



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


## Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



B

960,789









QP  
475  
• H 4  
12.12

# **Handbuch der Physiologischen Optik.**

---



24

61.

**Handbuch**

der

**Physiologischen Optik**

von  
Hermann Ludwig Ferdinand von  
**H. von Helmholtz.**

UNIVERSITY LIBRARY



CAUTION --- Please handle this volume with care.  
The paper is very brittle.

**HAMBURG UND LEIPZIG.**  
**Verlag von Leopold Voss.**  
**1896.**



Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung vorbehalten.

Druck der Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft  
(vormals J. F. Richter) in Hamburg.


## Vorrede zur ersten Auflage.

---

Die erste Abtheilung des vorliegenden Handbuches ist schon im Jahre 1856 erschienen, die zweite 1860, die dritte theils Anfang, theils Ende 1866. Die lange Verzögerung der Herausgabe des letzten Theils war theils durch äußere Gründe, zweimaligen Wechsel des Wohnortes und Wirkungskreises, sich zwischendrängende andere wissenschaftliche Arbeiten, theils durch innere Gründe veranlaßt. Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen ist gerade im Laufe der letzten Jahre sehr vielfältig bearbeitet worden, und hat eben angefangen ihren reichen Inhalt und das tiefgreifende Interesse, was sie besitzt, zu entfalten. Es könnte billiger Weise auch jetzt noch einem Zweifel unterliegen, ob es schon möglich ist, mit einiger Aussicht auf Erfolg einen, wenn auch nur vorläufigen, Abschluß eines so jungen und gleichsam noch gährenden Zweiges der Wissenschaft geben zu wollen, wie es doch der allgemeine Plan dieses Buches und der Encyclopädie, zu der es gehört, erfordert.\* Andererseits ist bei der eigenthümlichen Natur dieses Gebiets ein schneller Fortschritt zu einer endgültigen Beantwortung der noch offenen Fragen nicht gerade zu erwarten. Theils ist dasselbe eng verflochten mit den schwierigsten psychologischen Problemen, theils ist die Zahl der Beobachter gering, die es fördern können, da immer eine lange Uebung in der Beobachtung subjectiver Erscheinungen und in Beherrschung der Augenbewegungen vorhergehen muß, ehe

---

\* Die erste Auflage erschien als Band IX der *Allgemeinen Encyclopädie der Physik*, herausgegeben von GUSTAV KARSTEN. (A. K.)



Was die literarischen Uebersichten betrifft, die nach dem Plane der Encyclopädie verlangt wurden, so habe ich sie so gut gegeben, als ich bei den mir zu Gebot stehenden Hilfsmitteln konnte. Die neuere Literatur wird ziemlich vollständig sein; die ältere habe ich vielfach aus secundären Quellen zusammentragen müssen und kann für ihre Genauigkeit keine Garantie übernehmen. Die Ausarbeitung einer wirklich zuverlässigen Geschichte der physiologischen Optik würde eine Arbeit sein, die die Zeit und Kraft eines Forschers für lange Jahre in Anspruch nehme, und das entsprechende Interesse würde sie doch erst haben, wenn der Zustand der Wissenschaft selbst ein reiferer wäre, als er jetzt ist.

Mein Hauptstreben bei der Ausarbeitung des vorliegenden Buches ist es gewesen, mich durch eigenen Augenschein und eigene Erfahrung von der Richtigkeit aller, nur einigermaßen wichtigen Thatsachen zu überzeugen. Die Methoden der Beobachtung habe ich stets in derjenigen Ausführungsweise beschrieben, welche mir die zuverlässigste zu sein schien, und wo dieselben von der Methode des Entdeckers abweichen, bitte ich darin nicht eine unmotivirte Sucht nach Neuerungen zu sehen.

Mögen sachverständige Richter die Schwierigkeit und Weitläufigkeit der Aufgabe, die zu lösen war, berücksichtigen, wo sie das ihnen hier übergebene Buch zu tadeln finden sollten.

Heidelberg, im December 1866.

H. HELMHOLTZ.



Meinungen zu enthalten schien. Ich bin aber nicht darauf ausgegangen, im Texte des Buches eine vollständige Aufzählung und Kritik neuerer Meinungen zu geben. Dagegen soll am Schlusse eine möglichst vollständige Übersicht der Litteratur, nach dem Inhalte geordnet, folgen, deren Zusammenstellung Herr Dr. Arthur König übernommen hat.

Um die älteren Citate in der neuen Auflage finden zu können, sind die Seitenzahlen derselben am Rande des neuen Textes angegeben, und was umgearbeitet oder neu eingesetzt ist, ist durch ein an den Rand gesetztes \* bezeichnet, so daß der Leser die gemachten Änderungen leicht erkennt.

Auch von den Figuren ist ein großer Teil durch bessere neue ersetzt worden, andere sind neu hinzugefügt.

Berlin, im November 1885.

HERMANN VON HELMHOLTZ

---

Diese Worte waren der ersten Lieferung der neuen Auflage des vorliegenden Werkes zur Orientirung über die Gesichtspunkte, nach denen die Umarbeitung in Angriff genommen werden sollte, vorangeschickt. Seitdem sie niedergeschrieben, sind mehr als zehn Jahre vergangen, und inzwischen ist am 8. September 1894 Hermann von Helmholtz selbst von seinem Werke abberufen worden.

Das so umgrenzte Programm wurde in den ersten vier Lieferungen (Seite 1—320) im Wesentlichen eingehalten. Allmählich aber erwachte durch die neue Beschäftigung mit der physiologischen Optik bei dem Verstorbenen das Interesse an der Sache wieder zu der alten Intensität, und er begann auf's neue — freilich ohne selbst anhaltend zu experimentiren, sondern indem er sich auf die Beobachtungen und Messungen Anderer stützte — an der Lösung einzelner Probleme mitzuarbeiten. Es entstanden dadurch mehrere Abhandlungen, die dann, zum Theil verschmolzen mit großen Abschnitten aus den benutzten Abhandlungen Anderer, fast wörtlich in das vorliegende Handbuch aufgenommen wurden. Leider aber ließen die sonstigen wissenschaftlichen Interessen und die stets wachsenden beruflichen Arbeiten ihm keine Zeit, in gleicher Ausführlichkeit auch die übrigen Gebiete und Theorien zu

behandeln. Das hatte eine gewisse Ungleichmäßigkeit zur Folge, die im Interesse der abgerundeten, auch der entgegengesetzten Anschauung völlig gerecht werdenden Darstellung zu bedauern ist, aber sowohl gegenüber der großen wissenschaftlichen Bedeutung des Buches im Ganzen als auch der Ideenfülle des Neuhinzugekommenen verschwindet.

Nach dem Erscheinen der achten Lieferung (bis S. 640) betrachtete H. v. Helmholtz seine Arbeit für diese Auflage im Wesentlichen als beendet. Er wollte alles Folgende fast unverändert aus der ersten Auflage übernehmen, vielleicht nur einige mathematische Ausführungen fortlassen, insbesondere solche die schon in seinen „Wissenschaftlichen Abhandlungen“ enthalten waren. Als eine derartige Auslassung hatte er bereits (in Anm. 1 auf S. 640) die Ableitung des Drehungsgesetzes der Augen aus dem Principe der leichtesten Orientierung (S. 497—516 der ersten Aufl.) bezeichnet. Die Revision des weiteren Textes hatte er selbst noch bis zu dem Beginn des Abschnittes „allgemeine geometrische Betrachtung der Drehungen“ auf S. 645 vorgenommen, als am 12. Juli 1894 eine schwere Erkrankung aller weiteren Thätigkeit ein Ende setzte. Nach seinem Tode habe ich dann in Übereinstimmung mit den Erben und der Verlagsbuchhandlung die Fortführung des Werkes übernommen.

Wenn ich auch gewiß bin, daß der Verstorbene bei wirklicher Inangriffnahme der Arbeit, ebenso wie es bisher stets der Fall gewesen war, doch größere Änderungen und Einschaltungen gemacht haben würde, als er sie vorher beabsichtigte, so hielt ich mich trotzdem nicht für berechtigt, meine Aufgabe jetzt anders als jener Absicht entsprechend durchzuführen. Weitere Auslassungen als die oben angegebene konnte ich nicht vornehmen, da er keine bestimmte Äußerung darüber gemacht hatte; ich weiß nur, daß sie u. a. die Theorie des Horopters betreffen sollten. Abgesehen von kleinen Änderungen (Umstellung der Figuren, Berichtigung der Zeitangaben u. s. w.) habe ich daher den Text der ersten Auflage unverändert gelassen. Nur auf S. 799 ist eine Einschaltung (über die Tapetenbilder) gemacht, deren Wortlaut einer im Jahre 1878 von dem Verstorbenen veröffentlichten kleinen Abhandlung (Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin, 10. Mai 1878, S. 57—58. — Abgedruckt in du Bois-Reymond's Archiv. Jahrg. 1878, S. 322—324 und H. von Helmholtz, Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. II. S. 497—500) entnommen ist. Da ich weiß, daß der Verfasser Werth auf die hier mitgetheilte Beobachtung legte, so bedarf ihre Aufnahme keiner besonderen Rechtfertigung.

Von den beigegebenen Tafeln wurde Taf. I noch zu Lebzeiten des Verfassers ausgegeben. Taf. II hat ihm nur im Probeabzug vorgelegen. Fig. 1 dieser Tafel ist nach einer von Hrn. Prof. W. Uthoff hergestellten Zeichnung ausgeführt worden, für welche H. v. Helmholtz ihm an dieser Stelle seinen Dank aussprechen wollte. Ich bin gewiß, im Sinne des Verstorbenen zu handeln, wenn ich von dieser



Absicht hier Mittheilung mache. Taf. III—VIII sind unverändert aus der ersten Auflage übernommen worden.

Die oben bereits erwähnte Litteratur-Übersicht habe ich bis zum Schlusse des Jahres 1894 durchgeführt. Die Anordnung derselben schließt sich im Wesentlichen der Eintheilung des ganzen Buches an. Bis zum Jahre 1865 boten die in der ersten Auflage am Ende eines jeden Paragraphen gemachten Litteraturangaben ein so vortrefflich geordnetes und vollständiges Material, daß ich nur Weniges noch hinzufügen konnte. Von da an beginnt eigentlich erst meine Arbeit. Ich habe meine Zusammenstellungen, abgesehen von den allgemein verbreiteten Zeitschriften, nur aus secundären Quellen (Jahresberichten u. s. w.) machen können. Daher bitte ich zu entschuldigen, daß manche Citate besonders bei der ausländischen Litteratur in bibliographischer Hinsicht unvollständig sind. Die Angaben reichen aber stets aus, um die betreffende Abhandlung zu finden. Aus demselben Grunde konnte ich auch manchmal nicht entscheiden, ob die citirte Stelle sich auf die Originalabhandlung oder nur auf ein Referat über dieselbe bezog. In solchen Fällen habe ich lieber möglicherweise ein bloßes Referat aufgenommen, als den ganzen Hinweis fortgelassen. Wegen aller weiteren Einzelheiten verweise ich auf die besondere „Vorbemerkung“, welche auf Seite 1011 vorausgeschickt ist. Hier möchte ich allen Fachgenossen nur die dringende Bitte aussprechen, die Litteratur-Übersicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und mir persönlich oder der Verlagsbuchhandlung die aufgefundenen Lücken und Fehler mitzutheilen. Alle Angaben sollen bei sich später darbietender Gelegenheit dankbar berücksichtigt werden.

Berlin, im October 1896.

ARTHUR KÖNIG.

## Verzeichniss einiger Abkürzungen, welche in den ältern Citaten gebraucht sind.

Bei den aus der neueren Litteratur gemachten Citaten hat sich leider kein einheitliches Verfahren bei den Abkürzungen durchführen lassen.

Der Band des betreffenden Werkes ist jedes Mal mit römischer Ziffer, die Seite mit arabischer bezeichnet; wo eine Zeitschrift mehrere Serien von Bänden umfaßt, ist die arabishe Nummer der Serie, eingeklammert (....), der römischen Zahl des Bandes vorausgesetzt worden.

1. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — *Berl. Monatsber.*
2. Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse der Königl. Bair. Akademie der Wissenschaften. — *Abh. d. Münch. Ak.*
3. Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. — *Abh. d. Kön. Ges. zu Göttingen.*
4. Göttingische gelehrte Anzeigen unter Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. — *Götting. gel. Anz.*
5. Abhandlungen der Leipziger Akademie. *Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss.*
6. Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — *Leipz. Ber.*
7. Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von J. C. POGGENDORFF. — *Pogg. Ann.*
8. Journal für reine und angewandte Mathematik, herausgegeben von A. L. CRELLE. — *Crelle's J.*
9. Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, herausgegeben von FRORIEP und SCHLEIDEN. — *Fror. Not.*
10. Polytechnisches Journal, herausgegeben von J. G. DINGLER und E. M. DINGLER. — *Dingler's pol. J.*
11. *Archives des sciences physiques et naturelles* par DE LA RIVE, MARNAG et PICTET. — *Arch. d. sc. ph. et nat.* oder *Arch. de GENÈVE.*
12. *Philosophical transactions of the Royal Society of London.* — *Phil. Trans.*
13. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh.* — *Edinb. Trans.*
14. *Proceedings of the . . . meeting of the British Association.* — *Rep. of Brit. Assoc.*
15. *The London, Edinburgh and Dublin philosophical Magazine and Journal of science, conducted by* BREWSTER, TAYLOR, PHILLIPPS, KANE. — *Phil. Mag.*
16. *The Edinburgh new philosophical Journal, cond. by* R. JAMESON. — *Edinb. J.*
17. *The American Journal of science and arts, cond. by* SILLIMAN, B. SILLIMAN and DANA. — *Sillim. J.*
18. *Mémoires présentés à l'Académie Royale de Bruxelles.* — *Mém. de Brux.*
19. *Bulletin de l'Académie Royale des sciences et belles lettres de Bruxelles.* — *Bull. de Brux.*
20. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences de Paris.* — *C. R.*
21. *L'Institut, journal universel des sciences et des sociétés savantes en France et à l'étranger.* — *Inst.*
22. *Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris.* — *Mém. de Paris.*

23. *Mémoires des savants étrangers, présentés à l'Académie des Sciences à Paris.* — *Mém. d. Sav. étr.*
24. *Annales de chimie et de physique par MM. GAY-LUSSAC, ARAGO, CHEVREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT.* — *Ann. de ch. et de ph.*
25. *Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale.* — *Bull. de la Soc. d'enc.*
26. *Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg.* — *Bull. de St. Pét.*
27. *Mémoires présentés à l'Académie impériale de St. Pétersbourg.* — *Mém. de Pétersb.*
28. Archiv für Ophthalmologie, herausgegeben von F. ARLT, F. C. DONDEES und A. v. GRAEFE. — *Arch. f. Ophthalm.*
29. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. — *Wien. Ber.*
30. *Cosmos, revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des Sciences, redigée par MOIGNO.* Paris. — *Cosmos.*
31. Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde, herausgegeben von F. C. DONDEES und W. BERLIN. — *Arch. f. d. holl. Beitr.*
32. Nederlandsch Archief voor Genees. en Natuurkunde, uitgegeven door F. C. DONDEES en W. KOSTER. — *Nederl. Arch.*
33. .... Jaarlijksch Verslag betrekkelijk de verpleging en het onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. — *Jaarl. Versl. in het Nederl. Gasth.*
34. HENLE und PFLEUFFER Zeitschrift für rationelle Medicin. — *Henle u. Pfeuffer Zeitschr. oder Zeitschr. f. rat. Med.*
35. Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin, herausgegeben früher von J. MÜLLER, jetzt von C. B. REICHERT und E. DU BOIS-REYMOND. — *J. Müller's Archiv oder Reichert und du Bois Archiv.*
36. Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. — *Jahresber. d. Frankf. Ver.*
37. *Athenaeum, journal of literature, science and the fine arts.* — Athen.



## Inhaltsverzeichnifs.

	Seite
Vorrede zur ersten Auflage . . . . .	V
Vorrede zur zweiten Auflage . . . . .	VIII
Verzeichnifs einiger Abkürzungen . . . . .	XII

### ANATOMISCHE BESCHREIBUNG DES AUGES.

§. 1. Formen des Sehorgans im Allgemeinen. . . . .	3
§. 2. Sehnenhaut und Hornhaut. . . . .	5
Messungen der Dimensionen des Augapfels und der Hornhautkrümmung 8—10. Beschreibung und Theorie des Ophthalmometers von HELMHOLTZ 11—14.	
§. 3. Die Uvea. . . . .	22
Die Iris der Linse anliegend. Methode ihre Entfernung von der Horn- haut zu messen 25—30.	
§. 4. Die Netzhaut. . . . .	30
Messungen ihrer Elemente 37—38.	
§. 5. Die Krystalllinse. . . . .	38
§. 6. Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper. . . . .	39
Befestigung der Linse 40—42.	
§. 7. Umgebung des Auges. . . . .	42
Augenmuskeln 43.	

## PHYSIOLOGISCHE OPTIK.

§. 8.	Eintheilung des Gegenstandes. . . . .	47
	Allgemeine physikalische Eigenschaften des Lichtes 48—52.	

**Erster Abschnitt.****Die Dioptrik des Auges.**

§. 9.	Gesetze der Brechung in Systemen kugelliger Flächen. . . .	Seite 53
	Brechungsgesetz 53—54. Brechung an kugeligen Flächen 54—57. Eigenschaften der Cardinalpunkte 57—60. Mathematische Theorie der Brechung an einer Kugelfläche 60—71. Die Theoreme von GAUSS für die Brechung in centrirten Systemen von Kugelflächen 71—81. Linsen 81—85.	
§. 10.	Brechung der Strahlen im Auge. . . . .	85
	Das Netzhautbildchen 85—88. Das Gesichtsfeld 88. Die Cardinalpunkte des Auges 89. Schematisches und reducirtes Auge nach LISTING 89—91. Die Brechung in der Hornhaut 92—93. Die Brechung in der Krystalllinse 93—95. Die Brechungsverhältnisse der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges 95—99. Experimentelle Bestimmung der Cardinalpunkte todter Krystallinsen 99—102. Form der Krystalllinse an lebenden Augen 102—106. Lage der Cardinalpunkte des Auges und die Genauigkeit ihrer Bestimmung 106—109. Geschichtliches 109—112.	
§. 11.	Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut. . . . .	112
	Begriff der Accommodation 112—115. SCHEINER's Versuch 116—119. Refraktionszustände der Augen und die Größe der Accommodationsbreite 119—125. Die Größe der Zerstreuungskreise und das Visiren 125—128. Optometer 128—130. Geschichtliches über die Brillen 130.	
§. 12.	Mechanismus der Accommodation. . . . .	130
	Die Veränderung der Iris 130—131. Veränderungen der Linsenreflexe 132—134. Mechanismus der Accommodation 136—140. Schematisches Auge fernsehend und nahesehend 140—141. Messung der Aenderungen bei der Accommodation 141—147. Ansatz der Iris und des Ciliarmuskels 147—148. TH. YOUNG's Versuche über die Accommodation 149. Verschiedene Theorien der Accommodation 150—156.	
§. 13.	Von der Farbenzerstreuung im Auge. . . . .	156
	Schweiten in verschiedenen Farben 156—158. Farbige Ränder der Zerstreuungskreise 158—163. Die Dispersion im reducirten Auge berechnet 163—164. Berechnung der Helligkeit in einem durch Dispersion erzeugten Zerstreuungskreise 164—168. Geschichtliches 168—169.	
§. 14.	Monochromatische Abweichungen — Astigmatismus. . . . .	169
	Strahlenförmige Zerstreuungskreise 170—173. Verschiedenheit der Sehweite für verschiedene Meridiane 173—177. Theorie der Brechung für elliptische Form der Hornhaut und für schiefe Incidenz 178—179. Diffraction des Lichtes im Auge 180—181. Messungen an individuellen Augen und Geschichtliches 181—184.	

	Seite
§. 15. Die entoptischen Erscheinungen. . . . .	184
Beobachtungsweise 184—186. Feste Objecte 187—188. Fliegende Mücken 188—192. Wahrnehmung der Netzhautgefäße und der Blutbewegung 192—199. Theorie der entoptischen Parallaxe 199—200. Ort der lichtempfindlichen Schicht in der Netzhaut 200—201. Geschichtliches 201—202.	
§. 16. Das Augenleuchten und der Augenspiegel. . . . .	202
Bedingungen des Augenleuchtens 202—206. Mathematische Theorie des Augenspiegels 206—223. Verschiedene Formen der Augenspiegel 223—227. Beobachtungen mit dem Augenspiegel 227—228. Geschichtliches 228—230.	

### Zweiter Abschnitt.

#### Die Lehre von den Gesichtsempfindungen.

§. 17. Von der Reizung des Sehnervenapparates. . . . .	231
Reizbarkeit und spezifische Energie der Nerven 231—234. Reizung durch Licht 234—235. Mechanische Reizung 235—241. Reizung durch innere Ursachen 241—243. Electriche Reizung 243—248. Geschichtliches 248—249.	
§. 18. Von der Reizung durch Licht. . . . .	250
Die Substanz des Sehnerven selbst ist unempfindlich gegen das Licht 250—252. Die Größe des blinden Fleckes 252—254. Die hinteren Schichten der Netzhaut sind empfindlich 254—256. Von der Netzhautstruktur ist die Größe der kleinsten wahrnehmbaren Objecte abhängig (Sehschärfe) 256—264. Bleichung des Sehroths 265—268. Einwirkung des Lichtes auf das Pigmentepithel und die Innenglieder der Zapfen 268—269. Electriche Ströme des Sehnervenapparates 269—273. Geschichtliches 273—275.	
§. 19. Die einfachen Farben. . . . .	275
Das prismatische Spectrum, seine Farben und deren Grenzen 275—282. Ursache der Unsichtbarkeit der ultrarothten und ultravioletten Strahlen 282—284. Abhängigkeit des Farbeindrucks von der Intensität 284 bis 285. Die Farbenstufen des Spectrums verglichen mit der Tonleiter 288. Theorie der prismatischen Brechung 289—299. Methoden für die Herstellung reiner Spectren und Spectralfarben 299—306. Geschichte der Farbentheorie 306—310.	
§. 20. Die zusammengesetzten Farben. . . . .	311
Mischung der Farben und der Pigmente 311—316. Qualitäten der Mischfarben, insbesondere Complementärfarben 316—325. Construction der Farbentafel 325—341. Elementarerregungen 341—344. Th. Young's Theorie 344—350. Methoden zur Mischung farbigen Lichtes 350—357. Trichromatische Farbensysteme 357—359. Dichromatische Farbensysteme (Farbenblindheit) 359—369. Beziehung zwischen den dichromatischen und trichromatischen Systemen 369—372. Farbenblindheit der Netzhautperipherie 372—374. Farben kleiner Felder 374—375. Grenzen von Newton's Mischungsgesetz 375—376. Hering's Farbentheorie 376—382. Geschichtliches 382—384.	
§. 21. Von der Intensität der Lichtempfindung. . . . .	384
Das psychophysische Gesetz für die Helligkeit 384—394. Irradiation und Mitempfindung 394—402. Unterschiedsschwellen verschiedener Farben und das Eigenlicht der Netzhaut 402—415. Die unteren Reizschwellen 415. Principien der Photometrie 416—424. Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität 425—428. Vergleichung	



	Seite
verschiedener Farben betreffs ihrer Helligkeit (Purkinje'sches Phänomen) 428—433. Vergleichung der Helligkeit wenig unterschiedener Farben 434—439. Begriff der Helligkeit 439—444. Beziehung zwischen Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit (benutzt zur Berechnung der Urfarben) 444—462. Kürzeste Farbenlinien auf der Farbenscheibe 463—469. Farbenveränderungen bei abnehmender Intensität 469—473. Aeltere Methoden der Photometrie und Geschichtliches 473—480.	
§. 22. Die Dauer der Lichtempfindung. . . . .	480
Die scheinbar continuirliche Helligkeit intermittirenden Lichtes 480—488. Die Dauer des Lichteindrucks 488—491. Einrichtung der Farbenscheiben und Farbenkreisel 491—493. Stroboskopische Scheiben 491—496. Anorthoskop 496—501. Geschichtliches 501.	
§. 23. Die Veränderungen der Reizbarkeit. . . . .	501
Positive Nachbilder 501—505. Negative Nachbilder 505—513. Zeitlicher Verlauf eines Lichteindrucks 513—516. Farbenercheinungen der Nachbilder 516—534. Theorien der Nachbilder 534—536. Geschichtliches 536—537.	
§. 24. Vom Contraste. . . . .	537
Successiver Contrast 537—542. Simultaner Contrast 542—553. Fälle gleichnamiger inducirter Farbe 553—557. Einfluss der Vorstellung von der Lage und der Beschaffenheit der gesehenen Objecte 557—564. Theorien des Contrastes 564—566.	
§. 25. Verschiedene subjective Erscheinungen. . . . .	566
Der gelbe Fleck 566—570. Haidinger's Polarisationsbüschel 570—572. Verschiedene andere Erscheinungen 572—575.	

### Dritter Abschnitt.

#### Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen.

§. 26. Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen. . . . .	576
Abgrenzung gegen die Psychologie 576—578. Die inductiven Schlüsse 578—583. Die Wahrheit unserer Vorstellungen 583—591. Das Gesetzliche in den Erscheinungen und die Begriffe 591—594. Idealismus und Realismus 594—596. Hypothesen über den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinneseindrücke 596—606. Empiristische und nativistische Theorie. Einfluss der Erfahrung 606—612. Geschichtliches 612—613.	
§. 27. Die Augenbewegungen . . . . .	613
Der Drehpunkt des Auges 613—616. Festsetzung der Bezeichnungen 616—618. Gesetz der Raddrehung, Listing's Gesetz 618—625. Einfluss der Convergenz 625—626. Wirkung der Augenmuskeln 626—628. Willkür bei den Augenbewegungen 628—636. Bedeutung des Bewegungsgesetzes für die Orientirung 637—645. Allgemeine geometrische Betrachtung der Drehungen 645—656. Beobachtungsmethoden für den Drehpunkt und das Drehungsgesetz 656—665. Bestimmung der Muskelansätze und der Drehungsachsen, Ophthalmotrope 665—668. Geschichtliches 668—669.	
§. 28. Das monoculare Gesichtsfeld. . . . .	669
Die flächenhafte Anordnung der Objecte im Gesichtsfeld 669—682. Das Augenmaass im directen und indirecten Sehen 682—705. Täuschungen des Augenmaasses durch besondere Bilder 705—716. Ausfüllung des blinden Fleckes 716—727. Parallaxe des indirecten Sehens 727—730. Beobachtungen an Blindgeborenen 731—738. Geschichtliches 738—741.	

## INHALT.

XIX

	Seite
§. 29. Die Richtung des Sehens. . . . .	741
Das Innervationsgefühl der Augenmuskeln controllirt durch die Bilder, der Schwindel 741—751. Das Centrum der Sehrichtungen 751—757. Localisation der subjectiven Erscheinungen 758—764. Geschichtliches 765—766.	
§. 30. Wahrnehmung der Tiefendimension. . . . .	766
Monoculare Wahrnehmung der Tiefendimension 766—781. Binoculare Tiefenwahrnehmung 781—795. Die unvollkommene Beurtheilung der Convergenz und ihre Folgen; Reliefbilder 795—812. Geometrische Darstellung der stereoskopischen Projection 812—823. RECKLINGHAUSEN's Normalfläche 823—829. Verschiedene Formen des Stereoskops 829—838. Geschichtliches 838—841.	
§. 31. Das binoculare Doppeltsehen. . . . .	841
Bestimmung der correspondirenden Punkte beider Sehfelder 841—860. Der Horopter 860—867. Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung 867—874. Trennung und Verschmelzung der Doppelbilder 874—895. Geometrische Darstellung der correspondirenden Punkte und des Horopters 895—918. Geschichtliches 918—915.	
§. 32. Wettstreit der Sehfelder. . . . .	915
Wettstreit der Contouren 916—924. Wettstreit der Farben 924—932. Glanz 932—936. Contrast 936—945. Geschichtliches 945.	
§. 33. Kritik der Theorien. . . . .	945
Die Grundlagen der empiristischen Theorie 945—955. PANUM's Theorie 955—960. HERRING's Theorie 960—971.	

## SACH- UND NAMENREGISTER.

Sachregister . . . . .	975
Personenregister . . . . .	988
Berichtigungen . . . . .	1007

## ÜBERSICHT ÜBER DIE PHYSIOLOGISCH-OPTISCHE LITTERATUR.

Vorbemerkung . . . . .	1011
Inhaltsverzeichniss . . . . .	1013
Litteraturübersicht . . . . .	1015
Autorenregister . . . . .	1311



# **Anatomische Beschreibung des Auges.**

---



## § 1. Formen des Sehorgans im Allgemeinen.

1

Die Augen der Thiere unterscheiden:

Entweder nur Hell und Dunkel. Dies ist wahrscheinlich bei den sogenannten Augenpunkten der niedersten Thierformen (Ringelwürmer, Eingeweidewürmer, Seesterne, Seeigel, Quallen, Infusionsthierchen) der Fall. Ein lichtempfindender Nerv, dessen peripherisches Ende dem Lichte zugänglich unter durchsichtigen Decken liegt, genügt zu diesem Zwecke. Das peripherische Ende des Nerven scheint meistens von verschiedenfarbigem Pigment umgeben zu sein, und verräth sich dadurch dem Beobachter. Doch wissen wir durchaus noch nicht, ob alle pigmentirten sogenannten Augenpunkte der niederen Thierformen wirklich zur Lichtempfindung dienen. Anderseits müssen wir aus der Empfindlichkeit, welche niedere Thiere ohne Augenpunkte für das Licht zeigen, schliessen, daß auch lichtempfindende Nerven in durchsichtigen Thieren ohne Pigment vorkommen, die nur der Beobachter in keiner Weise als solche erkennen kann.

Oder die Augen unterscheiden nicht bloß Hell und Dunkel, sondern auch Gestalten. Um das zu können, muß Licht, welches von gesonderten leuchtenden Punkten ausgeht, gesondert, d. h. mittels verschiedener Nervenfasern wahrgenommen werden. Es darf dann nicht mehr jede einzelne Nervenfaser von allen Seiten des Raums her Licht empfangen, sondern nur von einem beschränkten Theile des Raums. Jeder einzelnen Nervenfaser entspricht dann ein gewisses Gesichtsfeld, und es wird in der Wahrnehmung unterschieden werden können, in welchen dieser elementaren Gesichtsfelder leuchtende Körper liegen, in welchen nicht. Je kleiner jedes einzelne Gesichtsfeld ist und je größer ihre Gesamtzahl, desto kleinere Theile der uns umgebenden Körper können unterschieden werden, bis bei der höchsten Vollendung des Gesichtorgans die einzelnen elementaren Gesichtsfelder gegen das Gesamtgesichtsfeld verschwindend klein werden. Für ein solches Organ können wir die Bedingung des deutlichen Sehens so aussprechen: Licht, welches von einem leuchtenden Punkte der Außenwelt kommt, darf nur auf einen Punkt der lichtempfindenden Nervenmasse (Netzhaut) fallen.

Die Scheidung des Lichts, welches von verschiedenen Seiten des Raums kommt, geschieht

entweder durch trichterförmig gestellte, undurchsichtige Scheidewände (zusammengesetzte Augen der Wirbellosen),

oder durch Brechung des Lichts an gekrümmten brechenden Flächen (einfache Augen der Wirbellosen und Augen der Wirbelthiere).

Die Trennung der Augen, welche nur Hell und Dunkel, und derer, welche auch Gestalten wahrnehmen, ist keine scharfe. Schon bei den niedersten

Thierformen bewirken die Pigmentscheiden der lichtempfindenden Nervenfasern, daß Licht nur von der freien Seite auf das Ende der Faser fallen kann, und mit Hülfe von Bewegungen seines Körpers wird ein Thier mit solchen Augenpunkten schon ermitteln können, von welcher Seite das meiste Licht kommt, ebenso wie der Mensch durch sein Hautgefühl die Richtung einstrahlender Wärme wahrnimmt, oder ein Kranker mit vollständig getrübler Krystalllinse den Ort der Fenster eines Zimmers ermittelt. In dieser Beziehung haben die Pigmentscheiden der Augenpunkte offenbar einen sehr wesentlichen Nutzen. Wo, wie bei den Blutegeln und Planarien, vor der Nervensubstanz noch ein durchsichtiger kugelig oder kegelförmiger Körper liegt, können schon verschiedene Theile der Netzhaut von dem aus verschiedenen Richtungen einfallenden Lichte verschieden stark getroffen werden. Von diesen findet ein allmählicher Fortschritt der Ausbildung statt durch die einfachen Augen der Crustaceen, Arachniden und Insecten, welche meist hinter der Hornhaut noch eine Linse und einen Glaskörper unterscheiden lassen, zu denen der Mollusken und namentlich der Cephalopoden, welche letzteren denen der Wirbelthiere schon sehr ähnlich sehen. Da die mikroskopischen Elemente der thierischen Gewebe, namentlich auch die des Nervensystems, in allen Klassen ziemlich gleiche Gröfse besitzen, und die Genauigkeit des Sehens wesentlich zusammenhängt mit der Menge einzelner empfindender Elemente, die Zahl dieser aber nahehin proportional sein muß der hinteren Oberfläche des Glaskörpers der einfachen Augen, so ist im Allgemeinen wohl anzunehmen, daß die Genauigkeit des Sehens dieser Augen ihren linearen Dimensionen direct proportional ist.

- 3 Vom Auge des Menschen habe ich in *Fig. 1.* einen horizontalen Querschnitt abgebildet in viermaliger Vergrößerung; das Auge der Wirbelthiere ist dem menschlichen im wesentlichen ähnlich gebaut. Diese Augen schliessen folgende durchsichtige Theile ein:

- 1) die wässrige Feuchtigkeit in der vorderen Augenkammer *B.*
- 2) die Krystalllinse *A.*
- 3) den Glaskörper *C.*

Umschlossen sind diese Theile von drei in einander liegenden Systemen von Häuten.

1) System der Netzhaut *i* und *Zonula Zinnii e*, schließt zunächst den Glaskörper ein und heftet sich vorn an die Linse *A.*

2) System der *Uvea*, besteht aus der durch einen stärkeren schwarzen Strich angedeuteten Aderhaut (*Chorioidea*) *g*, dem Ciliarkörper *h* und der Regenbogenhaut (*Iris*) *b*. Es umschließt das vorige System mit der Linse und hat nur an der vorderen Seite vor der Linse eine Oeffnung, die Pupille.

3) Die feste Kapsel des Augapfels, welche in ihrem größeren hinteren Theile aus der undurchsichtigen weissen Sehnenhaut (*Sclerotica*) und in dem kleineren vorderen aus der durchsichtigen knorpeligen Hornhaut (*Cornica*) gebildet wird. Am lebenden Auge sieht man zwischen den Augenlidern den vorderen Theil der Sehnenhaut (das Weiße) und hinter der durchsichtigen



und hervorspringenden Hornhaut die braun- oder blaugefärbte ringförmige Iris, in deren Mitte die schwarze Pupille.

Eine Linie, welche durch den Mittelpunkt der Hornhaut und durch den Mittelpunkt des ganzen Auges geht, nennt man die *Axe des Auges*, weil das Auge wenigstens annähernd einem Rotationskörper mit dieser Axe entspricht. Eine darauf senkrechte Ebene, welche durch die grösste Weite des Augapfels geht, nennt man dagegen die *Äquatorialebene*.




Fig. 1.

Ich werde im Folgenden eine Beschreibung der einzelnen Theile des Auges geben, dabei aber natürlich nur so weit in Einzelheiten gehen, als es für das Verständniß der Functionen des Auges nothwendig ist.

## § 2. Sehnenhaut und Hornhaut.

Die Sehnenhaut des Auges (*σκληρόν*, *tunica albuginea*, *sclerotica*, *dura*, harte Haut) umschliesst den grösseren Theil des Augapfels, bedingt seine Gestalt und schützt ihn vor äusseren Einwirkungen. Ihre äussere Form weicht merklich von der einer Kugel ab; ihre hintere Seite ist nämlich abgeplattet, und im Äquator wird sie oben und unten, rechts und links durch

den Druck der geraden Augenmuskeln etwas eingedrückt, während sie sich zwischen diesen Stellen stärker hervorwölbt. Der größte Durchmesser liegt bei den meisten Individuen von der Nasenseite und oben nach der Schläfenseite und unten. Vorn nimmt die Sehnenhaut die stärker gewölbte Hornhaut in sich auf, hinten und etwas nach der Nase herüber ist sie durchbohrt, um den Sehnerven (*Nervus opticus*) *Fig. 1. d* eintreten zu lassen, und geht hier in dessen sehnigen Überzug über. Die Sehnenhaut ist hinten und vorn dicker als in dem Äquator des Auges, wie dies die Figur zeigt. Die vordere Verdickung wird dadurch bedingt, daß die Sehnen der Augenmuskeln sich an die Sehnenhaut anlegen und mit ihr verschmelzen. Bei *m* ist der Ansatzpunkt des inneren, bei *n* der des äußeren geraden Augenmuskels.

Das Gewebe der Sehnenhaut ist Sehnengewebe; es ist weiß, wenig durchscheinend, biegsam, fast unausdehnbar. Seiner chemischen Beschaffenheit nach gehört es zu den leingebenden Stoffen. Mikroskopisch besteht es aus einem äußerst dichten und straffen Geflechte von Bindegewebsfasern, welche meist der Oberfläche parallel verlaufen, und daher eine unvollkommene Spaltbarkeit der Haut in Lamellen zulassen. Dazwischen liegt, wie in anderen Sehnen, ein Netzwerk äußerst feiner elastischer Fasern, welche an den Stellen, wo sich ursprünglich ihre Bildungszellen befanden, Verdickungen mit Kernrudimenten zeigen.

- 5 Die Hornhaut ist vorn in die Sehnenhaut eingesetzt, und hat im Allgemeinen die Form eines stark gekrümmten Uhrglases. Ihre vordere Fläche schließt sich ziemlich nahe einem Abschnitte eines Rotationsellipsoides an, welches um seine längere Axe gedreht ist. Das Ende dieser Axe liegt in dem Mittelpunkte der Hornhaut. Die Form der hinteren Fläche ist nicht sicher bekannt. Bei Erwachsenen ist die Hornhaut in der Mitte etwas dünner als am Rande.

Die Hornhaut besteht aus folgenden Schichten von außen nach innen:

1) Ein Epithelium, aus geschichteten Zellen von Hornsubstanz gebildet (Pflasterepithelium), in *Fig. 1* angedeutet durch die gebrochene Linie *ff*. Es setzt sich auf die Bindehaut der Augenlider fort. Die vordere Fläche dieses Epitheliums wird durch die fortdauernd zufließende Thränenfeuchtigkeit feucht und glatt erhalten.

2) Die faserige Schicht der Hornhaut (*Substantia propria corneae*) ist die mächtigste von allen, in der Figur weiß gelassen. Sie gehört nach ihrer chemischen Zusammensetzung den Knorpeln an, indem sie beim Kochen Chondrin giebt. Sie besteht aus einem ähnlichen Gewebe von Fasern, wie die Sehnenhaut, nur sind die Fasern zu platten Bündeln vereinigt, deren Fläche der Oberfläche der Hornhaut parallel läuft, daher auch die Hornhaut sich unvollkommen in Schichten trennen läßt. Beim Erwachsenen enthält die Hornhaut keine blutführenden Gefäße, wohl aber zwischen den Faserbündeln ein System verästelter kernhaltiger Zellen, wie sie als unentwickeltes elastisches Gewebe in den meisten bindegewebigen Organen sich finden, und wahrscheinlich unterhalten diese den zur Ernährung der Hornhaut nöthigen Austausch von Flüssigkeiten durch die Substanz hin. Die Substanz der

Hornhaut erscheint bei der gewöhnlichen Beleuchtung vollkommen durchsichtig. Concentriert man aber viel Licht durch eine Sammellinse auf einen Punkt der Hornhaut, so erscheint sie trüb, indem nun das von den Grenzflächen ihrer mikroskopischen Elemente zurückgeworfene Licht reichlich genug wird, um wahrgenommen zu werden.

3) Die DESCOMET'sche Haut (Wasserhaut, glasartige Lamelle der Hornhaut, auch *Membrana Demoursii*) ist eine structurlose, durchsichtige, brüchige Membran von 0,007 mm bis 0,015 mm Dicke. Wenn man sie von der Hornhaut trennt, rollt sie sich auf. Sie schließt sich durch ihre Resistenz gegen kochendes Wasser, Säuren und Alkalien dem elastischen Gewebe an. Auf ihrer der wässrigen Feuchtigkeit zugewendeten Fläche trägt sie eine Schicht großer polygonaler Epithelialzellen, welche in Fig. 1 durch die Doppellinie auf der inneren Seite der Hornhaut angedeutet ist.

Die Grenzfläche zwischen Hornhaut und Sehnenhaut ist nicht senkrecht gegen die Oberfläche des Augapfels, sondern ausßen greift die Sehnenhaut, innen die Hornhaut weiter über. Auf der inneren Fläche ist die Grenze der Hornhaut ein ziemlich regelmäßiger Kreis, von ausßen erscheint die Hornhaut dagegen queroval, weil oben und unten die Sehnenhaut etwas mehr übergreift als an den Seiten. Die Fasern der Hornhaut gehen an dieser Grenze unmittelbar in die der Sehnenhaut über.

Eigenthümlich verhält sich dagegen die DESCOMET'sche Haut an der Grenze der Hornhaut. In

Fig. 2 ist ein stark vergrößerter Querschnitt dieser Gegend dargestellt. Darin ist *S* die Sehnenhaut, *C* die Hornhaut, *c* ihr äußeres Epithelium, *e* welches auf die Bindehaut *D* übergeht, *d* die DESCOMET'sche Haut. Von *f*




Fig. 2.

ab entspringt zwischen dieser und der Substanz der Hornhaut ein Netzwerk elastischer Fasern, während die DESCER'Sche Haut selbst mit einem zugeschärften Rande zu enden scheint. Indem sich die Schicht elastischer Fasern von der Sehnenhaut trennt, und weiter hinten sich an eine Lamelle derselben ansetzt, entsteht hier an der Grenze zwischen Sehnenhaut und Hornhaut ein ringförmiger Kanal, der SCHLEMM'sche Kanal (*a* in *Fig. 1* und *A* in *Fig. 2*). Nach außen ist derselbe von der Sehnenhaut begrenzt, seine innere Wand besteht dagegen vorn aus elastischem Gewebe, hinten aus Sehnengewebe. An dieser inneren Wand sind die muskulösen Theile der Uvea befestigt. Der genannte Kanal scheint Blut zu führen.

Die Messungen der Dimensionen des Auges sind für die physiologische Optik von der größten Wichtigkeit, aber meist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, weil die Gestalt des ganzen Augapfels und seiner einzelnen Theile einmal bei verschiedenen Augen außerordentlich verschieden ist, und zweitens nach dem Tode den mannigfachsten Veränderungen unterliegt. Die individuellen Verschiedenheiten sind so groß, dass man Mittelwerthe aus Beobachtungen verschiedener Augen nur mit großer Vorsicht anwenden darf. Wo es auf genaue und sichere Resultate ankommt, müssen alle wichtigeren Größen durchaus an demselben Auge gemessen sein.

Was zunächst die äußere Form des Augapfels anlangt, so hängt dieselbe vom Druck der Flüssigkeiten ab, die er einschließt. Unmittelbar nach dem Tode entleert sich ein großer Theil seiner Blutgefäße, wobei sich der Druck natürlich verringert; dann vermindert sich allmählich die innere Flüssigkeitsmenge auf endosmotischem Wege noch mehr, so daß der Augapfel schlaff wird, und die Häute, namentlich die Hornhaut, sich falten. Messungen über die Form des Augapfels müssen daher entweder an sehr frischen Augen angestellt werden, oder man muß, wie BRÜCKE<sup>1</sup>, den Druck künstlich wiederherstellen, indem man durch den Sehnerven eine Canüle einstößt und diese mit einer senkrechten, eine Wassersäule von etwa 0,4 m enthaltenden Röhre in Verbindung bringt. Diese Methode genügt, um die verschiedenen Durchmesser des Augapfels zu messen. Aber für eines der wichtigsten optischen Elemente des Auges, die Hornhautkrümmung, genügt es nicht den Druck nur annähernd herzustellen. Der Krümmungsradius des Scheitels der Hornhaut wird, wie ich durch eine unten beschriebene Messungsmethode gefunden habe, desto größer, je größer der Druck. Der Grund hiervon ist wohl darin zu suchen, daß eine membranöse Hülle, welche Flüssigkeit umschließt, sich desto mehr der Form einer Kugel nähern muß, je größer der Druck der Flüssigkeit ist, weil die Kugel unter den Körpern mit gleich großer Oberfläche das größte Volumen hat. Wenn dies beim Auge eintritt, wird namentlich die einspringende Rinne zwischen Hornhaut und Sehnenhaut herausgedrängt werden müssen, und dadurch die Hornhaut weniger gewölbt werden.

Unter diesen Umständen ist es offenbar ein wesentliches Bedürfnis, daß so viel als möglich alle wichtigeren Größenverhältnisse des Augapfels an lebenden Augen bestimmt werden.

Die älteren Messungen des Auges sind meist nur mit dem Zirkel ausgeführt. C. KRAUSE, welcher ein sehr ausgedehntes System von Messungen durchgeführt hat, hat zuerst die äußeren Dimensionen des Auges mit dem Zirkel abgemessen; dann hat er die Augen, nachdem er sich die Schnittlinie vorher bezeichnet hatte, halbt, und zwar Hornhaut, Iris und Linse durch einen Schnitt des Rasirmessers, die Sehnenhaut mit der Scheere, die Hälften dann in ein Schälchen voll Eiweißlösung gelegt, so daß die Schnittfläche sich dicht unter der Oberfläche der Flüssigkeit befand. So maß er die Dimensionen des Querschnitts, theils mit dem Zirkel, theils mit einem gegitterten Glasmikrometer im

<sup>1</sup> E. BRÜCKE, *Anat. Beschreibung des menschl. Augapfels*. Berlin 1847. S. 4.

Oculare eines schwach vergrößernden Mikroskops, theils mit einem quadratischen Drahtnetze, welches auf die Oberfläche der Flüssigkeit gelegt wurde. Er hatte vielfach Gelegenheit sehr frische Augen anzuwenden; bei diesen können die äusseren Messungen 7 der Sclerotica als hinreichend zuverlässig angesehen werden, die Wölbung der Hornhaut, deren Grösse vom Drucke der Flüssigkeiten abhängt, ist aber wohl an den durchgeschnittenen Augen beträchtlich verändert gewesen.

Ich gebe hier KRAUSE's Tafel für die Form von 8 Augäpfeln.<sup>1</sup> Es ist Nr. I von einem 30jährigen ertrunkenen Manne, Nr. II das rechte Auge eines 60jährigen Mannes, durch einen Schnitt in den Hals getödtet, Nr. III und IV das linke und rechte Auge eines 40jährigen Mannes, erhängt, Nr. V und VI das linke und rechte Auge eines 29jährigen, Nr. VII und VIII dieselben eines 21jährigen Mannes, die beiden letzten mit dem Schwerte hingerichtet. Die Maasse sind in Pariser Linien angegeben.

Nr.	Axe des Auges		Durchmesser					
	äussere	innere	trans- versal.	senkrechter		diagonaler größer		kleiner
				äusserer	innerer	äusserer	innerer	
I.	10,9	9,85	10,9	10,8	9,9	11,25	10,3	
II.	11,05	10,0		10,3	9,4	11,1	10,2	11,05
III.	10,7	9,8	10,7	10,5	9,6	11	10,2	10,6
IV.	10,5	9,5	10,6	10,3	9,5	10,9	10,1	10,7
V.	10,8	9,55	10,9	10,55	9,6	11,3	10,35	11
VI.	10,8	9,55	11	10,6	9,45	11,3	10,2	11,1
VII.	10,65	9,4	10,75	10,3	9,45	10,75	9,6	10,75
VIII.	10,65	9,45	10,75	10,3	9,15	10,9	9,75	10,7

BRÜCKE hat Messungen an Augen angestellt, welche durch einen Wasserdruck von 4 Decimeter gespannt waren, und giebt an, dass die Axe des Augapfels zwischen 23 und 26 mm betrage, der größte horizontale Durchmesser zwischen 22,8 und 26 mm, der größte verticale zwischen 21,5 und 25 mm.

C. KRAUSE vergleicht die innere Wölbung der Sclerotica mit der Fläche eines Rotationsellipsoides; die Axen, welche er berechnet hat, und seine Angaben über Dicke der Hornhaut und Sclerotica an verschiedenen Stellen führe ich hier noch an.

Nr.	Dicke der Sehnenhaut			Halbe Axen des Ellipsoides der inneren Wölbung		Dicke der Hornhaut	
	in der Augen- axe.	am Äquator.	am vorderen Rande.	große	kleine	Mitte	Rand
I.	0,55	0,45	0,35	5,12	4,45	0,4	0,5
II.	0,5	0,35		5,05	4,15	0,35	0,5
III.	0,45	0,4	0,35	5,12	4,23	0,4	0,5
IV.	0,5	0,4	0,3	5,07	4,41	0,4	0,45
V.	0,65	0,4	0,3	5,14	4,58	0,5	0,55
VI.	0,65	0,5	0,3	5,05	4,43	0,48	0,55
VII.	0,55	0,5	0,4	5,05	4,41	0,53	0,63
VIII.	0,6	0,5	0,4	4,93	4,19	0,5	0,62

<sup>1</sup> Zusammenstellungen von Messungen s. in ZEHENDER, *Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges*. Erlangen 1855, und MERKEL, *Makroskopische Anatomie des Auges*, (GRAEFE und SAEMISCH *Handbuch der Augenheilkunde*. Leipzig 1874. Bd. I. Th. 1.) S. 44.

Die Messungen von C. KRAUSE über die Form der Hornhaut übergehe ich hier, weil deren Methode für ein so wichtiges Element nicht zuverlässig genug erscheint. Ich bemerke nur, daß er die vordere Wölbung der Hornhaut für eine Kugelfläche, die hintere für den Scheitel eines Rotationsparaboloides erklärt. Betreffs der Dicke fand ich an einigen Hornhäuten, die ich untersuchte, daß die Dicke in den mittleren zwei Vierteln des Querschnitts fast constant war, und erst gegen den Rand hin schnell zunahm, so daß in der Mitte die Krümmungskreise der beiden Flächen nahe concentrisch zu sein scheinen.

6 R. H. KOHLRAUSCH hat an lebenden Augen den Krümmungsradius der Hornhaut dadurch zu messen gesucht, daß er die GröÙe der Spiegelbilder auf der Hornhaut bestimmte. Der, dessen Auge untersucht werden sollte, saß auf einem sehr massiven Stuhle mit hoher Lehne. Sein Kopf wurde durch eine besondere Vorrichtung gehalten, wodurch es ihm leicht wurde, vollkommen ruhig zu sitzen. Er fixirt einen kleinen weißen Punkt, der auf dem Mittelpunkte des Objectivs eines auf 2 bis 3 Fuß Entfernung zu gebrauchenden KEPLER'schen Fernrohrs angebracht ist. Das Fernrohr ist auf das Auge gerichtet, und zwar so, daß der besagte weiße Punkt in derselben Horizontalebene mit dem Mittelpunkte der Hornhaut liegt. In dem Brennpunkte des Oculars sind zwei Spinnfäden parallel gespannt, welche, ohne ihren Parallelismus zu verlieren, durch Schraubebewegung einander genähert werden können. Auf jeder Seite, wieder in derselben Horizontalebene, steht ein Licht, dessen Schein durch eine runde Öffnung in einem kleinen Schirme auf das Auge fällt und von diesem reflectirt wird, so daß im Fernrohre zwei kleine Bilder der leuchtenden Punkte erscheinen. Nachdem die Spinnfäden auf diese genau gerichtet sind, wird an die Stelle des Auges ein wohlgetheilter Maafstab gebracht, und auf diesem die Entfernung der spiegelnden Stellen der Hornhaut abgelesen. Aus dieser Entfernung, aus dem Abstände des Auges von den Öffnungen in den Lichtschirmen und dem Mittelpunkte des Objectivs, und endlich aus der Entfernung der letztgenannten Punkte von einander wurde der Radius der Hornhaut annäherungsweise berechnet.

KOHLRAUSCH fand aus Messungen an 12 Augen im Mittel 3,495 Par. Lin. (7,87 mm), als kleinsten Werth 3,35, als größten 3,62, und berechnet den wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Bestimmungen auf 0,02.

SENEFF hat nach einer ähnlichen, aber nicht genauer beschriebenen Methode nicht bloß die Krümmungshalbmesser, sondern auch die Ellipticität der Hornhaut bestimmt und giebt folgende Resultate an:

	Krümmungshalbmesser im Scheitel.	Quadrat der Excentricität.	GroÙe Axe.	Kleine Axe.	α
Rechtes Auge. Vertical.	7,796	0,1753	9,452	8,583	3°,6
Rechtes Auge. Horizontal.	7,794	0,2531	10,435	9,019	2°,9
Linkes Auge. Vertical.	7,746	0,4492	11,243	8,344	1°,6

Den Winkel α nennt SENEFF den Winkel zwischen dem Scheitel der Ellipse und dem Endpunkte der Augenaxe. Jener liegt von diesem in den verticalen Durchschnitten nach unten, in dem horizontalen nach aussen. Wahrscheinlich versteht SENEFF hier unter Augenaxe dasselbe, was wir später als Gesichtslinie definiren werden.

Die größte Schwierigkeit bei diesen Messungen ist die, das Auge und den Kopf des Untersuchten gehörig zu befestigen. Bei einer jeden Messungsmethode der Bilder, wobei man erst abzulesen hat, mit welchem Theilstriche der gewählten Scale der eine Rand des Hornhautbildes, und dann, mit welchem der andere zusammentrifft, wird jede kleinste Verschiebung des Kopfes zwischen den beiden Ablesungen zur GröÙe des Bildes addirt oder davon subtrahirt werden. Ich habe deshalb ein Meßinstrument construirt, welches diese und andere Messungen am Auge genau auszuführen erlaubt, ungestört durch

die kleinen Schwankungen des Kopfes, und es eben deshalb Ophthalmometer genannt, obgleich es auch zu einer grossen Menge anderer Messungen, namentlich zu Messungen optischer Bilder mit Vortheil anzuwenden ist. Wenn wir durch eine planparallele Glasplatte, die wir schräg gegen die Gesichtslinie halten, nach einem Gegenstande blicken, sehen wir diesen in seiner natürlichen Grösse, aber um ein wenig seitlich verschoben, und diese Verschiebung ist desto gröfser, je kleiner der Winkel zwischen den Lichtstrahlen und den Flächen der Platte wird. Das Ophthalmometer ist im Wesentlichen ein Fernrohr, zum Sehen auf kurze Distanzen eingerichtet, vor dessen Objectivglase neben einander zwei Glasplatten stehen, so dafs die eine Hälfte des Objectivglases durch die eine, die andere durch die andere Platte sieht. Stehen beide Platten in einer gegen die Axe des Fernrohrs senkrechten Ebene, so erscheint nur ein Bild des betrachteten Objects,




Fig. 3.

dreht man aber beide Platten ein wenig und zwar nach entgegengesetzten Seiten, so theilt sich das einfache Bild in zwei Doppelbilder, deren Entfernung desto gröfser wird, je gröfser der Drehungswinkel der Glasplatten. Diese Entfernung der Doppelbilder aber kann aus den Winkeln, welche die Platten mit der Axe des Fernrohrs machen, berechnet werden. Stellt man die beiden Doppelbilder einer zu messenden Linie so auf einander ein, dafs sie sich gerade mit ihren Enden berühren, so ist die Länge der Linie gleich der Entfernung der beiden Doppelbilder von einander und wie diese zu berechnen.

Das Instrument ist in Fig. 3 in einer verticalen Ansicht gezeichnet, in Fig. 4 in einem horizontalen Durchschnitte, in halber natürlicher Grösse. Der viereckige Kasten  $B_1, B_1, B_2, B_2$ , welcher die ablenkenden Glasplatten enthält, ist am vorderen Ende des Fernrohrs  $A$  befestigt. In Fig. 3 ist die vordere Wand des Kastens weggenommen, und ausserdem sind alle Theile der unteren Hälfte in der Mittelebene durchschnitten gedacht. Die Grundlage des Kastens bildet ein starker viereckiger Rahmen, den man in Fig. 3

rings um den Kasten laufen sieht; an diesen sind dünne Messingplatten als Wände befestigt, wie namentlich in *Fig. 4* sichtbar ist. In der Mitte der horizontalen Theile des Rahmens sind conische Durchbohrungen vorhanden, in denen die Drehungsaxen  $CC$  der beiden Gläser laufen. Jede der Axen trägt ausserhalb des Kastens eine Scheibe  $d$ , deren cylindrischer Umfang in Winkelgrade getheilt ist; bei  $a$  ist ein Nonius angebracht, mittels dessen Zehnthelle eines Grades abgelesen werden können. Innerhalb des Kastens trägt jede Axe zunächst ein Zahnrad  $cc$  und einen Metallrahmen  $g$ , in welchem die Glasplatte  $f$  befestigt ist. Der Rahmen jeder Platte hat aber nur drei Seiten, die der anderen Glasplatte zugekehrte Seite desselben fehlt. Die beiden Glasplatten bildeten ursprünglich eine planparallele Platte. Für diese wurde ein vollständiger Metallrahmen gemacht und zwischen den Flächen der beiden Zahnräder befestigt, dann die Axen abgedreht und endlich der Rahmen in der Mitte durchschnitten. Eben so wurde das Glas durchschnitten, jede Hälfte in der entsprechenden Hälfte des Rahmens befestigt. So wurde eine genau übereinstimmende Stellung der Platten auf den beiden Axen erreicht. Bewegt werden die Zahnräder durch die Triebe  $c_1$  und  $c_2$ , die an den Axen  $b_1, c_1$  und  $b_2, c_2$  befestigt sind. Jede dieser Axen trägt ausserdem in ihrer Mitte einen Trieb  $h$ . Dreht man den Knopf bei  $b_1$ , so wird mittels des Triebes  $c_1$  das untere Zahnrad mit der unteren Glasplatte bewegt. Ausserdem greift der Trieb  $h_1$  in den Trieb  $h_2$ , und dreht die zweite Axe  $b_2, c_2$  um eben so viel in der entgegengesetzten Richtung. Infolge davon wirkt auch der Trieb  $c_2$  auf das obere Zahnrad, und dreht dieses mit der oberen Glasplatte um einen nahe eben so grossen Winkel wie die untere Platte. Gemessen wird die Drehung jeder Platte mittels der ausserhalb des Kastens auf die Drehungsaxe aufgesetzten getheilten Scheiben.

Es ist nothwendig, zwei Platten anzubringen, welche um nahe gleiche Winkel gedreht werden, weil die Bilder der durch die Platten gesehenen Objecte nicht blofs seitlich verschoben, sondern auch ein wenig genähert werden, und wenn die Näherung für die beiden Bilder desselben Gegenstandes ungleich gross ist, man das Fernrohr nicht gleichzeitig auf beide genau einstellen kann.

In das vordere Ende des Fernrohrs sind zwei Objectivlinsen einzusetzen,  $k$  und  $l$ . Die achromatische Doppellinse  $k$  allein wird gebraucht, wenn man entferntere Objecte zu betrachten hat. Ihre biconvexe Crown Glaslinse wird wie gewöhnlich dem Objecte zugekehrt. Will man dagegen sehr nahe Objecte betrachten, so giebt eine einzelne Linse kein gutes Bild mehr, weil diese Linsen darauf berechnet sind, parallel einfallende Strahlen in einen Punkt zu vereinigen. Deshalb setze ich dann eine zweite achromatische Doppellinse  $l$  ein, deren Crown Glas der andern zugekehrt wird. Steht dann das Object im vorderen Brennpunkte dieser zweiten Linse, so macht sie die Strahlen parallel, die erste Linse vereinigt die parallelen Strahlen in ihrem hinteren Brennpunkte. Dadurch erhält man schärfere Bilder. Die Brennweite von  $k$  ist bei meinem Instrumente 6 Zoll, die von  $l$  16 Zoll. Das Fernrohr ruht auf einer Säule  $n$ , in der ein Cylinder gedreht, so wie auch auf und ab bewegt werden kann. Auf diesem ist mittels des Charniergelenks  $i$  das Fernrohr befestigt. So kann man der Fernrohraxe beliebige Stellungen geben. Ausserdem ist auch der Kasten mit den Gläsern drehbar um das vordere Ende des Fernrohrs.




Fig. 4.

- 10 Zunächst will ich nachweisen, wie die Verschiebung der Bilder aus dem Drehungswinkel der Glasplatten zu finden ist.



Es sei in Fig. 5  $A_1 A_1 A_2 A_2$  eine der Glasplatten,  $a_1 c_1$  der einfallende,  $c_1 c_2$  der gebrochene,  $c_2 a_2$  der hindurchgegangene Strahl;  $b_1 c_1 d_1$  das erste,  $b_2 c_2 d_2$  das zweite Einfallslot. Der Einfallswinkel  $b_1 c_1 a_1$ , welcher dem Winkel  $b_2 c_2 a_2$  gleich ist, werde mit  $\alpha$ , der Brechungswinkel  $d_2 c_2 c_1$ , welcher gleich ist mit  $c_1 c_2 d_1$ , mit  $\beta$  bezeichnet und die Dicke der Platte mit  $h$ . Wird der Strahl  $a_2 c_2$  rückwärts verlängert, so scheint der leuchtende Punkt  $a_1$  für ein unterhalb der Platte befindliches Auge in dieser Verlängerung von  $a_2 c_2$  zu liegen. Fällt man von  $a_1$  ein Loth  $a_1 f$ , dessen Länge wir  $x$  nennen wollen, auf die genannte Verlängerung, so ist dies  $x$  die scheinbare seitliche Verschiebung des leuchtenden Punktes. Es ist

$$\begin{aligned} x &= c_1 c_2 \cdot \sin \angle c_1 c_2 f \\ c_1 c_2 &= \frac{h}{\cos \beta} \\ \angle c_1 c_2 f &= \angle d_1 c_2 f - \angle d_1 c_2 c_1 \\ &= \alpha - \beta \\ x &= h \cdot \frac{\sin (\alpha - \beta)}{\cos \beta}. \end{aligned}$$




Fig. 5.

Der Winkel  $\alpha$  wird durch das Instrument gemessen; die Dicke der Glasplatte  $h$  muß bekannt sein, ebenso ihr Brechungsverhältniß  $n$  gegen Luft. Dann ist

$$\sin \alpha = n \cdot \sin \beta.$$

Aus dieser Gleichung ist  $\beta$  zu finden, und dann sind alle Stücke zur Berechnung von  $x$  bekannt. Benutzt man zwei drehbare Platten, wie in dem Instrumente, welches ich beschrieben habe, geschieht, so ist die Entfernung  $E$  zweier beobachteten Punkte, deren Bilder man auf einander gestellt hat, doppelt so groß als  $x$ , also

$$E = 2h \cdot \frac{\sin (\alpha - \beta)}{\cos \beta} \quad \dots \dots \dots 1)$$

Die Werthe von  $n$  und  $h$ , die bei dieser Rechnung nöthig sind, findet man am besten durch Ausmessung der Theile eines guten Millimetermaafstabes mit dem Instrument. Man stellt den Maafstab horizontal in passender Entfernung vor dem Instrumente auf, senkrecht gegen die Axe des Fernrohrs gerichtet, und achtet darauf, daß bei der Drehung der Platten die Längskanten des Stabes genau in sich selbst verschoben werden. Am genauesten, finde ich, sind die Doppelbilder so einzustellen, daß die Theilstriche des einen die Zwischenräume des andern genau halbiren, so daß die gegenseitige Verschiebung der Bilder 0,5 oder 1,5 oder 2,5 u. s. w. Millimeter beträgt. Dann erscheint der Stab wie in halbe Millimeter eingetheilt, und man erkennt sehr sicher, ob die einzelnen Intervalle alle gleich, oder abwechselnd größer und kleiner sind. So bekommt man eine Reihe von Werthen des Winkels  $\alpha$ , die zu gegebenen Entfernungen  $E$  gehören.

Seien  $E$  und  $E_1$  zwei verschiedene Werthe von  $E$ ,  $\alpha$  und  $\alpha_1$  sowie  $\beta$  und  $\beta_1$  die dazu gehörigen Werthe der Winkel, so ergibt Gleichung 1)

$$\frac{E_1}{E} = \frac{\sin (\alpha_1 - \beta_1) \cdot \cos \beta}{\sin (\alpha - \beta) \cdot \cos \beta_1} = \varepsilon$$

worin  $\varepsilon$  nur eine kürzere Bezeichnung für das Verhältniß der beiden  $E$  ist. Indem man die Sinus der Differenzen auflöst, und  $\sin \beta = \frac{1}{n} \cdot \sin \alpha$  setzt, erhält man:

$$\sin \alpha_1 \cdot [n \cdot \cos \beta_1 - \cos \alpha_1] \cdot \cos \beta = \varepsilon \cdot \sin \alpha \cdot [n \cdot \cos \beta - \cos \alpha] \cdot \cos \beta_1,$$

oder

$$n = \frac{\sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_1 \cdot \cos \beta - \varepsilon \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta_1}{\sin \alpha_1 \cdot \cos \beta_1 \cdot \cos \beta - \varepsilon \cdot \sin \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \beta_1} \dots \dots \dots 1a)$$

Auf der rechten Seite sind  $\alpha$  und  $\alpha_1$  bekannt,  $\beta$  und  $\beta_1$  allerdings nur bei Kenntniss von  $n$  zu berechnen. Da aber die beiden letzteren Winkel nicht groß werden können, sind ihre Cosinus nicht sehr weit von 1 unterschieden. Man findet  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$  also schon mit sehr geringem Fehler, wenn man von einem angenähert richtigen Werthe von  $n$  ausgeht, etwa 1,6. Dann kann man Gleichung 1a) benutzen, um einen genaueren Werth für  $n$  zu finden, mit diesem wieder bessere Werthe von  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$ , u. s. f. Man fährt so fort, so lange die neu gefundenen Werthe des  $n$  noch die Werthe von  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$  merklich ändern. Gewöhnlich wird die zweite Berechnung von  $n$  schon genügen.

10 Dieselbe Stellung der Doppelbilder, welche bei einer Drehung um  $\alpha$  Grade stattfindet, tritt auch ein bei einer Drehung um  $-\alpha$ , um  $180 - \alpha$  und um  $\alpha - 180$  Grade. Um Fehler der Theilung und des Parallelismus der Glasplatten zu eliminiren, ist es rathsam, bei diesen vier Stellungen jede Messung zu wiederholen und aus den vier gefundenen Zahlen das Mittel zu nehmen.

Einer der wichtigsten Vortheile des Ophthalmometers ist, dass die lineare Gröfse der scheinbaren Entfernung seiner Doppelbilder unabhängig ist von dem Abstände des Objects. Man braucht also den letzteren nicht zu kennen, um die Messungen auszuführen. Sollten indess die Glasplatten schwach gekrümmte Oberflächen haben, so würde der Abstand des Objects nicht einflusslos sein. Daraufhin ist jedes Ophthalmometer zu untersuchen.

Wenn man das beschriebene Instrument zur Messung eines Hornhautbildes anwendet, wird man von kleinen Schwankungen des Kopfes des Beobachteten durchaus nicht gehindert, da beide Doppelbilder immer in derselben Weise sich mitbewegen, und ihre Stellung zu einander nicht geändert wird. Ist gleichzeitig das Object des Hornhautbildes weit genug entfernt, dass die kleinen Schwankungen des Kopfes gegen seine Entfernung verschwinden, so wird auch die Gröfse des Bildes nicht merklich durch die Schwankungen verändert, und es genügt daher zur Befestigung des Kopfes, dass man das Kinn leicht aufstützen lässt.

11 Das Instrument erlaubt nur kleine Distanzen zu messen, bis zur Gröfse von etwa 4 mm oder 2 Linien. Mittels des Nonius werden  $\frac{1}{10}$  Grade abgelesen, welche im Durchschnitt etwa  $\frac{1}{500}$  mm entsprechen. Mittels einer leichten Veränderung kann man es aber auch geschickt machen, grössere Entfernungen zu messen. Zu dem Ende setzt man an Stelle des Deckels C am vorderen Ende des Instruments eine Concaulinse ein, deren Brennpunkt so weit vor dem Instrumente liegt, als der vordere Brennpunkt der ersten achromatischen Objectivlinse m. Bei dieser Veränderung misst das Instrument die lineare Gröfse der im Brennpunkt der Concaulinse entworfenen Bilder ferner Gegenstände. Da diese Bilder stark verkleinert sind, so entsprechen ihre Dimensionen viel grösseren des Gegenstandes. Entfernt man dann den gemessenen Gegenstand, bringt an seine Stelle einen Maafstab, und misst dessen Theilstriche bei derselben Einrichtung des Instruments, so erhält man die absolute Gröfse des Gegenstandes. Für sehr entfernte Gegenstände wirkt das Instrument dann dem Heliometer gleich: es misst die Gesichtswinkel.

Die Gröfse der Drehung der zwei Platten eines Instruments differirt gewöhnlich um einige Zehntel eines Grades; zur Rechnung ist das Mittel beider Zahlen zu nehmen.

Um eine grössere Genauigkeit zu erreichen, kommt viel darauf an, dass man die Orte, deren Entfernung zu messen ist, passend durch die Erleuchtung markirt. Sehr genau ist namentlich die Breite eines geraden hellen Streifens mit parallelen Rändern auf dunklem, oder eines eben solchen dunkeln auf hellem Grunde zu messen. Wenn man die beiden Doppelbilder eines solchen Streifen zur Berührung bringt, zeichnet sich die kleinste Entfernung oder das kleinste Übereinandergreifen der Bilder durch eine feine schwarze oder helle Linie ab, für deren Wahrnehmung das Auge sehr empfindlich ist; bei genauer Berührung verschwindet die Grenze beider Bilder fast ganz. Oder man kann auch den einen Ort durch einen feinen hellen Punkt, den andern durch zwei solche einander sehr nahe stehende markiren, und nun das eine Bild des ersten genau in die

Mitte zwischen die zwei anderen einstellen. Auf die große Genauigkeit, welche diese Art der Einstellung zulässt, hat schon BESSLER bei der Messung der Sternparallaxen durch das Heliometer aufmerksam gemacht.

Wenn wir das Ophthalmometer zur Messung der Hornhautkrümmung anwenden wollen, so müssen wir auf der Hornhaut das Spiegelbild eines äußeren Objects von bekannter Größe und Entfernung erzeugen. Die Größe dieses Spiegelbildes ist zunächst durch das Ophthalmometer zu messen. Die Entfernung des gespiegelten Objects vom beobachteten Auge muß so groß sein, daß die kleinen Schwankungen in der Stellung dieses Organs dagegen vernachlässigt werden können.




Fig. 6.

Die Anordnung des hierher gehörigen Apparates ist in Fig. 6 im Grundrisse dargestellt. Der Beobachtete sitzt an einem Tische; die Lage seines Auges ist so weit als nöthig dadurch gesichert, daß er durch eine Öffnung von etwa 1 Zoll Durchmesser des vor ihm stehenden Pappschirms *SS* zu blicken angewiesen ist. Das beobachtete Auge ist in der Figur mit *O* bezeichnet. Sechs bis acht Fuß davon entfernt, und etwa 1 Zoll niedriger als das Auge, ist ein in Centimeter getheilter Maasstab *AB* horizontal angebracht. Den Fußpunkt *C* des von *O* auf *AB* gefällten Lothes ermittelt man leicht dadurch hinreichend genau, daß man an die hintere Seite des Maasstabes einen Glas-Spiegel anlegt, dessen Ebene dabei also der Linie *AB* parallel wird, und bemerkt, über welchem Theilstriche *C* des Maasstabes das Auge *O* sich selbst gespiegelt sieht. Nun mißt man von *C* aus nach beiden Seiten hin zwei gleiche Entfernungen *CE* und *CF* ab, jede ungefähr gleich  $\frac{1}{4} OC$ , und bringt an der Vorderseite des Maasstabes Pappschirme an, von denen der eine eine runde Öffnung, der andere zwei solche übereinander enthält. Die beiden durch die Mittelpunkte dieser Öffnungen gehenden Verticallinien

müssen den Theilstrichen *E* und *F* entsprechen. Hinter den Schirmen werden Lampen angebracht, deren Licht durch die Öffnungen auf das Auge *O* fällt. Die Linie *EF*, deren eines Ende somit durch einen lichten Punkt, das andere durch zwei bezeichnet wird, ist das Object, dessen Spiegelbild in der Hornhaut gemessen werden soll. Um nun noch die Stellung des Ophthalmometers *M* zu bestimmen, bringt man an den Theilstrich *C* einen durch ein Gewicht gespannten Faden, visirt an diesem vorbei nach der Mitte der Öffnung des Schirmes *S*, durch welche das Auge *O* sieht, und läßt, so daß sie vom Faden gedeckt wird, auf der Tischplatte eine Linie ziehen, auf welcher der Mittelpunkt des Fusses des Ophthalmometers sich befinden muß. Hat man das Ophthalmometer fest aufgestellt, auf das Auge *O* gerichtet, und für dasselbe eingestellt, so bemerkt man jede Verschiebung des Auges senkrecht gegen die Axe des Fernrohrs daran, daß es im Gesichtsfelde die Mitte des Fadenkreuzes verläßt, und kann seine Stellung verbessern lassen. Außerdem kann sich das Auge auch nicht viel in Richtung der Gesichtslinie des Beobachters nähern oder entfernen, ohne daß sein Bild undeutlich wird. So ist die Stellung des Auges bis auf wenige Linien gesichert, und zugleich läßt sich die Stellung, welche es hatte, nach beendeter Beobachtung leicht ermitteln, indem man irgend einen Körper aufstellt, der in der Mitte des Gesichtsfeldes des Fernrohrs deutlich erscheint. Ein solcher muß alsdann auch an dem früheren Orte des Auges stehen, und von ihm aus können die Entfernungen des Auges von der Scale und anderen Punkten mit Bequemlichkeit abgemessen werden.

Die Richtung des Auges kann sehr gut gesichert werden, wenn man ihm einen bestimmten Gesichtspunkt anweist, und indem man die Lage dieses Punktes ändert, kann man auch Drehungen des Auges um genau meßbare Winkel hervorbringen.

Will man nur den Krümmungsradius der Hornhaut für ihre Mitte kennen lernen, so läßt man das Auge *O* nach der Mittellinie des Ophthalmometers sehen, zu welchem Ende man in der vorderen Öffnung des Instruments ein Kreuz von zwei feinen weißen Fäden anbringen kann. Bezeichnet man die Länge *EF* mit *b*, die Größe ihres Spiegelbildchens in der Hornhaut mit  $\beta$ , und die Länge *CO* mit *a*, so ist der Krümmungsradius *r* jetzt nahehin:

$$r = \frac{2a \cdot \beta}{b}, \dots\dots\dots 2)$$

wenn man nämlich, sowohl *r* gegen *a*, als auch den Unterschied der Tangente und des Sinus des Winkels  $\frac{1}{2} EOC$  vernachlässigt. Erlaubt man sich das letztere nicht, so ist die genauere Formel:

$$r = \frac{\beta}{2 \sin \left[ \frac{1}{2} \text{arc tang} \left( \frac{b}{2a} \right) \right]} \dots\dots\dots 2a)$$

welcher letztere Werth von *r* bei den oben angegebenen Dimensionen des Apparats etwa um  $\frac{1}{2}$  Proc. von dem der ersten Formel abweicht.

Die Richtigkeit jener ersten abgekürzten Formel leuchtet leicht ein aus den bekannten katoptrischen Gesetzen. Die Brennweite eines convexen Spiegels ist gleich dem halben Radius, also  $\frac{1}{2} r$ . Das Bild eines weit entfernten Gegenstandes liegt nicht merklich vom Hauptbrennpunkte des Spiegels entfernt, und die Größe des Objects und seines Bildes verhalten sich zu einander wie ihre Entfernungen von der Kugelfläche. Also

$$b : \beta = a : \frac{1}{2} r,$$

woraus sich unmittelbar der angegebene Wert von *r* ergibt.

Kann man die Theile des Apparates ein für alle mal fest aufstellen, so ist die Messung der Hornhautkrümmungen verschiedener Augen außerordentlich leicht und schnell zu vollziehen. Man braucht nur eine Beobachtung durch das Ophthalmometer; für den abgelesenen Winkel entnimmt man aus der Tabelle den Werth von  $\beta$ , und multiplicirt ihn mit dem constanten Factor

$$\frac{2a}{b} \text{ oder } \frac{1}{2 \sin \left[ \frac{1}{2} \text{arc tang} \left( \frac{b}{2a} \right) \right]}.$$

Noch bequemer wird es natürlich, wenn man sich gleich eine Tabelle berechnet für die den abgelesenen Winkelgraden entsprechenden Hornhautkrümmungen.

Umständlich ist die Bestimmung der Ellipticität der Hornhaut. Wenn ich, wie SENFF gethan hat, die äussere Hornhautfläche im Folgenden als ein Stück eines Ellipsoids betrachte, so möchte ich dies nur in dem Sinne thun, daß jedes kürzere Stück einer continuirlichen Curve im Allgemeinen viel näher durch einen elliptischen als durch einen Kreisbogen ausgedrückt werden kann, und bei der Hornhaut der Ausdruck ihrer Form durch ein Ellipsoid vorläufig eine grobe Annäherung giebt. Auf einer Kugelfläche ist der Krümmungsradius überall constant, auf einem Ellipsoid veränderlich. So ist er denn auch am Rande der Hornhaut gröfser, als in ihrer Mitte. Kennt man die Werthe des Krümmungsradius an verschiedenen Stellen eines Ellipsoids, so kann man daraus dessen Axen und Excentricität berechnen. Die Messung des Krümmungsradius an verschiedenen Stellen der Hornhaut kann ganz so ausgeführt werden, wie ich eben beschrieben habe. Streng richtig ist die Methode allerdings nur für den Fall, daß das gemessene Spiegelbildchen verschwindend klein gegen den Krümmungsradius ist, was bei den gegebenen Dimensionen des Apparats eigentlich nicht der Fall ist. Indessen da die Abweichung des kleinen Scheitelabschnitts eines Ellipsoids, den die Hornhaut bildet, von einer Kugel überhaupt gering ist, so ist die begangene Ungenauigkeit, wie ich mich überzeugt habe, von keinem in Betracht kommenden Einflusse.

Die Form der Hornhaut entspricht nahehin einem Ellipsoid, welches durch Umdrehung einer Ellipse um ihre gröfsere Axe erzeugt ist. Der Scheitel des Ellipsoids entspricht, wie sich im folgenden zeigen wird, ungefähr der Mitte der Hornhaut, weicht aber merklich von der Gesichtslinie ab, welche bei allen von mir untersuchten Individuen vom Scheitel aus nach der Nasenseite hin lag.

Die Beobachtungen werden hierfür ganz so angestellt, wie ich es für die Bestimmung des Krümmungsradius der Hornhaut in der Gesichtslinie beschrieben habe, nur weist man dem beobachteten Auge nach einander verschiedene Fixationspunkte an, und wiederholt für alle diese die Messung. Der erste Fixationspunkt möge wieder in der Axe des Fernrohrs liegen; der zugehörige berechnete Werth des Krümmungsradius der Hornhaut sei  $\rho_0$ . Die beiden andern wähle man auf der Scale gleich weit nach rechts und nach links von dem Punkte  $C$ , in gleicher Höhe mit dem Lichtzeichen, etwa bei  $A$  und  $B$ . Für die Richtung der Gesichtslinie nach  $A$  sei gefunden der Werth des Krümmungsradius  $\rho_1$ , für  $B$  der Werth  $\rho_2$ . Nun folgt aus den geometrischen Eigenschaften der Ellipse, daß der Krümmungsradius  $\rho$  eines beliebigen Punktes durch folgende Gleichung gegeben ist, worin  $\omega$  den Winkel zwischen dem Krümmungsradius und der grofsen Axe,  $a$  die halbe grofse Axe,  $\epsilon$  die Excentricität (d. h. Abstand der Brennpunkte, dividirt durch die grofse Axe) bezeichnet.

$$\rho = \frac{a(1 - \epsilon^2)}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2 \omega}} \dots \dots \dots 3)$$

Bei unseren Versuchen mufs der Krümmungsradius der spiegelnden Stelle der Hornhaut immer der Axe des Fernrohrs parallel sein, weil die Mitte  $C$  des gespiegelten Objects  $EF$  in der Fernrohraxe liegt, und daher die spiegelnde Stelle senkrecht gegen die Fernrohraxe stehen mufs. Der Winkel  $\omega$  zwischen dem Krümmungsradius und der Axe des Ellipsoids ist also derselbe, wie der zwischen der Axe des Fernrohrs und der Axe des Ellipsoids. Bei der ersten Beobachtung, wo die Gesichtslinie des beobachteten Auges in die Axe des Fernrohrs fällt, ist der Winkel  $\omega$  gleich dem noch unbekannten Winkel zwischen der Gesichtslinie und der Axe des Ellipsoids, den wir  $\alpha$  nennen und positiv rechnen wollen, wenn die Axe des Ellipsoids auf derselben Seite der Linie  $CO$  liegt, wie der Punkt  $A$ , negativ, wenn sie auf der Seite von  $B$  liegt. Bei der zweiten Beobachtung ist die Gesichtslinie nach  $A$  gerichtet; und setzen wir

$$\angle EOC = \angle FOC = \varphi,$$

so wird  $\omega$  jetzt gleich  $(\alpha + \varphi)$ . Wenn bei der dritten Beobachtung die Gesichtslinie nach

$B$  gekehrt ist, wird  $\omega$  gleich  $(\alpha - q)$ . Setzen wir also die drei Paare zusammengehöriger Werte von  $q$  und  $\omega$  in die Gleichung 3, so erhalten wir folgende drei Gleichungen:

$$\left. \begin{aligned} \varrho_0 &= \frac{\alpha (1 - \epsilon^2)}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \cdot \sin^2 \alpha}} \dots \dots \dots \\ \varrho_1 &= \frac{\alpha (1 - \epsilon^2)}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \cdot \sin^2 (\alpha + q)}} \dots \dots \dots \\ \varrho_2 &= \frac{\alpha (1 - \epsilon^2)}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \cdot \sin^2 (\alpha - q)}} \dots \dots \dots \end{aligned} \right\} 3a)$$

Aus diesen drei Gleichungen läßt sich zunächst  $\alpha$  eliminiren. Wenn man sie gleichzeitig auf die zweite Potenz erhebt, und die dritte Wurzel auszieht, bekommt man folgende zwei andere Gleichungen:

$$\left. \begin{aligned} \varrho_0^{\frac{2}{3}} - \varrho_1^{\frac{2}{3}} &= \epsilon^2 \left[ \varrho_0^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 \alpha - \varrho_1^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 (\alpha + q) \right] \dots \dots \dots \\ \varrho_0^{\frac{2}{3}} - \varrho_2^{\frac{2}{3}} &= \epsilon^2 \left[ \varrho_0^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 \alpha - \varrho_2^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 (\alpha - q) \right] \dots \dots \dots \end{aligned} \right\} 3b)$$

Aus diesen endlich bekommt man nach Elimination von  $\epsilon^2$  die Gleichung

$$\tan(2\alpha) = \tan q \cdot \frac{(\varrho_0 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}} - (\varrho_0 \cdot \varrho_1)^{\frac{2}{3}}}{(\varrho_0 \cdot \varrho_1)^{\frac{2}{3}} + (\varrho_0 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}} - 2(\varrho_1 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}}} \dots \dots \dots 3c)$$

Aus dieser letzten ist  $\alpha$  zu finden, und wenn man  $\alpha$  hat, aus einer der Gleichungen 3b) die Excentricität  $\epsilon$  und aus 3a) die halbe Axe  $a$ . Die halbe kleine Axe der Ellipse  $b$  ist gegeben durch die Gleichung

$$b = a \cdot \sqrt{1 - \epsilon^2},$$

und der Krümmungsradius im Scheitel der Ellipse

$$\varrho = a (1 - \epsilon^2) = \frac{b^2}{a}.$$

Es ist bei dieser Berechnungsmethode wieder die Gröfse der gespiegelten Bildchen gegen die Axen der Ellipsen vernachlässigt worden; denn nur wenn man das thut, kann man unmittelbar aus der Gröfse der Bildchen den Krümmungsradius berechnen. Will man die Gröfse der Bildchen nicht vernachlässigen, so wird die Rechnung außerordentlich weitläufig, während ihre Ergebnisse sich nur ganz unerheblich von denen der hier angegebenen Formeln unterscheiden. Die Resultate meiner Messungen, welche ich weiter unten zusammengestellt habe, sind auf diesem genaueren Wege gewonnen. Übrigens ist es immer nothwendig, die Rechnung zuerst nach den einfachen Formeln zu führen, die ich oben aufgestellt habe, um genäherte Werthe der gesuchten Gröfsen zu erhalten, da sich die genaueren Formeln nicht arithmetisch nach den Unbekannten auflösen lassen, und daher deren Werthe nur durch approximative Rechnungen zu finden sind.

In dieser Weise habe ich für den horizontalen Durchschnitt der Hornhaut folgende Werthe für die drei untersuchten Augen gefunden. Es ist  $a$  die halbe große,  $b$  die halbe kleine Axe der Ellipse,  $\varrho$  der Krümmungshalbmesser im Scheitel,  $\epsilon$  die Excentricität,  $\alpha$  der Winkel, den die Gesichtslinie nach der Nasenseite zu mit der großen Axe der Ellipse bildet. Die Längenmaafse sind Millimeter.

	$\varrho$	$\epsilon^2$	$a$	$b$	$\alpha$
O. H.	7,338	0,4367	13,027	9,777	4° 19'
B. P.	7,646	0,2430	10,100	8,788	6° 43'
J. H.	8,154	0,3037	11,711	9,772	7° 35'

Es bleibt noch übrig, die Lage des Randes der Hornhaut gegen den Scheitel der Ellipse und die Gesichtslinie zu bestimmen. Ich brauchte dazu das Ophthalmometer mit dem Concavglase an seinem vorderen Ende, brachte dicht unter diesem Glase ein kleines Licht reflectirendes Spiegelchen an, dessen Spiegelbild als ein helles Pünktchen auf der Hornhaut erschien. Da das Licht hier in derselben Richtung in das Auge fiel, als das Fernrohr hineinsah, mußte das Spiegelbild auf derjenigen Stelle der Hornhaut erscheinen, welche senkrecht gegen die Fernrohraxe war. Nun wurden die ebenen Glasplatten des Ophthalmometers gedreht, so daß sich die Bilder der Hornhaut und des hellen Pünktchens darauf verdoppelten. Zugleich verschob ich den Körper, auf dem das beobachtete Auge seinen Gesichtspunkt hatte, so, daß es möglich wurde jedes der beiden Bilder des hellen Pünktchens mit einem Bilde eines der entgegengesetzten Ränder der Hornhaut zusammenfallen zu lassen. Die Einstellung war gut auszuführen, da das Spiegelbildchen nahehin in der Ebene der Hornhautbasis liegt, und deshalb mit dieser zugleich deutlich im Fernrohre erscheint. Es wurde endlich durch passende Abmessungen der Winkel  $\beta$  bestimmt, den die optische Axe des Fernrohrs mit der Gesichtslinie des beobachteten Auges bei der gedachten Einstellung gemacht hatte, und dieser fand sich nahe gleich dem Winkel  $\alpha$  zwischen der Gesichtslinie und der großen Axe der Ellipse. Zur Vergleichung setze ich beide Winkel für die drei gemessenen Augen neben einander.

	$\beta$	$\alpha$	Differenz
O. H.	4° 51'	4° 19'	+ 32'
B. P.	6° 21'	6° 43'	— 22'
J. H.	7° 9'	7° 35'	— 26'

Die spiegelnde Stelle der Hornhaut war also nahehin der Scheitel der Ellipse, das Spiegelbild lag in der großen Axe, und da sich durch dieselbe Drehung der Glasplatten gleichzeitig beide Hornhautränder mit dem Spiegelbildchen zum Decken bringen ließen, so müssen beide gleich entfernt von der Axe sein, folglich muß die Basis der Hornhaut eine nahehin auf der großen Axe der Ellipse senkrechte Ebene sein, und der Mittelpunkt der Hornhaut mit dem Scheitel der Ellipse zusammenfallen. Die kleinen Differenzen zwischen den Winkeln  $\alpha$  und  $\beta$  können dabei vernachlässigt werden, da auch die größte Winkelabweichung 32', längs der Fläche der Hornhaut gemessen, nur 0,07 mm beträgt.

Aus dem Winkel, um den wir bei dem angegebenen Versuche die Glasplatten abgelenkt haben, können wir auch sogleich noch den horizontalen Durchmesser der Hornhautbasis berechnen, und aus diesem und den Axen der Ellipsen den Abstand ihres Scheitels von der Basis. Diese Größen finden sich, wie folgt, in Millimetern.

Auge.	Durchmesser der Basis.	Abstand des Scheitels von der Basis.
O. H.	11,640	2,560
B. P.	11,640	2,531
J. H.	12,092	2,511

Seit der ersten Veröffentlichung dieser Untersuchungsmethoden<sup>1)</sup> sind eine große Zahl von Messungen der Krümmung und Dimensionen der Hornhaut gemacht worden. Es wird genügen, mit Verweisung auf die am Schlusse des Werks folgenden Litteraturübersichten, hier die von DONDERS<sup>2)</sup> gegebene Zusammenstellung ihrer Ergebnisse anzu-

<sup>1)</sup> H. HELMHOLTZ, *Gräfe's Archiv für Ophthalmologie*. I. (2) S. 1. 1854.

<sup>2)</sup> F. C. DONDERS, *On the anomalies of accommodation and refraction*. London. 1864. p. 89. — *Gräfe's Archiv für Ophthalmologie*. VIII. (1) S. 1862.

führen. Die Mittelwerthe des Krümmungsradius der Hornhaut in der Gesichtslinie waren in Millimetern

## A. Männer.

1) 20 unter 20 Jahren . . . . .	7,932
2) 51 unter 40 „ . . . . .	7,882
3) 28 über 40 „ . . . . .	7,819
4) 11 über 60 „ . . . . .	7,809
	<hr/>
Mittel	7,858
Maximum	8,396
Minimum	7,28

## B. Weiber.

1) 6 unter 20 Jahren . . . . .	7,720
2) 22 unter 40 „ . . . . .	7,799
3) 16 über 40 „ . . . . .	7,719
4) 2 über 60 „ . . . . .	7,607
	<hr/>
Mittel	7,799
Maximum	8,487
Minimum	7,115

## C. Nach der Sehweite geordnet.

1) 27 Normalsichtige . . . . .	7,785
2) 25 Kurzsichtige . . . . .	7,874
3) 26 Hypermetropen . . . . .	7,96

Die ellipsoidische Gestalt der Hornhaut ist nicht immer regelmässig eingehalten; in der That habe ich die Annahme von SENFF, daß die Hornhaut ein Ellipsoid sei, zunächst nur in dem Sinne festhalten wollen, daß ein kleines Stück einer jeden gekrümmten Fläche durch ein Ellipsoid sich genauer wird darstellen lassen, als durch eine Kugel. Die Herren AUBERT und MATTHIESSEN<sup>1</sup> sind zu dem Resultat gekommen, daß ein mittlerer Theil der Hornhaut sich einer Kugel mehr nähert, als es der Scheitel eines Ellipsoids thun sollte, und daß erst in etwa 16° Entfernung von der Mitte die Wölbung geringer wird.

Eine ganz abweichende Form des Ophthalmometers hat Herr COCCIUS<sup>2</sup> construirt, in welchem die Doppelbilder durch einen doppeltbrechenden Kalkspath mit parallelen Grenzflächen hervorgebracht werden. Solche haben auch constante lineare Entfernung von einander, die man aber nicht variiren kann. Man verändert deshalb den Abstand der Lichter, welche von der Hornhaut gespiegelt werden, bis die Doppelbilder die gewünschte Stellung zu einander haben.

Um in verticalen oder in schräg gerichteten Meridianen der Hornhaut die Krümmung messen zu können, hat Herr DONDEES einen verticalen Holzring mit beweglichen Lichtchen construiren lassen. Bequemer noch ist es, an einer um eine horizontale Axe drehbaren und in Centimeter getheilten Stange *Fig. 7* drei Spiegelchen *a, b, c* anzubringen, die in verschiedenen Entfernungen (*Fig. 8*) vermittle der Hülse *a* und der Schraube *b* angeklemt, und mit Hülfe einer andern Schraube *g* in beliebiger Neigung festgestellt werden können. Die Drehungsaxe bildet einen hohlen Cylinder *d* in *Fig. 7*, durch welchen das Ophthalmometer nach dem zu messenden Auge hin gerichtet wird. Die Lampe kommt nahe zur Seite des beobachteten Auges zu stehen, und die Drehungsaxe der Scala wird so gerichtet, daß sie einen mitten zwischen beobachtetem Auge und Lampe gelegenen Punkt schneidet. Die Spiegelchen müssen so gerichtet werden, als wären sie Stücke von einer Kugelfläche, die ihr Centrum in dem letztgenannten Punkte hat. Sie reflectiren dann das Licht der Flamme in das beobachtete Auge, und da alle Punkte einer spiegelnden Kugelschale innerhalb ziemlich großer Winkelentfernung von der

<sup>1</sup> H. AUBERT, *Pflüger's Archiv*. Bd. 35. S. 597. 1885.

<sup>2</sup> A. COCCIUS, *Über den Mechanismus der Accommodation des menschl. Auges*. Leipzig 1867. *Ophthalmometrie und Spannungsmessung am kranken Auge*. Leipzig 1872.



Axe dasselbe thun würden, so verliert sich der Reflex auch nicht, wenn man den Hebel dreht. Wenn die Öffnung für das beobachtete Auge und der Ort der Lichtflamme ein für alle Mal fixirt, und der Beleuchtungsapparat fest aufgestellt wird, kann man die Spiegelchen dadurch in ihre richtige Lage bringen, daß man versucht, ob sie bei allen Drehungen der Stange das Licht gleichmäßig reflectiren, und ihre Stellung dem entsprechend corrigirt.




Fig. 7.




Fig. 8.

Dieser Apparat ist von Herrn MANDELSTAMM<sup>1</sup> auch benutzt worden, um die Abweichung der Gesichtslinie von der Hornhautaxe in verschiedenen Meridianen zu studiren. Es ist verhältnißmäßig leichter diese Messungen so auszuführen, daß man auf beiden Seiten der Meßstange Orte für den Fixationspunkt des beobachteten Auges sucht, welche einer gleichbleibenden Einstellung des Ophthalmometers entsprechen.

Die Gesichtslinie ist der Regel nach etwas abwärts gegen die Axe der Hornhaut gerichtet, (bis 3° 5'), ausnahmsweise aufwärts (0° 56').

<sup>1</sup> E. MANDELSTAMM, *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* XI. (2) 8. 259—265. 1865.

Der Scheitel des Ellipsoids zeigt oft gröfsere Abweichungen von der Mitte der Hornhaut, als sie in den von mir beobachteten Augen vorhanden waren. Herr Dr. UTHOFF fand für vier Augen:

	Dr. A.	Dr. K.	Dr. R.	Dr. F.
Winkel $\beta$ bestimmt				
a) mit Ophthalmometer	6° 22'	3° 54'	2° 10'	6° 35'
b) nach SCHOELER	6° 6'	4° 25'	2° 9'	6° 35'
Winkel $\alpha$				
a) mein erstes Verfahren	4° 11'	1° 17'	0° 0'	8° 45'
b) Änderung MANDELSTAMM	4° 8'	1° 29'	0° 0'	8° 11'

Das erwähnte Verfahren von Herrn SCHOELER<sup>2</sup> beruht darauf, daß man eine dicke planparallele Glasplatte senkrecht gegen die Visirlinie stellen kann, wenn man das Bild eines feinen Glasfadens, durch die Platte gesehen, zur genauen Fortsetzung des neben der Platte erscheinenden Theils des Fadens macht. So kann die Platte nach einander auf zwei verschiedene Gesichtszeichen eingestellt und ihr Drehungswinkel mit Scala und Fernrohr bestimmt werden. Das erste Gesichtszeichen wird so eingestellt, daß der Beobachter am zweiten vorbeivisirend dies zum Decken bringt mit dem Hornhautreflex eines Lichtes, welches in derselben Richtung einfällt, wie der Blick des Beobachters. Daß der Reflex in der Mitte der Hornhaut steht, wird mit drei auf eine Glastafel geritzten convergirenden Linien controllirt, die mit einem durch eine Convexlinse erzeugten Luftbild der Hornhaut zusammenfallen. Zuerst steht die Platte senkrecht zu dem auf das erste Gesichtszeichen gerichteten Blick des Beobachters, dann stellt der Beobachtete die Platte so ein, daß sie senkrecht gegen seine auf das zweite Zeichen gerichtete Gesichtslinie ist.

Der Winkel zwischen Visirlinie und Mitte der Hornhaut, der hier  $\beta$  genannt ist, ist praktisch wichtig wegen der Beurtheilung des Schielens.

### § 3. Die Uvea.

12 Das System der Uvea trägt seinen Namen von dem Vergleiche mit einer dunklen Weinbeere, die man von ihrem Stiele getrennt hat. Die Stielöffnung entspricht der Pupille. Sämmtliche Theile dieses Systems zeichnen sich dadurch aus, daß sie von der Netzhaut getrennt auf ihrer inneren Fläche mit einer Lage von Pigmentzellen bedeckt zurückbleiben, theilweise auch solche in ihrer Substanz vertheilt zeigen, denen sie ihre dunkle Farbe verdanken. Die Uvea ist an zwei Stellen fest mit der Sehnenhaut verbunden, nämlich hinten an der Eintrittsstelle des Sehnerven *Fig. 1. d* (S. 5) und vorn an der inneren Wand des SCHLEMM'schen Kanals *a*. Den Theil *a b b a*, welcher nach vorn und innen von dieser letzteren Befestigung und zunächst hinter der Hornhaut liegt, nennt man *Iris* (Blendung); den hinteren Theil, welcher die innere Fläche der Sehnenhaut bekleidet, Aderhaut (*Chorioidea*).

Im hinteren Theile des Augapfels bildet die Aderhaut eine dünne dunkle Membran, größtentheils aus Blutgefäßen zusammengesetzt, die durch ein eigenthümliches Gewebe verbunden sind. Dieses Gewebe, welches KÖLLIKER als unentwickeltes elastisches Gewebe bezeichnet, besteht aus in einander geflochtenen strahligen, zum Theil mit Pigment gefüllten Zellen, deren Ausläufer äußerst fein verästelt sind. Dies eigenthümliche Stroma verbindet zunächst die Arterien und Venen der Aderhaut; die Schicht der Capillargefäße (*membrana chorio-capillaris*) liegt ihm nach innen lockerer auf, und

<sup>2</sup> H. SCHOELER, *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* XXX. (3) 8. 311–312. 1884. — W. UTHOFF, *Bericht der Ophthalm. Ges. zu Heidelberg.* 1884.

diese haftet nach innen fest an der Pigmentzellenschicht, welche den hinteren Abschluß der Netzhaut bildet, früher aber der Aderhaut selbst zugerechnet wurde, da sie bei Abtrennung der Retina durchreißt, so dass ihr äußerer dunkel gefärbter Theil, wie bemerkt, an der Uvea haften bleibt. Nach vorn hin aber, wo die Netzhaut aufhört, setzt sich die Pigmentmembran, der Uvea anhaftend, über deren Ciliartheil und die hintere Fläche der Iris fort.

Vorn legt sich an die äußere Fläche der Aderhaut ein Muskel, der Ciliarmuskel *Tensor Chorioideae, Musculus Brückianus*); von ihrer inneren Fläche dagegen erheben sich faltenförmige, durch ein Convolut von Gefäßstämmen ausgefüllte Hervorragungen, die Ciliarfortsätze (*Processus ciliares*). In *Fig. 1.* (S. 5) ist angenommen, daß der dargestellte Durchschnitt auf der linken Seite durch einen Ciliarfortsatz *c* hindurchgeht, auf der rechten Seite dagegen zwischen zwei solchen Fortsätzen, daher hier allein der Ciliarmuskel *h* in dem Schnitte sichtbar ist. Die Fasern des Ciliarmuskels entspringen von der inneren Wand des SCHLEMMschen Kanals, da wo sich deren elastischer und sehniger Theil mit einander verbinden, bei *a* *Fig. 1* und *a* *Fig. 2* (S. 7) laufen dann an der äußeren Seite der Aderhaut nach hinten, und heften sich an diese Membran. Die Fasern dieses Muskels gehören zu den sogenannten organischen, wie wir sie in den meisten nicht willkürlich bewegten Muskeln antreffen; sie sind mit längsovalen Kernen versehen und nicht quergestreift. BRÜCKE, der den Muskel entdeckte, nahm an, daß er die Aderhaut (und die mit dieser bei *g* *Fig. 1* engverbundene Netzhaut und Glashaut) um den Glaskörper anspanne, DONDERS dagegen, daß die Aderhaut sein fester Ansatzpunkt sei, und er im Gegentheil den elastischen Theil der inneren Wand des SCHLEMMschen Kanals verlängere und so den Ansatz der Iris nach hinten rücke. In Wahrheit verbinden sich beide Wirkungen mit einander.

Die Ciliarfortsätze sind häutige Falten der Aderhaut, welche in Richtung der Meridianlinien des Auges verlaufen, 70 bis 72 an der Zahl. Sie erheben sich in der Gegend des vorderen Endes der Netzhaut (*Fig. 1. g*), verlaufen allmählig ansteigend nach vorn, wo sie in der Gegend des äußeren Linsenrandes ihre größte Höhe erreichen, und senken sich dann schnell, indem die vorderen Ausläufer der meisten noch auf die Hinterseite der Iris übergehn. Ihre hervorstehenden scharfen Ränder sind oft von Pigment entblößt, und zeichnen sich als weiße Linien ab, wenn man die Ciliargegend durch den Glaskörper von hinten betrachtet, wie dies der in *Fig. 9* dargestellte Aequatorialschnitt des Bulbus zeigt. *Pc* sind die Ciliarfortsätze; von ihnen umgeben liegt die Linse, durch welche man die vor ihr liegende Iris erblickt. *Os* ist der Randtheil der Netzhaut. Die Ciliarfortsätze enthalten eine große Menge von Gefäßstämmen, durch ein ähnliches Stroma verbunden, wie es in der Aderhaut vorkommt.



*Pc Os*  
*Fig. 9.*

Die Iris, *ab* in *Fig. 1*, *J* in *Fig. 2*, der vorderste Theil der Uvea, bildet für das Auge eine bewegliche Blendung. Sie entspringt mit dem Ciliarmuskel

gemeinschaftlich an der inneren Wand des SCHLEMM'schen Kanals und zwar an der Grenze des hinteren sehnigen Theils dieser Wand, ist aber durch ein Netzwerk elastischer Fasern, welche frei durch die wässrige Feuchtigkeit verlaufen, mit dem elastischen Theile dieser inneren Wand verbunden. Man nennt diese elastischen Fasern das *Ligamentum Iridis pectinatum*, b *Fig. 2*. Von da an verläuft die Iris, sich an die vordere Fläche der Linse legend, nach innen bis zu ihrem inneren oder Pupillarrande, und ist dabei leicht nach vorn gewölbt. Sie enthält organische Muskelfasern, welche zu zwei Muskeln zusammengefaßt werden können.

1) Der Ringmuskel der Pupille (*Musculus Contractor sive Sphincter Pupillae*), umgiebt in Form eines Ringes von 2 mm Breite den Pupillarrand; er liegt vor der Pigmentschicht und hinter der Hauptmasse der zum Pupillarrande verlaufenden Gefäße und Nerven. Seine Fasern verlaufen in concentrischen Ringen, und verengern deshalb bei ihrer Zusammenziehung die Pupille.

2) Der Erweiterer der Pupille (*Musculus Dilator Pupillae*). Seine Fasern entspringen von der inneren Wand des SCHLEMM'schen Kanals und wohl auch von den Fasern des *Ligamentum pectinatum*, und verlaufen an der hinteren Seite der Iris netzförmig mit einander verbunden nach innen, wo sie sich in den Ringmuskel verlieren; doch ist die muskulöse Natur der Fasern noch zweifelhaft.

Das Stroma der Iris ist Bindegewebe; hinten ist sie von der Pigmentzellenschicht, vorn von einem Epithelium bedeckt. Auch ihr Stroma enthält oft Pigmentzellen; dann ist ihre Farbe braun, sonst erscheint sie als ein trübes Medium vor dem dunklen Pigmente blau.

Das Verhalten der Gefäße der Uvea bietet vieles Eigenthümliche. Ich habe schon angeführt, daß die Gefäße den größten Theil der Masse dieses Systems ausmachen. Ihre zuführenden Arterien (*Arteriae ciliares posticae breves* für die Aderhaut und Ciliarfortsätze, *posticae longae* und *anticae* für die Iris) treten durch die Sclerotica ein, und communiciren mit den Venen nicht bloß, wie es in anderen Theilen des Körpers der Fall ist, durch ein feines Capillargefäßnetz, sondern auch durch ziemlich weite Verbindungsröhren, welche auf der Aderhaut in zierlich geordneten Bögen wedelförmig aus den Arterien entstehen, und sich wieder zu Venen (*Venae vorticosae*) sammeln. Die *Arteriae ciliares posticae breves*, etwa 20 Ästchen, durchbohren die Sclerotica an ihrem hinteren Theile, laufen, sich fort-dauernd gabelförmig spaltend, nach vorn und geben ihr Blut theils durch das Capillargefäßnetz, welches, soweit die Netzhaut reicht, an der inneren Seite der Aderhaut unter den Pigmentzellen liegt, theils durch die weiten Verbindungsäste der Vortices an die Venen ab, welche theils (*Vasa vorticosa*) am Äquator des Augapfels, theils (*Venae ciliares posticae*) am hinteren Theile durch die Sclerotica austreten. Ein großer Theil der Äste dieser Arterien läuft aber nach vorn in die Ciliarfortsätze und bildet in diesen ein Gefäßknäuel, dessen rückkehrende Äste in die vorderen Bögen der Vortices übergehen. Durch diese Einrichtung wird wohl eine schnellere Aenderung der Blutvertheilung im Auge möglich, wie sie bei den durch die Accommodation schnell veränderten Druckverhältnisse gefordert wird. Das Gefäßnetz der Iris hängt mit dem der Ciliarfortsätze zusammen, zum größten Theile empfängt es aber sein Blut aus besonderen Stämmen, die theils hinten durch die Sclerotica treten (*Art. ciliares posticae longae*) und zwischen Aderhaut und Sehnenhaut nach vorn bis zum

Ciliarmuskel verlaufen, theils auch vorn eintreten (*Art. ciliares anticae*). Sie bilden in der Iris zwei anastomosirende Gefäßskränze, den einen (*Circulus arteriosus Iridis major*) am peripherischen Rande, den anderen (*Circ. arter. minor*) nahe dem Pupillarrande. An der Stelle des letzteren ist die Iris am dicksten, und bildet auf ihrer vorderen Fläche einen Vorsprung.

Am unverletzten Auge sieht man die Iris durch die Hornhaut. Durch die Wirkung der Strahlenbrechung erscheint sie der Hornhaut näher, also mehr nach vorn gewölbt, als sie es in Wirklichkeit ist. Wenn man dagegen das Auge einer Leiche unter Wasser bringt, dessen Brechungsvermögen dem der wässrigen Feuchtigkeit ziemlich gleich ist: so fällt die Strahlenbrechung an der Hornhaut weg und man sieht die Iris in ihrer natürlichen Lage, wo sie schwach oder nur wenig gewölbt erscheint. Um am lebenden Auge eine richtige Anschauung von der Iris zu erhalten, hat J. CZERMAK<sup>1)</sup> ein Instrument angegeben unter dem Namen Orthoskop, welches im wesentlichen eine kleine Wanne mit Glaswänden ist, die an das Gesicht so angesetzt wird, daß das Auge die Hinterwand derselben bildet, und dann voll Wasser gegossen wird. Das in Fig. 10 abgebildete Instrument hat eine untere Wand *fcb* und eine innere (der Nase zugekehrte) *gab* aus Metallblech gebildet. Beide sind am freien Rande passend ausgeschnitten, um sie an das Gesicht ansetzen zu können. Die vordere Wand *abcd* und die äußere *cdef* sind aus ebenen Glasplatten gebildet. Um den Rand des Instruments wasserdicht an das Gesicht ansetzen zu können, empfiehlt CZERMAK geknetete Brodkrume an das Gesicht anzulegen und den Rand des Instruments hineinzudrücken. Das Auge wird nun zunächst geschlossen, Wasser von 23 bis 26° R. in das Kästchen gegossen, und dann 15 das Auge geöffnet. Die Hornhaut tritt von der Seite gesehen als eine durchsichtige, gewölbte Blase hervor, die Iris tritt als ein fast ebener Vorhang von ihr zurück.




Fig. 10.

Es könnten bei dieser Methode Zweifel übrig bleiben, ob das Bild der Iris durch die Brechung zwischen Hornhaut und Wasser einerseits, Hornhaut und wässriger Feuchtigkeit andererseits nicht noch ein wenig verändert sei, und da die Frage nach der Form und Lage der Iris für die Lehre von der Accommodation des Auges von großer Wichtigkeit ist, so will ich hier noch andere Untersuchungsmethoden beschreiben. Eine leicht auszuführende Art, um an lebenden Augen das Relief der Iris kennen zu lernen, ist die folgende. Man stelle seitlich und etwas nach vorn von dem beobachteten Auge ein Licht auf, und concentrirte durch eine Sammellinse von etwa 2 Zoll Brennweite und möglichst großer Öffnung dessen Strahlen auf einen Punkt der Hornhaut, so daß auf dieser ein Bild des Lichts entworfen wird. Die Hornhaut sieht an der starkbeleuchteten Stelle trübe aus. Der Brennpunkt auf der Hornhaut bildet nun gleichsam eine neue Lichtquelle, deren Strahlen, ohne weiter gebrochen zu werden, geradlinig auf die Iris fallen, und, wenn sie schief auffallen, Schlagschatten verschiedener Länge auf ihr entwerfen, aus denen man leicht beurtheilen kann, wie viel ihre einzelnen Theile hervorspringen oder zurückweichen. Bei der angegebenen Untersuchungsmethode findet man die Iris kurzsichtiger Augen oft so platt, daß gar kein Schlagschatten auf ihr entsteht. Bei normalen Augen dagegen sieht man nahe um die Pupille herum den dem *Circulus arteriosus minor* entsprechenden Wulst, der deutliche Schlagschatten wirft. Wenn der lichtgebende Brennpunkt etwa 1 mm vom Rande der Hornhaut absteht, verlängert sich dieser Schlagschatten meist bis zum peripherischen Rande der Iris.

Um sich an lebenden Augen von dem sehr wichtigen Umstande zu überzeugen, daß die Iris der Linse dicht anliegt, kann man dasselbe Verfahren gebrauchen, mit dem Unterschiede, daß man den Brennpunkt der Sammellinse ein wenig von der Seite her

<sup>1)</sup> J. CZERMAK, Prager Vierteljahrsschrift für prakt. Heilkunde. Bd. XXXII. S. 154. 1851.

auf die vordere Linsenfläche fallen läßt. Bei so starker Beleuchtung erscheint dann die Substanz der Linse weißlich trübe, und man sieht, daß von der Iris kein Schlagschatten geworfen wird. Noch besser geschieht dies mittels der Reflexe, welche die vordere




Fig. 11.

Fläche der Linse von einfallendem Lichte giebt. Wenn in Fig. 11  $C_1 C_2$  ein convexer Kugelspiegel ist,  $DE$  ein davorstehender dunkler Schirm mit einer Öffnung  $F G$ , das Auge des Beobachters sich in  $A$  befindet und ein Licht in  $B$ , und der am Rande der Öffnung bei  $F$  vorbeigehende Lichtstrahl  $B F$  in  $H$  nach  $H A$  zurückgeworfen wird, so wird das Auge von den zwischen  $H$  und  $C_1$  gelegenen Punkten der Spiegel­fläche kein zurückgeworfenes Licht erhalten können, diese werden vielmehr die dunkle Hinterseite des Schirms spiegeln müssen. So z. B. würde in der Richtung  $A J$  Licht gespiegelt werden können,

welches von dem Punkte  $K$  des Schirms ausgegangen ist. Zwischen  $F$  und  $H$  wird also das Auge einen dunklen Theil der Spiegeloberfläche so oft erblicken müssen, als nicht der Rand des Schirms der spiegelnden Fläche ganz dicht anliegt. Man kann sich von der Richtigkeit des Gesagten an jeder spiegelnden convexen Fläche, z. B. eines gewölbten metallenen Knopfes, überzeugen, für welche man sich ein passendes dunkles Diaphragma mit runder Öffnung gemacht hat. Nur wenn der Rand der Öffnung dicht an der Fläche liegt, reichen die Spiegelbilder, welche sie von äußeren Gegenständen entwirft, bis an den Rand des Diaphragma. Ist dagegen zwischen letzterem und der spiegelnden Fläche ein kleiner Zwischenraum, so sieht man an dem dem Auge gegenüberliegenden Rande der Öffnung eine dunkle Linie sich zwischen die Spiegelbilder und den Rand der Öffnung einschieben.

Die Flächen der Linse reflectiren ebenfalls Licht, aber sehr wenig. Man sieht diese Reflexe<sup>1</sup>, wenn sich das Auge in einem dunklen Zimmer befindet, in welchem nur ein Licht enthalten ist. Man stellt das Licht vor dem Auge, etwas seitlich von der nach vorn verlängerten Augenaxe, auf. Der Beobachter sieht von der andern Seite her in das Auge, so daß seine Gesichtslinie etwa denselben Winkel mit der Augenaxe macht, wie das einfallende Licht. Neben dem bekannten hellen Reflexe der Hornhaut sieht er dann zwei andere sehr viel schwächere. Der grössere von beiden bildet ein aufrechtes, ziemlich verwaschenes Bild der Flamme und rührt von der vorderen Linsenfläche her, der kleinere bildet ein schärferes umgekehrtes Bildchen und wird von der hinteren Linsenfläche entworfen. Von den Augenärzten werden diese Reflexe die *SANSON'schen Bildchen* genannt. Wenn man die Stellung des Lichts oder des eigenen Auges verändert, während man sie beobachtet, verändert sich auch die Stellung der Bildchen, und so gelingt es leicht, das erstgenannte derselben, das der vorderen Linsenfläche, bis an jede beliebige Stelle des Randes der Pupille zu führen. Man sieht es dann stets, auch an dem dem Beobachter gegenüberliegenden Rande der Pupille, bis dicht an die Iris rücken, ohne zwischenliegende schwarze Linie. Wenigstens ist dies unter normalen Umständen ohne

<sup>1</sup> Entdeckt von PURKINJE. S. dessen Abhandlung: *De examine physiologico organi visus et syst. cutanei*. Vratisl. 1823. Zur Diagnose von Krankheiten benutzt von SANSON (*Leçons sur des maladies des yeux*. Paris 1837). Ihr Ursprung ist genauer bestimmt durch H. MEYER, *Hentle's und Pieufer's Zeitschrift für rationelle Medicin*. 1846. Bd. V.

künstliche Erweiterung der Pupille, so viel ich gefunden habe, stets der Fall, und daraus folgt mit Bestimmtheit, daß der Pupillarrand der Iris der Linse anliege.

Die Entfernung der Pupillenfläche von dem Scheitel der Hornhaut ist von C. KRAUSE an durchschnittenen Augen gemessen worden. Indessen ist die Verbindung der Linse mit der Sclerotica durch die Ciliarfortsätze keine so straffe, daß nicht nach der Durchschneidung beträchtliche Verschiebungen eintreten sollten.

Davon, daß die Pupillarfläche hinter einer durch den äußeren Rand der Hornhaut gelegten Ebene liegt, kann man sich am lebenden Auge überzeugen, wenn man es so von der Seite ansieht, daß die Pupille hinter dem Rande der Sclerotica zu verschwinden beginnt. Man sieht alsdann, wie in *Fig. 12*, perspectivisch vor der Pupille einen helleren Streifen, ein verzogenes Bild der Iris, und vor diesem am Rande der Hornhaut einen dunkleren Streifen, den jenseitigen über die Hornhaut greifenden Rand der Sehnenhaut. Bewegt der Beobachter sein Auge noch weiter zurück, so verschwindet ihm die Pupille und Iris ganz, und hinter dem noch sichtbaren Teile der Hornhaut erscheint nur noch der jenseitige Scleroticarand. Da die Lichtstrahlen, welche einmal durch die Hornhaut in die wässrige Feuchtigkeit eingetreten sind, geradlinig durch diese fortgehen, so folgt daraus, daß die Iris weiter zurück liegt, als eine die äußeren Ränder der Hornhaut verbindende Linie.




*Fig. 12.*

Kennt man den Krümmungsradius im Scheitel der Hornhaut, so kann man die Distanz der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut am lebenden Auge ziemlich genau bestimmen, indem man die scheinbare Lage der Iris im Verhältnis zur scheinbaren Lage eines von der Hornhaut gespiegelten Lichtpunktes bestimmt. Das Spiegelbild eines entfernten Lichtpunktes liegt ein wenig hinter der Fläche der Pupille, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man von verschiedenen Seiten das Auge ansieht, und die perspectivische Lage des Lichtpunktes zu den Rändern der Pupille sich merkt.

Ist *a b* in *Fig. 13* die Pupille, *c* der scheinbare Ort des gespiegelten Lichtpunktes, sind *d c* und *f c* zwei verschiedene Richtungen, aus denen der Beobachter nach dem Punkte *c* hinblickt, so wird dieser Punkt von *d* aus gesehen hinter dem Punkte *g* der Pupillarebene, also scheinbar näher an *a*, von *f* aus hinter dem Punkte *h* scheinbar näher an *b* liegen; wie es auch in Wirklichkeit der Fall ist. Man würde nun die Lage des Punktes *c* am einfachsten genau bestimmen können, wenn man seine scheinbare perspectivische Entfernung von den beiden Rändern der Pupille mässe, was mit dem Ophthalmometer ausführbar wäre. Aber hierbei sind die fast fortdauernden Schwankungen der Weite der Pupille hinderlich.

Ich fand es deshalb vorteilhafter, etwas anders zu verfahren. Es seien an dem betreffenden Auge die elliptischen Axen der Hornhaut gemessen worden, und die Lage der Gesichtslinie zu ihnen bekannt. Steht dann vor dem Auge ein Licht, dessen Stellung in Bezug auf die Gesichtslinie ebenfalls bekannt ist, so läßt sich aus den bekannten Gesetzen der kugeligen spiegelnden Flächen leicht der scheinbare Ort des von der Hornhaut entworfenen Spiegelbildes berechnen. Wir nehmen also im folgenden die Lage dieses Spiegelbildes immer als bekannt an. Sucht man nun eine solche Stellung des Lichts, des Fixationspunktes und des Ophthalmometers, daß man von den durch letzteres erblickten Doppelbildern des Lichtpunktes auf der Hornhaut gleichzeitig das eine mit dem einen Rande der Pupille, das andere mit dem andern zum Decken bringen kann: so folgt daraus, daß von dem Orte des Ophthalmometers aus gesehen der gespiegelte Lichtpunkt



*Fig. 13.*






gleichzeitig auf den anderen Rand, so verschiebt er das Zeichen  $F$  so lange an der Scale, bis dies der Fall ist, und merkt den Theilstrich der Scale, wo  $F$  steht. Dasselbe Verfahren wird wiederholt bei der zweiten Stellung des Ophthalmometers in  $G_2$ .

Die Länge  $AB$  ist in Scalentheilen zu messen; daraus ist der Winkel  $F'AB$  zu finden.

$$\frac{FB}{AB} = \text{tang. } \angle FAB.$$

Ist  $AH$  die große Axe des Hornhautellipsoides und der Winkel  $FAH$  schon bekannt, so ergibt sich daraus  $BAH$ , welchen Winkel man braucht, um die Lage des Spiegelbildes der Hornhaut zu bestimmen. Eben so bestimmt man den Winkel  $G_1AH$ , welcher die Richtung bestimmt, in welcher der Beobachter in das Auge gesehen hat. Der Mittelpunkt der scheinbaren Pupille (d. h. wie diese durch die Hornhaut erscheint) liegt dann also in einem bestimmten Orte des Hornhautbildes.



**Fig. 15.**

Wie aus der scheinbaren Lage des Mittelpunktes der Pupille seine wirkliche Lage berechnet werden kann, wird sich in § 9 und 10 ergeben<sup>1</sup>.

Die Resultate für die drei Augen, für deren Hornhäute ich die Abmessungen mit dem Ophthalmometer bestimmt habe, waren folgende:

		O. H.	B. P.	J. H.
Abstand der Pupillarebene vom Scheitel der Hornhaut	{ scheinbar	3,485	3,042	3,151
	{ wirklich	4,024	3,597	3,739
Abstand des Mittelpunktes der Pupille von der Hornhautaxe nach der Nasenseite . . . . .	{ scheinbar	0,037	0,389	0,355
	{ wirklich	0,032	0,383	0,304

Die Bestimmungen von KNAPP<sup>1</sup> nach derselben Methode ergaben für vier Augen:  $n_{D, 3692}$ ;  $n_{D, 3707}$ ;  $n_{D, 3477}$ ;  $n_{D, 3579}$  mm. ADAMČEK und WOJNOW<sup>2</sup> fanden  $n_{D, 3998}$ ;  $n_{D, 3237}$ ;  $n_{D, 2900}$  und  $n_{D, 3633}$  mm.

DONDERS<sup>4</sup> construirte für diese Messung das Cornealmikroskop, ein verschiebbares, schwach vergrößerndes Mikroskop, dessen Verschiebung genau abgelesen werden kann, und welches man zuerst auf die (nöthigenfalls mit Kalomel bepuderte) Vorderfläche der Hornhaut, dann auf den Pupillarrand einstellt. Die Verschiebung ergibt zunächst die scheinbare Tiefe der Kammer, aus der die wahre zu berechnen ist.

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, *Gräfe's Archiv für Ophthalmologie*. I. (2) S. 31. 1854.

<sup>3</sup> H. KNAPP, *Krümmung der Hornhaut*. Heidelberg 1859. p. 30. — *Gräfe's Archiv für Ophthalmol.* VI. (2) S. 1. 1860.

<sup>2</sup> E. ADAMČEK und M. WOINOW, *Gräfe's Archiv für Ophthalmologie*. XVI. (1) S. 144. 1870.

<sup>4</sup> F. C. DONDEK, 1872 dem Londoner Ophthalmologischen Congress mitgetheilt. *Zehender's Monatsblätter für Augenheilkunde*. 1872. p. 300.

Eine etwas abweichende Methode ist von den Herren MANDELSTAMM und SCHOELER<sup>1</sup> im Berliner Physikalischen Laboratorium ausgeführt, und später von Herrn REICH<sup>2</sup> angewendet und vollständiger beschrieben. Dabei sucht man das Mikroskop gleichzeitig auf den Rand der Pupille und ein von der Cornea entworfenen Spiegelbild einzustellen. Damit man dies kann, müssen beide scheinbar in gleicher Ebene liegen. Das Cornealbild ist das durch eine kleine verschiebbare Sammellinse ( $3\frac{1}{2}$  Zoll Brennweite) entworfene Bild einer fernen Flamme, dessen Strahlen durch eine zwischen Mikroskop und Auge befindliche unbelegte spiegelnde Glasplatte von vorn her auf die Hornhaut geworfen werden. Die Linse steht der spiegelnden Platte ziemlich nahe seitwärts von der Axe des Mikroskops. Darauf bestimmt man nach Entfernung des beobachteten Auges, in welcher Entfernung vom Objectiv des Mikroskops sich das von der Linse projecirte reelle Bild der Flamme einerseits und die scheinbare Pupille anderseits befanden, welche mit dem von der Hornhaut entworfenen Spiegelbilde der Flamme zusammenfiel. Kennt man den Krümmungsradius der Hornhaut, so genügt dies, um den Abstand des Spiegelbildes, bezüglich der scheinbaren Pupille von der Hornhautfläche zu berechnen. Der Hornhautradius kann, wenn keine große Genauigkeit verlangt wird, auch mit dem Cornealmikroskop gemessen werden, wenn man zwei Flammenreflexe erzeugt, und deren Abstand durch eine im Brennpunkt des Oculars angebrachte Glasplatte mißt, auf die eine Scala von Zehntel Millimeter eingeschnitten ist.

Die Messungen von Herrn REICH ergaben für drei Personen im Ruhezustand des Auges (Accommodation für die Ferne):

Wirkliche Tiefe der vorderen Kammer in Millimeter.

	Ophthalmometer	Mikroskop
H. H.	3,6696	3,639
H. G.	3,636	3,708
H. S.	—	3,6516

Herr REICH fand, daß Wiederholung der Messungen dieser Tiefe mit dem Mikroskop bessere Übereinstimmung ergab, als mit dem Ophthalmometer. In der That könnten Schwankungen in der Weite der Pupille einen nachtheiligen Einfluss bei der letzteren Messung haben, wenn dabei auch der Mittelpunkt der Pupille seine Lage ändern sollte.

19 Daß die Iris der Linse anliege und nach vorn gewölbt sei, ist von den Anatomen vielfach bestritten worden. Die älteren Anatomen nahmen es an, bis namentlich PETIT, auf Grund seiner Untersuchungen an gefrorenen Augen, das Gegentheil behauptete und zwischen Iris und Linse die sogenannte hintere Augenkammer annahm. In gefrorenen Augen findet man bald dünne Eisblätter zwischen Iris und Linse, bald nicht. Der Meinung von PETIT folgten fast alle späteren Anatomen, bis in der neuesten Zeit STELLWAG VON CARION und CRAMER sich wieder für die enge Anlagerung der Iris an die Linse erklärten. Ich selbst fand es möglich, in der oben beschriebenen Weise directe Beobachtungen dafür zu liefern, welche mir keinen Zweifel übrig zu lassen scheinen.

#### § 4. Die Netzhaut.

Die Netzhaut (*Retina*) ist eine flächenförmige Ausbreitung von Nervennasse, im Hintergrunde des Auges zwischen Aderhaut und Glaskörper gelegen. Sie ist frisch ziemlich durchsichtig, an todtten Augen weißlich trübe.

<sup>1</sup> L. MANDELSTAMM u. H. SCHOELER, *Gräfe's Archiv für Ophthalmol.* XVIII. (1) S. 155. 1872.

<sup>2</sup> M. REICH, *Gräfe's Archiv für Ophthalmol.* XX. (1) S. 207. 1874.

Im Hintergrunde des Auges ist sie am dicksten (0,22 mm); man bemerkt hier etwas nach der Nasenseite zu die weiße Eintrittsstelle des Sehnerven (*d* in *Fig. 1*, S. 3) und etwas nach der Schläfenseite hinüber (bei *p*) einen gelben Fleck (*Macula lutea Retinae*), die Stelle des deutlichsten Sehens. Nach vorn zu wird die Netzhaut dünner (am vorderen Rande 0,09 mm) und endet da, wo die Ciliarfortsätze beginnen, mit einem gezackten Rande (*Ora serrata Retinae*), wenigstens hören hier ihre nervösen Elemente auf. Sie ist an dieser Stelle eng verbunden mit der Aderhaut und Glashaut (der Hülle des Glaskörpers), und die membranösen Gebilde, welche hier ihre anatomische Fortsetzung bilden (*Pars ciliaris Retinae* und *Zonula Zinnii*), haben eine ganz andere Structur und physiologische Bedeutung.

Die Netzhaut besteht theils aus den gewöhnlichen mikroskopischen Bestandtheilen des Nervensystems, Nervenfasern, Ganglienkörpern, Kernen, theils aus eigenthümlichen, den Stäbchen (*Bacilli*) und Zapfen (*Coni*). *Fig. 16* stellt einen vergrößerten Durchschnitt der Netzhaut des Menschen dar, entworfen von MAX SCHULTZE, in den Dimensionen geändert von SCHWALBE. Die Reihe der Schichten, von der vorderen am Glaskörper anliegenden Schicht beginnend, ist die folgende:




Fig. 16.

- 1) *Membrana limitans interna*, eine glashelle elastische Haut.
- 2) Nervenfaserschicht, Fortsetzung der Fasern des Sehnerven, die sich von dessen Eintrittsstelle radial über die ganze Netzhaut ausbreiten mit Ausnahme des gelben Flecks, den sie umgehen. In der Umgebung des Nervenstamms ist diese Schicht daher am dicksten (0,2 mm), nach den Grenzen der Netzhaut hin viel dünner. Es sind in Bündel zusammengefasste blasse marklose Fasern von sehr verschiedener Dicke (0,0005 bis 0,003 und 0,005 mm), im frischen Zustande mit parallelen, glatten Rändern, nach Einwirkung von Reagentien treiben sie an einzelnen Stellen varicos auf.
- 3) Die Ganglienzellenschicht: *Fig 17* zeigt in *A* zwei solche Zellen aus der frischen Netzhaut des Rindes, *B* aus dem gelben Fleck des Menschen. Sie haben große Kerne mit Kernkörperchen, um diese einen feinkörnigen weichen, in Wasser nicht zerfließenden Markgehalt. Sie zeigen regelmässig

je einen in eine Faser der vorigen Schicht übergehenden Fortsatz (*a, a*), und einen oder auch (namentlich die größeren Zellen) mehrere, sich zum Theil verästelnde Fortsätze *b*, welche in die folgenden Schichten eintreten. Beim Menschen beträgt der Durchmesser der Zellen zwischen 0,01 und 0,03 mm; sie liegen in dem größeren Theile der Netzhaut in einfacher Schicht neben einander; nur in der Nähe des gelben Flecks drängen sie sich zusammen, und innerhalb desselben liegen bis 8 oder 10 Schichten übereinander, während das Centrum desselben davon frei bleibt, und deshalb als eine vertiefte dünne Stelle, die Netzhautgrube (*fovea centralis*), erscheint.




Fig. 17.

4) Die innere granulirte Schicht, eine schwer zu entwirrende Masse einer feinkörnigen Grundsubstanz, durchzogen von feinsten blassen Nervenfasern, die wohl aus den Fortsetzungen der Ganglienzellen hervorgehen, und sehr feiner bindgewebiger und elastischer Stützfasern, welche sich überhaupt zwischen allen andern Elementen der Netzhaut von der inneren zur äußeren *Membrana limitans* hinziehen.

5) Die innere Körnerschicht (äußere Nervenzellen HENLE), der der Ganglienzellen ähnlich; nur sind diese Körner viel kleiner, umschließen ziemlich eng ihren Kern. Auch diese senden je einen sehr feinen Fortsatz central, d. h. in die vorausgehende Schicht, dagegen mehrere, theilweis verästelte peripher ab. Außer den Körnern, die den Nervenzellen entsprechen, finden sich noch Kerne des Stützfasersystems in dieser Schicht vor.

6) Die äußere granulirte Schicht von sehr räthselhafter Structur; platte vielstrahlige Zellen mit Kernen liegen der Fläche der Netzhaut parallel, zwischen ihren Rändern bleiben Öffnungen; feinste Nervenfasern scheinen ebenfalls der Fläche parallel zu ziehen; daneben ein engmaschiges Netzwerk schärfer gezeichneter Fasern.

7) Die äußere Körnerschicht.

8) Die *Membrana limitans externa*.

9) Stäbchen und Zapfen. Fig. 18 zeigt neben einander ein Stäbchen und einen Zapfen vom Menschen nach MAX SCHULTZE. 11 bezeichnet die Stellen, wo sie in die *Limitans externa* eingefügt sind. Sie stehen auf der

äufseren, nach der *Uvea* gekehrten Fläche dieser Membran palissadenförmig nebeneinander gedrängt, so daß sie von der Fläche gesehen ein regelmäßiges Mosaik bilden. Die Zapfen haben ein dickeres Innenglied, als die Stäbchen, und ein kürzeres Aufsenglied. In der Netzhautgrube finden sich nur Zapfen, aber von etwas geringerem Durchmesser (0,003 mm) und länger (bis zu 0,06 und 0,1 mm), überhaupt den Stäbchen ähnlicher, während die Dicke ihrer Innenglieder in andern Theilen der Netzhaut bis zu 0,0045 und 0,0067 mm wächst, ihre Länge nur 0,032 bis 0,036 mm beträgt. Die Stäbchen sind etwa 0,002 dick und in der Mitte der Netzhaut 0,06 mm lang, am Rande nur 0,04 mm. Die Form des Mosaiks ist nach MAX SCHULTZE in *Fig. 19* aus der Umgebung des gelben Flecks, in *Fig. 20* von einer peripherischen Stelle der Netzhaut dargestellt. Die Zapfen entsprechen den breiteren weißen Stellen; der kleine Kreis in der Mitte derselben entspricht dem dünnen Aufsengliede.

Stäbchen und Zapfen zerfallen, ein jedes in zwei verschiedenartige Hälften, das Innenglied und das Aufsenglied. Die Aufsenglieder bestehen aus einer sehr durchsichtigen, übrigens doppeltbrechenden Substanz, die in ihren Reactionen dem Nervenmark ähnlich erscheint. Frisch erscheinen sie mit feiner Längsstreifung, was von einer Canellirung ihrer Oberfläche herzurühren scheint. Dagegen haben sie die Neigung in eine Reihe von feinen Querscheibchen zu zerfallen, wie dies am Aufsengliede des Zapfens,




Fig. 19.

*Fig. 18*, angedeutet ist. MAX SCHULTZE sah eine entsprechende äußerst feine Querstreifung, „haarscharf, wie in Kupfer gestochen“ auch an frischen Objecten. Bei Meerschweinchen fand er die Abstände je zweier Querlinien gleich 0,00087 mm und etwa 16 Plättchen in der Länge des Aufsengliedes.




Fig. 20.

Die Aufsenglieder der Stäbchen enthalten ein rothes, durch Licht zerstörbares Pigment, den Sehpurpur, über dessen näheres Verhalten wir im § 18 weiter berichten werden.



Die Innenglieder erscheinen frisch blafs und feinkörnig; durch Reagentien treten eigenthümliche Körper (Opticus-Ellipsoide, KRAUSE; Fadenapparat, M. SCHULTZE) beim Menschen am äufseren Ende hervor. Bei Vögeln, Reptilien und Amphibien liegen in ihrem hinteren Ende gelb und roth gefärbte Öltröpfchen.

Nach innen hin, aber an der andern Seite der *Limitans externa* liegend, schließt sich an jedes Zapfeninnenglied ein Zapfenkorn (*Fig. 16* zwischen 8 und 6) an, von dem eine Faser, die Zapfenfaser, durch die äufere Körnerschicht bis zur Grenze der äufsern granulirten Schicht läuft, um hier

mit einer kegelförmigen Anschwellung zu endigen. Von der gegen die *Granulosa externa* gekehrten Basis des Kegels gehen feine Fäserchen, feinen Nervenfasern in den Reactionen ähnlich, ab, die sich der Fläche der Netzhaut parallel in die genannte Schicht einsenken.

Die Stäbchen gehen spitz in feinere Fasern über, welche je ein Korn (Stäbchenkorn) in ihrem Verlauf enthalten, und bilden schliesslich an der *Granulosa externa* ein kleinere kolbenförmige Anschwellung. Die Stäbchenkörner sind quergestreift und liegen an denjenigen Stellen der Netzhaut, wo viele Stäbchen vorkommen, in vielen Lagen über einander.

10) Endlich die letzte Schicht der Netzhaut, die an die Aderhaut stößt, ist die Pigmentschicht. Von der äusseren Fläche her gesehen, zeigt sie ziemlich regelmässig sechseckig abgegrenzte Zellen von 0,012 bis 0,018 mm Durchmesser (*Fig. 21a*). Sie enthalten im Inhalt längliche schwarze Pigmentkörnchen, die wie kleine nadelförmige Krystalle aussehen. *Fig. 21 b* zeigt



*Fig. 21.*

in einer Seitenansicht der Pigmentzellen die große Zahl feiner Ausläufer, welche sich in die Zwischenräume zwischen die Stäbchen hineinziehen, mindestens bis zur Grenze zwischen Aufsenglied

und Innenglied. Eine Zelle, an welcher Aufsenglieder von Stäbchen zwischen diesen Ausläufern festhängen, ist in *Fig. 21 c* dargestellt. Die Pigmentkörnchen können in die Fortsätze hineinwandern, und wieder zu den Zellen zurück, worauf ebenfalls das Licht Einfluss hat. Auch hierüber wird § 18 Näheres bringen. *Fig. 22* zeigt nach FRISCH die Pigmentkörnchen *a* vom Menschen, *b* vom Meerschweinchen, *c* von der Taube, *d* vom Frosch, *e* vom Hecht.

Nach der Beobachtung von BOEL entspricht in der Netzhautgrube je ein Zapfen einer Pigmentzelle, während gegen den Rand der Netzhaut hin bis zu 15 Stäbchen auf einer Pigmentzelle befestigt sind, und die Zellen Sechsecke bilden, die in meridionaler Richtung etwas verlängert sind.

- 21 Der gelbe Fleck, für das Sehen der wichtigste Theil der ganzen Netzhaut, unterscheidet sich von den übrigen Theilen durch seine gelbe Farbe, welche von einem alle Theile mit Ausnahme der Stäbchenschicht durchdringenden Pigmente herrührt. Ihm fehlt die Nervenfaserschicht, und in der Stäbchenschicht finden sich nur Zapfen. In seiner Mitte befindet sich eine sehr durchsichtige vertiefte Stelle, die schon erwähnte Netzhautgrube (*Fovea centralis*), welche leicht einreißt und daher früher für eine Öffnung gehalten wurde. Die Nervenzellenschicht ist am Umfang des gelben Flecks stärker als in sämtlichen übrigen Theilen der Netzhaut, in der *Fovea centralis* wird sie aber wieder dünner, und enthält nur wenige Lagen von Zellen über einander; die granulöse Schicht fehlt vielleicht in der Mitte ganz. Die

innere Körnerschicht und Zwischenkörnerschicht nehmen gegen den gelben Fleck hin bedeutend zu, während die äußere Körnerschicht dünner wird. In der Netzhautgrube verdünnt sich nach H. MÜLLER auch die innere Körnerschicht. Nach REMAK und KÖLLIKER fehlen in der *Fovea centralis*




Fig. 22.

alle Schichten außer den Nervenzellen und Zapfen. Zwischen letzteren und der Aderhaut soll nach REMAK hier eine intensiv gelbe glashelle Substanz liegen.

Fig. 23 zeigt einen Durchschnitt der Netzhautgrube nach HENLE; *b* sind




Fig. 23.

die Zapfen, *Le* die *Limitans externa*, *g* die Zapfenkörner, deren ganz schräg verlaufende Fasern *f* die Verbindung mit den zur Seite gelagerten

Körnern und Ganglienzellen der vorderen Schichten herstellen. Weiter ist *gle* die äußere gangliöse Schicht, *gri* die innere granulierte, *gli* die innere gangliöse, *n* die Nervenfaserschicht, *Lh* die *Limitans hyaloidea* oder *interna*.

21 Auch bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel markirt sich die Netzhautgrube durch einen besonderen Lichtreflex (s. § 16). Sie enthält den Punkt des directen Sehens, d. h. auf ihr wird der Punkt des Gesichtsfeldes abgebildet, auf welchen wir den Blick richten.

n Für eine andere physiologisch wichtige Stelle, die Eintrittsstelle des Sehnerven ist ein Durchschnitt in *Fig. 24* gegeben; darin sind *oo* die Faserbündel, *r* die Netzhaut, *ch* die Aderhaut, *sc* die Sclerotica, alle drei in der Mitte durch die Sehnervenfasern durchbohrt. Die Sehnervenhaut schiebt eine durchlöchernte Lamelle *Lamina cribrosa*, *Lcr*, dazwischen. *Vc* ist die centrale Vene des Nerven. Die Figur stellt nur die linke Hälfte des Durchschnitts dar. Sie ist also auf der andern Seite der centralen Vene symmetrisch zu ergänzen.




Fig. 24.

21 Die Gefäße der Netzhaut treten in der Mitte des Sehnerven in das Auge (*Arteria und Vena centralis Retinae*), und verästeln sich von da aus baumförmig nach allen Richtungen. Anfangs liegen sie nahe unter der *Membrana limitans interna*, in der Schicht der Sehnervenfasern, später dringen sie auch in



die der Nervenzellen und in die feingranulierte Schicht ein, und verästeln sich <sup>22</sup> in diesen beiden Schichten in ein weitmaschiges Capillargefäßnetz. Die Lage und Form dieses Gefäßbaums ist für gewisse optische Erscheinungen wichtig<sup>1</sup>; ich gebe deshalb in *Fig. 25* eine Abbildung desselben, welche von DONDEERS nach einem Injectionspräparate gefertigt worden ist. Die Arterien sind hell, die Venen dunkel. In den gelben Fleck treten keine stärkeren Gefäße, in die Netzhautgrube auch keine Capillargefäße ein. Die letztere ist von einem Kranz von Endschlingen capillarer Gefäße umgeben.




Fig. 25.

An dem vorderen Rande (*Ora serrata*) geht die Netzhaut in eine Lage von Zellen über (*Pars ciliaris Retinae*), welche zugleich mit der sich ebenfalls fortsetzenden *Membrana limitans* die Ciliarfortsätze und die hintere Fläche der Iris, wo sie in Pigmentzellen überzugehen scheinen, überziehen, und diesen Theilen fest anhaften.

Da die Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente für sehr viele optische Erscheinungen von großer Wichtigkeit sind, gebe ich hier eine Zusammenstellung darauf bezüglicher Messungen älterer Beobachter, auf Millimeter reducirt. Ich bezeichne die Messungen von C. KRAUSE mit *Kr.*, von E. H. WEBER mit *W.*, von BRÜCKE mit *B.*, von KOLLIKER mit *Ko.*, von VINTSCHGAU mit *V.*

Durchmesser der Eintrittsstelle des Sehnerven *Kr.* 2,7 und 2,14. *W.* 2,09 und 1,71.

Durchmesser des Gefäßstrangs darin *W.* 0,704 und 0,63.

Entfernung der Mitte des Sehnerven von der Mitte des gelben Flecks *W.* 3,8. *Kr.* 3,28 und 3,6. Vom inneren Ende des gelben Flecks *Ko.* 2,25 bis 2,7.

Horizontaler Durchmesser des gelben Flecks *Kr.* 2,25. *W.* 0,76. *Ko.* 3,24.

Verticaler desgl. *Ko.* 0,81.

Durchmesser der Netzhautgrube *Ko.* 0,18 bis 0,225.

Entfernung der *Ora serrata* vom Rande der Iris an der Nasenseite *B.* 6, an der Schläfenseite 7.

Dicke der Netzhaut am Umfang des Sehnerven *Ko.* 0,22.

Desgl. an der hinteren Seite des Augapfels *Kr.* 0,164. *Ko.* 0,135.

Desgl. am Äquator *Kr.* 0,084.

Desgl. am vorderen Rande *Ko.* 0,09.

Dicke der Schichten im gelben Flecke. *Ko.*: Nervenzellen 0,101 bis 0,117; feinkörnige Schicht 0,045; innere Körnerschicht 0,058; Zwischenkörnerschicht 0,086; äußere Körnerschicht 0,058; Zapfen 0,067.

Durchmesser der Nervenzellen *B.* 0,01 bis 0,02. *Ko.* 0,009 bis 0,036, in der Regel zwischen 0,013 und 0,022.

Durchmesser der Körner *B.* 0,006 bis 0,008. *Ko.* 0,004 bis 0,009. Der Zapfenkern *V.* 0,0068.

Durchmesser der Stäbchen *B.* und *Ko.* 0,0018. *V.* 0,0010.

<sup>1</sup> S. unten § 15.

Länge der Stäbchen *B.* 0,027 bis 0,030. *Ko.* 0,063 bis 0,081.

Durchmesser der Zapfen *Ko.* 0,0045 bis 0,0067. *V.* 0,0034 bis 0,0068. Im gelben Flecke *Ko.* 0,0045 bis 0,0054.

Länge der Zapfen *V.* 0,015 bis 0,020.

23

### § 5. Die Krystalllinse.

Die Krystalllinse ist ein durchsichtiger, farbloser, biconvexer Körper, dessen vordere Fläche weniger gewölbt ist als die hintere. Sie wird umschlossen von einer structurlosen glashellen Membran (Linsenkapsel), welche in allen Eigenschaften der DESCEMERSchen Membran entspricht; auch trägt sie, wie diese, vorn, wo sie von der wässrigen Feuchtigkeit bespült wird, nach BRÜCKE ein Epithelium, welches HENLE und KÖLLIKER dagegen läugnen. Ihre hintere Hälfte ist mit der Glashaut verwachsen. Die Substanz der Linse ist in den äußeren Schichten von gallertartiger Consistenz, in deren Mitte oder dem Kerne der Linse dagegen consistenter. Das Ganze bildet in frischem Zustande einen elastischen Körper, der jeder äußeren Gewalt zwar leicht nachgiebt, aber auch schnell und vollkommen seine frühere Form wieder annimmt.

Die Substanz der Linse ist doppeltbrechend. Wenn man sie zwischen zwei gekreuzten NICOLSchen Prismen betrachtet, sieht man das schwarze Kreuz mit farbigen Ringen, welches senkrecht zur optischen Axe geschnittene einaxige Krystalle zeigen.

Die Masse der Linse besteht aus einem eigenthümlichen Proteinkörper, dem Globulin oder Krystallin. Ihre mikroskopischen Elementartheile sind Fasern von sechseckigem Querschnitt, 0,0056 bis 0,0112 mm breit, 0,002 bis




Fig. 26.

0,0038 mm dick, im Kerne fester und schmaler als in den äußeren Schichten. Ihre breitere Fläche liegt der Oberfläche der Linse parallel, daher die Linse auch leicht in dieser Richtung in zwiebelartig über einander liegende Schichten spaltet. Fig. 26 zeigt die Querschnitte der Fasern in ihrer Zusammenlagerung, Fig. 27 zeigt die Richtung der Schichten in einem




Fig. 27.

Durchschnitte der Linse. Die Fasern haben im Allgemeinen in jeder einzelnen Schicht die Richtung von der Axe der Linse nach ihrer Peripherie hin. Nur in den der Axe näheren Theilen bilden sie, indem sie mit kernhaltigen geschwollenen Enden aneinanderstossen, eigenthümliche sternförmige Figuren, wie eine solche aus den äußeren Linsenschichten in Fig. 28 abgebildet ist. In den Kernschichten hat der Stern nur drei Strahlen, welche mit einander Winkel von 120° machen. Die Sterne der hinteren und vorderen Fläche sind um 60° gegen einander gedreht. In den äußeren Schichten spalten sich dagegen

die drei Hauptstrahlen der Sterne vielfach in Nebenstrahlen, so daß viel verwickeltere und unregelmäßigere Figuren entstehen.

Dicht unter der Kapsel liegt statt der Fasern eine Zellschicht, welche nach dem Tode zerfließt und dann den *Liquor Morgagnii* bildet. Ähnliche Zellen verbinden nach BRÜCKE auch die Faserenden in den Strahlen der Sterne wenigstens in den äußeren Schichten, während BOWMAN und KÖLLIKER hier eine structurlose Substanz annehmen. Letzterer erklärt auch die zellenähnlichen Gebilde an der hinteren Linsenfläche für geschwollene und sich gegenseitig abplattende Enden der Linsenfasern, welche sich hier an die Kapsel heften. In jeder Hälfte der Linse existiren




Fig. 28.

also drei durch die Axe gehende Ebenen, die den Hauptstrahlen der Sterne entsprechen (*central planes*, BOWMAN), in denen die Structur der Linse abweichend ist; in den oberflächlichen Schichten theilen sich diese Flächen noch weiter. Es hängen damit wahrscheinlich gewisse Unregelmäßigkeiten in der Brechung der Lichtstrahlen zusammen.

THOMAS<sup>1</sup> hat eigenthümliche Figuren beschrieben, welche die Faserenden auf Durchschnittsflächen getrockneter Linsen bilden, und welche meist aus zwei Systemen concentrischer Kreise bestehen. Diese sind von CZERMAK<sup>2</sup> aus dem Faserverlauf der Linse erklärt worden.

Da die Dimensionen der Krystalllinse sich bei der Accommodation des Auges ändern, verschiebe ich die Angaben über ihre Größe und die Methoden sie zu messen auf § 10.

### § 6. Wässrige Feuchtigkeit und Glaskörper.

Die wässrige Feuchtigkeit (*Humor aqueus*) füllt den Raum zwischen 25 der Hornhaut, Iris und Linse aus. Den Raum, welcher zwischen der hinteren Fläche der Hornhaut, der vorderen Fläche der Iris und der Pupillarebene liegt, nennt man die vordere Augenkammer. Den Raum dagegen, den man zwischen der Pupillarebene, der hinteren Fläche der Iris und der vorderen Fläche der Linse vorhanden glaubte, nannte man hintere Augenkammer; indessen ist dies in der That im normalen Zustande nur eine capillare Spalte, indem die hintere Fläche der vorderen der Linse dicht anliegt. Nur bei starker künstlicher Erweiterung der Pupille durch *Belladonna* scheint sich die Iris von der Linse zu entfernen.

<sup>1</sup> THOMAS, *Prager medic. Vierteljahrsschr.* 1854. Bd. I. Außerord. Beilage. S. 1.

<sup>2</sup> J. CZERMAK. *Zeitschrift für wissensch. Zoologie.* Bd. 7, S. 185. 1885. Die neuesten Untersuchungen über die Structur der Linse finden sich in: OTTO BECKER, *Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse*, Wiesbaden. 1883.

Die wässrige Feuchtigkeit füllt also die vordere Augenkammer. Sie ist klar, farblos und besteht aus Wasser, welches etwa 2 Proc. fester Stoffe, nämlich Kochsalz und Extractivstoffe, enthält. Sein Brechungsverhältniß ist kaum von dem des Wassers unterschieden.

Der Raum des Augapfels, welcher zwischen der Linse und der Netzhaut liegt, ist vom Glaskörper (*Corpus vitreum*, *Humor vitreus*) ausgefüllt, welcher von der Glashaut (*Membrana hyaloidea*) umschlossen wird. Der Glaskörper bildet eine gallertartige Masse von wenig Zusammenhang. Wenn man ihn zerschneidet, tropft eine dünne, nicht Faden ziehende Flüssigkeit aus. Diese reagirt alkalisch, und enthält 1,69 bis 1,98 Proc. feste Theile, von denen die Hälfte aus unorganischen Stoffen (Kochsalz, wenig kohlensaures Natron, Spuren von Kalk, Schwefelsäure und Phosphorsäure) besteht. Der organische Theil des Inhalts scheint hauptsächlich Schleimstoff zu sein, und enthält Spuren einer Proteinverbindung. Auch das Brechungsverhältniß des Glaskörpers unterscheidet sich kaum von dem des Wassers, ist aber etwas höher als das der wässrigen Feuchtigkeit.

Bei Embryonen hat der Glaskörper einen zelligen Bau, später aber findet man von den Zellen nur einzelne Reste, Membranen, Körnerchen, körnige Massen, welche sich in der Flüssigkeit, wenn auch nicht ganz frei, bewegen. Seine Consistenz verdankt der Glaskörper wahrscheinlich einer geringen Menge einer stark aufgequollenen organischen Substanz (Schleimstoff oder Faserstoff). Geringe Mengen Faserstoff, welche sich aus hydropischen Flüssigkeiten abscheiden, geben oft ähnliche leicht bewegliche Gallerten,  
 26 aus denen die Flüssigkeit ausläuft, wenn man den Zusammenhang des Gerinnsels mechanisch zerstört. Läßt man den Glaskörper in Reagentien, welche den Schleimstoff niederschlagen, z. B. in Lösungen von essigsäurem Bleioxyd oder Chromsäure erhärten, so findet man auf Durchschnitten zuweilen regelmäßige Streifungen, von denen es aber noch höchst zweifelhaft ist, ob sie Membranen entsprechen, welche sich durch den Glaskörper hinziehen.

HANNOVER nimmt auf Grund dieser Streifungen an, daß im menschlichen Glaskörper ebene Membranen vorkommen, und sich alle in einer Linie schneiden, die von der Eintrittsstelle des Sehnerven nach der hinteren Fläche der Linse hinübergeht, und daß die Membranen sich von dieser Linie nach dem äußeren Umfang des Glaskörpers hinüberziehen und dort ansetzen, so daß der Bau des Glaskörpers ähnlich dem einer Apfelsine sein würde.

Bei den entoptischen Erscheinungen werde ich die Schlüsse besprechen, welche man daraus auf die Structur des Glaskörpers ziehen kann.

Die Glashaut ist eine sehr feine, glashelle, structurlose Membran, welche im hinteren Theile des Auges der *Membrana limitans interna* der Netzhaut anliegt, und ihr im Leben überall<sup>1</sup>, nach dem Tode nur an der Eintrittsstelle des Sehnerven und an der *Ora serrata* fest anhaftet. Von der *Ora*

<sup>1</sup> M. DE VINTSCHGAU in *Sitzber. d. Wiener Akad.* XI. 943. 1853 u. A. BUROW in *J. Müller's Archiv.* 1840.

*serrata* setzt sie sich, dünner geworden, fort bis zur hinteren Fläche der Linsenkapsel, mit der sie verschmilzt (*Fig. 1. k*), während sich zwischen sie und den Ciliartheil der Netzhaut noch eine andere Membran einschiebt, die *Zonula Zinnii* (*Ligamentum suspensorium lentis*), welche von manchen Anatomen als ein vorderes Blatt der Glashaut bezeichnet wird.

Die Zonula ist wie eine Halskrause gefaltet, so daß sie der Oberfläche der Ciliarfortsätze folgt. Der vordere oder äußere Rand ihrer Falten liegt fest mit der *Membrana limitans* verbunden in der Tiefe zwischen den Falten der Ciliarfortsätze, der hintere oder innere Rand ihrer Falten, welcher den Gipfeln der Ciliarfortsätze entspricht, nähert sich der Glashaut. In *Fig. 1* ist die Zonula durch die Linie *c* bezeichnet. Rechts fällt sie zwischen zwei Ciliarfortsätze, links zieht sie über den Gipfel eines solchen Fortsatzes hin. In dieser Weise gelangt sie zum Rande der Linse, und setzt sich in einer gewellten Linie an deren Kapsel fest. In *Fig. 29* ist nach BRÜCKE ein Quadrant der Linse, projectirt auf eine durch die Axe *ab* der Linse gelegte Ebene, dargestellt. Die Ansatzlinie der Glashaut ist mit *cd* bezeichnet. Davor sieht man die gezackte Ansatzlinie der Zonula. Nach HENLE würde die gewellte Linie fast ganz auf die vordere Seite der Linse hinübrücken.




Fig. 29.


Der spaltenförmige Raum zwischen der Zonula und Glashaut wird *Canalis Petiti* genannt. Wenn man ihn aufbläst, nachdem man die Zonula von vorn frei gelegt hat, treten die eingestülpten Falten der Zonula gewölbt heraus, und das Ganze bekommt das Ansehn einer ionischen Eierleiste; daher nannte ihn sein Entdecker PETIT auch *Canal godronné*. Bei stärkerem Blasen zerreißen die hervorgestülpten Theile der Membran, und es bleiben nur die vorderen Faltenränder wegen ihrer größeren Festigkeit als Stränge stehen, welche die Linse an den Glaskörper anheften. Diese vorderen Faltenränder sind übrigens fest verbunden mit dem Ciliartheile der Netzhaut, der in der Tiefe zwischen den Ciliarfortsätzen hinzieht, und letzterer haftet wieder der Pigmentschicht fest an. Hier finden sich auch Faserzüge vor, welche nach BRÜCKE aus den Fasern herkommen, zwischen welche die Nervenzellen der Netzhaut eingebettet sind. Diese drängen sich in der *Ora serrata* an den Stellen zusammen, die den Zwischenräumen je zweier Ciliarfortsätze entsprechen, und ziehen im Grunde dieser Zwischenräume nach vorn. Die Zonula selbst erklärt BRÜCKE für eine structurlose Membran, während HENLE und KÖLLIKER sie selbst für faserig erklären. Gegen Reagentien sind die Zonula und ihre Fasern so resistent wie elastisches Gewebe.

Die Zonula sichert die Stellung der Linse, indem sie diese an den Ciliarkörper heftet, und kann auch, wenn sie gespannt ist, auf den Äqua-

torialrand der Linse einen Zug ausüben, welcher die Äquatorialdurchmesser der Linse verlängert, ihre Dicke in der Axe verringert, und ihre Flächen abplattet.

### § 7. Umgebung des Auges.

Der Augapfel liegt, in lockeres Fettzellgewebe eingebettet, in der knöchernen Augenhöhle (*Orbita*). Diese hat eine nahehin kegelförmige Gestalt. Die Grundfläche des Kegels ist die vordere Öffnung der Orbita in der Gesichtsfläche, die Spitze des Kegels liegt nach hinten und etwas nach einwärts. In *Fig. 30* ist die Lage der Augen in den beiden Augenhöhlen



*Fig. 30.*

dargestellt. Aus der hinteren Seite des Augapfels rechts sieht man den Sehnerven *n* hervortreten, welcher durch ein in der Spitze der Augenhöhle gelegenes Loch *o* (*Foramen opticum*) in die Schädelhöhle eintritt, um sich hier bei *m* im *Chiasma nervorum opticorum* mit dem der anderen Seite zu vereinigen und zu kreuzen. Die Fortsetzungen der Sehnerven vom Chiasma bis zum Gehirn nennt man die *Tractus optici*. Die Fasern eines jeden *Tractus opticus* gehen theils in den Sehnerven derselben, theils in den der entgegengesetzten Seite über, ein kleiner Theil auch durch den *Tractus opticus* der anderen Seite nach dem Gehirne zurück. Auch wollen einige Beobachter Fasern gefunden haben, welche von dem einen Sehnerven durch das Chiasma in den anderen übergehen.

In der Augenhöhle liegen ferner sechs zur Bewegung des Augapfels 28 bestimmte Muskeln, nämlich

1) der innere gerade *i* und  
 2) der äußere gerade *a*. Beide entspringen am Umfange des *Foramen opticum* in der Spitze der Augenhöhle, und setzen sich an die innere und äußere Seite des Augapfels. Sie drehen ihn um seine verticale Axe.

3) Der obere gerade in *Fig. 30*-rechts weggenommen, um den Sehnerven zu zeigen, links mit *s* bezeichnet, und

4) der untere gerade, welcher ebenso auf der unteren Seite der Orbita liegt, wie der obere hier auf der oberen sichtbar ist. Sie entspringen ebenfalls vom Umfange des *Foramen opticum* und heften sich an die obere und untere Seite des Augapfels. Sie drehen ihn um eine horizontale Axe, welche von der Nasenseite und etwas nach vorn herübergeht nach der Schläfenseite und etwas nach hinten, und in *Fig. 30* mit *DD* bezeichnet ist. Diese Axe bildet einen Winkel von etwa  $70^{\circ}$  mit der Axe des Auges *A*.

5) Der obere schiefe Muskel *t* entspringt vom Rande des *Foramen opticum*, läuft an der inneren oberen Seite der Augenhöhle nach vorn, seine Sehne geht durch eine kleine Schleife *u* (*trochlea*), die am oberen vorderen Rande der Augenhöhle befestigt ist, biegt hier um und heftet sich an die obere Seite des Augapfels, bei *C*. Der Muskel übt einen Zug in Richtung seiner Sehne aus.

6) Der untere schiefe Muskel, in der Figur nicht sichtbar, entspringt vom inneren vorderen Umfange der Augenhöhle, läuft unter dem Augapfel nach der Schläfenseite herüber und befestigt sich am äußeren hinteren Umfange des Augapfels. Die Drehungsaxe *BB* für die schiefen Augenmuskeln läuft ebenfalls horizontal von außen und vorn nach innen und hinten, und macht mit der Drehungsaxe des oberen und unteren geraden Muskels einen Winkel von etwa  $75^{\circ}$ , mit der Axe des Auges einen von  $35^{\circ}$ .

Durch verschiedenartig combinirte Wirkung dieser sechs Muskeln kann die Augenaxe nach jeder beliebigen Richtung gewendet, und auch der Aug- 29 apfel um die Augenaxe gedreht werden. Wenn wir hier für je zwei Muskeln eines Paares eine gemeinschaftliche Drehungsaxe angenommen haben, so scheint diese Annahme wenigstens vorläufig als erste Annäherung erlaubt zu sein, da sie die Uebersicht der Bewegungen, welche die Augenmuskeln auszuführen haben, sehr vereinfacht.

Nach vorn ist der Augapfel geschützt durch zwei Deckplatten, die Augenlider (*Palpebrae*). Jedes von ihnen schließt ein Knorpelblättchen ein, welches auf der äußeren Seite von der äußeren Haut überzogen ist, auf der inneren von einer Schleimhaut, die von dort auf den Augapfel übergeht, Bindehaut des Auges (*Conjunctiva*). Sie ist an die weiße Sehnenhaut des Augapfels locker angeheftet, nur am Rande der Hornhaut verschmilzt sie fest mit ihr. Die Oberfläche der Bindehaut und die vordere Fläche der Hornhaut werden von drei verschiedenen Secreten fortdauernd befeuchtet. Diese sind 1) das Secret der MEIBOM'schen Drüsen, welche an

der inneren Fläche der Augenlider unter der Bindehaut liegen. Ihre Ausführungsgänge öffnen sich längs der hinteren Kante der Augenlidränder. Dieses fettige Secret haftet meistens wohl nur an den Rändern der Lider, und verhindert das Ueberfließen der wässrigen Thränen; es kann sich aber auch in öligen Tropfen über die Hornhaut verbreiten, namentlich bei starken Bewegungen der Lider. 2) Der Schleim der Schleimdrüsen der Bindehaut, welche am zahlreichsten am Rande der Falten zwischen den Lidern und dem Augapfel sich vorfinden. 3) Die Thränenflüssigkeit, abgesondert von den Thränenrüsen, von denen je zwei auf jeder Seite im oberen äußeren Theile der Augenhöhle liegen. Sie ergiessen ihr wässriges Secret, welches nur etwa 1 Proc. feste Substanzen enthält, durch 7 bis 10 feine Ausführungsgänge oberhalb des äußeren Augenwinkels zwischen das obere Lid und den Augapfel. Von hier verbreitet es sich über die ganze Conjunctiva, und wird am inneren Augenwinkel durch zwei feine Öffnungen, die Thränenpunkte, aufgenommen, die Mündungen der beiden Thränenkanälchen, welche es in einen weiteren Kanal, *Ductus nasolacrymalis*, und endlich in die Nase führen.

Die Bindehaut des Auges ist außerordentlich empfindlich. Jede leiseste Berührung eines fremden Körpers erregt Schmerz und eine unwillkürliche Bewegung der Augenlider, das Blinzeln. Dadurch und durch die fortwährend über die Bindehaut hinsickernde Thränenfeuchtigkeit wird die vordere Fläche der Hornhaut stets rein und glänzend erhalten, was ein nothwendiges Erforderniß für deutliches Sehen ist. Größere in der Luft schwebende Staubtheilchen, Insecten u. s. w. werden außerdem durch die Wimpern abgefangen.

---



# Physiologische Optik.

---



### § 8. Eintheilung des Gegenstandes.

Die physiologische Optik ist die Lehre von den Wahrnehmungen 30  
durch den Gesichtssinn. Wir sehen die Objecte der Außenwelt durch Vermittelung des Lichts, welches von ihnen her in unser Auge fällt. Dies Licht trifft die Netzhaut, einen empfindungsfähigen Theil unseres Nervensystems, und regt in ihr Empfindungen an. Die Empfindungen, durch den Sehnerven dem Gehirne zugeleitet, werden die Veranlassung, daß unser Bewußtsein die Vorstellung von gewissen im Raume vertheilten Gegenständen bildet.

Demgemäß zerfällt die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen in drei Abschnitte:

- 1) Die Lehre von den Wegen des Lichts im Auge. Da wir darin hauptsächlich mit Brechungen der Lichtstrahlen und nur ausnahmsweise mit spiegelnder oder diffuser Reflexion zu thun haben, können wir diesen Theil auch die Dioptrik des Auges nennen.
- 2) Die Lehre von den Empfindungen des Sehnervenapparats, in welcher die Empfindungen behandelt werden, ohne Bezug zu nehmen auf die Möglichkeit, äußere Objecte durch sie zu erkennen.
- 3) Die Lehre von dem Verständnisse der Gesichtsempfindungen oder die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen, welche von den Vorstellungen handelt, die wir auf Grund der Gesichtsempfindungen über die Objecte der Außenwelt uns bilden.

Die physiologische Optik unterscheidet sich also von der physikalischen Optik dadurch, daß erstere die Eigenschaften und Gesetze des Lichts nur in so fern behandelt, als sie zu den Gesichtswahrnehmungen in Beziehung stehen, während die physikalische Optik die Eigenschaften und Gesetze des Lichts untersucht, welche ihm unabhängig vom menschlichen Auge zukommen. Wenn die letztere auf das Auge Rücksicht nimmt, so benutzt sie es nur als experimentelles Hülfsmittel, als das bequemste Reagens, um das Dasein und die Verbreitung des Lichts zu erkennen und Licht verschiedener Art zu unterscheiden.

Für diejenigen meiner Leser, welchen die Resultate der physikalischen Optik nicht vollständig geläufig sind, schalte ich hier einen kurzen Abriss der wesentlichen Eigenthümlichkeiten des Lichts ein, welche für die physiologische Optik von Wichtigkeit sind, und gebe die Definitionen der physikalischen Begriffe, mit denen wir in der Folge zu thun haben werden.

Das Licht wird von der Mehrzahl der Physiker als eine eigenthümliche Bewegungsform eines hypothetischen Mediums, des Lichtäthers, angesehen, und wir wollen uns dieser Ansicht, der Undulationstheorie, die sehr vollständig von allen Erscheinungen Rechenschaft giebt, anschließen.

Die Art der Bewegung der Aethertheilchen längs eines Lichtstrahls, welche die Undulationstheorie ihren Folgerungen zu Grunde legt, versinnlicht man sich am leichtesten, wenn man einen nassen Faden oder eine feine Kette *A B*

31




Fig. 31.

*Fig. 31*, indem man sie am oberen Ende bei *A* mit der Hand faßt, senkrecht herabhängen läßt, und nun die Hand seitlich hin und her bewegt. Der Faden biegt sich dann zu einer Wellenlinie, wie sie durch die gestrichelte Linie der Figur angedeutet ist, welche Wellenlinie fortdauernd vom oberen zum unteren Ende herabläuft. Bei den Wellen, die sich längs des Fadens von oben nach unten fortpflanzen, bleibt jedes einzelne Theilchen des Fadens immer in gleicher Höhe über dem Boden, wobei es entweder in geraden Linien von rechts nach links, oder von vorn nach hinten hin und her schwanken, oder auch in horizontalen, kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um seine mittlere Gleichgewichtslage sich bewegen kann, je nachdem sich die Hand, welche den Faden hält, von rechts nach links, oder von vorn nach hinten, oder in geschlossenen krummen Linien bewegt.

Ganz ähnlich der Bewegung der einzelnen Theile des Fadens würde die Bewegung einer Reihe von Äthertheilchen sein, längs welcher sich ein Lichtstrahl fortpflanzt. Jedes einzelne Theilchen des Äthers bleibt fortdauernd in der Nähe seiner ursprünglichen Ruhelage, und bewegt sich in geraden oder gekrümmten Bahnen um diese. Was sich als Licht fortbewegt, sind nicht die Äthertheilchen selbst, sondern nur die Wellenform, in welche sie sich während ihrer Bewegung ordnen, mit ihren verschiedenen Abwechselungen (Phasen) von Ausweichung und Geschwindigkeit.

Die Bahnen der Äthertheilchen bei der Lichtbewegung liegen in Ebenen, welche senkrecht gegen die Fortpflanzungsrichtung der Wellen sind, ganz wie bei unserem Faden, wo die Wellen in verticaler Richtung nach dem Boden hin laufen, und jeder einzelne Theil des schwingenden Fadens stets in gleicher Höhe über dem Boden eine horizontale Bahn beschreibt. Dadurch unterscheiden sich die Lichtwellen von den Wellen elastischer Flüssigkeiten, z. B. von der Schallbewegung der Luft, bei welcher die Theilchen parallel der Fortpflanzungsrichtung oscilliren.

Wenn die Bahn der schwingenden Äthertheilchen in einem Lichtwellenzuge geradlinig ist, nennt man das Licht geradlinig polarisirt; wenn die Bahn kreisförmig oder elliptisch ist, nennt man das Licht dagegen kreisförmig oder elliptisch polarisirt, wobei die Drehung rechts oder links herum geschehen kann. Zwei geradlinig polarisirte Strahlen, deren Schwingungsrichtungen auf einander senkrecht stehen, nennt man senkrecht gegen einander polarisirt.

### § 8. Eintheilung des Gegenstandes.

Die physiologische Optik ist die Lehre von den Wahrnehmungen 30  
durch den Gesichtssinn. Wir sehen die Objecte der Außenwelt durch Vermittelung des Lichts, welches von ihnen her in unser Auge fällt. Dies Licht trifft die Netzhaut, einen empfindungsfähigen Theil unseres Nervensystems, und regt in ihr Empfindungen an. Die Empfindungen, durch den Sehnerven dem Gehirne zugeleitet, werden die Veranlassung, daß unser Bewußtsein die Vorstellung von gewissen im Raume vertheilten Gegenständen bildet.

Demgemäß zerfällt die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen in drei Abschnitte:

- 1) Die Lehre von den Wegen des Lichts im Auge. Da wir darin hauptsächlich mit Brechungen der Lichtstrahlen und nur ausnahmsweise mit spiegelnder oder diffuser Reflexion zu thun haben, können wir diesen Theil auch die Dioptrik des Auges nennen.
- 2) Die Lehre von den Empfindungen des Sehnervenapparats, in welcher die Empfindungen behandelt werden, ohne Bezug zu nehmen auf die Möglichkeit, äußere Objecte durch sie zu erkennen.
- 3) Die Lehre von dem Verständnisse der Gesichtsempfindungen oder die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen, welche von den Vorstellungen handelt, die wir auf Grund der Gesichtsempfindungen über die Objecte der Außenwelt uns bilden.

Die physiologische Optik unterscheidet sich also von der physikalischen Optik dadurch, daß erstere die Eigenschaften und Gesetze des Lichts nur in so fern behandelt, als sie zu den Gesichtswahrnehmungen in Beziehung stehen, während die physikalische Optik die Eigenschaften und Gesetze des Lichts untersucht, welche ihm unabhängig vom menschlichen Auge zukommen. Wenn die letztere auf das Auge Rücksicht nimmt, so benutzt sie es nur als experimentelles Hülfsmittel, als das bequemste Reagens, um das Dasein und die Verbreitung des Lichts zu erkennen und Licht verschiedener Art zu unterscheiden.

Für diejenigen meiner Leser, welchen die Resultate der physikalischen Optik nicht vollständig geläufig sind, schalte ich hier einen kurzen Abriss der wesentlichen Eigenthümlichkeiten des Lichts ein, welche für die physiologische Optik von Wichtigkeit sind, und gebe die Definitionen der physikalischen Begriffe, mit denen wir in der Folge zu thun haben werden.

Das Licht wird von der Mehrzahl der Physiker als eine eigenthümliche Bewegungsform eines hypothetischen Mediums, des Lichtäthers, angesehen, und wir wollen uns dieser Ansicht, der Undulationstheorie, die sehr vollständig von allen Erscheinungen Rechenschaft giebt, anschließen.

Die Art der Bewegung der Aethertheilchen längs eines Lichtstrahls, welche die Undulationstheorie ihren Folgerungen zu Grunde legt, versinnlicht man sich am leichtesten, wenn man einen nassen Faden oder eine feine Kette *A B*

31




Fig. 31.

*Fig. 31*, indem man sie am oberen Ende bei *A* mit der Hand faßt, senkrecht herabhängen läßt, und nun die Hand seitlich hin und her bewegt. Der Faden biegt sich dann zu einer Wellenlinie, wie sie durch die gestrichelte Linie der Figur angedeutet ist, welche Wellenlinie fortdauernd vom oberen zum unteren Ende herabläuft. Bei den Wellen, die sich längs des Fadens von oben nach unten fortpflanzen, bleibt jedes einzelne Theilchen des Fadens immer in gleicher Höhe über dem Boden, wobei es entweder in geraden Linien von rechts nach links, oder von vorn nach hinten hin und her schwanken, oder auch in horizontalen, kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um seine mittlere Gleichgewichtslage sich bewegen kann, je nachdem sich die Hand, welche den Faden hält, von rechts nach links, oder von vorn nach hinten, oder in geschlossenen krummen Linien bewegt.

Ganz ähnlich der Bewegung der einzelnen Theile des Fadens würde die Bewegung einer Reihe von Äthertheilchen sein, längs welcher sich ein Lichtstrahl fortpflanzt. Jedes einzelne Theilchen des Äthers bleibt fortdauernd in der Nähe seiner ursprünglichen Ruhelage, und bewegt sich in geraden oder gekrümmten Bahnen um diese. Was sich als Licht fortbewegt, sind nicht die Äthertheilchen selbst, sondern nur die Wellenform, in welche sie sich während ihrer Bewegung ordnen, mit ihren verschiedenen Abwechselungen (Phasen) von Ausweichung und Geschwindigkeit.

Die Bahnen der Äthertheilchen bei der Lichtbewegung liegen in Ebenen, welche senkrecht gegen die Fortpflanzungsrichtung der Wellen sind, ganz wie bei unserem Faden, wo die Wellen in verticaler Richtung nach dem Boden hin laufen, und jeder einzelne Theil des schwingenden Fadens stets in gleicher Höhe über dem Boden eine horizontale Bahn beschreibt. Dadurch unterscheiden sich die Lichtwellen von den Wellen elastischer Flüssigkeiten, z. B. von der Schallbewegung der Luft, bei welcher die Theilchen parallel der Fortpflanzungsrichtung oscilliren.

Wenn die Bahn der schwingenden Äthertheilchen in einem Lichtwellenzuge geradlinig ist, nennt man das Licht geradlinig polarisirt; wenn die Bahn kreisförmig oder elliptisch ist, nennt man das Licht dagegen kreisförmig oder elliptisch polarisirt, wobei die Drehung rechts oder links herum geschehen kann. Zwei geradlinig polarisirte Strahlen, deren Schwingungsrichtungen auf einander senkrecht stehen, nennt man senkrecht gegen einander polarisirt.

Das natürliche Licht, wie es von leuchtenden Körpern ausgeht, verhält sich meist wie eine gleichmäßige Mischung von allen Arten verschieden polarisirten Lichts; man nennt solches unpolarisirt. Erst durch die Brechung und Spiegelung des Lichts erhält man Licht, in welchem eine Art der Polarisation überwiegt, oder allein vorkommt.

Wenn jedes Äthertheilchen bei der Lichtbewegung immer genau in derselben Zeit denselben Weg mit derselben Geschwindigkeit wiederholt durchläuft, nennt man das Licht einfach, einfarbig oder homogen, und die Zeit, in der es seinen Weg einmal zurücklegt, heist die Schwingungsdauer. Die auffallendste Eigenthümlichkeit, durch welche sich Licht verschiedener Schwingungsdauer von einander unterscheidet, ist die Farbe. Das natürliche Licht der leuchtenden Körper ist meistens nicht einfaches Licht von constanter Schwingungsdauer, sondern enthält Wellenzüge von einer unendlichen Menge continuirlich in einander übergehender Werthe der Schwingungsdauer. Man nennt solches Licht gemischtes oder zusammengesetztes Licht. Das weiße Licht der Sonne ist gemischtes Licht. Einfaches Licht kann man am besten durch Brechung in durchsichtigen Prismen aus dem gemischten ausscheiden, indem nach der Brechung die Wellenzüge verschiedener Schwingungsdauer in verschiedenen Richtungen sich fortpflanzen. Wir können also die Bewegung in einem Strahle natürlichen Lichts vergleichen mit der Bewegung, welche unser Faden annehmen würde, wenn die Hand, welche ihn hält, unregelmäßige Bewegungen sowohl der Dauer als der Richtung nach ausführt, bei denen sie sich aber nie weit von ihrer mittleren Lage entfernt.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Lichtwellen ist außerordentlich groß. Für den Weltenraum ist sie durch astronomische Beobachtungen bestimmt worden, und beträgt hier etwa 300 000 Kilometer in der Secunde. In durchsichtigen Körpern ist sie geringer, und nicht ganz gleich für Licht verschiedener Schwingungsdauer.

In krystallisirten Körpern, oder solchen, deren moleculärer Bau nach verschiedenen Richtungen hin verschieden ist, (doppelthbrechenden Körpern), ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit auch für verschiedene Richtungen der Fortpflanzung und der Polarisation verschieden.

Wenn längs der Linie  $AB$  Fig. 31 ein einfacher, geradlinig polarisirter Lichtstrahl sich fortpflanzt, so ordnen sich die Äthertheilchen, welche anfangs in der geraden Linie  $AB$  lagen, in eine Wellenlinie  $a_0 b_0 a_1 b_1 a_2$ , welche sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit fortschiebt, und wechselnde Ausbiegungen nach rechts und nach links von gleicher Länge zeigt. Die Länge von zwei solchen Ausbiegungen,  $c_0 c_1$ , oder überhaupt die Entfernung je zweier entsprechender Punkte auf zwei nächst auf einander folgenden, nach gleicher Richtung hin gebogenen Theilen der Wellenlinie nennt man die Wellenlänge. Während nun der Gipfel des Wellenbergs von  $a_0$  bis  $a_1$  sich fortschiebt, muß bei  $A$  ein neuer Gipfel der Linie angekommen sein, und das Äthertheilchen bei  $A$  muß eine ganze Schwingungsdauer vollendet haben. Während der Zeit einer Schwingungsdauer pflanzt sich also das Licht um eine Wellenlänge fort, d. h. die Wellenlänge ist gleich der Schwingungsdauer, multiplicirt mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Daraus folgt, daß bei Licht von gleicher Schwingungsdauer in durchsichtigen Mitteln verschiedener Art die Wellenlänge der Fortpflanzungsgeschwindigkeit proportional sein muß, und daß die Wellenlängen in dichteren durchsichtigen Medien im Allgemeinen kleiner sind als im leeren Raume.

Die Wellenlängen kann man mit Hülfe der Phänomene der Interferenz messen und daraus die Schwingungsdauer des betreffenden Lichts berechnen. Die Phänomene der Interferenz beruhen darauf, daß zwei Lichtstrahlen sich gegenseitig verstärken, wenn sie gleichgerichtete Ätherbewegungen, sich aber aufheben, wenn sie entgegengesetzt gerichtete hervorbringen. Zwei Theile eines Lichtstrahls, welche nach Zurücklegung verschiedener Wege sich wieder vereinigen, verstärken sich also, wenn ihr Weg gar nicht, oder um ein, zwei, mehrere ganze Wellenlängen unterschieden sind, und sie heben sich auf, wenn die Wege um eine ungerade Zahl halber Wegelängen unterschieden sind. Aus solchen Phänomenen der Interferenz hat man nun gefunden, daß die Wellenlängen des sichtbaren Lichtes im leeren Raume 0,00039 bis 0,00069 mm betragen, und daraus für die Zahl der Schwingungen in der Secunde 435 bis 770 Billionen gefunden. Physikalisch ist es möglich die Existenz von Aetherwellen nachzuweisen, die außerhalb dieser Grenzen liegen, aber nicht oder kaum sichtbar sind.

Die Erschütterungen, welche ein leuchtender Punkt in einem einfach brechenden Mittel dem umgebenden Äther mittheilt, pflanzen sich von ihm aus gleichmäßig und mit gleicher Geschwindigkeit nach allen Richtungen fort. Dadurch entsteht eine kugelförmige Ausbreitung der Welle, wobei die Excursionen der schwingenden Äthertheilchen in dem Verhältnisse abnehmen, wie der Radius der Welle wächst. Die Intensität des Lichts aber, welche dem Quadrate der Excursionen proportional zu 33 setzen ist, verhält sich demnach in verschiedenen Entfernungen umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung vom leuchtenden Punkte. Bei einer solchen räumlichen Ausbreitung der Lichtbewegung nennt man eine Fläche, in der Äthertheilchen liegen, die alle in derselben Phase der Schwingung begriffen sind, eine Wellenfläche.

Ich habe noch den Begriff des Lichtstrahls zu erörtern. Seine mathematische Definition ist die, daß er eine auf den Wellenflächen senkrechte Linie sei: haben wir also mit kugelig sich verbreitenden Wellen zu thun, so ist er ein Radius der concentrischen Kugelflächen, und behält seine Richtung so lange bei, als die Lichtbewegung in demselben durchsichtigen Medium ungestört fortschreitet. Wenn wir nun die Bewegung der längs eines Strahls gelegenen Äthertheilchen betrachten, so ist dieselbe streng genommen allerdings nicht unabhängig von der Bewegung der Theilchen benachbarter Strahlen. Indessen haben Störungen in diesen benachbarten Bewegungen durch dunkle Körper u. s. w. unter den gewöhnlich stattfindenden Bedingungen, mit denen wir es auch namentlich im Auge allein zu thun haben, keinen beträchtlichen Einfluß auf die Bewegungen der Theile des ersten Strahls. Wir können also in solchen Fällen die Bewegung der Äthertheilchen innerhalb eines Strahls annähernd als ein abgeschlossenes mechanisches Ganze ansehen, welches unabhängig von den Bewegungen der benachbarten Strahlen von Statten geht. Dadurch wird die theoretische Untersuchung der Lichtbewegungen außerordentlich vereinfacht und erleichtert. So sind wir denn auch im täglichen Leben gewöhnt vorauszusetzen, daß jeder Lichtstrahl geradlinig fortschreite, ungehindert durch das, was seitlich von ihm geschieht; und in der That sind die Abweichungen von dieser Regel in den gewöhnlich vorkommenden Fällen ganz unmerklich. Diese Auflösung der kugelförmigen Ausbreitung der Lichtwellen in linear sich fortpflanzende Strahlen ist aber namentlich dann nicht erlaubt, wenn das Licht durch so kleine Öffnungen hindurch geht, daß die Wellenlängen des Lichts nicht mehr verschwindend klein gegen deren Dimensionen sind. Dann breiten sich sehr merkbare Quantitäten des Lichts seitlich aus. Überhaupt sind



Ablenkungen kleiner Theile des Lichts von dem geraden Wege (Diffraction) überall da zu bemerken, wo Licht an dem Rande undurchsichtiger Körper vorbeigeht. In solchen Fällen muß man auf die Bewegung der ganzen Lichtwellen zurückgehen, um die Phänomene zu erklären. Für die Physik des Auges können wir dagegen die Bewegung des Lichts unbedenklich als geradlinig betrachten, so lange es in einem homogenen Medium sich fortpflanzt.

Licht und Schall unterscheiden sich in dieser Beziehung sehr auffallend, wenn auch eigentlich nur relativ, von einander. Die Dimensionen der uns umgebenden Körper sind meist so groß, daß die Lichtwellenlängen dagegen als verschwindend klein zu betrachten sind; deshalb bewegt sich die bei weitem größte Menge des Lichts nur geradlinig fort, und es erfordert die Herstellung besonderer Apparate, um die seitliche Ausbreitung kleinerer Theile desselben wahrzunehmen. Die Schallwellen sind dagegen mehrere Zoll oder Fuß lang, und zeigen deshalb, wenn sie zwischen festen Körpern hindurchgehen, meist eine sehr bedeutende Seitenausbreitung. Wir wissen deshalb aus den alltäglichen Wahrnehmungen, daß wir nur in gerader Linie sehen, aber um Ecken herum hören können. Eben deshalb dürfen wir aber auch die Schallbewegung nicht in Schallstrahlen auflösen wollen, wir würden uns dadurch zu weit von den wirklichen Verhältnissen entfernen, und dasselbe ist der Grund, daß die Lehre von der Verbreitung des Schalls bis jetzt noch so wenig ausgebildet werden konnte, im Vergleich zu der des Lichts. Demselben Umstande verdankt unser Auge die Möglichkeit, aus der Richtung der einfallenden Lichtstrahlen sehr genau auf den Ort des leuchtenden Körpers schließen zu können, was beim Schall nur höchst unvollkommen möglich ist. Andererseits wird auch das Auge durch jeden in den Weg tretenden dunklen Körper verhindert, zu sehen, was hinter ihm vorgeht, während das Ohr sehr wohl Töne vernehmen kann, die hinter ihm erregt werden. So hängen mit der seitlichen Ausbreitung der Wellenzüge eigenthümliche Vortheile und Nachtheile beider Sinne zusammen.

Wenn Licht auf die Grenzfläche zweier verschiedenartiger durchsichtiger Mittel 34 fällt, wird in der Regel ein Theil zurückgeworfen (reflectirt), und bleibt in dem Mittel, in welchem er war; ein anderer Theil geht in das andere Medium über, wird dabei aber in der Regel von seiner bisherigen Richtung abgelenkt, d. h. gebrochen (refrangirt). Ist die Trennungsfläche glatt (polirt), sind beide Mittel einfach brechend, so wird ein auffallender Lichtstrahl nur nach einer Richtung hin zurückgeworfen (spiegelnde Reflexion), und nur nach einer Richtung hin gebrochen. Ist die Trennungsfläche rau, so wird das Licht, auch wenn es nur aus einer Richtung herkommt, nach vielen oder allen Richtungen zurückgeworfen und gebrochen, es wird zerstreut (diffuse Reflexion und Refraction).

Während das Licht in einem körperlichen Mittel sich fortbewegt, kann es entweder ungeschwächt bleiben, so weit es auch gehen mag; dann nennen wir das Mittel durchsichtig. Absolut durchsichtige Mittel giebt es vielleicht nicht außer dem leeren Raume. Oder es kann das Licht allmählich geschwächt werden, und zwar auf zweierlei Weise. Entweder nämlich wird es von kleinen fremden Körpern, Sprüngen, Stellen mit geändertem Gefüge u. s. w. diffus zurückgeworfen und gebrochen (falsche innere Dispersion), dabei erscheint das Mittel trübe, und in seinem Inneren selbst erleuchtet. Oder das Licht verschwindet, ohne von seinem Wege abgelenkt zu werden (Absorption). Da die Absorption meistentheils die Strahlen von verschiedener Schwingungsdauer verschieden schnell verschwinden macht, so wird weißes Licht, wenn es durch absorbirende Mittel geht, meistens

farbig, und das Mittel selbst erscheint gefärbt. Farblose durchsichtige Mittel sind solche, welche alle leuchtenden Strahlen ungeschwächt durchgehen lassen. Dieselben können dabei aber nichtleuchtende Strahlen absorbiren, z. B. Wärmestrahlen oder die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichts, sich gegen solche also noch wie gefärbte Mittel gegen die leuchtenden Strahlen verhalten.

Bei der Absorption der Lichtstrahlen entstehen oft chemische Wirkungen; zuweilen wieder Licht, und wahrscheinlich immer Wärme. Wenn wieder Licht entsteht, so sendet jeder Theil des beleuchteten Mittels Licht nach allen Seiten aus, welches sich aber in der Farbe und Zusammensetzung von dem absorbirten Lichte unterscheidet; die Substanz wird selbstleuchtend. Man nennt dieses Selbstleuchten Phosphorescenz, wenn es länger dauert als die Bestrahlung, dagegen Fluorescenz oder wahre innere Dispersion, wenn es nur so lange dauert als die Bestrahlung. Bei der Fluorescenz ist das von der Substanz entwickelte Licht meist von größerer Schwingungsdauer als das einstrahlende, seine Farbe und Zusammensetzung meist unabhängig von der des letzteren, es findet also eine Verlängerung der Schwingungsdauer (Verringerung der Brechbarkeit) statt, und es wird dadurch möglich, das wegen seiner zu geringen Schwingungsdauer nicht sichtbare oder kaum sichtbare Licht dem Auge sichtbar zu machen, indem man es auf eine fluorescirende Substanz (saures schwefelsäures Chinin, Uranglas, Aufguß von Rofskastanienrinde, Bernstein u. s. w.) fallen läßt, wobei es durch Fluorescenz Licht größerer Schwingungsdauer erzeugt.

---

# Erster Abschnitt.

## Die Dioptrik des Auges.

### § 9. Gesetze der Brechung in Systemen kugelliger Flächen.

Der Gang der Lichtstrahlen im menschlichen Auge wird hauptsächlich <sup>35</sup> durch Brechung verändert. Es ist aber nicht bloß eine einzelne brechende Fläche vorhanden, sondern eine Reihe von solchen. Ich werde also die allgemeinen Gesetze der Lichtbrechung in einfach brechenden Mitteln und namentlich auch der Brechung in einer Reihe von gekrümmten Flächen, welche die Grundlage des vorliegenden Abschnitts bilden, vorausschicken.

An einer einzelnen brechenden Fläche ist die Lage des zurückgeworfenen und gebrochenen Strahls in folgender Weise bestimmt. In *Fig. 32* sei  $ab$  die Grenzfläche beider Medien, welche man die brechende Fläche nennt;  $fc$  sei einer der darauf fallenden Lichtstrahlen,  $de$  die im Punkte  $c$  auf  $ab$  senkrecht stehende Linie, welche man das Einfallslotth nennt,  $ch$  der zurückgeworfene und  $cg$  der gebrochene Strahl. Die Ebene, welche durch das Einfallslotth und den einfallenden Strahl zu legen ist, nennt man Einfallsebene, den Winkel zwischen dem einfallenden Strahle und dem Einfallslothe den Einfallswinkel (in der Figur ist es der Winkel  $dce$ , mit  $\alpha$  bezeichnet), den Winkel zwischen




Fig. 32.

dem Einfallslothe und dem zurückgeworfenen Strahle den Reflexionswinkel <sup>36</sup> (in der Figur  $hce$ ) und denjenigen zwischen dem Einfallslothe und dem gebrochenen Strahle ( $gce$  oder  $\beta$ ) den Brechungswinkel. Bei einfach brechenden Medien ist dann die Lage des zurückgeworfenen und gebrochenen Strahls dadurch gegeben, daß erstens beide in der Einfallsebene liegen, und daß zweitens der Reflexionswinkel gleich dem Einfallswinkel ist, der Brechungswinkel aber von dem Einfallswinkel in der Weise abhängt, daß ihre Sinus

sich verhalten wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichts in den betreffenden beiden Medien. Das Verhältniß der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts im Vacuum zu der in einem gegebenen Mittel nennt man das Brechungsverhältniß, Brechungsvermögen oder den Brechungscoefficienten dieses Mittels. Ist also  $c$  die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Vacuum,  $c_1$  in dem ersten,  $c_2$  in dem zweiten Mittel,  $n_1$  das Brechungsverhältniß des ersten,  $n_2$  das des zweiten Mittels, so ist

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{c}{c_1} \\ n_2 &= \frac{c}{c_2} \\ \frac{\sin \alpha}{c_1} &= \frac{\sin \beta}{c_2} \text{ oder} \\ n_1 \cdot \sin \alpha &= n_2 \cdot \sin \beta. \end{aligned}$$

In der letzteren Form pflegt man gewöhnlich das Brechungsgesetz auszusprechen. Für das Vacuum ist das Brechungsverhältniß nach der gegebenen Definition = 1, für die Luft bei gewöhnlichem Drucke so wenig davon unterschieden (nämlich 1,00029 bei 0° und 760 mm Druck), daß man in den meisten Fällen den Unterschied vernachlässigen kann. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der verschiedenen einfachen farbigen Strahlen sind im Vacuum nicht, in den Gasarten sehr wenig, in den durchsichtigen tropfbaren und festen Körpern mehr von einander verschieden. In den letzteren pflanzen sich die Strahlen von kleinerer Schwingungsdauer (die blauen und violetten) der Regel nach langsamer fort als die von längerer Schwingungsdauer (gelbe und rothe), es sind also auch die Brechungsverhältnisse für die ersteren größer als für die zweiten, und man bezeichnet deshalb jene (die violetten) als die brechbareren Strahlen, letztere (die rothen) als die weniger brechbaren. Wegen dieser Verschiedenheit der Brechbarkeit schlagen denn auch die verschiedenen farbigen Theile des weißen Lichts nach einer Brechung in tropfbaren oder festen Körpern im Allgemeinen verschiedene Wege ein, und es giebt dies ein Mittel ab, sie zu trennen. In der *Fig. 32* ist vorausgesetzt, daß oberhalb der brechenden Fläche sich ein dünneres, unterhalb derselben ein dichteres Medium befinde. Kommt das Licht aus dem ersteren von  $f$  her, so wird der gebrochene Strahl  $cg$  dem Einfallslothe  $cc$  genähert werden. Für die violetten Strahlen ist die Ablenkung stärker als für die rothen. Wenn also die violetten etwa den Weg  $cg$  einschlagen, geht das rothe Licht des Strahls  $fc$  in der Richtung  $cg_1$  fort, und trennt sich somit von den brechbareren Farben.

Im Auge haben wir es mit der Brechung des Lichts an kugeligen oder  
 37 nahehin kugeligen Flächen zu thun. Die Gesetze der Brechung vereinfachen sich für eine jede solche Fläche außerordentlich, wenn das Licht nur unter sehr kleinen Einfallswinkeln, d. h. nahe senkrecht auf sie fällt. Sie vereinfachen sich auch für ein System solcher Flächen, wenn die Mittelpunkte

der Kugelflächen alle in einer geraden Linie, der Axe des Systems, liegen. Systeme von kugeligen Flächen, in denen diese letzte Bedingung erfüllt ist, nennt man *centrirt*. Licht, welches ursprünglich von einem Punkte ausgegangen ist, oder allgemeiner, Licht, dessen Strahlen hinreichend verlängert alle durch einen Punkt gehen, d. h. *homocentrisches* Licht, wird, nachdem es durch ein solches System gegangen ist, und alle brechenden Flächen nur unter kleinen Einfallswinkeln getroffen hat, entweder wirklich sich in einen Punkt wieder vereinigen, oder doch so fortgehen, als käme es alles von einem leuchtenden Punkte her, also wieder *homocentrisch* sein. Den *Convergenzpunkt* der Lichtstrahlen nennt man in beiden Fällen das *optische Bild* des ursprünglich leuchtenden Punktes, oder da Lichtstrahlen, welche von dem Orte des Bildes rückwärts gingen, an der Stelle des ursprünglich leuchtenden Punktes wieder vereinigt werden würden, nennt man den Ort des leuchtenden Punktes und den seines Bildes auch *conjugirte Vereinigungspunkte* der Strahlen. Man nennt ferner das optische Bild *reell*, wenn die Lichtstrahlen, welche von dem leuchtenden Punkte ausgegangen sind, in ihm wirklich zur Vereinigung kommen. Dies kann nur geschehen, wenn das Bild hinter den brechenden Flächen liegt. Man nennt es *virtuell*, wenn der Vereinigungspunkt der Lichtstrahlen in ihren rückwärts gezogenen Verlängerungen vor der letzten brechenden Fläche liegt. Im letzteren Falle schneiden sich also nicht die Lichtstrahlen selbst, sondern nur ihre Verlängerungen.

Convexe Glaslinsen (Brenngläser oder Sammellinsen) geben von entfernten Gegenständen reelle Bilder, wie *Fig. 33* zeigt; *cd* ist die Linse, *a* der leuchtende Punkt, die einfallenden Lichtstrahlen *ac* und *ad* werden in die Richtungen *cf* und *de* gebrochen, vereinigen sich wirklich in dem Punkte *b*, dem Punkte des reellen Bildes, und gehen nach der Schneidung wieder divergirend auseinander, gerade als wäre *b* ein ursprünglich leuchtender Punkt.




Fig. 33.

Concave Glaslinsen (Zerstreuungsgläser) geben virtuelle Bilder wie in *Fig. 34*, wo die Bezeichnungen dieselben sind wie in *Fig. 33*. Hier schneiden sich die Lichtstrahlen nicht wirklich, wohl aber ihre Verlängerungen in *b*, und gehen hinter der Linse weiter, als kämen sie von *b*, so dass ein hinter der Linse zwischen *f* und *e* stehendes Auge glauben würde, den leuchtenden Punkt in *b* zu sehen.




Fig. 34.

- 38 Wenn mehrere leuchtende Punkte in einer gegen die Axe des brechenden Systems senkrechten Fläche liegen, und der Axe nahe genug sind, daß ihre Strahlen auf sämtliche brechende Kugelflächen unter sehr kleinen Einfallswinkeln treffen, so liegen ihre reellen oder virtuellen Bilder auch alle in einer auf die optische Axe senkrechten Ebene, und ihre Vertheilung in dieser Ebene ist geometrisch ähnlich der Vertheilung der leuchtenden Punkte, und gehören die leuchtenden Punkte einem Objecte an, so ist das optische Bild dieses Objects ihm selbst geometrisch ähnlich.

Ein Beispiel reeller Bilder von Objecten, welches zugleich den Verhältnissen des Auges sehr nahe entspricht, giebt unter den physikalischen




Fig. 35.

Instrumenten die *Camera obscura*. Ein innen geschwärzter Kasten *A* enthält in seiner vorderen Wand eine verschiebbare Röhre, in welche eine oder mehrere Glaslinsen *l* eingesetzt sind. Die Rückseite des Kastens *g* besteht aus einer matten Glastafel. Wenn man die Gläser *l* gegen entfernte erleuchtete Objecte wendet, und die matte Tafel *g* beschattet, so sieht man auf ihr ein umgekehrtes, natürlich gefärbtes Bild der Objecte entworfen, welches auch bei einer richtigen

Stellung der Linsen *l* sehr scharf gezeichnet erscheint. Die Linsen müssen zu dem Ende so gewählt und gestellt sein, daß die Strahlen, welche von einem jeden einzelnen Punkte des abgebildeten Gegenstandes ausgegangen sind, sich in einem Punkte der mattgeschliffenen Glasfläche wieder vereinigen. Dann empfängt dieser Punkt der Glasfläche alles Licht, welches von dem entsprechenden Punkte des abgebildeten Gegenstandes her in das Instrument gefallen ist, und wird von ihm in derselben Farbe und entsprechender Helligkeit erleuchtet, wie sie dem Punkte des Objects zukommen. Dagegen fällt auf diese Stelle der Glastafel kein Licht, welches von irgend einem anderen Punkte des Gegenstandes ausgegangen wäre, weil solches Licht eben in anderen Punkten der Tafel sich vereinigt.

Bei diesen Beobachtungen bemerkt man zunächst, daß die Bilder ungleich von dem Instrumente entfernter Gegenstände nicht gleichzeitig deutlich auf der matten Tafel entworfen werden, daß man vielmehr die Röhre mit den Linsen etwas herausziehen muß, um nähere Gegenstände abzubilden, für entferntere dagegen mehr hineinschieben. Der Grund davon ist der, daß die Bilder ungleich entfernter Punkte auch selbst verschiedene Entfernung von den Linsen haben, also nicht gleichzeitig genau in der Ebene der matten Glastafel liegen können.

Man bemerkt ferner, wenn das Instrument nur eine einfache Linse enthält, und diese einen großen Durchmesser im Verhältniß zur Länge des Kastens hat, daß die Ränder heller Flächen in dem Bilde farbige, meist blaue oder gelbrothe Säume zeigen. Wegen der verschiedenen Brechbarkeit des verschiedenfarbigen Lichts liegen die Vereinigungspunkte verschiedenfarbiger Strahlen nicht genau in derselben Entfernung hinter der Linse, und

die Bilder für die verschiedenen Farben decken sich nicht genau. Man nennt dies die *chromatische Abweichung*. Sie kann fast vollständig aufgehoben werden durch eine passende Verbindung von Linsen, die aus verschiedenem Stoffe bestehen. Dergleichen optische Instrumente, in welchen so die chromatische Abweichung beseitigt ist, nennt man *achromatisch*.

Aber auch bei der Beleuchtung mit einfarbigem Lichte zeigen die Bilder der *Camera obscura* und anderer optischer Instrumente mit brechenden Kugelflächen bei grossen Öffnungen der Linsen eine gewisse Ungenauigkeit der Umrisse, welche daher entsteht, daß die durch eine kugelige Fläche gebrochenen Strahlen des abgebildeten Punktes zwar nahehin, aber doch nicht absolut genau in einen Punkt wieder vereinigt werden. Nur bei verschwindend kleinen Einfallswinkeln werden sie genau vereinigt. Diese zweite Art der Abweichung nennt man die *sphärische* oder die *Abweichung* wegen der Kugelgestalt. Instrumente, in denen sie durch passende Zusammenstellung der brechenden Flächen möglichst verringert ist, nennt man *aplanatisch*. Vollständige Aplanasie ist durch Kugelflächen im allgemeinen nicht zu erreichen, sondern dazu würde man andere gekrümmte Flächen und zwar Rotationsflächen des zweiten oder vierten Grades anwenden müssen, welche aber an optischen Instrumenten bisher noch nicht praktisch ausgeführt werden können.

Die Lage und GröÙe der optischen Bilder, welche centrirte Systeme von kugeligen brechenden Flächen entwerfen, sowie auch der Gang eines jeden durch sie hindurchgegangenen Lichtstrahls, der sämtliche brechende Flächen unter sehr kleinen Einfallswinkeln passirt hat, ist nach verhältnißmäÙig einfachen Regeln zu bestimmen, wenn man gewisse Punkte, die optischen Cardinalpunkte des Systems kennt. Es giebt drei Paare von solchen Punkten, nämlich die beiden Brennpunkte, die beiden Hauptpunkte und die beiden Knotenpunkte.

Man nenne die Seite des Systems, von der das Licht herkommt, die erste, die, nach der es hingeht, die zweite Seite, das Brechungsverhältniß des ersten Mittels sei  $n_1$ , das des letzten  $n_2$ .

Der erste Brennpunkt ist dadurch bestimmt, daß jeder Strahl, der vor der Brechung durch ihn geht, nach der Brechung parallel mit der Axe wird.

Der zweite Brennpunkt ist dadurch bestimmt, daß durch ihn jeder Strahl geht, der vor der Brechung parallel der Axe ist.

Der zweite Hauptpunkt ist das Bild des ersten, d. h. Strahlen, welche im ersten Mittel nach dem ersten Hauptpunkt hin gerichtet sind, gehen nach der letzten Brechung durch den zweiten. Ebenen, senkrecht zur Axe durch die Hauptpunkte gelegt, heißen Hauptebenen. Die zweite Hauptebene ist das optische Bild der ersten, und zwar sind es die einzigen zusammengehörigen Bilder, welche gleich groß und gleich gerichtet sind. Durch diese Bedingung ist die Lage der Hauptpunkte bestimmt.

Der zweite Knotenpunkt ist das Bild des ersten. Ein Strahl, der im ersten Medium nach dem ersten Knotenpunkte gerichtet ist, geht nach

der Brechung durch den zweiten Knotenpunkt, und die Richtungen des Strahls vor und nach der Brechung sind einander parallel.

Die Entfernung des ersten Hauptpunkts vom ersten Brennpunkte ist die erste Hauptbrennweite. Sie wird positiv gerechnet, wenn der erste Hauptpunkt im Sinne der Fortbewegung des Lichts hinter dem ersten Brennpunkte liegt. Ist also in *Fig. 36*  $AB$  die Axe, und  $A$  die Richtung,




Fig. 36.

von welcher das Licht herkommt,  $f$ , der erste,  $f''$ , der zweite Brennpunkt,  $h$ , der erste,  $h''$ , der zweite Hauptpunkt,  $K$ , der erste,  $K''$ , der zweite Knotenpunkt, so ist  $f, h$ , die positive erste Hauptbrennweite. Dagegen  $f'', h''$ , als die Entfernung des zweiten Brennpunkts vom zweiten Hauptpunkte, ist die zweite Hauptbrennweite, positiv gerechnet, wenn, wie in der Figur, der Brennpunkt hinter dem Hauptpunkte liegt.

Die Entfernung des ersten Knotenpunkts vom ersten Brennpunkte ist gleich der zweiten Hauptbrennweite, die des zweiten Knotenpunkts vom zweiten Brennpunkte gleich der ersten Hauptbrennweite. Also:

$$\begin{aligned} f, K, \\ f, h, = f'', K'', \end{aligned} \quad \text{a).}$$

Daraus folgt, daß der Abstand der gleichnamigen Haupt- und Knotenpunkte von einander gleich dem Unterschiede der beiden Brennweiten sei:

$$K, h, = K'', h'', = f'', h'' - f, h, \quad \text{b)}$$

und daß außerdem der Abstand der beiden Hauptpunkte von einander gleich sei dem Abstände der beiden Knotenpunkte von einander:

$$h, h'' = K, K'', \quad \text{c)}$$

Endlich verhalten sich die beiden Hauptbrennweiten zu einander wie die Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mittels:

$$\frac{f, h,}{n_1} = \frac{f'', h''}{n_2} \quad \text{d).}$$

Ist also das letzte Mittel dem ersten gleichartig und  $n_1 = n_2$ , wie es bei den meisten künstlichen optischen Instrumenten, nicht aber beim Auge der Fall ist, so sind die beiden Hauptbrennweiten gleich, und es fallen die gleichnamigen Hauptpunkte und Knotenpunkte zusammen, nach Gleichung  $\beta$ ).

Die ersten Brenn-, Haupt- und Knotenpunkte beziehen sich nach den gegebenen Definitionen stets auf den Gang der Strahlen im ersten Medium, die zweiten auf den Gang im letzten Medium.




Legt man senkrecht zur Axe Ebenen durch die beiden Brennpunkte, so heißen diese Brennebenen. Lichtstrahlen, welche von einem Punkte der ersten Brennebene ausgegangen sind, sind nach der Brechung unter einander parallel, und da nach der Definition der Knotenpunkte der vom leuchtenden Punkte nach dem ersten Knotenpunkte gerichtete Strahl nach der Brechung seiner ursprünglichen Richtung parallel sein soll, so müssen alle Strahlen, die von einem leuchtenden Punkte in der ersten Brennebene ausgegangen sind, jenem Strahle nach der Brechung parallel sein.

Strahlen, welche im ersten Mittel unter einander parallel sind, vereinigen sich in einem Punkte der zweiten Brennebene, und da derjenige von den parallelen Strahlen, welcher durch den ersten Knotenpunkt geht, nach der Brechung vom zweiten Knotenpunkte aus seiner früheren Richtung parallel weiter geht, so muß der Vereinigungspunkt der parallelen Strahlen da liegen, wo dieser letztere Strahl die zweite Brennebene schneidet.

Diese Regeln genügen, um in jedem Falle, wenn der Weg eines Strahls im ersten Medium gegeben ist, seinen Weg nach der letzten Brechung zu finden, und wenn ein leuchtender Punkt im ersten Medium gegeben ist, den Ort seines Bildes nach der letzten Brechung zu finden.

Es sei bekannt der Weg eines Strahls im ersten Medium; man soll seinen Weg im letzten Medium suchen.

In *Fig. 37*, deren hier nicht angegebene Bezeichnungen mit denjenigen von *Fig. 36* übereinstimmen, sei *a* der Punkt, wo der Strahl die erste Brennebene schneidet, *b* der Punkt, wo er die erste Hauptebene schneidet, wobei im allgemeinen die beiden Punkte *a* und *b* nicht in einer Ebene mit der Axe des Systems *AB* liegen



*Fig. 37.*

werden. Das Bild des Punktes *b* liegt in der zweiten Hauptebene, da die eine Hauptebene das Bild der anderen ist; und da ferner in diesem Falle das eine Bild dem anderen gleich und gleich gerichtet sein soll, so liegt das Bild des Punktes *b* der ersten Hauptebene in *c*, dem Fußpunkte des von *b* auf die zweite Hauptebene gefällten Lothes *bc*. Jeder Lichtstrahl, der von *b* ausgeht, oder durch *b* hindurchgeht, muß also nach der Brechung durch *c* gehen, als dem Bilde von *b*. So auch die Fortsetzung des Strahls *ab*.

Zweitens geht der Strahl *ab* durch den Punkt *a* der ersten Brennebene. Jeder Strahl, welcher von einem Punkte der ersten Brennebene ausgeht, ist nach den oben hingestellten Regeln nach der Brechung parallel dem Strahle, welcher von jenem Punkte *a* nach dem ersten Knotenpunkte geht. Also muß der Strahl *ab* nach der Brechung durch *c* gehen und parallel *aK*, sein. Man ziehe *cd* parallel *aK*, so ist *cd* der gebrochene Strahl.

Nach dem, was ich vorher über die Eigenschaft der zweiten Brennebene gesagt habe, können wir auch so verfahren. Man fälle das Loth  $bc$  auf die zweite Hauptebene, ziehe  $K,,e$  parallel  $ab$ , welches in  $e$  die zweite Brennebene schneidet, so ist  $ce$  der gebrochene Strahl. Dafs dieser mit  $cd$  zusammenfällt, läfst sich leicht zeigen.

42 Es sei  $a$  Fig. 38 ein leuchtender Punkt; es soll sein Bild gefunden werden.

Man braucht nur zwei Strahlen von  $a$  aus nach der ersten Hauptebene zu ziehen, und deren Weg nach der Brechung zu construiren. Wo sie sich schneiden,




Fig. 38.

liegt das Bild von  $a$ . Wenn  $a$  außerhalb der Axe liegt, ist es am bequemsten, den mit der Axe parallelen Strahl  $ac$  und den nach dem ersten Knotenpunkte gehenden  $aK,$  zu benutzen. Wenn  $e$  der Punkt ist, wo der erstere Strahl die zweite

Hauptebene schneidet, so ziehe man  $cf,,$  und verlängere es rückwärts oder vorwärts hinreichend, bis es die durch  $K,,$  mit  $aK,$  gelegte Parallele in  $e$  schneidet. Der Ort des Bildes ist  $e$ .

Dafs der Strahl  $ac$  nach der Brechung längs  $ce$  und  $aK,$  längs  $K,,e$  geht, ergibt sich leicht aus der vorigen Aufgabe und den obigen Definitionen.

Liegt der Punkt  $a$  in der Axe, so geht einer seiner Strahlen in der Axe selbst ungebogen fort. Man braucht dann nur irgend einen anderen Strahl zu construiren, der außerhalb der Axe verläuft. Wo letzterer nach der Brechung die Axe wieder schneidet, ist der Ort des Bildes.

Nachdem ich so die Resultate der mathematischen Untersuchung für diejenigen meiner Leser vorausgeschickt habe, denen es nur auf die Kenntniß der Resultate ankommt, lasse ich die vollständige mathematische Entwicklung derselben hier folgen.

#### Brechung an einer Kugelfläche.

Es sei  $a$  der Mittelpunkt der Kugelfläche  $cb$ , und  $p$  ein außerhalb der Kugel liegender leuchtender Punkt. Ein von  $p$  ausgehender Lichtstrahl, welcher in der geraden Linie  $pa$  auf den Mittelpunkt der Kugel zugeht, trifft die Kugelfläche normal, und geht deshalb ungebogen weiter in der Verlängerung von  $ap$  nach  $q$  hin.




Fig. 39.

Ein anderer Lichtstrahl  $pc$  treffe die Kugelfläche in  $c$  und werde hier gebrochen. Unsere nächste Aufgabe ist, seinen Weg nach der Brechung zu bestimmen.

Nach dem oben angeführten Brechungsgesetze muß derselbe zunächst in der Einfallsebene bleiben, d. h. in der durch den einfallenden Strahl und das Einfallslot





Nennen wir die Werthe von  $f_2$  und  $g_2$ , welche einer unendlichen Entfernung des leuchtenden Punkts entsprechen, beziehlich  $F_2$  und  $G_2$ , so erhalten wir, da  $f_1 = \infty$  und  $g_1 = \infty$ ,

$$\left. \begin{aligned} F_2 &= \frac{n_2 \cdot r}{n_2 - n_1} \\ G_2 &= \frac{n_1 \cdot r}{n_2 - n_1} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 3a).$$

$F_2$  ist nach der oben gegebenen Definition die zweite Hauptbrennweite.

Setzen wir  $f_2$  und  $g_2$  unendlich groß, und bezeichnen für diesen Fall  $f_1$  und  $g_1$  mit  $F_1$  und  $G_1$ , so ist

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \frac{n_1 \cdot r}{n_2 - n_1} = G_2, \\ G_1 &= \frac{n_2 \cdot r}{n_2 - n_1} = F_2. \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 3b)$$

$F_1$  ist die erste Hauptbrennweite.

Jetzt können wir den Gleichungen 3) die einfache Form geben

$$\left. \begin{aligned} \frac{F_1}{f_1} + \frac{F_2}{f_2} &= 1, \\ \frac{G_1}{g_1} + \frac{G_2}{g_2} &= 1. \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 3c).$$

Die erste dieser Gleichungen giebt, nach  $f_1$  und nach  $f_2$  aufgelöst, folgende Formeln zur Berechnung dieser Größen:

$$\left. \begin{aligned} f_1 &= \frac{F_1 \cdot f_2}{f_2 - F_2} \\ f_2 &= \frac{F_2 \cdot f_1}{f_1 - F_1} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 3d).$$

Findet man negative Werthe dieser Größen, so bedeutet es, daß sie auf der entgegengesetzten Seite der brechenden Fläche liegen, als in *Fig. 39* angenommen ist.

**Bemerkungen.** 1) Wenn das Licht nicht von  $p$  im ersten Medium, sondern von  $q$  im zweiten ausgeht, wird für den Strahl  $c q$  *Fig. 39*, der vorher der gebrochene Strahl, jetzt der einfallende ist,  $cp$  der zugehörige gebrochene sein, welcher vorher der einfallende war. Sind also die nahe senkrecht von  $p$  auf die brechenden Flächen fallenden Strahlen in  $q$  vereinigt, so werden die von  $q$  nahe senkrecht auffallenden in  $p$  vereinigt werden. Daraus ergeben sich nun gleich die Formeln für den Fall, daß die Lichtstrahlen auf die concave Seite der Kugel- fläche fallen. Man braucht nur das erste Medium jetzt das zweite zu nennen und umgekehrt, und dem entsprechend alle Indices der Buchstaben zu vertauschen. Die Grundgleichungen 3) werden alsdann

$$\begin{aligned} \frac{n_2}{f_2} + \frac{n_1}{f_1} &= \frac{n_1 - n_2}{r} \\ \frac{n_1}{g_2} + \frac{n_2}{g_1} &= \frac{n_1 - n_2}{r} \end{aligned}$$

Man braucht also für eine concave brechende Fläche nur den Krümmungsradius  $r$  negativ zu setzen, so gilt auch für sie die Formel 3), und natürlich gelten eben so auch die daraus abgeleiteten 3 a), 3 b), 3 c) und 3 d).

2) Wenn  $q$  das Bild von  $p$  ist, ist auch  $p$  das Bild von  $q$ . Um diese gemeinsame Beziehung auszudrücken, nennt man sie conjugirte Vereinigungspunkte, wobei man es zweifelhaft läßt, von welchem beider Punkte das Licht ausgeht. Ebenso ist es für die Brechungsgesetze einerlei, ob der Licht aussendende Punkt ein materieller, Licht erzeugender oder auffallendes Licht zerstreuer Punkt sei, oder nur der Vereinigungspunkt von gebrochenen Strahlen. Daher kann der leuchtende Punkt auch ein virtueller Vereinigungspunkt solcher Strahlen sein, und in der Verlängerung der Strahlen hinter der brechenden Fläche liegen.

3) Wenn  $r$  unendlich groß, d. h. die brechende Fläche eben wird, so werden nach 3 a) auch die Brennweiten unendlich groß, und die erste der Gleichungen 3) verwandelt sich in

$$\frac{n_1}{f_1} + \frac{n_2}{f_2} = 0$$

oder

$$f_2 = - \frac{n_2}{n_1} \cdot f_1 \dots \dots \dots 3e).$$

Das Bild liegt also auf derselben Seite von der brechenden Fläche, wie der Gegenstand, aber in einer anderen Entfernung.

„

#### Die Änderung der Divergenz der Strahlen.

Für die Änderung der Divergenz eines engen von einer kugeligen Fläche gebrochenen oder auch gespiegelten Strahlenbündels bei nahezu senkrechter Incidenz läßt sich ein wichtiges allgemeines Gesetz angeben, welches eigentlich am vollständigsten und zugleich am anschaulichsten das Wesen dieses Vorgangs bezeichnet. Da es bei der Spiegelung am einfachsten hervortritt, und wir im Folgenden auf die Reflexion an gekrümmten Flächen vielfach Rücksicht nehmen müssen, so will ich das Divergenzgesetz zunächst für Kugelspiegel erörtern.

Es sei  $a a_1$  Fig. 41 eine convexe spiegelnde Fläche und  $o$  ihr Mittelpunkt.




Fig. 41.

Der leuchtende Punkt  $b$  werde durch die Gerade  $bo$  mit dem Mittelpunkte der Kugel verbunden. Ein zweiter Strahl  $ba$  treffe bei  $a$  die spiegelnde Fläche. Das Einfallslot ist in diesem Falle der verlängerte Radius  $oa$ ; Einfallswinkel und Reflexionswinkel, welche beide einander gleich sind, sind beide mit  $\alpha$  bezeichnet. Da der gespiegelte Strahl in derselben Ebene, wie  $ba$  und  $oa$ , d. h. in der Ebene der Zeichnung liegen muß, so wird er passend verlängert die Linie  $bo$  schneiden müssen; der Schnittpunkt sei  $c$ . Alsdann ist der Einfallswinkel  $\alpha$

Außenwinkel zu dem Dreieck  $abo$ , folglich gleich der Summe der beiden inneren gegenüberliegenden Winkel:

$$\alpha = \beta + \omega.$$



Wenn diese Winkel sehr klein sind, können wir ihre Cosinus gleich 1, ihre Sinus gleich dem Bogen setzen, und erhalten

$$n_1 \cdot p - n_2 \cdot q = (n_2 - n_1) \cdot \omega. \quad 4a)$$

Das Product der Divergenzwinkel mit dem Brechungsverhältniß des Medium, in welchem der Strahl verläuft, können wir die optische Divergenz der Strahlen nennen. Diese wird bei der Brechung verändert um eine GröÙe  $(n_2 - n_1) \cdot \omega$ , welche unabhängig von der Entfernung des leuchtenden Punktes ist.

Die optische Divergenz der Strahlen wird vermindert, wenn das stärker brechende Medium an der concaven Seite der Kugelfläche liegt; sie wird vergrößert im entgegengesetzten Falle. Erstere Flächen sind sammelnde, collective, letztere zerstreue, dispersive. Man erkennt das leicht, wenn man die Strahlen der Fig. 39 vorwärts und rückwärts gehen läßt, beziehlich  $n_2 < n_1$  annimmt.

Fällt man in beiden Fällen vom Einfallspunkt an der Kugelfläche ein Loth auf die Axe, welches mit  $\varrho$  bezeichnet werde, und nennt die Entfernungen seines Fußpunkts vom leuchtenden Punkte  $f_1$ , von seinem Bilde  $f_2$ , und rechnet beide GröÙen bei Linsen, wie bei Spiegeln als positiv, wenn das Licht erst den Objectpunkt passirt, dann die Kugelfläche, dann das Bild: so kann der Divergenzwinkel der einfallenden Strahlen, wenn er sehr klein ist, durch seine Tangente  $\frac{\varrho}{f_1}$  ersetzt

werden, der Convergenzwinkel der abgelenkten Strahlen durch  $\frac{\varrho}{f_2}$ , der Winkel  $\omega$

durch  $\frac{\varrho}{r}$ . Zugleich rückt bei Verkleinerung des Winkels  $\omega$  der Fußpunkt des Lothes immer näher der Kugelfläche, so daß  $f_1$  und  $f_2$  die Entfernungen vom Object und Bild von der Kugelfläche werden. Dann giebt Gleichung 4) für spiegelnde Kugelflächen unmittelbar

$$\frac{\varrho}{f_1} + \frac{\varrho}{f_2} = \frac{2\varrho}{r},$$

oder

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{2}{r};$$

und Gleichung 4a) ergibt das Gesetz der Gleichung 3)

$$\frac{n_1}{f_1} + \frac{n_2}{f_2} = \frac{n_2 - n_1}{r}. \quad 5)$$

Man kann also das Gesetz der Bildabstände unmittelbar aus dem Divergenzgesetz herleiten.

Für ebene Flächen wird  $\omega = 0$ , also die optische Divergenz der Strahlen, durch Brechung und Spiegelung nicht geändert.

Abbildung flächenhafter Objecte durch eine brechende Kugelfläche.




Fig. 42.

Wenn seitwärts von dem leuchtenden Punkte in gleicher Entfernung von der brechenden Kugelfläche und ihrem Mittelpunkte  $a$  ein zweiter leuchtender Punkt  $s$  liegt, dessen Strahlen ebenfalls nur unter kleinen



Einfallswinkeln auf die Kugelfläche fallen, so wird dieser ein Bild ebenfalls in gleicher Entfernung hinter der Kugel und ihrem Mittelpunkte haben. Sind viele leuchtende Punkte  $s$  vorhanden, die alle diesen Bedingungen entsprechen, so werden sie alle, da sie gleiche Entfernung von  $a$  haben, in einer mit der brechenden Fläche concentrischen Kugelfläche liegen. Das gleiche gilt von ihren Bildern  $t$ . Für jeden Punkt  $s$  der einen Kugelfläche findet man den Ort des Bildes  $t$  dann, indem man von  $s$  aus eine Gerade bis zum Krümmungsmittelpunkt  $a$  zieht, und diese verlängert, bis sie die Kugelfläche der Bilder in  $t$  schneidet. Dann ist  $t$  das Bild von  $s$ . Daraus geht hervor, daß ein solches Bild seinem Objecte geometrisch ähnlich ist.

Das Größenverhältniß zwischen Object und Bild ergibt sich hierbei:

$$\frac{ps}{rt} = \frac{pa}{ar} = \frac{g_1}{g_2}$$

Bezeichnen wir die Größe des Objekts  $ps = \beta_1$ , und die des Bildes mit  $\beta_2$ , weil es umgekehrt ist, so ist demnach

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{g_1}{g_2} \quad \dots \dots \dots 6)$$

Die Bedingung, daß alle Strahlen, welche von einem der leuchtenden Punkte  $s$  auf die brechende Kugelfläche fallen, dies nur unter sehr kleinen Einfallswinkeln thun dürfen, beschränkt übrigens den deutlich abzubildenden Theil des Objects  $sp$  auf einen sehr kleinen Theil der betreffenden Kugelfläche, welcher Theil sich nicht merklich von einer in  $p$  senkrecht zu  $pa$  errichteten, und daher die Kugelfläche  $ps$  tangirenden Ebene unterscheidet. Dasselbe gilt von der entsprechenden Fläche des Bildes  $rt$ . Man kann also von der Krümmung der beiden kleinen Kugelstücke absehen, und Object, wie Bild, als gelegen in zwei sehr kleinen zur Axe senkrechten ebenen Flächen betrachten.

Aus Gleichung 6) ergibt sich in Verbindung mit 2 c), 3 a), 3 b) und 3 c)

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{G_2}{G_1 - g_1} = \frac{G_2 - g_2}{G_1} \quad \dots \dots \dots 6 a)$$

oder

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{F_1}{F_1 - f_1} = \frac{F_2 - f_2}{F_2} \quad \dots \dots \dots 6 b)$$

Wenn die brechende Fläche eben ist, werden die Brennweiten unendlich groß, und die Gleichung 6 b) verwandelt sich in

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 \quad \dots \dots \dots 6 c)$$

Das Bild, welches eine ebene brechende Fläche entwirft, ist also so groß wie sein Object.

Brennpunkte, Hauptpunkte und Knotenpunkte der einfachen brechenden Fläche.

Die Brennpunkte sind diejenigen Punkte, in denen sich Strahlen vereinigen, die im ersten oder zweiten Mittel parallel der Axe verlaufen. Die Entfernungen der beiden Brennpunkte  $F_1$  und  $F_2$  von dem Scheitel der brechenden Fläche, und  $G_1$  und  $G_2$  von deren Mittelpunkte sind schon oben in den Gleichungen 3 a) und 3 b) 48 gefunden, und dadurch ist die Lage der Brennpunkte bestimmt.

Die Brennebenen sind senkrecht durch die Brennpunkte gelegene Ebenen. Da das Bild jedes Brennpunktes in unendlicher Entfernung liegt, so muß dasselbe auch für solche Punkte der Brennebenen der Fall sein, welche der Axe nahe genug sind, um regelmäßige Bilder geben zu können. Strahlen, die von einem Punkte einer Brennebene ausgehen, werden also nach der Brechung parallel sein.

Die Hauptpunkte und die durch sie senkrecht zur Axe gelegten Hauptebenen sind dadurch charakterisirt, daß Bilder in den Hauptebenen liegend gleich gerichtet und gleich groß seien. Für die Hauptebenen muß also  $\beta_1 = \beta_2$  sein. Das kann nach den Gleichungen 6 b) nur der Fall sein, wenn  $f_1 = 0$  und  $f_2 = 0$ , was laut der Gleichungen 3 d) stets gleichzeitig der Fall sein muß. Beide Hauptpunkte fallen also in unserem Falle zusammen in dem Punkt, wo die Axe die brechende Fläche schneidet, und dieser Hauptpunkt ist sein eigenes Bild.

Die Knotenpunkte sind dadurch definirt, daß jeder Strahl, der vor der Brechung durch den ersten geht, nach der Brechung durch den zweiten geht, und dabei seiner ersten Richtung parallel bleibt. Auch diese beiden fallen in einen Punkt, nämlich den Mittelpunkt der Kugel zusammen. Denn ein Strahl, der im ersten Mittel auf den Mittelpunkt der Kugel zugeht, geht ungebrochen durch die Fläche, geht also auch im zweiten Mittel durch den Mittelpunkt, und ist seiner früheren Richtung parallel.

Die Constructionen der Richtung der Strahlen, welche S. 58 und 59 aus den Definitionen der genannten Ebenen und Punkte hergeleitet sind, lassen sich also auch auf eine einzelne brechende Fläche anwenden, und die Constructionen vereinfachen sich noch dadurch, daß erstens jeder Punkt in der ersten Hauptebene sein eigenes Bild ist, und man nicht erst den zugehörigen in der zweiten Hauptebene zu suchen hat, und zweitens dadurch, daß der nach dem ersten Knotenpunkte gehende Strahl unmittelbar in seiner eigenen Verlängerung weiter geht und man nicht erst eine Parallele mit ihm durch den zweiten Knotenpunkt zu legen hat.

#### Verallgemeinerung des Gesetzes für die Abstände der Bilder.

Wir haben unter 3 c) zwei Gleichungen ganz ähnlicher Form aufgestellt, bei denen aber die Entfernungen der Bilder von verschiedenen Punkten aus gemessen waren. Gleichungen von derselben einfachen Form erhalten wir immer, wenn wir die Entfernungen der Vereinigungspunkte, welche dem ersten Mittel angehören,

von einem beliebigen Punkte  $s$  Fig. 43 der Centrallinie  $ap$  abmessen, und von dem Bilde  $t$  dieses Punktes aus die Entfernungen der Vereinigungspunkte, die dem zweiten Mittel angehören.




Fig. 43.

Ist also  $t$  das Bild von  $s$ ,  $q$  das Bild von  $p$ ,  $P_1$  der erste,  $P_2$  der zweite Hauptbrennpunkt, und bezeichnen wir

$s$  a mit  $f_1$ ,  
 $t$  a mit  $f_2$ ,  
 $p$  a mit  $\varphi_1$ ,  
 $q$  a mit  $\varphi_2$ ,

$P_1$  a mit  $F_1$ ,  
 $P_2$  a mit  $F_2$ ,

$$\begin{array}{ll} p \text{ s mit } h_1, & q \text{ t mit } -h_2, \\ P_1 \text{ s mit } -H_1, & t \text{ P}_2 \text{ mit } -H_2, \end{array}$$

so ist

49

$$\begin{array}{ll} \alpha) & \frac{F_1}{f_1} + \frac{F_2}{f_2} = 1 \\ \beta) & \frac{F_1}{g_1} + \frac{F_2}{g_2} = 1 \\ \gamma) & g_1 - f_1 = h_1, \\ \delta) & g_2 - f_2 = h_2, \\ \epsilon) & F_1 - f_1 = H_1, \\ \zeta) & F_2 - f_2 = H_2. \end{array}$$

Setzt man aus  $\gamma)$  und  $\delta)$  die Werthe von  $g_1$  und  $g_2$  in  $\beta)$ , so erhält man

$$\frac{F_1}{h_1 + f_1} + \frac{F_2}{h_2 + f_2} = 1, \text{ oder}$$

$$F_1 \cdot (h_2 + f_2) + F_2 \cdot (h_1 + f_1) = (h_1 + f_1) \cdot (h_2 + f_2).$$

Subtrahirt man hiervon die aus  $\alpha)$  abzuleitende Gleichung

$$F_1 \cdot f_2 + F_2 \cdot f_1 = f_1 \cdot f_2,$$

so erhält man als Rest

$$F_1 \cdot h_2 + F_2 \cdot h_1 = h_1 \cdot h_2 + h_1 \cdot f_2 + h_2 \cdot f_1, \text{ oder}$$

$$(F_1 - f_1) \cdot h_2 + (F_2 - f_2) \cdot h_1 = h_1 \cdot h_2,$$

was vermöge der Gleichungen  $\epsilon)$  und  $\zeta)$  sich verwandelt in

$$H_1 \cdot h_2 + H_2 \cdot h_1 = h_1 \cdot h_2, \text{ oder}$$

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_2} = 1 \quad \dots \dots \dots 7).$$

Wenn man also als Ausgangspunkte für die Messung der Abstände irgend ein Paar zusammengehöriger Vereinigungspunkte von Lichtstrahlen benutzt, kommt man immer wieder zu derselben einfachen Formel zurück. Da in der brechenden Fläche selbst und in ihrem Mittelpunkte der leuchtende Punkt mit seinem Gegenstande zusammenfällt, sind diese beiden Punkte ihre eigenen Bilder und die Formeln 3c) bilden deshalb nur spezielle Fälle von 7).

#### Abstände der Bilder von den Brennpunkten.

Wenn man den Punkt  $s$  in den ersten Brennpunkt verlegt, wird die Gleichung 7) unbrauchbar, weil  $H_1$  und  $h_1$  unendlich groß werden. Man findet aber die entsprechende Gleichung leicht aus der ersten der Gleichungen 3d):

$$f_1 = \frac{F_1 \cdot f_2}{f_2 - F_2}.$$

Zieht man von beiden Seiten  $F_1$  ab, so erhält man:

$$f_1 - F_1 = \frac{F_1 \cdot F_2}{f_2 - F_2} \quad \dots \dots \dots 7a).$$

vorn, negativ, wenn sie nach hinten sieht. Auch bemerke ich hier gleich ein für alle Mal, daß, wenn von einem Strahlencentrum oder Bilde gesprochen wird, welches in einem gewissen brechenden Mittel liege, oder diesem angehöre, darunter auch stets der Fall mitverstanden ist, wo das Bild potentiell ist, und erst durch Verlängerung der Strahlen über die Grenzen des Mittels hinaus entstehen würde.

Zunächst wissen wir aus der bisherigen Untersuchung, daß homocentrische Strahlen, welche unter kleinen Einfallswinkeln auf kugelige brechende Flächen fallen, homocentrisch bleiben. Daraus folgt, daß homocentrische Strahlen, welche unter kleinen Winkeln gegen die Axe in das optische System eintreten, nach jeder Brechung homocentrisch bleiben, und ebenso aus der letzten brechenden Fläche wieder heraustreten. Wenn das einfallende Licht einer Anzahl von Vereinigungspunkten angehört, welche alle in einer kleinen auf der optischen Axe senkrechten Ebene liegen, so wissen wir ferner, daß nach der ersten Brechung die Vereinigungspunkte wieder alle in einer auf der optischen Axe senkrechten Ebene liegen, und ihre Vertheilung der frühesten geometrisch ähnlich ist. So wird es daher auch nach jeder folgenden Brechung sein, und auch das letzte Bild wird dem ursprünglichen geometrisch ähnlich sein, und wie dieses in einer auf die optische Axe senkrechten Ebene liegen.


Indem man nun das Bild, welches von der ersten brechenden Fläche entworfen ist, als den Gegenstand für die zweite betrachtet, das Bild der zweiten als den Gegenstand der dritten u. s. w., kann man ohne besondere Schwierigkeit schliesslich Gröfse und Lage des letzten Bildes berechnen. Allerdings werden aber die Formeln schon bei einer mäßigen Zahl brechender Flächen sehr weitläufig.

Hier kommt es uns nur darauf an, einige allgemeine Gesetze zu beweisen, welche für jede beliebige Zahl brechender Flächen gültig sind, was uns für das Auge desto wichtiger ist, da dieses in den verschiedenen Schichten der Krystalllinse unendlich viele brechende Flächen enthält, die Rechnung auf dem angedeuteten Wege also doch nicht zu Ende zu führen sein würde.

### I.

Zuerst will ich zeigen, daß das in Gleichung 7) für eine Fläche ausgesprochene Gesetz auch für beliebig viele gilt.

Es sei in *Fig. 45* die mit 1 bezeichnete brechende Fläche die erste, die mit  $(m - 1)$  bezeichnete die vorletzte, die mit  $m$  bezeichnete die letzte Fläche des



*Fig. 45.*

Systems. Wenn  $s$  der Vereinigungspunkt der eintretenden Strahlen ist, sei  $u$  der der austretenden, wenn  $p$  der der eintretenden ist, sei  $r$  der der austretenden. Wir bezeichnen  $ps$  mit  $h_1$ ,  $ur$  mit  $h_{m+1}$ , so will ich beweisen, daß

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1,$$

wo  $H_1$  der Abstand des ersten Hauptbrennpunktes von  $s$ ,  $H_2$  der des zweiten von  $u$  ist.

Um das Gesetz allgemein zu beweisen, werde ich zeigen, dafs, wenn es für ein System von  $(m - 1)$  Flächen richtig ist, es auch für  $m$  Flächen gilt. Da es nun für eine Fläche bewiesen ist, folgt dann, dafs es auch für zwei, und wenn für zwei, auch für drei u. s. w. *in infinitum* richtig sei.

Das System der  $(m - 1)$  ersten Flächen entwerfe von dem Punkte  $s$  das Bild  $t$ , und von dem Punkte  $p$  das Bild  $q$ , und  $tq$  werde bezeichnet mit  $h_m$ . Die Entfernungen der Hauptbrennpunkte des Systems der  $(m - 1)$  Flächen von den Punkten  $s$  und  $t$  seien beziehlich  $L_1$  und  $L_2$ , die Entfernungen der Hauptbrennpunkte der letzten  $m$ ten Fläche von den Punkten  $t$  und  $u$  seien beziehlich  $M_1$  und  $M_2$ , wobei alle diese Entfernungen immer von den Punkten  $s$ ,  $t$  und  $u$  aus in der Richtung positiv gerechnet werden, in welcher das brechende Medium, dem die betreffenden Strahlenbündel angehören, von den betreffenden brechenden Flächen oder Systemen liegt. Nun haben wir nach der obigen Voraussetzung

$$\frac{L_1}{h_1} + \frac{L_2}{h_m} = 1,$$

und für die Brechung in der letzten Fläche

$$-\frac{M_1}{h_m} + \frac{M_2}{h_{m+1}} = 1.$$

Wenn wir die erste dieser Gleichungen mit  $L_2$ , die zweite mit  $M_1$  dividiren und beide addiren, erhalten wir

$$\frac{L_1}{L_2} \cdot \frac{1}{h_1} + \frac{M_2}{M_1} \cdot \frac{1}{h_{m+1}} = \frac{1}{L_2} + \frac{1}{M_1},$$

oder, indem wir mit  $\frac{M_1 \cdot L_2}{M_1 + L_2}$  multipliziren:

$$\frac{M_1 \cdot L_1}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_1} + \frac{M_2 \cdot L_2}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_{m+1}} = 1.$$

Setzen wir  $h_1 = \infty$ , wobei  $h_{m+1} = H_2$  werden muss, so ergibt diese Gleichung

$$H_2 = \frac{M_2 \cdot L_2}{M_1 + L_2},$$

und setzen wir  $h_{m+1} = \infty$ , wobei  $h_1 = H_1$  werden muss, so ergibt sich

$$H_1 = \frac{M_1 \cdot L_1}{M_1 + L_2};$$

also haben wir schliesslich

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1, \quad \dots \dots \dots 8),$$

wie zu beweisen war.

Diese Gleichung liefert für jeden reellen Werth zwischen  $+\infty$  und  $-\infty$  von  $h_1$  einen und nur einen von  $h_{m+1}$ , und ebenso für jeden der letzteren Gröfse einen und nur einen von  $h_1$ . Der erste wie der letzte Vereinigungspunkt können also an jeder Stelle der Axe liegen, und sobald der eine gegeben ist, ist auch die Lage des anderen eindeutig bestimmt.

vorn, negativ, wenn sie nach hinten sieht. Auch bemerke ich hier gleich ein für alle Mal, daß, wenn von einem Strahlencentrum oder Bilde gesprochen wird, welches in einem gewissen brechenden Mittel liege, oder diesem angehöre, darunter auch stets der Fall mitverstanden ist, wo das Bild potentiell ist, und erst durch Verlängerung der Strahlen über die Grenzen des Mittels hinaus entstehen würde.

Zunächst wissen wir aus der bisherigen Untersuchung, daß homocentrische Strahlen, welche unter kleinen Einfallswinkeln auf kugelige brechende Flächen fallen, homocentrisch bleiben. Daraus folgt, daß homocentrische Strahlen, welche unter kleinen Winkeln gegen die Axe in das optische System eintreten, nach jeder Brechung homocentrisch bleiben, und ebenso aus der letzten brechenden Fläche wieder heraustreten. Wenn das einfallende Licht einer Anzahl von Vereinigungspunkten angehört, welche alle in einer kleinen auf der optischen Axe senkrechten Ebene liegen, so wissen wir ferner, daß nach der ersten Brechung die Vereinigungspunkte wieder alle in einer auf der optischen Axe senkrechten Ebene liegen, und ihre Vertheilung der frühesten geometrisch ähnlich ist. So wird es daher auch nach jeder folgenden Brechung sein, und auch das letzte Bild wird dem ursprünglichen geometrisch ähnlich sein, und wie dieses in einer auf die optische Axe senkrechten Ebene liegen.


Indem man nun das Bild, welches von der ersten brechenden Fläche entworfen ist, als den Gegenstand für die zweite betrachtet, das Bild der zweiten als den Gegenstand der dritten u. s. w., kann man ohne besondere Schwierigkeit schliesslich Gröfse und Lage des letzten Bildes berechnen. Allerdings werden aber die Formeln schon bei einer mäßigen Zahl brechender Flächen sehr weitläufig.

Hier kommt es uns nur darauf an, einige allgemeine Gesetze zu beweisen, welche für jede beliebige Zahl brechender Flächen gültig sind, was uns für das Auge desto wichtiger ist, da dieses in den verschiedenen Schichten der Krystalllinse unendlich viele brechende Flächen enthält, die Rechnung auf dem angedeuteten Wege also doch nicht zu Ende zu führen sein würde.

### I.

Zuerst will ich zeigen, daß das in Gleichung 7) für eine Fläche ausgesprochene Gesetz auch für beliebig viele gilt.

Es sei in *Fig. 45* die mit 1 bezeichnete brechende Fläche die erste, die mit  $(m - 1)$  bezeichnete die vorletzte, die mit  $m$  bezeichnete die letzte Fläche des



*Fig. 45.*

Systems. Wenn  $s$  der Vereinigungspunkt der eintretenden Strahlen ist, sei  $u$  der der austretenden, wenn  $p$  der der eintretenden ist, sei  $r$  der der austretenden. Wir bezeichnen  $ps$  mit  $h_1$ ,  $ur$  mit  $h_{m+1}$ , so will ich beweisen, daß

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1,$$

wo  $H_1$  der Abstand des ersten Hauptbrennpunktes von  $s$ ,  $H_2$  der des zweiten von  $u$  ist.

Um das Gesetz allgemein zu beweisen, werde ich zeigen, daß, wenn es für ein System von  $(m - 1)$  Flächen richtig ist, es auch für  $m$  Flächen gilt. Da es nun für eine Fläche bewiesen ist, folgt dann, daß es auch für zwei, und wenn für zwei, auch für drei u. s. w. *in infinitum* richtig sei.

Das System der  $(m - 1)$  ersten Flächen entwerfe von dem Punkte  $s$  das Bild  $t$ , und von dem Punkte  $p$  das Bild  $q$ , und  $tq$  werde bezeichnet mit  $h_m$ . Die Entfernungen der Hauptbrennpunkte des Systems der  $(m - 1)$  Flächen von den Punkten  $s$  und  $t$  seien beziehlich  $L_1$  und  $L_2$ , die Entfernungen der Hauptbrennpunkte der letzten  $m$ ten Fläche von den Punkten  $t$  und  $u$  seien beziehlich  $M_1$  und  $M_2$ , wobei alle diese Entfernungen immer von den Punkten  $s$ ,  $t$  und  $u$  aus in der Richtung positiv gerechnet werden, in welcher das brechende Medium, dem die betreffenden Strahlenbündel angehören, von den betreffenden brechenden Flächen oder Systemen liegt. Nun haben wir nach der obigen Voraussetzung

$$\frac{L_1}{h_1} + \frac{L_2}{h_m} = 1,$$

und für die Brechung in der letzten Fläche

$$- \frac{M_1}{h_m} + \frac{M_2}{h_{m+1}} = 1.$$

Wenn wir die erste dieser Gleichungen mit  $L_2$ , die zweite mit  $M_1$  dividiren und beide addiren, erhalten wir

$$\frac{L_1}{L_2} \cdot \frac{1}{h_1} + \frac{M_2}{M_1} \cdot \frac{1}{h_{m+1}} = \frac{1}{L_2} + \frac{1}{M_1},$$

oder, indem wir mit  $\frac{M_1 \cdot L_2}{M_1 + L_2}$  multiplizieren:

$$\frac{M_1 \cdot L_1}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_1} + \frac{M_2 \cdot L_2}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_{m+1}} = 1.$$

Setzen wir  $h_1 = \infty$ , wobei  $h_{m+1} = H_2$  werden muss, so ergibt diese Gleichung

$$H_2 = \frac{M_2 \cdot L_2}{M_1 + L_2},$$

und setzen wir  $h_{m+1} = \infty$ , wobei  $h_1 = H_1$  werden muss, so ergibt sich

$$H_1 = \frac{M_1 \cdot L_1}{M_1 + L_2};$$

also haben wir schliesslich

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1, \quad \dots \dots \dots 8),$$

wie zu beweisen war.

Diese Gleichung liefert für jeden reellen Werth zwischen  $+\infty$  und  $-\infty$  von  $h_1$  einen und nur einen von  $h_{m+1}$ , und ebenso für jeden der letzteren Gröfse einen und nur einen von  $h_1$ . Der erste wie der letzte Vereinigungspunkt können also an jeder Stelle der Axe liegen, und sobald der eine gegeben ist, ist auch die Lage des anderen eindeutig bestimmt.

## II.

Jedes optische System hat zwei und nur zwei zusammengehörige Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen, in denen die Gröfse eines auf die Axe senkrechten ebenen Bildes der des zugehörigen Gegenstandes gleich wird. Wir nennen die Ebene eines solchen Gegenstandes die erste und die des zugehörigen Bildes die zweite Hauptebene des Systems, und die beiden Punkte, wo sie die optische Axe schneiden, beziehlich den ersten und zweiten Hauptpunkt. Die zu den Hauptpunkten gehörigen Hauptbrennweiten sind den zugehörigen Brechungsverhältnissen des ersten und letzten Mittels proportional.

Beweis. Es sei  $sp$  der abgebildete Gegenstand,  $p$  ein Punkt desselben in der Axe,  $s$  ein anderer seitlich davon. Wenn wir den Gegenstand längs der Axe




Fig. 46.

verschieben, so daß er immer sich selbst parallel bleibt, so wird sich der Punkt  $s$  in der mit der Axe parallelen Linie  $st$  bewegen. Der Lichtstrahl  $st$  wird also stets dem Punkte  $s$  angehören, welches auch die Entfernung  $pg$  sein möge. Die der Axe parallelen Lichtstrahlen werden nun durch das brechende System so gebrochen, daß sie schließlich durch den zweiten Hauptbrennpunkt  $P_2$  gehen. Es sei  $rw$  der Gang des Lichtstrahls  $st$  nach der letzten Brechung. Da  $st$  stets dem leuchtenden Punkt  $s$  angehört, muß  $rw$  stets dem Bilde dieses Punktes angehören, d. h. das Bild von  $s$  muß in  $rw$  liegen. Es sei  $fg$  das Bild von  $sp$ , welches nach dem Vorausgeschickten senkrecht gegen die Axe  $uv$  sein muß. Wenn  $p$  sich längs der Axe verschiebt, wird sich auch  $f$  längs  $uv$ , und  $g$  längs  $rw$  verschieben, und es ist ersichtlich, daß die Gröfse des Bildes  $fg$  sich hierbei proportional dem Abstände  $P_2f$  ändern muß, wie dasselbe für eine einfache brechende Fläche oben in den Gleichungen 7c) ausgesprochen ist. Da ferner aus Gleichung 8) zu ersehen ist, daß die Entfernung  $P_2f$  jeden beliebigen Werth zwischen  $+\infty$  und  $-\infty$  annehmen kann, so wird auch die Gröfse des Bildes, wenn wir die eines umgekehrten Bildes negativ bezeichnen, jeden zwischen diesen Grenzen liegenden Werth und einen jeden nur einmal annehmen können. Es wird also auch seinem Gegenstande  $sp$  an einer und nur an einer Stelle gleich werden müssen; es sei  $c_1 b_1$  in diesem Falle der Gegenstand und  $c_2 b_2$  das ihm gleiche Bild, so bezeichnen diese beiden Linien die Lage der sogenannten Hauptebenen des Systems.

Formeln für Gröfse und Lage der Bilder bezogen auf die Hauptpunkte und Brennpunkte.

Bezeichnen wir nun

$$\begin{aligned} sp &= c_2 b_2 = \beta_1, \\ fg &= -\beta_2, \\ b_1 P_1 &= F_1, & b_1 p &= f_1, \\ b_2 P_2 &= F_2, & b_2 f &= f_2, \end{aligned}$$

so ist



$$\frac{c_2 b_2}{f g} = \frac{b_2 P_2}{P_2 f} \quad \text{oder}$$

$$-\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{F_2}{f_2 - F_2};$$

und da nach Gleichung 8):

$$\frac{F_1}{f_1} + \frac{F_2}{f_2} = 1, \quad \dots \dots \dots 8a),$$

so erhält man entsprechend der für eine brechende Fläche geltenden Gleichung 6b) 54

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{F_2}{F_2 - f_2} = \frac{F_1 - f_1}{F_1} \quad \dots \dots \dots 8b).$$

Nennen wir die Entfernung der zusammengehörigen Bilder von den Brennpunkten  $l_1$  und  $l_2$ , so daß also

$$l_1 = f_1 - F_1,$$

$$l_2 = f_2 - F_2,$$

so erhalten wir aus der Gleichung 8a) in derselben Weise die einfachste Form für das Gesetz der Lage der Bilder eines zusammengesetzten Systems, wie wir für die einer einzelnen Fläche aus Gleichung 3d) die 7b) erhalten haben, nämlich

$$l_1 \cdot l_2 = F_1 \cdot F_2 \quad \dots \dots \dots 8c),$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\beta_1}{\beta_2} &= -\frac{l_1}{F_1} \\ \frac{\beta_2}{\beta_1} &= -\frac{l_2}{F_2} \end{aligned} \right\} \quad \dots \dots \dots 8d).$$

Verhältniß der beiden Brennweiten.

Um endlich das Verhältniß der Größen  $F_1$  und  $F_2$  zu finden, wenden wir das in der Gleichung 7d) ausgesprochene Gesetz auf den Strahl an, welcher vor der Brechung durch  $s$  und  $b_1$ , Fig. 46, nach der Brechung also durch  $b_2$  und  $g$  geht.

Nennen wir die Größe eines in der ersten Hauptebeue enthalten Bildes  $\gamma_1$ , die Reihe der Bilder, welche bei den einzelnen Brechungen in dem Systeme gebildet werden,  $\gamma_2, \gamma_3$  etc. und  $\gamma_{m+1}$  das in der zweiten Hauptebeue nach der letzten Brechung entworfen. Nach der Definition der Hauptebeue ist  $\gamma_1 = \gamma_{m+1}$ . Nennen wir ferner  $\alpha_1$  den Winkel zwischen dem Strahl  $s b_1$  und der Axe im ersten Mittel,  $\alpha_2, \alpha_3$  u. s. w. in den folgenden Mitteln,  $\alpha_{m+1}$  im letzten Mittel, so daß

$$\angle s b_1 p = -\alpha_1,$$

$$\angle g b_2 f = -\alpha_{m+1}.$$

Nach der Gleichung 7d) ist

$$n_1 \cdot \gamma_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1 = n_2 \cdot \gamma_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2,$$

$$n_2 \cdot \gamma_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2 = n_3 \cdot \gamma_3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_3$$

u. s. w., woraus folgt

$$n_1 \cdot \gamma_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1 = n_{m+1} \cdot \gamma_{m+1} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{m+1} \quad \dots \dots \dots 9),$$

oder da  $\gamma_1 = \gamma_{m+1}$ , so ist

$$n_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1 = n_{m+1} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{m+1} \quad \dots \dots \dots 9a).$$

Ferner ist mit Berücksichtigung der oben aufgestellten Bezeichnungen

$$\begin{aligned} sp &= \beta_1 = -f_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2, \\ fg &= -\beta_2 = -f_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{m+1}, \quad \text{folglich} \\ \frac{n_1 \cdot \beta_1}{f_1} &= -\frac{n_{m+1} \cdot \beta_2}{f_2}; \end{aligned}$$

Setzt man in diese Gleichung aus 8a) den Werth von  $f_2$ , so erhält man

$$\frac{n_1 \cdot \beta_1}{f_1 - F_1} = -\frac{n_{m+1} \cdot \beta_2}{F_2}$$

55 und nach 8b) ist

$$\frac{\beta_1}{f_1 - F_1} = -\frac{\beta_2}{F_2}.$$

Beide Gleichungen durch einander dividirt geben:

$$\frac{n_1}{n_{m+1}} = \frac{F_1}{F_2}, \quad \dots \dots \dots 9c),$$

was zu beweisen war.

### III.

In jedem optischen Systeme giebt es ein und nur ein Paar von Knotenpunkten, welche die Eigenschaft haben, daß alle Lichtstrahlen, deren Richtung im ersten Mittel durch den ersten Knotenpunkt geht, nach der letzten Brechung eine ihrer früheren parallele Richtung haben, und durch den zweiten Knotenpunkt gehen. Die durch die Knotenpunkte senkrecht gegen die optische Axe gelegten Ebenen heißen die Knotenebenen. Da die im ersten Knotenpunkte sich schneidenden Lichtstrahlen sich also nach der letzten Brechung im zweiten schneiden, so ist der zweite offenbar das Bild des ersten. Die zu ihnen gehörigen Brennweiten verhalten sich umgekehrt wie die Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mediums.

Wir gehen von der in der vorigen Nummer gefundenen Gleichung 9) aus:

$$n_1 \cdot \gamma_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1 = n_{m+1} \cdot \gamma_{m+1} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{m+1} \quad \dots \dots \dots 10).$$

Wenn wir diese auf die Knotenpunkte beziehen, soll  $\alpha_1 = \alpha_{m+1}$  werden. Dies wird der Fall sein, wenn

$$n_1 \cdot \gamma_1 = n_{m+1} \cdot \gamma_{m+1}.$$

Die Lineardimensionen zweier zusammengehöriger in den Knotenebenen liegender Bilder verhalten sich also umgekehrt wie die zugehörigen Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mittels.

Da die Bilder desselben Gegenstandes  $\gamma_1$  sich verhalten wie ihre Abstände vom zweiten Hauptbrennpunkte, so läßt sich dieser Abstand aus der Größe des Bildes bestimmen. Fällt das Bild des Gegenstandes  $\gamma_1$  in die zweite Hauptebene, so ist seine Größe auch gleich  $\gamma_1$ , sein Abstand vom Brennpunkte  $F_2$ ; fällt es in die zweite Knotenebene, so ist seine Größe, wie eben bewiesen,

$$\gamma_{m+1} = \frac{n_1}{n_{m+1}} \cdot \gamma_1.$$

Sein Abstand vom Brennpunkte sei  $G_2$ , so ist

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_{m+1}} = \frac{F_2}{G_2}, \text{ also (9c)}$$

$$G_2 = \frac{n_1}{n_{m+1}} \cdot F_2 = F_1 \quad . . . . . 10a).$$

Der Abstand zwischen der zweiten Haupt- und Knotenebene ist danach

$$\begin{aligned} a_2 &= F_2 - G_2 \\ &= F_2 - F_1. \end{aligned}$$

Die erste Knotenebene soll das Bild der zweiten sein. Nennen wir ihren Abstand von der ersten Hauptebene  $a_1$ , so daß

$$a_1 = G_1 - F_1,$$

so ergibt die Gleichung 8a)

$$-\frac{F_1}{a_1} + \frac{F_2}{a_2} = 1, \text{ daher}$$


$$\begin{aligned} a_1 &= a_2 = F_2 - F_1 \\ G_1 &= F_2 \text{ und} \quad . . . . . 10b) \end{aligned}$$

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{n_{m+1}}{n_1} \quad . . . . . 10c)$$

Methoden, die Brenn-, Haupt- und Knotenpunkte eines aus zwei anderen zusammengesetzten centrirten Systems brechender Kugelflächen zu finden.

#### IV.

Es seien gegeben zwei centrirte optische Systeme  $A$  und  $B$ , welche dieselbe Axe haben. Es seien  $p$ , und  $p_{..}$ , *Fig. 47*, die beiden Brennpunkte,  $a$ , und  $a_{..}$ , die beiden Hauptpunkte des Systems  $A$ ,  $\pi$ , und  $\pi_{..}$ , die Brennpunkte,  $\alpha$ , und  $\alpha_{..}$ , die Hauptpunkte von  $B$ . Der Abstand des ersten Hauptpunktes  $\alpha$ , des zweiten



*Fig. 47.*

Systems vom zweiten  $a_{..}$  des ersten Systems sei  $d$ , und dies werde positiv gerechnet, wenn, wie in *Fig. 47*,  $\alpha$ , hinter  $a_{..}$  liegt. Die Hauptbrennweiten des ersten Systems  $a, p$ , und  $a_{..}, p_{..}$  bezeichnen wir mit  $f_1$  und  $f_2$ , die des zweiten  $\alpha, \pi$ , und  $\alpha_{..}, \pi_{..}$  mit  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ .

Der erste Brennpunkt des combinirten Systems ist offenbar das Bild, welches das System  $A$  vom ersten Brennpunkte  $\pi$ , des Systems  $B$  entwirft. Ist  $t$ , dieser Punkt, so ist klar, wie auch durch den in der Figur von  $t_1$  ausgehenden Strahl angedeutet ist, daß Strahlen, welche von  $t$ , ausgehen, nach der Brechung im ersten Systeme  $A$  in  $\pi$ , sich vereinigen und nach der Brechung im zweiten

parallel der Axe werden müssen, so daß also  $t$ , der Definition des vorderen Brennpunkts entspricht. Die Entfernung  $a, \pi$ , ist gleich  $d - q$ ; daraus ergibt sich für  $a, t$ , der Werth

$$a, t = \frac{(d - q_1) \cdot f_1}{d - q_1 - f_2} \quad \dots \dots \dots 11a).$$

Ebenso ist der zweite Brennpunkt des combinirten Systems das Bild, welches das zweite System  $B$  von dem zweiten Brennpunkte  $p$ , des ersten Systems entwirft. Es sei  $t$ , der Ort dieses Bildes, so ist

$$a, t = \frac{(d - f_1) \cdot q_2}{d - q_1 - f_2} \quad \dots \dots \dots 11b).$$

Die beiden Hauptpunkte des combinirten Systems sollen jeder des anderen Bild sein, und zwar bezieht sich der erste auf den Gang der Lichtstrahlen im ersten Medium, der zweite auf den im letzten. Die beiden Hauptpunkte müssen daher ein beider gemeinsames Bild in dem mittleren Medium haben, was zwischen den beiden optischen Systemen vorhanden ist. Es sei dieses Bild  $s$  in *Fig. 47*,  $r$ , und  $r$ , dagegen die Hauptpunkte des combinirten Systems. Wenn  $s$  das Bild von  $r$ , und  $r$ , das Bild von  $s$  ist, so ist auch  $r$ , das letzte Bild von  $r$ , und der ersten Bedingung für die beiden Hauptpunkte geschieht dadurch Genüge. Die 57 zweite Bedingung für diese Punkte ist die, daß zusammengehörige Bilder in den Hauptebenen gleich groß und gleich gerichtet seien. Es sei nun  $\sigma$  die Größe eines Objects in  $s$ ,  $\beta_1$  sein Bild entworfen vom System  $A$  in  $r$ ,  $\beta_2$  sein Bild entworfen vom System  $B$  in  $r$ , und  $x$  gleich der Länge  $a, s$ ,  $y$  gleich  $s \alpha_1$ , so ist nach 8b)

$$\frac{\beta_1}{\sigma} = \frac{f_2}{f_2 - x}$$

$$\frac{\beta_2}{\sigma} = \frac{q_1}{q_1 - y}.$$

Soll  $\beta_1 = \beta_2$  sein, so muß sein

$$\frac{f_2}{f_2 - x} = \frac{q_1}{q_1 - y} \quad \text{oder}$$

$$\frac{x}{f_2} = \frac{y}{q_1} \quad \dots \dots \dots 11c)$$

$$\text{oder} \quad \frac{a, s}{a, p} = \frac{\alpha, s}{\alpha, \pi}.$$

Um also den Punkt im mittleren Medium zu finden, dessen Bilder die beiden Hauptpunkte sind, theile man die Entfernung zwischen dem zweiten Hauptpunkte des ersten und ersten Hauptpunkte des zweiten Systems in zwei Theile, welche sich verhalten wie die zu diesen Hauptpunkten gehörigen Hauptbrennweiten der beiden Systeme.

Da  $x + y = d$  ist nach 11c)

$$\frac{x}{f_2} = \frac{d - x}{q_1}$$

$$\frac{d - y}{f_2} = \frac{y}{q_1}. \quad \text{Daraus folgt}$$

$$x = \frac{d \cdot f_2}{g_1 + f_2}$$

$$y = \frac{d \cdot g_1}{g_1 + f_2}$$

Aus dem Werthe von  $x$  findet man die Entfernung  $a, r, = h_1$  des ersten Hauptpunktes des combinirten Systems vor dem ersten Hauptpunkte des Systems  $A$ ,

$$h_1 = \frac{x \cdot f_1}{x - f_2}$$

$$h_1 = \frac{d \cdot f_1}{d - g_1 - f_2} \quad \dots \dots \dots 11d).$$

Ebenso die Entfernung  $\alpha, r, = h_2$  des zweiten Hauptpunktes des combinirten Systems hinter dem zweiten Hauptpunkte des Systems  $B$ ,

$$h_2 = \frac{g_2 \cdot y}{y - g_1}$$

$$h_2 = \frac{d \cdot g_2}{d - g_1 - f_2} \quad \dots \dots \dots 11e).$$

Daraus ergeben sich die Werthe  $F_1$  und  $F_2$  der Hauptbrennweiten des combinirten Systems:

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= a, t, - a, r, \\ &= \frac{g_1 \cdot f_1}{g_1 + f_2 - d} \\ F_2 &= \alpha, t, - \alpha, r, \\ &= \frac{g_2 \cdot f_2}{g_1 + f_2 - d} \end{aligned} \right\} \quad \dots \dots \dots 11f).$$

Hat man die Haupt- und Brennpunkte gefunden, so findet man die Knotenpunkte sehr leicht, da der Abstand des ersten Knotenpunktes vom ersten Brennpunkte gleich ist der zweiten Hauptbrennweite, der Abstand des zweiten Knotenpunktes vom zweiten Brennpunkte der ersten Hauptbrennweite.

## V.

Will man nur die Knotenpunkte, nicht die Hauptpunkte suchen, so kann man ein ähnliches Verfahren einschlagen wie für die Hauptpunkte, wobei man die Bedingung benutzt, daß die linearen Dimensionen zusammengehöriger Bilder in den Knotenebenen sich umgekehrt wie die Brechungsverhältnisse der betreffenden Media verhalten.

Es seien in *Fig. 47* jetzt  $a$ , und  $a, ,$   $\alpha$ , und  $\alpha, ,$  nicht mehr die Hauptpunkte, sondern die Knotenpunkte der beiden Systeme  $A$  und  $B$ ,  $r$ , und  $r, ,$  die Knotenpunkte des combinirten Systems, ihr gemeinsames Bild im mittleren Medium der Punkt  $s$ , so daß nun

$$\begin{aligned} a, p, &= f_2 & \alpha, \pi, &= g_2 \\ a, , p, &= f_1 & \alpha, , \pi, &= g_1 \\ a, , s &= x & \alpha, s &= y. \end{aligned}$$

Es ist

$$a, r, = \frac{x \cdot f_2}{x - f_1}$$

$$\alpha, r, = \frac{y \cdot \varphi_1}{y - \varphi_2}.$$

Ist nun  $\sigma$  die lineare Gröfse eines Objects im Punkte  $s$  des mittleren Medium,  $\beta_1$  die seines vom System  $A$  in  $r_1$  entworfenen Bildes,  $\beta_2$  die seines vom System  $B$  in  $r, ,$  entworfenen Bildes, so ist nach den bekannten Eigenschaften der Knotenpunkte

$$\frac{\beta_1}{\sigma} = \frac{a, r,}{x} = \frac{f_2}{x - f_1}$$

$$\frac{\beta_2}{\sigma} = \frac{\alpha, r,}{y} = \frac{\varphi_1}{y - \varphi_2}.$$

Da nun in den Knotenebenen, wenn  $n_1$  das Brechungsverhältnifs des ersten  $n_2$  des letzten,  $\nu$  des mittleren Mittels ist, sein muß

$$n_1 \cdot \beta_1 = n_2 \cdot \beta_2, \text{ so folgt, dafs}$$

$$\frac{n_1 \cdot f_2}{x - f_1} = \frac{n_2 \cdot \varphi_1}{y - \varphi_2}.$$

59 Nun ist aber

$$n_1 \cdot f_2 = \nu \cdot f_1$$

$$n_2 \cdot \varphi_1 = \nu \cdot \varphi_2, \text{ also}$$

$$\frac{f_1}{x - f_1} = \frac{\varphi_2}{y - \varphi_2} \quad \text{und}$$

$$\frac{x}{f_1} = \frac{y}{\varphi_2} \quad \text{oder}$$

$$\frac{a, s}{a, p,} = \frac{\alpha, s}{\alpha, \pi,}.$$

Die entsprechende Gleichung hatten wir aber auch gefunden in 11c), als wir angenommen hatten, dafs die Punkte  $a, , a, , \alpha, , \alpha, , r, ,$  und  $r, ,$  Hauptpunkte seien. Zur Auffindung der Knotenpunkte des combinirten Systems verfährt man also ganz wie zur Auffindung seiner Hauptpunkte, nur dafs man dabei von den Knotenpunkten der einzelnen Systeme, nicht von den Hauptpunkten ausgeht, und die zu den Knotenpunkten gehörigen Brennweiten nimmt.

## VI.

Wir wollen hier noch die Formeln für den einfachsten Fall hinschreiben, wo jedes der beiden verbundenen Systeme nur aus einer einzelnen Kugelfläche besteht. Es sei  $r_1$  der Radius der ersten,  $r_2$  der der zweiten Fläche,  $d$  ihr Abstand in der Axe von einander,  $n_1$  das Brechungsverhältnifs des ersten,  $n_2$  des zweiten,  $n_3$  des dritten Mittels. Dann ist nach 3a) und 3b)

$$f_1 = \frac{n_1 \cdot r_1}{n_2 - n_1} \quad . \quad \varphi_1 = \frac{n_2 \cdot r_2}{n_3 - n_2}$$

$$f_2 = \frac{n_2 \cdot r_1}{n_2 - n_1} \quad \varphi_2 = \frac{n_3 \cdot r_2}{n_3 - n_2}$$

Setzen wir der Kürze wegen

$$n_2 \cdot (n_3 - n_2) \cdot r_1 + n_2 \cdot (n_2 - n_1) \cdot r_2 - (n_3 - n_2) \cdot (n_2 - n_1) \cdot d = N,$$

so sind die Hauptbrennweiten:

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \frac{n_1 \cdot n_2 \cdot r_1 \cdot r_2}{N} \\ F_2 &= \frac{n_2 \cdot n_3 \cdot r_1 \cdot r_2}{N} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 12),$$

die Entfernungen der Hauptpunkte  $h_1$  und  $h_2$  von den Flächen:

$$\left. \begin{aligned} h_1 &= \frac{n_1 \cdot (n_2 - n_3) \cdot d \cdot r_1}{N} \\ h_2 &= \frac{n_3 \cdot (n_1 - n_2) \cdot d \cdot r_2}{N} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 12a),$$

und die Entfernung der Hauptpunkte von einander ist

$$H = d \cdot \frac{(n_2 - n_1) \cdot (n_3 - n_2) \cdot (r_1 - r_2 - d)}{N} \dots \dots \dots 12b).$$

Für  $d = 0$  wird  $h_1 = h_2 = H = 0$

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{n_1 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_3 - n_2) \cdot r_1 + (n_2 - n_1) \cdot r_2} \\ F_2 &= \frac{n_3 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_3 - n_2) \cdot r_1 + (n_2 - n_1) \cdot r_2} \end{aligned}$$

Setzen wir hierin  $r_2 = r_1$ , so erhalten wir

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{n_1 \cdot r_1}{n_3 - n_1} \\ F_2 &= \frac{n_3 \cdot r_1}{n_3 - n_1} \end{aligned}$$

Die Brennpunkte und Hauptpunkte sind dann also genau dieselben, als wäre nur eine brechende Fläche vorhanden; das Resultat ist unabhängig von  $n_2$ . Daraus folgt:

In einem Systeme von brechenden Kugelflächen können wir uns an jeder brechenden Fläche eine unendlich dünne, durch concentrische Kugelflächen begrenzte Schicht von beliebigem Brechungsverhältnisse eingeschoben denken, ohne die Brechung der Strahlen dadurch zu ändern.

Es wird uns dieser Satz später zur Vereinfachung mancher Betrachtungen dienen.

## VII.

**Lin sen.** Endlich will ich noch die Formeln für Linsen mit zwei kugelförmigen Begrenzungsflächen hersetzen, bei denen das erste und letzte Mittel einander gleich sind, also  $n_1 = n_3$ . Dann ergibt Gleichung 12):

$$F_1 = F_2 = \frac{n_1 \cdot n_2 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_2 - n_1) \cdot [n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d]} \dots \dots \dots 13).$$

Die Entfernungen der Hauptpunkte, welche in diesem Falle mit den Knotenpunkten zusammenfallen, von den Linsenflächen sind nach 12a)

$$\left. \begin{aligned} h_1 &= \frac{n_1 \cdot d \cdot r_1}{n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d} \\ h_2 &= - \frac{n_1 \cdot d \cdot r_2}{n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d} \end{aligned} \right\} \dots \dots 13a)$$

Die Entfernung der Hauptpunkte von einander:

$$H = d \cdot \frac{(n_2 - n_1) \cdot (d + r_2 - r_1)}{n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d} \dots \dots 13b)$$

Die beiden ersten sind positiv gerechnet, wenn sie auferhalb der Linse liegen.

Den Punkt in der Linse, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, nennt man in diesem Falle das optische Centrum der Linse. Es liegt in der optischen Axe, und seine Entfernungen von den beiden Flächen verhalten sich zu einander wie die Radien dieser Flächen.

Substitution verschiedener optischer Systeme für einander.

Da die Resultate der Brechung in einem optischen Systeme, was Gröfse und Lage der Bilder betrifft, nur von der Lage der Brennpunkte und Hauptpunkte (oder Knotenpunkte) abhängen, so kann man ohne Aenderung der Lage und Gröfse der Bilder zwei optische Systeme für einander substituiren, deren Brennpunkte und Hauptpunkte dieselbe Lage haben. Da das Verhältnifs des Brechungsvermögens des ersten und letzten Mittels nicht geändert werden kann, ohne das Verhältnifs der Hauptbrennweiten zu einander zu ändern, wollen wir voraussetzen, dafs das erste und letzte Mittel bei einer solchen Substitution ungeändert bleiben. Dann braucht nur die eine Hauptbrennweite und der Abstand der Hauptpunkte von einander in dem einen System gleich den entsprechenden Gröfsen des anderen gemacht zu werden, um die beiden Systeme für einander substituiren zu können. In einem Systeme von nur zwei brechenden Flächen würde man zur Erfüllung dieser Bedingungen über 4 Gröfsen,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $n_2$  und  $d$ , bestimmen können. Es kann daher für jedes centrirte System brechender Kugelflächen ein System von  
61 nur zwei solchen Flächen gesetzt werden, welches eben so grofse und eben so gelegene Bilder entwirft wie jenes, und im Allgemeinen kann man dabei sogar noch immer zwei andere Bedingungen für das System von zwei Flächen aufstellen, z. B. dafs es aus einem bestimmten Stoffe zu bilden sei u. s. w., und diese gleichzeitig erfüllen.

Für den Fall, wo das erste und letzte Mittel identisch sind, beide ein kleineres Brechungsvermögen haben als das mittlere Mittel, und der Abstand der brechenden Flächen kleiner ist als die Krümmungsradien, also für die sogenannten Linsen, will ich hier noch die einzelnen Fälle durchgehen, weil dergleichen Linsen eine ausgedehnte praktische Anwendung finden.

Verschiedene Arten der Linsen.

Man unterscheidet nach der Gestalt 1) biconvexe Linsen, bei denen beide Flächen convex, also  $r_1$  positiv,  $r_2$  negativ ist; die Brennweite ist immer positiv nach Gleichung 13). Die Abstände der Hauptpunkte von den Flächen sind negativ, d. h. diese Punkte liegen innerhalb der Linse, und der Abstand der Hauptpunkte



von einander ist positiv, d. h. der erste liegt vor dem zweiten. In *Fig. 48* ist die Lage der Brennpunkte  $p_1$  und  $p_2$  und Hauptpunkte  $h_1$  und  $h_2$  einer biconvexen Linse dargestellt. Die erste und zweite Fläche der Linse sind mit 1 und 2 bezeichnet. Ein Grenzfall der biconvexen Linsen sind die planconvexen, bei denen einer der Radien unendlich groß wird, und ein Hauptpunkt in die gekrümmte Fläche der Linse fällt.




Fig. 48.

2) Biconcave Linsen mit zwei concaven Flächen;  $r_1$  ist negativ,  $r_2$  positiv. Die Brennweiten sind negativ, die Abstände der Hauptpunkte von den Flächen beide negativ, d. h. die Hauptpunkte liegen innerhalb der Linse. Ihr Abstand ist positiv, d. h. der erste liegt vor dem zweiten. *Fig. 49* stellt die Lage der Hauptpunkte  $h_1$  und  $h_2$ , sowie der Brennpunkte  $p_1$  und  $p_2$  einer biconcaven Linse dar. Einen Grenzfall bilden die planconcaven Linsen, bei denen einer der Radien unendlich wird und einer der Hauptpunkte in die gekrümmte Fläche fällt.




Fig. 49.

3) Concavconvexe Linsen, beide Radien entweder positiv oder negativ. Wir wollen das erstere annehmen; der zweite Fall ergibt sich aus diesem sogleich, wenn wir nachher die erste Seite der Linse zur zweiten machen. Die Brennweite wird positiv, wenn

$$n_2 \cdot (r_2 + d - r_1) > n_1 \cdot d;$$

sie wird unendlich, wenn beide Seiten der Gleichung gleich sind; sie wird negativ, wenn der Ausdruck links kleiner als der rechts ist. Der Ausdruck  $r_2 + d - r_1$  ist der Abstand des Krümmungsmittelpunkts der zweiten Fläche von dem der ersten nach hinten gerechnet. Liegt der zweite Mittelpunkt hinter dem ersten, so wird die Linse von ihrer Mitte nach dem Rande zu dünner; liegt jener vor dem ersten, so wird sie dicker. Man kann also sagen: Wird eine concavconvexe Linse nach dem Rande zu dicker, so ist ihre Brennweite negativ, und soll ihre Brennweite positiv sein, so muß sie nach dem Rande hin dünner werden. Aber man darf beide Sätze nicht umkehren, wie es oft geschieht.

Der erste Hauptpunkt liegt vor der convexen Fläche (d. h. an ihrer convexen Seite), wenn die Brennweite positiv ist; er entfernt sich sehr weit, bis in das Unendliche, wenn die Brennweite selbst sehr groß und unendlich wird. Wird die Brennweite negativ, so liegt der erste Hauptpunkt hinter der convexen Fläche der Linse, d. h. auf ihrer concaven Seite, ebenfalls unendlich weit entfernt, wenn die Brennweite unendlich sein sollte.

Der zweite Hauptpunkt liegt vor der concaven Fläche der Linse, d. h. auf ihrer convexen Seite, wenn die Brennweite der Linse positiv, er liegt hinter dieser Fläche, wenn die Brennweite negativ ist, und rückt ebenfalls in das Unendliche hinaus, wenn die Brennweite unendlich groß wird. Bei einer positiven Brennweite liegt der zweite Hauptpunkt immer hinter dem ersten, d. h. der Linse näher. Bei einer negativen liegt er hinter dem ersten, d. h. der Linse ferner,

wenn die Linse nach ihrem Rande zu dicker wird; er liegt dagegen vor dem ersten, wenn die Linse bei negativer Brennweite von der Mitte nach dem Rande dünner wird; er fällt mit ihm zusammen, wenn die beiden Linsenflächen concentrischen Kugeln angehören, und zwar liegen beide Hauptpunkte dann in dem gemeinschaftlichen Centrum der Kugel. *Fig. 50* stellt eine concavconvexe Linse von positiver




Fig. 50.

Brennweite dar, *Fig. 51* eine solche von negativer Brennweite, die nach dem Rande zu dicker wird, *Fig. 52* eine solche von negativer Brennweite, welche nach dem Rande zu dünner wird. Der Krümmungsmittelpunkt der ersten Fläche ist mit  $c_1$ , der der




Fig. 51.

zweiten mit  $c_2$  bezeichnet. Ich bemerke noch, daß die Brennpunkte nie in die Linse und stets auf entgegengesetzte Seiten derselben fallen.




Fig. 52.

Was die Lage der Bilder betrifft, so vereinfacht sich die Gleichung 8a) und 8b), wenn die beiden Brenn-

weiten gleich werden, in folgende:

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{F}, \text{ oder} \quad \dots \dots \dots 14)$$

$$f_2 = \frac{F \cdot f_1}{f_1 - F}, \quad \dots \dots \dots 14a)$$

und

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{F}{F - f_1} = \frac{F - f_2}{F}, \quad \dots \dots \dots 14b)$$

„ Oder, wenn wir wie oben

$$\begin{aligned} f_1 - F &= l_1 \\ f_2 - F &= l_2 \end{aligned}$$

setzen, erhalten wir den Gleichungen 7c) entsprechend

$$- \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{l_1}{F} = \frac{F}{l_2} \quad \dots \dots \dots 14c)$$

und

$$l_1 \cdot l_2 = F^2 \quad \dots \dots \dots 14d)$$

Hiernach ist die Brennweite  $F$  der Linse in allen Fällen die mittlere geometrische Proportionale zwischen den beiden Bildabständen von den Brennpunkten  $l_1$  und  $l_2$ . Ebendeshalb muß von den letztern einer nothwendig größer als  $F$ , der andere kleiner sein, wenn nicht beide gleich  $+F$  oder gleich  $-F$  sind. Auch ergibt sich, daß  $l_1$  und  $l_2$  immer gleichzeitig positiv oder negativ sein müssen, d. h. wenn das Object vor dem ersten Brennpunkte liegt, liegt das Bild hinter dem zweiten, und umgekehrt.

Bei Linsen mit positiver Brennweite (Sammellinsen, Convexlinsen) liegt der erste Brennpunkt vor der Linse, der zweite dahinter. Positives  $l_1$  bezeichnet also eine Entfernung des Objects von der Linse, die noch grösser als die des ersten Brennpunkts ist, während das Bild hinter der Linse weiter entfernt als der zweite Brennpunkt liegt und nach 14 c) umgekehrt ist.

Dabei ist die Entfernung  $l_2$  wie die Bildgrösse  $\beta_2$  umgekehrt proportional der Entfernung  $l_1$  des Objects vom ersten Brennpunkte;  $l_2$  wird gleich  $l_1$  und  $\beta_2 = -\beta_1$ , wenn  $l_1 = F$ , d. h. das Object um die doppelte Brennweite von der Linse absteht.

Für ein negatives  $l_1$ , welches absolut kleiner als  $F$  ist, liegt das Object zwischen erstem Brennpunkt und Linse; das virtuelle und aufrechte Bild vor der Linse, da  $l_2$  nun auch negativ, aber, absolut genommen, grösser als  $F$  sein muß; das Bild ist vergrößert. Dies entspricht dem Falle, wo die Linse als Loupe gebraucht wird.

Für  $l_1 = -F$  fallen Object und Bild gleich groß und aufrecht im optischen Centrum der Linse zusammen.

Für  $-l_1 > F$  liegt das nunmehr virtuelle Object hinter der Linse, und da nun  $-l_2 < F$  sein muß, das wieder reelle, aufrechte, verkleinerte Bild zwischen der Linse und ihrem zweiten Brennpunkte.

Für Linsen mit negativer Brennweite (Concavlinen, Zerstreuungslinsen) liegt der erste Brennpunkt hinter der Linse, der zweite davor.

Der Fall  $l_1 > (-F)$  giebt eine Lage des Objects vor der Linse. Dabei wird nach 14c) und 14d)  $l_2 < (-F)$ , d. h. das Bild liegt vor der Linse, ist also virtuell, aufrecht verkleinert.

Der Fall  $l_1 = -F$  macht Object und Bild aufrecht und gleich groß im Centrum der Linse zusammenfallen.

Der Fall, wo ein positives  $l_1 < (-F)$ , entspricht einem virtuellen Bilde hinter der Linse zwischen ihr und dem hinter ihr liegenden Brennpunkte. Dann ist  $l_2 > (-F)$ , d. h. das Bild liegt hinter der Linse, ist also reell, dabei aufrecht, um so mehr vergrößert, je näher das virtuelle Object an den virtuellen Brennpunkt rückt.

Endlich, wenn  $l_1$  negativ wird, d. h. das virtuelle Object hinter dem virtuellen Brennpunkt liegt, wird auch  $l_2$  negativ, d. h. das virtuelle Bild ist weiter vor der Linse gelegen, als ihr vorderer (zweiter) Brennpunkt, und ist umgekehrt. Das ist der Fall, der in dem Galilei'schen Fernrohre eintritt.

### § 10. Brechung der Strahlen im Auge.

Das Auge verhält sich gegen das einfallende Licht im Wesentlichen 64 wie eine *Camera obscura*. Das von einem leuchtenden Punkte ausgegangene Licht muß, wenn dieser Punkt deutlich gesehen werden soll, durch die brechenden Mittel des Auges so gebrochen werden, daß Alles auch wieder auf einem Punkte der Netzhaut vereinigt wird. Auf der Fläche dieser Haut wird in der That ein reelles optisches Bild der äußeren gesehenen Gegenstände entworfen. Dasselbe ist umgekehrt und verkleinert. Man kann es an frisch ausgeschnittenen Augen sichtbar machen, wenn man vorsichtig den hinteren mittleren Theil der Sclerotica und Chorioidea entfernt, die Netzhaut aber stehen läßt, und nun die Hornhaut eines so präparierten Auges gegen

helle Gegenstände kehrt. Das Bild erscheint alsdann klein, hell, scharf und wie angegeben, umgekehrt auf der stehengebliebenen Netzhaut. Noch besser ist das Bildchen nach der Methode von GERLING<sup>1</sup> zu sehen, wenn man die Elemente der Netzhaut mit einem Pinsel entfernt, und dann ein Täfelchen von Glas oder Glimmer in die Öffnung einschiebt. Ohne viele Mühe kann man die Netzhautbildchen auch in den Augen weißer Kaninchen sehen, denen das Pigment der Aderhaut fehlt. Bei diesen braucht man nicht ein-  
 65 mal die harte Haut zu entfernen, sondern sieht das Bild durch sie hindurchscheinen, allerdings nicht so scharf wie bei freigelegter Netzhaut, aber doch deutlich genug, um seine Stellung, Gröfse u. s. w. zu erkennen. Auch ist es bei lebenden Menschen, namentlich bei blonden Personen mit hellblauen Augen, welche wenig Pigment in der Aderhaut zu haben pflegen, zuweilen möglich, das Bild durch die harte Haut hindurch zu sehen. Man läßt einen solchen in einem verdunkelten Zimmer das Auge so drehen, daß die Hornhaut im äußeren Augenwinkel steht, und in dem größeren mittleren und inneren Theile der Augenlidspalte daher die innere Seite der weißen Sehnenhaut erscheint. Hält man dann noch weiter seitlich, als die seitlich gekehrte Sehaxe steht, eine Kerzenflamme, so erscheint deren Bild auf der inneren Seite der Netzhaut, und schimmert oft so deutlich durch die weiße Sehnenhaut hindurch, daß man die umgekehrte Stellung des Bildes, die Spitze der Flamme und den Ort des Dochtes erkennen kann<sup>2</sup>.

Die genaueste Untersuchung der Netzhautbildchen im lebenden Auge des Menschen ist mittels des im § 16 zu beschreibenden Augenspiegels möglich. Mit diesem Instrumente kann man von vorn in das Auge hineinschauen, und die Netzhaut selbst mit ihren Gefäßen, sowie die auf ihr entworfenen optischen Bilder deutlich sehen. Man überzeugt sich leicht davon, daß von hinreichend hellen Objecten, welche das beobachtete Auge deutlich sieht, sehr scharfe und genau begrenzte optische Bilder auf der Fläche der Netzhaut entworfen werden.

Bei der Beschreibung der Netzhaut habe ich schon erwähnt, daß im Hintergrunde des Auges sich eine eigenthümlich gebaute Stelle der Netzhaut finde, der gelbe Fleck. In seiner Mitte, der sogenannten Netzhautgrube, fehlen die Gefäße, welche sich in den übrigen Theilen der Netzhaut verästeln; hier finden sich nur nervöse Elemente vor, und zwar von den Schichten der Netzhaut, wie es scheint, nur Körnchen und Zapfen. Diese Stelle ist in physiologischer Hinsicht von der größten Wichtigkeit als die Stelle des directen Sehens. Derjenige Punkt des Gesichtsfeldes, welchen wir direct betrachten, oder mit dem Blicke fixiren, wird jedesmal an dem Orte der Netzhautgrube abgebildet. Mittels des Augenspiegels kann dieser Satz, von dessen Richtigkeit man sich schon längst wegen der besonderen Structur des gelben Flecks überzeugt hielt, auch durch directe Beobachtungen erwiesen werden. Den Ort des gelben Flecks erkennt man mit dem Augen-

<sup>1</sup> C. L. GERLING, *Poggendorff's Ann.* XLVI. 243. 1839.

<sup>2</sup> VOLCKMANN, Artikel: Sehen in WAGNERS *Handwörterbuch der Physiologie.* 8. 236—239.

spiegel, wenn die ganze Netzhaut erleuchtet ist, an dem Mangel der Gefäße. In der Mitte der gefäßlosen Stelle, entsprechend dem Orte der Netzhautgrube, findet sich eine eigenthümlich helle Stelle, welche COCCIUS<sup>1</sup> zuerst beschrieben hat, und deren Helligkeit er einem Reflexe der Netzhautgrube zuschreibt. DONDEERS<sup>2</sup> hat ferner gezeigt, daß dieser helle Reflex stets an derjenigen Stelle des optischen Bildes erscheint, welche das beobachtete Auge im Gesichtsfelde fixirt, und ich habe mich von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugt. Man kann nach der Stellung des sogenannten Reflexes der Netzhautgrube dem beobachteten Individuum genau bezeichnen, welchen Punkt es fixirt, und wenn man ihm Anweisung giebt, bald diesen, bald jenen Punkt des Gegenstandes zu fixiren, sieht man den Reflex immer auf den entsprechenden Punkt des Bildes sich einstellen. Die Ausführung dieser Versuche wird in § 16 beschrieben werden.

Nur in der Gegend der Augenaxe pflegt das optische Bild auf der Netzhaut seine volle Schärfe zu haben, von ihr entfernter ist es weniger gut begrenzt. Wir sehen deshalb im Gesichtsfelde in der Regel nur den einen Punkt deutlich, welchen wir fixiren, alle übrigen undeutlich. Diese Undeutlichkeit im indirecten Sehen ist übrigens auch durch eine geringere Empfindlichkeit der Netzhaut bedingt; sie ist schon in geringer Entfernung von dem fixirten Punkte viel bedeutender als die objective Undeutlichkeit der Netzhautbilder. Das Auge stellt ein optisches Werkzeug von sehr großem Gesichtsfelde dar, aber nur in einer kleinen, sehr engbegrenzten Stelle dieses Gesichtsfeldes sind die Bilder deutlich. Das ganze Feld entspricht einer Zeichnung, in der zwar der wichtigste Theil des Ganzen sorgfältig ausgeführt, die Umgebungen aber nur skizzirt, und zwar desto roher skizzirt sind, je weiter sie von dem Hauptgegenstande abstehen. Durch die Beweglichkeit des Auges wird es aber möglich, nach einander jeden einzelnen Punkt des Gesichtsfeldes genau zu betrachten. Da wir zu einer Zeit doch nur einem Gegenstande unsere Aufmerksamkeit zuwenden können, ist der eine deutlich gesehene Punkt ausreichend, sie vollständig zu beschäftigen, so oft wir sie auf Einzelheiten lenken wollen; und wiederum ist das große Gesichtsfeld trotz seiner Undeutlichkeit geeignet, die Hauptzüge der ganzen Umgebung mit einem schnellen Blicke aufzufassen, und neu auftauchende Erscheinungen an den Seiten des Gesichtsfeldes sogleich zu bemerken.

Das Gesichtsfeld eines einzelnen Auges wird bestimmt durch die Weite der Pupille und ihre Lage zum Rande der Hornhaut. Ich finde, daß ich in einem dunklen Zimmer, wenn ich mein Auge in einem Spiegel besehe, und seitlich ein Licht aufstelle, die Anwesenheit des Lichts so lange noch wahrnehme, als Strahlen von dem Lichte auf den gegenüberliegenden Rand der Pupille und in diese selbst fallen. Alles Licht also, was durch die Hornhaut in die Pupille fällt, wird noch empfindliche Theile der Netzhaut treffen. Die Pupille liegt zwar etwas weiter zurück als der äußere Horn-

<sup>1</sup> A. COCCIUS, *Ueber die Anwendung des Augenspiegels*. Leipzig 1853. S. 64.

<sup>2</sup> F. C. DONDEERS, *Onderzoekingen gedaan in het Physiolog. Laborat. d. Utrechtsche Hoogeschool*. Jaar VI. S. 133.

hautrand, aber wegen der Brechung in der Hornhaut können selbst noch Strahlen zu ihr gelangen, welche senkrecht gegen die Augenaxe verlaufend auf den Rand der Hornhaut fallen, so daß das Gesichtsfeld eines einzelnen Auges etwa einer halben Kugel entspricht, eine GröÙe, welche keinem künstlichen optischen Instrumente zukommt. Individuelle Verschiedenheiten müssen darin vorkommen, abhängig von der Weite und Lage der Pupille. Da beim Sehen für die Nähe die Pupille sich der Hornhaut nähert, wird das Gesichtsfeld dabei etwas gröÙser, wie ich an meinen Augen wenigstens leicht erkennen kann, wenn ich am äußersten Rande des Gesichtsfeldes ein recht helles Licht anbringe.

Ein Theil des Gesichtsfeldes jedes einzelnen Auges nach innen, oben und unten wird durch Theile des Antlitzes, Nase, Augenbrauenrand, Wangen, eingenommen, nur nach auÙen hin ist es ganz frei<sup>1</sup>. Beide Augen zusammen  
67 überschauen aber, wenn ihre Axen parallel in die Ferne gerichtet sind, einen horizontalen Bogen von 180 oder mehr Graden, jedes einzelne bis 150°. Vergrößert wird das überschaubare Feld noch durch die Bewegungen der Augen, auf welche wir später zurückkommen.

Die Lichtstrahlen, welche von einem entfernten leuchtenden Punkte auf das Auge fallen, werden zuerst von der Hornhaut gebrochen, und zwar so, daß sie ungestört weitergehend sich etwa 10 mm hinter der Netzhaut in einem Punkte vereinigen würden. Indem sie somit convergirend [durch die vordere Augenkammer gehen, treffen sie auf die Krystalllinse, werden von dieser noch convergenter gemacht, und können in Folge dessen nun schon auf der Netzhaut zur Vereinigung gelangen.

Die stärksten Brechungen der Lichtstrahlen geschehen an der Hornhaut, demnächst an der vorderen und hinteren Fläche der Krystalllinse. Aber auch im Inneren der Krystalllinse finden an den Grenzen ihrer einzelnen Schichtflächen Brechungen statt, da diese Schichten von verschiedener Dichtigkeit sind. Wir können diese verschiedenen brechenden Flächen annähernd gleichsetzen einem System von Rotationsflächen, deren Axen alle in eine gerade Linie zusammenfallen. Wenn auch kleine Abweichungen in der Lage der Axen der einzelnen Flächen bei den meisten menschlichen Augen vorkommen scheinen, so sind diese doch so gering, daß wir sie in Bezug auf die Lage und GröÙe der optischen Bilder vernachlässigen und das Auge im Ganzen als ein centrirtes optisches System betrachten können.

Die Axe dieses Systems, deren vorderes Ende etwa mit dem Mittelpunkt der Hornhaut zusammenfällt, während das hintere zwischen dem gelben Flecke und der Eintrittsstelle des Sehnerven hindurchgeht, nennen wir die Augenaxe.

<sup>1</sup> Instrumente zur Ausmessung der Grenzen des Gesichtsfeldes, Perimeter, werden jetzt von den Augenärzten viel gebraucht. Sie sind theils ebene Tafeln mit verschiebbaren Gesichtsscheiben, vor denen der Kopf festgestellt wird, wie die von WECKER (*Zehender's Monatsbl.* 1867 p. 275) und DOR construirten, theils drehbare Gradbogen wie die von AUBERT und FÖRSTER (*Graefe's Archiv f. Ophthalmol.* III. 1857), LANDOLT (*Annali d'Oftalmologia del prof. Quaglino.* 1872. p. 1), CARTER (*Zehender's Monatsbl.* 1872) theils halbe Hohlkugeln, wie die von SCHENK (ebenda 1872. X. 8. 161.)

Die Lage der Brennpunkte, Hauptpunkte und Knotenpunkte des Auges unterliegt wohl ziemlich bedeutenden individuellen Verschiedenheiten, da überhaupt die meisten Abmessungen des Auges und seiner einzelnen brechenden Flächen bei verschiedenen Menschen so von einander abweichen, wie man es bei einem Organe, dessen Wirkungen eine so große Genauigkeit der Construction zu verlangen scheinen, kaum erwarten sollte. Außerdem werden wir weiter unten sehen, daß auch in jedem einzelnen Auge diese Punkte ihre Lage ändern, wenn das Auge nach einander Gegenstände in verschiedener Entfernung betrachtet. Man kann über die Lage der genannten Punkte im normalen, fernsehenden Auge nur etwa so viel sicher aussagen: Der erste Hauptpunkt ist dem zweiten Hauptpunkte sehr nahe, ebenso der erste dem zweiten Knotenpunkte. Die beiden Hauptpunkte des Auges liegen etwa in der Mitte der vorderen Augenkammer, die beiden Knotenpunkte sehr nahe der hinteren Fläche der Linse, der zweite Brennpunkt dicht an der Netzhaut.

Da es bei sehr vielen Gelegenheiten nothwendig ist, wenigstens angenäherte Werthe für die einzelnen optischen Constanten des Auges zu kennen, so will ich hier die Werthe anführen, welche LISTING für ein schematisches mittleres Auge gewonnen hat, indem er, den bis dahin ausgeführten Messungen sich möglichst anschließend, einfache abgerundete Zahlen für die hier in Betracht kommenden Größen wählte. Eine den neueren Messungen besser angepaßte Berechnung eines schematischen Auges folgt in § 12.

LISTING nimmt an

68

1) das Brechungsvermögen der Luft gleich .....	1
2) das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit .....	$\frac{103}{77}$
3) Brechungsvermögen der Krystalllinse .....	$\frac{16}{11}$
4) Brechungsvermögen des Glaskörpers .....	$\frac{103}{77}$
5) Krümmungshalbmesser der Hornhaut .....	8 mm
6) Krümmungshalbmesser der vorderen Linsenfläche .....	10 "
7) Krümmungshalbmesser der hinteren Linsenfläche .....	6 "
8) Entfernung der vorderen Hornhaut- und vorderen Linsenfläche	4 "
9) Dicke der Linse .....	4 "

Er berechnet aus diesen Annahmen:

- 1) Der erste Brennpunkt liegt 12,8326 mm vor der Hornhaut, der zweite Brennpunkt 14,6470 mm hinter der Hinterfläche der Linse.
- 2) Der erste Hauptpunkt liegt 2,1746 mm, der zweite 2,5724 mm hinter der Vorderfläche der Hornhaut, ihr gegenseitiger Abstand beträgt 0,3978 mm.
- 3) Der erste Knotenpunkt liegt 0,7580 mm, der zweite 0,3602 mm vor der Hinterfläche der Linse.

- 4) Die erste Hauptbrennweite des Auges beträgt hiernach 15,0072 mm, die zweite 20,0746 mm.

Die Lage der Hauptpunkte  $h$ , und  $h''$ , Knotenpunkte  $k$ , und  $k''$ , Brennpunkte  $F$ , und  $F''$ , nach LISTING ist in Fig. 53 angegeben. Unter den von LISTING der Berechnung zu Grunde gelegten Werthen ist der Hornhautradius und das Brechungs-Vermögen der Linse etwas zu groß angenommen. Beide nicht erheblichen Fehler




Fig. 53.

compensiren sich bei der Berechnung der Brennweite des ganzen Auges, also in dem Endergebnisse der ganzen Brechung. Auf die Lage der Haupt- und Knotenpunkte hat dies sehr wenig Einfluss. Wir brauchen also nicht zu zweifeln, daß LISTING's in runden Zahlen gegebenes Schema mit dem natürlichen Verhältnisse wirklich so gut übereinstimmt, als es bei der großen Breite der individuellen Unterschiede möglich ist.

Vermittelst der angegebenen Cardinalpunkte des Auges läßt sich der Weg eines gegebenen einfallenden Strahls nach der letzten Brechung vermöge der in § 9 vorgeschriebenen Constructionen finden; ebenso der Ort des Bildes eines beliebigen, in der Nähe der Augenaxe liegenden leuchtenden Punktes. Da übrigens sowohl die beiden Hauptpunkte des Auges, als auch die beiden Knotenpunkte einander sehr nahe liegen, so kann man ohne erhebliche Beeinträchtigung der Genauigkeit des Resultats die beiden Hauptpunkte in einen Punkt zusammenziehen und ebenso die beiden Knotenpunkte. Man erhält dadurch ein noch mehr vereinfachtes Schema des Auges, welches LISTING das reducirte Auge nennt. Er legt den einfachen Hauptpunkt eines solchen Auges 2,3448 mm hinter die Vorderfläche der Hornhaut, den Knotenpunkt  $\kappa$  Fig. 53 0,4764 mm vor die hintere Fläche der Linse, die Brennpunkte bleiben unverändert. Die Wirkung des reducirten Auges würde durch eine brechende Kugelfläche hervorgebracht werden können, deren Mittelpunkt der Knotenpunkt wäre, und deren Scheitel im Hauptpunkt läge, während sich vor ihr Luft, hinter ihr wässrige Feuchtigkeit oder Glaskörper



befände. Der Krümmungshalbmesser einer solchen Fläche würde 5,1248 mm betragen. Bei vielen theoretischen Betrachtungen, wo es nur auf die Größe und Lage der Bilder ankommt, kann man sich durch Anwendung dieses reducirten Schemas des Auges die Untersuchung sehr erleichtern. In *Fig. 53* ist die brechende Kugelfläche des reducirten Auges durch den gestrichelten Bogen *ll*, ihr Mittelpunkt bei *x* angegeben.

In dem sehr häufig vorkommenden Falle, wo man weiß, daß genaue optische Bilder auf der Netzhaut entworfen werden, und es nur darauf ankommt, den Ort des Bildes für einen bestimmten Punkt des Gegenstandes zu finden, genügt die Kenntniß der Knotenpunkte. Erlaubt man sich dabei die Vereinfachung, nur einen (und zwar als solchen am besten den zweiten) Knotenpunkt anzunehmen, so findet man den Ort des Bildes, wenn man von dem leuchtenden Punkte eine gerade Linie nach dem Knotenpunkte zieht, und diese bis zur Netzhaut verlängert; wo sie die Netzhaut trifft, ist der Ort des Bildes. Eine solche gerade Linie nennt man Richtungslinie des Sehens. Der einfach gedachte Knotenpunkt ist also der Kreuzungspunkt der Richtungslinien. Das vor der Hornhaut und das hinter der Linse liegende Stück einer solchen Linie würde zugleich dem Wege eines gewissen Strahls angehören, den man Richtungsstrahl nennen kann. Nur zwischen der vorderen Hornhaut- und hinteren Linsenfläche fällt der Richtungsstrahl nicht nothwendig mit der Richtungslinie zusammen.

Will man die genauere Construction machen, wobei man beide Knotenpunkte als getrennt betrachtet, so hat man zwei Richtungslinien zu unterscheiden. Die erste geht vom leuchtenden Punkte zum ersten Knotenpunkte, und die zweite ist parallel mit der ersten durch den zweiten Knotenpunkt zu legen. Wo letztere die Netzhaut schneidet, ist der Ort 70 des Bildes. Das außerhalb des Auges liegende Stück der ersten Richtungslinie und das im Glaskörper liegende Stück der zweiten gehören wieder dem Wege eines Lichtstrahls an, des Richtungsstrahls.

Ich nenne den Richtungsstrahl, welche die Stelle des directen Sehens trifft, die Gesichtslinie. Der vordere gerade Theil der Gesichtslinie geht also von dem fixirten Punkte des Gesichtsfeldes in der Richtung des ersten Knotenpunktes, der hintere gerade Theil von dem zweiten Knotenpunkte her nach der Netzhautgrube. Da man früher den gelben Fleck meist in dem hinteren Ende der optischen Axe des Auges gelegen glaubte, hielt man die Gesichtslinie auch für identisch mit der Augenaxe, und nannte diese Linie auch wohl Sehaxe oder Gesichtsaxe. Nach meinen Untersuchungen sind aber beide merklich von einander unterschieden. Vor dem Auge liegt die Gesichtslinie nach innen und meist etwas nach oben von der Augenaxe, die Netzhautgrube also nach außen und meist etwas nach unten von der Axe. Ich habe in *Fig. 53* die Lage der Gesichtslinie *G<sub>1</sub> G<sub>2</sub>* im horizontalen Durchschnitte des Auges angegeben, sowie ich sie in einem gut gebildeten Auge im Verhältniß zur Augenaxe *F, F''* liegen fand. Die obere Seite der Figur ist die Schläfenseite, die untere die Nasenseite.

Um die Brechung der Lichtstrahlen in den einzelnen Mitteln des Auges zu berechnen, theilen wir uns das optische System des Auges in zwei Theile, deren ersten die Hornhaut, deren zweiten die Krystalllinse ausmacht, so daß das erste Mittel des ersten Systems Luft, das Mittel zwischen beiden Systemen, oder das letzte des ersten, das erste des zweiten Systems wässrige Feuchtigkeit, das letzte Mittel des zweiten Systems Glaskörper ist.

#### Die Brechung in der Hornhaut.

Die Untersuchung der Brechung in dieser wird wesentlich vereinfacht durch den Umstand, daß die Hornhaut sehr dünn ist, fast gleichgekrümmte Flächen hat, und ihr Brechungsvermögen nur wenig das der wässrigen Feuchtigkeit übertrifft. Ich habe § 9 bei den Gleichungen 12), 12 a), 12 b) nachgewiesen, daß man an jeder brechenden Fläche eine unendlich dünne Schicht von beliebigem Brechungsvermögen und gleichgekrümmten Flächen einschieben könne, ohne die Brechung zu verändern. Man denke sich somit vor der Hornhaut eine unendlich dünne Schicht wässriger Feuchtigkeit ausgebreitet, wie sich denn sogar in Wahrheit dort eine ähnliche Schicht befindet, nämlich die Schicht der die Hornhaut netzenden Thränen. Dann können wir nachher die Hornhaut selbst als eine uhrglasförmige Linse betrachten, welche auf beiden Seiten von dem gleichen Medium, wässriger Feuchtigkeit, umgeben ist. Eine solche Linse hat eine sehr große oder unendliche Brennweite, d. h. sie verändert den Gang der Lichtstrahlen nicht merklich. Daraus folgt, daß die Brechung der Lichtstrahlen in der Hornhaut fast dieselbe sein wird, als wenn die wässrige Flüssigkeit bis an die vordere Fläche der Hornhaut reichte. Diese Annahme ist daher bis jetzt auch fast immer bei der Berechnung des Ganges der Lichtstrahlen in der Hornhaut gemacht worden, und sie ist hier nicht zu vermeiden, da wir bisher zwar gute Messungen der äußeren Hornhautkrümmung, aber keine genügend zuverlässigen für die innere besitzen.

Sollte die bezeichnete Annahme streng gerechtfertigt sein, so müßte nach § 9 Gleichung 13) sein

$$n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d = 0,$$

wo  $n_1$  das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit,  $n_2$  das der Hornhaut,  $d$  die Dicke,  $r_1$  den Krümmungshalbmesser der vorderen,  $r_2$  der hinteren Fläche <sup>71</sup> der Hornhaut bezeichnet. Diese Gleichung kann nun in der That auf die Hornhaut nicht wohl passen. Wenn wir sie schreiben:

$$(r_2 + d) - r_1 = \frac{n_1}{n_2} \cdot d,$$

so ist  $(r_2 + d)$  der Abstand des Krümmungsmittelpunktes der hinteren Fläche vom Scheitel der vorderen, und die Gleichung würde aussagen, daß der Krümmungsmittelpunkt der hinteren Fläche hinter dem der vorderen liege. Dann müßte die Hornhaut von der Mitte nach dem Rande zu an Dicke abnehmen, während in der Regel das Umgekehrte der Fall ist. Die Hornhaut wird also den Folgerungen gemäß, welche am Ende des § 9 für concavconvexe Linsen aus der Gleichung 13) gezogen sind, in der Regel als Linse in wässriger Feuchtigkeit aufgehängt eine negative, aber sehr große Brennweite haben.

Nehmen wir  $r_1 = 8$  mm,  $r_2 = 7$  mm,  $d = 1$  mm und nach W. KRAUSE  $n_2 = 1,3507$ ,  $n_1 = 1,3420$ , so wird nach § 9 Gleichung 13) die Brennweite der

in wässriger Feuchtigkeit befindlichen Hornhaut gleich — 8,7 Meter, eine Gröfse, welche wir im Verhältnisse zu den Dimensionen des Auges als unendlich groß betrachten können.

Dasselbe wurde bestätigt durch Versuche mit dem Ophthalmometer, mittels welches Instrumentes ich die Gröfse eines Objects mafs, welches sich hinter einem Glasgefäfse mit parallelen Wänden befand. Brachte ich in das Wasser eine frische Hornhaut einer menschlichen Leiche, so dafs ich das Object nur durch die Hornhaut erblickte, so war durch das Ophthalmometer keine Verkleinerung des Bildes zu entdecken. Diese war also so gering, dafs die leichte Trübung des Bildes durch die eingeführte Hornhaut hinreichte, sie unwahrnehmbar zu machen.

Um berechnen oder schätzen zu können, um wie viel sich die wirkliche Brechung am Auge von derjenigen unterscheidet, welche eintreten würde, wenn das Brechungsvermögen der Hornhaut wirklich dem der wässrigen Feuchtigkeit gleich wäre, wollen wir die optischen Constanten der Hornhaut nach der Formel § 9 Nr. 12) bestimmen, und dabei setzen,  $n_1 = 1$ ,  $n_s = n$ ,  $n_2 = n + \Delta n$ ,  $r_1 = r$ ,  $r_2 = r - \Delta r$ , wobei wir die Gröfsen  $\Delta n$ ,  $\Delta r$  und die Dicke der Hornhaut  $d$  als sehr klein gegen  $n$  und  $r$  ansehen können. Wenn wir diese Bezeichnungen in § 9 Gleichungen 12) einsetzen, und die höheren Dimensionen der kleinen Gröfsen vernachlässigen, erhalten wir die Brennweiten.

$$F_1 = \frac{1}{n} \cdot F_2 = \frac{r}{n-1} \left\{ 1 - \Delta n \cdot \frac{(n-1) \cdot d - n \cdot \Delta r}{n \cdot (n-1) \cdot r} \right\} \quad . . \quad 1).$$

Der Unterschied der Brennweiten von dem Werthe  $\frac{r}{n-1}$ , den wir durch die An-

nahme  $\Delta n = 0$  erhalten, ist eine kleine Gröfse zweiter Dimension; ebenso die Entfernung  $x$  des ersten Hauptpunktes, von der vorderen Hornhautfläche nach vorn gerechnet,

$$x = \frac{d \cdot \Delta n}{n(n-1)} \quad . . . . . \quad 1 a)$$

Die Entfernung der beiden Hauptpunkte von einander  $a$  wird sogar eine kleine Gröfse dritter Dimension.

$$a = \frac{d^2 \cdot \Delta n}{n \cdot r} \quad . . . . . \quad 1 b)$$

Für die Berechnung der Bilder wird es daher genügen, nur eine Brechung an der vorderen Fläche der Hornhaut in Betracht zu ziehen, und dabei das Brechungsvermögen der Hornhaut gleich dem der wässrigen Feuchtigkeit zu setzen.

#### Die Brechung in der Krystalllinse.

Der zweite Theil des optischen Systems des Auges besteht aus der Krystalllinse. Vor dieser befindet sich die wässrige, hinter ihr die Glasfeuchtigkeit. Da das Brechungsvermögen dieser beiden Stoffe nur äußerst geringe Unterschiede zeigt, 72 so wollen wir diesen Unterschied vernachlässigen. In optischen Systemen, deren erstes und letztes Mittel identisch ist, fallen die Hauptpunkte mit den Knotenpunkten zusammen. Wir können also bei der Krystalllinse im Auge, wie bei den gewöhnlichen Glaslinsen unserer optischen Instrumente, beide Arten von Punkten identificiren. Die Krystalllinse unterscheidet sich aber dadurch wesentlich von

künstlichen Glaslinsen, daß die Dichtigkeit ihrer Substanz nicht constant ist, sondern von außen nach innen zunimmt. Da wir das Gesetz dieser Zunahme nicht genau kennen, sind wir auch außer Stande den Gang der Lichtstrahlen durch die Linse vollständig zu berechnen, und den Ort ihrer Brennpunkte und Hauptpunkte genau zu bestimmen. Wir müssen uns begnügen, Grenzen für die Lage dieser Punkte zu finden. In dieser Beziehung lassen sich folgende Sätze aufstellen.

1) Die Brennweiten der Krystalllinse sind kleiner, als sie sein würden, wenn ihre ganze Masse das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte.

Um diesen wichtigen Satz zu beweisen, denken wir uns die Krystalllinse nach ihrer natürlichen Schichtung zerlegt in den Kern, der eine fast kugelige biconvexe Linse von positiver Brennweite darstellt, und in die einzelnen ihn umschließenden Schichten, deren zunächst der Augenaxe gelegene Theile concavconvexen Linsen entsprechen. Und zwar sind dies Linsen, die nach dem Rande zu dicker oder wenigstens nicht dünner werden, bei denen also  $r_1 \geq r_2 + d$  (s. Ende von § 9), wenn wir mit  $r_1$  den Radius der convexen, mit  $r_2$  den der concaven Fläche, und mit  $d$  die Dicke der Linse bezeichnen.

Da nach S. 81 die Brechung in einem optischen System nicht geändert wird, wenn wir unendlich dünne durch concentrische Kugelflächen begrenzte Schichten eines beliebigen brechenden Medium an beliebiger Stelle eingeschoben denken, so können wir uns zwischen je zwei Linsenschichten eine unendlich dünne Schicht Kernsubstanz eingeschaltet denken, und also alle übrigen Linsenschichten als in Kernsubstanz eingebettet betrachten. Da die einzelnen Linsenschichten nach dem Aequator der Linse hin dicker werden, so haben sie die Form von Concavlinsen, welche nach Gleichung 13) in § 9 und den sich daran schließenden Erörterungen über die Wirkung der Linsen negative Brennweite haben, wenn wie bei Glaslinsen in Luft  $n_2 > n_1$ , d. h. die Linse aus stärker brechender Substanz besteht. In unserem Falle aber ist es umgekehrt. Die in Kernsubstanz eingebetteten Linsenschichten würden  $n_2 < n_1$  haben, und deshalb wie Sammellinsen auf das in Kernsubstanz eingetretene Licht wirken. Daraus folgt nach § 9 S. 84, daß sie dieses Licht, ehe es die Hinterfläche der Krystalllinse erreicht, convergenter machen müssen, als es ohne ihre Anwesenheit in der aus Kernsubstanz gebildeten Linse geworden wäre. Somit wird es auch convergenter die Linse verlassen, und eher in deren Axe zur Vereinigung kommen, als es durch eine ganz aus Kernsubstanz bestehende ungeschichtete Linse geschehen wäre.

Daß bei dieser Verschiebung des Vereinigungspunkts auch die Brennweite verkürzt werden muß, ergibt sich, wenn wir einen der Axe parallel in der Entfernung  $q$  von ihr verlaufenden Strahl verfolgen, der also auch verlängert die erste, wie die zweite Hauptebene in der Entfernung  $q$  von der Axe trifft. Dieser muß hinter der Linse durch deren zweiten Brennpunkt gehen. Bezeichnen wir den Convergenzwinkel, unter dem der Strahl die Axe im Brennpunkt schneidet mit  $\alpha$ , so ist

$$q = F \cdot \operatorname{tg} \alpha.$$

Für denselben Strahl wird aber die Convergenz der Strahlen größer, wie wir eben gesehen, wenn wir die geschichtete Linse statt der einfachen Linse aus Kernsubstanz setzen. Wenn  $q$  gleich bleibt,  $\alpha$  größer wird, muß  $F$  kleiner werden.

Herr L. MATTHIESSEN<sup>1</sup> hat kürzlich die Strahlenbrechung in einer Linse theoretisch berechnet, die eine Zunahme des Brechungsverhältnisses von der Ober-

<sup>1</sup> L. MATTHIESSEN. *Pflüger's Archiv für Physiologie*. Bd. 38. S. 72.

fläche gegen den Kern zeigt, deren Gesetz zuvor hypothetisch angenommen, aber doch den Verhältnissen der menschlichen Krystalllinse möglichst angenähert ist.

2) Die Entfernung der Hauptpunkte von einander ist in der Krystalllinse kleiner als in einer Linse, welche dieselbe Form und das Brechungsvermögen des Kerns hätte. 75

Die Hauptpunkte sind die von der Linse selbst entworfenen Bilder eines in ihr liegenden Punktes, nämlich ihres sogenannten optischen Mittelpunktes. Wo dieser auch liegen mag, so läßt sich in ganz ähnlicher Weise, wie es eben zur Bestimmung der Brennpunkte geschehen ist, nachweisen, daß die Bilder des optischen Mittelpunktes desto näher den Oberflächen der Linse rücken werden, je mehr das Brechungsvermögen der einzelnen Schichten der Krystalllinse steigt, daß dabei also auch die Entfernung der beiden Bilder von einander algebraisch größer wird. Wenn nun sämtliche Schichten der Linse schließlich das Brechungsvermögen des Kerns erreicht haben, wird im Allgemeinen der optische Mittelpunkt der Krystalllinse nicht mehr mit dem optischen Mittelpunkte dieser neuen gleichartigen Linse zusammenfallen. Da aber bei einer Linse mit positiven Brennweiten die Entfernung der Hauptpunkte ein Maximum ist unter den Entfernungen der Bilder je eines inneren Punktes, so ist die Entfernung der Hauptpunkte dieser neuen gleichartigen Linse jedenfalls größer als die Entfernung der von ihr entworfenen Bilder des optischen Mittelpunktes der unveränderten Krystalllinse, folglich auch größer als die Entfernung der Hauptpunkte der unveränderten Krystalllinse von einander.

Es läßt sich ferner nachweisen, daß die Entfernung der Hauptpunkte der Krystalllinse einen positiven Werth hat, d. h. daß der zweite Hauptpunkt hinter dem ersten liegt, wenn wir annehmen, wie dies aus der Form der Linsenschichten hervorzugehen scheint, daß die Krümmungsradien der in der Axe gelegenen Theile der Schichtflächen größer sind als die Entfernungen dieser Flächen vom Kerne der Linse. Brechende Kugelflächen entwerfen von Punkten, welche zwischen ihnen und ihrem Mittelpunkte liegen, Bilder, die der brechenden Fläche näher sind, als das Object. Folglich wird das Bild des Mittelpunktes des Linsenkerne, welches die vordere Linsenhälfte entwirft, vor seinem Objecte, das, welches die hintere Linsenhälfte entwirft, hinter seinem Objecte liegen. Die beiden zusammengehörigen Bilder des Mittelpunktes des Linsenkerne haben also eine positive Entfernung. Da der Abstand der Hauptpunkte algebraisch größer ist als der aller anderen zusammengehörigen Bilder, so ist dieser Abstand jedenfalls positiv.

Die Hauptpunkte einer Linse, welche die Gestalt der menschlichen Krystalllinse und das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte, würden nur etwa  $\frac{1}{4}$  mm von einander entfernt sein; dadurch ist die Entfernung der Hauptpunkte der Krystalllinse 76 von einander also in sehr enge Grenzen eingeschlossen.

Die Brechungsverhältnisse der durchsichtigen Mittel des menschlichen Auges sind früher von CHOSSAT<sup>1</sup> und BREWSTER<sup>2</sup> bestimmt worden; später ist eine große Zahl solcher Messungen von W. KRAUSE<sup>3</sup> ausgeführt worden, während die erstgenannten Beobachter, wie es scheint, nur wenige Augen untersucht haben. BREWSTER brachte die zu untersuchende Substanz zwischen die krumme Fläche einer Convexlinse, welche als Objectiv eines Mikroskops diente, und ein gegen die Axe des Mikroskops senkrecht gestelltes Planglas. Dadurch wird die Brennweite des Mikroskops verändert. BREWSTER maß den Objektabstand des Mikroskops vor und nach der Einbringung der brechenden Substanz und nach der Einbringung von reinem Wasser,

<sup>1</sup> C. J. E. CHOSSAT, *Bulletin des sc. par la Société philom. de Paris*. A. 1818. Juin. p. 294.

<sup>2</sup> D. BREWSTER, *Edinburgh Philos. Journal*. 1819. No. 1. p. 47.

<sup>3</sup> W. KRAUSE, *Die Brechungsindizes der durchsichtigen Medien des menschl. Auges*. Hannover 1855.

dessen Brechungscoefficient bekannt war. CAHOUS und BECQUEREL<sup>1</sup> schlugen vor, die GröÙe der Bilder des Mikroskops zu messen, und dieser Methode ist auch W. KRAUSE gefolgt. Ich lasse hier die Beschreibung des Verfahrens folgen, welches der Letztere angewendet hat, da es für Ärzte, die ein Mikroskop zu gebrauchen pflegen, leicht ausführbar ist.

Ein gewöhnliches (KELLNERSches) Mikroskop, dessen unterer Theil in Fig. 54 abgebildet ist, wurde für die Messungen auf folgende Art eingerichtet. An die Stelle des Objectivs wurde eine biconvexe Linse von Crown-glas von etwa 30 mm Brennweite gebracht, indem die Fassung *b* in das Rohr des Mikroskops *a* eingeschraubt wurde. Die Linse befand sich in einer concaven, geschwärtzten Vertiefung, und wurde darin durch die Hülse *d*, die in der Mitte mit einer Öffnung von 2,6 mm Durchmesser versehen war, festgeschraubt. Die Linse lag luftdicht auf dem Rande dieser Öffnung an. Unter ihr wurde eine plane Glasplatte *e*, ebenfalls von Crown-glas, angebracht, vermittelt eines Ringes *f*, dessen Innenraum konisch ausgeschliffen war und auf die Hülse *d*, die ebenfalls konisch ausgeschliffen war, paßte, jedoch nicht so genau, daß nicht Luft langsam dazwischen hindurchdringen konnte.




Fig. 54.

Das zu prüfende Augenmedium wurde in den Ring *f* auf die Mitte der ebenen Platte gebracht, und dann der Ring so fest auf die Hülse *d* aufgedrückt, daß die letztere auf den vorspringenden Rand *g* aufstieß, um dadurch das Planglas sicher vertikal gegen die Axe des Mikroskops zu stellen. Nach jeder Messung konnte die Objectivlinse herausgenommen und gereinigt werden.

Im Oculare des Mikroskops war ein Glasmikrometer, getheilt in  $\frac{1}{100}$  Wiener Linien, befestigt; auf den Objecttisch wurde ein eben solches, getheilt in  $\frac{1}{10}$  Linien, gelegt, und das Mikroskop so gestellt, daß beide Theilungen gleichzeitig deutlich gesehen wurden, und bestimmt, wie viel Theilstrichen des unteren Mikrometers einer des oberen entsprach. Eben solche Messungen wurden angestellt, wenn bloß Luft zwischen der Objectivlinse und der ebenen Platte, und wenn destillirtes Wasser dazwischen war.

Zur Berechnung der Resultate können wir die Gleichungen 12) in § 9 benutzen; zwar beziehen sich diese nur auf zwei brechende Flächen und in dem Objectivsystem von KRAUSE's Apparate haben wir vier, nämlich die erste und zweite Fläche des Planglases, die erste und zweite Fläche der biconvexen Linse. Wenn wir uns das System in zwei zerlegen, von denen das erste die beiden ebenen Flächen umfaßt, das zweite die beiden Flächen der Linse, so sind die Brennweiten des ersten Systems unendlich. Bezeichnen wir die erste (untere) Brennweite des Planglases entsprechend der Bezeichnung in § 9. Gleichung 11a) bis 11f) mit  $f_1$ , die zweite des Planglases mit  $f_2$ , die erste (untere) der Linse mit  $q_1$ , die zweite mit  $q_2$ , den Abstand des zweiten Hauptpunktes des Planglases vom ersten der Linse mit  $d$ , so giebt die letztere der Gleichungen 11f), wenn wir  $f_2$  unendlich groß setzen, für die zweite (obere) Brennweite des ganzen Systems:

$$F_2 = q_2.$$

77 Die erste Brennweite des ganzen Systems ist dieser gleich, da das erste und letzte Mittel (Luft) identisch sind.

Für die Entfernung des zweiten Hauptpunktes des ganzen Systems vom zweiten Hauptpunkte der Linse giebt die Gleichung 11e) den Werth 0, wenn wir  $f_2 = \infty$  setzen. Der zweite Hauptpunkt und zweite Brennpunkt sind also in diesem Falle dieselben, als wenn das zwischen der ebenen Platte und der Linse eingeschlossene Mittel nach vorn unbegrenzt wäre.

Wir nennen also, entsprechend der Bezeichnung die Gleichung 12) in § 9, das Brechungsverhältniß der zu prüfenden Substanz  $n_1$ , das der Glaslinse  $n_2$ ; das der Luft  $n_3$  können wir = 1 setzen; dann entspricht der Werth von  $F_2$  der genannten Gleichungen der Brennweite  $F$  unseres Objectivsystems:

$$F = \frac{n_2 \cdot r_1 \cdot r_2}{n_2 \cdot (1 - n_2) \cdot r_1 + [n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d] \cdot (n_2 - n_1)}.$$

A. C. BECQUEREL, L'Institut. Scienc. math., phys. et natur. 1840. p. 399.

# § 10. MESSUNGEN DER OPTISCHEN CONSTANTEN DER KRYSTALLINSE. 97

Nennen wir  $F_0$  die Brennweite des Objectivsystems für den Fall, daß destillirtes Wasser zwischen die Platte und Linse eingebracht ist,  $n_0$  das Brechungsvermögen des destillirten Wassers, und  $\Phi$  die Brennweite für den Fall, wo sich Luft zwischen der Platte und Linse befindet, so erhalten wir noch zwei ähnliche Gleichungen, welche wir mit der vorigen in folgender Form schreiben können:

$$\left. \begin{aligned} F \cdot A - n_1 \cdot r_1 \cdot r_2 &= n_1 \cdot F \cdot B \\ F_0 \cdot A - n_2 \cdot r_1 \cdot r_2 &= n_0 \cdot F_0 \cdot B \\ \Phi \cdot A - n_2 \cdot r_1 \cdot r_2 &= \Phi \cdot B \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 2),$$

wenn wir der Abkürzung wegen setzen:

$$\begin{aligned} A &= n_2 \cdot [(1 - n_2) \cdot r_1 + n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d] \\ B &= n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d. \end{aligned}$$

Wenn wir die zweite der Gleichungen 2) von der ersten, und die dritte von der zweiten abziehen, erhalten wir:

$$\begin{aligned} (F - F_0) \cdot A &= (n_1 \cdot F - n_0 \cdot F_0) \cdot B \\ (F_0 - \Phi) \cdot A &= (n_0 \cdot F_0 - \Phi) \cdot B. \end{aligned}$$

Diese beiden Gleichungen durch einander dividirt geben:

$$\frac{F - F_0}{F_0 - \Phi} = \frac{n_1 \cdot F - n_0 \cdot F_0}{n_0 \cdot F_0 - \Phi}.$$

Daraus folgt endlich:

$$n_1 = 1 + (n_0 - 1) \cdot \frac{F_0 \cdot (F - \Phi)}{F \cdot (F_0 - \Phi)} \dots \dots \dots 2a).$$

Wir können also das Brechungsverhältniß der zu prüfenden Substanz  $n_1$  berechnen, wenn wir das Brechungsverhältniß des destillirten Wassers  $n_0$  kennen und die drei Brennweiten des Objectivsystems  $F$ ,  $F_0$  und  $\Phi$ . Diese Brennweiten lassen sich aber aus der Messung der Bilder berechnen. Ist  $b$  die Größe eines Theilstrichs des unteren Mikrometers, und  $\beta$  die absolute Größe seines in der Ocularblendung des Mikroskops entworfenen Bildes, ohne Rücksicht auf seine umgekehrte Stellung,  $F$  die Brennweite des Objectivsystems und  $g$  die Entfernung des Bildes  $\beta$  vom zweiten Hauptpunkte des Objectivsystems, so ist nach § 9 Gleichung 8b):

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{b} &= \frac{g - F}{F} \text{ oder} \\ F &= \frac{g \cdot b}{b + \beta} \dots \dots \dots 2b) \end{aligned}$$

Wenn man  $b$  und  $\beta$  gemessen hat, würde man also  $g$  noch kennen müssen, um  $F$  zu finden. Vorausgesetzt aber, daß  $g$  in allen Fällen dasselbe bleibt, was in KRAUSE'S Apparat mit großer Annäherung der Fall ist, würde sich dessen Werth aus der Gleichung für  $n_1$  fortheben, braucht also dann nicht gekannt zu sein. Lassen wir den drei Brennweiten  $F$ ,  $F_0$  und  $\Phi$  entsprechen die drei Werthe  $\beta$ ,  $\beta_0$  und  $b$ , so wird der Werth von  $n_1$

$$n_1 = 1 + (n_0 - 1) \cdot \frac{b - \beta}{b - \beta_0} \dots \dots \dots 2c).$$

Zur Berechnung von  $n_1$  braucht man also unter diesen Umständen nicht einmal die Größe des Objects  $b$  zu kennen, welches man unter das Mikroskop gelegt hat, sondern es genügt, irgend ein beliebiges Object zu nehmen, wenn es nur immer dasselbe bleibt.

Der Werth von  $g$  ist in diesen Messungen constant, wenn sich die Stellung des Mikrometers im Oculare, und die des zweiten Hauptpunktes des Objectivsystems nicht ändert. Die letztere ist bei Einschaltung verschiedener Flüssigkeiten zwischen der ebenen Platte und Linse nur dann streng constant, wenn die obere Fläche der Linse eben ist.

In § 9 Gleichung 12a) ist  $h_2$  die Entfernung des zweiten Hauptpunktes von der hinteren Fläche der Linse. Wenn  $r_2$  nicht unendlich ist, ist diese Entfernung von  $n_1$ , dem Brechungsvermögen der eingeschalteten Substanz, abhängig. Wenn man  $r_2$  unendlich groß setzt, nachdem man Zähler und Nenner des Ausdrucks für  $h_2$  dadurch dividirt hat, wird

$$h_2 = -\frac{n_2 \cdot d}{n_1},$$

also unabhängig von  $n_1$ . Es möchte daher besser sein, bei solchen Messungen statt der biconvexen eine planconvexe Linse zu nehmen, die plane Seite nach oben gewendet. Indessen ist der Fehler, welcher durch Anwendung einer biconvexen entstehen kann, jedenfalls äußerst unbedeutend, wenn nur die Dicke der Linse gegen die Länge des Körpers des Mikroskops vernachlässigt werden kann.

BREWSTER hat bei seinen Messungen den Brechungscoefficienten des destillirten Wassers = 1,3358 gesetzt, was nach FRAUNHOFER's Messungen etwa der Linie E in Grün, also den Strahlen mittlerer Brechbarkeit entsprechen würde. KRAUSE zieht auf LISTING's Rath vor, als Grundlage den intensivsten Strahl des Spectrums zu nehmen, welcher nach FRAUNHOFER den Brechungsindex 1,33424 hat. Ich gebe in der folgenden Tafel die Resultate, welche CHOSSAT, BREWSTER und KRAUSE für das menschliche Auge erhalten haben. W. KRAUSE hat 20 Augen von 10 Individuen untersucht und sehr beträchtliche individuelle Abweichungen gefunden.

Tabelle der Brechungsindices menschlicher Augen.

Beobachter.	Hornhaut.	Wässrige Feuchtig-keit.	Glas-körper.	Krystalllinse.		
				Äußere Schicht.	Mittlere Schicht.	Kern.
CHOSSAT.	1,33	1,338	1,339	1,338	1,395	1,420
BREWSTER. $n_0 = 1,3358$ .		1,3366	1,3394	1,3767	1,3786	1,3896
W. KRAUSE. { $n_0 = 1,3342$ .	Max.	1,3569	1,3557	1,3569	1,4743	1,4807
	Min.	1,3431	1,3349	1,3361	1,3431	1,3523
	Mittel.	1,3507	1,3420	1,3485	1,4053	1,4294
HELMHOLTZ. $n_0 = 1,3354$ .		1,3365	1,3382	1,4189		

Die von mir selbst angestellten Messungen sind in folgender Weise ausgeführt: Es wurden Proben der zu untersuchenden Flüssigkeit zwischen einer ebenen Glasplatte und der concaven Fläche einer kleinen planconcaven Linse eingeschlossen; Bilder dieses optischen Systems wurden mit dem Ophthalmometer gemessen, daraus die Brennweiten berechnet. Außerdem konnte der Radius der concaven Linsenfläche direct mit dem Ophthalmometer bestimmt werden, ähnlich wie dies in § 2 für den Krümmungsradius der Hornhaut geschehen ist. Unter diesen Umständen war es nicht nöthig, auch mit destillirtem Wasser zwischen den Gläsern zu beobachten, und dessen Brechungsverhältniß als bekannt vorauszusetzen. Das Brechungsverhältniß des destillirten Wassers fand sich auf diese Weise 1,3351, was zwischen BREWSTER's und KRAUSE's Zahl liegt.

KRAUSE hat noch eine Reihe von Brechungsverhältnissen an Kalbsaugen untersucht, namentlich in der Absicht zu ermitteln, ob die Brechungsverhältnisse in den ersten 24 Stunden nach dem Tode sich merklich verändern, indem er 20 solcher Augen unmittelbar nach dem Tode untersuchte, 20 andere, nachdem sie 24 Stunden bei 15° R. aufbewahrt worden waren. Er fand folgende Mittelzahlen:

	frische Augen	nach 24 Stunden
Hornhaut . . . . .	1,3467	1,3480
Wässrige Feuchtigkeit . . . . .	1,3421	1,3415
Glaskörper . . . . .	1,3529	1,3528
Äußere Linsenschicht . . . . .	1,3983	1,4013
Mittlere Linsenschicht . . . . .	1,4194	1,4211
Linsenkern . . . . .	1,4520	1,4512.



Daraus geht hervor, daß sich die Brechungsverhältnisse der Kalbsaugen in den ersten 24 Stunden nach dem Tode nicht merklich verändern, und es läßt sich demnach dasselbe für die menschlichen annehmen.

Später sind verschiedene Bestimmungen der Brechungsverhältnisse der brechenden Theile des Auges mit dem dafür sehr geeigneten Refractometer von **ABBE**<sup>1</sup> ausgeführt worden. In diesem Instrumente sind zwei rechtwinkelige Prismen mit den Hypotenusenflächen aneinander gelegt, zwischen diese Flächen wird ein Tropfen der Substanz, die man untersuchen will, gebracht, und dann untersucht, unter welchem Winkel totale Reflexion eintritt. Diese tritt bekanntlich für Licht, das sich in einem stärker brechenden Medium bewegt, ein, wenn das Brechungsgesetz

$$\sin \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1} \cdot \sin \alpha_2$$

erfordern würde, daß  $\sin \alpha_1 > 1$  würde, was der Sinus eines reellen Winkels nicht kann. Die Grenze ist also gegeben, wo

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

**ABBE**'s Instrument erlaubt diesen Winkel genau zu messen, mit gleichzeitiger Compensation der Farbenzerstreuung und Messung der mittleren Dispersion. Man braucht für diese Messungen nur äußerst wenig der betreffenden Substanz.

Bestimmungen nach dieser Methode sind ausgeführt von den Herren **SIGMUND FLEISCHER**<sup>2</sup>, **HIRSCHBERG**<sup>3</sup>, **AUBERT** und **MATTHIESSEN**<sup>4</sup>. Herr **HIRSCHBERG** hat besonders frische Augen benutzen können; er fand

für Kammerwasser: 1,337 (Max. 1,33799 — Min. 1,33705)

für Glaskörper 1,336 (Max. 1,33798 — Min. 1,33541)

Die Herren **AUBERT** und **MATTHIESSEN** fanden gemeinsam bei den Augen eines Mannes von 50 Jahren und eines Kindes von 2 Tagen, während das Brechungsverhältniß des destillirten Wassers, mit demselben Instrument bestimmt, gleich 1,3310 gefunden wurde:

	Mann		Kind	
	I.	II.	I.	II.
Hornhaut. . . . .	—	1,377	1,3721	—
Kammerwasser . . .	—	—	1,3338	—
Vordere Linsenkapsel	—	—	1,3831	1,3780
Hintere . . . . .	1,3374	1,3376	1,3503	1,3572
Außere Linsenschicht	1,3953	1,3967	1,3967	—
Mittlere . . . . .	1,4087	1,4067		
Kern . . . . .	1,4119	1,4093		
Glaskörper. . . . .	—	1,3348	1,3340	

#### Experimentelle Bestimmung der Cardinalpunkte todter Krystallinsen.

Da aus der Gestalt und den Brechungsverhältnissen der einzelnen Schichten der 79 Krystallinse deren Brennweite nicht unmittelbar zu berechnen ist, so will ich hier die Resultate von directen Messungen der optischen Constanten zweier menschlicher Linsen anführen, welche ich etwa 12 Stunden nach dem Tode untersuchen konnte.

An der Luft trocken und faltet sich die Oberfläche einer aus dem Auge genommenen Linse sehr bald, in Wasser quillt sie auf und wird trübe. Ich habe deshalb die todtten Linsen während ihrer Untersuchung mit Glasfeuchtigkeit umgeben. Außerdem sind die Linsen außerordentlich nachgiebig gegen jeden Zug und Druck; so lange sie aber von

<sup>1</sup> E. **ABBE**. *Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs- und Zerstreuungsvermögens*. Jena 1874.

<sup>2</sup> S. **FLEISCHER**. *Neue Bestimmungen der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges*. Inaug. Diss. Jena 1874.

<sup>3</sup> J. **HIRSCHBERG**, *Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde*. Bd. IV. Wiesbaden 1874.

<sup>4</sup> H. **AUBERT**, *Grundsätze der Physiologischen Optik*. Leipzig 1876.

ihrer elastischen und sie sehr prall umschliessenden Kapsel umgeben sind, sind diese Formveränderungen vorübergehend. Man muß die Linsen während der Untersuchung also so lagern, daß sie keinem äußeren Zuge oder Drucke ausgesetzt sind. Ich that das




Fig. 55.

mit Glasfeuchtigkeit, legt dann die Krystalllinse, welche man vorsichtig und ohne Verletzung oder harte Berührung aus dem Auge genommen hat, mit ihrer platteren Seite auf das Diaphragma *bb*. Dann füllt man oben noch etwas Glasfeuchtigkeit nach, bis sie bis zum oberen Rande des Messinggefäßes steht, und deckt die zweite planparallele Glasplatte *dd* darüber, so daß diese auch oben der Glasfeuchtigkeit eine gerade Oberfläche giebt. Da ich mein Ophthalmometer nicht bequem vertical stellen konnte, so setzte ich auf die Glasplatte *dd* noch ein rechtwinkeliges, gleichschenkeliges Glasprisma *f*, welches das von unten her durch die Linse kommende Licht horizontal reflectirte. Das Ganze setzt man dann bequem auf den Körper eines Mikroskops, von dem man alle Gläser und die enge Blendung am unteren Theile entfernt hat, und bringt eine Messingplatte mit GRAVESAND'schen Schneiden, deren Zwischenraum als optisches Object für die Krystalllinse gebraucht werden soll, einmal auf den Objecttisch des Mikroskops, und dann  
80 wieder dicht unter die Glasplatte *cc*, zwischen sie und den oberen Rand des Körpers des Mikroskops. Zur Beleuchtung gebraucht man den Spiegel des Mikroskops, indem man ihn von unten her Licht durch den zwischen den Schneiden gelegenen Ausschnitt der Messingplatte werfen läßt. Mittels des Ophthalmometers mißt man nun die Gröfse des Bildes, welches die Krystalllinse von dem Ausschnitte der Messingplatte entwirft.

Zur Rechnung muß man die Entfernung des Ausschnitts zwischen den GRAVESAND'schen Schneiden von der unteren Fläche der Platte *cc* kennen. Diese Gröfse sei  $a_1$ , wenn der Schirm auf dem Tische des Mikroskops liegt, und  $a_2$ , wenn er dicht unter der Platte liegt. Je größer man  $a_1$  und je kleiner man  $a_2$  machen kann, desto bessere Resultate giebt der Versuch. Ferner muß man die Dicke der Platte *cc* kennen, welche wir  $c$  nennen wollen, und wenigstens annähernd ihr Brechungsvermögen  $n_c$ , endlich die Entfernung  $b$  zwischen der oberen Fläche der Platte *cc* und dem oberen Rande der Öffnung *bb*, und das Brechungsverhältniß des Glaskörpers gegen Luft  $n_g$ . Ferner sei  $b_1$  die Entfernung der GRAVESAND'schen Schneiden von einander zu der Zeit, wo sie auf dem Tische des Mikroskops um  $a_1$  entfernt von der Platte *c* lagen,  $\beta_1$  die Breite des von der Krystalllinse entworfenen Bildes, ihres Zwischenraums, welche in diesem Falle eine negative Gröfse ist wegen der Umkehrung des Bildes,  $b_2$  und  $\beta_2$  die entsprechenden Gröfsen bei der anderen Lage des Schirms,  $f$  die gesuchte Brennweite der Linse in Glasfeuchtigkeit, und  $x$  der Abstand ihres ersten Knotenpunktes von der Ebene des oberen Randes der Öffnung *bb*. So ergiebt sich aus dem, was über die Brechung in ebenen Platten § 9 Gleichung 3 e) und 6 c) gefunden ist, daß die Lichtstrahlen, wenn sie in der Glasfeuchtigkeit vor der Krystalllinse angekommen sind, einem Bilde von der Gröfse  $b_1$  und  $b_2$  entsprechen, welches in der Entfernung beziehlich  $\left(n \cdot a_1 + \frac{n}{n_c} \cdot c + b + x\right)$

oder  $\left(n \cdot a_2 + \frac{n}{n_c} \cdot c + b + x\right)$  liegt. Die Gröfse des Bildes  $\beta_1$  oder  $\beta_2$  wird nachher durch

# § 10. MESSUNGEN DER OPTISCHEN CONSTANTEN DER KRYSTALLINSE. 101

die Brechung an den ebenen Flächen der oberen Glasplatte nicht weiter verändert. Wir haben also die Gleichungen:

$$\frac{\beta_1 - b_1}{\beta_1} = \frac{n \cdot a_1 + \frac{n}{n_c} \cdot c + b + x}{f}$$

$$\frac{\beta_2 - b_2}{\beta_2} = \frac{n \cdot a_2 + \frac{n}{n_c} \cdot c + b + x}{f}$$

Durch Subtraction erhält man:

$$\frac{\beta_1 - b_1}{\beta_1} - \frac{\beta_2 - b_2}{\beta_2} = \frac{n \cdot (a_1 - a_2)}{f},$$

woraus  $f$  zu finden ist:

$$f = \frac{n \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot (a_1 - a_2)}{b_2 \cdot \beta_1 - b_1 \cdot \beta_2},$$

und dann erhält man aus einer der beiden früheren Gleichungen auch  $x$ . Man vergesse bei der Rechnung nicht, daß  $\beta_1$ , wenn  $a_1$  größer als die Brennweite ist, ein umgekehrtes Bild, also negativ ist. Die GröÙe  $x$  ist nicht unmittelbar gleich dem Abstände des Knotenpunktes von der vorderen Fläche der Linse zu setzen, sondern bedarf dazu noch einer kleinen Correction, weil die gekrümmte Fläche der Linse sich etwas unter die Ebene der Öffnung, auf deren Rändern sie ruht, herabwölbt. Wenn man den Durchmesser der Öffnung und den Krümmungsradius der Linse kennt, ist die Höhe des betreffenden Kugelabschnitts leicht zu berechnen.

Den Abstand des zweiten Knotenpunktes von der hinteren Fläche der Linse erhält man in derselben Weise, nachdem man die Linse umgekehrt hat.

Die kleine GröÙe  $\frac{c}{n_c}$  kann man durch Beobachtungen mit dem Ophthalmometer bestimmen, indem man die Glasplatte  $cc$ , ähnlich wie sie hier zwischen dem Spalt und 81 der Krystalllinse angebracht ist, zwischen diesen und eine kleine Glaslinse von bekannter Brennweite und bekannter Lage der Knotenpunkte bringt. In ähnlicher Weise kann auch die GröÙe  $b$  ermittelt werden. Dieselben Gleichungen, welche wir für die Ermittlung von  $x$  und  $f$  aufgestellt haben, können bei bekanntem  $x$  und  $f$  auch dienen,  $b$  oder  $\frac{c}{n_c}$  zu ermitteln.

Die Krümmungshalbmesser für die Scheitel der Linse können entweder, wie oben angegeben ist, durch Spiegelung ermittelt werden, oder auch durch Brechung. Zu dem Ende läßt man die Linse in ihrem Messinggehäuse liegen, und entfernt nur den Theil der Glasfeuchtigkeit, welcher ihre obere Fläche bedeckt, und stellt nun entweder den Ausschnitt zwischen den GRAVESAND'schen Schneiden vor dem Prisma  $f$ , etwas seitlich von der Gesichtslinie des Ophthalmometers auf, und mißt die GröÙe seines Spiegelbildes, oder man läßt den Messingschirm mit den Schneiden auf dem Objecttische des Mikroskops liegen, und mißt das dioptrische Bild, welches jetzt entworfen wird. Wie die Messung des Spiegelbildchens zur Rechnung zu benutzen ist, ist schon oben angegeben. Für die dioptrische Messung mögen  $b_1$ ,  $\beta_1$  und  $f$  die bisherige Bedeutung behalten,  $\beta_2$  die GröÙe des Bildes bezeichnen, nachdem man die Glasfeuchtigkeit von der oberen Fläche der Linse entfernt hat, und  $y$  der Abstand des oberen Knotenpunktes von der oberen Fläche sein. (Dieser Abstand bezieht sich immer auf den Fall, wo die Linse in Glasfeuchtigkeit liegt.) Endlich sei  $R$  der Krümmungsradius im Scheitel der oberen Fläche. Dann kann  $R$  aus der Gleichung gefunden werden:

$$R \cdot \frac{n \cdot (\beta_1 - \beta_2)}{(n - 1) \cdot \beta_2} = f \cdot \frac{b_1 - \beta_1}{b_1} - y.$$

Ich habe für den eigenthümlichen Bau der Linse erwiesen, daß ihre Brennweite kürzer sei, als wenn sie ganz und gar die Dichtigkeit und das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte. Wollte man also eine homogene Linse von gleicher Gestalt und Größe und gleicher Brennweite, wie der Krystallkörper ist, herstellen, so würde man dieser ein noch höheres Brechungsvermögen geben müssen, als selbst sein Kern hat. Dieses Brechungsvermögen einer imaginären gleichgestaltigen und gleichwerthigen homogenen Linse hat SENFF das totale Brechungsvermögen genannt. Es ist wohl zu unterscheiden von dem mittleren Brechungsvermögen, welches dem arithmetischen Mittel sämtlicher Schichten entspricht. Das totale ist im Gegentheile höher als das höchste Brechungsvermögen der dichtesten Theile der Linse. Ich gebe hier zunächst eine Zusammenstellung der von mir für menschliche Linsen gefundenen Werthe, die Lineardimensionen in Millimetern. Brennweite und Hauptpunkte beziehen sich auf den Fall, wo die Linse von Glasfeuchtigkeit umgeben ist. Die Krümmungshalbmesser sind durch Spiegelung bestimmt.

1) Brennweite . . . . .	45,144	47,435
2) Abstand des ersten Hauptpunktes von der vorderen Fläche . . . . .	2,258	2,810
3) Abstand des zweiten Hauptpunktes von der hinteren Fläche . . . . .	1,546	1,499
4) Dicke der Linse . . . . .	4,2	4,314
5) Krümmungshalbmesser im Scheitel der vorderen Fläche . . . . .	10,162	8,865
6) Krümmungshalbmesser im Scheitel der hinteren Fläche . . . . .	5,860	5,889
7) Totales Brechungsvermögen . . . . .	1,4519	1,4414.

#### Form der Krystalllinse an lebenden Augen.

Ob aber Form und Brennweite todter Linsen denen des lebenden fernsehenden Auges gleich sind, ist mir durch Messungen, die ich an lebenden Augen ausgeführt habe, zweifelhaft geworden. Ich habe nämlich die Dicke der Linse an drei lebenden Personen zum Theil um mehr als  $\frac{1}{2}$  mm kleiner gefunden, als die kleinsten Werthe der Dicke sind, die man an todtten Linsen findet<sup>1</sup>. Wie man die Entfernung der Pupille von der vorderen Hornhautfläche findet, ist in § 3 beschrieben. Dicht am Pupillarrande der Iris befindet sich auch die vordere Linsenfläche. Um die Dicke der Linse zu bestimmen, muß man also noch die Entfernung der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut zu ermitteln suchen.




Fig. 56.

Es sei in Fig. 56 *AA* die Hornhaut, *B* die Linse. Es falle in der Richtung *Cc* Licht in das Auge, werde gebrochen an der Hornhaut und vorderen Linsenfläche, dann an der hinteren Linsenfläche in *i* reflectirt. Der zurückgeworfene Strahl trete bei *d* aus der Hornhaut und gehe fort in der Richtung *dD*, wo er das Auge des Beobachters trifft. Jetzt bringe der Beobachter sein Auge nach *C* genau an die Stelle des Lichts und das Licht nach *D* genau an die frühere Stelle seines Auges, so wird ein Lichtstrahl wieder genau auf demselben Wege, nur in umgekehrter Richtung *Dd* *ic* *C* vom Lichte zum Auge des Beobachters gehen, und es wird bei dieser zweiten Stellung wieder genau dieselbe Stelle der hinteren Linsenfläche das Licht zurückwerfen, wie bei der ersten. Indem man den Ort des Lichts und des Auges des Beobachters, den Ort des beobachteten

Auges, so wie den Fixationspunkt des letzteren durch passende Abmessungen bestimmt, erhält man die Winkel, welche die Linien *Cc*, *Dd* und die Gesichtslinie des beobachteten

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, *Graefe's Archiv für Ophthalmologie*. Bd. I. (2.) S. 56.

Auges  $Gg$  mit einander bilden. Um die Punkte  $c$  und  $d$  auf der Hornhaut zu finden, bringt man, wenn das Auge des Beobachters in  $D$  steht, ein kleines Licht entfernt vom Auge in  $E$  so an, daß für den Beobachter der von der Hornhaut entworfene Reflex dieses Lichts mit dem von der hinteren Linsenfläche entworfenen Reflexe des Lichts  $C$  zusammenfällt. Dies geschieht, wenn der Strahl  $Ed$  nach  $D$  zurückgeworfen wird, wenn also die Halbirungslinie des Winkels  $EdD$  senkrecht auf der Hornhautfläche steht. Es sei  $ed$  diese Halbirungslinie. Hat man durch passende Abmessungen den Winkel  $EdD$  oder  $EdG$  bestimmt, so berechnet sich daraus leicht der Winkel, den  $ed$  mit  $Gg$  bildet, und daraus, wenn man die Form und Krümmung der Hornhaut schon gemessen hat, die Länge des Hornhautbogens, der zwischen beiden liegt, oder die Lage des Punktes  $d$  auf der Hornhaut. Eben so wird die Lage des Punktes  $c$  bestimmt.

Jetzt kennt man also die Lage der Punkte  $c$  und  $d$ , die Richtung der Linien  $Cc$  und  $Dd$ ; man verlängere beide, bis sie sich in  $h$  schneiden, so ist  $h$  der scheinbare Ort des spiegelnden Punktes der hinteren Linsenfläche, d. h. der Ort, wie er durch die Substanz der Linse und Hornhaut hin erscheint.

Die nöthigen Data zu diesen Bestimmungen bekommt man auf folgende Weise. <sup>a</sup>

Es wird, wie in *Fig. 15*, in einiger Entfernung vor dem beobachteten Auge  $A$  eine Scale aufgestellt. Symmetrisch zur Linie  $AB$  werden die beiden Stellungen des Ophthalmometers (von dem man aber nur das Fernrohr benutzt) in  $G_1$  und  $G_2$  construirt und bezeichnet, so daß man das Instrument leicht aus der einen in die andere bringen kann. Wenn das Fernrohr in  $G_1$  steht, wird in  $G_2$  ein Schirm mit einer Öffnung aufgestellt, durch welche eine große und helle Lampenflamme ihr Licht auf das Auge  $A$  wirft. Das Gesichtszeichen  $F$  wird so gestellt, daß die Axe der Hornhaut nach dem Punkte  $B$  gerichtet ist. Außerdem wird an der Scale verschiebbar noch ein kleiner Schirm mit einer engeren, durch ein blaues Glas verschlossenen Öffnung angebracht, hinter der ein Wachslichtchen steht. Die ganze Anordnung, wie sie dem beobachteten Auge erscheint, ist in *Fig. 57* dargestellt.  $F$  ist das Gesichtszeichen,  $E$  der Schirm mit dem blauen Lichtchen. Man verschiebt  $E$  so lange, bis sich der Hornhautreflex des blauen Lichts mit dem Linsenreflex der großen Flamme deckt, und merkt den Theilstrich der Scale, wo  $E$  steht. Dann vertauscht man die Stellungen des Fernrohrs und der Lampe, und wiederholt dasselbe Verfahren.




Fig. 57.

Die Orte der Hornhautbildchen, und den Durchschnittspunkt der Gesichtslinien des Beobachters im beobachteten Auge kann man ganz ebenso, wie ich es für die Iris beschrieben habe, bestimmen. Ich habe es für die folgenden Beobachtungen mit Berücksichtigung der Ellipticität der Hornhaut gethan.

Falls die Linse ein Rotationskörper wäre, dessen Axe genau mit der der Hornhaut zusammenfielen, müßte bei diesem Verfahren der spiegelnde Punkt der hinteren Linsenfläche, also auch sein scheinbarer Ort, der Durchschnittspunkt der Gesichtslinien des Beobachters, in der Axe der Hornhaut liegen. Meine Versuche zeigen, daß das nicht der Fall sei.

In dem Auge O. H. ist die Abweichung allerdings so gering, daß sie kleinen Beobachtungsfehlern in der Bestimmung der Hornhaut zugeschrieben werden könnte; aber in den beiden andern Augen ist sie dafür zu groß. Ich gebe im Folgenden die Ordinaten der scheinbaren Lage des reflectirenden Punktes  $c$  für die drei untersuchten Augen an. Als Abstand von der Axe der Hornhaut habe ich angegeben die Länge des Lothes, welches von  $c$  auf die Hornhautaxe gefällt ist, und als Abstand von der Hornhaut die Länge zwischen dem Fußpunkte des Lothes und dem Scheitelpunkte der Hornhaut. Die so gefundene Lage des Punktes  $c$  ist immer nur eine scheinbare, wie sie dem Beobachter durch die Linse und Hornhaut erscheint, indessen ist die Abweichung von der wirklichen Lage jedenfalls nicht sehr bedeutend, da die hintere Linsenfläche dem zweiten Knotenpunkte des Auges sehr nahe liegt. Die Brechung in der Hornhaut kann berechnet, und dadurch die Lage des Punktes  $c$  gefunden werden, wie sie einem in der wässrigen Feuchtigkeit stehenden Beobachter erscheinen würde. Die Bezeichnung scheinbare Lage in Luft und in wässriger Feuchtigkeit erklärt sich hiernach. Es sind die Resultate zweier Versuchsreihen angegeben.

Scheinbare Lage des Punktes  $c$  der hinteren Linsenfläche.

		O. H.	B. P.	J. H.
Abstand von der Hornhaut	in Luft	{ 6,763 6,788	{ 7,013 6,993	{ 6,655 6,662
	in Hum. aq.	{ 6,899 6,932	{ 7,162 7,189	{ 6,979 6,989
Abstand von der Hornhautaxe nach der Nase zu	in Luft	{ 0,034 0,173	{ 0,190 0,236	{ 0,194 0,284
	in Hum. aq.	{ 0,026 0,133	{ 0,143 0,177	{ 0,146 0,213

Die scheinbare Lage des Punktes  $c$ , von der wässrigen Feuchtigkeit aus gesehen, ist nun immer noch nicht seine wahre Lage, da die von ihm kommenden Lichtstrahlen noch in der Linse gebrochen werden. Leider lassen sich die optischen Constanten der Linse an den lebenden Augen noch nicht ermitteln. Glücklicher Weise hat aber die Brechung in der Linse einen höchst geringen Einfluss auf die scheinbare Lage des Punktes  $c$ , weil dieser ihrem hinteren Knotenpunkte sehr nahe liegt, und wir brauchen deshalb an dem Abstände des Punktes  $c$  von der Hornhaut nur eine kleine Correction anzubringen, die wir nach den optischen Constanten todter Linsen bestimmen können. Die wahre Entfernung des Punktes  $c$  von der Hornhautaxe läßt sich dagegen nicht bestimmen, weil die Linsenflächen offenbar schief von der Hornhautaxe geschnitten werden, und wir die Größe dieser Abweichung, welche von großem Einfluss auf die scheinbare seitliche Verschiebung des Punktes  $c$  ist, nicht kennen.

Ein durch eine Convexlinse gesehener Punkt, der nahe hinter ihrem zweiten Knotenpunkte liegt, wird scheinbar vorgerückt um die Entfernung ihrer Knotenpunkte von einander, ein Theil dieser Verschiebung wird aber wieder dadurch aufgehoben, daß die Distanz des Bildes vom ersten Knotenpunkte nach hinten gerechnet, etwas größer ausfällt, als die wahre Entfernung des Punktes vom zweiten Knotenpunkte ist. Ist für eine in wässriger Feuchtigkeit liegende Linse die Entfernung der Knotenpunkte von einander  $d$ , die Entfernung des Punktes  $c$  vom hinteren Knotenpunkte  $a$ , und  $p$  die Brennweite der Linse, so ist die scheinbare Verschiebung  $x$  des Punktes  $c$  nach vorn,

wenn man die höheren Potenzen von  $\frac{a}{p}$  vernachlässigt, gleich

$$x = d - \frac{a^2}{p}$$

In LISTING's schematischem Auge ist für die in wässriger Feuchtigkeit liegende Linse:

$$\begin{aligned}d &= 0,203 \text{ mm} \\a &= 1,424 \text{ „} \\p &= 44,301 \text{ „} \\x &= 0,157 \text{ „}\end{aligned}$$

Die Messungen an todtten Linsen (S. 102) ergaben:

$$\begin{aligned}a &= 1,546 & 1,499 \\p &= 45,14 & 47,43,\end{aligned}$$

was mit LISTING's Annahmen hinreichend übereinstimmt;  $d$  konnte ich leider nicht genau genug bestimmen, weil sich in dieser sehr kleinen GröÙe die Fehler in der Bestimmung der Dicke der Linse und der Abstände der beiden Knotenpunkte von den betreffenden Linsenflächen addirten.

Wende ich den gefundenen Werth der Correction  $x$  auf die von mir durchgemessenen Augen an, (wie dies auszuführen, wird in § 12 beschrieben werden), so ergibt sich:

	O. H.	B. P.	J. H.
Abstand vom Scheitel der Hornhaut { der hinteren Linsenfläche	7,172	7,232	7,141
{ der Pupille	4,024	3,597	3,739
Dicke der Linse in mm:	3,148	3,635	3,402

Diese Werthe der Linsendicke sind kleiner, als man sie an todtten Linsen gefunden hat.

KRAUSE giebt an, an solchen  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$  par. Lin. (4,05 bis 5,4 mm) gefunden zu haben; ich selbst fand 4,2 und 4,3 mm. Nun wölbt sich die vordere Linsenfläche in der Pupille ein wenig, und ihre Mitte tritt deshalb etwas vor die Ebene des Kreises hervor, in der die Pupille ihr anliegt, und diese Wölbung könnte der Dicke der Linse noch zugerechnet werden. Die Höhe der Wölbung beträgt nach den in den Messungen an lebenden Augen von mir gefundenen Werthen des Durchmessers der Pupille und des Krümmungshalbmessers der vorderen Linsenfläche:

$$\begin{array}{ccc}\text{O. H.} & \text{B. P.} & \text{J. H.} \\0,266 & 0,166 & 0,153\end{array}$$

dann würde die Dicke der Linse:

$$\begin{array}{ccc}3,414 & 3,801 & 3,555.\end{array}$$

Aber auch diese Werthe reichen noch nicht an die der todtten Linsen, und doch ist es auch fraglich, ob man die ganze Höhe der Wölbung hinzurechnen darf, da dem Rande der Pupille, da wo er der Linse anliegt, auch noch eine Dicke von einigen Hundertel Millimeter gegeben werden muss, um welche der von vorn sichtbare Rand von der Linsenfläche entfernt bleiben wird. Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, daß bei diesen Messungen ein Fehler von einem halben Millimeter begangen sein sollte.

Auch neuere Messungen bestätigen dies Ergebniss. Herr A. v. REUSS<sup>1</sup> findet bei Emmetropen zwischen 3,5 bis 4,19 Linsendicke, bei Kurzsichtigen sogar nur 2,97 bis 3,68. Um die Reflexe zu verstärken hat er DRUMMOND'sches Licht, Herr ROSOW<sup>2</sup> vor ihm Sonnenlicht angewendet.

<sup>1</sup> A. v. REUSS, *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* XXIII. (4). S. 241–243.

<sup>2</sup> B. ROSOW. *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* XI. (2). S. 129.

- 83 Da der jüngere KRAUSE die Brechungsverhältnisse von Kalbslinsen unmittelbar nach dem Tode und 24 Stunden später merklich gleich gefunden hat, so ist es unwahrscheinlich, daß die Linse durch Aufnahme von Wasser sich verdicke. Dann müssten wir nämlich eine Abnahme des Brechungsvermögens erwarten. Dagegen erscheint es möglich, daß dieser Unterschied mit den Veränderungen der Linse beim Fern- und Nahesehen zusammenhängt, worauf wir unten in § 12 noch zurückkommen werden.

#### Lage der Cardinalpunkte des Auges.

Es bleibt noch übrig auseinander zu setzen, in wie weit sich bis jetzt die optischen Cardinalpunkte des Auges bestimmen lassen.

- 84 Nennen wir  $r$  den Krümmungsradius der Hornhaut, und  $n$  das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit, so ist die vordere Brennweite der Hornhaut nach § 9 Gleichung 3 a) und 3 b):

$$F_2 = \frac{r}{n-1},$$

die hintere Brennweite derselben:

$$F_3 = \frac{n \cdot r}{n-1},$$

Nach LISTING's Annahmen wird:

$$F_1 = 23\frac{9}{13}, \quad F_2 = 31\frac{9}{13}.$$

Nehmen wir nach den Beobachtungen von SENFF  $r=7,8$ , was auch ungefähr mit dem Mittel meiner Beobachtungen stimmt, und nach W. KRAUSE  $n=1,342$ , so wird:

$$F_1 = 22,81, \quad F_2 = 30,61.$$

LISTING giebt der Linse seines schematischen Auges das Brechungsverhältniß  $\frac{16}{11}$ , eine Dicke von 4 mm und Krümmungsradien von 10 und 6 mm. Nach § 9 Gleichung 13), 13 a) und 13 b) giebt dies für den Fall, wo die Linse in wässriger Feuchtigkeit liegt, die Brennweite 43,796 mm, den Abstand der Hauptpunkte von einander 0,2461 mm, den Abstand des vorderen Hauptpunktes von der vorderen Linsenfläche 2,3462, und den des hinteren von der hinteren Fläche 1,4077. Diese Annahmen stimmen sehr nahe überein mit den vorher angeführten Werthen, welche ich selbst an zwei Krystallinsen menschlicher Leichen durch directe Messung gefunden habe. Daß es bisher unmöglich sei, aus der Form und den Brechungsindices der verschiedenen Linsenschichten die Brennweite zu berechnen, ist oben auseinandergesetzt und namentlich geht aus dem über diese Brennweite aufgestellten Theorem hervor, daß es unrichtig ist, die Krystalllinse durch eine homogene Linse ersetzen zu wollen, welche die Form und das mittlere Brechungsvermögen derselben habe, wie das von den älteren Optikern meistens geschah, sondern daß im Gegentheile einer solchen Linse ein höheres Brechungsvermögen als das ihrer dichtesten Theile beigelegt werden müsse. Für die Linse eines Ochsen fand SENFF<sup>1</sup> für dieses totale Brechungsvermögen 1,539, während Grenschicht und Kerntheil die Werthe 1,374 und 1,453 ergaben. Die aus meinen Messungen folgenden Werthe des totalen Brechungsvermögens sind niedriger (1,4519 und 1,4414), und entsprechen etwa nur dem Mittel der Werthe, welche W. KRAUSE für das Brechungsverhältniß des Kerns gefunden hat (Max. 1,4807, Min. 1,4252; Mittel 1,4541). LISTING hat vor meinem und W. KRAUSE's Untersuchungen damit sehr übereinstimmend  $\frac{16}{11} = 1,4545$  gewählt.

Sollte sich der Unterschied zwischen todtten und lebenden Linsen, den meine Messungen ergaben, als constant herausstellen, so würde LISTING's schematisches Auge wahrscheinlich nur einem nahesehenden Auge entsprechen, und wir würden der Linse

<sup>1</sup> VOLEMANN Artikel „Sehen“ in R. WAGNER's Handwörterbuch d. Physiologie. Bd. III. S. 290.



eines fernsehenden Auges eine grössere Brennweite und geringere Dicke beilegen müssen.

Die Entfernung der vorderen Linsenfläche von der vorderen Hornhautfläche hat LISTING gleich 4 mm gesetzt, was dem von mir untersuchten kurzsichtigen Auge O. H. entspricht. Bei kurzsichtigen Augen pflegt überhaupt die vordere Augenkammer tiefer, die Iris flacher zu sein. Bei den übrigen beiden normalsichtigen Augen war die Entfernung geringer. Bei allen dreien lag die hintere Linsenfläche vor dem Krümmungsmittelpunkte der Hornhaut. Ich vermuthete deshalb, daß bei normalsichtigen Augen die Linse im Allgemeinen etwas näher der Hornhaut liegt, als LISTING angenommen hat. Jedenfalls würde aber auch der Einfluß dieser Abweichung sehr gering sein.

Wenn die Brennweiten der Hornhaut, die Lage der Hauptpunkte und die Brennweiten der Linse gegeben sind, sind die Cardinalpunkte des ganzen Auges nach § 9 Gleichung 11 a) bis 11 f) zu finden. Die Werthe, welche LISTING aus seinen Angaben berechnet hat, sind schon oben angegeben.

Von den Cardinalpunkten am wichtigsten für die Bestimmung der Lage der Bilder auf der Netzhaut sind uns die Knotenpunkte des Auges. Glücklicher Weise kann deren Lage jetzt nicht mehr vielem Zweifel unterworfen sein.

Derjenige Punkt, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, liegt nach den in § 9 angegebenen Methoden zur Auffindung dieser Punkte zwischen dem Knotenpunkte der Hornhaut, d. h. ihrem Krümmungsmittelpunkte und dem ersten Hauptpunkte der Linse, und seine Abstände von diesen beiden Punkten verhalten sich wie die kleinere Brennweite der Hornhaut zu der der Linse, also nahe wie 1 zu 2. In LISTING's schematischem Auge beträgt der Abstand des vorderen Hauptpunktes der Linse vom Mittelpunkt der Hornhaut, der bei ihm in die hintere Linsenfläche fällt, 1,627 mm, nach meinen Messungen an lebenden Augen kann die hintere Linsenfläche bis zu 1 mm vor dem Mittelpunkt der Hornhaut liegen; jene Entfernung würde also bis etwa 2,6 steigen können. Der Punkt also, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, würde 0,54 bis 0,87 mm vor dem Krümmungsmittelpunkte der Hornhaut liegen, ein, wie man sieht, sehr enges Intervall für seine Lage. Der erste Knotenpunkt ist sein durch die Hornhaut entworfenen Bild. Bilder von Objecten, die sehr nahe vor dem Krümmungsmittelpunkte einer kugelförmigen brechenden Fläche liegen, liegen sehr wenig vor ihrem Objecte. Nehmen wir LISTING's Werthe für die Brennweiten der Hornhaut und Linse, so liegt bei seinen Annahmen der vordere Knotenpunkt 0,758 mm vor dem Mittelpunkt der Hornhaut. Wenn dagegen der Punkt, dessen Bild er ist, 0,87 mm vor dem Mittelpunkt der Hornhaut läge, würde der Knotenpunkt etwa 1,16 mm vor diesem liegen.

Wir werden daher schwerlich fehlen, wenn wir annehmen, daß in normalen Augen der vordere Knotenpunkt  $\frac{3}{4}$  bis  $\frac{5}{4}$  mm vor dem Mittelpunkt der Hornhaut liegt.

Zu erwähnen ist hier noch ein Versuch von VOLKMANN<sup>1</sup>, auf experimentellem Wege am menschlichen Auge die Lage des Knotenpunktes zu finden. Ich habe oben erwähnt, daß, wenn die Strahlen eines Lichts von der äußeren Seite her in das Auge fallen, das Flammenbildchen namentlich bei blonden Personen im inneren Augenwinkel sichtbar werden kann. Er maß den Abstand dieses Bildes von der Hornhaut, während zugleich die Richtung der einfallenden Strahlen und der Gesichtslinie passend bestimmt wurde. Er zeichnete dann den horizontalen Querschnitt des menschlichen Auges, bestimmte in der Zeichnung den Punkt, wo das Netzhautbild durch die Sclerotica erschienen war, und legte durch diesen Punkt eine Linie, welche die Augenaxe unter demselben Winkel schnitt, den die einfallenden Strahlen mit der Gesichtslinie gebildet hatten. Den Durchschnittspunkt sah er als Knotenpunkt an. Er findet im Mittel von fünf Personen, daß die Knotenpunkte 3''',97 (8,93 mm) hinter der Hornhaut liegen. Jedenfalls ist dieser Werth zu groß, weil die Knotenpunkte nach dieser Bestimmung hinter dem Krümmungsmittelpunkte der Hornhaut liegen würden, während sie nothwendig vor ihm liegen müssen. Die Abweichung in VOLKMANN's Resultate erklärt sich einmal daraus, daß er

<sup>1</sup> VOLKMANN, R. WAGNER's Handwörterbuch d. Physiologie. Art. Sehen. S. 286.

den Unterschied zwischen Augenaxe und Gesichtslinie noch nicht kannte, und daraus, daß die Lichtstrahlen bei diesem Versuche die brechenden Flächen des Auges unter sehr großen Einfallswinkeln treffen, und die auf die Knotenpunkte und Hauptpunkte bezüglichen Sätze streng genommen nur für beinahe senkrechte Incidenz gelten. Auch BUROW<sup>1</sup> bemerkte deshalb bei der Wiederholung von VOLKMANN's Versuchen über den Knotenpunkt in weißen Kaninchenaugen, daß bei sehr schiefen Incidenzen die Netzhautbilder der Augenaxe näher fallen, als sie es sollten, wenn alle Richtungslinien sich in einem Punkte schnitten. Beide Ursachen müssen dazu beitragen, bei VOLKMANN's Versuch den Abstand des Knotenpunktes von der Hornhaut etwas größer erscheinen zu lassen, als er wirklich ist.

86 Endlich will ich hier noch beschreiben, wie man die Centrirung des Auges, die Lage der Augenaxe und der Gesichtslinie untersuchen kann. Es dienen dazu die Spiegelbilder, welche die Hornhaut und die beiden Linsenflächen von einem vor dem Auge befindlichen hellen Lichte entwerfen.

Ueber das Aussehen dieser Spiegelbilder, und die Art, sie am besten zu beobachten, s. § 12. Es sei in Fig. 58  $cd$  die Axe eines genau centrirten Auges, bei  $a$  das Auge




Fig. 58.

des Beobachters, bei  $b$  ein Licht, es sei  $ac = cb$  und  $ac$  senkrecht auf  $cd$ . Unter diesen Umständen würden, wie leicht ersichtlich ist, die in der Axe gelegenen Scheitel der drei reflectirenden Flächen, der Hornhaut, der vorderen und hinteren Linsenfläche, Licht, welches von  $b$  auf sie fällt, von  $b$  nach  $a$  reflectiren, da Alles auf beiden Seiten symmetrisch sein soll; und wenn das Auge und Licht ihren Platz tauschten, würde dasselbe wieder der Fall sein müssen, und dabei würden die drei reflectirenden Punkte in derselben perspectivischen Stellung zu einander bleiben. Namentlich würde in beiden Stellungen der Reflex von der vorderen Linsenfläche etwa in der Mitte zwischen den beiden anderen erscheinen müssen, da der scheinbare (durch die Hornhaut gesehene) Ort der vorderen Linsenfläche etwa in der Mitte zwischen der Hornhaut und dem scheinbaren Orte der hinteren Linsenfläche sich befindet.

Die Untersuchung des Auges in dieser Weise ist nun leicht auszuführen. Es sei  $ab$  ein horizontaler Maßstab, an dessen Enden passende Oeffnungen für das Auge und das Licht angebracht sind. Dem untersuchten Auge  $d$  werde ein Platz in der Linie  $cd$  angewiesen, welche auf der Mitte von  $ab$  senkrecht steht, und man gebe ihm einen Fixationspunkt an einem beweglichen Körper  $g$ , den man so lange verschiebt nach oben und unten, nach rechts und links, bis der Beobachter den Reflex der vorderen Linsenfläche zwischen dem der Hornhaut und dem der hinteren Linsenfläche erblickt.<sup>2</sup> Dann vertausche er den Ort des Lichts und seines Auges, und versuche, ob er bei derselben Stellung des Fixationspunktes auch von der anderen Seite her die drei Reflexe in der

<sup>1</sup> A. BUROW, Beiträge zur Physiologie d. menschl. Auges. S. 56–60.

<sup>2</sup> Den Einwänden von Herrn EHRENBROTH (*Pflüger's Archiv.* Bd. 35. S. 390.) gegenüber, bemerke ich, dass ganz kleine Aenderungen in der Stellung des Gesichtszzeichens  $g$  das mittlere Bild auffällig verschieben. Für die Messung des Winkels  $cdg$  ist es daher fast indifferent, ob man die Abstände der Bilder gleich macht, oder den Abstand der äusseren im Verhältniss 12 : 10 theilt. Der genannte Autor hat nicht einmal die leicht auszuführende Probe auf seine Rechnungen gemacht, ob überhaupt irgend ein Theilungsverhältniss des Abstandes zu finden ist, bei dem sich ein lebendes Auge symmetrisch verhält.

angegebenen Stellung erblicken kann. Ist das beobachtete Auge richtig centrirt, so muß es offenbar möglich sein, eine Stellung des Fixationspunktes zu finden, welche die angegebene Forderung erfüllt.

Ich habe noch kein menschliches Auge gefunden, welches dem entsprochen hätte. Wenn von der einen Seite gesehen die drei Reflexe die richtige Stellung hatten, war dies nicht mehr der Fall von der anderen Seite her; man mußte dann das Fixationszeichen mehr oder weniger verschieben, um die richtige Stellung wieder hervorzubringen.

Bei den drei Augen, für welche ich das System von Messungen angestellt habe, mußte der Fixationspunkt sich immer etwas oberhalb der Ebene  $abd$  befinden. Die Gesichtslinie lag immer auf der Nasenseite der Linie  $cd$ . Ihre horizontale Projection bildete mit der Linie  $cd$  unter den angegebenen Umständen folgende Winkel:

Beobachter.	Auge.	Licht kommt	
		von der Schläfenseite	von der Nasenseite
HELMHOLTZ	O. H.	3° 47'	4° 57'
	B. P.	5° 6'	8° 12'
	J. H.	5° 43'	7° 44'
KNAPP <sup>1</sup>	J. S.	4° 50'	6° 48'
	H. S.	3° 40'	6° 22'
	F. S.	4° 36'	7° 56'
	H. Sch.	6° 4'	5° 39'

Daraus folgt, daß das menschliche Auge nicht genau centrirt ist. Da jedoch die Unterschiede der zusammengehörigen Winkel verhältnismäßig klein sind, so erfüllt die Linie  $cd$  für die in den Versuchen gefundenen Stellungen der beobachteten Augen wenigstens annähernd die Ansprüche, welche man an eine Augenaxe zu machen hat, und man mag als Winkel zwischen der horizontalen Projection der Gesichtslinie und der Linie, welche einer Augenaxe am besten entspricht, das arithmetische Mittel aus den angeführten Winkeln nehmen. Diese Linie fällt nach meinen Untersuchungen auch nahe genug mit der Hornhautaxe zusammen, und geht durch den Mittelpunkt des Hornhautumfangs. 87

Derjenige, welcher zuerst eine klare Vorstellung von der Brechung der Strahlen im Auge und von der Entstehung und Lage des Netzhautbildchens gehabt hat, ist KEPLER. Vor ihm hatte allerdings schon MAUROLICUS die Krystalllinse des Auges mit einer Glaslinse verglichen, und behauptet, daß sie die Strahlen nach der Axe hin breche, aber er läugnete, daß auf der Netzhaut ein umgekehrtes Bild entworfen werde, weil wir ja sonst Alles verkehrt sehen müßten. Auch PORTA, der Erfinder der *Camera obscura*, verglich das Auge mit einer solchen, meinte aber, daß die Bilder auf der Krystalllinse entworfen würden. Erst KEPLER, der überhaupt die Grundsätze der Theorie der optischen Instrumente aufgefunden hat, läßt auf der Netzhaut ein umgekehrtes optisches Bild entstehen, und stellt als Bedingung des deutlichen Sehens hin, daß die Strahlen eines leuchtenden Punktes auf einen Punkt der Netzhaut vereinigt werden. KEPLER's Theorie wurde noch

<sup>1</sup> H. KNAPP, *Grüße's Archiv f. Ophthalm.* VI. (2) 8. 8.

weiter ausgeführt durch den berühmten Jesuiten SCHEINER<sup>1</sup>, der den Bau des Auges, die Brechung in den Feuchtigkeiten weiter untersuchte. Er bewies, daß die optischen Bilder auf der Netzhaut entworfen werden, indem er an Augen von Thieren die Netzhaut hinten frei legte. An einem menschlichen Auge stellte er diesen Versuch 1625 zu Rom an. Die brechende Kraft der wässrigen Flüssigkeit setzt er der des Wassers gleich, die Linse dem Glase, den Glaskörper zwischen beide. HUYGENS<sup>2</sup> endlich verfertigte eine künstliche Nachbildung des Auges, an der er die wesentlichsten Vorgänge des Sehens, den Nutzen der Brillen u. s. w. auseinandersetzte.

Die Theorie KEPLER's behielt von nun an ziemlich allgemeine Anerkennung, wenn auch noch einzelne Liebhaber paradoxer Theorien sich in Widersprüchen dagegen gefielen. So N. TH. MÜHLBACH<sup>3</sup> und CAMPBELL<sup>4</sup>, welche die Existenz des Netzhautbildchens läugnen, LEHOT<sup>5</sup>, der im Glaskörper ein räumliches Bild der Gegenstände entstehen läßt. PLAGGE<sup>6</sup> läßt das Auge wie einen Spiegel wirken, und hält das durch Spiegelung auf der Hornhaut entstehende Bildchen für das Object des Sehens. J. READE<sup>7</sup> stimmt ihm bei und läßt es durch die Nerven der Hornhaut empfinden. MAYER<sup>8</sup> widerlegt die Ansicht von PLAGGE, stellt aber eine ebenso wunderliche auf, daß die Netzhaut als Hohlspiegel wirke. Ebenso läßt ANDREW HORN<sup>9</sup> das Bild gegen den Glaskörper reflectiren und von hier aus auf den Sehnerven wirken.

Was die Lage der optischen Cardinalpunkte betrifft, so erhob sich zunächst eine Schwierigkeit für den hinteren Brennpunkt, weil nach der Rechnung, die auf die gemessenen Dimensionen und Brechungsverhältnisse des Auges gestützt war, dieser Punkt hinter die Netzhaut zu fallen schien. Der Grund davon lag darin, daß man für die Krystalllinse das mittlere Brechungsverhältniß ihrer einzelnen Schichten wählen zu müssen glaubte<sup>10</sup>. VALLÉE<sup>11</sup> glaubte deshalb annehmen zu müssen, daß das Brechungsverhältniß des Glaskörpers von vorn nach hinten zunehme. PAPPENHEIM<sup>12</sup> will wirklich solche, wenn auch sehr kleine Unterschiede durch den Versuch gefunden haben. Ueber die Lage der Knotenpunkte des Auges herrschte vor den theoretischen Arbeiten von GAUSS einige Verwirrung unter Physikern und Physiologen, weil die Theorie der optischen Instrumente bis dahin sich ausschließlich mit Systemen brechender Flächen beschäftigt hatte, deren Entfernung von einander vernachlässigt werden konnte, wie das z. B. bei den Objectivgläsern der Fernröhre der Fall war. Im Auge ist die Entfernung der 88 brechenden Flächen von einander im Vergleich zur Brennweite des ganzen Systems aber ziemlich beträchtlich, und wegen der mangelnden Ausbildung der Theorie wußte man die Fragen, auf die es ankam, nicht scharf zu stellen. Man suchte lange nach dem Punkte, der im Auge dem optischen Mittelpunkt der Glaslinsen entspräche und dadurch charakterisirt würde, daß der durch ihn gegangene Strahl ungebrochen durch die Augenmedien ginge. Wenn wir uns beide Knotenpunkte in einen zusammenzuziehen erlauben, so würde dieser dem gesuchten Punkte entsprechen. Man verwechselte namentlich auch diesen Punkt mit demjenigen Punkte, in welchem sich Linien schneiden, welche durch die im Gesichtsfelde sich deckenden Punkte verschieden entfernter Gegenstände gelegt sind. Der letztere, den wir Kreuzungspunkt der Visirlinien nennen wollen, ist, wie wir im nächsten Paragraphen zeigen werden, der Mittelpunkt des von der Hornhaut

<sup>1</sup> C. SCHEINER, *Oculus*. Inspruck 1619.

<sup>2</sup> C. HUYGENS, *Dioptrica in Opera posthuma*. Lugduni 1704. p. 112.

<sup>3</sup> N. TH. MÜHLBACH, *Inquisitio de visus sensu*. Vindob. 1816.

<sup>4</sup> CAMPBELL, *Annals of philosophy*. X. 17. — *Deutsches Archiv*. IV. 110.

<sup>5</sup> LEHOT, *Nouvelle Théorie de la Vision*. Paris 1825.

<sup>6</sup> PLAGGE, *Hecker's Annalen*. 1830. S. 404.

<sup>7</sup> J. READE, *Annals of philos.* XV. 260.

<sup>8</sup> MAYER, MÜNCKE Art. Gesicht. in GEHLER's Wörterbuch. Das dortige Citat ist falsch.

<sup>9</sup> A. HORN, *The seat of vision determined*. London 1813.

<sup>10</sup> L.F. MOBER in *Dove's Repertorium*. V. 337—349\*. — J.D. FORBES, *Proc. Edinb. Roy. Soc.* 1849. Dec. p. 251.

<sup>11</sup> L. L. VALLÉE, *Comptes rendus*. 1845. XIV. 481

<sup>12</sup> PAPPENHEIM, *Comptes rendus*. XXV. 901.

entworfenen Bildes der Pupille, und wesentlich vom Knotenpunkte verschieden. MUNCKE<sup>1</sup> identificirt beide Punkte und verlegt sie in die Mitte der Linse, BARTELS<sup>2</sup> dagegen in das Centrum der Hornhaut. VOLKMANN<sup>3</sup> nennt den Punkt, wo sich Linien, die von einzelnen Punkten der Netzhautbilder nach den entsprechenden Bildern des Objects gezogen werden, schneiden, Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen, später, nach MILE's Einwendungen, der Richtungslinien. Er zeigt experimentell an Augen weißer Kaninchen, daß wirklich alle Richtungslinien in einem Punkte sich schneiden, und bestimmt die Lage dieses Punktes, welcher zwischen beide Knotenpunkte fallen muß, für das Kaninchenauge. Er findet, daß derselbe hinter die Linse fällt. Er versuchte denselben Punkt nach einer anderen Methode am lebenden menschlichen Auge zu finden. Zwei 6 Zoll vom Auge entfernte Haarvisire werden durch zwei dem Auge nähere Diopter betrachtet, und letztere so eingestellt, daß die Haare gleichzeitig in der Mitte der Diopteröffnungen erscheinen. Jedes Haar mit der zugehörigen Diopteröffnung, durch eine gerade Linie verbunden, giebt eine Visirlinie. VOLKMANN würde also den Kreuzungspunkt der Visirlinien im Auge haben finden können, wenn die von ihm beobachteten Personen im Stande gewesen wären, gleichzeitig und ohne Bewegung des Auges beide Haare in ihren Dioptern zu sehen. Dies ist aber außerordentlich schwer, weil man dann nur eines direct sehen kann, und das andere durch indirectes Sehen auf den Seitentheilen der Netzhaut erkennen muß. Die Experimentirenden haben deshalb ohne Zweifel die beiden Diopter nach einander direct betrachtet, und ihre Visirlinien schnitten sich im Drehungspunkte des Auges, den VOLKMANN demzufolge für identisch mit dem Kreuzungspunkte der Richtungslinien erklärte.

MILE<sup>4</sup>, KNOCHENHAUER<sup>5</sup> und STAMM<sup>6</sup> stritten gegen VOLKMANN's Folgerungen. Ersterer zeigte, daß Richtungslinien und Visirlinien nicht nothwendig identisch seien, und erklärte den Mittelpunkt der Hornhaut für den Kreuzungspunkt der Richtungslinien, weil er die Brechung in der Linse glaubte vernachlässigen zu dürfen. Daraus folgert er denn, daß die Richtungslinien nicht nothwendig durch die Mitte eines Zerstreuungskreises zu gehen brauchen, welcher im Auge von einem nicht deutlich gesehenen Objecte entworfen wird. KNOCHENHAUER suchte MILE's Beweis, daß das Decken der Bilder im Gesichtsfelde unabhängig sei von den Richtungslinien, zu vereinfachen, und vermeidet dabei MILE's bei dem damaligen Stande der theoretischen Kenntnisse allerdings bedenkliche und in der That nur annähernd richtige Voraussetzung, daß der Kreuzungspunkt der Richtungslinien für verschiedene Objectabstände gleich sei. Auch BURROW<sup>7</sup> widerlegte VOLKMANN's Folgerungen, benutzte dessen Methode, um den Drehpunkt des Auges zu bestimmen, und schlug einen neuen Weg ein, den Kreuzungspunkt der Richtungslinien zu bestimmen, der aber aus einem von LISTING später aufgedeckten Grunde auch nicht zum Ziele führte.

MOSER<sup>8</sup> war der Erste, der die theoretischen Arbeiten von GAUSS<sup>9</sup> und BESSEL<sup>10</sup> auf das Auge anwendete, und aus den bis dahin ausgeführten Bestimmungen der Form der brechenden Flächen und der Brechungsverhältnisse die Lage der beiden Knotenpunkte, die er übrigens Hauptpunkte nennt, berechnete. Die Werthe, welche er für die Entfernung dieser Punkte von der Hornhaut fand, waren 3,19 und 3,276 Par. Lin. (7,18 und 7,37 mm). Da er aber als Brechungsverhältniß der Krystalllinse BREWSTER's Mittelwerth 1,3839 angenommen hatte, und die Strahlen ferner Lichtpunkte sich dabei erst

<sup>1</sup> MUNCKE, GEHLER's *physik. Wörterbuch* neu bearb. Leipzig 1828. Art. Gesicht. Bd. IV. 2. S. 1434\*.

<sup>2</sup> E. D. A. BARTELS, *Beiträge zur Physiol. d. Gesichtsinns*. Berlin 1834. S. 61.

<sup>3</sup> A. W. VOLKMANN, *Neue Beiträge zur Physiol. d. Gesichtsinns*. Leipzig 1836. Kap. IV. — *Poggendorff's Ann.* XXXVII. 342.

<sup>4</sup> J. MILE, *Poggendorff's Ann.* XLII. 37—71. 235—263\*. Dagegen A. W. VOLKMANN, *Pogg. Ann.* XLV. 207—226\*.

<sup>5</sup> K. W. KNOCHENHAUER, *Pogg. Ann.* XLVI. 248—258\*.

<sup>6</sup> W. STAMM, *Pogg. Ann.* LVII. 346—382\*.

<sup>7</sup> A. BURROW, *Beiträge zur Physiologie u. Physik d. menschl. Auges*. Berlin 1841. S. 26—93.

<sup>8</sup> L. F. MOSER, *Dove's Repertorium der Physik*. V. 337 u. 373.

<sup>9</sup> C. F. GAUSS, *Dioptrische Untersuchungen*. Göttingen 1841.

<sup>10</sup> F. W. BESSEL, *Astronomische Nachrichten*. XVIII. Nr. 415.

hinter der Netzhaut vereinigten, glaubte er den Radius der Hornhaut verkleinern zu müssen von 3'',39 auf 2'',88, und berechnete danach noch andere Werthe für den Abstand der Knotenpunkte von der Hornhaut, nämlich 2'',835 und 2'',890 (6,38 und 6,50 mm).

LISTING<sup>1</sup> erörterte die Eigenschaften der Haupt- und Knotenpunkte (welchen letzteren er den Namen gab) in ihrer Beziehung zum Auge, gab angenäherte Werthe für ihre Lage, und hob namentlich hervor, daß der Brechungscoefficient der Linse, wenn man diese sich homogen denke, höher gesetzt werden müsse als der ihres dichtesten Theils. VOLKMANN<sup>2</sup> machte dann noch den schon oben erwähnten Versuch, die Lage der Knotenpunkte im lebenden menschlichen Auge experimentell zu bestimmen. Endlich gab LISTING<sup>3</sup> neben einer vollständigen mathematischen Theorie eine Berechnung der Zahlenwerthe nach den besten bis dahin ausgeführten Messungen.

### § 11. Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.

Wenn Licht von einem leuchtenden Punkte in das Auge fällt, so bildet dasjenige, welches durch die kreisförmige Pupille hindurchgegangen ist, hinter der Pupille einen Strahlenkegel, dessen Basis kreisförmig und nach vorn, dessen Spitze nach hinten gekehrt ist, und dem Bilde des leuchtenden Punktes entspricht. Jenseits ihres Vereinigungspunktes divergiren die Strahlen wieder.




Fig. 59.

Es sei in Fig. 59 a der leuchtende Punkt, b, b'', die Pupille, c der Convergenzpunkt der Strahlen, c, c', die Verlängerung des Strahles b, c, ebenso c d'', die Verlängerung

von b, c. Wenn der Vereinigungspunkt der Strahlen gerade auf die Fläche der Netzhaut trifft, so beleuchtet der einzelne leuchtende Punkt a nur einen einzelnen Punkt c der Netzhaut, und es wird ein scharfes Bild des leuchtenden Punktes entworfen. Wenn aber die Netzhaut vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen, etwa in f, f,, oder in g, g,, von dem Strahlenkegel getroffen würde, so würde nicht bloß ein einzelner Punkt, sondern eine dem kreisförmigen Durchschnitte des Strahlenkegels entsprechende Kreisfläche der Netzhaut erleuchtet werden. Man nennt einen solchen von dem Licht eines leuchtenden Punktes außerhalb des Auges beleuchteten Kreis der Netzhaut einen Zerstreuungskreis. Die Kreisform entspricht, wie aus dem Gesagten erhellt, der kreisförmigen Gestalt der Pupille. Wird deren Form oder die Grundfläche des einfallenden Lichtkegels geändert, was namentlich auch dadurch geschehen kann, daß man einen Schirm mit einer beliebig gestalteten kleinen Öffnung von kleinerem Durchmesser als die Pupille dicht

<sup>1</sup> J. LISTING. *Beitrag zur physiologischen Optik*. Göttingen 1845.

<sup>2</sup> J. VOLKMANN, R. WAGNER'S *Handwörterbuch d. Physiologie*. Art. Sehen. S. 236\*.

<sup>3</sup> J. LISTING, R. WAGNER'S *Handwörterbuch der Physiologie*. Art. Dioptrik des Auges.

vor die Hornhaut bringt, so erhalten auch die Zerstreuungsfelder eine entsprechende andere Form, welche, auf den mittleren Theilen der Netzhaut wenigstens, der Grundfläche des Strahlenkegels geometrisch ähnlich ist. Sehr kleine Zerstreuungsbilder im Auge, welche in geringer Entfernung vom Vereinigungspunkte der Strahlen auf der Netzhaut entworfen werden, zeigen auffallende Abweichungen von diesen Regeln, wovon wir in § 14 weiter handeln werden.

Objectiv kann man das Entstehen der Zerstreuungsbilder leicht nachahmen, indem man eine Sammellinse aufstellt, vor ihr in einiger Entfernung ein kleines Licht, oder besser einen Schirm mit einer engen Öffnung, durch welche ein Licht scheint, und das Bild der Lichtquelle hinter der Linse auf einem weissen Papiere auffängt, welches man der Linse bald nähert, bald von ihr entfernt. Dabei sieht man, dafs nur in einer gewissen Entfernung von der Linse das Bild des Lichtpunktes scharf gezeichnet und punktförmig ist, sonst sich zu lichten Kreisen ausdehnt.

Bringt man vor der Linse als Object eine helle Linie an, z. B. einen schmalen Spalt in einem dunklen Schirme, hinter welchem ein Licht steht, so decken sich die Zerstreuungskreise der einzelnen hellen Punkte dieser Linie, wie in *Fig. 60 b* angedeutet ist, theilweise, und es erscheint statt der scharfen Linie *a* eine helle Figur ähnlich der *c*.




Fig. 60

Wird eine scharf begrenzte gleichmäfsig helle Fläche in einem Zerstreuungsbilde abgebildet, so bleibt die Mitte der Fläche in unveränderter Helligkeit, die Ränder aber erscheinen verwaschen, so dafs an ihnen die Helligkeit der Mitte der Fläche allmählig in die Helligkeit des umgebenden Grundes übergeht.

Dergleichen Zerstreuungsbilder können nun auch im Auge entworfen werden. Allerdings können wir nicht die Netzhaut willkürlich hin- und herücken gleich dem Papierschirme bei der beschriebenen objectiven Darstellung der Zerstreuungsbilder, aber wir können den leuchtenden Punkt dem Auge nähern und ihn davon entfernen, so dafs sein Bild im Glaskörper vor- und zurückweicht. Wie bei einem jeden optischen Systeme von kugeligen brechenden Flächen liegen die Bilder verschieden entfernter Gegenstände auch beim Auge in verschiedenen Entfernungen von den brechenden Flächen. Das Bild eines unendlich weit entfernten hellen Punktes liegt in der hinteren Brennebene des Auges, das Bild eines näheren leuchtenden Punktes hinter der Brennebene. Wenn also eines von diesen Bildern auf die Netzhaut fällt und scharf gezeichnet ist, so bildet das andere nothwendig einen Zerstreuungskreis. Daraus folgt:

Wir können verschieden weit vom Auge entfernte Gegenstände nicht gleichzeitig deutlich sehen.

Um sich davon zu überzeugen, halte man in der Entfernung von etwa 92 6 Zoll vor dem Auge einen Schleier oder ein anderes durchsichtiges Gewebe, und dahinter in etwa 2 Fufs Entfernung ein Buch, und schliesse ein Auge,

so wird man sich leicht überzeugen, daß man es in seiner Gewalt hat, nach einander bald die Fäden des Schleiers, bald die Buchstaben des Buches zu betrachten und deutlich zu sehen, daß aber die Buchstaben undeutlich werden, während man die Fäden des Schleiers betrachtet, und daß der Schleier nur noch als eine leichte gleichmäßige Verdunkelung des Gesichtsfeldes erscheint, während man die Buchstaben fixirt. Wenn man, ohne die Richtung des Auges zu verändern, bald den näheren, bald den fernerer Gegenstand betrachtet, fühlt man bei jedem solchen Wechsel, daß das Auge eine gewisse Anstrengung macht, um den Wechsel zu Stande zu bringen.

Denselben Versuch kann man mannigfach variiren. Man wende sich nach einem Fenster und halte etwa 6 Zoll vor dem Auge senkrecht eine Nadel, so daß sie einen der horizontalen Stäbe des Fensters kreuzt, so kann man entweder die Nadel fixiren, während dabei der Stab des Fensterkreuzes als verwaschener dunkler Streifen erscheint, oder das Fensterkreuz und die Gegenstände der Landschaft draussen fixiren, während die Nadel nur noch als ein verwaschener dunkler Streifen im Gesichtsfelde erscheint. Ebenso, wenn man durch ein Loch von 1 bis 2 Linien Durchmesser nach fernen Gegenständen sieht, kann man bald diese, bald die Ränder des Loches scharf sehen, nie aber beide zugleich. Indessen ist der Versuch in seiner ersten Gestalt am überraschendsten, und dabei zugleich jeder Verdacht, daß eine Änderung in der Richtung der Sehaxe von Einfluß sei, am besten beseitigt.

Bei allen diesen Versuchen überzeugt man sich, daß, wenn man auch nicht gleichzeitig zwei verschieden entfernte Gegenstände deutlich sehen kann, dies doch gelingt, indem man sie nach einander betrachtet, und daß man willkürlich bald den einen, bald den anderen deutlich, mit scharf begrenzten Umrissen erblicken kann.

Die eigenthümliche Veränderung, welche im Zustande des Auges vor sich geht, um bald ferne, bald nahe Gegenstände deutlich zu sehen, nennt man die Accommodation oder Adaptation des Auges für die Entfernung des Objects.

Für sehr ferne Objecte kann sich die Entfernung des Objects sehr beträchtlich verändern, ohne daß die Entfernung seines optischen Bildes von den Hauptpunkten des Auges sich merklich ändert. Wenn ein Auge für unendliche Entfernung accommodirt ist, so sind die Zerstreuungskreise auch für Objecte von etwa 12 Meter Entfernung immer noch so klein, daß keine merkliche Undeutlichkeit des Bildes entsteht. Ist aber das Auge für einen nahen Gegenstand accommodirt, so erscheinen Gegenstände in sehr kleinen Distanzen vor oder hinter jenem schon undeutlich. Den Theil der Gesichtslinie, in welchem die bei einem gegebenen Accommodationszustande des Auges ohne merkliche Undeutlichkeit sichtbaren Objecte liegen, hat J. CZERMAK die Accommodationslinie genannt. Die Länge dieser Accommodationslinien ist desto größer, je weiter ihr Abstand vom Auge ist, und für einen sehr großen Abstand unendlich groß.



Von dem angegebenen Verhalten kann man sich leicht überzeugen, wenn man vor einem bedruckten Blatte in der Entfernung eines oder einiger Zolle <sup>93</sup> eine Spitze als Fixationspunkt befestigt. Nähert man sich mit dem Auge der Spitze, so weit man sie deutlich sehen kann, und accommodirt das Auge für die Spitze, so erscheinen die Buchstaben undeutlich: je weiter man sich aber entfernt, immer das Auge für die Spitze accommodirend, desto deutlicher werden sie.


Eben weil die Zerstreuungskreise ferner Gegenstände sehr klein sind, wenn das Auge für andere ferne Gegenstände accommodirt ist, ist es auch möglich zu visiren, d. h. zu erkennen, ob verschieden entfernte Punkte an einer Stelle des Gesichtsfeldes liegen. Streng genommen kann man immer nur einen der beim Visiren betrachteten Punkte deutlich sehen, die anderen in grösseren und kleineren Zerstreuungskreisen. Eine genaue Deckung zweier Punkte nehmen wir an, wenn der deutlich gesehene Punkt in der Mitte des Zerstreuungsbildes des anderen liegt. Eine Linie, welche durch zwei sich deckende Punkte gezogen ist, nennen wir Visirlinie. Die Visirlinien kreuzen sich in einem Punkte des Auges, nämlich im Mittelpunkte des von der Hornhaut entworfenen Bildes der Pupille, dem Kreuzungspunkte der Visirlinien.

Dafs bei der Accommodation nicht blos, wie mehrere Physiologen früher annahmen, die Art, wie das Netzhautbildchen empfunden wird, sich verändere, sondern dafs das optische Bild auf der Netzhaut selbst Veränderungen erleide, läfst sich am unzweifelhaftesten bei der Untersuchung eines lebenden Auges mit dem Augenspiegel nachweisen. Durch dieses Instrument, welches in § 16 beschrieben werden wird, kann man den Hintergrund des Auges, also die Netzhaut mit ihren Gefäfsen und die auf ihr entworfenen Bilder, deutlich sehen. Läfst man das beobachtete Auge einen Gegenstand in einer gewissen Entfernung fixiren, so findet man, dafs das Bild eines Lichtes, welches in derselben Entfernung steht, auf der Netzhaut ganz scharf entworfen wird, während man in dem hellen Grunde des Bildes auch die Gefäfsen und sonstigen anatomischen Einzelheiten der Netzhaut deutlich sieht. Wenn man aber das Licht sehr nähert, wird sein Bild undeutlich, während die Einzelheiten des Gewebes der Netzhaut deutlich bleiben. Die Versuche, die Veränderungen der Bilder an todtten Augen, denen man den hinteren Theil der Sclerotica und Chorioidea weggenommen hatte, oder an Augen weifser Kaninchen, deren Sclerotica sehr durchscheinend ist, zu sehen, sind meist gescheitert, weil unter diesen Umständen die Bilder überhaupt nicht mehr genau genug sind, um kleine Veränderungen an ihnen wahrzunehmen. Auch für das lebende Auge sind nur an verhältnifsmäfsig feinen Gegenständen die Veränderungen des Bildes bei veränderter Adaptation auffällig. Größere Gegenstände erkennen wir auch bei unpassender Accommodation noch ihrer Form nach. In dem Netzhautbilde eines todtten Auges erscheinen aber überhaupt nur noch gröfsere Objecte, die feineren sind verwischt, wie man sogleich erkennt, wenn man es künstlich vergrößert, so dafs die Bilder dem

Beobachter in ähnlicher Gröfse erscheinen, wie sie dem beobachteten Auge, als es lebte, erschienen waren.

Eine noch nähere Erläuterung der Accommodationserscheinungen und der verschiedenen Lage des Vereinigungspunktes der Strahlen zur Netzhaut giebt der SCHEINER'sche Versuch. Man steche durch ein Kartenblatt mit  
 94 einer Nadel zwei Löcher, deren Entfernung kleiner ist als der Durchmesser der Pupille, und blicke nun durch die beiden Löcher nach einem feinen Gegenstande hin, der sich dunkel auf hellem Grunde oder hell auf dunklem Grunde scharf abzeichnet, z. B. nach einer Nadel, die man vor den hellen Hintergrund des Fensters hält, und zwar vertical, wenn die Löcher des Kartenblatts horizontal neben einander liegen, dagegen horizontal, wenn letztere vertical übereinander stehen. Fixirt man nun die Nadel selbst, so sieht man sie einfach; fixirt man dagegen einen näheren oder fernerer Gegenstand, so erscheint sie doppelt. Schiebt man dann von der Seite her einen Finger über das Kartenblatt, so dafs er eines der Löcher verdeckt, so findet man in dem Falle, wo das Bild der Nadel einfach ist, keine andere Veränderung, als dafs das Gesichtsfeld dunkler wird. Sieht man dagegen die Nadel doppelt, so verschwindet beim Verdecken der Oeffnung eines der Doppelbilder, während das andere unverändert stehen bleibt, und zwar verschwindet, wenn man einen fernerer Gegenstand, als die Nadel ist, fixirt, das linke Bild der Nadel beim Verdecken des rechten Loches; wenn man aber das Auge für einen näheren Gegenstand eingerichtet hat, verschwindet das rechte Bild beim Verdecken des rechten Loches. Hat man sich noch nicht genügend geübt, das Auge für die Nähe und Ferne zu accommodiren, ohne dafs man einen entsprechenden Fixationspunkt hat, so stelle man zwei Nadeln hinter einander vor einem hellen Hintergrunde auf, die eine in 6 Zoll, die andere in 2 Fufs Entfernung, die eine horizontal, die andere vertical, und fixire die eine, um die Doppelbilder der anderen zu sehen, wobei man natürlich die Löcher des Kartenblatts stets quer gegen die Richtung der Nadel stellen mufs, welche doppelt erscheinen soll.

Macht man drei Löcher in ein Kartenblatt, welche nahe genug zusammenstehen, um gleichzeitig vor die Pupille gebracht zu werden, so erscheinen drei Bilder der Nadel. Haben die Löcher die Stellung wie in *Fig. 61 a*, so erscheinen bei der Accommodation für einen näheren Gegenstand drei Nadeln in der Stellung wie bei *b*, so dafs ihre Köpfe die Stellung der Löcher in gleichem



*Fig. 61.*

Sinne wiedergeben. Bei der Accommodation für einen fernerer Gegenstand erscheinen die Nadeln in der Stellung *c*, so dafs ihre Köpfe ein umgekehrtes Bild von der Stellung der Löcher geben. Ganz dieselben vielfachen Bilder zeigen sich, wenn man einen hellen Gegenstand auf dunklem Grunde, eine Oeffnung eines dunklen Schirms, durch welche Licht fällt, oder ein Nadelköpfchen, welches Sonnenlicht reflectirt, betrachtet.

Von dem angegebenen Verhalten kann man sich leicht überzeugen, wenn man vor einem bedruckten Blatte in der Entfernung eines oder einiger Zolle eine Spitze als Fixationspunkt befestigt. Nähert man sich mit dem Auge der Spitze, so weit man sie deutlich sehen kann, und accommodirt das Auge für die Spitze, so erscheinen die Buchstaben undeutlich: je weiter man sich aber entfernt, immer das Auge für die Spitze accommodirend, desto deutlicher werden sie.

Eben weil die Zerstreuungskreise ferner Gegenstände sehr klein sind, wenn das Auge für andere ferne Gegenstände accommodirt ist, ist es auch möglich zu visiren, d. h. zu erkennen, ob verschieden entfernte Punkte an einer Stelle des Gesichtsfeldes liegen. Streng genommen kann man immer nur einen der beim Visiren betrachteten Punkte deutlich sehen, die anderen in größeren und kleineren Zerstreuungskreisen. Eine genaue Deckung zweier Punkte nehmen wir an, wenn der deutlich gesehene Punkt in der Mitte des Zerstreuungsbildes des anderen liegt. Eine Linie, welche durch zwei sich deckende Punkte gezogen ist, nennen wir Visirlinie. Die Visirlinien kreuzen sich in einem Punkte des Auges, nämlich im Mittelpunkte des von der Hornhaut entworfenen Bildes der Pupille, dem Kreuzungspunkte der Visirlinien.

Dafs bei der Accommodation nicht blos, wie mehrere Physiologen früher annahmen, die Art, wie das Netzhautbildchen empfunden wird, sich verändere, sondern dafs das optische Bild auf der Netzhaut selbst Veränderungen erleide, läfst sich am unzweifelhaftesten bei der Untersuchung eines lebenden Auges mit dem Augenspiegel nachweisen. Durch dieses Instrument, welches in § 16 beschrieben werden wird, kann man den Hintergrund des Auges, also die Netzhaut mit ihren Gefäfsen und die auf ihr entworfenen Bilder, deutlich sehen. Läft man das beobachtete Auge einen Gegenstand in einer gewissen Entfernung fixiren, so findet man, dafs das Bild eines Lichtes, welches in derselben Entfernung steht, auf der Netzhaut ganz scharf entworfen wird, während man in dem hellen Grunde des Bildes auch die Gefäfsen und sonstigen anatomischen Einzelheiten der Netzhaut deutlich sieht. Wenn man aber das Licht sehr nähert, wird sein Bild undeutlich, während die Einzelheiten des Gewebes der Netzhaut deutlich bleiben. Die Versuche, die Veränderungen der Bilder an todtten Augen, denen man den hinteren Theil der Sclerotica und Chorioidea weggenommen hatte, oder an Augen weißer Kaninchen, deren Sclerotica sehr durchscheinend ist, zu sehen, sind meist gescheitert, weil unter diesen Umständen die Bilder überhaupt nicht mehr genau genug sind, um kleine Veränderungen an ihnen wahrzunehmen. Auch für das lebende Auge sind nur an verhältnißmäfsig feinen Gegenständen die Veränderungen des Bildes bei veränderter Adaptation auffällig. Größere Gegenstände erkennen wir auch bei unpassender Accommodation noch ihrer Form nach. In dem Netzhautbilde eines todtten Auges erscheinen aber überhaupt nur noch größere Objecte, die feineren sind verwischt, wie man so gleich erkennt, wenn man es künstlich vergrößert, so dafs die Bilder dem

Umgekehrt ist es beim Fixiren eines nahen Gegenstandes, wo die Netzhaut dem Schirme in  $l$  entspricht.

Bringt man vor der Glaslinse einen Schirm mit drei Oeffnungen, wie in *a Fig. 61*, an, so entstehen auch drei lichte Punkte auf dem in  $m$  oder  $l$  gestellten Schirme, und zwar in  $m$  gleich, in  $l$  dagegen entgegengesetzt gerichtet als auf dem vorderen Schirme; also wieder umgekehrt, als es scheinbar im Auge der Fall ist, was sich in derselben Weise erklärt, wie eben auseinandergesetzt ist.

Bringt man vor die Glaslinse einen Schirm mit einer Oeffnung, und bewegt ihn hin und her, so bleibt das Bild des lichten Punktes unbeweglich, wenn (siehe in *Fig. 62*) der Vereinigungspunkt  $c$  der Lichtstrahlen in den auffangenden Schirm fällt. Steht dieser Schirm aber vor  $c$  in  $m$ , so bewegt sich das Bild in demselben Sinne wie die Oeffnung vor dem Glase. Steht der auffangende Schirm in  $l$  hinter dem optischen Bilde, so bewegt es sich  
 96 in entgegengesetzter Richtung. Entsprechendes findet beim Auge statt. Sieht man durch eine kleine Oeffnung eines Kartenblatts nach einer Nadel, fixirt einen fernen Gegenstand und bewegt das Kartenblatt, so bewegt sich die Nadel scheinbar in entgegengesetztem Sinne. Fixirt man dagegen einen näheren Punkt, so bewegt sie sich in gleichem Sinne wie das Kartenblatt. Die Erklärung dieser Versuche ergiebt sich leicht aus dem Vorausgeschickten, wenn man für *Fig. 62* annimmt, daß der Schirm nicht zwei Oeffnungen, sondern nur eine hat, die sich bald in  $c$ , bald in  $f$  befindet.

Man kann einen Schirm mit enger Oeffnung, welche man vor das Auge bringt, auch benutzen, um Gegenstände deutlich zu sehen, für welche man das Auge nicht accommodiren kann. Die Grundfläche des in das Auge eindringenden Strahlenkegels wird dadurch kleiner, und in demselben Verhältnisse auch alle seine Querschnitte, zu denen auch der Zerstreuungskreis auf der Netzhaut gehört.

Wenn man einen nahe vor dem Auge befindlichen Gegenstand, der deshalb im Zerstreuungsbilde erscheint, durch eine feine Oeffnung betrachtet, erscheint er aus dem angeführten Grunde deutlich und außerdem vergrößert. Ja, er erscheint sogar größer, als wenn man ihn ohne Oeffnung bei derselben Entfernung im Zerstreuungsbilde betrachtet. Seine Vergrößerung wird um so bedeutender, je mehr man die Oeffnung vom Auge entfernt. Diese Erscheinungen erklären sich auf folgende Weise. Es seien in *Fig. 63*  $a$  und  $b$  zwei leuchtende Punkte des Objects,  $S$  der Schirm,  $A$  das Auge. Vom Punkte  $a$  fällt durch die Oeffnung des Schirms nur der Lichtstrahl  $am_1$  in das Auge, von  $b$  der Lichtstrahl  $bm_2$ . Ist  $\beta\alpha$  das dem Objecte  $ab$  entsprechende Bild, welches die Augenmedien entwerfen, so geht der Strahl  $am_1$  nach der Brechung nach  $\alpha$  und schneidet die Netzhaut in  $f$ ; der Strahl  $bm_2$  geht dagegen nach  $\beta$  und trifft die Netzhaut in  $g$ . Zieht man von  $f$  und  $g$  aus die Linien  $f\varphi$  und  $g\gamma$  durch den Knotenpunkt des Auges  $k$ , so geben diese die Richtungen an, in welchen leuchtende Punkte beim gewöhnlichen deutlichen Sehen liegen müßten, um sich in  $f$  und  $g$  abzubilden. In diese Linien verlegt unser Urtheil deshalb auch die Punkte  $a$  und  $b$ .

Wenn der Schirm sich vom Auge entfernt und dem Objecte nähert, ist leicht ersichtlich, daß die Punkte  $m_1$  und  $m_2$  und ebenso die Linien  $m_1 \alpha$  und  $m_2 \beta$  mit den Punkten  $f$  und  $g$  sich von der Augenaxe entfernen müssen. Das Netzhautbild wird in diesem Falle also größer.

Nehmen wir den Schirm weg, so entwirft jeder lichte Punkt des Objects einen Zerstreuungskreis. Die Mittelpunkte der Zerstreuungsbilder von  $a$  und  $b$  sind dann auf der Netzhaut weniger von einander entfernt als die Punkte  $f$  und  $g$ , wo diese Punkte bei vorgehaltenem Schirme sich ab-




Fig. 63.

bilden. Der Mittelpunkt der Zerstreuungskreise wird bestimmt durch den  $97$  Axenstrahl des Strahlenkegels, d. h. durch den Strahl, welcher durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen ist. Es sei  $l$  dieser Punkt. Der von  $a$  durch  $l$  nach  $\alpha$  gehende Strahl trifft dann die Netzhaut in  $i$ , der von  $b$  durch  $l$  nach  $\beta$  gehende in  $h$ . Die Punkte  $h$  und  $i$  sind also die Mittelpunkte der Zerstreuungsbilder, wenn der Schirm entfernt wird. Sie liegen einander näher als die Punkte  $f$  und  $g$ .

Sieht man dagegen durch eine enge Oeffnung nach entfernten Gegenständen, während man das Auge für die Nähe accommodirt, so erscheinen die Gegenstände kleiner, und desto kleiner, je weiter man die Oeffnung vom Auge entfernt.

Die Entfernungen, für welche sich das menschliche Auge accommodiren kann, sind bei verschiedenen Individuen sehr verschieden. Man nennt den dem Auge nächsten Punkt, für den eine vollständige Accommodation ausgeführt werden kann, den Nahepunkt, den entferntesten den Fernpunkt der Accommodation.

Die Lehre von den individuellen Verschiedenheiten des Refractions- 825 zustands der Augen ist namentlich durch die wichtigen Arbeiten von DONDERS<sup>1</sup> vollständig aufgeklärt worden und hat denn auch schon die fruchtbarste Anwendung in der Augenheilkunde gefunden, nicht bloß direct für die Verbesserung mangelhaften Accommodationsvermögens durch Brillen, sondern auch indirect, indem eine Reihe bisher dunkler Krankheitszustände sich als Folge mangelhafter Refraction und Accommodation des Auges ergaben.

Der Fortschritt, den DONDERS gemacht hat, hängt namentlich davon ab, dass er getrennt hat die Erscheinungen, welche einem abnormen Refractionsgrade im Ruhezustande des Auges angehören bei der Accommodation für

<sup>1</sup> F. C. DONDERS, *Anomalies of accommodation and refraction*. London 1864.

die Ferne, von denen, welche sich auf die grössere oder geringere Breite der Accommodation beziehen und die also in einer Aenderung des Refraktionszustandes durch Muskelthätigkeit bestehen.

Für die Ansicht, dass der Zustand des Fernsehens der Ruhezustand des Auges sei, für welche schon die subjective Empfindung sehr entschieden spricht und die auch meiner oben gegebenen Darstellung zu Grunde liegt, führt DONDERS noch weiter an, dass durch gewisse narkotische Stoffe (namentlich Atropin, das Alkaloid der Belladonna) eine Lähmung des Ringmuskels der Pupille und der Accommodation hervorgebracht wird, wobei das Auge für seinen Fernpunkt eingerichtet ist, ohne diesen Refraktionszustand ändern zu können. Sollte ein muskulöser Apparat da sein, dessen Contraction die Accommodation für die Ferne verstärken könnte, so müsste man die sehr unwahrscheinliche Annahme machen, dass dieser durch das Atropin nicht gelähmt, sondern in eine dauernde krampfhaftige Zusammenziehung gebracht würde.

Daneben lehren pathologische Beobachtungen, dass wenn durch Lähmung des *Nervus oculomotorius* der Accommodationsapparat gelähmt wird, das Auge sich stets auf seinen früheren Fernpunkt dauernd einstellt. Dagegen sind durchaus keine Fälle von Bewegungslähmungen des Auges beobachtet worden, wobei der Fernpunkt sich genähert hätte.

826 Die grösste Sehweite entspricht also dem Ruhezustande des Auges. Als normale Lage des Fernpunktes kann die in unendlicher Ferne betrachtet werden. Solche Augen nennt DONDERS emmetropisch (von *ἐμμετρος*, *modus tenens*, und *ὤψ*, *oculus*), um die Vieldeutigkeit des Ausdrucks „normale“ oder „normalsichtige“ Augen zu vermeiden. Emmetropische Augen können natürlich noch an mancherlei anderen Fehlern leiden und brauchen nicht „normal“ zu sein.

Augen, deren Fernpunkt vor ihnen, aber nicht in unendlicher Ferne liegt, nennt er brachymetropisch oder, mit dem älteren Namen, myopisch; diese Augen können nur divergirend einfallende Strahlenbündel auf der Netzhaut vereinigen.

Augen, die im Gegentheil nicht nur parallele, sondern auch convergirend einfallende Strahlen vereinigen können, heissen hypermetropisch.

Die myopischen Augen können sich ohne Hilfe eines Brillenglases für weit entfernte Objecte nicht einstellen; es mangelt ihnen also ein wichtiger Theil der Fähigkeit eines emmetropischen Auges. Die hypermetropischen dagegen sind genöthigt jedes Mal, wo sie ein reelles Object fixiren wollen, eine Accommodationsanstrengung zu machen, wodurch mannigfache und häufig sehr störende Ermüdungserscheinungen herbeigeführt werden. Beiderlei Arten der Abweichung sind also für den praktischen Gebrauch des Auges nachtheilig und werden deshalb von DONDERS unter dem Namen der ametropischen Augen zusammengefasst.

Der Grund dieser Abweichungen beruht der Regel nach auf der verschiedenen Länge der Augenaxe, die in den hypermetropischen kürzer ist

als in den emmetropischen. Damit hängt auch die Lage des Drehpunkts dieser Augen zusammen, der in den myopischen Augen weiter nach hinten, in den hypermetropischen weiter nach vorn liegt. Die Hornhaut und Linse zeigen in der Regel keine Krümmungsänderungen, aus denen die Ametropie erklärt werden könnte.

Um den Zustand solcher abweichender Augen vollständig zu bestimmen, muß ferner die Größe der Veränderung bestimmt werden, welche durch active Muskelanstrengung in ihrem Brechungszustande hervorgebracht werden kann. Wenn wir ein emmetropisches Auge, welches zwischen unendlicher Ferne und einer Sehweite von 6 Zoll sich für jedes Object einstellen kann, und ein stark myopisches, welches zwischen 6 und 3 Zoll Entfernung accommodiren kann, mit einander vergleichen, so scheint auf den ersten Anblick vielleicht das letztere eine viel engere Grenze der Accommodationsfähigkeit zu haben, als das letztere. Wenn wir aber dicht vor ein solches myopisches Auge eine Concavlinse von 6 Zoll Brennweite setzen, welche ihm erlaubt unendlich entfernte Gegenstände deutlich zu sehen, so werden wir finden, daß dasselbe Auge mit Hilfe dieser Brille nun auch, wie das zuerst genannte emmetropische Auge zwischen unendlicher Ferne und 6 Zoll Abstand accommodiren kann, also eine ebenso große Breite der Accommodation hat, wie das erstere. Die genannte Linse mit 6 Zoll negativer Brennweite entwirft nämlich von Objecten, die 6 Zoll hinter ihr liegen, ein virtuelles Bild in 3 Zoll Entfernung, für welches sich also das supponirte myopische Auge accommodiren kann.

Wir können also die Accommodationsbreite zweier verschiedenen fernsichtiger Augen nicht unmittelbar nach dem Abstand ihres Fernpunkts vom Nahpunkte mit einander vergleichen, sondern wir müssen sie durch eine vorgesetzte Linse erst auf gleichen Refraktionszustand gebracht denken, um sie vergleichen zu können.

Soll eine solche Linse die Objecte nicht vergrößern oder verkleinern, so muß ihr zweiter Knotenpunkt mit dem ersten des Auges zusammenfallen (was sich praktisch, wenn es der Mühe werth erscheinen sollte, bei dicken convexconcaven Linsen erreichen lassen würde; vergleiche Seite 83 und 84). Nennen wir die Entfernung des Fernpunktes eines gegebenen Auges vom ersten Knotenpunkte  $F$ , die des Nahpunktes  $N$ , und  $A$  die Entfernung des nächsten Punktes, für den das mit einer Linse von der negativen Brennweite  $F$  versehene Auge sich noch accommodiren kann, so ist

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{N} - \frac{1}{F}$$

und die Größe  $\frac{1}{A}$  wird von DONDERS als Maafs der Accommodationsbreite benutzt.

Die Einheit dieses Accommodationsmaafses ist also Eins dividirt durch das Längenmaafs, wozu bisher, den Brillennummern entsprechend, Pariser Zolle gewählt sind.

die Ferne, von denen, welche sich auf die grössere oder geringere Breite der Accommodation beziehen und die also in einer Aenderung des Refraktionszustandes durch Muskelthätigkeit bestehen.

Für die Ansicht, dass der Zustand des Fernsehens der Ruhezustand des Auges sei, für welche schon die subjective Empfindung sehr entschieden spricht und die auch meiner oben gegebenen Darstellung zu Grunde liegt, führt DONDERS noch weiter an, dass durch gewisse narkotische Stoffe (namentlich Atropin, das Alkaloid der Belladonna) eine Lähmung des Ringmuskels der Pupille und der Accommodation hervorgebracht wird, wobei das Auge für seinen Fernpunkt eingerichtet ist, ohne diesen Refraktionszustand ändern zu können. Sollte ein muskulöser Apparat da sein, dessen Contraction die Accommodation für die Ferne verstärken könnte, so müsste man die sehr unwahrscheinliche Annahme machen, dass dieser durch das Atropin nicht gelähmt, sondern in eine dauernde krampfhaftige Zusammenziehung gebracht würde.

Daneben lehren pathologische Beobachtungen, dass wenn durch Lähmung des *Nervus oculomotorius* der Accommodationsapparat gelähmt wird, das Auge sich stets auf seinen früheren Fernpunkt dauernd einstellt. Dagegen sind durchaus keine Fälle von Bewegungslähmungen des Auges beobachtet worden, wobei der Fernpunkt sich genähert hätte.

826 Die grösste Sehweite entspricht also dem Ruhezustande des Auges. Als normale Lage des Fernpunktes kann die in unendlicher Ferne betrachtet werden. Solche Augen nennt DONDERS emmetropisch (von *ἐμμετρος*, *modum tenens*, und *ὤψ*, *oculus*), um die Vieldeutigkeit des Ausdrucks „normale“ oder „normalsichtige“ Augen zu vermeiden. Emmetropische Augen können natürlich noch an mancherlei anderen Fehlern leiden und brauchen nicht „normal“ zu sein.

Augen, deren Fernpunkt vor ihnen, aber nicht in unendlicher Ferne liegt, nennt er brachymetropisch oder, mit dem älteren Namen, myopisch; diese Augen können nur divergirend einfallende Strahlenbündel auf der Netzhaut vereinigen.

Augen, die im Gegentheil nicht nur parallele, sondern auch convergirend einfallende Strahlen vereinigen können, heissen hypermetropisch.

Die myopischen Augen können sich ohne Hilfe eines Brillenglases für weit entfernte Objecte nicht einstellen; es mangelt ihnen also an dem Theil der Fähigkeit eines emmetropischen Auges. Die hypermetropischen dagegen sind genöthigt jedes Mal, wo sie ein Object sehen wollen, eine Accommodationsanstrengung zu machen, welche häufig sehr störende Ermüdungserscheinungen hervorruft. Beiderlei Arten der Abweichung sind also für das Auge nachtheilig und werden deshalb von den ametropischen Augen zusammengefasst.

Der Grund dieser Abweichungen beruht auf einer ungleichen Länge der Augenaxe, die in de



Gesichtslinien und erreicht die stärkste Anstrengung der Accommodation besser bei stark convergenten Gesichtslinien.

DONDERS unterscheidet daher 1. die absolute Accommodationsbreite, wo der Fernpunkt genommen wird bei parallelen (oder selbst divergenten) Blicklinien, der Nähepunkt bei möglichst stark convergenten. Der Nähepunkt der Accommodation liegt hierbei ferner als der Convergenzpunkt. Es ist dies die größte erreichbare Accommodationsbreite, sie betrug bei einem emmetropischen Beobachter im Alter von 15 Jahren  $\frac{1}{3,69}$  (nach Pariser Zollen) oder 10 Dioptrien.

2. Die binoculare Accommodationsbreite. Die Convergenz wird hierbei nicht stärker gemacht, als zur Fixirung des Punktes, für den man accommodirt, nöthig ist. Man erreicht hierbei nicht ganz denselben Grad der Accommodation, wie im ersten Falle. Die Breite der binocularen Accommodation desselben Beobachters war  $\frac{1}{3,9}$  (9,5 Dioptrien).

3. Die relative Accommodationsbreite für einen gegebenen Grad der Convergenz. Diese war für denselben Beobachter bei parallelen Gesichtslinien nur gleich  $\frac{1}{11}$  (3,7 D.), erreichte bei einer Convergenz von  $11^\circ$  ihr Maximum von  $\frac{1}{5,76}$  (6,4 D.), blieb dann bei steigender Convergenz ziemlich unverändert, so daß sie bei  $23^\circ$  noch  $\frac{1}{6,4}$  (5,8 D.) betrug, und bei der Stellung des binocularen Nähepunkts, bei  $38^\circ$  Convergenz,  $\frac{1}{9}$  (4,1 D.). In der Stellung des absoluten Nähepunkts, bei  $73^\circ$  Convergenz, war sie Null.

Für ärztliche Zwecke müssen also bestimmte Grade der Convergenz gewählt werden, um vergleichbare Grade der Accommodation zu erhalten, und man muß mit passend gewählten Linsen, die man vor das Auge setzt, dem Patienten die Accommodation bei einem solchen Convergenzgrade möglich zu machen suchen.

Für die Bestimmung des Fernpunkts empfiehlt sich die parallele Richtung der Gesichtslinien auf ein entferntes Object; die Brennweite der schwächsten concaven Linsen, welche einem myopischen, oder der stärksten convexen Linsen, welche einem hypermetropischen Auge noch vollkommen genaues Sehen sehr entfernter kleiner Objecte gestatten, ist unmittelbar gleich der Entfernung des Fernpunktes vom Auge. Für die Bestimmung des Nähepunktes schreibt DONDERS vor, ihn durch passende Convexgläser stets bis auf etwa 8 Zoll heranzubringen, wenn er weiter abliegen sollte, um einer genügenden Accommodationsanstrengung sicher zu sein. Dabei muß dann natürlich der Einfluß der Linse auf die Lage des gesehenen Bildes in Rechnung gebracht werden.

829 Als Probeobjecte zur Prüfung der Sehweite ungeübter Beobachter dienen Buchstaben, Ziffern und Punktsysteme verschiedener Gröfse<sup>1</sup> und eine Sammlung abgestufter und leicht zu wechselnder Brillengläser.

Im Ganzen ist es rathsam bei Augen, deren Sehweite für die gewählte Beschäftigung nicht genügt, rechtzeitige Unterstützung durch passende Brillen anzuwenden. Presbyopische Augen brauchen eine Convexbrille beim Lesen und Schreiben, überhaupt bei der Beschäftigung mit nahen Objecten, um die Zerstreuungskreise zu vermindern. Bei schwacher Beleuchtung, wenn die Pupille weit ist und deshalb die Zerstreuungskreise gröfser, ist eine stärkere Brille nothwendig als bei stärkerer Beleuchtung. In der Regel genügt eine Brille, welche den Nähepunkt auf 10 bis 12 Zoll heranbringt; nur bei sehr alten Leuten, zwischen 70 und 80 Jahren, wo die Gesichtsschärfe sich beträchtlich vermindert, ist es wünschenswerth, die Objecte bis auf 8 oder 7 Zoll heranbringen zu können, um sie unter gröfserem Gesichtswinkel zu sehen.

Bei myopischen Augen ist namentlich darauf zu sehen, daß bei der Beschäftigung mit nahen Gegenständen gebückte Haltung des Kopfes und starke Convergenz der Augen vermieden wird, weil die Verdünnung, Ausbauchung und Zerrung der Membranen im hinteren Theile des Auges durch gesteigerten Blut- und Muskeldruck schnell wächst und die höheren Grade der Myopie das Sehvermögen sehr erheblich beeinträchtigen und gefährden. Bei den schwächeren Graden von Kurzsichtigkeit, wobei der Fernpunkt über 5 Zoll vom Auge liegt, ist es im Allgemeinen zulässig, concave Brillengläser, welche den Fernpunkt in unendliche Ferne rücken, anzuwenden und fortdauernd zu tragen. Das myopische Auge wird dadurch einem emmetropischen ähnlich gemacht. Dabei ist aber sehr sorgfältig darauf zu achten, daß Bücher, Papierblätter, auf denen geschrieben wird, und Handarbeiten nicht näher als 12 Zoll den Augen genähert werden. Bei übrigens guter Beschaffenheit des Auges ist in dieser Entfernung ohne Schwierigkeit möglich zu lesen und zu schreiben. Zwingen die Umstände gebieterisch zu feinerer Arbeit, die den Augen näher gebracht werden muß, so ist hierfür der Gebrauch schwächerer Concavgläser und vielleicht achromatisirter prismatischer Gläser, die auf der Nasenseite dicker als auf der Schläfenseite sind, rathsam, weil dann die sehr genäherten Objecte mit geringerer Convergenz und geringerer Anstrengung der Accommodation gesehen werden können.

Gläser, welche die Myopie vollkommen neutralisiren, können zuweilen bei solchen Kurzsichtigen, die noch nie Brillen getragen haben, erst nach einiger Gewöhnung an schwächere Gläser, statt deren man nach und nach schärfere substituirt, angewendet werden, weil die Verbindung zwischen

<sup>1</sup> Dergleichen sind herausgegeben von JÄGER jun., *Schriftscalen*, Wien 1857; und SNELLEN, *Test types for the determination of the acuteness of vision*; London, Williams and Norgate; Paris, Germer Baillière; Berlin, Peters; Utrecht, Greven. Die letztern sind in regelmäßiger Abstufung der Gröfse ausgeführt und mit Nummern versehen, welche die Zahl der Pariser Fusse angeben, um welche entfernt ein normales Auge die Buchstaben noch lesen kann. Aehnliche auch von GIRAUD TEULON. Paris, Nacet. Ferner M. BURCHARDT, *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite*. Cassel, A. Freyschmidt.

Accommodation und Convergenz den neuen Umständen allmählig angepaßt werden muß. Bei geringerer Accommodationsbreite oder merklich vermindelter Gesichtsschärfe ist es überhaupt rathsamer, für nahe Objecte schwächere Brillen zu tragen, die für die gewöhnlichen Beschäftigungen genügen, und für ferne Objecte eine Lorgnette zu Hilfe zu nehmen.

Bei höheren Graden von Myopie ist das Auge überhaupt schon leidend <sup>830</sup> und gefährdet; es sind dann mancherlei andere Rücksichten noch zu nehmen, die hier nicht weiter erörtert werden können, und der Rath eines intelligenten Arztes jedenfalls nothwendig. Überhaupt ist die Gleichgültigkeit, womit die meisten Kurzsichtigen den Zustand ihrer Augen betrachten, die Ursache späterer Entwicklung gefährlicher Augenkrankheiten und vieler Erblindungen, und es kann nicht genug vor Nachlässigkeit in dieser Hinsicht gewarnt werden.

Hypermetropische Augen brauchen convexe Linsen, und zwar wähle man im Anfang, wo sie ihre fortdauernde Accommodationsanstrengung noch nicht ganz zu beseitigen wissen, etwas zu starke Gläser, durch die sie schon ferne Objecte nicht mehr ganz deutlich sehen können. Je mehr sie sich der übermäßigen Accommodation entwöhnen, desto schwächere Gläser werden ausreichen. Bei vermindelter Accommodationsbreite brauchen sie stärkere Convergläser für die Nähe, schwächere für die Ferne. Die sehr bedeutenden Beschwerden der fortdauernden Accommodationsanstrengung werden durch passende Gläser ganz beseitigt, und es ist einer der bedeutendsten praktischen Triumphe der neueren Ophthalmologie, daß die äußerst hartnäckige Asthenopie, die auf Hypermetropie beruht und die die Verzweiflung der Patienten und Ärzte war, nachdem ihr Grund erkannt worden ist, durch ein so einfaches Mittel so leicht beseitigt werden kann.

Wenn man das Auge in Wasser taucht, fällt die Brechung der Licht- <sup>98</sup> strahlen an der Hornhaut fast ganz fort, und es bleibt nur die in der Krystalllinse wirksam, welche nicht hinreicht, um deutliche Bilder auf der Netzhaut zu entwerfen. Das Auge verhält sich dann wie ein überweitsichtiges, und braucht eine stark convexe Linse als Brille, um irgend etwas zu erkennen.

Um die Größe der Zerstreuungskreise berechnen zu können, bemerke man zunächst, daß alle Strahlen, die außerhalb des Auges auf die scheinbare (d. h. durch die Hornhaut gesehene) Pupille hinzielen, nach der Brechung in der Hornhaut die wirkliche Pupille treffen, und daß sie im Glaskörper so verlaufen, als kämen sie von dem Bilde der Pupille her, welches die Linse nach hinten zu entwirft. Es ergibt sich dies sogleich aus dem Begriffe des optischen Bildes. Ein gewisser Punkt der wirklichen Pupille und der correspondirende Punkt ihres Hornhautbildes sind in Rücksicht auf die Brechung an der Hornhaut correspondirende Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen. Strahlen, die von dem Punkte der wirklichen Pupille aus nach vorn gehen, scheinen vor dem Auge von dem Bilde dieses Punktes zu kommen, und umgekehrt, Strahlen, welche in der Luft nach einem Punkte der scheinbaren Pupille convergiren, müssen sich nach der Brechung an der Hornhaut in dem entsprechenden Punkte der wirklichen Pupille vereinigen.



der Strahl  $cp$  die Netzhaut in  $\gamma$  schneidet, so ist  $\gamma$  der Mittelpunkt des Zerstreuungskreises. Denn wegen des Parallelismus von  $ab$  und  $\alpha\beta$  verhält sich

$$\begin{aligned} ac : bc &= \alpha\gamma : \beta\gamma \\ ac &= bc, \text{ folglich} \\ \alpha\gamma &= \beta\gamma. \end{aligned}$$

Der Strahl also, welcher die Mitte des Zerstreuungskreises trifft, geht im Glaskörper verlängert durch den Mittelpunkt des Linsenbildes der Pupille. Wir können hinzusetzen, er geht in der vorderen Kammer in der That durch den Mittelpunkt der wirklichen Pupille und in der Luft verlängert durch den Mittelpunkt des Hornhautbildes der Pupille.

Daraus folgt, daß, wenn die Mittelpunkte der Zerstreuungskreise für zwei ungleich vom Auge entfernte Punkte auf einander fallen, der nach diesem gemeinsamen Mittelpunkte von dem Mittelpunkte des Linsenbildes der Pupille gehende Strahl beiden Strahlensystemen gemeinsam sein muß. Die Fortsetzung dieses gemeinsamen Strahls vor dem Auge muß also auch beide leuchtende Punkte treffen, und wird verlängert durch den Mittelpunkt des Hornhautbildes der Pupille gehen. Dasselbe wird der Fall sein, wenn das eine Zerstreuungsbild sich auf einen Punkt reducirt, der im Mittelpunkte des anderen Zerstreuungskreises liegt.

Beim Visiren decken sich zwei ungleich entfernte Punkte, wenn das Bild des einen in die Mitte des Zerstreuungsbildes des anderen fällt, oder die Mittelpunkte beider Zerstreuungsbilder auf einander fallen, falls beide undeutlich gesehen werden. Die sie verbindende gerade Linie nenne ich Visirlinie. Sie muß nach der eben gemachten Auseinandersetzung mit dem Strahle zusammenfallen, der nach dem Mittelpunkte des Hornhautbildes der Pupille geht, und dieser letztere Punkt wird deshalb der Kreuzungspunkt aller Visirlinien sein.

Der Begriff des Gesichtswinkels hängt hiermit nahe zusammen. Wenn man sagt, daß Objecte, die unter gleichem Gesichtswinkel erscheinen, gleiche scheinbare Größe haben, so muß man den Scheitel des Gesichtswinkels in den Kreuzungspunkt der Visirlinien legen. Gewöhnlich hat man ihn aber in den Kreuzungspunkt der Richtungslinien (den ersten Knotenpunkt) verlegt, und wenn es sich um Fälle handelt, wo die beiden gesehenen Punkte nach einander direct gesehen werden, würde man ihn in den Drehpunkt des Augapfels legen müssen. Für sehr weit entfernte Punkte wird die Größe des Gesichtswinkels dadurch nicht 100 verändert, für nahe aber allerdings.

Ich füge hier noch eine kleine Tafel bei, welche LISTING für sein schematisches Auge unter der Annahme berechnet hat, daß die Netzhaut in der zweiten Brennebene des Auges liege, und die Pupille 4 mm Durchmesser habe. Es sind darin angegeben unter  $l_1$  die Entfernungen des leuchtenden Punktes von dem vorderen Brennpunkte nach vorn, unter  $l_2$  die des Bildes von der Netzhaut nach hinten, unter  $z$  der Durchmesser des Zerstreuungskreises. Die Rechnung ist ausgeführt nach § 9 Gleichung 8 c)

$$l_1 \cdot l_2 = F_1 \cdot F_2$$

und § 11 Gleichung 1 a). Das Product  $F_1 \cdot F_2$  ist für LISTING's schematisches Auge gleich 301,26 Quadratmillimeter. (Als runde Zahl genügt 300.)

$l_1$	$l_2$	$z$
$\infty$	0 mm	0 mm
65 Meter.	0,005	0,0011
25	0,012	0,0027
12	0,025	0,0056
6	0,050	0,0112
3	0,100	0,0222
1,5	0,200	0,0443
0,75	0,40	0,0825
0,375	0,80	0,1616
0,188	1,60	0,3122
0,094	3,20	0,5768
0,088	3,42	0,6484

Man sieht aus dieser Tabelle auch, wie wenig sich die Lage des Bildchens ändert, wenn die sich ändernde Entfernung des Objects noch sehr groß ist, und wie schnell das Bildchen sich von der Netzhaut entfernt, wenn das Object in geringerer Entfernung vom Auge sich mehr und mehr nähert.

Um zu ermitteln, für welche Entfernungen sich ein Auge accommodiren kann, sind verschiedene Instrumente, Optometer, vorgeschlagen worden.

Die zuerst sich darbietende Methode, nach welcher wir im täglichen Leben Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit zu unterscheiden pflegen, ist die, zu beobachten, in welcher Entfernung kleinere Gegenstände, z. B. Buchstaben, am besten gesehen werden. Indessen ist dabei keine grosse Genauigkeit der Angaben möglich. Einmal sind gedruckte Buchstaben nie so klein, um nicht auch bei ziemlich beträchtlichen Abweichungen der Accommodation noch gelesen werden zu können. So kann ich eine Druckschrift, wie die vorliegende, in 13 Zoll Entfernung noch lesen, während mein Auge für seinen Fernpunkt, 3 Fuss Entfernung accommodirt ist. Und ebenso kann ich sie in 2,7 Zoll Entfernung lesen, obgleich ich das Auge nur auf 3,6 Zoll accommodiren kann. Ausserdem ist zu bemerken, dass die Gegenstände, wenn man sie dem Auge nähert, unter einem grösseren Gesichtswinkel erscheinen, und deshalb unter übrigens gleichen Umständen deutlicher erkannt werden als in grösserer Entfernung. Sehr kleine, schwer zu erkennende Gegenstände werden deshalb dem Auge zuweilen näher gebracht, namentlich von Hypermetropen, als die Accommodationsdistanz ist, weil man bei mässiger Ungenauigkeit des Bildes und grösserem Sehwinkel zuweilen mehr erkennt, als bei genauer Accommodation und geringerem Sehwinkel. Will man also die Accommodationsweiten auf diese Art ermitteln, so muss man für verschiedene Abstände verschiedene Gesichtsobjekte wählen, und alle so fein, dass sie in der betreffenden Entfernung von einem gut accommodirten Auge nur eben noch erkannt werden können.

PORTERFIELD<sup>1</sup> hat zuerst den SCHEINERSchen Versuch zur Untersuchung der Sehweiten empfohlen, und darauf ein Optometer gegründet, welches TH. YOUNG<sup>2</sup> verbesserte. Letzterer empfiehlt einen feinen weissen Faden auf dunklem Grunde auszuspannen, so dass sein eines Ende nahe unter dem Auge sich befindet, und dann durch einen Schirm mit zwei Löchern nach dem Faden zu sehen. Er erscheint dann nur an der Stelle, für welche das Auge accommodirt ist, einfach, an allen übrigen Stellen doppelt. Die einfach erscheinende Stelle kann leicht bezeichnet werden. Ihre Entfernung vom Auge entspricht der beim Versuche stattfindenden Sehweite des Auges. Übrigens kann man auch andere feine Objecte benutzen, welche man in verschiedene Entfernung vom Auge bringt. Man muss die Objecte für diese Versuche so fein wählen, dass sie durch die Löcher des Schirms eben noch deutlich gesehen werden können, z. B. feine Nadeln auf hellem

<sup>1</sup> W. PORTERFIELD, *On the eye*. Vol. I. p. 423. — *Edinb. medical Essays*. IV. 185.

<sup>2</sup> TH. YOUNG, *Phil. Transactions*. 1801. P. I. p. 34.

Grunde, oder feine Löcher und Spalten in dunklen Schirmen. Auch muß man darauf achten, dass man das Object durch beide Löcher gleichzeitig erblickt, sonst ist man Irrungen leicht ausgesetzt. Das Gesichtsfeld reducirt sich bei diesen Versuchen auf die verhältnißmäßig breiten Zerstreuungsbilder der beiden Löcher des Schirms, welche zum Theil in einander greifen müssen, wie *Fig. 65 a* und *b* darstellt. Nur in dem mittleren gemeinsamen Theile *c*, welcher zugleich am hellsten ist, können Doppelbilder erscheinen wie die Nadelspitzen *g*, nicht aber in den seitlichen Theilen, welche nur je einem Zerstreuungsbilde angehören. In dem letzteren erscheinen die Bilder stets einfach, wie die Nadel *h*. Dieser Umstand macht für ungeübte Personen das Gelingen des Versuchs oft schwierig.



Fig. 65.

Eine ähnliche Methode, um die Accommodationsdistanzen, namentlich den Fernpunkt zu bestimmen, schien mir in der Ausführung noch größere Genauigkeit zu geben als das Sehen durch zwei Löcher. Man läßt durch eine kleine Öffnung eines Schirms Licht des Himmels oder eine Kerzenflamme fallen. Solch ein kleiner Lichtpunkt erscheint einem Auge, welches nicht genau für ihn accommodirt ist, als ein fünf- oder sechsstrahliger Stern (s. unten § 14), während er bei passender Accommodation als ein ziemlich gut begrenzter, wenn auch nicht ganz regelmäÙig runder Lichtpunkt erscheint. Schiebt man nun einen Schirm von der Seite her vor die Pupille, so sieht man die Lichtfigur, welche der Punkt bildet, in der Regel von einer Seite her sich verdunkeln, und zwar von derselben Seite, wo der Schirm vorgeschoben wird, wenn das Object weiter entfernt ist, als die Accommodationsdistanz beträgt; von der entgegengesetzten Seite, wenn es näher ist. Bei richtiger Accommodation dagegen wird das Object entweder in allen seinen Theilen gleichzeitig dunkler, oder es wird in unregelmäßiger Weise verlöscht, so daß es z. B. oben und unten an zu schwinden fängt, während man den Schirm von einer Seite her vor die Pupille schiebt.

Ein anderes Mittel, die Sehweite zu bestimmen, welches namentlich für Ungeübte leichter ausführbar ist als der SCHEINER'sche Versuch, ist von der Farbenzerstreuung im Auge hergenommen, und wird in § 13 beschrieben werden.

RÜETE's Optometer ist bestimmt, sich gegen absichtliche Täuschungen durch den Untersuchten zu sichern. Es ist ein kastenartiger Schirm, durch welchen eine Röhre geht. Der zu untersuchende Mensch blickt durch diese Röhre auf ein Buch, von dem er nur einige Worte sieht, und dessen Entfernung zu beurtheilen er kein Mittel hat (als die Accommodation des Auges selbst). Man hält ihm bald kleinere, bald größere Druckschrift in verschiedenen Entfernungen vor; bei beabsichtigter Täuschung wird er schwer vermeiden, sich in Widersprüche zu verwickeln.

Noch sicherer ist zu diesem Zweck der Augenspiegel mit aufrechtem Bilde (s. u. § 16) zu gebrauchen, indem der Beobachter zu ermitteln sucht, durch welche Linse er selbst bei Entspannung seiner eigenen Accommodation die NetzhautgefäÙe im Hintergrunde des fremden Auges deutlich sieht.

Statt der wechselnden Brillengläser hat A. v. GRAEFE<sup>1</sup> auch ein ganz schwach vergrößernes GALILEI'sches Doppelfernrohr angewendet, in welchem die Änderung des Abstandes von Objectiv und Ocular durch ein Getriebe geschieht, dessen Drehung genau abgelesen werden kann. Ein ähnliches Optometer mit KEPLER'schem Fernrohr ist später von J. HIRSCHBERG<sup>2</sup> construiert.

Künstliche Augen zur Erläuterung von KEPLER's Theorie des Sehens und der Wirkung der Brillen sind beschrieben worden von HALLER<sup>3</sup>, HUYGENS<sup>4</sup>, WOLF<sup>5</sup>, ADAMS<sup>6</sup> und KRIES<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> A. v. GRAEFE, *Klinische Monatsblätter*. Bd. III. 8. 392.

<sup>2</sup> J. HIRSCHBERG, *Beiträge zur praktischen Augenheilkunde*. II. p. 4. Leipzig 1877.

<sup>3</sup> A. HALLER, *Elementa Physiologiae*. 1763. V. 469.

<sup>4</sup> C. HUYGENS, *Dioptrica*. Lugduni 1704. p. 112.

<sup>5</sup> C. v. WOLF, *Nützliche Versuche*. III. 481. Halle 1721.

<sup>6</sup> G. ADAMS, *Essay on vision*. London 1792.

<sup>7</sup> F. C. KRIES, *Übersetzung des Vorigen*. Gotha 1794.

die Ferne, von denen, welche sich auf die grössere oder geringere Breite der Accommodation beziehen und die also in einer Aenderung des Refraktionszustandes durch Muskelthätigkeit bestehen.

Für die Ansicht, dass der Zustand des Fernsehens der Ruhezustand des Auges sei, für welche schon die subjective Empfindung sehr entschieden spricht und die auch meiner oben gegebenen Darstellung zu Grunde liegt, führt DONDEBS noch weiter an, dass durch gewisse narkotische Stoffe (namentlich Atropin, das Alkaloid der Belladonna) eine Lähmung des Ringmuskels der Pupille und der Accommodation hervorgebracht wird, wobei das Auge für seinen Fernpunkt eingerichtet ist, ohne diesen Refraktionszustand ändern zu können. Sollte ein muskulöser Apparat da sein, dessen Contraction die Accommodation für die Ferne verstärken könnte, so müsste man die sehr unwahrscheinliche Annahme machen, dass dieser durch das Atropin nicht gelähmt, sondern in eine dauernde krampfartige Zusammenziehung gebracht würde.

Daneben lehren pathologische Beobachtungen, dass wenn durch Lähmung des *Nervus oculomotorius* der Accommodationsapparat gelähmt wird, das Auge sich stets auf seinen früheren Fernpunkt dauernd einstellt. Dagegen sind durchaus keine Fälle von Bewegungslähmungen des Auges beobachtet worden, wobei der Fernpunkt sich genähert hätte.

826 Die grösste Sehweite entspricht also dem Ruhezustande des Auges. Als normale Lage des Fernpunktes kann die in unendlicher Ferne betrachtet werden. Solche Augen nennt DONDEBS emmetropisch (von *ἐμμετρος*, *modum tenens*, und *ὄψ*, *oculus*), um die Vieldeutigkeit des Ausdrucks „normale“ oder „normalsichtige“ Augen zu vermeiden. Emmetropische Augen können natürlich noch an mancherlei anderen Fehlern leiden und brauchen nicht „normal“ zu sein.

Augen, deren Fernpunkt vor ihnen, aber nicht in unendlicher Ferne liegt, nennt er brachymetropisch oder, mit dem älteren Namen, myopisch; diese Augen können nur divergirend einfallende Strahlenbündel auf der Netzhaut vereinigen.

Augen, die im Gegentheil nicht nur parallele, sondern auch convergirend einfallende Strahlen vereinigen können, heissen hypermetropisch.

Die myopischen Augen können sich ohne Hilfe eines Brillenglases für weit entfernte Objecte nicht einstellen; es mangelt ihnen also ein wichtiger Theil der Fähigkeit eines emmetropischen Auges. Die hypermetropischen dagegen sind genöthigt jedes Mal, wo sie ein reelles Object fixiren wollen, eine Accommodationsanstrengung zu machen, wodurch mannigfache und häufig sehr störende Ermüdungserscheinungen herbeigeführt werden. Beiderlei Arten der Abweichung sind also für den praktischen Gebrauch des Auges nachtheilig und werden deshalb von DONDEBS unter dem Namen der ametropischen Augen zusammengefasst.

Der Grund dieser Abweichungen beruht der Regel nach auf der verschiedenen Länge der Augenaxe, die in den hypermetropischen kürzer ist



als in den emmetropischen. Damit hängt auch die Lage des Drehpunkts dieser Augen zusammen, der in den myopischen Augen weiter nach hinten, in den hypermetropischen weiter nach vorn liegt. Die Hornhaut und Linse zeigen in der Regel keine Krümmungsänderungen, aus denen die Ametropie erklärt werden könnte.

Um den Zustand solcher abweichender Augen vollständig zu bestimmen, muß ferner die Größe der Veränderung bestimmt werden, welche durch active Muskelanstrengung in ihrem Brechungszustande hervorgebracht werden kann. Wenn wir ein emmetropisches Auge, welches zwischen unendlicher Ferne und einer Sehweite von 6 Zoll sich für jedes Object einstellen kann, und ein stark myopisches, welches zwischen 6 und 3 Zoll Entfernung accommodiren kann, mit einander vergleichen, so scheint auf den ersten Anblick vielleicht das letztere eine viel engere Grenze der Accommodationsfähigkeit zu haben, als das letztere. Wenn wir aber dicht vor ein solches myopisches Auge eine Concavlinse von 6 Zoll Brennweite setzen, welche ihm erlaubt unendlich entfernte Gegenstände deutlich zu sehen, so werden wir finden, daß dasselbe Auge mit Hilfe dieser Brille nun auch, wie das zuerst genannte emmetropische Auge zwischen unendlicher Ferne und 6 Zoll Abstand accommodiren kann, also eine ebenso große Breite der Accommodation hat, wie das erstere. Die genannte Linse mit 6 Zoll negativer Brennweite entwirft nämlich von Objecten, die 6 Zoll hinter ihr liegen, ein virtuelles Bild in 3 Zoll Entfernung, für welches sich also das supponirte myopische Auge accommodiren kann.

Wir können also die Accommodationsbreite zweier verschieden fern- 827 sichtiger Augen nicht unmittelbar nach dem Abstand ihres Fernpunkts vom Nahpunkte mit einander vergleichen, sondern wir müssen sie durch eine vorgesetzte Linse erst auf gleichen Refraktionszustand gebracht denken, um sie vergleichen zu können.

Soll eine solche Linse die Objecte nicht vergrößern oder verkleinern, so muß ihr zweiter Knotenpunkt mit dem ersten des Auges zusammenfallen (was sich praktisch, wenn es der Mühe werth erscheinen sollte, bei dicken convexconcaven Linsen erreichen lassen würde; vergleiche Seite 83 und 84). Nennen wir die Entfernung des Fernpunktes eines gegebenen Auges vom ersten Knotenpunkte  $F$ , die des Nahpunktes  $N$ , und  $A$  die Entfernung des nächsten Punktes, für den das mit einer Linse von der negativen Brennweite  $F$  versehene Auge sich noch accommodiren kann, so ist

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{N} - \frac{1}{F}$$

und die Größe  $\frac{1}{A}$  wird von DONDERS als Maafs der Accommodationsbreite benutzt.

Die Einheit dieses Accommodationsmaafses ist also Eins dividirt durch das Längenmaafs, wozu bisher, den Brillennummern entsprechend, Pariser Zolle gewählt sind.

829 Als Probeobjecte zur Prüfung der Sehweite ungeübter Beobachter dienen Buchstaben, Ziffern und Punktsysteme verschiedener Größe<sup>1</sup> und eine Sammlung abgestufter und leicht zu wechselnder Brillengläser.

Im Ganzen ist es rathsam bei Augen, deren Sehweite für die gewählte Beschäftigung nicht genügt, rechtzeitige Unterstützung durch passende Brillen anzuwenden. Presbyopische Augen brauchen eine Convexbrille beim Lesen und Schreiben, überhaupt bei der Beschäftigung mit nahen Objecten, um die Zerstreuungskreise zu vermindern. Bei schwacher Beleuchtung, wenn die Pupille weit ist und deshalb die Zerstreuungskreise größer, ist eine stärkere Brille nothwendig als bei stärkerer Beleuchtung. In der Regel genügt eine Brille, welche den Nahpunkt auf 10 bis 12 Zoll heranbringt; nur bei sehr alten Leuten, zwischen 70 und 80 Jahren, wo die Gesichtsschärfe sich beträchtlich vermindert, ist es wünschenswerth, die Objecte bis auf 8 oder 7 Zoll heranbringen zu können, um sie unter größerem Gesichtswinkel zu sehen.

Bei myopischen Augen ist namentlich darauf zu sehen, daß bei der Beschäftigung mit nahen Gegenständen gebückte Haltung des Kopfes und starke Convergenz der Augen vermieden wird, weil die Verdünnung, Ausbauchung und Zerrung der Membranen im hinteren Theile des Auges durch gesteigerten Blut- und Muskeldruck schnell wächst und die höheren Grade der Myopie das Sehvermögen sehr erheblich beeinträchtigen und gefährden. Bei den schwächeren Graden von Kurzsichtigkeit, wobei der Fernpunkt über 5 Zoll vom Auge liegt, ist es im Allgemeinen zulässig, concave Brillengläser, welche den Fernpunkt in unendliche Ferne rücken, anzuwenden und fortdauernd zu tragen. Das myopische Auge wird dadurch einem emmetropischen ähnlich gemacht. Dabei ist aber sehr sorgfältig darauf zu achten, daß Bücher, Papierblätter, auf denen geschrieben wird, und Handarbeiten nicht näher als 12 Zoll den Augen genähert werden. Bei übrigens guter Beschaffenheit des Auges ist in dieser Entfernung ohne Schwierigkeit möglich zu lesen und zu schreiben. Zwingen die Umstände gebieterisch zu feinerer Arbeit, die den Augen näher gebracht werden muß, so ist hierfür der Gebrauch schwächerer Concavgläser und vielleicht achromatisirter prismatischer Gläser, die auf der Nasenseite dicker als auf der Schläfenseite sind, rathsam, weil dann die sehr genäherten Objecte mit geringerer Convergenz und geringerer Anstrengung der Accommodation gesehen werden können.

Gläser, welche die Myopie vollkommen neutralisiren, können zuweilen bei solchen Kurzsichtigen, die noch nie Brillen getragen haben, erst nach einiger Gewöhnung an schwächere Gläser, statt deren man nach und nach schärfere substituirt, angewendet werden, weil die Verbindung zwischen

<sup>1</sup> Dergleichen sind herausgegeben von JAEGER Jun., *Schriftscalen*, Wien 1857; und SNELLEN, *Test types for the determination of the acuteness of vision*; London, Williams and Norgate; Paris, Germer Baillière; Berlin, Peters; Utrecht, Greven. Die letztern sind in regelmäßiger Abstufung der Größe ausgeführt und mit Nummern versehen, welche die Zahl der Pariser Fuße angeben, um welche entfernt ein normales Auge die Buchstaben noch lesen kann. Aehnliche auch von GIRAUD TEULON. Paris, Nachez. Ferner M. BURCHARDT, *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Schärfe und Sehweite*. Cassel, A. Freyschmidt.

Accommodation und Convergenz den neuen Umständen allmählig angepaßt werden muß. Bei geringerer Accommodationsbreite oder merklich verminderter Gesichtsschärfe ist es überhaupt rathsamer, für nahe Objecte schwächere Brillen zu tragen, die für die gewöhnlichen Beschäftigungen genügen, und für ferne Objecte eine Lorgnette zu Hilfe zu nehmen.

Bei höheren Graden von Myopie ist das Auge überhaupt schon leidend 830 und gefährdet; es sind dann mancherlei andere Rücksichten noch zu nehmen, die hier nicht weiter erörtert werden können, und der Rath eines intelligenten Arztes jedenfalls nothwendig. Überhaupt ist die Gleichgültigkeit, womit die meisten Kurzsichtigen den Zustand ihrer Augen betrachten, die Ursache späterer Entwicklung gefährlicher Augenkrankheiten und vieler Erblindungen, und es kann nicht genug vor Nachlässigkeit in dieser Hinsicht gewarnt werden.

Hypermetropische Augen brauchen convexe Linsen, und zwar wähle man im Anfang, wo sie ihre fortdauernde Accommodationsanstrengung noch nicht ganz zu beseitigen wissen, etwas zu starke Gläser, durch die sie schon ferne Objecte nicht mehr ganz deutlich sehen können. Je mehr sie sich der übermäßigen Accommodation entwöhnen, desto schwächere Gläser werden ausreichen. Bei verminderter Accommodationsbreite brauchen sie stärkere Convexgläser für die Nähe, schwächere für die Ferne. Die sehr bedeutenden Beschwerden der fortdauernden Accommodationsanstrengung werden durch passende Gläser ganz beseitigt, und es ist einer der bedeutendsten praktischen Triumphe der neueren Ophthalmologie, daß die äußerst hartnäckige Asthenopie, die auf Hypermetropie beruht und die die Verzweiflung der Patienten und Ärzte war, nachdem ihr Grund erkannt worden ist, durch ein so einfaches Mittel so leicht beseitigt werden kann.

Wenn man das Auge in Wasser taucht, fällt die Brechung der Licht- 98 strahlen an der Hornhaut fast ganz fort, und es bleibt nur die in der Krystalllinse wirksam, welche nicht hinreicht, um deutliche Bilder auf der Netzhaut zu entwerfen. Das Auge verhält sich dann wie ein überweitsichtiges, und braucht eine stark convexe Linse als Brille, um irgend etwas zu erkennen.

Um die Größe der Zerstreuungskreise berechnen zu können, bemerke man zunächst, daß alle Strahlen, die außerhalb des Auges auf die scheinbare (d. h. durch die Hornhaut gesehene) Pupille hinzielen, nach der Brechung in der Hornhaut die wirkliche Pupille treffen, und daß sie im Glaskörper so verlaufen, als kämen sie von dem Bilde der Pupille her, welches die Linse nach hinten zu entwirft. Es ergibt sich dies sogleich aus dem Begriffe des optischen Bildes. Ein gewisser Punkt der wirklichen Pupille und der correspondirende Punkt ihres Hornhautbildes sind in Rücksicht auf die Brechung an der Hornhaut correspondirende Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen. Strahlen, die von dem Punkte der wirklichen Pupille aus nach vorn gehen, scheinen vor dem Auge von dem Bilde dieses Punktes zu kommen, und umgekehrt, Strahlen, welche in der Luft nach einem Punkte der scheinbaren Pupille convergiren, müssen sich nach der Brechung an der Hornhaut in dem entsprechenden Punkte der wirklichen Pupille vereinigen.

in der Richtung des Pfeils auf das Auge: auf der Iris sieht man an der dem Lichte zugekehrten Seite *b* den Hornhautreflex des Lichts, auf der anderen nach *a* hin die kaustische Linie, deren Licht zum Theil noch durch den vorspringenden Rand der Sclerotica hindurchscheint.

„ Aus diesen Thatsachen habe ich folgende Ansicht über den Mechanismus der Accommodation hergeleitet. Die Krystalllinse ist ein elastischer Körper, der bei Entspannung der inneren Augenmuskeln durch den Zug der an ihrem Rande sich anheftenden Zonula in radialer Richtung gedehnt und daher in Richtung ihrer Symmetrieaxe etwas zusammengezogen ist. Die Elasticität der Linse wird hauptsächlich ihrer Kapselmembran zu verdanken sein, denn wenn die Kapsel abgestreift ist, zeigen die oberflächlichen Schichten der Linse mehr eine schleimige als eine gallertige Consistenz. Sie haben keine Spur von dem Bestreben ihre Form gegen äufsere Kraft zu behaupten, oder nach Änderung der Form in die frühere Form zurückzukehren. Dafs aber die von der Kapsel umschlossene Linse elastisch ist, und dafs der Zug der Zonula genügt, sichtbare Formveränderungen hervorzubringen, läfst sich an todten, nicht zu alten menschlichen und thierischen Augen zeigen, wenn man von vorn her Linse und Zonula freilegt, und dann vorsichtig mit zwei feinen Pincetten die Zonula an entgegengesetzten Seiten der Linse fassend einen Zug ausübt. Man sieht dabei die Linse sich in Richtung des Zuges verlängern und wieder in ihre Kreisform zurückkehren, sobald der Zug nachläßt.

Im unverletzten Zustande ist die Zonula an ihrem äufseren Rande ziemlich fest mit den niedrig auslaufenden Firsten der Ciliarfortsätze und dadurch mit der Aderhaut verbunden, so dafs Linse, Zonula und Aderhaut eine vollständig geschlossene vom Glaskörper prall ausgefüllte Kapsel bilden. Der Druck der Flüssigkeit wird die Spannung der genannten Theile unterhalten müssen.

Die in Richtung der Meridiane des Auges verlaufenden Radialfasern des Ciliarmuskels, welche am hintern Ende der Ciliarfortsätze im Gewebe der Aderhaut endigen, werden bei ihrer Zusammenziehung das dort mit der Aderhaut und Glashaut fest verbundene hintere Ende der Zonula nach vorn ziehen, und dadurch die Spannung der Zonula und ihren Zug gegen die Peripherie der Linse aufheben müssen, so dafs in Folge davon die Linse in Richtung ihrer Durchmesser sich zusammenziehen, in Richtung ihrer Axe sich verdicken wird. Dadurch wird auch nothwendig die Wölbung ihrer beiden Flächen vergrößert werden.

Die vordersten mehr nach der Augenaxe hin gerichteten Fasern des Ciliarmuskels biegen zum Theil in Richtungen um, die dem Rande der Linse parallel verlaufen, und setzen so eine Art Ringfaserschicht zusammen, die von MAX LANGENBECK<sup>1</sup> entdeckt und *Compressor lentis* oder *Sphincter lentis* genannt worden ist. Sie liegen der Linse aber nirgend an. Die Function

<sup>1</sup> MAX LANGENBECK, *Klinische Beiträge zur Chirurgie und Ophthalmologie*. 1849.

dieser Fasern scheint mir nur die zu sein, auch den vorderen Theil der Ciliarfortsätze der zurückweichenden Linse und Zonula nachzuschieben, so daß keine Zerrung in deren Gewebe und kein Zug auf den vorderen Theil der Zonula entstehen kann, wodurch die Wirkung der Radialfasern des Ciliarmuskels beeinträchtigt würde..

Der Zug des Ciliarmuskels wird aber auch nach vornhin sich geltend machen, wo er sich an das elastische Gewebe an der inneren Seite des *Canalis Schlemmii* ansetzt. Er wird dieses nach rückwärts hin dehnen und damit auch den Ansatz der Iris nach rückwärts ziehen, was, wie die unter 5) oben beschriebenen Thatsachen zeigen, im lebenden Auge wirklich geschieht. Es wird dadurch Platz gewonnen für die wässrige Feuchtigkeit, die andererseits durch das Vordringen der Krystalllinse in der Augenaxe an Raum verliert.

Welche Fläche der Linse durch diese Änderung stärker verändert wird, muß wesentlich davon abhängen, ob der Zug der Zonula mehr die vordere oder hintere Linsenfläche trifft. Nach MAX SCHULTZE<sup>1</sup> treten geradezu alle Fasern der Zonula auf den peripherischen Rand der vorderen Hälfte der Linsenkapsel. Jedenfalls thun das die starken Fasern, welche auf den nach vorn vortretenden Firsten der Zonulafalten verlaufen. Daß diese gespannt und unnachgiebig sind, zeigt sich auch bei dem alten, oben schon erwähnten anatomischen Experimente PETIT's, wo man eine feine Canüle in den sogenannten *Canalis Petiti*, d. h. in den Raum zwischen Zonula und Glashaut einsticht und dann Luft einbläst. Dabei stülpen sich die hinteren schlaffen Theile der Zonula nach vorn aus und treten zwischen den straff gespannten Außenfirsten eiförmig gewölbt nach vorn, einer antiken Eierleiste entsprechend, daher PETIT den Canal *Canal godronné* nannte.

Aus dieser Straffheit der Außenfirsten der Zonula folgt nun, daß der Zug derselben hauptsächlich die vordere Linsenkapsel treffen und abplatteln muß, wodurch das ganze Centrum der Linse etwas nach rückwärts gedrängt wird.

Eine solche Durchbiegung der Linse wird die vordere Fläche platter machen müssen, als sie durch rein radialen Zug geworden wäre. An der hinteren Fläche dagegen wird der größere Theil der Abplattung, den die radiale Spannung hervorbringen könnte, durch die Durchbiegung wieder aufgehoben. Auch die Verschiebung nach vorn, welche die hintere Fläche durch die Verkürzung der Linsenaxe erleiden sollte, wird durch die beschriebene Durchbiegung wieder aufgehoben. Indessen ist klar, daß die Linsensubstanz und der vor ihr ausweichende Glaskörper längs der Peripherie der Linse der wässrigen Feuchtigkeit gegenüber an Platz wieder gewinnen müssen, was die Linse in der Mitte durch das Zurückweichen ihrer vorderen Fläche verliert.

In der That schiebt sich, wie wir gesehen, wenn diese Spannung im fernsehenden Auge eintritt, der davor liegende peripherische Theil der Iris vor. Da die Iris ventilartig der vorderen Fläche der Linse anliegt, ist an

<sup>1</sup> M. SCHULTZE, *Archiv für mikroskopische Anatomie*. Bd. III. S. 496.

ein schnelles Eindringen von Wasser in den Raum hinter der Iris nicht zu denken; das Vortreten der peripherischen Iris zeigt ohne Zweifel auch ein entsprechendes Vortreten des hinter ihr liegenden Ciliarkörpers an.

Gespannte elastische Membranen, die ein unveränderliches Volumen einer incompressibeln Flüssigkeit umschließen, und mit einem kreisförmigen Rande angeheftet sind, wie die Zonula an der Aderhaut, streben, je mehr ihre Spannung wächst, desto mehr sich der Form eines Kugelsegments zu nähern. Im ungespannten Zustande, beim Nahesehen, wölbt sich die vordere Linsenfläche vor der flachen Krümmung der vorderen Zonulafirsten hervor. Im gespannten Zustande, beim Fernsehen, viel weniger. Indessen ist der Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche von etwa 10 mm doch immer noch kleiner, als der der Zonulawölbung, der etwa auf 14 mm zu schätzen ist.

Für die Theorie des Mechanismus der Accommodation sind noch einige der an operirten Menschen gemachten Erfahrungen wichtig. A. VON GRAEFE<sup>1</sup> beobachtete an einem Auge, wo er die ganze Iris durch Operation entfernt hatte, daß die normale Breite der Accommodation vorhanden war, und auch die Krümmungsänderung der vorderen Linsenfläche deutlich beobachtet werden konnte. Daraus geht hervor, daß die Iris bei der Accommodation keine wesentliche Rolle spielt, wie es A. CRAMER<sup>2</sup> vermuthet hatte.

DONDERS<sup>3</sup> stellte in zwei für die Untersuchung sehr günstigen Fällen, wo die Linse durch Staaroperation entfernt war, aber mit Hülfe einer convexen Brille noch gut gesehen werden konnte, fest, daß keine Spur von Accommodation vorhanden war, trotzdem bei dem Bestreben nahe Objecte zu sehen Convergenz beider Augenaxen und Verengerung der Pupille eintrat. Das zeigt also namentlich, daß keine Veränderung in der Länge der Axe des Augapfels der Accommodation zu Hülfe kommt, wie dies früher vielfach vermuthet worden war.<sup>4</sup>

Dasselbe wird bestätigt durch die Wirkung des Atropins auf das Auge, wobei der *Sphincter pupillae* und der Ciliarmuskel zeitweilig vollständig gelähmt werden, die Pupille sich stark erweitert und die Accommodation ganz aufhört. Die äußeren Augenmuskeln, durch deren Druck auf den Äquator des Bulbus dieser nach hinten verlängert werden könnte, sind indessen ganz wirkungskräftig. Es ergibt sich also daraus, daß sie nicht wesentlich zur Accommodation beitragen.

831 Zu erwähnen ist in dieser Hinsicht noch ein Versuch von BAHR<sup>5</sup> am unverletzten Auge.

BAHR betrachtete im Zustande der Accommodation ein nahes scharf beleuchtetes Rechteck, bis ein kräftiges Nachbild in seinem Auge entwickelt war, und warf dieses dann mit nachlassender Accommodation auf eine ferne Fläche, auf der er die scheinbare Größe des Nachbildes bestimmte. Da

<sup>1</sup> A. V. GRAEFE, *Graefe's Archiv für Ophthalmol.* Bd. VII. (2) 150.

<sup>2</sup> A. CRAMER, *het Accommodationsvermogen der Oogen*, Haarlem, 1853. Übersetzt von DODEN, Leer. 1855.

<sup>3</sup> F. C. DONDERS, *On the anomalies of accommodation and refraction*. London. 1864. p. 320–321.

<sup>4</sup> Eine entgegengesetzte Beobachtung will FÖRSTER gemacht haben. *S. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*. X. Jahrg. Febr., März. 1872.

<sup>5</sup> C. R. BAHR, *De oculi accommodationis experimenta nova*. Berlin 1857. (Dissert.)

nun die Größe des Bildes auf der Netzhaut proportional ist dem Abstände der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges, und die Größe des Netzhautbildes in beiden Beobachtungen dieselbe war, so läßt sich aus einem solchen Versuche berechnen, in welchem Verhältniß sich der Abstand der Netzhaut vom zweiten Knotenpunkte ändert. BAHR fand aus seinen Versuchen eine Verschiebung des Knotenpunkts nach vorn um 0,35 Millimeter; meine weiter unten angestellte neuere Berechnung ergiebt 0,356. Fände eine Verlängerung des Augapfels statt, so müßte die Veränderung jener Entfernung viel bedeutender sein, und wenn eine solche Verlängerung der einzige Grund der Accommodation wäre, bis zu 3 Millimeter betragen, was demnach, wie auch diese Versuche von BAHR zeigen, nicht der Fall sein kann.

Auch an frischen Augen getödteter Thiere läßt sich Zusammenziehung<sup>n</sup> des Ciliarmuskels durch elektrische Reizung der vorderen Hälfte des Augapfels hervorbringen, wie schon CRAMER gefunden hat, dem es auch bei Tauben, wo der Muskel quergestreifte, sich schnell bewegende Fasern hat, gelang, die Änderung der Form der vorderen Linsenfläche zu beobachten. Später haben V. HENSEN und C. VOELCKERS<sup>1</sup> durch Reizung der Ciliarnerven bei Hunden Contractionen des Muskels hervorgebracht. Sie konnten constatiren, daß, wenn die Hornhaut bis auf einen 2 mm breiten peripheren Saum abgetragen war, dieser Saum bei Reizung des Muskels nach innen gezogen wurde; die Hornhaut also wirklich den vorderen Ansatzpunkt des Muskels bildete. Ein Stückchen der Hornhaut, welches mit dem Muskel nur noch durch das *Lig. pectinatum* in Verbindung stand, wurde bei der Contraction des Muskels an diesen herangezogen.

Durch ein Fenster der Sclera konnte die bei der Reizung eintretende Verschiebung der Aderhaut nach vorn beobachtet werden.

Eine sehr feine Nadel durch die Sclera und Aderhaut eingestossen bewegt sich bei Reizung der Ciliarnerven mit ihrem äußeren Ende nach hinten, was ebenfalls das Vorrücken der Aderhaut bei Spannung des Muskels anzeigt. Am Äquator des Auges schätzen die genannten Beobachter die Verschiebung auf  $\frac{1}{2}$  mm. Auf den Ciliarmuskel eingestossen, bewegt sich die Nadel nicht.

Die vordere Fläche der Linse wölbt sich beim Hunde bei Tetanisirung des *Ganglion ciliare* stärker vor, auch wenn vorher die Iris theilweis weggenommen war. Die hintere Fläche verschob sich ein wenig nach hinten, was theils durch eine mit einem Deckgläschen geschlossene Öffnung in der Sclerotica beobachtet, theils durch ein Fühlhebelchen constatirt wurde. Zusammenziehung der Querdurchmesser der Linse war nicht sicher zu beobachten. Dagegen gelang es beiden Beobachtern, das Erschlaffen der Zonula bei Spannung des Ciliarmuskels mittels eines Fühlhebels zu beobachten.

War die Hornhaut bis auf einen Randstreifen von 1 mm Breite weggenommen, so war die Vorwölbung der Linse bei Reizung noch vorhanden,

<sup>1</sup> V. HENSEN u. C. VOELCKERS, *Experimentaluntersuchung über den Mechanismus der Accommodation*. Kiel, 1868.

wenn auch vermindert, ebenso wenn auch noch die Iris weggenommen wurde. Nach Entfernung auch der Linse wölbt sich der Glaskörper convexer vor. Läßt man jetzt den Accommodationsapparat spielen, so sieht man, wie die tellerförmige Grube sich stark vorwölbt, und beim Aufhören der Reizung schnell zurückgeht.

Ich gebe hier außer der ersten von mir durchgeführten Berechnung eines schematischen Auges in zwei verschiedenen Accommodationszuständen<sup>1</sup> noch eine neuere Berechnung, welche gewonnen ist unter Anwendung von Mittelwerthen, wie sie durch die ophthalmometrischen Messungen bisher gefunden sind. Als Krümmungsradius der Hornhaut ist das Mittel von DONDERS Beobachtungen an normalsichtigen Männern und Frauen genommen.<sup>2</sup> Als Ort verschiedener Punkte und Flächen ist immer ihre Entfernung vom Hornhautscheitel angegeben, und zwar nach hinten positiv gerechnet, nach vorn negativ. Die Längen sind in Millimeter angegeben.

	Alte Berechnung Accommodation für		Neue Berechnung Accommodation für	
	Ferne	Nähe	Ferne	Nähe
<b>Angenommen.</b>				
Brechungsvermögen des Kammerwassers und Glaskörpers .....	103	103		
	77	77	1.3365	1.3365
Totales Brechungsvermögen der Krystalllinse .	16	16	1.4371	1.4371
	11	11		
Krümmungsradius der Hornhaut .....	8.0	8.0	7.829	7.829
Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche .	10.0	6.0	10.0	6.0
Krümmungsradius der hinteren Linsenfläche .	6.0	5.5	6.0	5.5
Ort der vorderen Linsenfläche .....	3.6	3.2	3.6	3.2
Ort der hinteren Linsenfläche .....	7.2	7.2	7.2	7.2
<b>Berechnet.</b>				
Vordere Brennweite der Hornhaut .....	23.692	23.692	23.266	23.266
Hintere desgl. ....	31.692	31.692	31.095	31.095
Brennweite der Linse .....	43.707	33.785	50.617	39.073
Abstand des vorderen Hauptpunktes der Linse von ihrer Vorderfläche .....	2.1073	1.9745	2.126	1.989
Abstand des hinteren von der hinteren Fläche	— 1.2644	— 1.8100	— 1.276	— 1.823
Abstand der beiden Hauptpunkte der Linse von einander .....	0.2283	0.2155	0.198	0.187
Hintere Brennweite des Auges .....	19.875	17.756	20.713	18.689
Vordere desgl. ....	14.858	13.274	15.498	13.990
Ort des ersten Hauptpunktes .....	1.9403	2.0330	1.753	1.858
Ort des zweiten Hauptpunktes .....	2.3563	2.4919	2.106	2.257
Ort des ersten Knotenpunktes .....	6.957	6.515	6.968	6.566
Ort des zweiten Knotenpunktes .....	7.373	6.974	7.321	6.965
Ort des vorderen Brennpunktes .....	— 12.918	— 11.241	— 13.745	— 12.132
Ort des hinteren Brennpunktes .....	22.231	20.248	22.819	20.955

<sup>1</sup> Erste Auflage dieses Buches, S. 111.

<sup>2</sup> Die Berechnung für das fersichtige Auge ist wohl nach einem Collegienhefte schon in GRAEFE und SÄMISCH, *Handbuch der Ophthalmologie*, VI., S. 230 unter HELMHOLTZ II von Herrn NAGEL mitgetheilt. Ein kleiner Rechnungsfehler ist hier verbessert.



Nimmt man an, daß bei der Accommodation für die Ferne dieses schematische Auge in unendliche Ferne blicken könne, so würde die Netzhaut nach der neuen Berechnung in der Axe des Auges 22,819 mm von der vorderen Hornhautfläche entfernt sein, und bei dem anderen berechneten Accommodationszustande ein Gegenstand deutlich gesehen werden, welcher 140,33 mm vor dem vorderen Brennpunkte, oder 152,46 mm vor der Hornhaut liegt. Es würde dies der Accommodationsbreite eines normalen Auges gut entsprechen.

Veränderungen der Hornhautkrümmung wollten einige ältere Beobachter<sup>1</sup> bei ungenaueren Untersuchungsmethoden gefunden haben. Neuere genauere Messungen dieser Krümmung mit Hilfe der reflectirten Bilder haben ergeben, daß sie ganz unverändert bleibt. Solche sind von SENFF<sup>2</sup>, CRAMER<sup>3</sup> und mir selbst angestellt worden. Das Ophthalmometer läßt eine sehr genaue Ausführung dieser Versuche zu, wobei Änderungen des Radius um  $\frac{1}{200}$  seiner Größe wahrzunehmen sein würden, während ein Wechsel der Sehweite zwischen 5 Zoll und unendlicher Entfernung einen Wechsel des Krümmungshalbmessers von 6,8 auf 8 mm erfordern würde, wenn eine solche Veränderung die Accommodation bewirken sollte. Ich habe aber durchaus negative Resultate erhalten. Zu erwähnen ist hier noch ein sehr sinnreicher Versuch von TH. YOUNG, welcher dasselbe beweist. Er beschreibt ihn folgendermaßen: „Ich nehme aus einem kleinen botanischen Mikroskope eine biconvexe Linse von  $\frac{3}{10}$  Zoll Radius und Brennweite, befestigt in einer beckenförmigen Fassung von  $\frac{1}{5}$  Zoll Tiefe, und mache ihre Kante mit Wachs wasserdicht. Ich tröpfe ein wenig mäßig kaltes Wasser hinein, bis es zu drei Vierteln damit angefüllt ist, und bringe es dann an das Auge, so daß die Hornhaut in das Becken hineinragt und überall mit dem Wasser in Berührung ist. Mein Auge wird dadurch sogleich weitsichtig, und das Brechungsvermögen der Glaslinse, welches durch das Wasser auf etwa 1,6 Zoll Brennweite zurückgeführt ist, ist nicht hinreichend, die Stelle der Hornhaut zu vertreten, welche durch das Wasser unwirksam geworden ist; aber die Hinzufügung einer anderen Linse von  $\frac{5}{8}$  Zoll Brennweite bringt mein Auge zu seinem natürlichen Zustande zurück, und noch etwas darüber hinaus. Ich wende dann das Optometer an, und finde dieselbe Ungleichheit in der horizontalen und verticalen Brechung wie ohne Wasser, und ich habe in beiden Richtungen eine Accommodationsfähigkeit bis zu einer Sehweite von 4 Zollen wie vorher. Im ersten Augenblicke erschien mir die Accommodation allerdings etwas geringer und nur im Stande, das Auge von dem für parallele Strahlen geeigneten Zustande zu einer Sehweite von 5 Zoll zu bringen, und dies ließ mich glauben, daß die Hornhaut eine kleine Wirkung im natürlichen Zustande haben könnte; indem ich aber überlegte, daß die künstliche Hornhaut ungefähr  $\frac{1}{10}$  Zoll vor der Stelle der natürlichen sich befand, berechnete ich die Folgen dieses Unterschiedes und fand ihn genau ausreichend, um die Verringerung des Spielraums der Sehweite erklären.“

Um wie viel sich beim Nahesehen der Pupillarrand der Iris nach vorn verschiebt, läßt sich wenigstens annähernd bestimmen, nachdem man die Dimensionen und Krümmung der Hornhaut und die Entfernung der Pupillfläche von

<sup>1</sup> J. P. LOBÉ, *Diss. de oculo humano*. Lugd. Batav. 1742. p. 119. — HOME, *Philos. Transact.* 1796. p. 1.

<sup>2</sup> Artikel „Sehen“ in R. WAGNER, *Handwörterbuch der Physiologie*.

<sup>3</sup> A. CRAMER, *Het Accommodatievermogen der Oogen*. Harlem 1853. p. 45

der Hornhaut bestimmt hat. Es sei *C* *Fig. 73* die Hornhaut, *c* und *d* ihr äußerer Rand, *a* *b* die Pupille beim Fernsehen. Hat sich nun der Beobachter gegen dieses Auge so  
 113 gestellt, daß ihm die ganze Pupille gerade verdeckt wird, so muß *cb* die Gesichtslinie des Beobachters in der wässrigen Feuchtigkeit sein. Wird nun beim Nahesehen die ganze Pupille vor dem Rande der Sclerotica eben sichtbar, und kennt man ihre Breite




Fig. 73.

selben, so muß man die Größe des hervortretenden Theils schätzen und danach die Berechnung anstellen.

Da die vordere Fläche der Linse eine, wenn auch kleine, Quantität des einfallenden Lichtes reflectirt — das größere der bekannten SANSON'schen Bildchen — so kann diese Spiegelung, wie bei der Hornhaut, zur Bestimmung des Krümmungshalbmessers der vorderen Linsenfläche gebraucht werden. Indessen muß eine andere Methode eingeschlagen werden, und läßt sich auch nicht eine gleiche Genauigkeit erreichen, wie bei den Messungen der Hornhaut, weil der Reflex kein recht scharfes Bild formt, und wenigstens, wenn er von Lampenlicht herrührt, zu schwach ist, um im Ophthalmometer in deutlich sichtbare Doppelbilder zerlegt werden zu können. Jedes der Doppelbilder hat natürlich nur die halbe Lichtstärke des einfachen Bildes.

Es schien mir daher am besten, die Größe des Bildchens der vorderen Linsenfläche mit einem dicht daneben stehenden Hornhautbildchen zu vergleichen, dessen Größe leicht berechnet oder gemessen werden kann. Ich mußte deshalb zwei gespiegelte Objecte haben, das eine von veränderlicher Größe, um das Hornhautbild des einen gleich dem ersten SANSON'schen Bilde des andern machen zu können.




Fig. 74.

Die Anordnung des Apparates ist perspectivisch dargestellt *Fig. 75* und im Grundriss in *Fig. 74*. *O* ist das beobachtete Auge, dicht vor ihm liegt ein kleines ebenes Metallspiegelchen *A* (ich benutzte ein OERTLING'sches Stahlspiegelchen) horizontal auf einer festen Unterlage. In einiger Entfernung ( $1\frac{1}{2}$  Fufs) davor befinden sich zwei stellbare Schirme *b* und *c* mit den Öffnungen *f* und *g*. Die Öffnung *f* ist eng (2 Linien im

Quadrat), hinter ihr steht ein kleines Wachslichtchen. Die Öffnung  $g$  ist gröfser (9 Linien im Quadrat), hinter ihr befindet sich eine recht helle und grofse Lampenflamme. Das Auge  $O$  stellt sich nun so, dafs es gleichzeitig über den Spiegel  $A$  hinweg die beiden erleuchteten Öffnungen sieht, als auch im Spiegel ihre Spiegelbilder, welche scheinbar bei  $f_1$  und  $g_1$  liegen. Die Öffnung  $f$  und ihr Spiegelbild  $f_1$  bilden nun das Object für die Hornhautspiegelung, die Öffnung  $g$  und ihr Spiegelbild  $g_1$  das Object für die Linsenspiegelung. Um die Schirme richtig zu stellen, werden auf dem Tische erst, wie der Grundrifs zeigt, die Linien  $OB$  und senkrecht dazu  $GH$  gezogen. Letztere fällt mit der Ebene beider Schirme zusammen. Dem beobachteten Auge  $O$  wird ein Fixationspunkt  $E$  neben dem Ständer des Schirms  $b$  vorbei in der Ferne angewiesen. Der Beobachter hat sein Auge, entweder unbewaffnet oder mit einem schwach vergrößernden, aber lichtstarken Fernrohre  $F$ , versehen über der Linie  $OF$ , welche mit  $OB$  einen Winkel bildet, der gleich dem Winkel  $gOB$  ist. Das Gesichtszeichen  $E$  wird nun so gestellt, dafs der Linsenreflex in der Mitte der Pupille erscheint, und das Hornhautbildchen der kleineren Lichtpunkte dicht daneben. Dann wird der Schirm  $b$  so lange gehoben oder gesenkt, bis der Abstand der kleinen gespiegelten Lichtpunkte genau eben so grofs ist, wie der der Mittelpunkte der gröfseren.




Fig. 75.

Die Spiegelung auf der Hornhaut wird durch eine einfache spiegelnde Fläche bewirkt, deren negative Brennweite nach den bekannten Gesetzen der Katoptrik gleich dem halben Krümmungsradius ist. Die vordere Linsenfläche ist aber in diesem Falle ein aus einer brechenden und einer spiegelnden Fläche zusammengesetztes spiegelndes System, ähnlich einer convex-concaven gläsernen Sammellinse, deren concave Seite mit Spiegelfolie belegt ist. Die Brennweite  $q$  dieses spiegelnden Systems ist sowohl von der Krümmung der brechenden, als von der der spiegelnden Fläche und ihrem gegenseitigen Abstände abhängig. Diese Brennweite  $q$  läfst sich aus dem beschriebenen Versuche bestimmen. Die Bilder, welche spiegelnde Systeme von weit entfernten Gegenständen entwerfen, verhalten sich nämlich direct wie die Brennweiten der Systeme, wenn also zwei verschiedene Systeme von ungleichen gleich weit entfernten Gegenständen gleiche Bilder entwerfen, muß sich ihre Brennweite umgekehrt, wie die Gegenstände verhalten. Es verhält sich also

$$q : \frac{1}{2}R = f_1 : gg_1.$$

Um den scheinbaren Abstand der Öffnung  $g$  von ihrem Spiegelbilde  $g_1$  zu finden, stellt man neben sie einen senkrechten Maßstab  $hh$  (Fig. 75). Das Spiegelbild  $g_1$  liegt eben so tief unter der verlängerten Ebene des Spiegels  $A$ , als  $g$  selbst darüber. Um nun den Ort zu finden, wo die Spiegelebene den Maßstab schneidet, braucht man nur sehr flach über das Spiegelchen hinweg nach dem Maßstabe hin zu visiren. Man sieht dann an der Grenzlinie direct gesehene und gespiegelte Theilstriche sich decken. Die

Mitte zwischen zwei solchen sich deckenden Theilstrichen ist der Punkt des Maßstabes, der in die Verlängerung der Spiegelebene fällt. Dessen Abstand von der Mitte der Öffnung  $g$  doppelt genommen ist gleich dem Abstände  $gg_1$ . Ebenso findet man  $ff_1$ .

Es ergaben sich in drei verschiedenen Reihen von Versuchen folgende Werthe für das Verhältniß  $\frac{R}{2q}$ :

	O. H.	B. P.	I. H.
$\frac{R}{2q} =$	0,308	0,635	0,544
	0,313	0,618	0,544
	0,346	0,571	0,478
Mittel	0,322	0,608	0,522
$q =$	11,39 mm	6,288 mm	7,810 mm

Endlich ist aus  $q$  noch der Radius  $r$  der vorderen Linsenfläche zu berechnen. Die Herleitung der Formel, welche die Brennweite eines zusammengesetzten brechenden und spiegelnden Systems giebt, ist weitläufig aber ohne Schwierigkeiten. Ich gebe daher hier nur ihr Resultat, und zwar gleich für einen etwas allgemeineren Fall. Vor der spiegelnden Fläche vom Radius  $r$  (Radien concaver Flächen als positiv, convexer als negativ betrachtet) stehe ein System brechender Kugelflächen, deren erste Brennweite (in Luft)  $f_1$ , die zweite Brennweite (im letzten brechenden Medium)  $f_2$  ist. Der Abstand der spiegelnden Fläche vom zweiten Hauptpunkte des brechenden Systems sei  $d$ , so ist

$$q = \frac{f_1 \cdot f_2 \cdot r}{2(f_2 - d) \cdot (f_2 - d + r)} \quad \dots \dots \dots 1)$$

Die Haupt- und Knotenpunkte des Systems fallen in einen Punkt zusammen, und dieser ist das von dem Systeme entworfene Bild des Scheitels der brechenden Fläche. Aus dem Werthe von  $q$  findet sich:

$$r = \frac{q \cdot (f_2 - d)^2}{\frac{1}{2} f_1 \cdot f_2 - q \cdot (f_2 - d)} \quad \dots \dots \dots 1a)$$

Die beiden Größen  $f_1$  und  $f_2$  sind oben für die Hornhäute der untersuchten Augen berechnet worden. Für die Größe  $d$  können wir hier ohne Nachtheil den Abstand zwischen der Pupillarfläche und der Mitte der Hornhaut setzen. Es ergibt sich der Krümmungshalbmesser der vorderen Linsenfläche

für das Auge	O. H.	gleich	11,9 mm
- - -	B. P.	-	8,8 -
- - -	I. H.	-	10,4 -

Bei zwei todten Linsen fand ich mit dem Ophthalmometer den Krümmungsradius der vorderen Fläche gleich 10,2 und 8,9 mm, was mit den Messungen an den lebenden Augen gut stimmt.

Mittels des Apparates, Fig. 73 und 74, kann nun auch leicht die Größenveränderung des Bildes der vorderen Linsenfläche gemessen werden, indem man die Beobachtung ganz ebenso ausführt, wie dort beschrieben ist, und nur die Augen für das nähere Ge-  
sichtszeichen accommodiren läßt. Ich fand unter diesen Umständen die Brennweite  $q$  des aus der Hornhaut und vorderen Linsenfläche zusammengesetzten spiegelnden Systems und den Krümmungsradius  $r$  der vorderen Linsenfläche, wie folgt:

Augo.	Krümmungshalbmesser der vorderen Linsenfläche		Verschiebung der Pupille bei Accommodation für die Nähe.
	fernsehend.	nahsehend.	
O. H.	11,9	8,6	0,36
B. P.	8,8	5,9	0,44
J. H.	10,4		

Um den Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche nach den obigen Gleichungen <sup>114</sup> berechnen zu können, muß man den Krümmungsradius der Hornhaut und die Entfernung der vorderen Linsenfläche (Pupille) von der Hornhaut kennen. Beide Größen waren an den angeführten Augen schon vorher gemessen.

Das Spiegelbild, welches die hintere Linsenfläche von fernen Gegenständen entwirft, verändert seine Größe ebenfalls bei geänderter Accommodation des Auges, aber in sehr unbedeutendem Grade. Ich beobachtete diese Veränderung durch das Ophthalmometer, indem ich zwei Flammen senkrecht über einander seitlich vom Auge hinter den Öffnungen eines Schirms aufstellte und deren von der hinteren Linsenfläche gespiegelte Bilder beobachtete. Ich stellte die Doppelbilder der beiden Lichter, so wie Fig. 76 zeigt, neben einander. Hier sind  $a_0$  und  $a_1$  die Doppelbilder des unteren,  $b_0$  und  $b_1$  die des oberen Lichts. Die einander genäherten Bilder  $a_1$  und  $b_0$  deckten sich nicht, sondern standen dicht neben einander, so daß ich sie gesondert erkennen konnte. Bei der Accommodation für die Nähe verschob sich  $b_0$  etwas in der Richtung nach  $a_0$  und  $a_1$  in der Richtung nach  $b_1$  hin. Ich schätzte die Breite der Verschiebung etwa gleich der Hälfte der Breite eines jeden lichten Flecks, und da die Entfernung der Mittelpunkte der Öffnungen, durch welche das Licht fiel, gleich der sechsfachen Breite der Öffnungen war, so war die Verkleinerung des Bildes etwa  $\frac{1}{12}$  seiner Größe. Andere Beobachter haben zum Theil etwas größere Änderungen gefunden (s. S. 147).




Fig. 76.

Endlich suchte ich noch zu ermitteln, ob die hintere Linsenfläche sich bei der Accommodation für die Nähe in der Richtung von hinten nach vorn verschöbe. Ich verfuhr dabei in derselben Weise, wie ich die scheinbare Entfernung der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut bestimmt hatte. Bei derselben Anordnung des Apparates untersuchte ich, ob der Lichtreflex der hinteren Linsenfläche bei veränderter Accommodation und unänderter Richtung der Augenaxe seinen Platz änderte, wobei abwechselnd das Fernrohr rechts und das Licht links, dann wieder das Fernrohr links und das Licht rechts stand. Indessen habe ich keine Ortsveränderung dieses Bildchens bemerken können. Die scheinbare Entfernung der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut wird also bei den Accommodationsänderungen nicht merklich verändert.

Was dürfen wir nun aus diesen Veränderungen des Spiegelbildchens und des scheinbaren Ortes der hinteren Linsenfläche auf die wirklichen Veränderungen derselben für Schlüsse ziehen? Der scheinbare Ort dieser Fläche wird durch die Brechung in der Linse überhaupt sehr wenig geändert, da sie dem hinteren Knotenpunkte der Linse ziemlich nahe liegt, und wir können daraus schließen, daß auch die Unterschiede ihrer Verschiebung durch die Brechung bei verschiedenen Accommodationszuständen des Auges jedenfalls so klein sein werden, daß wir sie vernachlässigen können. So wird z. B. in dem neueren schematischen Auge, dessen optische Constanten wir in diesem Paragraphen als Beispiel berechnet haben, beim Fernsehen die hintere Linsenfläche scheinbar um 0,166 mm, beim Nahesehen um 0,102 mm nach vorn verschoben; sie würde also, während sie in Wirklichkeit an ihrer Stelle bleibt, sobald das Auge sich für die Nähe accommodirt, scheinbar um 0,064 mm nach hinten rücken. Dies ist aber zu wenig, um wahrgenommen zu werden. Übrigens kann diese Rechnung eben nur dazu dienen zu zeigen, daß die Verschiebungen und ihre Unterschiede überhaupt klein sind, keineswegs um den Sinn dieses Unterschiedes in der wirklichen Krystalllinse zu zeigen, weil hierbei wesentlich die Entfernung der Hauptpunkte der Linse von einander in Betracht kommt, welche in der Krystalllinse jedenfalls geringer ist als in den schematischen homogenen Linsen.

Wir können also nur sagen, daß der wahre Ort der hinteren Linsenfläche bei den Accommodationsänderungen nicht merklich geändert werde.

Um zu ermitteln, wie das von der hinteren Linsenfläche entworfene Spiegelbild sich bei Änderungen der Augenmedien verändere, denken wir uns die spiegelnde Fläche durch eine unendlich dünne Schicht Glaskörper von der letzten brechenden Fläche des

Auges getrennt. Dann können wir für die Cardinalpunkte des brechenden Systems die Cardinalpunkte des Auges nehmen. Es sei  $n$  das Brechungsverhältniß des Glaskörpers; ferner nennen wir  $p$  die Entfernung des hinteren Brennpunktes des Auges von der hinteren Linsenfläche nach hinten gerechnet,  $\epsilon$  die des zweiten Knotenpunktes des Auges von derselben Fläche nach vorn gerechnet. In der Gleichung 1), welche die Brennweite eines zusammengesetzten brechenden und spiegelnden Systems giebt, haben wir zu setzen

$$\begin{aligned} f_1 &= p + \epsilon \\ f_2 &= n \cdot (p + \epsilon) \\ f_2 - d &= p. \end{aligned}$$

Dann wird der Werth der Brennweite des brechenden und spiegelnden Systems:

$$q = \frac{n \cdot r}{2} \cdot \frac{(p + \epsilon)^2}{p \cdot (p + r)} \quad \dots \dots \dots 2)$$

Bei der Accommodation für die Nähe wird  $\epsilon$  jedenfalls größer, weil bei der Gestaltveränderung der Linse die Knotenpunkte des Auges vorrücken müssen; dadurch würde auch, wenn sich  $r$  und  $p$  gar nicht veränderten, der Werth von  $q$  und die Größe des Spiegelbildes zunehmen müssen. Dagegen wird  $p$  bei der Accommodation für die Nähe kleiner und dadurch kann der Werth von  $q$  auch kleiner werden, unter den Verhältnissen dieser Größen im Auge. Differentiirt man  $q$  nach  $p$ , so erhält man

$$\frac{dq}{dp} = \frac{n \cdot r}{2} \cdot \frac{p + \epsilon}{p^2 \cdot (p + r)^2} \cdot [p \cdot r - (2p + r) \cdot \epsilon].$$

Von den Factoren dieses Ausdrucks kann nur der letzte, in der eckigen Klammer eingeschlossene negativ werden, wird es aber wohl im normalen Auge nicht, da  $\epsilon$  gegen  $p$  und  $r$  sehr klein ist. Es wird  $\frac{dq}{dp}$  positiv sein, d. h.  $q$  wird mit  $p$  zugleich größer und kleiner werden. Es würde also bei der Accommodation für die Nähe, wobei  $p$  kleiner wird, wenn wir vorläufig von der Veränderung von  $\epsilon$  absehen und  $r$  constant setzen, auch  $q$  und das Spiegelbild der hinteren Linsenfläche kleiner werden können, und man könnte vermuthen, die beobachtete Verkleinerung dieses Bildes sei dadurch hervorgerufen. Die Rechnung nach der Gleichung 2) indessen ergibt das Gegentheil. Nehmen wir aus LISTING's schematischem Auge die Werthe  $p = 14,647$ ,  $\epsilon = 0,3601$ ,  $r = 6$ , so würde  $p$  auf 10,597 verkleinert werden müssen, um  $q$  um  $1/12$  seines Werthes zu verringern. Der hintere Brennpunkt des Auges müßte also 4 mm vor die Netzhaut rücken, was jedenfalls schon die mögliche Veränderung der Lage dieses Punktes überschreitet. Aber da ein Theil der hierdurch bewirkten Verkleinerung des Bildes durch das Vorrücken der Knotenpunkte (d. h. Vergrößerung von  $\epsilon$ ) wieder aufgehoben werden würde, wie vorher auseinandergesetzt ist, so können wir nicht zweifeln, daß die Verkleinerung des Bildchens auf der hinteren Linsenfläche ohne eine, wenn auch geringe Vermehrung der Krümmung dieser Fläche nicht die beobachtete Größe haben könne.

Berechnet man die Brennweiten  $q$  für das neuere schematische Auge dieses Paragraphe, so findet man für das fernsehende 2,850, für das nahesehende 2,715, welche Größen nur um  $1/11$  ihres Werthes unterschieden sind, während die dazu gehörigen Krümmungsradien (6 und 5,5 mm) um  $1/12$  differiren. Hier verdeckt also die Änderung der brechenden Mittel die des Krümmungsradius zum Theil, und läßt sie kleiner erscheinen, als sie wirklich ist. Wir schließen daraus, daß die hintere Fläche der Linse bei der Accommodation für die Nähe sich stärker wölbt.

831 KNAPP<sup>1</sup> hat an vier individuellen Augen die Lage des Fernpunkts und Nahpunkts, die Krümmung und Lage der Hornhaut und der Linsenflächen beim Sehen für die Ferne, wie bei der Accommodation für die Nähe bestimmt und gefunden, daß die aus den Krümmungsänderungen der Krystalllinse berechnete Accommodation hinreichend gut mit

<sup>1</sup> H. KNAPP, *Graefe's Archiv für Ophthalmologie*. VI. (2) 8. 1. 1860.

der wirklich stattfindenden Accommodationsbreite übereinstimmte, so daß die Annahme einer Verlängerung des Auges hierdurch ausgeschlossen war.

Ähnliche Bestimmungen sind ferner gemacht worden von ADAMÜCK und WOINOW<sup>1</sup> n von MANDELSTAMM und SCHÖLER<sup>2</sup>, von REICH<sup>3</sup> und endlich von WOINOW<sup>4</sup>.

Ich gebe hier die von diesen Beobachtern gemessenen Werthe sowohl beim Sehen für die Ferne, wie bei der Accommodation für die Nähe, und füge, des Vergleichs halber, die schon oben angegebenen Resultate meiner eigenen Bestimmungen hinzu.

		Krümmungs- radius der Horn- haut	Abstand der vor- deren Fläche der Krystalllinse von dem Hornhautscheitel		Abstand der hin- teren Fläche der Krystalllinse von dem Hornhautscheitel		Krümmungs- radius der vor- deren Linsen- fläche		Krümmungs- radius der hin- teren Linsen- fläche	
			für den Fern- punkt	für den Nahe- punkt	für den Fern- punkt	für den Nahe- punkt	für den Fern- punkt	für den Nahe- punkt	für den Fern- punkt	für den Nahe- punkt
HELMHOLTZ	I	7.338	4.024	3.664	7.172	7.172	11.9	8.6	5.83	
	II	7.646	3.597	3.157	7.232	7.232	8.8	5.9	5.13	
	III	8.154	3.739	—	7.141	7.141	10.4	—	5.37	
KNAPP	IV	7.7705	3.5924	3.0343	7.5127	7.5127	8.2972	5.3213	5.3546	4.6585
	V	8.0303	3.6073	3.0533	7.4568	7.4568	7.9459	4.8865	5.4867	4.9536
	VI	7.1653	3.3774	2.7295	7.1534	7.1534	7.8600	4.8076	6.9012	5.6098
	VII	7.2053	3.4786	2.8432	7.1011	7.1011	9.0641	5.0296	6.4988	5.0855
ADAMÜCK und WOINOW	VIII	7.2303	3.9981	3.29523	7.200	7.200	9.77751	8.21771	6.06353	4.6941
	IX	7.15568	3.23731	2.98985	7.200	7.200	10.2021	8.5975	6.2156	5.0001
	X	6.85224	2.8997	2.4876	6.8435	6.8247	9.1139	7.3104	7.6008	6.3792
	XI	7.17369	3.6332	3.07682	7.200	7.200	10.543	8.80103	6.5331	5.6293
MANDELSTAMM und SCHÖLER	XII	7.3408	3.7097	3.4606	7.5780	7.9048	10.5409	6.4881	6.4088	5.0494
	XIII	7.785	3.539	2.954	7.1218	6.803	10.159	6.496	6.331	5.664
REICH	XIV	7.201	3.654	3.3924	7.6474	7.7817	10.408	5.9358	6.5875	4.9872
	XV	7.4544	3.708	3.3234	7.4164	7.4879	10.5650	7.3822	5.5373	4.5825
	XVI	7.7939	3.6516	3.2626	7.4832	7.5861	11.197	8.2045	6.2229	5.1976
WOINOW	XVII	8.00747	3.6175	3.0028	7.200	7.200	9.3785	5.2304	6.2480	4.9714

Für den Mechanismus der Accommodation ist es wichtig, den Ursprung der 115 Iris genau zu kennen. Ich habe den *Canalis Schlemmii* mit Umgebung, wie er sich auf feinen Querschnitten der Augenhöhle darstellt, in *Fig. 2* (S. 7) abgebildet. *A* ist der Querschnitt des Kanals, der wohl auch im lebenden fernsehenden Auge eine längliche Spalte bildet, *C* die Cornea, *S* die Sclerotica, *D* die Bindehaut, *B* die Aderhaut, *E* ein Ciliarfortsatz, *J* die Iris. Die innere Wand des Kanals ist aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt. Der hinterste Theil dieser Wand bei *a* besteht ganz deutlich aus demselben Gewebe eng durchflochtener Sehnenfasern wie die Sclerotica, von der er ausgeht. Der vordere Theil besteht dagegen aus einem anderen Gewebe, welches undurchsichtiger ist als das Sehngewebe, stärker sich abzeichnende, gegen Essigsäure und Kali sehr

<sup>1</sup> E. ADAMÜCK u. M. WOINOW, *Gräfe's Archiv für Ophthalmologie*. XVI. (1) S. 144. 1870.

<sup>2</sup> L. MANDELSTAMM u. H. SCHÖLER, *Gräfe's Archiv für Ophthalmol.* XVIII. (1) S. 155. 1872.

<sup>3</sup> M. REICH, *Gräfe's Archiv für Ophthalmol.* XX. (1) S. 207. 1874.

<sup>4</sup> M. WOINOW, *Ophthalmometrie*. Wien. 1871. S. 119.

116 resistente Fasern enthält, und daher wohl für elastisches Gewebe zu halten ist. Nach vorn schiebt es sich zwischen *Membrana Descemetii* und die Knorpelsubstanz der Hornhaut ein, nach hinten heftet es sich theils an den hinteren sehnigen Theil der Wand, theils verbindet es sich mit den Faserzügen des Spannmuskels der Aderhaut. Das System der Aderhaut hängt nur mit der hinteren Hälfte der inneren Wand des SCHLEMMschen Kanals fest zusammen, wo der sehnige und elastische Theil sich verbinden. Doch entspringt auch von dem vorderen Theile der Kanalwand ein lockeres Netzwerk von Fasern, die die Charaktere der elastischen an sich tragen, welche sich an den Anfang der Iris anheften. Die Fasermassen, welche dem Spannmuskel und der Iris angehören, sieht man zum Theil von der Wand des Kanals entspringen, zum Theil mögen sie aber auch direct von der Aderhaut auf die Iris übergehen. In dem Gewebe der Ciliarfortsätze sieht man eine große Zahl weiter Lumina durchschnittener Blutgefäße, auf ihrem dem Glaskörper zugekehrten Rande die Lage des schwarzen Pigments.

Um sich von der Richtigkeit der hier gegebenen Darstellung des Ansatzes der Iris zu überzeugen, muß man einerseits feine Schnitte von getrockneten Augenhäuten untersuchen, dabei aber beachten, daß das Trocknen sehr starke Verzerrungen hervorbringen kann, und daß die elastischen Fasern vor dem Ansatz der Iris sehr leicht reißen oder brechen, wenn man die Iris von der Hornhaut abzieht. Andererseits muß man frische Präparate untersuchen, wobei man am besten eine Borste in den SCHLEMMschen Kanal einführt, ebenfalls aber sehr sorgfältig jedes Ziehen an der Iris oder Chorioidea vermeiden muß, denn dadurch kann man der Muskelmasse, durch welche diese Theile befestigt sind, jede beliebige Gestalt geben. Hebt man die Iris leise auf, und legt sie auf die Ciliarfortsätze zurück, so bemerkt man die feinen elastischen Fäden, welche sich zum vorderen Rande des Kanals hinüberspannen. Zieht man dann die Borste nach vorn, so erkennt man leicht die elastische Dehnbarkeit des vorderen Theils der Kanalwand. Schlägt man dagegen Iris und Chorioidea nach vorn über, und zieht die Borste nach hinten an, so zeigt sich der hintere Theil der Wand als unausdehnbar.

Die beschriebene Art des Ansatzes scheint mir für das Zurückweichen der Seitentheile der Iris beim Nahesehen wichtig zu sein. Ist die Iris nämlich erschlafft, so wird sie durch das Netzwerk der elastischen Fasern bei  $b$  bis zum vorderen Rande des SCHLEMMschen Kanals an dessen innerer Wand festgehalten. Spannen sich dagegen die circulären und radialen Fasern der Iris gleichzeitig, so bietet erst die Sehnenmasse am hinteren Rande des Kanals ihrem Zuge einen genügend festen Widerstand, und man kann daher sagen, die erschlaffte Iris setzt sich an den vorderen, die gespannte an den hinteren Rand des SCHLEMMschen Kanals, welche im Mittel 0,45 mm auseinanderliegen. In Fig. 70, S. 134, habe ich das verschiedene Verhalten des Ansatzes der Iris beim Fernsehen (Seite F) und Nahesehen (Seite N der Figur) darzustellen gesucht. Der SCHLEMMsche Kanal ist auf beiden Seiten mit  $s$  bezeichnet.

Ein anderer Theil des Auges, dessen Wirkungen bei der Accommodation noch in Betracht kommen könnten, sind die Ciliarfortsätze. L. FICK<sup>1</sup> hat nachgewiesen, daß sie unter dem Einflusse des elektrischen Stromes sich zusammenziehen, und ihr Blut entleeren, welches durch ziemlich weite Gefäßverbindungen leicht in die *Vasa vorticosa* der Aderhaut abfließen kann. Er nimmt an, daß durch diesen Übergang des Blutes in dem Theile des Auges, welcher hinter der durch die Linse und Zonula gebildeten Scheidewand liegt, der hydrostatische Druck vermehrt, vorn vermindert werde. Dadurch werde die Mitte der Linse nach vorn gedrängt, ihre vordere Fläche wölbe sich deshalb mehr. Dagegen behauptet FICK folgerichtig, daß die hintere Fläche dabei flacher werde, was den Beobachtungen nicht entspricht. Auch J. CZERMAK<sup>2</sup> hat in einem Versuche, den Mechanismus der Accommodation zu erklären, neben der von CRAMER angenommenen Spannung der Iris und des Ciliarmuskels eine Anschwellung der Ciliarfortsätze zu Hülfe genommen, wodurch ein Druck auf den Rand der Linse ausgeübt werden könnte.

<sup>1</sup> L. FICK, *J. Müller's Archiv*. 1853. S. 449.

<sup>2</sup> J. CZERMAK, *Prager Vierteljahrsschr. für praktische Heilkunde*. XLIII. S. 109.



Gegen die Ansicht, daß die Augenmuskeln durch ihren Druck auf den Augapfel dessen Gestalt veränderten, ihn namentlich in Richtung der Augenaxe verlängerten, und dadurch die Netzhaut weiter von der Linse entfernten, eine Ansicht, die vor der Entdeckung der Formänderung der Linse viel gewichtige Freunde hatte, ist anzuführen, erstens, daß, wie ich durch Messungen mit dem Ophthalmometer gefunden habe, jede Steigerung des hydrostatischen Drucks im Auge die Hornhaut flacher macht, was man an lebenden Augen würde beobachten können, wenn es der Fall wäre, und zweitens, daß bei einem geringen Drucke mit dem Finger auf den Augapfel durch den Augenspiegel beobachtet werden kann, wie die Gefäße der Netzhaut enger werden, nur noch intermittierende Blutströme bei den Pulsellen hindurchlassen, endlich ganz collabiren. Sobald die intermittierende Bewegung (sichtbare Pulsation der Schlagadern) beginnt<sup>1</sup>, verschwindet die Empfindlichkeit der Netzhaut, wahrscheinlich wegen ungenügender Blutzufuhr, und das Gesichtsfeld wird vollkommen schwarz.

Endlich sind noch die Versuche von TH. YOUNG anzuführen, welche wohl kaum einen Zweifel darüber bestehen lassen können, daß auch nicht die geringste Verlängerung der Augenaxe beim Nahesehen eintritt. Man kann die Fläche der Bindehaut des Auges zwischen den Augenlidern mit einem glatten, gut polirten Stücke Metall ohne erhebliche Beschwerde berühren. Man setze in den inneren Augenwinkel auf die Bindehaut einen glatten eisernen Ring (eines Schlüssels) auf, den man fest gegen den inneren Rand der Augenhöhle anstëmmt, und wende das Auge nach der inneren Seite herüber, so daß man durch den Ring und an dem Nasenrücken vorbei in die Ferne sieht. Dabei kommt der innere Umfang der Hornhaut ganz dicht an den Schlüssel zu liegen, und es wird somit verhindert, daß der Augapfel bei der Accommodation sich nach vorn verschieben könne. Nun dränge man den Ring eines ganz kleinen Schlüssels am äußeren Augenwinkel zwischen den Augapfel und Knochen ein. Dabei wird durch den Druck auf den Augapfel die Netzhaut gereizt, und es erscheint im Gesichtsfelde scheinbar vor dem Nasenrücken ein dunkler, anfangs auch wohl heller Fleck, ein Druckbild. Dieses reichte bei YOUNG bis auf die Stelle des deutlichsten Sehens, und er konnte erkennen, daß gerade Linien im Bereiche dieses Druckbildes eine leichte Krümmung erhielten, welche von einer durch den Druck veranlaßten leichten Einbiegung der Sclerotica herzurühren schien. Da das Druckbild an der Stelle des deutlichsten Sehens entstand, mußte der kleine Schlüssel die Gegend des gelben Flecks an der Hinterseite des Augapfels treffen. Unter diesen Umständen kann eine Verlängerung der Augenaxe offenbar nicht eintreten, ohne die Schlüssel von ihrer Stelle zu drängen. Wäre also die Accommodation mit einer Verlängerung der Augenaxe verbunden, so müßte sie unter diesen Umständen entweder ganz unmöglich sein, oder es müßten die Schlüssel verdrängt werden, und es müßte dabei das Druckbild wegen stärkerer Einbiegung der Hinterwand des Augapfels an Umfang außerordentlich zunehmen. Nichts von allem diesem ist der Fall. Das Auge kann vollständig so gut wie sonst accommodirt werden, und das Druckbild bleibt bei veränderter Accommodation ganz dasselbe.

TH. YOUNG scheint etwas hervorstehende Augen gehabt zu haben, wie auch aus anderen Versuchen, welche er beschreibt, hervorgeht. In meinem eigenen Auge reicht nur der eine Rand des Druckbildes bis zur Stelle des deutlichsten Sehens; übrigens konnte auch ich mich vollständig von der Möglichkeit der Accommodation und der Unveränderlichkeit des Druckbildes überzeugen.

Aus diesem Versuche folgt zunächst unmittelbar, daß die Entfernung des inneren Umfangs der Hornhaut von dem gelben Flecke oder einem Punkte der Hinterwand etwas nach außen vom gelben Flecke vollständig unveränderlich sei. Es würde aber die Entfernung der Hornhaut von dem gelben Flecke ohne auffallende Asymmetrie des Auges sich nicht verändern können, wenn nicht die genannte Entfernung ihres Randes sich ebenfalls änderte.

<sup>1</sup> F. C. DODDERS, *Nederl. Lancet*. 1854. Nov. S. 275.

FORBES meinte, daß bei der Accommodation für die Nähe das innere Auge unter einen stärkeren Druck gesetzt werde, und die Linse, weil sie wegen der verschiedenen Form und Dichtigkeit ihrer Schichten nach verschiedenen Richtungen hin verschieden elastisch sei, ihre Form ändere. DE HALDAT hat dagegen keine Veränderung der Brennweite des brechenden Apparates des Auges und einzelner Linsen finden können, welche er im Wasser comprimirt<sup>1</sup>.

Über keinen anderen Gegenstand der physiologischen Optik sind so viel widersprechende Ansichten aufgestellt worden, als über die Accommodation des Auges, weil erst in neuerer Zeit entscheidende Beobachtungsthatssachen gefunden wurden, und man bis dahin fast nur einem Spiel von Hypothesen überlassen gewesen war. Um die Übersicht zu erleichtern, werde ich die chronologische Ordnung verlassen, welche überdies in der späteren Zusammenstellung der Literatur beibehalten werden wird, und werde die verschiedenen Ansichten vielmehr nach ihren wesentlichen Zügen zusammenzugruppiren.

1) Ansichten, welche die Nothwendigkeit (und das Vorhandensein einer Änderung des brechenden Apparates ganz leugnen. Mehrere Naturforscher glaubten, daß das thierische und menschliche Auge die Fähigkeit habe, abweichend von den künstlich gefertigten Linsen die Bilder verschieden entfernter Gegenstände an gleichem oder wenigstens unmerkbar verschiedenem Orte zu entwerfen. MAGENDIE<sup>2</sup> behauptete sich davon an den Augen von weißen Kaninchen überzeugt zu haben, bei denen das Pigment der Aderhaut fehlt, und daher das Bild durch den hinteren Theil der Sehnethaut gesehen werden kann. In der That kann aber das Bild nicht scharf genug durch die Sehnethaut gesehen werden, um die geringen Unterschiede, welche bei der Accommodation in Betracht kommen, zu bemerken. Dasselbe wie MAGENDIE behaupteten RITTER<sup>3</sup> und HALDAT<sup>4</sup>. Für die Krystalllinse allein genommen, behaupteten HALDAT und ENGEL<sup>5</sup> dasselbe. Wenn man die Krystalllinse aus den Augenflüssigkeiten herausnimmt, und sie von Luft umgeben untersucht, wird ihre Brennweite außerordentlich kurz, und dann folgt aus den allgemeinen optischen Gesetzen, daß die Abstände der Bilder für unendlich oder 7 Zoll entfernte Objecte nicht merklich verschieden seien. Dadurch erklären sich die von ENGEL erhaltenen Resultate<sup>6</sup>.

Durch genauer angestellte Versuche haben sich dagegen HUECK<sup>7</sup>, VOLKMANN<sup>8</sup>, GERLING<sup>9</sup>, MAYER<sup>6</sup> und CRAMER<sup>10</sup> experimentell überzeugt, worüber die Theorie schon keinen Zweifel lassen konnte, daß auch thierische und menschliche Augen Bilder verschieden entfernter Gegenstände in verschiedenen Entfernungen entwerfen.

TREVIRANUS<sup>11</sup> glaubte auch eine theoretische Erklärung für die vermeintliche That- sache geben zu können, daß die Lage der Bilder unabhängig von der Lage des Gegen- standes sei, indem er ein besonderes Gesetz für die Zunahme der Dichtigkeit in der Linse zu diesem Ende annahm. Seine mathematische Beweisführung ist durch KOHL- RAUSCH<sup>12</sup> widerlegt worden.

STURM<sup>13</sup> glaubte die Abweichungen, welche die brechenden Flächen des Auges ver- glichen mit genauen Rotationsflächen zeigen, benutzen zu können, um die Accommodation

<sup>1</sup> C. N. A. DE HALDAT, *Comptes rendus*. XX. p. 61, 458 u. 1561.

<sup>2</sup> F. MAGENDIE, *Précis élémentaire de Physiologie*. I. p. 73. 1816.

<sup>3</sup> RITTER, *Græfe und Walther's Journal*. 1832. Bd. VIII. S. 347.

<sup>4</sup> DE HALDAT, *Comptes rendus*. 1842. *Ann. d. Chim. et de Phys.* Sér. 3. Tom. XII. p. 94.

<sup>5</sup> J. ENGEL, *Prager Vierteljahrsschr.* 1850. Bd. I. S. 167.

<sup>6</sup> S. ihre Widerlegung durch MAYER ebenda. 1850. Bd. IV. Außerord. Bellage.

<sup>7</sup> A. HUECK, *Diss. de mutationibus oculi internis*. Dorpat 1826. p. 17. — *Die Bewegung der Krystalllinse*. Leipzig 1841.

<sup>8</sup> A. W. VOLKMANN, *Neue Beiträge zur Physiol. d. Gesichtsinnes*. 1836. S. 100.

<sup>9</sup> C. L. GERLING, *Poggendorff's Ann.* XLVI. 243.

<sup>10</sup> A. CRAMER, *Het Accommodatievermogen*. Haarlem 1853. S. 9.

<sup>11</sup> G. R. TREVIRANUS, *Beiträge zur Anat. u. Physiol. der Sinneswerkzeuge*. 1823. Heft I.

<sup>12</sup> R. H. KOHLRAUSCH, *Über Treviranus' Ansichten v. deutlichen Sehen in der Nähe u. Ferne*. Rinteln 1836.

<sup>13</sup> J. K. F. STURM, *Comptes rendus*. XX. 554, 761 u. 1238. S. die Widerlegungen von CRAHAY, *Bull. de Bruxelles*. XII. 2. 311. E. BRÜCKE, *Berl. Berichte*. I. 207.

für verschiedene Abstände zu erklären. Er untersucht zunächst den Gang homocentrischer Strahlen, wenn sie durch eine krumme Fläche gebrochen sind, welche nicht eine Rotationsfläche ist, und findet, daß sie dann nicht in einen Brennpunkt vereinigt werden, sondern daß zwei Brennebenen für die gebrochenen Strahlen existiren. In der einen dieser Brennebenen findet die Vereinigung der Strahlen nach einer Richtung statt, in der anderen nach der darauf senkrechten. Wenn der Querschnitt des Strahlenbündels in der einen Brennebene eine kurze horizontale gerade Linie bildet, so geht er durch eine Ellipse mit horizontaler größter Axe in einen Kreis über, wenn man sich der anderen Brennebene nähert, und dann durch eine Ellipse mit senkrechter großer Axe in eine senkrechte gerade Linie, wenn man bis zur anderen Brennebene fortschreitet. Zwischen den beiden Brennebenen hält STURM den Querschnitt des Strahlenbündels im Auge für klein genug, um deutliche Bilder zu geben. Wird der leuchtende Punkt dem Auge genähert, so werden beide Brennebenen sich von der Linse entfernen, so lange aber die Netzhaut sich zwischen beiden Brennebenen befindet, würden die Bilder doch hinreichend deutlich bleiben.

Abweichungen der Art, wie sie STURM annimmt, scheinen in der That bei den meisten menschlichen Augen vorzukommen, und wir werden die davon abhängigen Erscheinungen in § 14 beschreiben, ebenda uns aber auch überzeugen, daß das Intervall der beiden Brennebenen lange nicht so bedeutend ist, wie STURM voraussetzt, und daß die erwähnte Abweichung des Auges keineswegs die Deutlichkeit des Sehens vermehrt, im Gegentheil vermindert. 119

DE LA HIRE<sup>1</sup> behauptete, daß es nur einen Abstand des deutlichen Sehens gebe, und daß in einer gewissen Entfernung vor ihm und hinter ihm die Gegenstände noch nicht so undeutlich erschienen, um nicht erkannt zu werden; sonst gebe es keine Accommodation. HALLER<sup>2</sup> ist im Wesentlichen derselben Meinung, und meint nur, daß auch die Verengerung der Pupille ein Hilfsmittel sei, um die Zerstreuungskreise naher Gegenstände kleiner zu machen; ebenso BESIO<sup>3</sup>.

Alle diese Ansichten, welche die Nothwendigkeit und das Vorhandensein einer inneren Veränderung des Auges ganz läugnen, werden am einfachsten widerlegt durch die Thatsache, daß wir einen in unveränderlicher Entfernung vor dem Auge liegenden Punkt willkürlich bald deutlich, bald undeutlich sehen können. Sie werden ferner widerlegt durch den SCHEINER'schen Versuch, da wir einen solchen Punkt durch ein Kartenblatt mit zwei Öffnungen willkürlich bald einfach, bald doppelt sehen können, und endlich durch die schon in § 11 erwähnten Beobachtungen mit dem Augenspiegel, wobei die Veränderungen des optischen Bildes auf der Netzhaut auch objectiv sichtbar gemacht werden.

2) Ansichten, wonach die Verengerung der Pupille zur Accommodation für die Nähe genügen sollte. Die Thatsache, daß sich die Pupille beim Nahesehen verengt, war von SCHEINER<sup>4</sup> gefunden worden. Wäre das Auge für die Ferne accommodirt, so würden die Zerstreuungskreise, in welchen nahe leuchtende Punkte auf der Netzhaut sich abbilden, durch Verengerung der Pupille allerdings verkleinert werden können. Indessen überzeugt man sich durch einen einfachen Versuch leicht davon, daß die Verengerung der Pupille nicht genügend ist, um das Auge für die Nähe zu accommodiren. Man braucht nur durch ein Kartenblatt mit einer Öffnung zu sehen, die enger als die Pupille ist, und welches gleichsam eine künstliche unbewegliche Pupille vertritt, um sich zu überzeugen, daß man auch dann beim Fernsehen nahe Gegenstände undeutlich sieht, beim Nahesehen ferne. Anhänger einer solchen Ansicht waren außer HALLER, den ich schon genannt habe, LE ROY<sup>5</sup>, HALL<sup>6</sup>, MORTON<sup>7</sup>. Die Beweise gegen diese

<sup>1</sup> PH. DE LA HIRE, *Journal des Sçavans*. 1685. p. 398.

<sup>2</sup> A. V. HALLER, *Elementa Physiologiae*. 1763. Tom. V. p. 516.

<sup>3</sup> BESIO, *Giornale Arcad.* 1846. CV. p. 3.

<sup>4</sup> CHR. SCHEINER, *Oculus*. p. 31.

<sup>5</sup> CH. LE ROY, *Mém. d. l'Acad. d. Sciences*. 1755. p. 594.

<sup>6</sup> HALL, *Meckel's Archiv*. Bd. IV. S. 611.

<sup>7</sup> S. G. MORTON, *American Journal of med. Sciences*. 1831. Nov.

Meinung brachten vor OLBERS<sup>1</sup>, DUGÈS<sup>2</sup>, HUECK und DONDERS<sup>3</sup>. Eine eigenthümliche Ansicht über den Erfolg der Verengerung der Pupille, die aber durch den schon genannten Versuch ebenfalls widerlegt wird, stellte J. MILE<sup>4</sup> auf, nahm sie aber selbst später wieder zurück<sup>5</sup>. Er glaubte, daß beim Fernsehen die Randstrahlen des Lichtbündels, welche vor der Netzhaut die Augenaxe schneiden würden, durch Diffraction am Rande der Pupille von der Augenaxe abgelenkt würden, und sie deshalb erst später schnitten. Die Diffraction des Lichts besteht aber keineswegs in einer solchen einfachen Ablenkung der ganzen Strahlen.

3) Ansichten, welche eine veränderte Krümmung der Hornhaut voraussetzen. LOBÉ<sup>6</sup> scheint der Erste gewesen zu sein, der eine Veränderung der Hornhautkrümmung wahrgenommen zu haben meinte. OLBERS<sup>7</sup> wagt nach seinen eigenen Beobachtungen nicht bestimmt zu behaupten, daß die Convexität beim Nahesehen zunehme. HOME<sup>8</sup>, ENGLEFIELD und RAMSDEN dagegen wollten eine Vermehrung der Krümmung bestimmt wahrgenommen haben. Jemand, der ein gutes Accommodationsvermögen besitzt, wurde mit dem Kopf in den Ausschnitt eines festen Brettes befestigt, so daß sein Kopf möglichst unbeweglich war. An dem Brette, in einem kleinen Abstände vom Auge, war eine Platte mit einer kleinen Öffnung befestigt (als Fixationspunkt), während ebenfalls an dem Brette zur Seite des Auges ein bewegliches Mikroskop angebracht war, durch welches man die vorderste Krümmung der Hornhautfläche wahrnehmen konnte. Das Mikroskop selbst war mit einem Ocularmikrometer versehen. Beim Nahesehen sollte die Hornhaut stärker gekrümmt werden, so daß ihre Mitte um  $\frac{1}{1000}$  eines englischen Zolles vorrückte. Messung der Spiegelbildchen auf der Hornhaut, welche HOME später ausführte, ergab zweifelhaftere Resultate. Wahrscheinlich ist er in beiden Fällen durch sehr kleine, regelmäßig eintretende Verschiebungen des Kopfes der beobachteten Person von hinten nach vorn getäuscht worden. TH. YOUNG<sup>9</sup> fand, indem er die Spiegelbilder der Hornhaut der Messung unterwarf, keine solche Unterschiede, und widerlegte namentlich die Hypothese der veränderten Hornhautkrümmung sehr schlagend in der oben beschriebenen Weise dadurch, daß er die unveränderte Existenz des Accommodationsvermögens nachwies, auch wenn das Auge unter Wasser gebracht ist. HUECK<sup>10</sup> fand bei der Wiederholung von HOME's Versuchen ähnliche Resultate, meint aber ermittelt zu haben, daß die Athmungsbewegungen regelmäßige Schwankungen des Kopfes hervorbringen, indem wir beim Nahesehen gewöhnlich einathmen, beim Fernsehen ausathmen. Sobald er den Athem anhalten liefs, traten gar keine oder nur sehr unregelmäßige Schwankungen der Mitte der Hornhaut ein. Diese unregelmäßigen Schwankungen schienen durch Contractionen des Schließmuskels der Augenlider hervorgebracht zu sein, da bei jeder Berührung der Cilien der Augapfel etwas zurückgedrängt wurde. BURROW<sup>11</sup> fand bei einer sorgfältigen Wiederholung von HOME's Versuchen keine regelmäßigen Schwankungen der Hornhautfläche; ebenso VALENTIN<sup>12</sup>. SENFF<sup>13</sup> stellte Messungen der Spiegelbildchen mit einem Fernrohr an, wodurch seine Messungen von kleinen Verschiebungen des Auges unabhängig wurden, und fand, daß der Krümmungshalbmesser der Hornhaut sich nicht um 0,01 Par. Linie veränderte, während das Auge bald auf 4, bald

<sup>1</sup> H. W. M. OLBERS, *De oculi mutationibus internis*. Gotting. 1780. p. 13.

<sup>2</sup> DUGÈS, *Institut* 1834. No. 73.

<sup>3</sup> F. C. DONDERS in RUETE, *Leerboek der Ophthalmologie*. 1846. bl. 110.

<sup>4</sup> J. MILE, *MAGENDIE, Journal de Physiologie*. VI. p. 166.

<sup>5</sup> J. MILE, *Poggendorff's Ann.* XLII.

<sup>6</sup> LOBÉ, ALBINUS, *Dissert. de oculo humano*. Lugd. Bat. 1742. p. 119.

<sup>7</sup> H. W. M. OLBERS, *De oculi mutat. int.* p. 39.

<sup>8</sup> E. HOME, *Philosoph. Transact.* 1795. p. 13 u. 1796. p. 2.

<sup>9</sup> TH. YOUNG, *Philosoph. Transact.* 1801. I. p. 55.

<sup>10</sup> A. HUECK, *Die Bewegung der Krystalline*. S. 40.

<sup>11</sup> BURROW, *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschl. Auges*. Berlin 1842. S. 115.

<sup>12</sup> G. G. VALENTIN, *Lehrbuch der Physiologie*. 1848. Bd. II. S. 122.

<sup>13</sup> SENFF, Art. „Sehen“ in R. WAGNER'S *Handwörterbuch der Physiologie*. S. 303.

auf 222 Zoll accommodirt wurde. Auch CRAMER<sup>1</sup> erhielt negative Resultate bei einer Messung der Spiegelbilder auf der Hornhaut mit Hilfe seines Ophthalmoskops. Sehr leicht und genau läßt sich diese Art von Messungen mittels des von mir construirten Ophthalmometers<sup>2</sup> ausführen, und gab mir ebenfalls negative Resultate.

Als Anhänger der Ansicht, wonach die Accommodation durch Änderung der Hornhautkrümmung bewirkt werde, sind aus späterer Zeit noch anzuführen FRIES<sup>3</sup>, VALLÉE<sup>4</sup> und PAPPENHEIM<sup>5</sup>. Der Letztere nimmt an, daß die Contraction der Iris beim Nahesehen die Hornhaut convexer mache.

4) Ansichten, nach welchen die Accommodation durch Verschiebung der Linse bewirkt wird. Diese Annahme war die älteste, denn schon KEPLER<sup>6</sup>, aus dessen Theorie des Sehens sich zuerst auch die Nothwendigkeit der Accommodation ergab, stellte sie auf, und sie hat zu jeder Zeit viele Anhänger gehabt. Ihm folgten SCHEINER<sup>7</sup>, PLEMPUS<sup>8</sup>, STURM<sup>9</sup>, CONRADI<sup>10</sup>, PORTERFIELD<sup>11</sup>, PLATNER<sup>12</sup>, JACOBSON<sup>13</sup>, BREWSTER<sup>14</sup>, J. MÜLLER<sup>15</sup>, MOSER<sup>16</sup>, BUROW<sup>17</sup>, RUETE<sup>18</sup>, WILLIAM CLAY WALLACE<sup>19</sup>, C. WEBER<sup>20</sup>. Die meisten dieser Männer hielten es für wahrscheinlich, daß der Ciliarkörper durch willkürlich hervorgebrachte Zusammenziehungen die Linse vor- und rückwärts bewegen könne. Um bei der Berechnung der Größe, um welche die Linse verschoben werden müßte, um das Auge zu accommodiren, nicht unmögliche Größen zu finden, war man gezwungen, der Hornhaut eine größere, der Linse eine geringere Brennweite beizulegen, als diese Theile wirklich besitzen. Unterstützt wurde diese Ansicht in neuerer 121 Zeit auch namentlich durch Beobachtungen am lebenden Auge, welche bewiesen, daß die Pupille sich beim Nahesehen der Hornhaut nähert. Bei Vögeln hat BIDLOO<sup>21</sup> schon die stärkere Wölbung der Iris beim Nahesehen bemerkt, was für den Menschen später HECK<sup>22</sup>, BUROW<sup>23</sup> und RUETE bestätigten. C. WEBER zeigte auf mechanischem Wege, daß bei Hunden die Vorderfläche der Linse sich nach vorn bewegt, sobald der vordere Theil des Auges durch elektrische Ströme gereizt wird. Er machte zu dem Ende an dem Auge eines lebenden, durch Opium betäubten Hundes in der Mitte der Cornea eine runde Öffnung, führte ein passend befestigtes Stäbchen ein, bis es die vordere Fläche der Linse berührte. Das andere Ende des Stäbchens stützte sich gegen den kürzeren Arm eines Fühlhebels, der das Vordrängen der vorderen Linsenfläche in vergrößertem Maasstab anzeigte.

HANNOVER<sup>24</sup> nahm dagegen die Möglichkeit an, daß die Linse in ihrer Kapsel sich nach vorn und hinten bewegen könnte, wozu ihr der sogenannte *Liquor Morgagni*

<sup>1</sup> A. CRAMER, *Het Accommodatievermogen der Oogen*. Harlem 1858. bl. 45.

<sup>2</sup> H. HELMHOLTZ, *Graefe's Archiv für Ophthalmologie*. Bd. I. (2) S. 303.

<sup>3</sup> FRIES, *Über den optischen Mittelpunkt im menschl. Auge*. Jena 1839. S. 27.

<sup>4</sup> L. L. VALLÉE, *C. R. de l'Acad. d. Sciences*. 1847. Oct. p. 501.

<sup>5</sup> PAPPENHEIM, *Specielle Gewebelehre des Auges*. Breslau 1842.

<sup>6</sup> J. KEPLER, *Dioptrice*. Propos. 64.

<sup>7</sup> C. SCHEINER, *Oculus*. Oeniponti 1619. Lib. III. p. 163.

<sup>8</sup> PLEMPUS, *Ophthalmographia*. Lovanii 1648. B. III.

<sup>9</sup> J. CHR. STURM, *Dissertatio visionem ex obscurae camerae tenebris illustrans*. Altdorff 1693. p. 172.

<sup>10</sup> CONRADI, *Frörise's Notizen*. Bd. 45.

<sup>11</sup> W. PORTERFIELD, *On the eye*. Edinburgh 1759. Vol. I. p. 450.

<sup>12</sup> J. Z. PLATNER, *De motu ligamenti ciliaris*. Lipsiae 1738. p. 5.

<sup>13</sup> JACOBSON, *Suppl. ad. Ophthalm.* Copenh. 1821.

<sup>14</sup> D. BREWSTER, *Edinb. Journal of Science*. I. 77. — *Poggendorff's Ann.* II. 271.

<sup>15</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1826. S. 212.

<sup>16</sup> L. MOSER, *Dove's Repertor. d. Physik*. Berlin 1844. Bd. V. S. 364.

<sup>17</sup> BUROW, *Beiträge zur Physiol. u. Physik des menschl. Auges*. Berlin 1842.

<sup>18</sup> C. G. TH. RUETE, *Lehrbuch der Ophthalmologie*.

<sup>19</sup> WILLIAM CLAY WALLACE, *The accommodation of the eye to distances*. New York 1850.

<sup>20</sup> C. WEBER, *Disquisitiones quae ad facultatem oculum accommandandi spectant*. Marburgi 1850. p. 81.

<sup>21</sup> BIDLOO, *Obervy, de oculis et visu variorum animalium*. Lugd. Bat. 1715.

<sup>22</sup> A. HECK, *Bewegung der Krystalline*. S. 60.

<sup>23</sup> BUROW, *Beiträge zur Physiol. u. Physik des menschl. Auges*. S. 136.

<sup>24</sup> A. HANNOVER, *Bidrag til Oiet Anatomie*. Kjöbenhavn 1850. p. 111.

Platz lassen sollte. Dafs eine solche Flüssigkeit in der normalen Linsenkapsel nicht existiert, ist schon erwähnt worden.

5) Ansichten, welche eine Formveränderung der Linse annehmen. Diese Annahme, welche sich endlich als die richtige erwiesen hat, wurde ebenfalls schon sehr früh gemacht und von Vielen vertheidigt, ohne dafs sie aber das Stattfinden einer solchen Veränderung durch wirkliche Beobachtungen hätten erweisen können. Der erste war DESCARTES<sup>1</sup>, es folgten PEMBERTON<sup>2</sup>, CAMPER<sup>3</sup>, HUNTER<sup>4</sup>, TH. YOUNG<sup>5</sup>, PURKINJE<sup>6</sup>, GRAEFE<sup>7</sup>, TH. SMITH<sup>8</sup>, HUECK<sup>9</sup>, STELLWAG VON CARION<sup>10</sup>, FORBES<sup>11</sup>. Ältere Anatomen, wie LEEUWENHOEK, PEMBERTON, nannten die Linse deshalb auch wohl *Musculus crystallinus*, weil sie voraussetzten, dafs ihre Fasern contractil seien. TH. YOUNG stützte diese Ansicht auf Versuche, welche nicht jedem Auge gelingen, für ihn selbst aber vollständig beweisend waren. Wenn man durch ein feines Gitter von geraden Drähten das Zerstreuungsbild eines Lichtpunktes betrachtet, ist das Bild von geraden dunklen Linien, Schattenbildern der Drähte, durchzogen. Diese waren vollständig gerade, wenn YOUNG's Auge für die Ferne accommodirt war, an den Seiten des Zerstreuungskreises dagegen nach außen convex, wenn er in die Nähe sah. Die Erscheinung blieb dieselbe, wenn er das Auge unter Wasser brachte, und so den Einfluß der Hornhaut eliminierte. Die Krümmung der vorher geraden Schattenlinien konnte nur durch eine veränderte Krümmung der Linsenflächen bedingt sein. Zur Ausführung des Versuchs gehört eine weite Pupille. WOLLASTON konnte die Erscheinung nicht sehen (auch Referent nicht), wohl aber ein anderer Freund YOUNG's, KOENIG. Dem entsprechend fand YOUNG mittelst seines Optometers, dafs beim Sehen durch vier neben einander liegende Spalten die vier Bilder des Fadens sich in einem Punkte schnitten, wenn er für die Ferne, aber nicht, wenn er für die Nähe accommodierte.

Die Veränderung der Linsenreflexe bei Accommodationsänderungen beobachtete zuerst MAX LANGENBECK<sup>12</sup>, und schloß auch richtig daraus, dafs die vordere Linsenfläche beim Nahesehen gewölbt wird. Seine Beobachtungsweise ist aber ungünstig, indem er den Beobachteten direct in die Flamme blicken liefs, wobei die drei Spiegelbildchen dem Beobachter sehr nahe an einander zu stehen scheinen, und das überwiegend helle Hornhautbild die Wahrnehmung der beiden anderen erschwert. Dies mag der Grund sein, weshalb LANGENBECK's Beobachtung die Aufmerksamkeit der Physiologen nicht erregte. CRAMER beobachtete dasselbe, verbesserte aber die Methode der Beobachtung namentlich dadurch, dafs er die Lichtstrahlen von der Seite her in das Auge fallen und den Beobachter von der anderen Seite hereinblicken liefs. Auch beschrieb er ein Instrument, welches er Ophthalmoskop nannte, um die Beobachtungen leichter und sicherer zu machen. Es ist dies im Wesentlichen ein Gestell, an welchem eine Lampe, ein Fadenkreuz als Gesichtszeichen, ein Mikroskop von ungefähr 10 bis 20maliger Vergrößerung und ein hohles kegelförmiges Stück mit den nöthigen Ausschnitten, an welches der Beobachtete sein Auge fest anlegt, angebracht sind. Der Beobachter stellt die Flamme so, dafs er durch das Mikroskop in der Pupille des beobachteten Auges den Reflex der mittleren Linsenfläche zwischen den beiden anderen Reflexen erscheinen sieht. Indessen ist die wesentlichste Thatsache, die Verkleinerung des von der vorderen Linsenfläche entworfenen Bildes, auf diese Weise nicht so bequem zu beobachten, als wenn man das

<sup>1</sup> R. CARTESIUS, *Dioptrice*. Lugd. Bat. 1637.

<sup>2</sup> PEMBERTON, *Dissert. de facultate oculi, qua ad diversas distantias se accommodat*. Lugd. Bat. 1719.

<sup>3</sup> E. CAMPER, *Dissert. physiol. de quibusdam oculi partibus*. Lugd. Bat. 1746. p. 23.

<sup>4</sup> J. HUNTER, *Philosoph. Transact.* 1794. p. 21.

<sup>5</sup> TH. YOUNG, *Philosoph. Transact.* 1801. P. I. p. 58.

<sup>6</sup> J. E. PURKINJE, *Beobachtungen u. Versuche sur Physiol. d. Sinne*. Berlin 1825.

<sup>7</sup> K. F. V. GRAEFE, *Reil's Archiv für Physiologie*. Bd. IX. S. 231.

<sup>8</sup> TH. SMITH, *Philosophical Magazine*. 1833. T. V. 3. No. 18. — *Schmidt's Jahrbücher*. 1834. Bd. I. 8.

<sup>9</sup> A. HUECK, *Bewegung der Krystalllinse*. Leipzig 1841.

<sup>10</sup> STELLWAG VON CARION, *Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Ärzte zu Wien*. 1850. Heft 3 u. 4.

<sup>11</sup> FORBES, *Comptes rendus*. XX. p. 61.

<sup>12</sup> MAX LANGENBECK, *Klinische Beiträge*. Göttingen 1849.

Spiegelbild von zwei leuchtenden Punkten mit bloßem Auge beobachtet, wie ich es oben beschrieben habe. Die Verschiebung des Reflexes der vorderen Linsenfläche dagegen, welche durch CRAMER's Ophthalmoskop leicht und sicher zu beobachten ist, ist wegen der von CRAMER noch nicht gekannten Asymmetrie des Auges für sich allein nicht beweisend, wenn man sich nicht, was leicht auszuführen ist, durch eine Reihe von Versuchen überzeugt, daß von jeder Stelle der Pupille aus das genannte Bild sich stets der Mitte der Pupille nähert.

Ohne von den beiden genannten Forschern zu wissen, und zu einer Zeit, wo CRAMER's Entdeckung erst durch kurze Notizen<sup>1</sup>, die er selbst und DONDERS gegeben hatte, veröffentlicht war, ehe noch seine von der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften gekrönte Abhandlung erschienen war, fand ich selbst dieselbe Thatsache<sup>2</sup>, und ermittelte weiter dasjenige, was ich oben über das Verhalten der hinteren Fläche der Linse bei der Accommodation angeführt habe<sup>3</sup>.

Gegen die Abhängigkeit des Accommodationsvermögens von Verschiebungen und Formänderungen der Linse wurden vielfach Fälle geltend gemacht, in denen das Auge sich noch sollte accommodiren können, nachdem die Linse durch die Staaroperation entfernt war. Indessen ist dabei zu bedenken, daß eine Regeneration der Linse möglich ist, und daß die Kranken auch bei unpassender Accommodation aus Zerstreuungsbildern mancherlei erkennen können. Daß Jemand, der mit der Staarbrille Druckschrift liest, mit derselben Brille auch ferne Menschen, Fensterkreuze und dergleichen erkennen kann, berechtigt noch nicht, ihm Accommodationsvermögen zuzuschreiben. Ein Jeder kann sich leicht überzeugen, daß, wenn er einen Finger in etwa 4 Fuß Entfernung fixirt, er dabei doch eine Menge Einzelheiten an weit entfernten Gegenständen wahrnehmen kann. Zum Beweis des Vorhandenseins von Accommodation gehört, daß der Kranke mit derselben Brille einen Gegenstand in bestimmter Entfernung willkürlich deutlich und undeutlich sehen kann, je nachdem er sein Auge für dieselbe oder eine andere Entfernung einzurichten strebt. SZOKALSKY will einen solchen Fall wirklich beobachtet haben; aber das betreffende Auge konnte ohne Staarbrille in 17 Zoll Entfernung deutlich sehen, was ohne Ersatz der Linse nicht möglich ist. Um bei operirten Augen während des Lebens zu erkennen, ob die Linse hergestellt sei, schlägt DONDERS vor die entoptischen Erscheinungen zu benutzen.

6) Ansichten, welche eine Formveränderung des Augapfels annehmen. Wenn die Netzhaut sich von den brechenden Flächen entfernen, der Augapfel sich also verlängern könnte, würde das Auge sich dadurch für die Nähe accommodiren. Die Anhänger dieser Ansicht nahmen meistens an, daß die Augenmuskeln, entweder die rechten allein, oder die schiefen allein, oder alle zusammen, oder auch der Schließmuskel der Augenlider, durch Druck auf den Augapfel dessen Gestalt verändern könnten. Hierzu gehören STURM<sup>4</sup>, LE MOINE<sup>5</sup>, BUFFON<sup>6</sup>, BOERHAVE<sup>7</sup>, MOLINETTI<sup>8</sup>, OLBERS<sup>9</sup>, HAESSELER<sup>10</sup>, WALTHER<sup>11</sup>, MONRO<sup>12</sup>, HIMLY<sup>13</sup>, MECKEL<sup>14</sup>, PARROT<sup>15</sup>, POPPE<sup>16</sup>, SCHROEDER VAN

<sup>1</sup> A. CRAMER, *Tydschrift der Maatschappij voor Geneeskunde*. 1851. W. 11. bl. 115. und *Nederlandsch Lancet*. 2. Serie. W. 1. bl. 529. 1851—52.

<sup>2</sup> H. HELMHOLTZ, *Monatsberichte der Berliner Akad.* 1853. Februar. S. 137.

<sup>3</sup> H. HELMHOLTZ, *Graefe's Archiv für Ophthalmologie*. Bd. 1. (2) S. 1—74.

<sup>4</sup> J. CHR. STURM, *Dissert. de presbyopia et myopia*. Altdorff 1697.

<sup>5</sup> LE MAINE, *Quaestio an obliqui musculi retinam a crystallino removeant*. Paris 1743.

<sup>6</sup> G. L. L. BUFFON, *Histoire naturelle*. Paris 1789. T. III. p. 331.

<sup>7</sup> H. BOERHAVE, *Praelectiones academ.* Taurini 1755. Vol. III. p. 121.

<sup>8</sup> A. v. HALLER, *Elementa Physiologiae*, 1763. T. V. p. 511.

<sup>9</sup> H. W. M. OLBERS, *Dissert. de oculi mutut. int.* Gottingae 1780. § 43.

<sup>10</sup> J. F. HAESSELER, *Betrachtungen über das menschliche Auge*.

<sup>11</sup> WALTHER, *Dissert. de lente crystallina*. § 1.

<sup>12</sup> MONRO, *Attenburger Annalen f. d. J.* 1801. S. 97.

<sup>13</sup> HIMLY, *Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen*. Bremen 1801.

<sup>14</sup> G. CUVIER, *Vorlesungen über vergl. Anat.* Übers. von MECKEL. Leipzig 1809. Bd. II. S. 369.

<sup>15</sup> G. F. PARROT, *Entretiens sur la physique*. Dorpat 1820. T. III. p. 434.

<sup>16</sup> J. H. M. POPPE, *Die ganze Lehre vom Sehen*. Tübingen 1823. S. 153.

123 DER KOLK<sup>1</sup>, ARNOLD<sup>2</sup>, SERRE<sup>3</sup>, BONNET<sup>4</sup>, HENLE<sup>5</sup>, SZOKALSKY<sup>6</sup>, LISTING<sup>7</sup>. Daß die Augenmuskeln nicht nur die Form des Augapfels ändern können, sondern auch mittelbar die Hornhaut gewölbt machen und die Linse nach vorn verschieben, nimmt CLAVEL<sup>8</sup> an. Die Gründe, aus denen eine solche Gestaltänderung des Augapfels unwahrscheinlich erscheint, habe ich schon oben angeführt.

Die angeführten Ansichten sind die wichtigeren, welche über diesen schwierigen Gegenstand aufgestellt worden sind: daneben wurden von Einzelnen noch mancherlei andere Erklärungsweisen hervorgesucht, welche sich mit Recht geringeren Beifalls zu erfreuen hatten. Ich erwähne v. GRIMM<sup>9</sup>, welcher annahm, das Brechungsvermögen der Augenmedien könnte sich ändern; WELLER<sup>10</sup>, welcher die Accommodation nicht durch eine Veränderung des Auges, sondern durch einen psychischen Prozeß erklären wollte u. s. w.

125

### § 13. Von der Farbenzerstreuung im Auge.

Daß die Lichtstrahlen, welche von einem gesehenen leuchtenden Punkte ausgegangen sind, durch die brechenden Mittel des Auges wieder in einen Punkt vereinigt werden, ist nur annähernd richtig. Wir wenden uns jetzt zum Studium der Abweichungen von dem genannten Gesetze, und wollen zunächst die chromatische Abweichung betrachten, welche daher entsteht, daß die Lichtstrahlen von verschiedener Schwingungsdauer auch verschiedene Brechbarkeit in tropfbaren und festen durchsichtigen Mitteln haben. Da die Größe der Brennweiten gekrümmter brechender Flächen von dem Brechungsverhältnisse abhängig ist, so liegen die Vereinigungspunkte von Strahlen verschiedener Farbe bei Systemen solcher Flächen im Allgemeinen an verschiedenen Orten, und nur durch besondere Combinationen verschiedenartiger brechender Mittel läßt es sich erreichen, daß die Brennpunkte verschiedenfarbiger Strahlen in optischen Apparaten zusammenfallen, so daß diese dadurch achromatisch werden.

Das Auge ist nicht achromatisch, obgleich beim gewöhnlichen Sehen die Farbenzerstreuung sich fast gar nicht merklich macht. Daß der brechende Apparat des Auges verschiedene Brennweiten für verschiedenfarbige einfache Strahlen habe, zeigte FRAUENHOFER folgendermaßen. Er beobachtete ein prismatisches Spectrum durch ein achromatisches Fernrohr, in dessen Oculare ein sehr feines Fadenkreuz angebracht war, und bemerkte, daß er die Ocularlinse dem Fadenkreuze näher schieben mußte, um dies deutlich sehen zu können, wenn er den violetten Theil des Spectrum im Gesichtsfelde hatte, als wenn er den rothen betrachtete. Indem er mit einem Auge einen

126

<sup>1</sup> LUCHTMANS *Diss. de mutatione axis oculi*. Traject. ad Rhenum 1832.

<sup>2</sup> ARNOLD, *Untersuchungen über das Auge des Menschen*. Heidelberg 1832. S. 38.

<sup>3</sup> SERRE, *Bulletin de thérapie*. 1835. T. 8. L. 4.

<sup>4</sup> BONNET, *Progrès de la vision*. 1841. S. 233.

<sup>5</sup> J. HENLE, *Canstatt's Jahresbericht für 1849*. Bd. I. S. 71.

<sup>6</sup> SZOKALSKY, *Archiv für physiologische Heilkunde*. VII. 1849. 7.—8. Heft.

<sup>7</sup> J. LISTING, *Wagner's Handwörterbuch d. Physiologie*. IV. 498.

<sup>8</sup> CLAVEL, *Comptes rendus*. XXXIII. p. 259.

<sup>9</sup> v. GRIMM, *Dissert. de visu*. Göttingae 1758. S. auch H. W. M. OLBERS *de oculi mutationibus inter-*  
*nis*. p. 29.

<sup>10</sup> WEBER, *Diätetik für gesunde und schwache Augen*. Berlin 1821. S. 225.



äußeren Gegenstand fixirte, mit dem anderen den Faden im Fernrohre betrachtete, stellte er die Ocularlinse so, daß ihm der Faden ebenso deutlich wie das äußere Object erschien, und maß, um wie viel die Linse verschoben werden mußte, um den Faden in zwei verschiedenen Farben gleich deutlich zu sehen. Mit Berücksichtigung der schon vorher gemessenen chromatischen Abweichung der Ocularlinse selbst konnte er dann berechnen, welches die entsprechenden Sehweiten des Auges seien. Er fand bei diesen Versuchen, daß ein Auge, welches ein unendlich entferntes Object deutlich sieht, dessen Licht der Linie *C* des Sonnenspectrum, also der Grenze zwischen Roth und Orange entspricht, bei demselben Accommodationszustande ein Object, dessen Licht der Farbe der Linie *G* (Grenze von Indigblau und Violett) entspräche, auf 13 bis 24 Par. Zoll nähern müßte, um es deutlich zu sehen.

Ich habe an meinen eigenen Augen ähnliche Resultate erhalten. Ich ließ verschiedenfarbiges, mittels eines Prisma isolirtes Licht durch eine punktförmige Öffnung eines dunklen Schirms fallen, und suchte dann die größte Entfernung auf, aus der ich die kleine Öffnung noch punktförmig sehen konnte. Die größte Sehweite meines Auges für rothes Licht beträgt gegen 8 Fuß, für violettes  $1\frac{1}{2}$  Fuß und für das brechbarste überviolette Licht der Sonne, welches durch Abblendung des helleren Lichts des Spectrum sichtbar gemacht werden kann, nur einige Zolle.

Auffallend bemerkt man die Verschiedenheit der Sehweiten, wenn man ein regelmäßig rechteckiges, auf einen weißen Schirm projecirtes prismatisches Spectrum aus einiger Entfernung betrachtet. Während man das rothe Ende noch ziemlich gut in seiner wirklichen Form erkennt, erscheint das violette als eine Zerstreungsfigur (die für meine Augen schwalbenschwanzförmig ist).

Das im Vergleiche mit künstlichen optischen Instrumenten ziemlich geringe Zerstreungsvermögen des menschlichen Auges erklärt sich daraus, daß die Dispersion des Wassers und der meisten wässrigen Lösungen überhaupt viel geringer ist als die des Glases. Da die Brechungsverhältnisse der optischen Medien des Auges meist nicht beträchtlich von dem des Wassers abweichen, so scheint es wahrscheinlich zu sein, daß wenigstens die wässrige Feuchtigkeit und der Glaskörper auch nahezu dasselbe Zerstreungsvermögen wie das Wasser haben werden. Ich habe deshalb die Dispersion für LISTING's reducirtes Auge mit einer brechenden Fläche berechnet unter der Annahme, daß Wasser darin als brechende Substanz gebraucht sei. Für die von FRAUENHOFER bei seinen Versuchen gebrauchten Strahlen sind die Brechungsverhältnisse des Wassers folgende:

für das rothe Licht der Linie *C*..... 1,331705

für das violette Licht der Linie *G*..... 1,341285.

Der Radius der einzigen brechenden Fläche von LISTING's reducirtem Auge

ist 5,1248 Millimeter. Daraus ergeben sich die Brennweiten im Innern des Auges:

im Roth 20,574 mm

im Violett 20,140 mm.

- 127 Ist das Auge im Roth für unendliche Ferne accommodirt, steht also die Netzhaut im Brennpunkte der rothen Strahlen, so liegt der Brennpunkt der violetten 0,434 mm vor ihr, woraus folgt, daß in violettem Lichte dieses Auge für eine Entfernung von 713 mm (26 Zoll) accommodirt sein würde. FRAUENHOFER fand für sein eigenes Auge 18 bis 24 Zoll, woraus folgt, daß die Farbenzerstreuung in einem aus destillirtem Wasser gebildeten Auge selbst noch etwas geringer sein würde, als sie im menschlichen Auge sich findet. Nimmt man dagegen an, daß das reducirte Auge wie meines im Roth für 8 Fufs (2,6 m) accommodirt sei, so würde die Netzhaut noch 0,123 mm hinter dem Brennpunkte der rothen Strahlen liegen müssen, und im Violett das Auge für  $20\frac{3}{4}$  Zoll (560 mm) accommodirt sein, während meines in der That für 18 Zoll accommodirt war. Auch MATTHIESSEN<sup>1</sup> berechnet aus seinen Versuchen den Abstand des rothen und violetten Brennpunktes im menschlichen Auge auf 0,58 bis 0,62 mm, während er in einem Auge aus destillirtem Wasser nur gleich 0,434 mm ist. MATTHIESSEN hat seine Messungen in der Weise angestellt, daß er den kürzesten Abstand maßt, in welchem eine Glastheilung von rothem oder violettem Lichte beleuchtet deutlich gesehen werden konnte. Alle diese nach verschiedenen Methoden ausgeführten Untersuchungen stimmen darin überein, daß das menschliche Auge in Bezug auf Farbenzerstreuung mit einem Auge aus destillirtem Wasser sehr nahe übereinstimmt, wahrscheinlich aber eine etwas stärkere Dispersion hat. Wir dürfen danach wohl vermuthen, daß die Krystalllinse ein im Verhältniß zu ihrem Brechungsvermögen etwas stärkeres Zerstreuungsvermögen als reines Wasser hat.

Ich will hier noch die Beschreibung einiger Versuche anreihen, bei denen sich die Farbenzerstreuung im Auge merklich macht. Im Allgemeinen sind die hierhergehörigen Erscheinungen viel auffallender, wenn man dabei nicht weißes Licht, sondern Licht braucht, welches aus nur zwei prismatischen Farben von möglichst verschiedener Brechbarkeit zusammengesetzt ist. Am leichtesten erhält man solches Licht, wenn man Sonnenlicht durch die gewöhnlichen violettgefärbten Gläser gehen läßt. Diese Gläser absorbiren die mittleren Strahlen des Spectrum ziemlich vollständig, und lassen nur die äußersten Farben Roth und Violet hindurch. Will man mit Lampenlicht experimentiren, welches wenig blaue und violette Strahlen enthält, so wendet man besser die gewöhnlichen blauen (durch Kobalt gefärbten) Gläser an, welche ebenfalls vom Orange, Gelb und Grün nur wenig, reichlich dagegen das äußerste Roth, das Indigblau und Violet hindurchlassen.

Man mache eine enge Öffnung in einen dunklen Schirm, befestige hinter derselben ein gefärbtes Glas von der erwähnten Art, und stelle ein Licht

<sup>1</sup> L. MATTHIESSEN, *Comptes rendus*. T. XXIV. p. 374.

dahinter, dessen Strahlen durch das Glas und die Öffnung in das Auge des Beobachters fallen. Die Öffnung im Schirme können wir unter diesen Umständen als einen leuchtenden Punkt, der rothe und violette Strahlen aussendet, betrachten. Dem Beobachter erscheint dieser Punkt in verschiedener Weise, je nach der Entfernung, für welche sein Auge accommodirt ist. Ist es für die rothen Strahlen accommodirt, so geben die violetten einen Zerstreuungskreis, und es erscheint ein rother Punkt mit violettem Lichthofe; <sup>128</sup> oder das Auge ist für die violetten Strahlen accommodirt, dann geben die rothen einen Zerstreuungskreis, und es erscheint ein violetter Punkt mit rothem Hofe. Auch ist ein Refraktionszustand des Auges möglich, wobei der Vereinigungspunkt der violetten Strahlen vor, der der rothen hinter der Netzhaut liegt, und beide gleich grofse Zerstreuungskreise geben. Nur in diesem Falle erscheint der Lichtpunkt einfarbig. Bei diesem Refraktionszustande des Auges würden diejenigen einfachen Strahlen auf der Netzhaut vereinigt werden, deren Brechbarkeit die Mitte zwischen der der rothen und violetten hält, also die grünen.

Deshalb geben diese Gläser ein Mittel von ziemlich grofser Empfindlichkeit ab, um die Entfernungen zu bestimmen, innerhalb welcher das Auge sich für die mittleren Strahlen des Spectrum accommodiren kann. Das sind nämlich die Entfernungen, innerhalb welcher das Auge das gemischte roth-violette Licht einfarbig sehen kann. Die Farbendifferenz der Ränder wird sehr leicht bemerkt, auch von einem Ungeübten, viel leichter als die Ungenauigkeit eines weifsen Bildes. Ist das Auge für Licht jeder Brechbarkeit auf gröfsere Entfernungen als die des leuchtenden Punktes accommodirt, so geben die rothen Strahlen einen gröfseren Zerstreuungskreis als die violetten, es erscheint also eine violette Scheibe mit rothem Saum. Ist das Auge für beide Farben auf kleinere Entfernungen als die des leuchtenden Punktes eingestellt, so erscheint umgekehrt ein rother Zerstreuungskreis mit blauem Saume.

Ähnliche Erscheinungen wie die der roth-violetten Gläser treten überall ein, wo ein Gegenstand zweierlei Arten verschiedenfarbigen Lichts von sehr unterschiedener Brechbarkeit aussendet. Sehr auffallend zeigen sie sich zum Beispiel auch bei den Versuchen über Mischung von Spectralfarben, welche ich später bei der Lehre von der Farbenmischung beschreiben werde.

Bei weifser Beleuchtung tritt natürlich ebenfalls eine Zerlegung des zusammengesetzten einfachen Lichts ein, aber sie ist unter gewöhnlichen Umständen wenig merklich. Die Beobachtung lehrt in dieser Beziehung, dafs weifse Flächen, welche weiter entfernt als der Accommodationspunkt des Auges liegen, mit einem schwachen blauen Rande umgeben erscheinen, weifse Flächen, welche näher als der Accommodationspunkt liegen, mit einem schwachen rothgelben Rande, weifse Flächen dagegen, für welche das Auge genau accommodirt ist, lassen keine farbigen Ränder sehen, so lange die Pupille vollständig frei ist, zeigen aber solche Ränder, sobald man dicht

vor das Auge den Rand eines undurchsichtigen Blattes schiebt, und dadurch der einen Hälfte der Pupille das Licht abschneidet. Und zwar erscheint die Grenze zwischen einem weissen und schwarzen Felde gelb gesäumt, wenn man das Blatt von der Seite her vor die Pupille schiebt, wo das schwarze Feld liegt, blau gesäumt dagegen, wenn man es von der Seite des weissen Feldes her vorschiebt.

Die eben beschriebenen Farbenzerstreuungserscheinungen im menschlichen Auge erklären sich sehr leicht aus dem Umstande, daß der hintere Brennpunkt der violetten Strahlen vor dem der rothen liegt.

Es sei *Fig. 77* *A* der leuchtende Punkt,  $b_1, b_2$  die vordere Hauptebene des Auges,  $v$  der Vereinigungspunkt der violetten,  $r$  der der rothen Strahlen, *cc* die Ebene, in welcher sich die äußersten rothen Strahlen des gebrochenen Strahlenkegels  $b_1, b_2, v$  schneiden. Der Anblick der Figur ergibt sogleich,




Fig. 77.

daß, wenn die Netzhaut vor der Ebene *cc* sich befindet, d. h. wenn das Auge für fernere Gegenstände als *A* accommodirt ist, sie am Rande

des Strahlenkegels nur von rothem Lichte, in der Axe aber von gemischtem getroffen werde. Steht sie in der Ebene *cc*, ist das Auge also für das Licht mittlerer Brechbarkeit von *A* accommodirt, so wird sie überall von gleichmäßig gemischtem Lichte getroffen. Endlich, wenn die Netzhaut sich hinter der Ebene *cc* befindet, das Auge also für nähere Gegenstände als *A* accommodirt ist, so trifft sie am Rande des Strahlenbündels nur violettes, in der Mitte gemischtes Licht.

Ist das Auge für *A* accommodirt, befindet sich die Netzhaut also in der Ebene *cc*, und wird der untere Theil der Apertur  $b_1, b_2$ , durch welche der Strahlenkegel einfällt, bis  $f$  hin verdeckt, so fallen die violetten Strahlen zwischen  $b_2, v$  und  $f, v$  sowie deren Verlängerungen zwischen  $v, w_2$  und  $v, r$  fort, und die rothen zwischen  $b_1, r$  und  $f, r$ . Es verschwindet dann also in der Ebene *cc* oberhalb der Axe das violette, unterhalb der Axe das rothe Licht, und es wird sich auf der Retina statt des Bildes des Punktes *A* ein kleiner oben rother, unten violetter Zerstreuungskreis bilden.

Befindet sich in *A* statt eines einzelnen leuchtenden Punktes eine gleichmäßig rothes und violettes Licht aussendende Fläche, deren Bild auf der Retina entworfen wird, so wird gleichzeitig ein rothes und ein violettes Bild der Fläche entworfen werden, von denen mindestens eines ein Zerstreuungsbild sein muß. Zerstreuungsbilder in Flächen haben, wie in § 11 auseinandergesetzt ist, in ihrer Mitte, wo die Zerstreuungskreise der Punkte des Randes nicht hinreichen, dieselbe Helligkeit wie ein scharfgeesehenes Bild. Ihre Ränder sind dagegen verwachsen und fließen so weit über das Bild der Umgebung über, als die Zerstreuungskreise der Randpunkte reichen.

Wenn sich nun ein rothes und ein violettes Bild einer Fläche decken, so wird sich in der Mitte, soweit beide die normale Helligkeit haben, die Mischfarbe zeigen, an den Rändern aber diejenige Farbe allein erscheinen, deren Zerstreuungskreise die grössten sind, für welche also der Rand des Bildes am weitesten über die Umgebung greift.

Wird das Bild der Fläche in der Ebene  $cc$  aufgefangen, wo die rothen und violetten Zerstreuungskreise gleich groß sind, so werden die Farben bis zum Rande gleichmäßig gemischt sein. Zerstreuungsbilder verschieben sich aber scheinbar, wie wir aus § 11 wissen, wenn man einen Schirm vor die Pupille schiebt, und zwar nach entgegengesetzten Richtungen, wenn sie, wie in unserem Falle das rothe und violette, das eine durch zu nahe, das andere durch zu weite Accommodation entstehen. Daher hört die Congruenz der farbigen Bilder auf und es werden farbige Ränder sichtbar.

Für das rothe Licht verhält sich die Fläche wie ein Gegenstand, der dem Auge zu nahe ist; ein solcher bewegt sich dem die Pupille verdeckenden Schirme scheinbar entgegen. Für das violette Licht verhält es sich umgekehrt. Verdeckt man also z. B. von unten her die Pupille, so verschiebt sich die rothe Fläche scheinbar nach unten, die violette nach oben; unten wird ein rother, oben ein violetter Rand sichtbar. Betrachtet man eine schmale roth-violette Linie durch einen schmalen Spalt, den man vor der Pupille hin und her bewegt, so gelingt es auch leicht, das rothe von dem violetten Bilde ganz getrennt sichtbar zu machen.

Wenn von dem leuchtenden Punkte  $A$  Fig. 77 nicht bloß rothes und violettes Licht, sondern aus allen Farben zusammengesetztes weißes Licht ausgeht, so schaltet sich das der übrigen Farben zwischen dem Roth und Violet ein, und die Wirkungen der Farbenzerstreuung sind weniger auffallend als wenn zwei Farben allein da sind. Wo wir in diesem Falle einen violetten Saum um ein purpurnes Feld hatten, erscheint jetzt das weiße Feld gesäumt mit weißlichem Blau, Indigblau, Violet, und da die weißlichen Töne des inneren Randes dieses Saumes sich nicht merklich vom Weiß der Mitte unterscheiden, erscheint der farbige Saum überhaupt schmaler. Wo bei dem Versuche mit den zwei Farben ein rother Saum um das purpurne Feld erschien, haben wir jetzt um das weiße Feld herum zuerst weißliches Gelb, Orange, Roth, und wieder unterscheidet sich das weißliche Gelb fast gar nicht von dem Weiß des Grundes.

Eine besondere Betrachtung verdient die Dispersion des weißen Lichts noch für den Fall, wo die Netzhaut sich in der Ebene  $cc$  befindet, wo das Strahlenbündel seinen kleinsten Durchmesser hat. Roth und Violet bilden hier gleich große Zerstreuungskreise. Das mittlere Grün ist ganz in der Axe concentrirt, die übrigen Farben bilden kleinere Zerstreuungskreise. Der Zerstreuungskreis auf der Retina würde also am Rande gemischt aus Roth und Violet, d. h. purpurroth, in der Mitte grünlich erscheinen müssen. Indessen ist davon im Auge nichts zu sehen. Es sind nämlich gerade die lichtstärksten Farben Gelb und Grün bei dieser Stellung der Retina fast

genau in einen Punkt vereinigt, und der purpurne Rand ist zu schmal und verhältnißmäßig zu lichtschwach, um wahrgenommen zu werden.



Fig. 78.



Fig. 79.



Fig. 80.

n Nach einer Bemerkung von Herrn W. v. BEZOLD<sup>1</sup> sieht man die Wirkungen der Farbenzerstreuung im Auge außerordentlich auffallend an Bildern wie Fig. 78 und 79 zeigen, wenn man diese aus etwas zu großer Entfernung, oder Fig. 80 aus zu geringer Entfernung für die Möglichkeit genauer Accommodation betrachtet. Die Erscheinungen vermischen sich übrigens mit denen des irregulären Astigmatismus, von denen im nächsten Paragraphen die Rede sein wird. Wenn man aus der Entfernung des Fernpunkts allmählig weiter abgeht, so werden zunächst die weißen Streifen röthlich, während die dunklen von den bläulichen Zerstreuungskreisen übergossen werden. Dann kommt eine Entfernung, wo auf den schwarzen Streifen sich die blauen Zerstreuungskreise der beiden benachbarten weißen Streifen decken, und deshalb auffallend hell werden. Später beginnt auch das Roth sich auszubreiten, und es kommt eine Entfernung, wo die dunklen Streifen auffallend roth erscheinen im Gegensatz zu dem stark verwaschenen bläulichen Weiß. Das geschieht offenbar dann, wenn die Zerstreuungsbilder des Roth von beiden Seiten auf dem Schwarz zusammentreffen, während die des bläulichen Weiß dann schon über dem nächsten weißen Streifen sich decken, und diesen mit seinem geschwächten Roth wieder weiß machen.

130 Übrigens kann man alle die beschriebenen Erscheinungen ganz ebenso wie bei dem Auge, nur noch augenfälliger, an einem nicht achromatisirten Fernrohr wahrnehmen, wenn man eine stärkere Vergrößerung mit demselben erzeugt, als mit der Deutlichkeit des Bildes verträglich ist. In einem solchen Fernrohre wird das von der Objectivlinse entworfene Bild nicht auf einem Schirme aufgefangen, wie im Auge auf der Netzhaut, sondern durch die vergrößernden Ocularlinsen vom Beschauer betrachtet. Eine Vergrößerung des

<sup>1</sup> W. v. BEZOLD, *Graefe's Archiv für Ophthalm.* XIV. (2). 8. 1—29. Dort ist auch eine eingehende Theorie der Erscheinungen gegeben.

vom Objectivglase entworfenen Bildes muß man aber anwenden, weil sonst die Farbensäume meist zu schmal sind, um deutlich gesehen zu werden. Auch hier sieht man, wenn das Fernrohr für einen entfernteren Gesichtspunkt eingerichtet ist, weiße Flächen roth und gelb gesäumt; ist es dagegen für einen näheren eingestellt, blau gesäumt. Bei der Einstellung, welche die schärfsten Bilder giebt, erscheinen sehr schmale purpurne Ränder. Verdeckt man eine Hälfte des Objectivs, so erscheinen an gegenüberliegenden Rändern <sup>131</sup> der weißen Flächen blaue und gelbe Ränder u. s. w., ganz wie unter analogen Verhältnissen im Auge.

Um die Gröfse der durch Dispersion im Auge erzeugten Zerstreuungskreise zu berechnen, können wir LISTING's reducirtes Auge und darin Wasser als brechende Flüssigkeit zu Grunde legen, da nach FRAUNHOFER's Messungen die farbenzerstreuende Kraft eines solchen Auges von der des menschlichen wenig abweichen würde. Es verhält sich (*Fig. 77*)

$$\begin{aligned} \frac{\gamma\gamma}{b_1 b_2} &= \frac{\delta r}{fr} = \frac{\delta v}{fv}, \text{ also ist} \\ \gamma\gamma \cdot fr &= b_1 b_2 \cdot \delta r \\ \gamma\gamma \cdot fv &= b_1 b_2 \cdot \delta v. \text{ Beides addirt giebt} \\ \gamma\gamma \cdot [fr + fv] &= b_1 b_2 \cdot [\delta r + \delta v] \\ &= b_1 b_2 \cdot [fr - fv] \\ \gamma\gamma &= b_1 b_2 \cdot \frac{fr - fv}{fr + fv}. \end{aligned}$$

Setzen wir  $b_1 b_2$ , entsprechend dem mittleren Durchmesser der Pupille normaler Augen, gleich 4 mm, und weiter, wie oben gefunden ist,

$$\begin{aligned} fr &= 20,574 \text{ mm,} \\ fv &= 20,140 \text{ mm,} \\ \text{so wird } \gamma\gamma &= 0,0426 \text{ mm.} \end{aligned}$$

Nach der in § 11 gegebenen Tafel für die Gröfse der Zerstreuungskreise von Objecten, für welche das Auge nicht accommodirt ist, würde daher der Durchmesser  $\gamma\gamma$  der durch die Dispersion bedingten Zerstreuungskreise ebenso groß sein, wie der, den ein leuchtender Punkt 1,5 m ( $4\frac{3}{4}$  Fufs) Entfernung in einem für unendliche Entfernung accommodirten Auge giebt. Eine solche Abweichung der Accommodation giebt bei der Betrachtung feinerer Gegenstände schon eine recht merkliche Ungenauigkeit des Bildes, wie man bei Anstellung eines entsprechenden Versuches leicht erkennt. Um zu erklären, warum die Dispersion des weissen Lichts im Auge trotz der gleichen Gröfse der Zerstreuungskreise keine merkliche Ungenauigkeit des Bildes hervorbringt, muß man nicht bloß die Gröfse der Zerstreuungskreise, sondern auch die Vertheilung des Lichts in denselben berücksichtigen,

Wenn ein Lichtkegel von einem einfarbig leuchtenden Punkte in das Auge fällt, und die Netzhaut sich vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen befindet, so wird ein Zerstreuungskreis gebildet, der in allen seinen Theilen gleiche Helligkeit hat.

Wenn dagegen das Auge von einem Kegel weissen Lichts getroffen wird, und sich die Netzhaut im Vereinigungspunkte der grüngelben Strahlen, welche die lichtstärksten sind,

genau in einen Punkt vereinigt, und der purpurne Rand ist zu schmal und verhältnismässig zu lichtschwach, um wahrgenommen zu werden.



Fig. 78.




Fig. 79.



Fig. 80.

n Nach einer Bemerkung von Herrn W. v. BEZOLD<sup>1</sup> sieht man die Wirkungen der Farbenzerstreuung im Auge außerordentlich auffallend an Bildern wie Fig. 78 und 79 zeigen, wenn man diese aus etwas zu grosser Entfernung, oder Fig. 80 aus zu geringer Entfernung für die Möglichkeit genauer Accommodation betrachtet. Die Erscheinungen vermischen sich übrigens mit denen des irregulären Astigmatismus, von denen im nächsten Paragraphen die Rede sein wird. Wenn man aus der Entfernung des Fernpunkts allmählig weiter abgeht, so werden zunächst die weissen Streifen röthlich, während die dunklen von den bläulichen Zerstreuungskreisen übergossen werden. Dann kommt eine Entfernung, wo auf den schwarzen Streifen sich die blauen Zerstreuungskreise der beiden benachbarten weissen Streifen decken, und deshalb auffallend hell werden. Später beginnt auch das Roth sich auszubreiten, und es kommt eine Entfernung, wo die dunklen Streifen auffallend roth erscheinen im Gegensatz zu dem stark verwaschenen bläulichen Weiss. Das geschieht offenbar dann, wenn die Zerstreuungsbilder des Roth von beiden Seiten auf dem Schwarz zusammentreffen, während die des bläulichen Weiss dann schon über dem nächsten weissen Streifen sich decken, und diesen mit seinem geschwächten Roth wieder weiss machen.

130 Übrigens kann man alle die beschriebenen Erscheinungen ganz ebenso wie bei dem Auge, nur noch augenfälliger, an einem nicht achromatisirten Fernrohr wahrnehmen, wenn man eine stärkere Vergrößerung mit demselben erzeugt, als mit der Deutlichkeit des Bildes verträglich ist. In einem solchen Fernrohre wird das von der Objectivlinse entworfene Bild nicht auf einem Schirme aufgefangen, wie im Auge auf der Netzhaut, sondern durch die vergrößernden Ocularlinsen vom Beschauer betrachtet. Eine Vergrößerung des

<sup>1</sup> W. v. BEZOLD, *Graefes Archiv für Ophthalm.* XIV. (2). S. 1–29. Dort ist auch eine eingehende Theorie der Erscheinungen gegeben.



vom Objectivglase entworfenen Bildes muß man aber anwenden, weil sonst die Farbensäume meist zu schmal sind, um deutlich gesehen zu werden. Auch hier sieht man, wenn das Fernrohr für einen entfernteren Gesichtspunkt eingerichtet ist, weiße Flächen roth und gelb gesäumt; ist es dagegen für einen näheren eingestellt, blau gesäumt. Bei der Einstellung, welche die schärfsten Bilder giebt, erscheinen sehr schmale purpurne Ränder. Verdeckt man eine Hälfte des Objectivs, so erscheinen an gegenüberliegenden Rändern <sup>131</sup> der weißen Flächen blaue und gelbe Ränder u. s. w., ganz wie unter analogen Verhältnissen im Auge.

Um die GröÙe der durch Dispersion im Auge erzeugten Zerstreuungskreise zu berechnen, können wir LISTING's reducirtes Auge und darin Wasser als brechende Flüssigkeit zu Grunde legen, da nach FRAUNHOFER's Messungen die farbenzerstreuende Kraft eines solchen Auges von der des menschlichen wenig abweichen würde. Es verhält sich (*Fig. 77*)

$$\begin{aligned} \frac{\gamma\gamma}{b_1 b_2} &= \frac{\delta r}{fr} = \frac{\delta v}{fv}, \text{ also ist} \\ \gamma\gamma \cdot fr &= b_1 b_2 \cdot \delta r \\ \gamma\gamma \cdot fv &= b_1 b_2 \cdot \delta v. \text{ Beides addirt giebt} \\ \gamma\gamma \cdot [fr + fv] &= b_1 b_2 \cdot [\delta r + \delta v] \\ &= b_1 b_2 \cdot [fr - fv] \\ \gamma\gamma &= b_1 b_2 \cdot \frac{fr - fv}{fr + fv}. \end{aligned}$$

Setzen wir  $b_1 b_2$ , entsprechend dem mittleren Durchmesser der Pupille normaler Augen, gleich 4 mm, und weiter, wie oben gefunden ist,

$$\begin{aligned} fr &= 20,574 \text{ mm,} \\ fv &= 20,140 \text{ mm,} \\ \text{so wird } \gamma\gamma &= 0,0426 \text{ mm.} \end{aligned}$$

Nach der in § 11 gegebenen Tafel für die GröÙe der Zerstreuungskreise von Objecten, für welche das Auge nicht accommodirt ist, würde daher der Durchmesser  $\gamma\gamma$  der durch die Dispersion bedingten Zerstreuungskreise ebenso groß sein, wie der, den ein leuchtender Punkt 1,5 m ( $4\frac{3}{4}$  Fuß) Entfernung in einem für unendliche Entfernung accommodirten Auge giebt. Eine solche Abweichung der Accommodation giebt, bei der Betrachtung feinerer Gegenstände schon eine recht merkliche Ungenauigkeit des Bildes, wie man bei Anstellung eines entsprechenden Versuches leicht erkennt. Um zu erklären, warum die Dispersion des weißen Lichts im Auge trotz der gleichen GröÙe der Zerstreuungskreise keine merkliche Ungenauigkeit des Bildes hervorbringt, muß man nicht bloß die GröÙe der Zerstreuungskreise, sondern auch die Vertheilung des Lichts in denselben berücksichtigen,

Wenn ein Lichtkegel von einem einfarbig leuchtenden Punkte in das Auge fällt, und die Netzhaut sich vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen befindet, so wird ein Zerstreuungskreis gebildet, der in allen seinen Theilen gleiche Helligkeit hat.

Wenn dagegen das Auge von einem Kegel weißen Lichts getroffen wird, und sich die Netzhaut im Vereinigungspunkte der grüngelben Strahlen, welche die lichtstärksten sind,

Dann wird die Gleichung 4a)

$$J = B \int_{n_1}^{n_2} \frac{dn}{(N-n)^2} + B \int_{n_3}^{n_4} \frac{dn}{(N-n)^2} \\ = B \left\{ \frac{1}{N-n_2} - \frac{1}{N-n_1} + \frac{1}{N-n_4} - \frac{1}{N-n_3} \right\} \quad 4b).$$

Ist nun  $q_0$  die Entfernung des Punktes, dessen Helligkeit wir bestimmen wollen, vom Mittelpunkte des Zerstreuungskreises, so wird dieser Punkt von allen denjenigen Farben getroffen, für welche die Radien der Zerstreuungskreise größer sind als  $q_0$ , also zwischen  $q_0$  und  $r = \frac{1}{2} gg$  liegen. Nun ist für die weniger brechbaren Farben, wenn wir aus Gleichung 2a) den Werth von  $N-n$  bestimmen,

$$\frac{1}{N-n} = \frac{1}{N} + \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{q}.$$

134 Für  $n = n_1$  ist  $q = r$ , für  $n = n_2$  ist  $q = q_0$ , also

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{N-n_1} &= \frac{1}{N} + \frac{1}{(N-1) \cdot N} \cdot \frac{b}{r} \\ \frac{1}{N-n_2} &= \frac{1}{N} + \frac{1}{(N-1) \cdot N} \cdot \frac{b}{q_0} \end{aligned} \right\} \quad 4c).$$

Für die Bestimmung von  $n_3$  und  $n_4$  müssen wir den Werth von  $N-n$  aus Gleichung 2b) entnehmen.

$$\frac{1}{N-n} = \frac{1}{N} - \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{q}.$$

Für  $n = n_4$  wird  $q = r$ , und für  $n = n_3$  wird  $q = q_0$ , also

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{N-n_4} &= \frac{1}{N} - \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{r} \\ \frac{1}{N-n_3} &= \frac{1}{N} - \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{q_0} \end{aligned} \right\} \quad 4d).$$

Setzen wir die Werthe aus 4c) und 4d) in 4b), so erhalten wir endlich

$$J = \frac{2B}{N \cdot (N-1)} \left\{ \frac{b}{q_0} - \frac{b}{r} \right\} \quad 5).$$

Dieser Werth von  $J$  wird in der Mitte des Zerstreuungskreises für  $q_0 = 0$  unendlich groß, am Rande, wo  $q_0 = r$ , gleich 0.

Berechnung der Helligkeit am Rande einer gleichmäßig erleuchteten Fläche. Es sei in Fig. 82  $AB$  die Grenzlinie einer links von ihr liegenden leuchtenden Fläche, und angenommen, daß jeder Punkt derselben als Zerstreuungskreis erscheine. Es sei ferner  $p$  der Punkt, dessen Helligkeit bestimmt werden soll, und  $pq = r$  der Radius der Zerstreuungskreise. Es wird auf  $p$  Licht gelangen aus allen denjenigen Punkten der Fläche, welche innerhalb des mit dem Radius  $r$  um  $p$  geschlagenen Kreises liegen. Wenn  $s$  einer dieser Punkte ist, und wir die Länge  $sp$  mit  $q$ ,




Fig. 82.

Kreises liegen. Wenn  $s$  einer dieser Punkte ist, und wir die Länge  $sp$  mit  $q$ ,

den Winkel  $spq$  mit  $\omega$ , und die Helligkeit des Zerstreuungskreises eines einzelnen Punktes in der Entfernung  $\varrho$  vom Centrum mit  $J$  bezeichnen, so wird die Helligkeit  $H$  im Punkte  $p$  werden:

$$H = \iint J \cdot \varrho \cdot d\omega \cdot d\varrho, \quad \dots \dots \dots 6),$$

dieses Integral ausgedehnt über alle Theile der Fläche, welche innerhalb des um  $p$  geschlagenen Kreises liegen.

Wenn der Rand der Fläche eine gerade Linie und der Abstand des Punktes  $s$  von diesem Rande gleich  $x$  ist, so ist für die am Rande gelegenen Punkte der Fläche

$$\varrho \cdot \cos \omega = x$$

und wenn wir den Ausdruck für  $H$  zuerst nach  $\omega$  integrieren, und aus der letzten Gleichung den Werth für die Grenzen von  $\omega$  entnehmen,

$$H = \int_x^r 2 J \cdot \varrho \cdot \arccos \left( \frac{x}{\varrho} \right) \cdot d\varrho, \quad \dots \dots \dots 6a).$$

Wenn die Zerstreuungskreise durch unpassende Accommodation entstehen, 135 können wir  $J$  als unabhängig von  $\varrho$  betrachten und erhalten dann:

$$H = J \left[ r^2 \cdot \arccos \left( \frac{x}{r} \right) - x \cdot \sqrt{r^2 - x^2} \right], \quad \dots \dots \dots 7),$$

welche Gleichung für diesen Fall die Helligkeit in der Nähe des Randes der Fläche als Function des Abstandes vom Rande giebt. Für  $x = r$  wird  $H = 0$ , für  $x = -r$  wird  $H = Jr^2\pi$  und geht hier in die constante Helligkeit der Fläche über.

Wenn die Zerstreuungskreise durch Dispersion entstanden sind, können wir in Gleichung 6a) den Werth von  $J$  aus Gleichung 5) setzen, und erhalten durch Ausführung der Integration:

$$H = \frac{2 B \cdot b}{N \cdot (N-1)} \left\{ r \cdot \arccos \left( \frac{x}{r} \right) + \frac{x}{r} \sqrt{r^2 - x^2} + x \cdot \log. nat. \left( \frac{r - \sqrt{r^2 - x^2}}{r + \sqrt{r^2 - x^2}} \right) \right\} 8).$$

Für  $x = r$  wird  $H = 0$ , für  $x = -r$  wird

$$H = \frac{2 B \cdot b \cdot r \cdot \pi}{N \cdot (N-1)}$$

und geht hier in die constante Helligkeit des mittleren Theils der Fläche über.




Fig. 83.

Um den Gang dieser Functionen übersichtlicher darzustellen, habe ich in Fig. 83 die beiden Curven construiert. A entspricht der Gleichung 7), B der Gleichung 8).

In beiden sind die Werthe von  $x$  in horizontaler, die Werthe der Helligkeit  $H$  in verticaler Richtung aufgetragen. Die Ordinate  $ab$  entspricht der Helligkeit in der Mitte der Fläche,  $c$  bezeichnet den Ort des Randes, so daß die Linie  $adc$  die Helligkeit eines ganz scharfen Bildes bezeichnen würde. Die Grenzen des Zerstreuungskreises von  $c$  sind  $a$  und  $g$ . Die Curve  $B$  zeichnet sich dadurch vor der anderen aus, daß sie in ihrer Mitte bei  $f$ , entsprechend dem wirklichen Orte des Randes, ganz senkrecht abfällt. Es wird hier für  $x = 0$  nämlich der Differentialquotient

$$\frac{dH}{db} = \frac{2B \cdot b}{N \cdot (N-1)} \cdot \left\{ \frac{2}{r} \cdot \sqrt{r^2 - x^2} + \log. \text{ nat. } \left[ \frac{r - \sqrt{r^2 - x^2}}{r + \sqrt{r^2 - x^2}} \right] \right\} \dots 9)$$

unendlich groß. Dieser plötzliche Abfall der Helligkeit am Rande der Fläche macht für das Auge die Lage des Randes scharf erkennbar, wenn auch eine gewisse Menge Licht sich noch weiter verbreitet, während in der Curve  $A$  die Abnahme der Helligkeit ziemlich gleichmäßig stattfindet, und der Ort des Randes durch kein besonderes Kennzeichen ausgezeichnet ist.

Wenn man die nach den Enden des Spectrum abnehmende Helligkeit der 136 Farben in Rechnung ziehen könnte, so würde die Curve  $B$  etwa die Form der punktierten Linie bekommen müssen. Die Helligkeit innerhalb der Grenzen der Fläche würde sich der normalen noch mehr nähern, und außerhalb dieser Grenzen würde sie noch geringer werden.

Aus diesen Verhältnissen erklärt es sich, warum die Farbenzerstreuung der Bilder im Auge der Schärfe des Sehens so wenig Eintrag thut. Ich habe mir Linsen zusammengestellt, welche im Stande waren, das Auge achromatisch zu machen, aber nicht gefunden, daß die Schärfe des Gesichts dadurch merklich erhöht wurde. Ich fand zu dem Ende eine concave Flintglaslinse von 15,4 mm Brennweite, von einem Objectivglase eines Mikroskops genommen, passend. Diese setzte ich zusammen mit convexen Crownglaslinsen, so daß dadurch ein System von etwa  $2\frac{1}{2}$  Fuß negativer Brennweite entstand, wie es für mein Auge paßte, um ferne Gegenstände gut zu erkennen. Wenn ich durch dieses System sah, und die halbe Pupille verdeckte, entstanden keine farbigen Ränder an der Grenze dunkler und heller Gegenstände mehr. Ebenso wenig entstanden dergleichen bei unpassender Accommodation des Auges, so daß das Auge durch dieses Linsensystem wirklich achromatisch gemacht war. Ich konnte aber nicht finden, daß die Schärfe des Sehens in irgend merkbarer Weise zugenommen hätte.

NEWTON kannte schon die Farbenzerstreuung im Auge; er erwähnt die Farbränder, welche bei halbverdeckter Pupille erscheinen<sup>1</sup>. Es ist bekannt, daß NEWTON, weil er irrthümlich voraussetzte, die Dispersion aller durchsichtigen Mittel sei ihrer Brechkraft proportional, zu dem Schlusse kam, daß es keine achromatischen Linsensysteme geben könne. Wunderlicher Weise fand EULER<sup>2</sup> in dieser Beziehung das Richtigere, indem er jedoch dabei von der anderen falschen thatsächlichen Voraussetzung ausging, daß das Auge achromatisch sei, und daraus folgerte, daß NEWTON'S Annahme über die Dispersion falsch sein müsse. Ihm widersprach in dieser Beziehung D'ALEMBERT<sup>3</sup>, indem er nachwies, daß im Auge die Farbenzerstreuung nicht merklich zu werden brauche, selbst wenn sie ebenso groß wie in Gläsern sei. Ebenso widersprach DOLLOND<sup>4</sup>, welcher behauptete, daß trotz der Anwendung verschiedener brechender Substanzen im Auge es

<sup>1</sup> J. NEWTON, *Optice*. Lib. I. P. II. Prop. VIII.

<sup>2</sup> L. EULER, *Journat Encyclop.* 1767. II. p. 146. — *Mém. de l'Acad. de Berlin*. 1747.

<sup>3</sup> J. L. D'ALEMBERT, *Mém. de l'Acad. de Paris*. 1767. p. 81.

<sup>4</sup> J. DOLLOND, *Philos. Trans.* T. LXXIX. p. 256.

nicht achromatisch sein könne, da alle einzelnen Brechungen der Lichtstrahlen nach der Axe zu gingen. Wenn wir das für farblos durchsichtige Mittel bisher stets bestätigte Gesetz als allgemeingültig ansehen, daß bei jeder Brechung des Lichts an der Grenzfläche von zwei ungefärbt durchsichtigen Substanzen die violetten Strahlen stärker gebrochen werden als die rothen, so ist DOLLOND's Beweisführung gültig. Dann muß nämlich im Auge jedenfalls bei jeder Brechung das violette Licht sich der Axe mehr nähern als das rothe. MASKELYNE<sup>1</sup> hat auch Messungen der Farbenzerstreuung gemacht und gefunden, daß das Intervall der Brennpunkte 0,02 Zoll (0,61 mm) betrage, was einem Gesichtswinkel von 25 Sec. entspreche, während man in Fernröhren sie noch bis zu einem Gesichtswinkel von 57 Sec. zulässig finde. JURIN<sup>2</sup> hat die farbigen Ränder unbestimmt gesehener Objecte bemerkt. WOLLASTON<sup>3</sup> machte auf das eigenthümliche Aussehen des prismatischen Spectrum aufmerksam, welches von der Unfähigkeit des Auges, sich für alle Farben gleichzeitig zu accommodiren, herrührt. Eine vollständige Theorie der Erscheinungen bei halbverdeckter Pupille gab MOLLWEIDE<sup>4</sup>, eine vollständige Bearbeitung sämtlicher hierher gehörigen Erscheinungen TOURNAI. Die ersten genauen Messungen der Farbenzerstreuung des Auges stellte FRAUNHOFER<sup>5</sup> an, mit Berücksichtigung der von WOLLASTON und ihm entdeckten festen Linien im Spectrum, spätere MATTHIESSEN<sup>6</sup>.

Trotz aller dieser Untersuchungen hielten manche Naturforscher doch die Idee 137 von der absoluten Vollkommenheit des Auges und somit auch seiner mehr oder weniger vollkommenen Achromasie fest, wie FORBES<sup>7</sup>, VALLÉE<sup>8</sup>.

### § 14. Astigmatismus.

Ausser der Ungenauigkeit des Bildchens, welche durch die ungleiche Brechung verschiedenfarbiger Lichtstrahlen bedingt ist, kommt bei den optischen Instrumenten, welche Glaslinsen mit sphärischen Flächen enthalten, noch eine zweite Art der Abweichung vor, die Abweichung wegen der Kugelgestalt oder sphärische Aberration, welche darin besteht, daß auch Lichtstrahlen von gleicher Farbe, die von einem Punkte ausgehen, von krummen Flächen im Allgemeinen nicht genau, sondern nur annähernd in einen Punkt wieder vereinigt werden. Wir wollen diese monochromatische Abweichungen nennen. Es giebt allerdings gewisse krumme Flächen, welche die Lichtstrahlen, die von einem bestimmten leuchtenden Punkte ausgehen, ganz genau in einen Punkt wieder vereinigen (aplanatische Flächen). Es sind dies Rotationsflächen, deren Erzeugungscurve im Allgemeinen durch eine Gleichung vierten Grades gegeben wird. In gewissen Fällen aber, z. B. wenn der leuchtende Punkt in unendlicher Entfernung liegt, ist die Erzeugungscurve eine Ellipse. Auch kann in Systemen von kugeligen brechenden Flächen durch eine passende Combination der Krümmungsradien und Abstände der Flächen die Kugelabweichung auf ein Minimum gebracht werden. Auch solche Systeme nennt man aplanatisch. Übrigens ist natürlich der

<sup>1</sup> N. MASKELYNE, *Philos. Trans.* LXXIX. 258. 1789.

<sup>2</sup> J. JURIN, *Smith's Optics*. 96.

<sup>3</sup> WOLLASTON, *Philos. Trans.* 1801. P. I. p. 50.

<sup>4</sup> K. B. MOLLWEIDE, *Gilbert's Annalen*. XVII. 328. 1804 und XXX. 220. 1808.

<sup>5</sup> J. FRAUNHOFER, *Gilbert's Annalen*. LVI. 304. — *Schuhmacher's astron. Abhandlg.* Heft II. S. 39.

<sup>6</sup> MATTHIESSEN, *Comptes rendus*. XXIV. 875.


<sup>7</sup> J. D. FORBES, *Roy. Edinb. Soc.* XVI. 1849. p. 251.

<sup>8</sup> L. L. VALLÉE, *Comptes rendus*. XXIV. 1096. XXXIV. 821.

Zerstreuungskreis, den das Bild eines in der optischen Axe eines solchen Systems liegenden leuchtenden Punktes bildet, rings um die Axe symmetrisch. Er bildet einen hellen Fleck, dessen Helligkeit in der Axe am stärksten ist, und von da nach allen Seiten hin schnell abnimmt.

Die im Auge vorkommenden monochromatischen Abweichungen sind nicht, wie die sphärische Aberration der Glaslinsen, symmetrisch um eine Axe, sie sind vielmehr unsymmetrisch und von einer Art, wie sie bei gut 138 gearbeiteten optischen Instrumenten nicht vorkommen darf.

Die Erscheinungen sind folgende: 1) Man wähle zuerst als Object einen sehr kleinen leuchtenden Punkt (ein mit einer Nadel gestochenes Löchelchen in schwarzem, undurchsichtigem Papier, durch welches Licht fällt) und bringe ihn, nöthigenfalls unter Anwendung eines convexen Brillenglases, in eine etwas größere Entfernung als die größte Accommodationsdistanz, so dafs auf der Netzhaut ein kleiner Zerstreuungskreis entsteht. Man sieht alsdann statt des hellen Punktes nicht, wie es in einem schlecht eingestellten Fernrohre der Fall ist, eine kreisförmige Fläche, sondern eine strahlige Figur von vier bis acht unregelmäßigen Strahlen, welche in beiden Augen verschieden zu sein pflegt und auch für verschiedene Menschen verschieden ist. Ich habe in *Fig. 84 a* die aus meinem rechten, in *b* die aus



*Fig. 84.*

meinem linken Auge abgebildet. Die nach der Peripherie gekehrten Ränder der hellen Partien eines von weißem Lichte entworfenen Zerstreuungsbildes dieser Art sind blau gesäumt, die dem Centrum zugekehrten rothgelb. Die Figur scheint bei den meisten Menschen in der Richtung von oben nach unten länger zu sein als von rechts nach links. Ist das Licht schwach, so kommen nur die hellsten Stellen der Strahlenfigur zur Wahrnehmung, und man sieht mehrere Bilder des hellen Punktes, von denen gewöhnlich eines heller ist als die an-

deren. Ist das Licht dagegen sehr stark, läßt man z. B. directes Sonnenlicht durch eine feine Öffnung fallen, so fließen die Strahlen des Sterns in einander, rings umher entsteht außerdem ein aus unzähligen, äußerst feinen und bunt gefärbten Linien bestehender Strahlenkranz von viel größerer Ausdehnung, den wir unter dem Namen des Haarstrahlenkranzes von dem sternförmigen Zerstreuungsbilde unterscheiden wollen.

Hat man die sternförmige Figur oder bei schwächerem Lichte die mehrfachen Bilder des leuchtenden Punktes vor sich, und schiebt ein undurchsichtiges Blatt von unten her vor das Auge, so schwindet zuerst der scheinbar untere Theil des Zerstreuungsbildes, also der obere Theil des entsprechenden Netzhautbildchens. Schiebt man das Blatt von oben, von rechts oder links vor das Auge, so schwindet dem entsprechend immer der obere, rechte oder linke Theil des Zerstreuungsbildes.

Anders verhält sich der ausgedehntere Haarstrahlenkranz, den sehr intensives Licht erregt. Wenn man die Pupille von unten her verdeckt, verschwindet keineswegs der untere Theil dieses Kranzes, sondern nur der untere Theil des centralen hellen Sterns. Die Erscheinung wird aber dadurch gestört und verändert, daß sehr lebhaft Diffractionsbilder sich entwickeln, welche von der verengerten und veränderten Gestalt der Pupille bedingt sind. 139

Die strahlige Gestalt der Sterne und ferner Laternen gehört mit zu diesen Erscheinungen.

2) Ist umgekehrt das Auge für eine größere Entfernung als die des leuchtenden Punktes accommodirt (zu welchem Zwecke man bei fernen leuchtenden Punkten eine schwache Concavlinse vor das Auge bringen kann), so erscheint eine andere strahlenförmige Figur (*Fig. 84 c* aus meinem rechten, *d* aus meinem linken Auge), deren größere Ausdehnung meist horizontal ist. Verdeckt man die Pupille von einer Seite her, so schwindet die entgegengesetzte Seite des vom Beobachter gesehenen Zerstreuungsbildes, d. h. die der verdeckten Hälfte der Pupille gleichseitigen Theile des Netzhautbildes. Diese Figur wird also von Strahlen gebildet, welche die Axe des Auges noch nicht geschnitten haben. Wenn sich Thränenflüssigkeit über das Auge verbreitet hat, oder durch häufiges Blinzeln mit den Lidern Fetttröpfchen aus den Meibom'schen Drüsen auf die Hornhaut gekommen sind, ist die Strahlenfigur meist größer, unregelmäßiger, wird durch Blinzeln bedeutend verändert, und wenn man die Pupille von der Seite her verdeckt, verschwindet dadurch nicht bloß eine Seite der Strahlenfigur.

3) Bringt man den leuchtenden Punkt in eine solche Entfernung, daß man das Auge für sie accommodiren kann, so sieht man bei mäßigem Lichte einen kleinen rundlichen hellen Fleck ohne Unregelmäßigkeiten. Bei stärkerem Lichte dagegen bleibt sein Bild bei jeder Weise der Accommodation strahlig, und man findet bei allmäligen Accommodationsänderungen nur, daß die vertical verlängerte Strahlenfigur, welche bei kürzerer Sehweite vorhanden ist, sich verkleinert, rundlicher wird und dann in die horizontal verlängerte Strahlenfigur übergeht, die einer größeren Sehweite angehört.

4) Wenn man eine feine Lichtlinie betrachtet, kann man sich die Erscheinungen, welche entstehen, leicht dadurch im Voraus entwickeln, daß man die strahligen Zerstreuungsbilder für alle einzelnen Punkte der Linie construirt denkt, die sich nun zum Theile decken. Die helleren Theile der Zerstreuungsbilder fließen dann zu Lichtlinien zusammen, welche als mehrfache Bilder der hellen Linie erscheinen. Die meisten Augen sehen zwei, manche in gewissen Lagen fünf oder sechs solche Doppelbilder.

Um den Zusammenhang der Doppelbilder von Linien mit den strahligen Bildern von Punkten gleich durch den Versuch anschaulich zu machen, schneide man in ein dunkles Papierblatt eine feine gerade Spalte, und ein wenig von deren Ende entfernt, in der Richtung ihrer Verlängerung, steche man ein rundes Löchelchen ein, wie *Fig. 85 a*. Von Ferne sehend, be-

merkt man dann, daß die Doppelbilder der Linie genau denselben Abstand von einander haben, wie die hellsten Stellen der strahlenförmigen Zerstreuungsfigur des Punktes, und daß letztere in der Verlängerung der ersteren liegen, wie in *Fig. 85 b*, wo in der Zerstreuungsfigur des hellen Punktes nur die hellsten Theile des Sterns, *Fig. 84 a*, sichtbar sind.

140



Fig. 85.

Hierher gehören die mehrfachen Bilder, welche die meisten Augen von den Hörnern der Mondsichel sehen. Diese Erscheinung wird *Polyopia monocularis* (oder *monophthalmica*) genannt.

An den Grenzen heller Flächen, für welche das Auge nicht ganz vollkommen accommodirt ist, machen sich die Doppelbilder auch mitunter dadurch bemerklich, daß am Rande der hellen Fläche der Übergang von Helligkeit zu Dunkel in zwei oder

drei Absätzen geschieht.

Weitere hierher gehörige Erscheinungen folgen unten bei der Lehre von der Irradiation.

Daß die beschriebenen Erscheinungen von einer Asymmetrie des Auges herrühren, ist zunächst klar. Ein optisches Instrument, welches um seine Axe ringsum symmetrisch gebaut ist, kann für einen in der Axe liegenden Lichtpunkt allerdings Zerstreuungsfiguren entwerfen, die aber selbst symmetrisch gegen die Axe und kreisförmig gebildet sein müssen.

141

Was zunächst die strahlige Bildung der kleineren Zerstreuungskreise betrifft, so müssen wir trennen, was davon dauernd ist und jeder Zeit bei reiner Hornhaut wieder erscheint, und andererseits den Theil der Erscheinung, der durch Thränenfluß und Blinzeln der Augenlider verändert wird. Der letztere Theil rührt offenbar her von Tropfen wässriger oder fetter Flüssigkeit, oder von Unreinigkeiten, die sich auf der Hornhaut angesammelt haben. Man kann diese Erscheinungen nachahmen, wie A. FICK gezeigt hat, wenn man mit einer Glaslinse, auf deren Oberfläche man Wassertropfen ausgebreitet hat, das Bild eines hellen Punktes entwirft.

Dergleichen vergängliche Erscheinungen kommen in den Strahlenfiguren meiner eigenen Augen seltener vor, vielmehr sehe ich gewöhnlich immer dieselben Figuren wieder, welche ich oben in *Fig. 84 a* bis *b* abgebildet habe, und welche durch ihre strahlige Form wohl zunächst an den strahligen Bau<sup>1</sup> der Linse erinnern. In der That konnte ich mich überzeugen, daß die wesentlichsten Züge dieser Strahlenfiguren von Unregelmäßigkeiten der Linse herrühren, indem ich die feine Öffnung, durch welche das Licht fiel, sehr nahe an das Auge brachte; dann sieht man in dem Zerstreuungskreise die sogenannten entoptischen Erscheinungen, welche im nächsten Paragraphen beschrieben werden sollen. Dort wird auch gezeigt werden, in welcher Weise man eine sichere Kenntniss von dem Orte der Objecte im Auge erhalten kann, welche diese Erscheinungen veranlassen. Es fand sich nun, daß gewisse helle und dunkle Streifen, welche dem entoptischen Bilde der

<sup>1</sup> S. oben Seite 39. Fig. 28.



Linse angehörten, bei allmählig steigender Entfernung der Öffnung vom Auge übergangen in die hellen und dunklen Flecken und Streifen der in *Fig. 84 c* und *d* abgebildeten Sternfiguren. Abbildungen dieses Übergangs hat schon TH. YOUNG<sup>1</sup> gegeben.

Neuere Untersuchungen an Augen, deren Linse durch Staaroperation „entfernt“ worden ist, zeigen, daß diese Augen in der That die sternförmige Bildung der kleinen Zerstreuungskreise nicht zeigen, sondern nur die später zu beschreibenden elliptischen Formen derselben. Ausnahmsweise aber trägt auch die Hornhaut zu diesen Unregelmäßigkeiten bei, wenn sie kegelförmige Erhebungen oder Geschwürsnarben hat.

DONDERS<sup>2</sup> hat die Erscheinungen, welche jeder einzelne Sector der Krystalllinse hervorbringt, dadurch zu isoliren gesucht, daß er einen Schirm mit sehr kleiner Öffnung vor dem Auge herumführte, so daß das Licht bald durch den einen, bald durch den andern Sector der Linse einfiel. Es zeigte sich, daß jeder einzelne Sector die Strahlen nahehin in einen Punkt vereinigt, daß aber die Brennpunkte der verschiedenen Strahlen nicht zusammenfallen. Dabei ist aber auch die Vereinigung der Strahlen durch jeden einzelnen Sector nicht ganz genau, sondern die der Augenaxe näheren scheinen einen entfernteren Vereinigungspunkt zu haben, als die peripherisch einfallenden Strahlen. Daher drängen sich in dem Zerstreuungskreis jedes Sectors die Strahlen gegen die Peripherie hin zusammen, ehe der Ort der engsten Vereinigung erreicht ist, und nachher an der centralen Seite des Zerstreuungskreises.

Optische Systeme, welche solche Abweichungen zeigen, wie wir sie hier für das Auge beschrieben haben, können überhaupt an keiner Stelle homocentrische Strahlen wieder in einen Brennpunkt vereinigen. WHEWELL hat dafür den Namen des Astigmatismus vorgeschlagen ( $\alpha$  privativum und  $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha$ , von  $\sigma\tau\iota\zeta\omega$ , pingo, d. h. „ohne Brennpunkt“). Die bisher beschriebene Bildung unregelmäßig sternförmiger Zerstreuungskreise, wie sie sich bei stärkeren Abweichungen der Accommodation zeigen, bezeichnete DONDERS als den irregulären Astigmatismus. Theoretisch sind diese Erscheinungen wichtig, weil sie am deutlichsten die Art des Vorgangs erkennen lassen. Für das Sehen wichtiger sind dagegen diejenigen Unregelmäßigkeiten, welche bei möglichst guter Accommodation stehen bleiben. In diesen spricht sich meist nur noch die schon in den *Figuren 84 a—d* hervortretende Verlängerung der Zerstreuungskreise bald in der einen, bald in der andern Richtung aus. Es sind dies die Erscheinungen, die von DONDERS mit dem Namen des regulären Astigmatismus belegt worden sind.

Dieselben können auch an andern gekrümmten brechenden Flächen beobachtet werden, wenn entweder die Strahlen zwar nahehin senkrecht auf die brechende Fläche fallen, diese aber nicht kugelig gekrümmt ist, sondern

<sup>1</sup> TH. YOUNG, *Philos. Transact.* 1801. I. pl. VI.

<sup>2</sup> F. C. DONDERS, *Arch. f. Ophthalm.* VII. (1.) S. 185–241. 1861; ebenda X. (2.) S. 83–108. 1864. Derselbe. *Astigmatismus und cylindrische Gläser.* Berlin 1862. — *Anomalies of accommodation and refraction.* London 1864. p. 449–556.

in verschiedenen durch das Einfallslot gelegten Schnittebenen verschieden gekrümmte Schnittlinien bildet; oder wenn die Fläche zwar kugelig gekrümmt ist, aber die Strahlen unter grossen Einfallswinkeln auffallen. Selbst ebene Flächen können dünne Strahlenbündel, welche sehr schräg hindurchgehen und stark divergiren, astigmatisch machen. Überhaupt ist Astigmatismus der gebrochenen und gespiegelten Strahlen eigentlich der allgemeinere Fall, und die Homocentricität derselben nur als die unter besonderen Bedingungen eintretende Ausnahme zu betrachten.

Die Eigenthümlichkeit eines dünnen astigmatischen Strahlenbündels besteht darin, daß es nicht in einem einzigen Punkte, sondern in zwei verschieden weit vom Ursprunge der Strahlen entfernten, gegen die Axe des Bündels und gegen einander senkrechten kleinen Brennlinien vereinigt wird. Der deutlicheren Beschreibung wegen wollen wir annehmen, daß die Strahlen in horizontaler Richtung fortgehen, eine kreisförmige Öffnung passieren, welche das Bündel abgrenzt, und daß die erste und nähere Brennlinie horizontal, die andere vertical liege. In *Fig. 86* sei  $cd$  die Richtung, in der sich das Strahlenbündel fortpflanzt. Die darunter gesetzten dunklen Flecke zeigen die Form der Querschnitte, welche es in den darüber stehenden Punkten von  $cd$  annimmt. In  $c$  sei das kreisförmige Diaphragma; die




Fig. 86.

Strahlen convergiren, aber sie convergiren von oben nach unten schneller als von rechts nach links. Die Querschnitte werden quer verlängerte Ellipsen, endlich bei  $a$  eine begrenzte gerade Linie. Dort schneiden sich die Strahlen von oben nach unten; in Folge dessen verlängert sich die kürzere Verticalaxe der Ellipse wieder, während die Horizontalaxe noch fortfährt abzunehmen. Der Querschnitt wird also wieder eine quer verlängerte Ellipse, dann ein Kreis, dann eine senkrecht verlängerte Ellipse, endlich eine verticale begrenzte gerade Linie, in der der Querdurchmesser der Ellipse ganz geschwunden ist, und die Strahlen sich nun auch von rechts nach links schneiden. Von da ab erweitern sich beide Axen der Ellipse wieder: die horizontale ist zunächst immer noch die kleinere; in großer Entfernung aber nähert sich der Querschnitt wieder einem Kreise mehr und mehr.

In einem solchen Bündel geschieht also die Durchkreuzung der Strahlen von oben nach unten nicht an derselben Stelle, wie von rechts nach links.

Wenn das leuchtende Objekt nicht ein einzelner leuchtender Punkt, sondern eine feine Horizontallinie ist, so würde dieselbe an der Stelle  $a$  in *Fig. 86* noch vollkommen scharf gesehen werden können, da die Zerstreuung des Lichts jedes einzelnen leuchtenden Punktes nur in Richtung der Lichtlinie geschieht. Dagegen müsste eine solche in  $b$  undeutlich erscheinen, und ein

lichtes Band von einer gewissen Breite bilden. Umgekehrt würde eine lichte Verticallinie in *b* deutlich, in *a* undeutlich erscheinen. Ein astigmatisches Auge ist also im Allgemeinen nicht gleichzeitig für horizontale und verticale Linien, welche sich in gleicher Entfernung von ihm befinden, accommodirt. Man betrachte aufmerksam eine Anzahl gerader Linien, die sich in einem Punkte schneiden, wie *Fig. 87* in einer Entfernung, für welche man gut accommodiren kann. Man wird bemerken, daß man sie nach einander alle scharf begrenzt und dunkel schwarz sehen kann, während man aber eine von ihnen scharf sieht, sind im Allgemeinen die anderen nicht scharf. Ist man darin geübt, sich der Accommodationsänderungen seines Auges bewußt zu werden, so bemerkt man in der Regel, daß das Auge eine gröfsere Sehweite annimmt, um die seinem horizontalen Durchmesser parallelen Linien deutlich zu sehen, mehr für die Nähe dagegen accommodirt, um die senkrechten zu sehen.




Fig. 87.

Man muß deshalb eine verticale Linie weiter vom Auge entfernen als eine horizontale, wenn man sie beide zu gleicher Zeit deutlich sehen will. Ad. Fick sah verticale Linien in 4,6 Mt. Entfernung deutlich, und zugleich horizontale in 3 Mt., ich selbst zu verticalen in 0,65 Mt., horizontale in 0,54 Mt. Entfernung.

Zeichnet man eine große Zahl feiner concentrischer Kreislinien in gleichen Abständen von einander auf Papier, wie in *Taf. I. Fig. 1*, und betrachtet sie in einer Entfernung, für die man gut accommodiren kann, so erscheinen eigenthümliche strahlige Scheine auf der Figur. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, daß in den lichterem Radien die schwarzen und weißen Linien scharf von einander geschieden sind, dazwischen aber liegen hellgraue wolkige Stellen, in denen die schwarzen Linien mehr verwaschen erscheinen. Läßt man die Accommodation des Auges oder die Entfernung der Figur vom Auge etwas wechseln, so werden andere Stellen der Figur klar, und es entsteht dadurch der Anschein, als ob die klaren Strahlen sich sehr schnell hin und her bewegten. Richtet man das Auge für eine beträchtlich weitere Entfernung ein, als in der die Figur liegt, so sieht man 8 bis 10 Sektoren mit deutlichen Linien; wo diese an einander stoßen, sind sie nebelig, aber man erkennt, daß die schwarzen Linien des einen Sectors nicht mit denen des nächsten zusammenpassen. Die innersten Kreise bekommen dadurch ein seltsam verzerrtes Ansehen.

Der reguläre Astigmatismus zeigt sich in fast allen menschlichen Augen in geringem Grade. Seine Größe kann nach demselben Principe, wie die Breite der Accommodation gemessen werden. Astigmatische Augen haben, wie oben angeführt wurde, verschiedene Sehweite für Linien von verschiedener Richtung im Gesichtsfelde. Wenn die größte dieser Sehweiten in Pariser Zoll gemessen *P* ist und bei demselben unveränderten Accommodations-

zustande die kleinste für eine andere Linienrichtung gleich  $p$ , so brauchen wir als Maafs des Astigmatismus

$$As = \frac{1}{p} - \frac{1}{P}.$$

So lange  $As$  kleiner ist als  $\frac{1}{40}$ , bringt es noch keine erhebliche Störung des Sehens hervor; wenn es aber gröfser ist, wird die Gesichtsschärfe merklich beeinträchtigt, und es kann solchen Augen durch Brillengläser mit cylindrischen Flächen<sup>1</sup> geholfen werden, deren Brennweite man der Gröfse  $As$  gleich grofs wählt, und deren geradlinige Cylinderkanten man, wenn die cylindrische Krümmung convex ist, der Richtung der entferntesten deutlich gesehenen Linien parallel macht. Ist die cylindrische Krümmung concav, so stellt man die Cylinderkanten im Gegentheil senkrecht zu jener Richtung. Die zweite Fläche der Cylinderlinsen kann man sphärisch schleifen, so dafs die gleichzeitig etwa vorhandene Myopie oder Hypermetropie corrigirt wird.

Ein System cylindrischer Linsen ist auch das beste Mittel schnell herauszufinden, ob und wie grofser Astigmatismus vorhanden sei und welches die Richtungen des Meridians gröfster und kleinster Sehweite sind. Astigmatische Linsen mit veränderlichem Grade von Astigmatismus kann man sich nach einem Vorschlage von STOKES zusammensetzen aus zwei gleichen Cylinderlinsen, die man aufeinander legt. Stellt man sie so, dafs ihre Cylinderkanten sich rechtwinkelig schneiden, so sind sie nicht astigmatisch, sondern wirken zusammen wie eine sphärische Linse. Dreht man sie unter einem kleineren oder gröfseren Winkel, so kann man ihnen beliebig wachsende Gröfse des Astigmatismus geben.

Einen zweckmäfsigen Apparat zur schnellen Messung des Astigmatismus hat E. JAVAL<sup>2</sup> durch Herrn NACHET in Paris construiren lassen. Zwei Sterne von je 24 Linien werden durch Convexlinsen mit parallelen Gesichtslinien betrachtet. Man entfernt die Zeichnungen so weit, bis nur noch eine der Linien scharf gesehen wird. Dann werden Cylinderlinsen, die in zwei drehbaren kreuzförmigen Fassungen sitzen, entweder einzeln oder zu zweien combinirt vorgeschoben, bis man eine Stärke gefunden hat, bei der alle Linien  
836 des Sterns gleich deutlich erscheinen. Das Centrum der beiden drehbaren Kreuze ist selbst an einem beweglichen Arme befestigt, der um die optische Axe der Convexlinse gedreht werden kann, um der Krümmung des cylindrischen Glases die richtige Richtung geben zu können.

n Besser noch unterscheidet man die verschiedene Deutlichkeit an den Linien-systemen von Herrn O. BECKER<sup>3</sup>, wo je vier parallele Linien in jeder Gruppe nebeneinander stehen, die verschiedenen Gruppen verschieden gerichtet sind.

<sup>1</sup> TH. YOUNG hat für sein Auge eine schief gestellte sphärische Linse gebraucht, was leicht nachzumachen ist.

<sup>2</sup> E. JAVAL, *Ann. oculistique*. LV. p. 5—29. 1866.

O. BECKER, *Vier Tafeln zur Bestimmung des Astigmatismus*. Wien 1868.

Herr E. JAVAL<sup>1</sup> hat auch ein dem Ophthalmometer ähnlich wirkendes Instrument construiert, um die verschiedene Krümmung der Hornhaut in verschiedenen Meridianen leicht und schnell zu constatiren und zu messen. Die Doppelbilder werden durch ein doppelt brechendes Prisma hervorgebracht, welches man gleichzeitig mit den hellen Flächen, die als Object der Hornhautbilder dienen, um die Axe des Instruments rotiren lassen kann.

Noch einfacher ist ein von Herrn PLACIDO<sup>2</sup> vorgeschlagenes Verfahren. Man läßt eine hell beleuchtete Scheibe mit concentrischen schwarzen und weißen Ringen, wie *Fig. 78* (S. 162), von der Hornhaut spiegeln, wobei der Beobachter durch ein dem mittleren schwarzen Kreise entsprechendes Loch blickt. Abweichungen der Hornhaut von der Kugelgestalt verrathen sich durch entsprechende Verzerrungen des Hornhautbildes.

Die von DONDEERS und KNAPP<sup>3</sup> ausgeführten Messungen der Hornhaut astigmatischer Augen haben ergeben, daß mit wenigen Ausnahmen die Hornhaut den regelmäßigen Astigmatismus bedingt, und daß er bei höheren Graden häufig ein wenig vermindert wird durch einen entgegengesetzten Astigmatismus der Krystalllinse.

Die Richtung der Linien, für welche die Sehweite am größten ist, ist wie in den oben angegebenen Fällen von A. FICK und mir selbst in der Regel der verticalen Richtung näher als der horizontalen; doch kommt auch, wie bei TH. YOUNG, in nicht allzu seltenen Fällen das Umgekehrte vor.

Erscheinungen der angegebenen Art werden im Auge oder in optischen Instrumenten im Allgemeinen eintreten, so oft Licht an krummen Flächen gebrochen wird, deren Krümmung nach verschiedenen Richtungen hin verschieden ist, oder auch an Kugelflächen, so oft es schief auf die Fläche fällt. An beiderlei Ursachen kann man im Auge denken. Horizontale und verticale Meridianschnitte der brechenden Flächen des Auges haben nachweisbar nicht dieselben Krümmungsradien; und wir wissen außerdem, daß das menschliche Auge nicht ganz genau centrirt ist, und daß der Ort des directen Sehens nicht in der Linie liegt, welche dem Begriffe einer Augenaxe am nächsten kommt.

Wie die verschiedene Krümmung der Hornhautmeridiane mit dem Ophthalmometer nachzuweisen ist, ist in § 2, S. 20—22, erörtert.

Anzuführen ist, daß TH. YOUNG<sup>4</sup>, in dessen Auge die beiden Vereinigungsweiten ziemlich beträchtlich differirten, durch einen Versuch ermittelt hat, daß seine Hornhaut diese Differenz nicht bewirke. Er brachte nämlich das Auge unter Wasser, wobei die Brechung in der Hornhaut fast vollständig aufgehoben ward, und fand, daß die Differenz der Vereinigungsweiten noch in gleichem Maasse fortbestand.

Schließlich ist noch die unvollkommene Klarheit der Augenmedien als Grund monochromatischer Abweichungen anzuführen. Die Fasern der Horn-

<sup>1</sup> E. JAVAL et SCHIÖTZ. *Ann. d'oculist.* Juillet 1881. JAVAL ebenda. Mai 1882. Juillet 1882. Janvier 1883.

<sup>2</sup> PLACIDO in *Period. di oftalm. pratica.* Anno 2, No. 5 u. 6. 1880.

<sup>3</sup> H. KNAPP, *Gräfe's Archiv f. Ophthalm.* VIII. 2. S. 185—241. 1862.

<sup>4</sup> TH. YOUNG. *Philos. Transact.* 1801. P. I. p. 40.

v. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik.* 2. Aufl.

haut und Linse scheinen allerdings durch eine Zwischensubstanz von ziemlich gleichem Brechungsvermögen verbunden zu sein, so daß bei mäßiger Lichtstärke diese Theile vollkommen homogen und klar erscheinen. Wenn man aber starkes Licht durch eine Brennlinsen auf sie concentrirt, wird das an den Grenzen ihrer Elementarbestandtheile reflectirte Licht stark genug, um sie weißlich trübe erscheinen zu lassen. Von dem durch sie gehenden Lichte wird also, wie dieser Versuch zeigt, ein Theil diffus zerstreut, und muß auch andere Theile der Netzhaut treffen, auf welche das regelmäsig gebrochene Licht nicht fällt. In der That bemerkt man, wenn man ein intensives Licht vor einem ganz dunklen Grunde betrachtet, den Grund mit einem nebeligen weißen Scheine übergossen, der in der Nähe des Lichts am hellsten ist. Sowie man das Licht verdeckt, erscheint der umgebende Grund in seiner natürlichen Schwärze. Ich glaube diese Erscheinung durch zerstreutes Licht erklären zu müssen<sup>1</sup>.

Ich will die Theorie der Brechung an nicht kugeligen Flächen und der Brechung bei schiefem Einfall an Kugelflächen hier nicht vollständig entwickeln, weil sie vorläufig für die Untersuchung der Brechung im Auge nur von geringem Nutzen sein würde, solange wir nicht genauere Bestimmungen für die Form der brechenden Flächen haben. Es genüge hier, eine derartige Brechung in zwei einfachen Fällen zu betrachten, aus denen die betreffenden Verhältnisse anschaulich werden.

Wir betrachten zuerst die Brechung im Scheitel eines ungleichaxigen Ellipsoides. Es sei in *Fig. 88* die Linie *gb* eine Axe des Ellipsoides, in




Fig. 88.

deren Verlängerung bei *p* der leuchtende Punkt liegt. Die Ebene der Zeichnung sei ein Hauptschnitt des Ellipsoides, so daß auch noch eine zweite Axe des Ellipsoides *gh* in dieser Ebene liegt. Da nun die Normalen solcher Punkte der ellipsoidischen Fläche, welche in einem Hauptschnitte

liegen, auch in demselben Hauptschnitte liegen, so liegen die Normalen der Curve *bch* in diesem Falle in der Ebene der Zeichnung. Wenn von *p* aus ein Strahl auf den Punkt *c* fällt, so liegt der gebrochene Strahl in der durch den leuchtenden Punkt und das Einfallslot gelegten Ebene, d. h. in der Ebene der Zeichnung, und schneidet also die Axe *bg* in irgend einem ihrer Punkte *q*. Dies würde nicht der Fall sein, wenn die Ebene der Zeichnung nicht eben ein Hauptschnitt des Ellipsoids wäre.

Ist *ad* die Normale im Punkte *c*, so wird die Lage des gebrochenen Strahls nun weiter durch die Bedingung bestimmt, daß

$$\sin \angle pcd = n \cdot \sin \angle acq$$

143 sein muß, wenn *n* das Brechungsverhältniß bezeichnet. Diese Bedingung ist also dann ganz dieselbe wie für Rotationsflächen. Die nahe senkrecht bei *b* auffallen-

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, Pogg. Ann. LXXXVI. S. 509. 1852.

den Strahlen werden dann also einen gemeinschaftlichen Vereinigungspunkt in der Axe haben, dessen Entfernung von dem Krümmungsradius  $r$ , der Curve  $bch$  in  $b$  abhängt. Ist  $p$  unendlich entfernt, so ist die Vereinigungsweite der Strahlen,

d. h. die Brennweite in dem vorliegenden Hauptschnitte gleich  $\frac{n \cdot r}{n-1}$ .

Für die Strahlen von  $p$ , welche in dem anderen Hauptschnitte verlaufen, der durch  $bq$  und die dritte Axe gelegt ist, verhält sich wieder Alles ebenso, nur hat der Krümmungsradius im Scheitel der Fläche einen anderen Werth  $r''$ , und die

Brennweite der Strahlen in diesem zweiten Hauptschnitte ist gleich  $\frac{n \cdot r''}{n-1}$ .

Der Strahl  $pq$  wird also von den Strahlen, die in der Ebene der Zeichnung unmittelbar neben ihm liegen, in einem Punkte, etwa  $q$ , geschnitten; von den Strahlen dagegen, die in einer durch ihn senkrecht zur Ebene der Zeichnung gelegten Ebene ihm unmittelbar benachbart sind, nicht in demselben Punkte  $q$ , sondern in einem anderen Punkte, etwa in  $s$ .

Läßt man unter diesen Umständen die Strahlen von  $p$  durch eine kleine kreisförmige Öffnung, deren Mittelpunkt sich in der Axe bei  $b$  befindet, auf die brechende Fläche fallen, so ist der Querschnitt des Strahlenbündels unmittelbar bei  $b$  ein Kreis, zwischen  $b$  und  $q$  eine Ellipse, deren senkrecht zur Ebene der Zeichnung gestellte Axe grösser ist als die in der Ebene liegende. Die Ellipse wird immer kleiner und zugleich gestreckter, je mehr wir uns dem Punkte  $q$  nähern. In  $q$  ist der Querschnitt des Strahlenbündels eine zur Ebene der Zeichnung senkrechte Linie. Weiterhin wird er wieder eine Ellipse, deren grössere Axe senkrecht zur Ebene der Zeichnung steht, die schnell einem Kreise ähnlicher wird, ungefähr in der Mitte zwischen  $q$  und  $s$  wirklich ein Kreis wird und sich dann in eine Ellipse verwandelt, deren längere Axe in der Ebene der Zeichnung liegt, die sich gegen  $s$  hin immer mehr streckt, in  $s$  selbst sich in eine gerade Linie zusammenzieht und jenseits  $s$  allmählig wieder breiter wird und sich immer mehr der Kreisform nähert, wie dies in *Fig. 86*, (S. 174) dargestellt ist.

Ähnlich verhält es sich mit Strahlenbündeln, welche schief auf eine kugelige Fläche fallen. Nehmen wir an, in *Fig. 88* sei  $bch$  eine Kugelfläche und  $pc$  ein solcher schief auffallender Strahl. Wir wissen<sup>1</sup>, daß die Strahlen, welche in der Ebene der Zeichnung unmittelbar neben  $c$  auf die Fläche fallen, sich mit dem Strahle  $pc$  nach der Brechung nicht im Brennpunkte und in der Centrallinie  $pq$ , sondern in einem seitwärts von der Axe liegenden Punkte der kaustischen Fläche schneiden. Es sei dieser Punkt  $t$ . Denken wir uns dagegen die ganze Figur um die Linie  $ap$  gedreht, so tritt der Strahl  $pc$  allmählig an die Stelle anderer Strahlen, welche mit ihm gleich weit von dem Punkte  $b$  entfernt auf die Fläche fallen, und der gebrochene Strahl  $cq$  tritt an die Stelle der dazu gehörigen gebrochenen Strahlen. Diese Strahlen schneiden sich also alle nur im Punkte  $q$ .

Während also die in der Ebene der Zeichnung dem Strahle  $pc$  unmittelbar benachbarten Strahlen ihn in  $t$  schneiden, schneiden ihn diejenigen benachbarten Strahlen, die vor und hinter der Ebene der Zeichnung in gleicher Entfernung von  $b$  einfallen, in  $q$ , und endlich können wir hinzusetzen, daß ihn diejenigen Strahlen, welche weder in der Ebene der Zeichnung noch in gleicher Entfernung von  $b$ , wie  $bc$  ist, auffallen, gar nicht schneiden.

<sup>1</sup> s. oben S. 62. *Fig. 40*.

Es ist noch zu erörtern, inwiefern die Diffraction des Lichts in der Pupille von Einfluß auf die monochromatischen Abweichungen des Auges sein kann. 144 Zunächst dürfte wohl die Frage aufgeworfen werden, ob die strahlige Form der kleinen Zerstreuungsfiguren nicht von den kleinen Einschnitten des Pupillarrandes veranlaßt sei. In der That sieht man eine ausgedehntere strahlige Figur, wenn man nach einem sehr hellen Lichtpunkte durch eine Öffnung sieht, welche kleiner als die Pupille ist, und deren Ränder nicht ganz feingepolirt sind; doch besteht eine solche Strahlenfigur in der Regel aus sehr feinen, mehr haarförmigen Strahlen mit lebhaften Farben, ähnlich dem schon oben beschriebenen Haarstrahlenkranz des Auges, der sehr helle Lichtpunkte umgibt, auch wenn man sie nicht durch eine künstliche Öffnung betrachtet. Dreht man die Öffnung dann um ihren Mittelpunkt, so dreht sich der ganze Strahlenkranz mit ihr, woraus sich eben ergibt, daß dieser Strahlenkranz von den Rändern der Öffnung herrührt.

Von dem Vorhandensein einer Diffraction des Lichts, welche durch die feine Faserung der Krystalllinse veranlaßt wäre, konnte ich mich an meinem eigenen Auge nicht überzeugen. Wenn ich durch eine glatt gebohrte Öffnung einer Metallscheibe nach einem kleinen lichten Punkte sehe, so dreht sich immer die ganze Diffractionsfigur, wenn ich die Scheibe drehe. Gehörten einzelne Züge der Diffractionsfigur den Fasern der Hornhaut oder Linse an, so müßten diese stehen bleiben. Dagegen beschreibt BEER<sup>1</sup> aus seinem Auge Diffractionserscheinungen, welche er von einer Faserung der Augenmedien herleitet.

n Auch TYNDALL<sup>2</sup> beschreibt einen Fall, wo Interferenzringe erschienen, ähnlich denen, welche ein mit Lycopodiumsamen bepulvertes Glas zeigt.

144 Diese Diffractionsphänomene unterscheiden sich aber von denen der kleinen Zerstreuungskreise wesentlich durch den Umstand, daß letztere beim Verdecken der Pupille von einer Seite her auch von einer Seite her verschwinden, während die andere Seite ungestört bleibt. Wenn ein feines Fäserchen oder ein feiner Einschnitt dagegen Diffractionsstrahlen bildet, so erstrecken sich diese niemals blos nach einer Richtung, sondern stets auch nach der entgegengesetzten, weil jede Unterbrechung einer Lichtwelle stets nach entgegengesetzten, meist nach allen Seiten hin ihren Einfluß ausübt. Die Haarstrahlenfiguren zeigen nun wirklich diesen Charakter; sobald man die Pupille anfängt zu bedecken, werden mehr oder weniger alle Theile der Figur gestört und verändert.

Außer der Diffraction, welche Unregelmäßigkeiten des Randes der Pupille bewirken, kommt aber auch noch in Betracht, daß die ganze Pupille als enge kreisförmige Öffnung Diffraction hervorrufen kann. Jedes Mal, wo Strahlen eines leuchtenden Punktes durch eine oder mehrere brechende Flächen von begrenzter Apertur, die übrigens vollkommen achromatisch und aplanatisch sein mögen, gebrochen werden, entsteht im Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen kein punktförmiges Bild, sondern wegen der Diffraction am Rande der Apertur eine kleine lichte Figur, die abwechselnd helle und dunkle Stellen zeigt, deren Form und Lage im Allgemeinen von der Größe und Gestalt der Öffnung abhängig sind. Ist die letztere kreisförmig, was bei den optischen Instrumenten und im Auge gewöhnlich der Fall ist, so besteht die Diffractionsfigur aus einer hellen Kreisscheibe, umgeben von mehreren dunklen und hellen Ringen von schnell abnehmender Helligkeit. Ist  $d$  der Durchmesser der Apertur des brechenden Systems,  $r$  der Abstand des Bildes von der-

<sup>1</sup> E. BEER. *Poggendorff's Ann.* LXXXIV. 518. 1853.

<sup>2</sup> J. TYNDALL in *Phil. Magaz.* (4) XI. 332.



selben,  $l$  die Wellenlänge des Lichts, so ist der Durchmesser  $\delta$  der mittleren Kreisscheibe nach der durch die Versuche bestätigten Theorie dieser Erscheinungen

$$\delta = 2,440 \cdot \frac{l \cdot r}{d}.$$

Setzen wir für mittleres Licht  $l = \frac{1}{2000}$  mm und  $r$  für das Auge gleich 20 mm, so wird, wenn  $\delta$  und  $d$  in Millimetern ausgedrückt werden,

$$\delta = 0,0244 \cdot \frac{1}{d}.$$

Bei der kleinsten Pupillenweite, die wir gleich 2 mm setzen wollen, würde  $\delta$  gleich 145 0.0122 mm werden. Diese GröÙe des Zerstreuungskreises entspricht einem Gesichtswinkel von 2 Min. 6 Sec., und ist gleich der GröÙe des Zerstreuungskreises, den in einem für unendliche Entfernung adaptirten Auge ein 25 m entfernter Lichtpunkt entwirft. Da der Gesichtswinkel der kleinsten wahrnehmbaren Distanzen etwa 1 Min. beträgt, so muß bei engster Pupille die Diffraction eben anfangen, die Genauigkeit des Sehens zu beeinträchtigen.

Zu den monochromatischen Abweichungen gehören auch noch die Lichtstreifen, welche nach oben und unten von einem lichten Körper ausgehen, wenn man die Augenlider halb schließt. Sie rühren von der Brechung des Lichts in dem concaven Flüssigkeitsrande her, der sich an den Lidern erhebt. Dieser Rand wirkt wie ein kleines Prisma oder eine Reihe kleiner Prismen von veränderlichem Winkel, und lenkt das ihn treffende Licht stark von seinem Wege ab.

Die Messungen, welche von älteren Physikern über die Ungleichheit der Brennweite horizontal und vertical divergirender Strahlen ausgeführt worden sind, haben nur noch historisches Interesse. Bei einigen fehlen diese Abweichungen ganz und gar, wie z. B. bei BRÜCKE<sup>1</sup>, und wo sie vorkommen, zeigen sie sich in entgegengesetztem Sinne.

TH. YOUNG giebt an, daß sein Auge zu einem Focus sammelte vertical divergirende Strahlen eines 10 engl. Zoll (304 mm) entfernten leuchtenden Punktes, und horizontal divergirende eines 7 Zoll (213 mm) entfernten. Um die GröÙe dieses Unterschieds unabhängig von den Sehweiten seines Auges auszudrücken, berechnet er die Brennweite eines Glases, welches im Stande wäre, als Brille gebraucht, die eine Entfernung auf die andere zu reduciren, und findet 23 engl. Zoll (700 mm). Um den Fehler seines Auges zu corrigiren, würde er ein Brillenglas mit einer convexen Cylinderfläche von horizontaler Axe oder ein solches mit einer concaven Cylinderfläche und verticaler Axe von der angegebenen GröÙe der Brennweite gebraucht haben. A. FICK fand, daß er 4,6 m entfernte Verticallinien und 3 m entfernte Horizontallinien gleichzeitig deutlich gesehen habe. Ich selbst sehe gleichzeitig deutlich 0,65 m entfernte Verticallinien und 0,54 m entfernte Horizontallinien. Der Sinn der Abweichung ist in diesen beiden Fällen der entgegengesetzte wie bei TH. YOUNG, die GröÙe eine viel geringere. Durch die Focallänge einer cylindrischen Linse ausgedrückt, entspricht die Abweichung in FICK's Auge einer Brennweite von 8,6 m und in meinem Auge 3,19 m. Dergleichen Messungen sind leicht auszuführen, indem man etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll über einem horizontalen, hinreichend langen Brettchen eine feine Nähnadel horizontal befestigt, und indem man sie vom Ende des Brettchens her betrachtet, eine verticale Nadel vor ihr oder hinter ihr in solcher Entfernung einsticht, daß beide gleich deutlich erscheinen.

A. FICK fand, daß ein unbefangenes blickendes Auge sich meist für Verticallinien accommodirt. Um annähernd die Entfernung der beiden Brennebenen berechnen zu können, wollen wir annehmen, daß LISTING's schematisches Auge für Verticallinien accommodirt sei. Machen wir die Abweichung der horizontal und vertical divergirenden

<sup>1</sup> E. BRÜCKE, *Fortschritte der Physik im Jahre 1845*. S. 211. Berlin 1847.

Strahlen darin ebenso groß wie bei den genannten drei Beobachtern, so würde liegen der Brennpunkt für horizontale Strahlen nach den Angaben von

TH. YOUNG . . . 0,422 mm	vor dem anderen,
A. FICK . . . . 0,035 mm	} hinter dem anderen.
H. HELMHOLTZ 0,094 mm	

Diese Abweichungen sind, wie man sieht, kleiner als die des rothen und violetten Brennpunktes (0,6 mm). Sie beeinträchtigen die Schärfe des Sehens auch so lange nicht sehr wesentlich, als es darauf ankommt, Linien von einander zu unterscheiden, die irgend einer Hauptrichtung folgen. Nur wo gekreuzte Linien gleichzeitig scharf gesehen werden sollen, treten sie hindernd auf. Die sehr ausgedehnte neuere Literatur über diesen Gegenstand ist theils schon gegeben, theils wird dies am Schluss des Werkes geschehen.

- 146 Die mehrfachen Bilder eines Punktes oder einer Linie bei ungenauer Accommodation haben schon DE LA HIRE<sup>1</sup> und JURIN<sup>2</sup> erwähnt, ohne aber die richtige Erklärung zu finden. Später beschrieb und bildete TH. YOUNG<sup>3</sup> die Form der Zerstreuungsfiguren ab bei verschiedener Entfernung des leuchtenden Punktes, und spricht die Vermuthung aus, daß die Strahlen von leichten Ungleichförmigkeiten der vorderen Linsenfläche herrühren möchten. Später erwähnt sie HASENFRATZ<sup>4</sup>, welcher denselben Grund voraussetzt und sie als Schnitlinien von zwei kaustischen Flächen bezeichnet. PURKINJE<sup>5</sup> beschreibt die Erscheinungen der mehrfachen Bilder, ferner die, welche beim Anschauen feiner paralleler Linien eintreten, und bildet die Sternfigur ab; er glaubt sie am besten von Hornhautfacetten ableiten zu können. Mehrfache Bilder einer hellen Linie hat auch PÉCLET<sup>6</sup> gesehen und erkannt, daß sie durch eine besondere Structur der brechenden Flächen veranlaßt sein müßten. Ebenso NIEDT<sup>7</sup>, GUÉRARD<sup>8</sup>, FLIEDNER<sup>9</sup>. Letzterer hat die hierher gehörigen Erscheinungen ausführlich in ihrem Zusammenhange beschrieben. TROUSSART<sup>10</sup> glaubt einen netzförmigen dunklen Schirm hinter den brechenden Flächen des Auges annehmen zu müssen, deren mehrfache Öffnungen nach dem Principe des SCHEINER'schen Versuchs die mehrfachen Bilder veranlassen. Die Ansicht über ihre Entstehung von A. FICK<sup>11</sup> ist oben schon erwähnt. Erwähnt werden hierher gehörige Erscheinungen noch von AIMÉE<sup>12</sup> und CRANMORE<sup>13</sup>. Eine ganz eigenthümliche Ansicht über den Ursprung der mehrfachen Bilder, die *Polyopia monophthalmica* der Augenärzte, hat STELLWAG VON CARION<sup>14</sup> aufgestellt. Er glaubte beobachtet zu haben, daß die verschiedenen Bilder nach verschiedenen Richtungen polarisirtes Licht erhalten. Indessen ist dies nicht richtig; Herr CARION ist bei seinen Versuchen wahrscheinlich durch eine schlecht geschliffene Turmalinplatte mit schwach gewölbten Flächen oder Streifen im Innern getäuscht worden. Eine schwach cylindrische Fläche einer solchen Platte würde, vor das Auge gehalten, bald in horizontaler, bald in verticaler Richtung die Strahlen zur Vereinigung bringen und dadurch einzelne der Doppelbilder beseitigen können. Um den Einfluß solcher Mängel der Platte aufzuheben, stelle man sie zwischen das Licht und einen Schirm mit enger Öffnung, so daß polarisirtes Licht durch die Öffnung fällt, während der Beobachter diese Öffnung aus hinreichender Entfernung betrachtet, um sie

<sup>1</sup> Ph. DE LA HIRE, *Accidens de la vue*. p. 400.

<sup>2</sup> J. JURIN, *Smith's Optics. Essay on distinct and indistinct vision*. p. 156.

<sup>3</sup> TH. YOUNG, *Philos. Transactions*. 1801. I. p. 43. Pl. VI.

<sup>4</sup> J. H. HASENFRATZ, *Ann. de Chimie*. 1809. T. LXXII. p. 5.

<sup>5</sup> J. E. PURKINJE, *Beiträge zur Kenntniß des Sehens*, Prag 1819. S. 113--119. *Neue Beiträge zur Kenntniß des Sehens*. S. 139--146, 173.

<sup>6</sup> J. C. E. PÉCLET, *Ann. d. Chimie et d. Phys.* LIV. 379. — *Poggendorff's Ann.* XXXIV. S. 557.

<sup>7</sup> NIEDT, *De dioptrici oculi coloribus ejusque Polyopia*. Dissert. Berolini 1842.

<sup>8</sup> GUÉRARD, *Institut*. 1845. No. 581. p. 64.

<sup>9</sup> C. FLIEDNER, *Poggendorff's Ann.* LXXXV. S. 321. 460. LXXXVI. 336. *Cosmos*, I. 333.

<sup>10</sup> TROUSSART, *C. R. de l'Acad. d. sciences*. XXXV. 134--136. 398. *Archiv de Genève*. XX. 305. *Institu.* 1852. p. 304.

<sup>11</sup> A. FICK, *Hente u. Pfeuffer Zeitschrift*. N. Folge V. S. 277.

<sup>12</sup> AIMÉE, *Ann. d. Chimie et d. Physique*. LVI. 108. *Poggendorff's Ann.* XXXIII. S. 479.

<sup>13</sup> CRANMORE, *Philos. Magazine*. (3) XXXVI. 485.

<sup>14</sup> STELLWAG VON CARION, *Wiener Sitzungsberichte*. VIII. 82. *Denkschriften d. k. k. Akad.* V. 2. p. 172.

sternförmig zu sehen. Man lasse nun die polarisierende Platte herumdrehen, so daß die Polarisationsrichtung des Lichts wechselt. Dann ist nicht der geringste Einfluß der Polarisationsrichtung auf die Doppelbilder zu erkennen. Übrigens lassen sich die von CARION angeblich gewonnenen Resultate auch nicht mit den bekannten Gesetzen der Doppelbrechung vereinigen. Widerlegt worden ist er durch GUT<sup>1</sup>. Die medicinische Literatur über das pathologische Vorkommen auffallenderer *Diplopia monophthalmica* findet sich in dem Aufsätze von CARION zusammengestellt.

Über Diffractionerscheinungen des Auges sind Beobachtungen gemacht von BOUDRIMONT<sup>2</sup>, WALLMARK<sup>3</sup>, BEER<sup>4</sup>. Die Lichtstreifen, welche bei halb vorgeschobenen Augenlidern durch den concaven Thränenrand an ihren Rändern entstehen, hat MEYER<sup>5</sup> (in Leipzig) besprochen.

Die Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianebenen finde ich zuerst von TH. YOUNG<sup>6</sup> besprochen, welcher dabei anführt, daß ein Herr CARY ihm als That-  
sache angeführt habe, daß viele Personen ihre Brillengläser schief gegen das Auge halten müßten, um gut durch sie zu sehen. Weitere darauf bezügliche Beobachtungen finden sich von AIRY<sup>7</sup>, FISCHER<sup>8</sup>, CHALLIS<sup>9</sup>, HEINEKEN<sup>10</sup>, HAMILTON<sup>11</sup>, SCHUYDER<sup>12</sup>, welcher Letz- 147  
tere Cylinderrlinsen dagegen verfertigen ließ, endlich A. FICK<sup>13</sup>. Eine vollständige Zusammenstellung der älteren Beobachtungen findet sich in FECHNER's Centralblatt (Jahrgang 1853. p. 73—85. 96—99. 374—370. 558—564). Seitdem DONDERS<sup>14</sup> auf die „ durch Astigmatismus bedingten Sehstörungen hinwies, bildet die Bestimmung des Astigmatismus einen regelmäßigen Theil der augenärztlichen Untersuchungen.

Die Frage nach der sphärischen Abweichung des Auges in dem Sinne, wie dieser 147  
Ausdruck für künstliche Instrumente gebraucht wird, verliert neben den beschriebenen viel größeren Abweichungen, die im Auge vorkommen, ihre Wichtigkeit. Außer der im vorigen Paragraphen schon erwähnten Beobachtung von TH. YOUNG mit seinem Optometer, wonach dessen Faden, durch vier Öffnungen gesehen, vierfach erschien und sich die vier scheinbar vorhandenen Fäden bei der Accommodation für die Nähe nicht in einem Punkte kreuzten, hat auch VOLKMANN<sup>15</sup> sich bemüht, durch Versuche über die Frage zu entscheiden, ob das Auge sphärische Aberration besitze. Er und einige andere Personen blickten durch einen Schirm mit vier Öffnungen, die in einem Bogen standen, nach einer Nadel, die in verschiedene Entfernungen vom Auge gebracht wurde. Wenn das Auge die mittleren Strahlen eher vereinigt als die Randstrahlen, werden sich bei dem Versuche, indem man die Nadel vom Auge entfernt und dem Punkte des deutlichen Sehens nähert, die Bilder der Nadel, welche den mittleren Öffnungen angehören, eher vereinigen als die der seitlichen Öffnungen. Werden die Randstrahlen eher vereinigt als die Centralstrahlen, so wird es umgekehrt sein. VOLKMANN fand bei verschiedenen Individuen in dieser Beziehung ein entgegengesetztes Verhalten. Bei regelmäßig gebildeten brechenden Rotationsflächen würden die angegebenen Versuche von YOUNG und VOLKMANN in der That über die Art und GröÙe der sphärischen Abweichung des Auges Aufschluß geben.

<sup>1</sup> GUT. *Über Diplopia monophthalmica. Dissert.* Zürich 1854.

<sup>2</sup> BAUDRIMONT, C. R. d. l'Acad. d. sc. XXXIII. 496; *Institut*. No. 931; *Phil. Magaz.* (4) II. 575.

<sup>3</sup> WALLMARK, *Poggendorff's Ann.* LXXXII. 129.

<sup>4</sup> E. BEER, *Poggendorff's Ann.* LXXXIV. 518. 1853.

<sup>5</sup> M. H. MEYER, *Poggendorff's Ann.* LXXXIX. 429. 1853.

<sup>6</sup> MEYER, *Phil. Transact.* 1801. I. p. 39.

<sup>7</sup> G. B. AIRY, *Edinh. Journal of Sc.* XIV. p. 322.

<sup>8</sup> E. G. FISCHER, *Berl. Denkschriften* 1818 u. 1819. S. 46.

<sup>9</sup> J. CHALLIS, *Transact. of the Cambridge Phil. Soc.* II.; *Phil. Magaz.* (3) XXX. 366.

<sup>10</sup> HEINEKEN, *Phil. Magaz.* XXII. 318.

<sup>11</sup> HAMILTON, *Froriep's Notizen.* VII. 219.

<sup>12</sup> SCHUYDER, *Verhandl. d. schweizer. naturf. Ges.* 1848. p. 15; *Froriep's Notizen.* X. 346; *Archiv de Genève.* X. 302.

<sup>13</sup> A. FICK, *De errore quodam optico asymmetria bulbi effecto.* Marburgi 1851; *Henle u. Pfeuffer Zeitschrift.* N. Folge. Bd. II. S. 83.

<sup>14</sup> F. C. DONDERS, *Anomalies of Accommodation and Refraction.* London 1864. Chapter VIII.

<sup>15</sup> VOLKMANN, *R. Wagner's Handwörterbuch für Physiol.* Artikel: Sehen.

Indessen werden in den meisten Meridianebenen der meisten Augen die Punkte, wo die gebrochenen Strahlen den Centralstrahl treffen, gar keine continuirliche Reihe bilden, so dafs der Begriff der sphärischen Abweichung hier gar nicht paßt.

### § 15. Die entoptischen Erscheinungen.

Das in das Auge einfallende Licht macht unter gewissen Bedingungen eine Reihe von Gegenständen sichtbar, welche sich im Auge selbst befinden. Solche Wahrnehmungen nennt man entoptische. Unter gewöhnlichen Umständen werfen kleine dunkle Körper, die im Glaskörper oder der Linse und wässerigen Feuchtigkeit schweben, keinen sichtbaren Schatten, und werden deshalb nicht bemerkt. Der Grund davon ist, dafs durch jeden Theil der Pupille meist gleichmäfsig Licht eindringt, und somit für die Beleuchtung der hinteren Augenkammer die ganze Pupille gleichsam die leuchtende Fläche bildet. Es ist aber bekannt, dafs, wenn Licht von einer sehr breiten Fläche ausgeht, nur breite Gegenstände, oder solche Gegenstände, welche der den Schatten auffangenden Fläche sehr nahe sind, einen sichtbaren Schatten werfen.

Nun giebt es im Auge allerdings Gegenstände, nämlich die Gefäße der Netzhaut, welche sehr nahe vor der lichtempfindenden Fläche des Auges sich befinden, und daher immer einen Schatten auf die dahinter liegenden Theile der Netzhaut werfen. Aber eben weil diese Theile der Netzhaut hinter den Gefäßen immer beschattet sind, und der beschattete Zustand für sie der normale ist, nehmen sie ihn nur unter besonderen Umständen wahr, welche wir weiter unten näher besprechen wollen.

Zunächst wende ich mich zu den in den durchsichtigen Mitteln des Auges enthaltenen kleinen schattengebenden Körpern. Um sie wahrzunehmen, muß man Licht von einer sehr kleinen leuchtenden Stelle, welche sich sehr nahe vor dem Auge befindet, in das Auge fallen lassen. Zu dem Zwecke kann man entweder das im Focus einer kleinen Sammellinse entworfene Bild einer fernen Lichtflamme nahe vor das Auge bringen, oder ein kleines

gut polirtes metallisches Knöpfchen, welches von der Sonne oder einer Lampe beschienen wird, oder einen Schirm von dunklem Papier, welcher Licht durch eine sehr kleine Öffnung fallen läßt. Am zweckmäfsigsten ist es, eine Sammellinse von grofser Apertur und kleiner Brennweite *a* Fig. 89 aufzustellen; vor ihr in einiger Entfernung eine Lichtflamme *b*, von der die Linse in ihrem Brennpunkte ein verkleinertes Bild entwirft. Dann stellt




Fig. 89.

man hier einen undurchsichtigen dunklen Schirm *c* mit kleiner Öffnung so auf, dafs das Bild der Flamme auf diese Öffnung fällt. Durch die Öffnung

dringt dann ein breiter Kegel divergirender Strahlen. Ein Auge  $o$ , welches der Öffnung sehr genähert wird, erblickt durch sie hindurch die breite, gleichmäßig erleuchtete Fläche der Linse, auf welcher sich nun mit großer Deutlichkeit die entoptisch wahrzunehmenden Gegenstände darstellen. Wenn wie in *Fig. 90* der leuchtende Punkt  $a$  zwischen dem Auge und seinem vorderen Brennpunkte  $f$  liegt, entwerfen die Augenmedien ein entfernteres, vor dem Auge liegendes Bild  $\alpha$  von  $a$ , und die Strahlen durchdringen den Glaskörper in Richtungen, welche von  $\alpha$  aus divergiren. Unter diesen Umständen wird von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körper  $b$  ein Schatten  $\beta$  auf der Netzhaut entworfen, welcher größer ist als  $b$ .




Fig. 90.

Wenn wie in *Fig. 91* der leuchtende Punkt  $a$  im vorderen Brennpunkte des Auges liegt, werden die von  $a$  ausgehenden Strahlen im Glaskörper parallel sein, und von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körperchen  $b$  wird ein Schatten  $\beta$  von gleicher Größe entworfen. Liegt endlich der leuchtende Punkt vom Auge weiter entfernt als der vordere Brennpunkt des Auges  $f$ , wie in *Fig.*




Fig. 91

92, so fällt das Bild von  $a$  hinter das Auge nach  $\alpha$ , und die Strahlen convergiren im Glaskörper nach  $\alpha$  hin. Der Schatten  $\beta$  von  $b$  ist dann kleiner als  $b$ .




Fig. 92.

Dem entsprechend bemerkt man, daß die entoptisch sichtbar gewordenen Gegenstände sich scheinbar vergrößern, wenn man das Auge dem leuchtenden Punkte nähert; sich verkleinern, wenn man es von ihm entfernt.

Die bei diesen Versuchen beleuchtete Stelle der Netzhaut ist der Zerstreuungskreis des leuchtenden Punktes. Auf diesem werden die Schatten der entoptisch wahrgenommenen Gegenstände entworfen. Diese Schatten sind zwar scharf genug, daß man die Gestalt der Objekte ziemlich gut erkennen kann, wenn die Lichtquelle klein genug ist, aber sie bilden doch niemals ganz vollkommen scharfe Bilder, weil das Licht in Wirklichkeit doch nicht von einem einzigen Punkte, sondern stets von einer, wenn auch kleinen, leuchtenden Fläche kommt. Das von den Augenmedien entworfene Bild

dieser Fläche ist für die auf der Netzhaut zu entwerfenden Schatten die Lichtquelle, welche natürlich stets einige Ausdehnung haben wird. Während punktförmige Lichtquellen scharf gezeichnete Schatten entwerfen würden, entwerfen ausgedehntere Lichtquellen Schatten, deren Umrisse allmählig durch Halbschatten in die Fläche übergehen, und die deshalb minder scharf gezeichnet sind. Im Allgemeinen werden deshalb die entoptischen Wahrnehmungen desto schärfer gezeichnet, je feiner die Öffnung ist, durch welche das Licht dringt, und ausserdem je näher der schattengebende Körper der Netzhaut sich befindet. Aber natürlich muß man bei engeren Öffnungen auch intensiveres Licht zur Beleuchtung benutzen. Ausserdem kommt bei sehr engen Öffnungen noch eine andere Erscheinung zum Vorschein, welche die Deutlichkeit der Zeichnung beeinträchtigt. Es bilden sich nämlich durch Diffraction am Rande des schattengebenden Körpers Diffractionsfransen, helle und dunkle Linien, welche dem Umriss des Schattens folgen. Dergleichen Diffractionsfransen entstehen überall, wo punktförmige, hinreichend intensive Lichtquellen Schatten werfen. Bei den gewöhnlichen Lichtquellen von gröfserer Breite verschwinden diese Franssen im Halbschatten.

Wenn das Auge oder der leuchtende Punkt seine Stellung verändert, so verschieben sich die Schatten der Körper, welche verschieden weit von der Netzhaut abstehen, in verschiedener Weise, und nehmen dadurch eine verschiedene gegenseitige Lage an. Man kann, wie LISTING gezeigt hat, diesen Umstand benutzen, um den Ort im Auge ungefähr zu bestimmen, wo sich die schattengebenden Körperchen befinden. Das entoptische Gesichtsfeld ist begrenzt durch den kreisförmigen Schatten der Iris. Wenn wir nach einander verschiedene Punkte des kreisförmigen Feldes fixiren, verschieben sich die Schatten aller Körper, welche nicht in der Ebene der Pupille liegen, gegen die kreisförmige Begrenzung des Gesichtsfeldes. Diese Bewegung der Schatten in dem entoptischen Gesichtsfelde nennt LISTING die relative entoptische Parallaxe; er nennt sie positiv, wenn die Bewegung des betreffenden Schattens die gleiche Richtung hat mit der Richtung des Visirpunktes, negativ, wenn sie entgegengesetzte Richtung hat. Die relative entoptische Parallaxe ist Null für Objecte, welche in der Ebene der Pupille liegen, positiv für Objecte hinter der Pupille, negativ für Objecte vor der Pupille. Für Objecte, welche der Netzhaut sehr nahe liegen, ist die Verschiebung der Schatten fast ebenso grofs wie die des Visirpunktes, so dafs diese den Visirpunkt bei seinen Bewegungen überall hin begleiten, wenn sie nicht durch wirkliche Bewegungen in der Flüssigkeit des Glaskörpers aus der Gesichtslinie entfernt werden.

Der Schatten auf der Netzhaut ist ebenso gerichtet wie der schattentwerfende Körper; da aber, was auf der Netzhaut oben ist, im Gesichtsfelde unten erscheint, so erscheinen die entoptisch gesehenen Gegenstände im Gesichtsfelde stets verkehrt.

Was man entoptisch wahrnehmen kann, ist Folgendes:

1) Begrenzt ist das helle Feld durch den Schatten der Iris; es ist deshalb nahe kreisrund, entsprechend der Form der Pupille. Hat der Pupillarrand der Iris Einschnitte, Falten oder Vorsprünge, wie dies in vielen Augen der Fall ist, so sind dergleichen auch in dem entoptischen Bilde zu erkennen. Auch die Erweiterung und Verengung der Pupille kann man entoptisch beobachten, am leichtesten, wenn man das andere Auge abwechselnd mit der Hand verdeckt und wieder frei läßt. Sobald Licht in dieses Auge fällt, verengern sich die Pupillen beider Augen, und man erkennt diese Verengung leicht im entoptischen Bilde.

2) Von den Flüssigkeiten herrührend, welche die Hornhaut überziehen (Thänenfeuchtigkeit, Secret der Augenliderdrüsen), nimmt man oft im entoptischen Gesichtsfelde Streifen wahr, wolkig-helle oder lichtere Stellen, tropfenähnliche Kreise mit heller Mitte, welche durch Blinzen mit den Augenlidern schnell verwischt und verändert werden. Dergleichen sind dargestellt in *Taf. I. Fig. 2*. Sie sind meist in schnellem Zerfließen begriffen und haben eine selbständige Bewegung von oben nach unten. Die Streifen sind am stärksten ausgeprägt dicht am Rande der Augenlider, wenn man die Lider vor die Pupille treten läßt, und sind der Ausdruck der capillaren concaven Flüssigkeitsschicht, welche sich von der Hornhaut auf den Rand der Augenlider herüberzieht. Die Tropfen entstehen wohl durch capilläre Anhäufungen der feuchten Schicht um Schleimklümpchen, Staubtheile u. dgl. Die helle Stelle in der Mitte der Tropfen bildet oft ein unvollkommenes optisches Bild von der Lichtquelle, ist z. B. dreieckig, wenn das Licht durch eine dreieckige Öffnung in das Auge fällt. Dies Bild der Lichtquelle steht scheinbar aufrecht im entoptischen Gesichtsfelde, während es auf der Netzhaut verkehrt sein muss. Die Ansammlungen von Flüssigkeit auf der Hornhaut bilden hierbei kleine Convexlinsen, welche hinter sich ein umgekehrtes Bild der vor ihnen liegenden Gegenständen entwerfen. Der Bewegung dieser Gebilde im Gesichtsfelde von oben nach unten entspricht eine wirkliche Bewegung nach oben, welche wohl dadurch bedingt wird, daß das obere Augenlid, während es gehoben wird, die zähen Schleimtheile nachzieht.

3) Die kraus gewordene Vorderfläche der Hornhaut, nachdem man eine Zeit lang das geschlossene Auge mit den Fingern gedrückt oder gerieben hat. Man sieht ziemlich gleichförmig vertheilt größere, unbestimmt begrenzte, wellige oder netzartig geordnete Linien und getigerte Flecken, die sich eine Viertelstunde bis zu einigen Stunden halten. Es sind dergleichen dargestellt in *Taf. I. Fig. 3*. Zuweilen bleiben auch in dem Netze dieser Linien einzelne unveränderte glatte Stellen stehen, welche darauf schließen lassen, daß hier die Hornhaut eine andere Art der Consistenz habe.

Außerdem finden sich, von der Hornhaut herrührend, zuweilen constante dunkle Flecken und Linien vor, welche sich nicht ändern und wohl meist Reste von Entzündungen und Verletzungen sind.

4) Von der Linse, namentlich der vorderen Kapselwand, und dem vorderen Theile des Krystallkörpers rühren mannigfache Erscheinungen her.

152 LISTING beschreibt folgende vier Formen:

a) Perlflecken, runde oder rundliche Scheibchen, innen hell, mit scharfem, dunklem Rande. Sie sehen bald Luftbläschen, bald Öltropfen, bald Krystallchen ähnlich, welche man durch das Mikroskop sieht (s. *Taf. I. Fig. 4*); LISTING hält sie für Schleimmassen in der MORGAGNI'schen Feuchtigkeit.

b) Dunkle Flecken, unterscheiden sich von den vorigen durch den Mangel eines hellen Kerns und auch durch gröfsere Mannigfaltigkeit der Gestalt. Sie scheinen partielle Verdunkelungen der Kapsel oder Linse zu sein (s. *Taf. I. Fig. 5*).

c) Helle Streifen, meist einen unregelmäßigen Stern mit wenig Ausläufern in der Mitte des Gesichtsfeldes darstellend (*Taf. I. Fig. 6*). LISTING hält sie für das Bild eines nabelförmigen Gebildes mit naht- oder wulstähnlichen Zweigen in der vorderen Kapselmembran, herrührend von der im Fötalzustande erfolgenden Trennung dieses Kapseltheils von der Innenseite der Hornhaut.

d) Dunkle radiale Linien (*Taf. I. Fig. 7*), welche wohl Andeutungen des strahligen Baues der Linse sind.

Einzelne von den genannten Formen scheinen fast in jedem Auge sichtbar zu sein, wenige Augen sind ganz frei davon.

5) Bewegliche Gebilde im Glaskörper, die sogenannten fliegenden Mücken (*Mouches volantes*), welche theils als Perlenschnüre, theils als vereinzelte oder zusammengruppirte Kreise mit hellem Centrum, theils als unregelmäßige Gruppen sehr feiner Kügelchen, theils als blasse Streifen, ähnlich den Falten einer sehr durchsichtigen Membran, erscheinen. Da viele von ihnen sehr nahe vor der Netzhaut sich befinden, sieht man sie oft ohne weitere Hilfsmittel, indem man nach einer breiten, gleichmäßig erleuchteten Fläche, z. B. dem hellen Himmel, blickt. Dafs sie sich nicht bloß scheinbar, sondern wirklich bewegen, bemerkt man leicht, wenn man bei aufrechter Haltung des Kopfes, z. B. durch eine Fensterscheibe, nach dem Himmel blickt, und einen mit einem Merkzeichen versehenen Punkt des Glases fixirt. Dann sieht man die entoptischen Erscheinungen meistens langsam im Gesichtsfelde herabsinken. Senkt man den Blick und hebt ihn wieder, so folgen die Mücken dieser Bewegung des Visirpunktes, schiefsen aber 153 gewöhnlich etwas über das Ziel hinaus und sinken dann wieder. Nach einer Bewegung des Auges dagegen, welche von oben nach unten gerichtet ist, tritt ein solches Schwanken über das Ziel hinaus nicht ein, auch nicht bei seitlichen Bewegungen. Beobachtet man dagegen bei senkrecht nach unten oder oben gerichteter Gesichtslinie, so liegen die Mücken ziemlich ruhig. Sehr leicht läßt man sich aber bei diesen Beobachtungen verleiten, den Blick nach einer solchen dem Gesichtspunkt naheliegenden Mücke richten zu wollen, um sie durch direkte Fixation deutlicher zu sehen. Dann fliegt die entoptische Erscheinung vor dem Visirpunkte einher, ohne natürlich je



von ihm erreicht werden zu können. Gerade auf diese Eigenthümlichkeit der Erscheinung bezieht sich wohl der Name der *Mouches volantes*. Man verwechsle diese scheinbare Bewegung nicht mit einer wirklichen, und achte bei den Beobachtungen der letzteren darauf, einen äußeren Gesichtspunkt ganz fest zu fixiren.

Um solche bewegliche Objecte mit Ruhe betrachten zu können, wählt man am besten eine Lage des Kopfes, wo das Auge vertical nach unten oder nach oben sieht, weil dann die Bewegungen der schwimmenden Körperchen aufhören. Übrigens kann man Mücken, welche seitlich im Gesichtsfelde liegen, zwingen, nach der Stelle des deutlichsten Sehens heranzuschwimmen, wenn man das Auge erst recht schnell in der Richtung bewegt, nach welcher sie vom Visirpunkt aus liegen und dann langsam zurückbewegt.

DONDERS und DONCAN<sup>1</sup> unterscheiden folgende Formen dieser Objecte:

a) Größere isolirte Kreise, bald mit dunkleren, bald mit blasserem Umrissen, in der Mitte heller, meist noch mit einem schmalen Lichtkreis umgeben. Sie haben zwischen  $\frac{1}{32}$  und  $\frac{1}{120}$  mm Durchmesser und sind  $\frac{1}{3}$  bis 3 oder 4 mm von der Netzhaut entfernt, kommen aber auch in der Linse vor. Ist das Auge lange ruhig gewesen, so zeigen sich nur wenige; sie kommen namentlich, und zwar scheinbar von unten her, zum Vorschein durch eine schnelle Bewegung des Auges von unten nach oben, der plötzlicher Stillstand folgt, und senken sich dann wieder langsam nach unten. Ihre Bewegung kann für die dunkelsten in einer Ausdehnung von  $1\frac{1}{2}$  mm direct beobachtet werden und ist wahrscheinlich viel ausgedehnter. Ihre seitlichen Bewegungen bei seitlichen Bewegungen des Auges findet DONCAN beschränkt. In meinen eigenen Augen kann ich einen solchen Unterschied nicht wahrnehmen. Wenn ich den Kopf auf die Seite lege, so finde ich, daß die Mücken jetzt ebenso schnell und weit scheinbar nach dem Erdboden hin sinken, in Wirklichkeit nach dem aufwärts gewendeten Augenwinkel emporsteigen, wie bei aufrechter Haltung des Kopfes. Bei der letzteren Haltung erscheinen die seitlichen Bewegungen der Mücken allerdings beschränkter als die absteigenden, weil sie seitlich eben nur die Bewegungen des Visirpunktes mitmachen. Eine Bewegung derselben parallel der Gesichtslinie gelang nicht zu constatiren. Viele, obgleich scheinbar von einander getrennt, scheinen sich immer in gleichem Abstände zu begleiten, oder bleiben in derselben Beziehung zu andern Formen, so daß man berechtigt ist, auf einen unsichtbaren Zusammenhang zu schließen. Ihnen entsprechend fand DONCAN bei mikroskopischer Untersuchung des freigelegten und unverletzten Glaskörpers von seiner Oberfläche aus darin blasse Zellen, welche in der Verwandlung in Schleimstoff begriffen zu sein schienen, wie in *Fig. 93.* abgebildet sind. 154

<sup>1</sup> A. DONCAN *Dissert. de corporis vitrei struct. Trajecti ad Rhenum 1854.* — *Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. 171.*

b) Perlschnüre kommen in den meisten Augen vor; DONCAN konnte jedoch keine sehen. Ihre Breite beträgt  $\frac{1}{33}$  bis  $\frac{1}{190}$  mm, ihre Länge



Fig. 93.

1 bis 4 mm. Die schmalsten liegen gewöhnlich dichter bei, die breiteren und dunkleren entfernter von der Netzhaut, in  $\frac{1}{4}$  bis 3 mm Abstand. Ihre Bewegungsart ist meist dieselbe wie der vorher beschriebenen Kreise, doch sind sie zuweilen auch befestigt. Einzelne sind isolirt, andere hängen mit anderen Gebilden zusammen. Sie entsprechen Fasern, die mit Körnern besetzt sind (Fig. 94), welche durch das Mikroskop im Glaskörper gefunden werden.




Fig. 94.

c) Die zusammenhängenden Gruppen von größeren und kleineren, theils blassen, theils dunkeln Kreisen, welche den mikroskopisch gefundenen Körnerhaufen (Fig. 95) entsprechen, sind meist undurchscheinender als die übrigen Formen, weil mehrere Körner in der Richtung der Gesichtssaxe hinter einander liegen. Diese sind es, die am häufigsten beim gewöhnlichen Sehen als *Mouches volantes* wahrgenommen werden. Nicht selten scheinen



Fig. 95.

einige von ihnen in der Nähe der Gesichtslinie einen Gleichgewichtszustand einzunehmen; aber sie kommen doch auch bei Bewegungen des Auges auf gleiche Weise und in gleicher Richtung, mit denselben Bewegungen wie die Perlschnüre, in größerer Menge zum Vorschein, um das Gesichtsfeld in der Folge wieder zu verlassen.

d) Die Falten zeigen sich in Gestalt hellerer Bänder, von zwei dunkleren, nicht scharf gezeichneten Linien begrenzt. DONCAN unterscheidet davon noch wieder zwei Formen. Einige zeigen sich nämlich entweder ähnlich einer stark gefalteten Faser, oder wie verschiedene kleine Bänder, einander sehr nahe, auf unsichtbare Weise



Fig. 96.

mit einander verbunden, oder als ein unregelmäßig aufgerolltes, in den verschiedensten Richtungen gefaltetes Häutchen, das seine Form constant behält, wie das nach einer mikroskopischen Beobachtung in Fig. 96 dargestellte. Diese bewegen sich wie die Perlschnüre und liegen nur  $2\frac{1}{2}$  bis 4 mm von der Netzhaut entfernt. —

Davon unterscheiden sich sehr ausgebreitete Häute, die theils dicht hinter der Linse liegen, theils nur 2 bis 4 mm von der Netzhaut entfernt, während zwischen 4 und 10 mm

Entfernung von der Netzhaut keine getroffen werden. In den ersteren zeigen sich Falten von nicht weniger als  $\frac{1}{23}$  mm Breite, in den letzteren haben sie selten mehr als  $\frac{1}{60}$  mm. Sie kommen zum Vorschein, wenn die Gesichtslinie seitwärts bewegt wird, aber namentlich auch durch eine kräftige, plötzlich abgebrochene Bewegung von oben nach unten. Scheinbar steigen hierbei die dicht hinter der Linse gelegenen Falten nach oben, während umgekehrt die in der Nähe der Netzhaut gelegenen nach unten sinken, so daß sie sich in der Gesichtslinie an einander vorbei schieben. Meist sieht man nun die gefalteten Häute mehr und mehr undeutlich werden, ohne daß sie doch aus dem Gesichtsfelde sich entfernten, und doch kommen sie durch Wiederholung der Bewegung aufs neue deutlicher zum Vorschein. DONCAN schließt daraus, daß diese Häute nur scheinbar eine so ausgebreitete Bewegung haben, und daß nicht die Häute sich fortbewegen, sondern nur Faltungen sich fortpflanzen, welche sich bei der plötzlich unterbrochenen Bewegung des Auges an der Peripherie formen und sich bis an das andere Ende der Häute ausstrecken, wobei sie ihre Schärfe verlieren und minder sichtbar werden. Die Ursache der verschiedenen Richtung, worin die Bewegung dieser Häute und die Fortpflanzung der Falten stattfindet, ist darin zu suchen, daß die einen vor, die anderen hinter dem Drehpunkte des Auges liegen. Wenn man die Pupille durch Atropin erweitert, oder den leuchtenden Punkt sehr nahe an das Auge bringt, so daß man ziemlich weit zur Seite der Gesichtslinie sehen kann, so bemerkt man, daß namentlich bei kräftigen, plötzlich unterbrochenen seitlichen Bewegungen des Auges noch mehr Häute dicht hinter der Linse zum Vorschein kommen, die selten bis an die Gesichtslinie reichen, und mit einem unregelmäßigen, zuweilen zerfetzten Rande hier endigen.

Die Bewegungsart der frei beweglichen Objecte des Glaskörpers läßt wohl kaum einen Zweifel, daß sie kleine Körper sind, welche in einem vollkommen flüssigen Medium schwimmen und specifisch leichter sind als die Flüssigkeit. Da man sie oft durch das ganze entoptische Gesichtsfeld schwimmen sieht, und sie in meinem Auge wenigstens das Gesichtsfeld ebenso gut von oben nach unten, wie von rechts nach links durchschwimmen, dieses aber bei divergirend einfallendem Lichte einen größeren Theil der Netzhaut umfaßt, als die Pupille beträgt, so muß das Bassin, in welchem sie sich bewegen, längs der Netzhaut gemessen, jedenfalls größer sein als die Pupille. Dagegen scheinen die schwimmenden Körper sich nicht von der Netzhaut entfernen zu können, denn auch bei aufwärts gerichteter Gesichtslinie, wo die Objecte wegen ihrer specifischen Leichtigkeit streben müssen nach der Linsenseite des Glaskörpers hin zu schwimmen, sieht man dieselben Objecte sich längs der Netzhaut hin bewegen, aber nicht von ihr fort. Das Hinderniß mögen wohl die Membranen sein, deren Falten man im entoptischen Gesichtsfelde sieht und welche der Netzhaut parallel zu sein scheinen. Einige solche Körperchen scheinen auch an der Glashaut befestigt zu sein, wie denn DOXDERS mittheilt, daß er in der Gesichtslinie

Indessen werden in den meisten Meridianebenen der meisten Augen die Punkte, wo die gebrochenen Strahlen den Centralstrahl treffen, gar keine continuirliche Reihe bilden, so daß der Begriff der sphärischen Abweichung hier gar nicht paßt.


### § 15. Die entoptischen Erscheinungen.

Das in das Auge einfallende Licht macht unter gewissen Bedingungen eine Reihe von Gegenständen sichtbar, welche sich im Auge selbst befinden. Solche Wahrnehmungen nennt man entoptische. Unter gewöhnlichen Umständen werfen kleine dunkle Körper, die im Glaskörper oder der Linse und wässerigen Feuchtigkeit schweben, keinen sichtbaren Schatten, und werden deshalb nicht bemerkt. Der Grund davon ist, daß durch jeden Theil der Pupille meist gleichmäßig Licht eindringt, und somit für die Beleuchtung der hinteren Augenkammer die ganze Pupille gleichsam die leuchtende Fläche bildet. Es ist aber bekannt, daß, wenn Licht von einer sehr breiten Fläche ausgeht, nur breite Gegenstände, oder solche Gegenstände, welche der den Schatten auffangenden Fläche sehr nahe sind, einen sichtbaren Schatten werfen.

Nun giebt es im Auge allerdings Gegenstände, nämlich die Gefäße der Netzhaut, welche sehr nahe vor der lichtempfindenden Fläche des Auges sich befinden, und daher immer einen Schatten auf die dahinter liegenden Theile der Netzhaut werfen. Aber eben weil diese Theile der Netzhaut hinter den Gefäßen immer beschattet sind, und der beschattete Zustand für sie der normale ist, nehmen sie ihn nur unter besonderen Umständen wahr, welche wir weiter unten näher besprechen wollen.

Zunächst wende ich mich zu den in den durchsichtigen Mitteln des Auges enthaltenen kleinen schattengebenden Körpern. Um sie wahrzunehmen, muß man Licht von einer sehr kleinen leuchtenden Stelle, welche sich sehr nahe vor dem Auge befindet, in das Auge fallen lassen. Zu dem Zwecke kann man entweder das im Focus einer kleinen Sammellinse entworfene Bild einer fernen Lichtflamme nahe vor das Auge bringen, oder ein kleines

gut polirtes metallisches Knöpfchen, welches von der Sonne oder einer Lampe beschienen wird, oder einen Schirm von dunklem Papier, welcher Licht durch eine sehr kleine Öffnung fallen läßt. Am zweckmäßigsten ist es, eine Sammellinse von großer Apertur und kleiner Brennweite *a* *Fig. 89* aufzustellen; vor ihr in einiger Entfernung eine Lichtflamme *b*, von der die Linse in ihrem Brennpunkte ein verkleinertes Bild entwirft. Dann stellt



*Fig. 89.*

man hier einen undurchsichtigen dunklen Schirm *c* mit kleiner Öffnung so auf, daß das Bild der Flamme auf diese Öffnung fällt. Durch die Öffnung

dringt dann ein breiter Kegel divergirender Strahlen. Ein Auge  $o$ , welches der Öffnung sehr genähert wird, erblickt durch sie hindurch die breite, gleichmäßig erleuchtete Fläche der Linse, auf welcher sich nun mit großer 149 Deutlichkeit die entoptisch wahrzunehmenden Gegenstände darstellen. Wenn wie in *Fig. 90* der leuchtende Punkt  $a$  zwischen dem Auge und seinem vorderen Brennpunkte  $f$  liegt, entwerfen die Augenmedien ein entfernteres, vor dem Auge liegendes Bild  $\alpha$  von  $a$ , und die Strahlen durchdringen den Glaskörper in Richtungen, welche von  $\alpha$  aus divergiren. Unter diesen Umständen wird von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körper  $b$  ein Schatten  $\beta$  auf der Netzhaut entworfen, welcher größer ist als  $b$ .




Fig. 90.

Wenn wie in *Fig. 91* der leuchtende Punkt  $a$  im vorderen Brennpunkte des Auges liegt, werden die von  $a$  ausgehenden Strahlen im Glaskörper parallel sein, und von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körperchen  $b$  wird ein Schatten  $\beta$  von gleicher Größe entworfen. Liegt endlich der leuchtende Punkt vom Auge weiter entfernt als der vordere Brennpunkt des Auges  $f$ , wie in *Fig.*




Fig. 91

92, so fällt das Bild von  $a$  hinter das Auge nach  $\alpha$ , und die Strahlen convergiren im Glaskörper nach  $\alpha$  hin. Der Schatten  $\beta$  von  $b$  ist dann kleiner als  $b$ .




Fig. 92.

Dem entsprechend bemerkt man, daß die entoptisch sichtbar gewordenen Gegenstände sich scheinbar vergrößern, wenn man das Auge dem leuchtenden Punkte nähert; sich verkleinern, wenn man es von ihm entfernt.

Die bei diesen Versuchen beleuchtete Stelle der Netzhaut ist der Zerstreuungskreis des leuchtenden Punktes. Auf diesem werden die Schatten der entoptisch wahrgenommenen Gegenstände entworfen. Diese Schatten sind zwar scharf genug, daß man die Gestalt der Objekte ziemlich gut erkennen kann, wenn die Lichtquelle klein genug ist, aber sie bilden doch niemals ganz vollkommen scharfe Bilder, weil das Licht in Wirklichkeit doch nicht von einem einzigen Punkte, sondern stets von einer, wenn auch kleinen, leuchtenden Fläche kommt. Das von den Augenmedien entworfene Bild

dunklen Streifen in der Richtung  $\alpha A$  in das Gesichtsfeld. Liegt der Brennpunkt in  $b$ , so fällt der Schatten nach  $\beta$ , und es wird der dunkle Streifen in das Gesichtsfeld nach  $B$  verlegt. Während sich also die Lichtquelle von  $a$  nach  $b$  bewegt, wird der scheinbare Gefäßstamm in

158




Fig. 98.

Gesichtsfelde von  $A$  nach  $B$  in gleicher Richtung wandern. Die chagrinirte Fläche um den Visirpunkt herum zeigt die entgegengesetzte Bewegungsart; sie entsteht also jedenfalls nicht in derselben Weise, wie die Gefäßschatten entstehen. Im Gesichtsfelde greift auf der dem Lichte abgekehrten Seite der Gefäßbaum etwas über den Rand der chagrinirten Stelle, oben und unten scheint er den Rand nur zu berühren, dem Lichte abgekehrt ist ein Zwischenraum zwischen beiden, gleichviel ob das Licht vom innern oder äußern Augenhorn einfällt. Es ist dies wohl dadurch bedingt, daß die Gefäßverzweigungen mehr nach vorn liegen als die Schicht, welche durch Brechung oder Zurückwerfung des Lichts das chagrinirte Aussehen erzeugt, und daher bei schief einfallendem Lichte der Schatten der Gefäßstamm

auf der Hinterfläche der Netzhaut nicht senkrecht unter den Gefäßen liegt. Diejenige Structur, welche das chagrinirte Aussehen hervorruft, scheint demnach ziemlich genau dieselbe Ausdehnung zu haben, wie die Gefäßstelle der Netzhaut.

n Dieselbe Erscheinung wird auch nach der unter 3) angeführten Methode sichtbar, nach welcher unter Andern Herr L. WOLFFBERG<sup>1</sup> sie beobachtet und zu Messungen benutzt hat. Derselbe hat die Feinheit der Granulirung mit der von Körnern und Glasperlen zu vergleichen gesucht, und findet, daß dieselben der Größe nach den Zapfen der Netzhautgrube entsprechen. Zu der gleichen Meinung ist auch J. P. NUEL<sup>2</sup> gekommen, obwohl seine Größenschätzungen weniger gut zur Größe der Zapfen stimmen.

Andere Erscheinungen, die bei intermittirendem Licht gesehen werden, deren Beziehung auf Netzhautelemente aber noch sehr zweifelhaft ist, werde ich in § 23 erwähnen.

158 2) Die zweite Methode zur Beobachtung der Netzhautgefäße ist folgende: Man blicke auf einen dunklen Hintergrund hin und bewege dabei unterhalb oder seitlich vom Auge ein brennendes Licht hin und her. Man sieht dann den dunklen Hintergrund von einem matten weißlichen Scheine überzogen, in welchem sich der dunkle Gefäßbaum abzeichnet. Die Figur bleibt so lange deutlich, als man das Licht bewegt. Wenn man das Licht von rechts nach links bewegt, erscheinen hauptsächlich die von oben nach

<sup>1</sup> L. WOLFFBERG, *Die entoptische Wahrnehmung der Fovea centralis und ihrer Zapfenmosaik*. Archiv Augenheilkunde. XVI. 1886.

<sup>2</sup> J. P. NUEL, *De la vision entoptique de la fovea centralis*. Archives de Biologie par VAN BENEDEK et BAMBEKE. T. IV. 1883. Annales d'Oculistique. T. XCI. p. 95.

unten verlaufenden Gefäße, wenn man es von oben nach unten bewegt, die horizontal verlaufenden. Bei den Bewegungen des Lichts bewegt sich gleichzeitig der ganze Gefäßbaum, aber nicht in allen seinen Theilen gleichmäßig. MEISSNER vergleicht sehr passend die Art der Bewegung des Gefäßbaums hierbei mit dem Ansehen eines vom Wasser entworfenen Spiegelbildes, wenn Wellen darüber fortlaufen. Bei näherer Untersuchung der Erscheinung zeigt sich, daß wenn abwechselnd das Licht gegen die Gesichtslinie hin und von ihr wegbewegt wird, der Gefäßbaum im Gesichtsfelde sich in gleicher Richtung wie das Licht verschiebt. Wenn aber das Licht in Richtung eines Kreisbogens bewegt wird, dessen Mittelpunkt in der Gesichtslinie liegt, verschiebt sich der Gefäßbaum in entgegengesetzter Richtung. Wird also z. B. das Licht unter dem Auge gehalten und vertical nach oben und unten bewegt, so bewegt sich auch der Gefäßbaum im Gesichtsfelde mit dem Lichte zugleich nach oben und nach unten; wird es horizontal unter dem Auge von rechts nach links bewegt, so geht der Gefäßbaum nach rechts, wenn das Licht nach links, und umgekehrt.

Die inneren Äste des Gefäßbaums erscheinen nicht in so großer Feinheit der Zeichnung wie bei den beiden anderen Methoden.

In der Mitte, dem Visirpunkte entsprechend, beschreiben mehrere Beobachter eine helle kreisförmige oder elliptische Scheibe. *Fig. 99.* ist die 159 Abbildung, welche BUROW davon gegeben hat. Sie ist an dem der Flamme zugewendeten Rande durch einen dunklen halbmondförmigen Schatten gesäumt, in der Mitte am hellsten. H. MÜLLER sieht diese Scheibe gar nicht, und ich selbst sehe immer nur den halbmondförmigen Schatten, welcher die dem Lichte zugekehrte Seite ihrer Peripherie bildet, während die andere Seite keine entschiedene Begrenzung darbietet. Auch diese centrale Scheibe bewegt sich bei Bewegungen des Lichts. Man überzeugt sich davon, wenn man, während man die Erscheinungen wahrnimmt, einen äußeren Punkt fixirt. Bei mir liegt der Fixationspunkt immer an dem dem Lichte zugewendeten Theile des Randes der hellen Scheibe, wenn ich den halbmondförmigen Schatten meines Auges zur Scheibe ergänzt denke.



*Fig. 99.*

Die vollständige Theorie dieser Erscheinungen ist von H. MÜLLER gefunden worden, und ist folgende: Die Lichtquelle für die Beleuchtung des inneren Auges ist in diesem Falle das Netzhautbildchen der Lichtflamme, welches, da das Licht weit vom Centrum des Gesichtsfeldes absteht, auf dem Seitentheile der Netzhaut entworfen wird. Da das Licht sich übrigens dem Auge sehr nahe befindet, kann sein Netzhautbild ziemlich groß sein und genügend viel Licht in den Glaskörper hinein zurückwerfen, um eine

merkliche Lichtperception in der ganzen Netzhaut anzuregen. Die Art der Beleuchtung ist also ähnlich derjenigen der ersten Methode, nur dadurch unterschieden, daß die Licht aussendende Stelle der Augenwand ihr Licht nicht von außen durch die Sclerotica, sondern von vorn durch die Pupille empfängt. Da die Bilder auf den Seitentheilen der Netzhaut nicht scharf sind, das Bildchen der Flamme in diesem Falle, um hinreichend Licht zu geben, auch ziemlich ausgedehnt sein muß, so erklärt es sich leicht, daß man die Einzelheiten der feineren Gefäßverzweigungen nicht so gut wahrnimmt wie bei der ersten Methode. Die Art der Bewegung des Gefäßbaums erklärt sich vollständig aus H. MÜLLER'S Theorie. Es sei in *Fig. 100*  $k$  der Knotenpunkt des Auges und  $v$  ein Netzhautgefäß. Wenn die Licht-




Fig. 100.

quelle in  $a$  sich befindet, fällt ihr Netzhautbild nach  $b$ , das von  $b$  ausgehende Licht wirft den Schatten des Gefäßes  $v$  nach  $c$ , und wenn wir  $ck$  ziehen und verlängern, ist diese Verlängerung  $kd$  die Richtung, in welcher der Schatten des Gefäßes  $v$  im Gesichtsfelde erscheint. Bewegen wir den Lichtpunkt von  $a$  nach  $\alpha$ , so rückt  $b$  nach  $\beta$ ,  $c$  nach  $\gamma$ ,  $d$  nach  $\delta$ ; es verschiebt sich also  $d$  in gleichem Sinne wie  $a$ . Wenn hingegen  $a$  sich senkrecht gegen die Ebene der Zeichnung bewegt, ist es umgekehrt. Wenn  $a$  vor der genannten Ebene steht, liegt  $b$  dahinter,  $c$  wieder davor,  $d$  dahinter. Wenn also  $a$  sich nach vorn (vor die Ebene der Zeichnung) bewegt, bewegt sich  $d$  nach hinten, und umgekehrt, ganz wie es den Beobachtungen entspricht.




Fig. 101.

160

Die Erscheinung der hellen Scheibe in der Mitte des Gesichtsfeldes mit dem halbmondförmigen Schatten erklärt H. MÜLLER nicht ohne Wahrscheinlichkeit für den Schatten der Netzhautgrube. Wenn in *Fig. 101* bei  $c$  die Netzhautgrube sich befindet, und in ihrer Tiefe die Stelle des directen Sehens, das Licht bei  $a$  steht, sein Netzhautbild bei  $b$ , so wird der Schatten des nach  $b$  hingewendeten erhabenen Randes der Netzhautgrube gerade auf den Visirpunkt fallen, und der ganze Schatten der Netzhautgrube auf der Netzhaut selbst vom Visirpunkte aus dem hellen Bilde  $b$ , und entsprechend im Gesichtsfelde dem Lichte  $a$  zugewendet sein, wie dies die Beobachtung lehrt. Wenn man das Licht  $a$  mehr der Gesichtslinie nähert, und infolge davon  $b$  näher nach  $c$  rückt, bemerke ich in meinem Auge einen hellen Streifen an der Außenseite des halbmondförmigen Schattens, der wohl von Licht herührt, welches von hinten, von der Netzhautseite her, auf die Oberfläche der Netzhautgrube gefallen und dort reflectirt ist, wie es in *Fig. 101* durch den punktierten Strahl  $\alpha\beta\gamma$  angedeutet ist. Bei Personen, deren Netzhautgrube weniger steil ansteigende Seiten hat, kann dagegen ein solcher Schatten ganz fehlen.



3) Die dritte Methode zur Beobachtung der Netzhautgefäße besteht darin, daß man durch eine enge Öffnung nach einem breiten lichten Felde, z. B. dem hellen Himmel blickt und die Öffnung vor der Pupille schnell hin und her bewegt. Die Netzhautgefäße erscheinen sehr fein gezeichnet, dunkel auf dem hellen Grunde, und bewegen sich im Gesichtsfelde gleichsinnig mit der Öffnung. In der Mitte, entsprechend dem Visirpunkte, sieht man die gefäßlose Stelle, die mir ein fein granulirtes Ansehen zu haben scheint, und in welcher sich ein runder Schatten bei den Bewegungen der Öffnung herumbewegt. Bei horizontalen Bewegungen der Öffnung sieht man nur die verticalen Gefäße, bei verticalen Bewegungen die horizontal verlaufenden. Dieselbe Gefäßfigur sieht man auch, wenn man in ein zusammengesetztes Mikroskop hineinblickt, ohne ein Object unterzulegen, so daß man nur den gleichmäßig hellen Kreis der Blendung sieht. Wenn man das Auge über dem Mikroskope etwas hin und her bewegt, erscheinen in der Blendung des Mikroskops die Gefäße der Netzhaut sehr fein und scharf gezeichnet, und zwar besonders deutlich immer die Gefäße, welche senkrecht gegen die Richtung der Bewegung verlaufen, während diejenigen verschwinden, welche der Richtung der Bewegung parallel sind.

Nach den beiden ersten Methoden fiel das Licht aus einer ungewöhnlichen Richtung her auf die Netzhaut, und es fiel deshalb auch der Schatten der Netzhautgefäße auf Theile der Netzhaut, welche bei dem gewöhnlichen Sehen von diesem Schatten nicht getroffen werden, und von denen die Beschattung daher als ein ungewöhnlicher Zustand leicht empfunden wird. Bei der beschriebenen dritten Methode dagegen fällt das Licht auf dem gewöhnlichen Wege, nämlich durch die Pupille, in das Auge. Ist die ganze Pupille frei und das Auge nach dem hellen Himmel gewendet, so gehen von jedem Punkte der Pupillarebene nach jeder Richtung in den Hintergrund des Auges hinein Lichtstrahlen aus, ganz so als wäre die Pupille selbst die leuchtende Fläche. Unter dem Einflusse dieser Beleuchtung müssen die Netzhautgefäße einen breiten verwaschenen Schatten auf die hinter ihnen liegenden Netzhautpartien werfen, wobei der Kernschatten etwa nur vier bis fünf mal so lang sein wird, als der Durchmesser des Gefäßes. Da nach E. H. WEBER der dickste Ast der *Vena centralis* 0,017 Par. Linien (0,038 mm) im Durchmesser hat, und die Netzhaut nach KÖLLIKER im Hintergrunde des Auges 0,22 mm dick ist, läßt sich annehmen, daß der Kernschatten <sup>161</sup> der Gefäße nicht bis zur hinteren Fläche der Netzhaut reichen wird. Wenn wir aber eine enge Öffnung vor die Pupille bringen, wird der Schatten der Gefäße nothwendig schmaler, schärfer begrenzt, der Kernschatten länger, so daß Theile der Netzhaut, die sonst im Halbschatten lagen, theils in den Kernschatten kommen, theils mit den unbeschatteten Theilen gleich stark erleuchtet werden.

Daß wir beim gewöhnlichen Sehen die Gefäßschatten nicht wahrnehmen, erklärt sich wohl daraus, daß die Empfindlichkeit der beschatteten Stellen der Netzhaut größer, ihre Reizbarkeit weniger erschöpft ist als die der

übrigen Theile der Netzhaut. Sobald wir aber den Ort des Schattens oder seine Ausbreitung verändern, wird derselbe wahrnehmbar, weil die schwache Beleuchtung nun auf ermüdete, weniger reizbare Netzhautelemente fällt. Der reizbarere, früher beschattete Theil der Netzhautelemente dagegen wird nun zum Theil von vollem Lichte getroffen, und empfindet dies stärker. Daher erklärt sich, daß zuweilen, namentlich im Anfange der Versuche, der Gefäßbaum für Augenblicke auch wohl hell auf dunklerem Grunde erscheint und überhaupt bei manchen Personen der helle Theil der Erscheinung die Aufmerksamkeit mehr auf sich lenken kann, als der dunkle. Sobald der Schatten der Gefäße indessen bei unseren Versuchen seine neue Stelle dauernd behauptet, werden die neu beschatteten Stellen allmählig reizbarer, die früher beschatteten scheinen dagegen ihre erhöhte Reizbarkeit schnell zu verlieren, und die Erscheinung verschwindet wieder. Um sie dauernd zu sehen, ist es also nöthig, den Ort des Schattens stets wechseln zu lassen, und bei geradlinigen Bewegungen der Lichtquelle bleiben nur die Gefäße sichtbar, deren Schatten den Platz wechselt. Auf diese Veränderungen der Reizbarkeit kommen wir in § 24 unten noch näher zurück.

837 VIERORDT<sup>1</sup> hat auf hellen Flächen bei intermittirender Beleuchtung, wenn er bewegte vor den Augen die Hand mit gespreizten Fingern hin und her — eine strömende Bewegung gesehen, die er für die Blutbewegung in den Netzhautgefäßen erklärte; MEISSNER und ich selbst haben diese Bewegung nur in Form uferloser Strömchen gesehen, denen ich VIERORDT's Deutung nicht zu geben wagte. Doch folgt daraus nicht, daß VIERORDT die Erscheinung nicht deutlicher und bestimmter gesehen haben kann, und daß es nicht wirklich bei ihm ein Ausdruck des Blutlaufs war.

Außerdem hatten PURKINJE<sup>2</sup> und J. MÜLLER<sup>3</sup>, wenn sie nach einer ausgedehnten hellen Fläche blickten, helle Punkte im Gesichtsfelde erscheinen und eine Strecke fortlaufen sehen, so daß dieselben nach unregelmäßigen Pausen immer wieder an denselben Stellen auftauchen und immer wieder denselben Weg mit derselben ziemlich großen Geschwindigkeit zurücklegen. Diese Erscheinung sieht man nun nach einer Bemerkung von O. N. B. noch sehr viel besser, wenn man durch ein dunkles blaues Glas nach dem Himmel sieht. Ich fixire dabei einen Punkt der Fensterscheibe, um die beweglichen Körperchen immer wieder an derselben Stelle zu sehen und die Lage ihrer Bahnen mit der auf dieselbe Fensterscheibe projecirten Gefäßfigur zu vergleichen.

Nachdem ich diese Beobachtungen wiederholt habe, glaube ich nun ebenfalls nicht mehr zweifeln zu können, daß sie von der Blutbewegung herrühren, und zwar so, daß ein einzelnes größeres Körperchen sich in einem der engeren Gefäße klemmt. Dann pflegt vor einem solchen Gefäße relativ leer zu werden, hinter ihm dagegen stauen sich die Blut-

<sup>1</sup> K. VIERORDT in *Archiv für physiol. Heilkunde*. 1856. Heft II.

<sup>2</sup> J. E. PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche*. I. 127.

<sup>3</sup> J. MÜLLER, *Physiologie*. II. 390.



162 Punkte der Pupille, deren entoptische Bilder sich mit denen der Objecte  $d$  und  $i$  jetzt decken. Während also der Visirpunkt in dem entoptischen Bilde von  $g$  nach  $f$  gerückt ist, hat das Bild des hinter der Pupille gelegenen Objectes  $d$  eine Bewegung in gleichem Sinne von  $h$  nach  $m$ , das Bild des vor der Pupille gelegenen Objectes in entgegengesetztem Sinne von  $h$  nach  $e$  ausgeführt. Nach der Bezeichnungsweise von LISTING hat also  $d$  eine positive Parallaxe, und  $i$  eine negative. Es ist bei geringer Übung immer leicht zu entscheiden, ob die entoptisch gesehenen Objecte sich im Verhältniß zu der kreisförmigen Begrenzung des Gesichtsfeldes in gleichem oder entgegengesetztem Sinne wie der Visirpunkt verschieben, und danach entscheidet man leicht, ob sie vor oder hinter der Pupille liegen.

Um die Entfernung der im Glaskörper schwebenden Objecte genauer messen zu können, hat D. BREWSTER zuerst eine Methode eingeschlagen, bei welcher er zwei Bündel homocentrischer Strahlen in das Auge dringen liefs, und dadurch zwei Schatten eines jeden Objectes erzeugte. Aus der Entfernung der Schatten von einander kann dann die Entfernung des Objectes von der Netzhaut gefunden werden. BREWSTER sah zu dem Ende durch eine vor dem Auge stehende Linse nach zwei neben einander gestellten Flammen hin. DONDERS hat diese Methode geändert, indem er vor das Auge ein Metallplättchen mit zwei kleinen,  $1\frac{1}{2}$  mm von einander entfernten Öffnungen bringt. Durch diese sieht er nach einem weissen, stark erleuchteten Papiere hin, auf welchem die entoptischen Erscheinungen projicirt erscheinen. Er mißt nun den Abstand der Mittelpunkte der beiden sich gegenseitig bedeckenden kreisförmigen Bilder der Pupille, welcher einfach dadurch gefunden wird, daß man den Durchmesser des unbedeckten Theiles dieser Kreise mißt. Ferner mißt er den Abstand der Doppelbilder des betreffenden entoptischen Objectes. Der letztere verhält sich zum Abstände der beiden Kreise wie der Abstand des Objectes von der Netzhaut, welcher gefunden werden soll, zum scheinbaren Abstände der Pupille von der Netzhaut (18 mm). So kann der Abstand der Objecte von der Netzhaut leicht berechnet werden.

DONCAN hat die Methode von DONDERS insofern geändert, daß er seine Messungen nach dem Principe der mikroskopischen Messung *à double vue* ausführt. Das eine Auge blickte durch eine oder zwei feine Öffnungen nach einem kleinen Hohlspiegel, der das Licht des Himmels reflectirte, das andere auf eine in der Entfernung des deutlichen Sehens gelegene Tafel, und der Beobachter mißt mit dem Zirkel auf dieser Tafel die Gröfse der entoptischen Objecte und den Abstand ihrer Doppelbilder, sowie den Abstand entsprechender Punkte am Rande der Iris. Um aus der scheinbaren Gröfse der entoptischen Objecte ihre wahre Gröfse zu berechnen, muß man noch den Abstand der Öffnung, durch welche man sieht, von der Hornhaut kennen. Am besten ist es, diese Öffnung in den vorderen Brennpunkt des Auges (12 mm vor der Hornhaut) anzubringen. dann sind die Schatten der entoptischen Objecte so groß wie die Objecte selbst. Die mit dem Zirkel gemessene scheinbare Gröfse dieser Objecte im Gesichtsfelde verhält sich aber zur wahren Gröfse des Schattens auf der Netzhaut wie die Entfernung des messenden Zirkels vom Auge zur kleineren Hauptbrennweite des Auges (15 mm).

Um das Plättchen mit der Öffnung wenigstens nahehin in die vordere Brennebene des Auges zu bringen, befestigt man es am Ende eines kurzen Röhrchens von passender Länge.

Die scheinbare Gröfse der Bewegung des Gefäfsbaums im Gesichtsfelde bei der ersten eben beschriebenen Methode, ihn sichtbar zu machen, hat H. MÜLLER gemessen, während gleichzeitig die Gröfse der Verschiebung des leuchtenden Brennpunktes auf der Sclerotica mit dem Zirkel gemessen wurde. Es kann daraus, wenigstens annähernd, durch Construction oder Rechnung die Entfernung der Schatten werfenden Gefäfsse von der den Schatten wahrnehmenden Schicht der Netzhaut bestimmt werden. Man zeichne, wie in Fig. 103, den Querschnitt des Auges in natürlicher Gröfse. Der Brennpunkt auf der Sclerotica sei zwischen den Punkten  $a$  und  $b$  hin und her bewegt. Es sei  $a$  der Schatten eines in der Nähe des gelben Flecks gelegenen Gefäfses  $v$ , dessen scheinbare 163 Bewegung man gemessen hat, für die Lage des Lichtpunktes in  $a$ , so muß dies Gefäfs

in der geraden Linie  $a\alpha$  liegen. Es sei  $\alpha\beta$  die aus der scheinbaren Verschiebung des Gefäßes im Gesichtsfelde berechnete wahre Verschiebung auf der Netzhaut, also  $\beta$  der Ort des Gefäßschattens für den Fall, wo sich der Brennpunkt in  $b$  befindet. Man ziehe die gerade Linie  $b\beta$ . Der Punkt  $r$ , wo  $b\beta$  und  $a\alpha$  sich schneiden, muß dann der Ort des Gefäßes sein, dessen Entfernung von der Netzhaut durch Messung oder Rechnung gefunden werden kann. H. MÜLLER erhielt auf diese Weise in mehreren Versuchen für die Entfernung der Gefäße von der empfindenden Schicht 0,17; 0,19 bis 0,21; 0,22; 0,25 bis 0,29; 0,29 bis 0,32 mm. Bei drei anderen Beobachtern 0,19; 0,26; 0,36 mm. Da nach den anatomischen Messungen desselben Beobachters die Entfernung der Gefäße von den Stäbchen und Zapfen in der Gegend des gelben Flecks zwischen 0,2 und 0,3 mm beträgt, so wird es daraus wahrscheinlich, daß die Zapfen die den Schatten empfindenden Gebilde seien, worauf auch andere Verhältnisse hindeuten, welche ich in § 18 auseinandersetzen werde.




Fig. 103.

DECHALES<sup>1</sup>, ein Jesuit des 17. Jahrhunderts, stellte zuerst eine Ansicht über die Entstehung der fliegenden Mücken auf, und zwar die richtige, daß es Schatten seien von Körperchen, die in der Nähe der Netzhaut schwimmen. PITCAIRN<sup>2</sup> verlegte sie dagegen auf die Netzhaut selbst, und MORGAGNI<sup>3</sup> in alle Augenmedien, obgleich die weiter nach vorn liegenden ohne die Anwendung schmaler Lichtquellen nicht wohl gesehen sein können. Ebenso irrt auch DE LA HIRE<sup>4</sup>, wenn er die festen Mücken ausschließlich auf die Netzhaut verlegt, die beweglichen in die wässrige Feuchtigkeit. LE CAT<sup>5</sup> beschreibt einen Versuch, der dem Principe nach die Methode der entoptischen Untersuchung vollständig enthält, indem er das umgekehrte Schattenbild einer dicht vor das Auge gehaltenen Nadel im Zerstreuungskreise eines kleinen Lichtpunktes wahrgenommen hat. Auch AEPINUS<sup>6</sup> hat etwa zu derselben Zeit den Schatten der Iris, die Erweiterung und Verengerung der Pupille entoptisch wahrgenommen und richtig verstanden. Aber erst seit 1760<sup>7</sup> hat man angefangen, kleine Öffnungen und starke Linsen anzuwenden, um die fliegenden Mücken deutlicher zu sehen, welches Verfahren übrigens auch dem DECHALES nicht ganz unbekannt gewesen war.

Eine strengere Theorie der Erscheinungen, und die Methoden den Ort der Körperchen im Auge zu beurtheilen, wurden erst später durch LISTING<sup>8</sup> und BREWSTER<sup>9</sup> festgestellt, denen später DONDERS<sup>10</sup> folgte. Des Letzteren Schüler DONCAN<sup>11</sup> wies dann die Übereinstimmung der entoptisch gesehenen Gegenstände mit mikroskopischen Structuren des Glaskörpers nach; dasselbe versuchte JAMES JAGO<sup>12</sup>. Beschreibungen der verschiedenen Formen entoptischer Objecte gaben außer den eben Genannten auch STEIFENSAND<sup>13</sup>, MACKENZIE<sup>14</sup>, APPIA<sup>15</sup>.

<sup>1</sup> DECHALES, *Cursus seu mundus mathematicus*. Lugduni 1690. T. III. p. 402.

<sup>2</sup> PITCAIRN, *Pitcairni opera*. Lugd. Bat. p. 203. 206.

<sup>3</sup> MORGAGNI, *Adversaria anatomica* VI. Anm. LXXV. p. 94. Lugd. Bat. 1722.

<sup>4</sup> Ph. DE LA HIRE, *Accidens de la vue*. p. 358.

<sup>5</sup> LE CAT, *Traité des sens*. Rouen 1740. p. 298.

<sup>6</sup> AEPINUS, *Nori Comment.* Petropol. Vol. VII. p. 303.

<sup>7</sup> *Histoire de l'Acad. d. sciences*. 1760. p. 57. Paris 1766.

<sup>8</sup> J. LISTING, *Beitrag zur physiologischen Optik*. Göttingen 1845.

<sup>9</sup> D. BREWSTER, *Transactions of the Roy. Soc. of Edinb.* XV. 377.

<sup>10</sup> F. C. DONDERS, *Nederl. Lancet*. 1846—47. 2te Serie. D. II. bl. 345. 432. 537.

<sup>11</sup> A. DONCAN, *De corporis vitrei structura*. Diss. Utrecht 1854; *Onderzoekingen ged. in het Physiol. Laborat. d. Utrechtsche Hoogeschool*. Jaar VI. p. 171.

<sup>12</sup> J. JAGO, *Proceed. Roy. Soc.* 18. Jan. 1855.

<sup>13</sup> K. A. STEIFENSAND, *Poggendorff's Ann.* LV. p. 134; v. Ammon's *Monatsschrift f. Med.* I. 203.

<sup>14</sup> MACKENZIE, *Edinburgh Medical and Surgical Journal*. July 1845.

<sup>15</sup> APPIA, *De l'oeil vu par lui même*. Genève 1853.

Die subjective Erscheinung der Centralgefäße hat PURKINJE<sup>1</sup> zuerst entdeckt und sie nach den drei oben beschriebenen Methoden sichtbar gemacht. Auch bei Erregung des Auges durch Druck und Blutandrang hat er sie wahrgenommen. GUDDEN<sup>2</sup> machte auf die für die Theorie der Erscheinung wichtige Bedeutung der Bewegung des Schattens aufmerksam. Die Theorie der Erscheinung bei der Anwendung homocentrischen Lichts von der Pupille aus oder eines Brennpunktes auf der Sclerotica schien keine Schwierigkeit zu haben. Wohl aber machte MEISSNER<sup>3</sup> auf die abweichenden Verhältnisse aufmerksam, 164 welche bei der Bewegung eines Lichts unterhalb des Auges eintreten, und leitete daraus Bedenken gegen die bisherige Erklärungsweise überhaupt ab. Diese wurden von H. MÜLLER<sup>4</sup> beseitigt, welcher die oben hingestellte Theorie dieser Art des Versuchs fand.

Schon PURKINJE erwähnt, daß in der Mitte des Gesichtsfeldes ein heller Fleck erschiene, der einer Grube ähnlich sehe; BURROW<sup>5</sup> beschrieb die entoptische Erscheinung des gelben Flecks genauer, deutete sie aber als die Erscheinung einer Hervorragung, nicht eines Grübchens, vermöge der unrichtigen älteren Theorie des Versuchs, die durch H. MÜLLER verbessert wurde.

### § 16. Das Augenleuchten und der Augenspiegel.

Von dem Lichte, welches auf die Netzhaut gefallen ist, wird ein Theil absorbirt, namentlich durch das schwarze Pigment der Aderhaut, ein anderer Theil wird diffus reflectirt, und kehrt durch die Pupille nach außen zurück.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen nehmen wir nichts von dem Lichte wahr, welches aus der Pupille eines anderen Auges zurückkehrt, diese erscheint uns vielmehr ganz dunkelschwarz. Der Grund hiervon ist hauptsächlich in den eigenthümlichen Brechungsverhältnissen des Auges zu suchen, zum Theil auch darin, daß von den meisten Stellen des Augenhintergrundes wegen des schwarzen Pigments verhältnismäßig wenig Licht zurückgeworfen wird.

Bei allen Systemen brechender Flächen, welche ein genaues Bild eines leuchtenden Punktes entwerfen, können die Lichtstrahlen genau auf denselben Wegen, auf denen sie von dem leuchtenden Punkte zu dessen Bilde gegangen sind, auch rückwärts von dem Bilde zu dem leuchtenden Punkte zurückgehen. Oder wenn man den leuchtenden Punkt an den Ort des Bildes bringt, wird nun das Bild an dem früheren Orte des leuchtenden Punktes entworfen.

Daraus folgt: Wenn das menschliche Auge genau für einen leuchtenden Körper accommodirt ist, und von diesem ein genaues Bild auf seiner Netzhaut entwirft, und wir betrachten nun die erleuchtete Stelle der Netzhaut als ein zweites leuchtendes Object, so wird deren von den Augenmedien 165 entworfenen Bild genau mit dem ursprünglich leuchtenden Körper zusammenfallen, d. h. alles Licht, welches von der Netzhaut aus dem Auge zurückkehrt, wird außerhalb des Auges direct zu dem leuchtenden Körper zurückgehen, und nicht neben ihm vorbei. Das Auge des Beobachters würde

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, *Beiträge zur Kenntniss des Sehens*. 1819. S. 89. *Neue Beiträge*. 1825. S. 115. 117.

<sup>2</sup> GUDDEN, *J. Müller's Archiv für Anat. u. Physiol.* 1849. S. 522.

<sup>3</sup> MEISSNER, *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans*. 1854.

<sup>4</sup> H. MÜLLER, *Verhandl. der med.-physik. Ges. zu Würzburg*. IV. 100. V. Lief. 3.

<sup>5</sup> A. BURROW, *J. Müller's Arch.* 1854. S. 166.

sich, um etwas von diesem Lichte aufzufangen, zwischen den leuchtenden Körper und das beleuchtete Auge einschieben müssen, was ohne weitere Hilfsmittel natürlich nicht angeht, ohne dem beleuchteten Auge das Licht abzuschneiden.

Ebenso wenig kann der Beobachter Licht aus dem Auge eines Anderen zurückkehren sehen, wenn dies letztere für die Pupille des Beobachters genau accommodirt ist. Unter diesen Umständen wird nämlich ein genaues dunkles Bild der Pupille des Beobachters auf der Netzhaut des beobachteten Auges entworfen werden. Rückwärts werden die Augenmedien ein Bild dieser dunklen Stelle der Netzhaut gerade auf die Pupille des Beobachters werfen, und somit wird dieser gerade nur den Widerschein seiner eigenen schwarzen Pupille in der fremden sehen.

Daher kommt es, daß man unter gewöhnlichen Umständen auch die stärker Licht reflectirenden Theile im Hintergrunde eines fremden Auges nicht sieht, wie z. B. die weiße Eintrittsstelle des Sehnerven, die Gefäße. Auch bei Albinos, Personen, denen das Pigment der Chorioidea fehlt, erscheint die Pupille schwarz, sobald man durch einen dunklen, vor ihr Auge gehaltenen Schirm, der nur eine Öffnung von der Größe der Pupille zum Durchsehen hat, verhindert, daß Licht durch ihre Sclerotica in das Innere des Auges dringt.<sup>1</sup> Letzteres ist es, welches das gewöhnliche rothe Ansehen der albinotischen Pupille bewirkt. Ebenso erscheint das Objectglas einer *Camera obscura* von vorn gesehen schwarz, wenn der Beobachter sie aus der Entfernung solcher Gegenstände, für die sie eingestellt ist, betrachtet; selbst dann, wenn man als Schirm zum Auffangen des Bildes ein weißes Blatt Papier angebracht hat.

Ist dagegen das beleuchtete Auge weder für den leuchtenden Gegenstand, noch für die Pupille des Beobachters genau accommodirt, so ist es möglich, daß der Beobachter einiges von dem aus der Pupille zurückkehrenden Lichte wahrnimmt; die Pupille erscheint ihm dann leuchtend.

Es ist leicht einzusehen, daß der Beobachter von allen denjenigen Punkten der Netzhaut des beobachteten Auges Licht empfangen kann, auf welche das Zerstreuungsbild seiner eigenen Pupille fällt. Supponiren wir einen Augenblick statt der Pupille des Beobachters eine leuchtende Scheibe, deren Zerstreuungsbild in dem beobachteten Auge genau mit dem Zerstreuungsbilde jener Pupille zusammentreffen würde, so gehen Lichtstrahlen von einem oder mehreren Punkten dieser leuchtenden Scheiben nach jedem Punkte ihres Zerstreuungsbildes hin, es können also auch rückwärts Lichtstrahlen von jedem Punkte der Netzhaut, der dem Zerstreuungskreise angehört, nach einem oder mehreren Punkten der leuchtenden Scheibe, d. h. an den Ort der Pupille des Beobachters gelangen. Der Beobachter wird also das beobachtete Auge leuchten sehen, so oft in dem beobachteten Auge das Zerstreuungsbild seiner eigenen Pupille theilweise zusammenfällt mit dem Zerstreuungsbilde eines leuchtenden Gegenstandes. 166

<sup>1</sup> F. C. DONDERS, *Onderzoekingen gedaan in het Physiologisch Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool*. Jaar VI. p. 133. — VAN TRIGT, *Nederlandsch Lancet*. 3te Ser. D. II. bl. 419.

Blickt daher der Beobachter dicht am Rande eines Lichtes vorbei, dessen Strahlen er durch einen dunklen Schirm von seinem eigenen Auge abhält, um nicht geblendet zu werden, nach dem Auge eines Anderen, und ist dieses Auge für eine nähere oder viel weitere Entfernung accommodirt,



Fig. 104.

so erscheint ihm die Pupille roth leuchtend. Diese Anordnung des Versuchs ist schematisch in Fig. 104 dargestellt. *B* ist das Auge des Beobachters, *S* der Schirm, welcher es vor den directen Lichtstrahlen schützt, *A* der

Grundriss einer Lampenflamme, *C* das beobachtete Auge, *BC* die Gesichtslinie des Beobachters, *Ca* die des beobachteten Auges, welche beliebig gerichtet sein kann. Der Versuch gelingt auch meist, ohne daß man die Accommodation des beobachteten Auges berücksichtigt, wenn der Beobachter weit entfernt ist, weil die meisten menschlichen Augen nicht absolut genaue Bilder geben, namentlich wenn der Beobachtete, wie in Fig. 104, seitwärts sieht. Großer Abstand des Lichtes ist vortheilhaft, weil das Gesicht des Beobachteten dann wenig beleuchtet ist, während das Netzhautbild gleich hell bleibt. Am hellsten ist das Leuchten, wenn das einfallende Licht auf die Eintrittsstelle des Sehnerven trifft, weil dessen weiße Substanz das Licht stark reflectirt und wegen ihrer durchscheinenden Beschaffenheit keine hinreichend bestimmte Grenzfläche darbietet, auf der sich das Bild scharf projeciren könnte.

Zu bemerken ist hierbei, daß bei hinreichend starker Beleuchtung auch Licht genug durch die Aderhaut zur Sclerotica dringt, und hier diffus reflectirt wieder zurückkehrt, um wahrgenommen zu werden. Dies Licht verhält sich wie das der Zerstreuungskreise. Daher kann bei starker Beleuchtung auch bei genauer Accommodation des beobachteten Auges für die Pupille des Beobachters ein schwacher Grad von Leuchten stattfinden, namentlich bei schwach pigmentirten Augen, der sich in der angegebenen Weise erklärt.




Fig. 105.

Noch besser kann das Augenleuchten beobachtet werden, wenn man nicht direct das Licht der Flamme in das Auge fallen läßt, sondern von einem Spiegel reflectirt, und der Beobachter durch diesen Spiegel hindurchsieht. *A* in Fig. 105 sei das Licht, *S* der Spiegel, welcher aus einer unbelegten Glasplatte bestehen kann. Diese wirft das auffallende Licht so zurück, als käme es von einem Spiegelbilde *a* der Flamme. *C* sei das beobachtete Auge, auf dessen Hintergrunde ein kleines Netzhautbildchen



des Lichts entworfen wird. Das von der Netzhaut zurückkehrende Licht geht nun, wenn es das Auge verlassen hat, zunächst in der Richtung des Spiegelbildes  $\alpha$  zurück, trifft wieder auf die spiegelnde Platte, wo ein Theil nach dem wirklichen Lichte hin zurückgeworfen wird, während ein anderer durch die Platte geht und seinen Weg nach dem Orte des Spiegelbildes hin fortsetzt. Hier kann es nun von dem Auge des Beobachters  $B$  aufgefaßt werden. Dieser sieht bei der beschriebenen Anordnung das beobachtete Auge leuchten.

Statt der unbelegten Glasplatte kann auch ein belegter Glasspiegel oder Metallspiegel gebraucht werden, mit einer engen Öffnung, durch welche der Beobachter sieht.

Wenn der Beobachter unter diesen Umständen nun auch den Hintergrund des beobachteten Auges erleuchtet sieht, so kann er doch in der Regel nichts im Hintergrunde dieses Auges erkennen, weil er sein Auge für das Bild, welches die Augenmedien vom Hintergrunde des Auges entwerfen, nicht accommodiren kann. Zu dem Ende müssen noch passende Glaslinsen hinzugenommen werden. Die Zusammenstellung eines Beleuchtungsapparates mit solchen Glaslinsen giebt ein Instrument, Augenspiegel genannt, mittels dessen man die Bilder auf der Netzhaut und die Theile der Netzhaut eines fremden Auges deutlich sehen und untersuchen kann.

BRÜCKE hat auf einen eigenthümlichen Nutzen aufmerksam gemacht, den die Schicht der stabförmigen Körperchen bei der Zurückwerfung des Lichts an der Netzhaut haben dürfte. Die Aufsglieder dieser Körperchen sind kleine Cylinder, 0,030 mm lang, 0,0018 mm dick, von einer stark lichtbrechenden Substanz gebildet, welche palissadenartig neben einander gestellt, aber durch die Fortsätze der Pigmentzellen von einander getrennt, die der Aderhaut zugekehrte letzte Schicht der Netzhaut bilden. Die Axe derer, welche im Hintergrunde des Auges die Netzhaut bedecken, ist gegen die Pupille hin gerichtet, und alles einfallende Licht tritt deshalb in diese Körperchen nahehin ihrer Axe parallel ein. Da nun Licht, welches innerhalb eines dichteren Mittels fortschreitend unter einem sehr großen Einfallswinkel auf die Grenze eines weniger lichtbrechenden Mediums trifft, total reflectirt wird, so können wir schliessen, daß das Licht, welches in ein stabförmiges Körperchen einmal eingetreten ist, dieses meist nicht wieder verläßt, sondern, wenn es irgendwo auf die cylindrische Begrenzungsfläche des Körperchens treffen sollte, hier größtentheils nach innen reflectirt wird. Wenn wir die Brechkraft der stabförmigen Körperchen beispielsweise gleich der des Öls (1,47), die ihrer Zwischensubstanz gleich der des Wassers setzen (1,33), so werden Strahlen, die unter einem Winkel kleiner als  $25^\circ$  gegen ihre Fläche fallen, total reflectirt, während die von der Pupille etwa nur unter einem Winkel von  $8^\circ$  auffallen. Ist das Licht endlich an dem äußeren Ende des Körperchens angekommen, und wird hier ein Theil von der Aderhaut diffus zurückgeworfen, so wird dieser wieder hauptsächlich durch dasselbe Körperchen zurückkehren müssen. Was von dem Lichte dann unter einem größeren Winkel gegen die Axe des Körperchens verläuft, wird allerdings theilweise das Körperchen verlassen können, und dann der Absorption durch die Fortsätze der Pigmentzellen verfallen. Was in den Körperchen bleibt, wird aber nur nach oft wiederholten schwächenden Reflexionen an

den Grenzen der nächsten Körperchen bis in den Glaskörper dringen können. Solches Licht dagegen, welches nahe parallel der Axe der Körperchen zurückgeht, wird nur eine oder wenige totale Reflexionen erleiden, daher wenig geschwächt sein, wenn es das Körperchen verläßt, dann aber auch die Richtung nach der Pupille haben und durch diese austreten. Diese Function der Körperchen scheint namentlich bei denjenigen Thieren, welche statt der Schicht schwarzer Pigmentzellen auf der Aderhaut eine stark reflectirende Fläche (Tapetum) haben, von 168 Wichtigkeit zu sein. Einmal wird dadurch bewirkt, daß das Licht die empfindenden Netzhautelemente, welche es beim Einfallen getroffen hatte, bei seiner Rückkehr noch einmal trifft und erregt. Zweitens kann es rückkehrend nur dieselben oder höchstens theilweise die nächsten Netzhautelemente treffen, und sich nur zu einem kleinen Theile im Auge diffus zerstreuen, was die Genauigkeit des Sehens erheblich beeinträchtigen würde.\* Daß solches diffus zerstreutes Licht bei hinreichend hellen Netzhautbildern im Gesichtsfelde merkbar werden kann, zeigt die im vorigen Paragraphen beschriebene Beobachtungsweise der Aderfigur mittels eines unter dem Auge hin und her bewegten Lichts.

Ich lasse nun hier eine Reihe allgemeiner Sätze zur Begründung der mathematischen Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel folgen, durch deren Aufstellung die Betrachtung der einzelnen Fälle später außerordentlich vereinfacht wird.

### Satz I.

Wenn zwei Lichtstrahlen in entgegengesetzter Richtung durch beliebig viele einfach brechende Mittel gehen, und in einem dieser Medien in eine gerade Linie zusammenfallen, so fallen sie in allen zusammen.

Es sei  $AB$  Fig. 106 der Theil der beiden Strahlen, von denen wir wissen, daß er beiden gemeinschaftlich angehöre. Der erste Strahl sei von  $E$  längs der Linie  $EB$  gekommen, in  $B$  gebrochen und nach  $A$  gegangen. Der zweite Strahl kommt von  $A$  längs der Linie  $AB$  nach  $B$ , wird hier gebrochen, und gehe nach  $E'$ . Zunächst ist zu beweisen, daß  $E, B$  mit  $E'B$  zusammenfällt.  $DBC$  sei das Einfallslot,  $m$  das Brechungsverhältniß des Mittels, in welchem  $E$  und  $E'$ , der Winkel  $EBD$  gleich  $\alpha$  und der Winkel  $E'BD = \alpha$ , liegen;  $n$  dagegen das Brechungsverhältniß des Mittels, in welchem  $A$  und der Winkel  $ABC = \beta$  liegt. Für den ersten Strahl muß nach dem Brechungsgesetz  $AB$  in der durch  $DB$  und  $EB$  gelegten Ebene liegen, und ferner sein

$$m \sin \alpha = n \sin \beta.$$

Ebenso muß für den zweiten Strahl  $E'B$  in der durch  $DB$  und  $AB$  gelegten Ebene liegen, also in derselben, in welcher auch  $EB$  liegt, und es muß sein

$$m \sin \alpha = n \sin \alpha.$$




Fig. 106.

Daraus folgt

$$\sin \alpha = \sin \alpha, \text{ oder} \\ \alpha = \alpha,$$

da beide Winkel nur im ersten Quadranten liegen können.

Daraus folgt, daß  $E, B$  mit  $EB$  zusammenfällt. Somit congruiren die beiden Strahlen auch in dem Mittel, in welchem  $E$  liegt, soweit dieses reicht.

Bei der nächsten brechenden Fläche läßt sich ihre Congruenz dann wieder für das dritte Medium folgern u. s. w.

Zusätze. 1) Auch sieht man leicht ein, daß bei Reflexionen an spiegelnden Flächen die Congruenz nicht gestört wird.

2) Für das Auge folgt, daß ein Strahl, der auf seinem Wege von der Netzhaut zur Linse mit einem anderen zusammenfällt, der von einem leuchtenden Punkte in das Auge und auf die Netzhaut fällt, auch außerhalb des Auges mit diesem congruirt.

3) Stellt man den Satz so allgemein hin, wie es hier geschehen ist, so muß man daran denken, daß bei gewissen Polarisationsrichtungen und Einfallswinkeln die Strahlen bei einer Brechung oder Reflexion ganz verlöschen könnten. Bei unseren Anwendungen auf die Beleuchtung des Auges treten solche Umstände nicht ein. Das Licht fällt auf die brechenden Flächen des Auges fast senkrecht ein, wobei seine etwa vorhandene Polarisation so gut wie keinen Einfluß auf die Stärke des gebrochenen und reflectirten Theils hat. Uebrigens können wir die Schwächung der Strahlen durch Reflexion und Absorption an und in den Augenmedien vernachlässigen. Nur wenn man schräg gestellte Glasplatten als Reflector benutzt, muß man an die Schwächung des Lichts durch Reflexion denken. 169

Für die Intensität des hin und zurück gehenden Lichtstrahls läßt sich übrigens ebenfalls eine ganz entsprechende Regel von sehr ausgehneter Gültigkeit aufstellen, die ausgesprochen zu haben hier genügen mag, da wir bei gegenwärtiger Anwendung das Princip in seiner allgemeineren Form nicht brauchen. Den Beweis kann sich übrigens Jeder, der die Gesetze der Optik kennt, leicht selbst führen. Man kann diese allgemeinere Regel folgendermaßen aussprechen.

Ein Lichtstrahl gelange von dem Punkte  $A$  nach beliebig vielen Brechungen, Reflexionen u. s. w. nach dem Punkte  $B$ . In  $A$  lege man durch seine Richtung zwei beliebige, auf einander senkrechte Ebenen  $a_1$  und  $a_2$ , nach welchen seine Schwingungen zerlegt gedacht werden. Zwei eben solche Ebenen  $b_1$  und  $b_2$  werden durch den Strahl in  $B$  gelegt. Alsdann läßt sich folgendes beweisen: Wenn die Quantität  $J$  nach der Ebene  $a_1$  polarisirten Lichts von  $A$  in der Richtung des besprochenen Strahls ausgeht, und davon die Quantität  $K$  nach der Ebene  $b_1$  polarisirten Lichts in  $B$  ankommt, so wird auf demselben Wege rückwärts, wenn die Quantität  $J$  nach  $b_1$  polarisirten Lichts von  $B$  ausgeht, dieselbe Quantität  $K$  nach  $a_1$  polarisirten Lichts in  $A$  ankommen.

Soviel ich sehe, kann hierbei das Licht auf seinem Wege der einfachen und doppelten Brechung, Reflexion, Absorption, gewöhnlichen Dispersion und Diffraction unterworfen sein, ohne daß das Gesetz seine Anwendbarkeit verliert, nur darf keine Änderung seiner Brechbarkeit stattfinden, und es darf nicht durch Körper gehen, in denen der Magnetismus nach FARADAY'S Entdeckung auf die Lage der Polarisationsebene einwirkt.

### Satz II.

Wenn die Pupille des beobachteten Auges leuchtend erscheinen soll, so muß sich auf seiner Netzhaut das Bild der Lichtquelle ganz oder theilweise mit dem Bilde der Pupille des Beobachters decken.

Wenn von irgend einer Stelle der Netzhaut des beobachteten Auges Licht in das Auge des Beobachters dringen soll, so muß diese Stelle erstens von der Lichtquelle erleuchtet sein, also dem Bilde der Lichtquelle angehören. Zweitens, wenn wir die Fiction machen, daß Licht von der Pupille des Beobachters ausgeht, so mußte nach dem vorigen Satze ebenso gut Licht von der Pupille des Beobachters zur betreffenden Stelle der Netzhaut des beobachteten Auges wie umgekehrt gehen können. Die Netzhautstelle muß also gleichzeitig dem Netzhautbilde der Pupille des Beobachters angehören, mag dieses Bild nun scharf oder ein Zerstreuungsbild sein.

Zusätze. 1) Dieser Satz gilt nicht nur für den Fall, wo die Strahlen auf geradem Wege von der Lichtquelle zum beobachteten Auge und von diesem zum Auge des Beobachters gehen, sondern auch wenn beliebig viele Linsen und Spiegel dazwischen geschoben sind. Dadurch erhält man ein bequemes Mittel, sich experimentell die Wirkung jedes Augenspiegels am eigenen Auge deutlich zu machen. Man stelle das zur Erleuchtung dienende Licht auf und bringe das Instrument vor sein Auge in dieselbe Lage, wie es sonst vor dem Auge des Beobachters steht; der Theil des Gesichtsfeldes, welcher alsdann hell erscheint, entspricht dem Theile der Netzhaut, welcher beleuchtet ist. Man kann erkennen, ob das helle Feld groß oder klein, ob es gleichmäßig erleuchtet ist, oder ob sich dunkle Stellen darin befinden, und wie dunkel diese sind. Alsdann nehme man die Flamme von der Stelle weg, wo sie zur Erleuchtung des Auges dient, und bringe sie hinter das Instrument, da wo sich sonst das Auge des Beobachters befindet, 170 so daß das Licht durch die Öffnung scheint, welche dem Beobachter zum Durchsehen dient. Was jetzt im Gesichtsfelde erleuchtet ist, ist der Kreis, den der Beobachter von der Netzhaut übersehen kann.

Ich empfehle diesen Weg, um bei den verschiedenen Combinationen ebener und gekrümmter Spiegel, convexer und concaver Linsen in den Augenspiegeln sich die Wirkungen klar zu machen, ohne daß man sich auf verwickelte geometrische Constructionen einzulassen braucht, die den Ungeübten leicht mehr verwirren als aufklären.

2) Was die Wirkung der in diesem Paragraphen beschriebenen Beleuchtungsweisen betrifft, so ordnet sich deren Wirkung leicht unter die hier aufgestellte Regel. Man erinnere sich daran, daß, wie die tägliche Erfahrung lehrt und eine einfache Construction des Ganges der Lichtstrahlen bestätigt, das Zerstreuungsbild eines fernen Gegenstandes nicht das scharfe Bild eines deutlich gesehenen näheren Gegenstandes bedecken kann, wohl aber das Zerstreuungsbild eines näheren Gegenstandes das scharfe Bild eines fernen. Bei dem Versuche mit dem durchbohrten Spiegel bedeckt das Zerstreuungsbild der Öffnung, durch welche der Beobachter blickt und welche sich möglichst nahe vor dem beobachtenden Auge befinden muß, das entferntere, vielleicht deutlich gesehene Bild der Lichtflamme. Wenn man keinen Spiegel anwendet, sondern der Beobachter dicht an der Flamme vorbei nach dem beobachteten Auge sieht, erscheinen diesem Auge die Flamme und das Auge des Beobachters nahe neben einander, und sobald das beobachtete Auge nicht scharf für sie accommodirt ist, fließen ihre Zerstreuungskreise in einander. Bei der Beleuchtung mit einer unbelegten Glasplatte können beide Bilder scharf sein, sowohl das des Lichts, wie das der Pupille des Beobachters. Ersteres wird von der Platte gespiegelt, letzteres durch die Platte gesehen, so daß beide auf einander fallen. Der Beobachtete kann deshalb selbst am leichtesten die Glasplatte so stellen, daß dem Beobachter sein Auge leuchtend erscheint. Er muß nur darauf achten, daß ihm das Auge des Beobachters von dem Spiegelbilde der Flamme gedeckt erscheine.

Ein solches Reprocitätsgesetz, wie wir es eben dafür aufgestellt haben, daß überhaupt Licht von einem leuchtenden zu einem zu beleuchtenden Punkte hin und her gehe; läßt sich auch für die Helligkeit des hin und zurück gelangenden Lichts aufstellen. Wir erinnern in dieser Beziehung zunächst an folgendes

## Allgemeines Gesetz der Beleuchtung.

Wenn sich in einem durchsichtigen Medium zwei verschwindend kleine Flächenelemente von der Größe  $a$  und  $b$  in der gegenseitigen Entfernung  $r$  befinden, ihre Normalen mit der sie verbindenden geraden Linie beziehlich die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  bilden, und  $a$  mit der Helligkeit  $H$  Licht aussendet, so ist die Lichtmenge  $L$ , welche von  $a$  auf  $b$  fällt,

$$L = \frac{H \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta}{r^2} \dots \dots \dots 1).$$

Ebenso groß ist auch die Lichtmenge, welche von  $b$  auf  $a$  fallen würde, wenn  $b$  mit der Helligkeit  $H$  Licht aussendete.

## Satz III.

In einem centrirten Systeme von brechenden Kugelflächen sei  $n_1$  das Brechungsverhältniß des ersten,  $n_2$  das des letzten brechenden Mittels. In dem ersten befinde sich senkrecht gegen die Axe des Systems gerichtet und der Axe nahe ein Flächenelement  $\alpha$ , in dem letzten ein eben solches  $\beta$ . Wenn  $\alpha$  die Helligkeit  $n_1^2 \cdot H$  hat, und  $\beta$  die Helligkeit  $n_2^2 \cdot H$ , so fällt ebenso viel Licht von  $\alpha$  auf  $\beta$ , wie von  $\beta$  auf  $\alpha$ .

Um den Beweis nicht complicirter zu machen, als unsere beabsichtigten Anwendungen verlangen, vernachlässigen wir dabei die Schwächungen, welche die Strahlen an den brechenden Flächen durch Reflexion erleiden, und nehmen an, daß die Einfallswinkel der Strahlen an den brechenden Flächen immer klein genug sind, um ihre Cosinus gleich 1 setzen zu können, obgleich der Satz sich auch in 171 allgemeinerer Form beweisen läßt.

1) Wenn  $\beta$  nicht am Orte des Bildes von  $\alpha$  liegt.

Es sei  $AC$  die optische Axe des brechenden Systems,  $F$  sein erster,  $G$  sein zweiter Hauptpunkt,  $\alpha$  das erste Flächenelement, welches wir, da es verschwindend klein sein soll, nur durch einen Punkt in der Zeichnung dargestellt haben,  $\gamma$  sein Bild,  $f_1 f_2$  der Durchschnitt des einfallenden Strahlenbündels in der ersten Hauptebe,  $g_1 g_2$  derselbe in der zweiten. Die Grundfläche des Strahlenbündels in der ersten Hauptebe ist congruent derselben in der zweiten; ihre gemeinsame Größe sei  $\Phi$ . Das zweite Flächenelement  $\beta$  liege in der Ebene, welche in  $B$  senkrecht gegen die optische Axe steht, und  $b_1 b_2$  sei der Durchschnitt des Strahlenbündels in dieser Ebene. Die Fußpunkte der von  $\alpha$  und  $\gamma$  auf die optische Axe gefällten Lothe seien  $A$  und  $C$ .




Fig. 107.

Die Lichtmenge, welche von  $\alpha$  auf die Grundfläche des Strahlenkegels  $f_1 f_2$  fällt, ist nach Gleichung 1) gleich

$$\frac{n_1^2 \cdot H \cdot \alpha \cdot \Phi}{A F^2},$$

wenn  $n_1^2 \cdot H$  die Helligkeit von  $\alpha$  ist. Dieselbe Lichtmenge fällt auch auf die-  
teren Querschnitte des Strahlenkegels in  $g_1 g_2$  und  $b_1 b_2$ . Die Lichtmenge  
welche in der letzteren Ebene auf das Flächenelement  $\beta$  fällt, verhält sich zu  
ganzen Lichtmenge, welche die Fläche  $b_1 b_2$  trifft, wie die Oberfläche von  
dem Querschnitt des Strahlenkegels in  $b_1 b_2$ , den wir mit  $\Xi$  bezeichnen w  
Es ist also die ganze Lichtmenge  $X$ , welche von  $\alpha$  auf  $\beta$  fällt, gleich

$$X = \frac{\Phi}{\Xi} \cdot \frac{n_1^2 \cdot H \cdot \alpha \cdot \beta}{AF^2} \dots \dots \dots$$

Nun ist aber ferner

$$\frac{\Phi}{\Xi} = \frac{(g_1 g_2)^2}{(b_1 b_2)^2} = \frac{CG^2}{BC^2}.$$

Dieser Werth in die Gleichung 2) gesetzt, giebt

$$X = n_1^2 \cdot H \cdot \alpha \cdot \beta \frac{CG^2}{BC^2 \cdot AF^2}.$$

Da nun nach § 9 Gleichung 8a)

$$\frac{GC}{AF} = \frac{F_2}{AF - F_1},$$

wo  $F_1$  und  $F_2$  die beiden Brennweiten des Systems sind, so ist

$$X = H \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \frac{n_1^2 \cdot F_2^2}{[AF \cdot F_2 + BG \cdot F_1 - AF \cdot BG]^2} \dots$$

Ebenso bekommt man nun für die Lichtmenge  $Y$ , welche von  $\beta$ , we  
mit der Helligkeit  $n_2^2 \cdot H$  leuchtet, auf  $\alpha$  fällt, den Ausdruck

$$Y = H \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \frac{n_2^2 \cdot F_1^2}{[AF \cdot F_2 + BG \cdot F_1 - AF \cdot BG]^2} \dots$$

172 Da auf beiden Seiten Alles symmetrisch ist, braucht man, um dies zu erl  
in dem Ausdrucke für  $X$  nur zu vertauschen

$$\begin{array}{l} AF \text{ mit } BG \\ F_1 \text{ mit } F_2 \\ \alpha \text{ mit } \beta \\ n_1^2 \cdot H \text{ mit } n_2^2 \cdot H \end{array}$$

Da nun nach § 9 Gleichung 9c)

$$n_1 \cdot F_2 = n_2 \cdot F_1$$

so folgt aus 2a) und 2b)

$$X = Y,$$

was zu beweisen war.

2) Wenn  $\beta$  an den Ort des Bildes von  $\alpha$  fällt.

Wir nehmen zuerst an, daß  $\beta$  in Gröfse und Lage dem Bilde von  $\alpha$   
entspreche, dann entspricht auch  $\alpha$  genau dem Bilde von  $\beta$ . Alles Licht  
was von  $\alpha$  aus durch die brechenden Flächen dringt, fällt auf  $\beta$ , umgekehrt,  
was von  $\beta$  durch die brechenden Flächen dringt, fällt auf  $\alpha$ .

Wir behalten die Bezeichnungen der Figur 107 bei, nur daß wir u  
Element  $\beta$  jetzt in  $\gamma$  liegend denken.

Es ist dies von  $\alpha$  bei der Helligkeit  $n_1^2 \cdot H$  auf die brechenden Flächen und also auch auf  $\beta$  fallende Lichtmenge  $X$  wiederum

$$X = n_1^2 \cdot H \cdot \frac{\alpha \cdot \Phi}{A F^2} \dots \dots \dots 3a),$$

und die von  $\beta$  bei der Helligkeit  $n_2^2 \cdot H$  auf die brechenden Flächen und also auch auf  $\alpha$  fallende Menge  $Y$

$$Y = n_2^2 \cdot H \cdot \frac{\beta \cdot \Phi}{G C^2} \dots \dots \dots 3b),$$

Da nun  $\beta$  das Bild von  $\alpha$  sein soll, so ist nach § 9 Gleichung 8b), indem man berücksichtigt, daß  $\alpha$  und  $\beta$  ähnliche Flächen, also dem Quadrate ihrer entsprechenden Lineardimensionen proportional sind,

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{F_2^2}{(GC - F_2)^2},$$

und da ferner nach § 9 Gleichung 8a)

$$GC - F_2 = \frac{GC \cdot F_1}{AF},$$

so folgt

$$\frac{\alpha \cdot F_1^2}{A F^2} = \frac{\beta \cdot F_2^2}{G C^2},$$

und da  $F_1 : F_2 = n_1 : n_2$ , so folgt

$$\frac{\alpha \cdot n_1^2}{A F^2} = \frac{\beta \cdot n_2^2}{G C^2} \dots \dots \dots 3c).$$

Aus 3a), 3b) und 3c) zusammen folgt endlich

$$X = Y,$$

was zu beweisen war.

Sollte eines der beiden Elemente, z. B.  $\alpha$ , größer sein als das Bild von  $\beta$ , so würden die Theile von  $\alpha$ , welche nicht zum Bilde von  $\beta$  gehören, weder Licht auf  $\beta$  werfen, noch von  $\beta$  empfangen können, es würde dadurch also weder  $X$  noch  $Y$  geändert werden und unser Satz richtig bleiben.

**Zusätze.** 1) Die ganze Beweisführung läßt sich ebenso gut auf centrirt Systeme 173 brechender und spiegelnder Kugelflächen anwenden.

2) Die leuchtende und beleuchtete Fläche brauchen auch nicht verschwindend klein zu sein, wenn sie nur klein genug sind, daß die Cosinus der Einfallswinkel der Strahlen an den brechenden Flächen sich nicht merklich von 1 unterscheiden. Denn da für jedes Paar verschwindend kleiner Flächenelemente der beiden Flächen der Satz gilt, so gilt er auch für die ganzen Flächen.

Wenn wir den eben bewiesenen Satz auf die Verhältnisse des Augenleuchtens anwenden und das eine Flächenelement in die Netzhaut des beobachteten Auges verlegen, statt des anderen die Pupille des Beobachters setzen, übrigens den Unterschied der Brechung zwischen wässriger und gläserner Feuchtigkeit vernachlässigen und zwischen den beiden Augen ein beliebiges System centrirt brechender oder spiegelnder kugelliger Flächen angebracht denken, so können wir den Satz folgendermaßen aussprechen:

**Satz IIIa.**

Die Menge Licht, welche von einem Flächenelemente der Netzhaut des beobachteten Auges in das Auge des Beobachters fällt, ist gleich der Helligkeit, mit der das Netzhautelement von der Lichtquelle erleuchtet wird, multiplicirt mit der Menge Licht, welche von der Pupille des Beobachters, wenn sie die Helligkeit  $= 1$  hätte, auf das Netzhautelement fallen würde.

$H$  sei die Helligkeit, mit der das Netzhautelement von der Lichtquelle erleuchtet wird, und  $k$  die Lichtmenge, welche von der Pupille des Beobachters, wenn diese mit der Helligkeit 1 leuchtet, auf das Netzhautelement fällt, so würde nach dem eben bewiesenen Satze  $k$  auch gleich der Lichtmenge sein, welche von dem Netzhautelemente, wenn dieses die Helligkeit 1 hätte, in die Pupille des Beobachters gelangte. Da dieses nun aber die Helligkeit  $H$  hat, so ist die Lichtmenge, welche von diesem Elemente wirklich in die Pupille des Beobachters gelangt,  $H \cdot k$ , wie es unser Satz ausspricht.

Es ist dieser Satz gleichsam die weitere Ausführung des Satzes II, indem hier die quantitativen Bestimmungen gegeben werden, welche dort fehlten. Zunächst ist er nur erwiesen für Augenspiegel, an deren brechenden und spiegelnden Flächen die Lichtstrahlen nahe senkrecht einfallen und keinen erheblichen Verlust erleiden. Es ist aber leicht einzusehen, daß er auch für die Beleuchtung des Auges mit schiefgestellten spiegelnden Glasplatten gilt, da unpolarisirtes Licht, vom beobachtenden zum beobachteten Auge durch eine solche Platte gehend, ebenso stark geschwächt wird, als wenn es den umgekehrten Weg verfolgte.

**Satz IV.**

Wenn ein Beobachter durch ein centrirtes System brechender und spiegelnder Kugelflächen ein scharfes Bild eines leuchtenden Gegenstandes erblickt und wir den Verlust von Licht an den brechenden und spiegelnden Flächen vernachlässigen können, so erscheint jede Stelle des Bildes dem Beobachter ebenso hell, wie ihm die entsprechende Stelle des Gegenstandes ohne optische Instrumente gesehen erscheinen würde, so oft die ganze Pupille des Beobachters von den Strahlen getroffen wird, die von einem einzelnen Punkte jener Stelle ausgehen. Ist diese letztere Bedingung nicht erfüllt, so verhält sich die Helligkeit des optischen Bildes zur Helligkeit des frei gesehenen Gegenstandes, wie der von Strahlen jenes leuchtenden Punktes getroffene Flächenraum der Pupille des Beobachters zur ganzen Pupille.

Wenn das Auge direct oder durch ein centrirtes optisches System ein deutliches Bild eines Gegenstandes sieht, so können wir das Auge mit dem vorgesetzten  
174 optischen Systeme zusammen wiederum als ein optisches System betrachten, welches ein Bild des Gegenstandes auf der Netzhaut entwirft. Es sei  $a$  ein Flächenelement des Gegenstandes,  $b$  sein Bild auf der Netzhaut. So viel Licht von  $a$  nach  $b$  geht, würde auch nach Satz III dieses Paragraphen von  $b$  nach  $a$  gehen, wenn dem Netzhautelemente  $b$  die Helligkeit  $\frac{(n_2)^2}{(n_1)^2} \cdot H$  ertheilt würde. In diesem Ausdrucke



ist  $H$  die Helligkeit des Elements  $a$ ,  $n_1$  das Brechungsverhältniß des Mediums, in dem sich  $a$  befindet,  $n_2$  das des Glaskörpers. Es läßt sich aber leicht berechnen, wie viel Licht von  $b$  nach  $a$  unter diesen Umständen gehen würde. Ist  $q$  der Querschnitt des von einem Punkte von  $b$  nach einem Punkte von  $a$  gehenden Strahlenbündels in der Pupille, so ist die von  $b$  nach  $a$  gehende Lichtmenge  $M$  gleich der von  $b$  nach  $q$  gehenden, und diese ist

$$M = \frac{n_2^2}{n_1^2} \cdot H \cdot \frac{q \cdot b}{R^2},$$

worin  $R$  den Abstand der Pupille von der Netzhaut bedeutet. Streng genommen würde hier unter  $q$  der Querschnitt des Strahlenbündels in dem von der Linse entworfenen Bilde der Pupille, und unter  $R$  die Entfernung dieses Bildes von der Netzhaut zu verstehen sein. In diesem Ausdrücke für die Lichtmenge, welche von dem leuchtenden Flächenelemente  $H$  in das Auge fällt, sind zwei Größen, welche von der Beschaffenheit des dem Auge vorgesetzten optischen Systems abhängen, nämlich  $q$  der Querschnitt des Strahlenbündels in der Pupille und  $b$  die Größe des Bildes auf der Netzhaut.

Die Helligkeit dieses Bildchens hängt nun aber nicht nur von der einfallenden Lichtmenge ab, sondern auch von der Größe der Fläche  $b$ , über welche die Lichtmenge ausgebreitet wird, und ist der letzteren umgekehrt proportional. Setzen wir als Einheit der Beleuchtungsstärke die Lichtmenge, welche die Einheit der Fläche trifft, so ist die Beleuchtungsstärke  $J$  des Netzhautelements  $b$

$$J = \frac{M}{b} = \frac{n_2^2}{n_1^2} \cdot H \cdot \frac{q}{R^2},$$

in welchem Ausdrücke nur noch  $q$  von der Beschaffenheit des optischen Systems abhängig ist. Sieht das Auge frei den Gegenstand an, so füllt das Strahlenbündel die ganze Pupille, deren Querschnitt  $Q$  sei, und die Beleuchtungsstärke wird

$$J = \frac{(n_1)^2}{(n_2)^2} \cdot H \cdot \frac{Q}{R^2}.$$

Größer als  $Q$  kann  $q$  niemals werden; dieser letztere Ausdruck ist also das Maximum der Helligkeit; er stellt die natürliche Helligkeit des Bildes dar. Die Helligkeit ausgedehnter Flächen kann durch optische Instrumente nie größer, nur kleiner werden, wenn  $q$  kleiner als  $Q$ , und verhält sich dann zur natürlichen Helligkeit wie  $q$  zu  $Q$ .

**Zusätze.** 1) Nur wenn wir verschwindend kleine leuchtende Punkte durch optische Instrumente betrachten, deren Bild auch bei den stärksten Vergrößerungen nur die Ausdehnung der kleinsten Zerstreuungskreise auf der Netzhaut bedeckt, also immer dieselbe Flächenausdehnung behält, können optische Instrumente die Helligkeit vergrößern. Dies geschieht z. B. für die Fixsterne, und deshalb können auch Fixsterne durch stark vergrößernde Fernrohre mit großen Aperturen bei Tage sichtbar gemacht werden. Die scheinbare Helligkeit des Fixsterns steigt proportional der Lichtmenge, welche das Instrument in seinen Focus vereinigt, während die Helligkeit des Himmelsgewölbes im Fernrohre nicht vermehrt wird

2) Auch wenn Zerstreuungsbilder einer leuchtenden Fläche von gleichmäßiger Helligkeit im Auge entworfen werden, kann die Helligkeit des Netzhautbildes nur gleich, nie größer werden als die Helligkeit bei freier Betrachtung der Fläche. Der Beweis läßt sich ganz so führen wie für scharf gesehene Bilder, da Satz III für scharfe Bilder und

für Zerstreungsbilder gleichmäfsig gilt. Auch hier ist die Helligkeit proportional dem Querschnitt des Strahlenbündels in der Pupille, welches von dem entsprechenden Punkte der Netzhaut bis nach der leuchtenden Fläche gelangen kann.

Ich erlaube mir zu bemerken, dafs gegen die hier entwickelten Grundsätze der Helligkeit dioptrischer und katoptrischer Apparate noch oft gesündigt wird. Man findet noch oft die irrige Meinung ausgesprochen, dafs, wenn man Licht durch Sammellinsen oder Hohlspiegel in das Auge, u. s. w. fallen läfst, man dadurch nicht blos die scheinbare Gröfse der leuchtenden Fläche, sondern auch ihre scheinbare Helligkeit vermehren könne. Der Vermehrung des in das Auge fallenden Lichts, welche durch solche Mittel erreicht werden kann, entspricht stets eine entsprechende Vergröfserung des Bildes, so dafs das Bild eben nur gröfser, nicht heller wird. Durch kein optisches Instrument kann man die Helligkeit einer leuchtenden Fläche von erkennbaren Dimensionen für das Auge gröfser machen, als sie dem blofsen Auge erscheint. Ebenso wenig kann eine beleuchtete Fläche jemals eine gröfsere Helligkeit bekommen, als die leuchtende hat.

#### Satz V.

Allgemeines Verfahren, die Helligkeit zu bestimmen, mit welcher dem Beobachter durch einen Augenspiegel eine Stelle der Netzhaut des beobachteten Auges erscheint.

a) Wenn der Verlust, den die einzelnen Strahlen an den brechenden und reflectirenden Flächen erleiden, vernachlässigt werden kann. Es sei  $x$  ein Punkt an der betreffenden Stelle der Netzhaut; wir haben zu untersuchen, wie das Strahlenbündel verläuft, welches von  $x$  nach der Pupille desselben Auges geht. Nach Satz I und II mufs ein Theil dieses Strahlenbündels zum leuchtenden Körper, ein anderer zur Pupille des Beobachters gehen. Es sei  $P$  der Querschnitt der Pupille des beobachteten Auges,  $p$  in dieser Pupille der Querschnitt desjenigen Theils des Strahlenbündels, welches zum leuchtenden Körper zurückgelangt,  $H$  die Helligkeit, welche der betreffenden Netzhautstelle zukommen würde, wenn das beobachtete Auge, frei nach dem leuchtenden Körper blickend, auf ihr ein Bild dieses Körpers entwürfe. Wir können diese die normale Helligkeit nennen. Sie hängt natürlich wesentlich von der Structur der Netzhaut ab, ferner von der Helligkeit des leuchtenden Körpers und der Weite der Pupille  $P$ . Bei Anwendung des Augenspiegels mufs nothwendig die wirkliche Helligkeit der Netzhautstelle kleiner werden, nämlich

$$\frac{p}{P} \cdot H.$$

Weiter ermittle man den Querschnitt  $q$ , den der Theil des von  $x$  ausgegangenen Strahlenbündels, welcher in die Pupille des Beobachters gelangt, in dieser Pupille hat, deren ganzer Flächeninhalt  $Q$  sei, so ergibt sich schliesslich für die Helligkeit der Netzhautstelle, wie sie dem Beobachter erscheint,

$$\frac{q \cdot p}{Q \cdot P} \cdot H.$$

b) Wenn die Strahlen durch Spiegelung oder Brechung einen merklichen Verlust erleiden. Unter den bisher construirten Formen der Augenspiegel kommt ein solcher nur bei dem von mir angegebenen mit unbelegten spiegelnden Platten vor. Das vom Auge zum leuchtenden Körper gehende Strahlenbündel wird in diesem Falle und allen ähnlichen ebenso viel verlieren als die vom Lichte wirklich zum Auge gehenden Strahlen. Man braucht also auch nur den

Verlust des ersteren zu berechnen. Es möge von einem Strahl, der vom Licht zum beobachteten Auge geht, und dessen Intensität 1 ist,  $\alpha$  im Auge ankommen, und von einem eben solchen Strahle, der vom beobachteten Auge ausgeht,  $\beta$  in dem des Beobachters ankommen, dann müssen wir den obigen Ausdruck für die Helligkeit noch mit  $\alpha$  und  $\beta$  multipliciren; er wird also

$$\frac{\alpha \cdot \beta \cdot p \cdot q}{P \cdot Q} H.$$

Durch die in den vorstehenden Sätzen vollzogene Umkehr des Problems von der Beleuchtung des Auges haben wir die Untersuchung der Helligkeit der Bilder für jeden Fall auf die Bestimmung des Ganges eines einzigen Strahlenbündels reducirt, während es sonst nöthig war, die Helligkeit einer einzelnen Netzhautstelle aus der Helligkeit aller über einander gelagerten Zerstreuungskreise, welche den einzelnen Punkten der Lichtquelle entsprechen, durch Summation zu bestimmen. Auch glaube ich, daß die Sache dadurch der Anschauung zugänglicher wird. Den Gang der Strahlen von einem Netzhautpunkte durch die verhältnißmäßig einfachen optischen Systeme der Augenspiegel, von denen eines zur Beleuchtung, eines zur Beobachtung dient, einzeln genommen kann man sich leicht veranschaulichen, während die ganze Übersicht des Ganges der Lichtstrahlen von der Lichtquelle bis zum Auge des Beobachters meist deshalb schwierig wird, weil auf der Netzhaut eine unendliche Zahl in einander greifender Zerstreuungskreise der Punkte der Lichtquelle und der Pupille des Beobachters entstehen.

#### Satz VI.

Die Mittel, ein deutliches Bild des Augenhintergrundes zu erhalten.

*A Fig. 108* sei das beobachtete Auge, *a* ein Punkt seiner Netzhaut, dessen Bild von den Augenmedien in *b* entworfen wird, in der Entfernung, wo das beobachtete Auge




Fig. 108.

deutlich sieht. Die beiden Pfeile, welche bei *a* und *b* gezeichnet sind, entsprechen der Größe der zusammengehörigen Bilder. Das Bild der Netzhautstelle ist vergrößert und umgekehrt. Ein Beobachter, welcher ohne weitere Hilfsmittel dies Bild der Netzhaut in *b* sehen wollte, müßte also noch weiter entfernt vom Auge *A*, etwa in *C* sich befinden, so daß die Entfernung *Cb* wieder gleich der Sehweite des Beobachters würde. Hierbei würde aber das von der Pupille des beobachteten Auges begrenzte Gesichtsfeld des Beobachters so klein sein, daß er schwerlich etwas erkennen könnte.

Es sind bisher zwei Hauptmethoden angewendet worden, um die Lage des Bildes *b* dem Beobachter bequemer zu machen. Bei der einen wird ein virtuelles aufrechtes Bild der Netzhaut, bei der anderen ein reelles umgekehrtes entworfen.

## A. Darstellung der Netzhaut im virtuellen aufrechten Bilde.

Man wendet dazu eine Concavlinse  $B$  in *Fig. 109* an, deren Brennweite  $Bp$  kleiner ist als die Entfernung des Punktes  $b$  von ihr. Eine solche macht die von




Fig. 109.

$A$  nach  $b$  hin convergirenden Lichtstrahlen wieder divergent, so daß sie von einem scheinbar bei  $d$  im Rücken des beobachteten Auges gelegenen Punkte zu kommen

scheinen. Die Pfeile bezeichnen wieder Lage und Größe der Netzhautstelle und ihrer Bilder.

Nennen wir  $p$  die (negative) Brennweite der Concavlinse,  $\alpha$  die Entfernung  $Bb$ ,  $\gamma$  die Entfernung  $dB$ , so ist nach § 10 Gleichung 14)

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{p};$$

$\gamma$  muß gleich der Sehweite des Beobachters sein, wenn er das bei  $d$  entworfen Bild der Netzhaut deutlich sehen soll;  $\alpha$  hängt von der Accommodationsweite  $Ab$  des beobachteten Auges und der Entfernung  $A$  von  $B$  ab. Hat man den Werth beider Größen festgestellt, so kann man aus der gegebenen Gleichung den Werth von  $p$  berechnen, welcher gewählt werden muß, um deutliche Bilder zu geben.

Wären beide Augen für unendliche Ferne accommodirt, also  $\alpha = \gamma = \infty$ , so würde auch  $p = \infty$  werden müssen, d. h. es wäre gar keine Linse nothwendig.

Auch für die seitlich gelegenen Theile der Netzhaut ist gewöhnlich keine Linse nothwendig, weil diese vor den dorthin fallenden Vereinigungspunkten der Lichtstrahlen weit entfernter Lichtpunkte zu liegen scheinen, und die Augenmedien von ihnen daher selbst schon ein dem Beobachter passendes Bild entwerfen.

Das Netzhautbild in  $d$  ist bei dieser Beobachtungsweise aufrecht.

Was die Vergrößerung betrifft, so denke man in  $b$  einen leuchtenden Gegenstand, dessen Bild auf der Netzhaut in  $a$  entworfen werden würde. Die rückkehrenden Strahlen bilden ein Bild des Netzhautbildes, welches nach den vorher auseinandergesetzten Grundsätzen des Augenleuchtens dem leuchtenden Gegenstande in  $b$  congruent ist. Nennt man  $\beta$  die Größe des leuchtenden Gegenstandes und des ihm gleichen Bildes in  $b$ ,  $\delta$  die des vom Beobachter gesehenen Bildes in  $d$ , so ist

$$\frac{\beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\gamma}.$$

Als Maß für die scheinbare Größe des gesehenen Bildes können wir seine Größe dividirt durch seine Entfernung von dem sehenden Auge gebrauchen. Befindet sich das Auge des Beobachters dicht hinter dem Concavglase, so wäre die scheinbare Größe des Bildes

$$\frac{\delta}{\gamma} = \frac{\beta}{\alpha}.$$

Nennen wir die Entfernung  $AB$  nun  $q$ , so ist die scheinbare Gröfse des Objects  $b$  für das Auge  $A$

$$\frac{\beta}{\alpha + q},$$

also etwas kleiner als die des Bildes  $\delta$  für den Beobachter. Ist die Sehweite des Auges  $A$  sehr viel gröfser als  $q$ , so kann man  $q$  gegen  $\alpha$  vernachlässigen, und findet auch für das beobachtete Auge die scheinbare Gröfse des leuchtenden Gegenstandes gleich  $\frac{\beta}{\alpha}$ .

Die Netzhautbilder des beobachteten Auges erscheinen also bei dieser Anordnung dem Beobachter unter gleichem oder etwas gröfserem Gesichtswinkel als die entsprechenden Gegenstände dem beobachteten Auge.

Daraus ergibt sich nun leicht die Vergröfserung der Netzhauttheile des beobachteten Auges. Ist  $x$  die Gröfse des auf der Netzhaut in  $a$  entworfenen Bildes von  $\beta$ , und  $y$  der Abstand der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges, so verhält sich

$$\begin{aligned} \frac{x}{\beta} &= \frac{y}{\alpha + q} \\ \frac{\beta}{\delta} &= \frac{\alpha}{\gamma} \quad \text{Beides multiplicirt giebt:} \\ \frac{x}{\delta} &= \frac{y \cdot \alpha}{\gamma \cdot (\alpha + q)} \end{aligned}$$

178

$y$  ist in LISTING's schematischem Auge gleich 15,0072 mm (oder 6,694 Par. Lin.),  $\gamma$  ist hier nach der bei der Berechnung von Vergröfserungen angenommenen Norm der Sehweite gleich 8 Zoll zu setzen. Daraus ergibt sich die Vergröfserung

$$\frac{\delta}{x} = 14,34 \frac{\alpha + q}{\alpha}.$$

Da  $q$  gegen  $\alpha$  gewöhnlich sehr klein ist, können wir die Vergröfserung gleich  $14\frac{1}{3}$  mal annehmen.

Das Gesichtsfeld, welches man übersieht, ist bei dieser Methode durch den undeutlich gesehenen Rand der Pupille des beobachteten Auges nicht scharf begrenzt. Um eine bestimmte Grenze passend zu wählen, kann man die nach dem Rande der Pupille des beobachteten Auges gezogenen Visirlinien des Beobachters nehmen, deren Kreuzungspunkt<sup>1</sup> im Mittelpunkt der Pupille des Beobachters liegt. Wenn man diese Visirlinien wie Lichtstrahlen behandelt, die von dem Mittelpunkte der Pupille des Beobachters ausgehen, findet man, dafs das Gesichtsfeld des Beobachters auf der Netzhaut des beobachteten Auges dem Zerstreuungsbilde entspricht, in welchem der Mittelpunkt der Pupille des Beobachters dort erscheint. Liegt dieser Mittelpunkt oder vielmehr sein durch die Concavlinse gesehenes Bild im ersten Brennpunkte des beobachteten Auges, so ist der Zerstreuungskreis, wie im vorigen Paragraphen bei den entoptischen Erscheinungen nachgewiesen ist, ebenso grofs wie die Pupille des beobachteten Auges. Meist wird aber das Auge des Beobachters sich dem beobachteten Auge nicht so weit nähern können, und dann wird der dem Gesichtsfelde gleiche Zerstreuungskreis kleiner als die Pupille des beobachteten Auges werden, um so kleiner, je weiter der Beobachter sich entfernt.

<sup>1</sup> S. § 11, S. 115.

## B. Darstellung der Netzhaut im reellen umgekehrten Bilde.

Die zweite Methode, das Bild der Netzhaut dem Beobachter bequem sichtbar zu machen, besteht darin, daß man nahe vor das beobachtete Auge eine Convexlinse von kurzer Brennweite, 1 bis 3 Zoll, hält. Es sei wieder in *Fig. 110* *a* ein beleuchteter Punkt der Netzhaut, *b* sein Bild außerhalb des beobachteten Auges *A*, *B* eine Convexlinse, auf welche die Strahlen fallen, ehe sie sich zum Bilde vereinigen. Diese entwirft ein kleineres und näheres




Fig. 110.

Bild, als *b* ist, in *d*, ebenfalls in umgekehrter Stellung, wie das in *b*. Das Auge des Beobachters befindet sich in *C*, so weit entfernt, als es zur Accommodation dieses Auges für das Bild nothwendig ist.

Ist *p* die positive Brennweite der Linse *B*, und wird die Entfernung *Bb* wieder mit *alpha*, *Bd* mit *gamma* bezeichnet, so ist (Gleichung 14 auf S. 84)

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha + p}{p}.$$

179 Da *alpha* meist sehr viel größer ist als *p*, so wird *gamma* nahehin gleich *p*, bleibt aber stets etwas kleiner.

Die Größe eines Netzhauttheiles im Punkte *a* sei *x*, die seines Bildes in *b* sei *beta*, die des letzteren Bildes in *d* sei *delta*, und die Entfernung der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges sei *y*, die Entfernung des ersten Hauptpunktes der Linse *B* vom vorderen Knotenpunkte des Auges *A* sei *q*, so ist nach Gleichung 6 S. 67

$$\begin{aligned} \frac{x}{\beta} &= \frac{y}{\alpha + q} \\ \frac{\beta}{\delta} &= \frac{\alpha}{\gamma}. \quad \text{Beides multiplicirt giebt} \\ \frac{x}{\delta} &= \frac{y \cdot \alpha}{\gamma \cdot (\alpha + q)} = \frac{y \cdot (\alpha + p)}{p \cdot (\alpha + q)}. \end{aligned}$$

In der Regel stellt man die Linse *B* so, daß die Pupille von *A* in ihrem einen Hauptbrennpunkte liegt, dann wird also *p* nahehin gleich *q*, und die Vergrößerung

$$\frac{\delta}{x} = \frac{p}{y}.$$

Nehmen wir für *y* den Werth aus LISTING's schematischem Auge, so ergibt sich daß das Bild *delta*

2 mal vergrößert ist, wenn *p* = 30 mm (13,4''')  
 3 mal wenn *p* = 45 mm (20,1''')  
 4 mal wenn *p* = 60 mm (26,8''').

Dies ist die wirkliche Vergrößerung des objectiven Bildes. Die Vergrößerung für den Beobachter, wenn die Entfernung *Cd* gleich *c* gesetzt wird, ist

$$\frac{p}{yc} \times 8 \text{ Zoll.}$$

Das Gesichtsfeld sieht der Beobachter bei dieser Methode begrenzt durch die Pupille des beobachteten Auges, so lange die Convexlinse diesem Auge sehr nahe steht. Je weiter man die Convexlinse aber entfernt, desto stärker vergrößert erscheint die Pupille, bis sie endlich in die Nähe des Brennpunktes der Glaslinse kommt, dann verschwindet der Pupillarrand ganz aus dem Gesichtsfelde, und die Ausdehnung des letzteren wird nur noch von der Apertur dieser Linse bestimmt. Um die Größe des Gesichtsfeldes zu bestimmen, können wir wieder, wie in dem vorigen Falle, die Visirlinien des Beobachters wie Lichtstrahlen behandeln. Zunächst entwirft die Linse *B* ein Bild vom Kreuzungspunkt der Visirlinien in der Nähe ihres Brennpunktes, also nahehin in die Ebene der Pupille des beobachteten Auges. Von da divergiren die Visirlinien nach dem Hintergrund des beobachteten Auges hin. Da ihr Vereinigungspunkt in der Nähe des vorderen Knotenpunktes des beobachteten Auges liegen wird, oder vielleicht auch, je nach der Stellung der Linse *B*, ganz mit diesem Knotenpunkte zusammenfallen wird, so gehen die Visirlinien des Beobachters fast ungebrochen in das beobachtete Auge hinein. Ihr Gang ist in *Fig. 110* durch die punktirten Linien angedeutet. Ist die Apertur der Linse *B* gleich *u*, der Durchmesser des Gesichtsfeldes auf der Netzhaut gleich *v*, so ist

$$\frac{v}{y} = \frac{u}{p}.$$

Da man bei so kleinen Linsen recht gut die Apertur gleich der halben Brennweite machen kann, also  $u = \frac{1}{2}p$ , so wird alsdann

$$v = \frac{1}{2}y = 7\frac{1}{2} \text{ mm.}$$

Man übersieht also in diesem Falle ein größeres Gesichtsfeld, als es ohne künstliche Erweiterung der Pupille durch Atropin bei der Beobachtung mit Concavgläsern möglich ist.

## VII.

### Beleuchtungsapparate der Augenspiegel.

Nach den drei oben angeführten Methoden kann die Beleuchtung direct mit einem Lichte geschehen, oder mit einem durchbohrten undurchsichtigen Spiegel, oder mit unbelegten, also durchsichtigen Glasplatten als Spiegel.

Beleuchtung ohne allen Spiegel läßt sich nur für das umgekehrte Bild der Netzhaut anwenden, erfordert eine beträchtliche Geschicklichkeit, und wäre etwa nur da zu empfehlen, wo gerade kein anderes Instrument als eine einfache Convexlinse von kurzer Brennweite zur Hand ist. Die Ausführung der Beobachtung ist folgende. Der Beobachter sieht dicht neben einem Lichte vorbei und, durch einen Schirm gegen dessen directe Strahlen geschützt, wie es in *Fig. 104* abgebildet ist, nach dem beobachteten Auge hin, und bringt eine Convexlinse von 2 bis 4 Zoll Brennweite vor dieses Auge, wie in *Fig. 110*. Um die richtige Stellung zu finden, bringt man diese Linse zuerst ganz dicht vor das beobachtete Auge, und entfernt sie allmähig so weit, bis man die Pupille so stark vergrößert erblickt, daß ihre Ränder hinter denen der Linse verschwinden. Man erblickt dann ein umgekehrtes reelles Bild der Netzhaut bei *d* *Fig. 110*. Um die Helligkeit dieses Bildes zu bestimmen, verfolgen wir nach den Vorschriften von Nr. V dieses Paragraphen das Strahlenbündel, welches vom Netzhautpunkte *a* ausgeht; es wird von den brechenden

Flächen des Auges nach  $b$  hin, darauf von der Linse  $B$  nach  $d$  hin convergent gemacht, divergirt hinter  $d$ , und ist bei  $qq$  am Auge des Beobachters jedenfalls breit genug, daß die Pupille des Beobachters ganz hineintauchen und also die Netzhautstelle mit ihrer ganzen wirklichen Helligkeit sehen kann. Diese wirkliche Helligkeit verhält sich zur normalen oder größtmöglichen Helligkeit nach  $V$  wie der Theil des Strahlenkegels  $qq$ , der die Flamme trifft, zum ganzen Strahlenkegel. Wenn nun die Flamme hinreichend groß und passend gestellt ist, so brauchen nur sehr wenig Strahlen des Kegels  $qq$  bei der Flamme vorbei zu gehen, um die Pupille des Beobachters auszufüllen. Dann wird die wirkliche Helligkeit der Netzhautstelle  $a$  sehr wenig kleiner sein als die normale Helligkeit, und die scheinbare Helligkeit für den Beobachter gleich der wirklichen.

Sehr viel bequemer wird die Beobachtung, wenn der Beobachter einen durchbohrten undurchsichtigen Spiegel anwendet, um das Auge  $A$  zu erleuchten. Es sei in *Fig. 111* wieder  $A$  das beobachtete,  $B$  das beobachtende Auge,  $C$  die




Fig. 111.

Convexlinse, und  $SS$  ein durchbohrter Spiegel, Von dem Netzhauptpunkte  $a$  wird ein Bild bei  $d$  entworfen, welches der Beobachter durch die Öffnung des Spiegels hin betrachtet. Von dem ganzen von  $a$  kommenden Strahlenkegel geht nur der schmale Theil für die Beleuchtung verloren, welcher durch die Öffnung des Spiegels fällt, der ganze übrige Theil wird reflectirt und kann dem leuchtenden Körper zugeleitet werden. Zu dem letzteren Ende ist entweder der Spiegel  $SS$  ein Hohlspiegel (RUETE), oder aber ein Planspiegel (COCCIUS) oder Concavspiegel (ZEHENDER), neben dem man eine Linse  $L$  angebracht hat, welche die Strahlen auf den leuchtenden Körper vereinigt. Aus dieser Darstellung folgt schon nach Nr. V, daß die Helligkeit der Erleuchtung nahezu die normale sein kann.

Das Gesichtsfeld für den Beobachter fanden wir bedingt durch die Größe der Linse  $C$ , wenn die Pupille im Brennpunkte dieser Linse steht. Es fragt sich, in wie großer Theil der Netzhaut erleuchtet werden kann. Da alles Licht durch die Linse  $C$  in das Auge des Beobachters fällt, kann natürlich das beleuchtete Feld 181 der Netzhaut nicht größer als das Zerstreuungsbild der Linse  $C$  sein, welches selbe



Zerstreuungsbild auch, wie wir in VI gezeigt haben, dem Gesichtsfelde des Beobachters entspricht. Dies Zerstreuungsbild wird in allen Theilen sein Maximum der Helligkeit haben, wenn von jedem Theil der Linse  $C$  Licht auf jeden Theil der Pupille fällt. Diese Bedingung wird erfüllt sein, wenn die Pupille des beobachteten Auges gleich oder kleiner als das Bild ist, welches die Linse  $C$  in der Nähe der Pupille von dem Spiegel  $SS$  (oder der Linse  $L$ ) entwirft, und von jedem Punkte dieses Spiegels, mit nothwendiger Ausnahme der mittleren Durchbohrung, Licht auf jeden Theil der Linse  $C$  fällt. Das Letztere wird aber wiederum geschehen, wenn die Linse  $C$  an dem Orte steht, wo der Spiegel das Bild der Lampenflamme  $D$  entwirft, und die Linse gleich oder kleiner als dieses Bild ist.

Um ein Beispiel solcher Construction zu geben, wollen wir annehmen, man verlange von dem Augenspiegel eine viermalige Vergrößerung und gebe dem entsprechend der Linse  $C$  eine Brennweite von 60 mm und eine Apertur von 30 mm. Der Spiegel, welcher ein durchbohrter Concavspiegel ohne Linse sein möge, muß soweit von dem Orte des Bildes  $d$  entfernt sein, daß der Beobachter sein Auge für das Bild accommodiren kann, also etwa 150 mm. Dann steht der Spiegel  $S$  von der Linse  $C$  210 mm ab. Nach der Gleichung § 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenen Bild  $= \frac{60}{150} = \frac{2}{5}$  seiner eigenen Größe sein. Da nun sein Bild der Pupille des beobachteten Auges gleich sein soll, und diese bei künstlicher Erweiterung bis auf 10 mm Durchmesser kommen kann, so brauchen wir dem Spiegel nur 25 mm Durchmesser zu geben.

Die Brennweite, welche wir dem Spiegel geben müssen, bestimmt sich nun durch die Bedingung, daß er ein Bild der Lampenflamme entwerfen muß, welches die Linse  $C$  deckt. Die Flamme größerer ARGAND'scher Brenner hat etwa 15 mm Durchmesser. Setzen wir in § 9 Gleichung 14 b) für  $\beta_1$  den Durchmesser der Linse  $C$  30 mm, für  $\beta_2$  den Durchmesser der Lampenflamme 15 mm, für  $f_1$  die Entfernung  $CS$  gleich 210 mm, so wird die Brennweite des Spiegels gefunden gleich 70 mm, und die Lampenflamme muß 105 mm vom Spiegel entfernt sein.

Wenn man nicht einen Concavspiegel, sondern einen ebenen Spiegel und eine convexe Glaslinse wie in Fig. 111 anwenden will, muß man statt der Entfernung des Spiegels von der Linse  $C$  in der Rechnung die Summe der Entfernungen der beiden Linsen  $L$  und  $C$  von der Mitte des Spiegels nehmen.

Wenn der Beobachter den Spiegel und die Linse frei in der Hand hält, wird es natürlich nicht möglich sein, die Entfernungen dieser Theile, die der Rechnung zu Grunde gelegt sind, genau einzuhalten, und man wird auch bei ziemlich großen Abweichungen davon noch gute Bilder erhalten; dennoch ist es aber wohl für den Beobachter vorthellhaft, die besten Bedingungen für die Haltung seines Instruments zu kennen.

Wenn mit einem durchbohrten Spiegel und einem Concavglase beobachtet werden soll, sind die Verhältnisse ungünstiger. In Fig. 112 ist wieder  $A$  das beobachtete,  $B$  das beobachtende Auge,  $S$  der Spiegel. Soll der Netzhautpunkt  $a$  beobachtet werden, so muß ein Theil des von ihm ausgehenden Strahlenkegels in das Auge des Beobachters fallen; wir wollen diesen Theil  $\alpha$  nennen; ein anderer Theil  $(1-\alpha)$  von dem Spiegel nach dem Lichte reflectirt werden. Ist also  $H$  die normale Helligkeit der Netzhautstelle  $a$ , so wird unter diesen Umständen nach Nr. V dieses Paragraphen  $H \cdot (1-\alpha)$  ihre wirkliche Helligkeit sein. Es sei wie früher  $J$  der Flächeninhalt der scheinbaren Pupille des beobachteten Auges  $A$ ,  $R$  ebenderselbe von  $B$ ,  $g$  die Entfernung




Fig. 112.

der beiden scheinbaren Pupillen von einander, und  $h$  die Accommodationsdistanz des Auges  $A$ , so ist der Querschnitt des Theils des Strahlenbündels, der in das Auge des Beobachters fällt,

$$\alpha \cdot J \cdot \frac{(h-g)^2}{h^2}.$$

Dieser Querschnitt wird in der Regel kleiner sein als  $R$ . Die scheinbare Helligkeit für den Beobachter wird dann

$$H \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{R h^2}.$$

Die Gröfse  $\alpha \cdot (1-\alpha)$  erreicht ihr Maximum, wenn  $\alpha = \frac{1}{2}$ , sie wird alsdann gleich  $\frac{1}{4}$ . Die vortheilhafteste Anordnung in Bezug auf Helligkeit wird also die sein, wo die Hälfte des Strahlenkegels in das Auge des Beobachters fällt, die Hälfte zurückgeworfen wird. Man erreicht dann die Helligkeit

$$H \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{4 R \cdot h^2}.$$

Um ein möglichst großes Feld in dem beobachteten Auge zu beleuchten, wende man eine große und nahestehende Lampenflamme an, oder wenn dies nicht zureicht, kann man bei  $L$  eine Sammellinse anbringen. Entwirft diese ein Bild der Flamme, welches die Pupille ganz deckt, so wird im Auge  $A$  das ganze Zerstreuungsbild der Linse  $L$  beleuchtet.

Für die Beobachtung mit Convexlinsen würde die Beleuchtung mit unbelegten Glasplatten nur  $\frac{1}{4}$  der Helligkeit geben, welche man mit durchbohrten undurchsichtigen Spiegeln erreichen kann. Dagegen kann diese Beleuchtung bei der Beobachtung mit Concavlinen unter Umständen mit Vortheil angewendet werden.

Man stelle sich nämlich in *Fig. 112* den Spiegel  $SS$  vor als nicht durchbohrt und unbelegt, bestehend aus einer oder mehreren über einander gelegten Glasplatten. Es werde von jedem Lichtstrahl, der auf den Spiegel fällt, der Theil  $\alpha$  durchgelassen, der Theil  $(1-\alpha)$  zurückgeworfen. Ist  $H$  die normale Helligkeit der Netzhautstelle  $a$ , bei direct einfallendem Lichte, so giebt das von dem Spiegel reflectirte Licht nur die Helligkeit  $H \cdot (1-\alpha)$ . Der Querschnitt des Strahlenbündels, welches von  $a$  ausgeht, ist, da wo es auf  $B$  fällt, jetzt

$$J \cdot \frac{(h-g)^2}{h^2}.$$

Da nun der Theil  $\alpha$  des Lichts durch die Platten hindurchgeht, so wird die scheinbare Helligkeit für den Beobachter:

$$H \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{R \cdot h^2}.$$

Dieser Ausdruck erreicht auch in diesem Falle ein Maximum, wenn  $\alpha$  gleich  $\frac{1}{2}$  ist, und wird

$$H \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{4 R \cdot h^2},$$

so lange

$$R < \frac{J \cdot (h-g)^2}{h^2}.$$

Diese Bedingung wird bei normalen Augen in der Regel erfüllt sein, da die Pupille  $J$  des von einer großen Lichtmenge getroffenen Auges  $A$  in der Regel enger sein wird als die Pupille  $R$  des Beobachters. Nur bei der künstlichen Erweiterung der Pupille  $J$  durch Atropin wird es nicht der Fall sein, und dann wird die scheinbare Helligkeit einfach gleich  $\frac{1}{4}H$ . Im letzteren Falle ist die Beobachtung mit einem durchbohrten Spiegel vortheilhafter, denn dort gilt der gegebene Ausdruck für die Helligkeit, so lange

$$R < \alpha \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{h^2} \text{ und}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

Wenn man normale Augen ohne Anwendung von Atropin untersucht, so würde man mittels beider Arten der Beleuchtung dieselbe Helligkeit erhalten können, wenn die Pupillen unbeweglich wären. Der belegte Spiegel wirft aber im Ganzen mehr Licht in das beobachtete Auge, blendet es stärker, und die Pupille verengt sich mehr, so daß unter diesen Umständen der unbelegte Spiegel ein größeres Gesichtsfeld und eine größere Helligkeit geben kann. Außerdem beleuchtet er die gesehene Netzhautfläche gleichmäßig, während beim durchbohrten Spiegel das Zerstreuungsbild der Durchbohrung die Beleuchtung ungleichmäßig macht. Endlich ist der Hornhautreflex bei dem unbelegten Spiegel weniger störend, weil das vom Spiegel reflectirte Licht mehr oder weniger polarisirt ist, und von der Hornhaut ohne Änderung seiner Polarisation zurückgeworfen nur zu einem sehr kleinen Theil durch die Platten zurückgeht,

Damit der unbelegte Spiegel die Hälfte des auffallenden Lichts zurückwerfe, kann man ihn entweder aus einer Glasplatte bestehen lassen, oder aus mehreren übereinandergelegten, muß aber den Einfallswinkel der reflectirten Lichtstrahlen dann passend wählen. Der passende Einfallswinkel für

eine Platte ist  $70^\circ$   
 drei Platten „  $60^\circ$   
 vier Platten „  $56^\circ$ .

#### Formen der Augenspiegel.

1) Augenspiegel von HELMHOLTZ<sup>1</sup>, mit reflectirenden Glasplatten und Concavlinen. Es ist dieser Augenspiegel auf *Fig. 113* im Querschnitt und natürlicher Größe, und in *Fig. 114* von vorn gesehen in halber Größe dargestellt, mit einer Modification der ursprünglichen Form, welche von dem Mechaniker REXOSS angebracht ist, nämlich mit zwei beweglichen Scheiben, welche die nöthigen Concavlinen enthalten. Die drei reflectirenden Glasplatten sind mit  $aa$  bezeichnet, sie bilden die nach vorn gekehrte Hypotenusenfläche eines prismatischen Kastens, dessen Grundfläche ein rechtwinkeliges Dreieck ist, wie man im Querschnitte *Fig. 113* sieht. Die übrigen Flächen des Prismas sind aus Metallplatten gebildet und, um das Licht möglichst vollständig zu absorbiren, innen mit schwarzem Sammet ausgelegt. Die kleinere Kathetenfläche des Prismas ist an dem Gestell des Augenspiegels so befestigt, daß sie sich um die optische Axe des Instruments drehen kann, und hat dieser Axe entsprechend eine Öffnung. Die Glasplatten werden durch einen rechtwinkeligen Rahmen an dem prismatischen Kasten zurückgehalten; der Rahmen selbst ist durch zwei Schrauben  $ee$  an die dreiseitigen Grundflächen des Prismas befestigt. Die Glasplatten bilden einen Winkel von  $56^\circ$  mit der optischen Axe des Instruments. 184

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, *Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge.* Berlin 1852.

In das metallene Gestell des Instruments *gg* ist ferner eine Axe *dd* eingelassen, um welche sich zwei Scheiben *bb* und *cc* drehen. Jede dieser Scheiben hat fünf Öffnungen. In je vieren sind Concavgläser von 6 bis 13 Zoll Brennweite eingesetzt, die fünfte ist leer. Diese Öffnungen können nach einander in die optische Axe des Instruments gebracht werden, so daß der Beobachter, welcher sein Auge an das beckenförmige Ocularstück *B* anlegt, durch sie und die Glasplatten *aa* hindurchsieht. In *Fig. 113* ist die leere Öffnung der Scheibe *bb* und eine mit einer Linse versehene der Scheibe *cc* vorgeschoben. So kann der Beobachter eine beliebige von den acht Linsen oder zwei von ihnen gleichzeitig vor sein Auge bringen. Damit die Scheiben ihre Stellung nicht ohne Willen des Beobachters verändern, sind an ihrem Rande Grübchen angebracht, in welche sich die Enden zweier Federn *h* einlegen.




Fig. 113.




Fig. 114.

Für Beobachtungen mit Concavgläsern, also bei starker Vergrößerung, an Personen, deren Pupille nicht künstlich erweitert ist, und bei großer Empfindlichkeit des beobachteten Auges gegen Licht, finde ich unter den beweglichen Spiegeln diese erste Form des Augenspiegels aus den Gründen, welche ich oben bei der Theorie der Beleuchtung durch unbelegte Glasplatten angeführt habe, noch immer am vortheilhaftesten. Wenn ein gesundes Auge durch diesen Spiegel beobachtet wird, kann es die Erleuchtung Stunden lang, ohne geblendet zu werden, ertragen. Ich selbst habe oft 20 Studirenden hinter einander meine Netzhaut mit diesem Instrumente ohne Unbequemlichkeit gezeigt, während die Beleuchtung mit belegten Spiegeln nicht 5 Minuten ohne starke Blendung des Auges ertragen wird. Ich ziehe deshalb diesen Spiegel zu den meisten physiologischen Versuchen den anderen Formen vor. Für die augenärztlichen Untersuchungen dagegen wird ein größeres Gesichtsfeld und größere Helligkeit bei geringerer Vergrößerung meist vortheilhafter sein, und deshalb werden für dergleichen Beobachtungen meist belegte durchbohrte Spiegel mit Convexlinsen angewendet.

Will man den Spiegel gebrauchen, so setzt sich der Beobachter dicht vor den Beobachteten, und stellt an seiner Seite eine hell brennende Lampe auf. Ein undurchsichtiger Schirm wird so aufgestellt, daß er das Gesicht des Beobachteten beschattet.

Der Beobachter bringt zuerst den Spiegel, ohne hindurchzusehen, ungefähr in die richtige Stellung vor das Gesicht des Beobachteten, und dreht ihn so, daß die Glasplatten ihren hellen Reflex auf das zu beobachtende Auge werfen. Dann blickt er hindurch und erblickt nun die Netzhaut roth erleuchtet. Wenn er nicht sogleich sein Auge für die feineren Theile der Netzhaut accommodiren kann, dreht er mit dem Zeigefinger der Hand, welche das Instrument hält, eine der Scheiben, welche die Linsen enthält, bis er die passende Concavlinse gefunden hat.

Wenn die Beleuchtung der Netzhaut verschwindet, achte man nur auf den hellen Reflex der Glasplatten im Gesichte des Beobachteten und führe diesen wieder auf das Auge zurück.

2) Augenspiegel von RUETE<sup>1</sup>, mit durchbohrtem Concavspiegel, auf Stativ dargestellt in *Fig. 115*. Auf einem runden Fusse von Holz ruht eine hohle Säule *a*, in deren Axenkanale sich ein runder Stab *b* von Holz befindet, der hoch und niedrig geschoben und durch eine Feder, die sich am unteren Ende desselben befindet, in jeder beliebigen Höhe festgestellt werden kann. Auf diesem Stabe sitzt ein Halbkreis von Messing *c*, der sich mit dem Stabe hoch und niedrig, rechts und links stellen läßt. In diesem Halbkreise ist ein in der Mitte durchbohrter Hohlspiegel *d* von etwa 3 Par. Zoll Durchmesser und von einer Brennweite von etwa 10 Par. Zoll durch Schrauben, die je nach dem Bedürfnisse gelüftet oder stärker angezogen werden können, so befestigt, daß er um seine Horizontalaxe gedreht werden kann. In der Mitte der Säule *a* befinden sich zwei hölzerne Ringe *e* und *f*, welche sich um die Säule drehen lassen. Jeder Ring trägt einen horizontal auslaufenden Arm *g* und *h*; der Arm *g* trägt einen geschwärzten Schirm, der einestheils dazu dient, um das Licht der Lampe vom Beobachter abzuhalten, an-




Fig. 115.

dernteils auch dazu, um, wenn es nöthig ist, das vom Spiegel in das beobachtete Auge fallende Licht abzuschwächen, was man dadurch bewirkt, daß man einen Theil des Spiegels durch den Schirm beschattet. Der Arm *h*, welcher in 12 Zolle eingetheilt ist, trägt zwei verticale Säulen, *i* und *k*, die rück- und vorwärts geschoben werden können; in jeder verticalen Säule steckt ein am unteren Ende mit einer Feder versehener Stift von Messing *l* und *m*, den man auf- und abwärts schieben kann, und der durch die Feder in jeder Höhe, die man ihm giebt, festgehalten wird. Auf diese Stifte steckt man je nach den Umständen concave oder convexe Gläser, welche die aus dem beobachteten Auge zurückkehrenden Lichtstrahlen zu einem deutlichen Bilde für den Beobachter vereinigen. *A* ist der Beobachtete, *B* der Beobachter. Die Zeichnung ergibt leicht das Übrige.

Für die Beobachtungen mit Concavlinsen, die in der augenärztlichen Praxis allerdings wohl eine seltenere Anwendung finden, ist das Instrument nicht gut geeignet, weil sich die beiden Augen nicht hinreichend nähern können, und deshalb das Gesichtsfeld sehr klein wird. Für Beobachtungen mit Convexlinsen dagegen, die ungeübten Beobachtern

<sup>1</sup> TH. RUETE, *Der Augenspiegel und das Optometer*. Göttingen 1852.


demonstrirt werden sollen, erscheint das Instrument bequem, namentlich, wenn man durch einen Assistenten den Kopf des Beobachteten so dirigiren läßt, daß seine Pupille in den Focus der Lichtstrahlen kommt; auch kann durch Anbringung einer zweiten convexen Ocularlinse (die dann aber wohl besser hinter dem Spiegel anzubringen wäre) eine Art kleinen Fernrohrs zusammengesetzt und eine stärkere Vergrößerung erreicht werden. Die Helligkeit des Instruments ist sehr groß. Gelegenheit, die Netzhautbilder zu beobachten, ist nicht gegeben.

3) In praktischem Gebrauche geblieben ist schließlich von diesem Instrumente nur der Concavspiegel *d*, an einem kleinen Handgriff befestigt, den der Beobachter in der rechten Hand hält, und die Convexlinse *m*, die er zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand nimmt, während er den kleinen Finger der linken Hand auf das Gesicht des Patienten stützt. Die Linse braucht er, wie S. 219 unten beschrieben ist. Den Convexspiegel hält er vor sein eigenes Auge, blickt durch die mittlere Öffnung und wendet ihn so, daß der Reflex des Lichtes auf die Linse und durch dieselbe auf das beobachtete Auge fällt.

Von dieser Art ist der in der GRAEFE'schen Klinik üblich gewordene kleinere LIEBREICH'sche Augenspiegel mit durchbohrtem belegtem Concavspiegel, mit zwei Convexlinsen (2 und 3 Zoll Brennweite) und 5 Linsen, die hinter dem Spiegel in einer Gabel zu befestigen sind, um dem Beobachter die Accommodation zu erleichtern (+ 10, — 6, — 8, — 10, — 12 Zoll). Sie werden in großer Zahl fabrikmäßig dargestellt, und sind selbst in Westentaschenformat zu haben.

4) ERKENS' Augenspiegel, verbessert von DONDERS und VAN TRIGT<sup>1</sup>, feststehend auf einem Gestell, hauptsächlich zu physiologischen Beobachtungen der Bilder und zum Zeichnen brauchbar. Ein ebener durchbohrter Glasspiegel reflectirt das Licht, und hat hinter sich die REKOS'schen Scheiben mit Concavgläsern. Das Licht scheint durch eine Röhre auf den Spiegel, die verlängert werden kann und an ihrem Ende zwei einander gegenüberstehende Metallspitzen trägt, deren Abstand durch eine Mikrometerschraube regulirt werden kann. Der Beobachtete sieht sie in deutlichem Spiegelbilde, und hat auf seiner Netzhaut ein deutliches Bild derselben. So kann die Beschaffenheit der optischen Bilder auf seiner Netzhaut, die Lage derselben und auch die Größe der gesehenen Netzhauttheile ermittelt werden.

186



187

Fig. 116.

5) Portativer Augenspiegel von COCCIVS,<sup>2</sup> mit durchbohrtem, belegtem, ebenem Spiegel mit einer Beleuchtungslinse. Er ist abgebildet in Fig. 116. Das Instrument besteht aus einem viereckigen Planspiegel *a* von 14 Par. Lin. Seite. Die Öffnung hat 2 Par. Lin. Durchmesser, und ihr vorderer, dem beobachteten Auge zugekehrter Rand ist etwas abgeschliffen. Der Spiegel ist in eine dünne Messingplatte gefast, welche an ihrem untern Ende in einen kleinen Fortsatz übergeht, der an der Stange *b* befestigt ist. Die Beleuchtungslinse hat 5 Zoll Brennweite; um sie aber auch mit anderen vertauschen zu können, ist sie in einen geschlitzten federnden Ring *f* eingesetzt, von der Stange *g* und dem geschlitzten Querbalken *d* getragen. Der letztere wird durch festes Anschrauben des Griffes *e* festgeklemmt, um die Stellung der Linse gegen den Spiegel zu sichern, welche man gewählt hat. Auseinander genommen kann das Instrument in ein kleines Etui gelegt werden.

<sup>1</sup> VAN TRIGT, *Dissertatio de Speculo oculi*. Utrecht 1853. *Nederlandsch Lancet*. Ser. 3. DI. II. 430. — Deutsch von SCHAUENBURG, Lahr 1854.

<sup>2</sup> A. COCCIVS, *Über die Anwendung des Augenspiegels, nebst Angabe eines neuen Instruments*. Leipzig 1853.

Coccius bringt, wie RUETE, die Concavgläser wie die Convexgläser zwischen Spiegel und Licht an. Da das Erstere wegen der Reflexe unvortheilhaft ist, hat man später mehrere Hohlgläser in einem Schieberchen oder einzeln in Ringen an der Rückseite des Spiegels angebracht.

Wegen seiner Beweglichkeit ist dieser Spiegel für ärztliche Zwecke wohl brauchbarer, als der von RUETE, aber jedenfalls schwerer zu richten, als der Concavspiegel ohne Linse.

6) Portativer Spiegel von ZEHENDER,<sup>1</sup> mit durchbohrtem convexen Metallspiegel und Beleuchtungslinse, mit ähnlicher Fassung, wie der von Coccius. Im Wesentlichen unterscheidet sich das Instrument von dem letzteren nur dadurch, daß statt des ebenen Glasspiegels ein convexer Metallspiegel von 6 Zoll Radius angebracht ist. Indem man die convexe Linse dem convexen Spiegel näher oder ferner stellt, erhält man ein reflectirendes System von veränderlicher Brennweite, was man den Umständen anpassen kann. Ein wesentlicher Vortheil scheint mir noch in dem Umstande zu liegen, daß der Spiegel von Metall gefertigt ist, und daher der Rand des Sehlochs dünn, gut geschwärzt und ohne Licht reflectirende Unebenheiten ist. Vorher habe ich nachgewiesen, daß bei den Beobachtungen mit dem durchbohrten Spiegel und der Concavlinse zur Erlangung der größten Helligkeit nur die Hälfte des von einem Punkte der Netzhaut ausgehenden Strahlenbündels in das Auge des Beobachters fallen darf, falls nicht die Pupille des beobachteten Auges den mehr als doppelten Flächeninhalt von der des Beobachters hat. Der Beobachter wird daher in der Regel sich einen Theil seiner Pupille mit dem Rande der Öffnung des Spiegels verdecken müssen, und einen Theil dieses Randes gerade vor dem Auge haben. Es ist daher vortheilhaft, an diesem Rande Alles zu vermeiden, was Licht reflectiren könnte, und das ist bei ZEHENDERS Metallspiegeln viel besser erreicht als bei Coccius' Glasspiegeln.

7) Neuerdings ist von LORING-WADSWORTH, COHN, v. WECKER, KNAPP, LANDOLT das System der REKOS'schen Scheiben sehr ausgebildet worden, indem bis zu 29 kleine Linsen von verschiedener Brennweite, theils in einer, theils in zwei hinter einander liegenden Scheiben sich vereinigen. Sie werden Refractions-Ophthalmoskope genannt, und dienen hauptsächlich dazu, die Sehweiten des beobachteten Auges zu controlliren.

Von den Beobachtungen, welche mit dem Augenspiegel an normalen Augen anzustellen sind, erwähne ich Folgendes. Der Grund des Auges erscheint bei starker Beleuchtung (mit belegten Spiegeln und Convexlinsen) roth, nur die Eintrittsstelle des Sehnerven zeichnet sich hellweiß ab. Man sieht auf dem rothen Grunde zunächst die Netzhautgefäße verlaufen, deren Stämme aus der Mitte des weißen Sehnerven hervortreten. Die Arterien sind durch ihre lichtere rothe Farbe und durch einen stärkeren Lichtreflex an ihrer Oberfläche zu erkennen. Zwischen den Netzhautgefäßen erscheint der Grund des Auges je nach der Menge des Pigments bald hellroth, bald braun, und man erkennt, namentlich an den mehr zur Seite gelegenen Theilen sehr häufig die Gefäße der Aderhaut, wie es in *Taf. II Fig. 1* dargestellt ist. Man sieht in der Mitte die Eintrittsstelle des Sehnerven; *a a a* sind Äste der Netzhautarterie, *b b b* der Netzhautvene, dazwischen sieht man die viel weiteren Gefäße der Aderhaut. Letztere sind nicht immer gleich deutlich; in den meisten Augen ist die Pigmentschicht über diesen Gefäßen so dünn, daß sie sich dadurch von den stärker pigmentirten Zwischenräumen abheben.

Bei starker Beleuchtung zeigt der Augengrund keine auffallenden Unterschiede in der Helligkeit, mit Ausnahme der Eintrittsstelle der Sehnerven. Es scheint, daß dabei verhältnißmäßig viel Licht durch die Pigmentschicht dringt, von den Gefäßen der Aderhaut und der Sclerotica reflectirt wird und wieder zurückkehrt. Daß bei den meisten Augen ziemlich viel Licht durch die Augenhäute dringen kann, zeigt uns der Versuch (§ 10, S. 86), bei welchem das Netzhautbildchen im inneren Augenwinkel sichtbar wird, und ferner die entoptische Erscheinung der Aderfigur der Netzhaut mittels Lichts, welches die Sclerotica

<sup>1</sup> W. ZEHENDER, *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* 1854. I. S. 121.

durchdringt (s. S. 193). Dieser Theil des zurückkehrenden Lichts, welcher von der Reflexion in der Aderhaut und Sehnenhaut herrührt, bleibt nun wohl ziemlich gleich auf allen Stellen des Augengrundes, auch wenn die Helligkeit der Netzhaut selbst variiert.

Bei schwacher Beleuchtung (mit reflectirenden Glasplatten) erscheinen dagegen die Theile des Augengrundes in der Nähe des Sehnerven besonders hell, und die Helligkeit nimmt von hier aus im Allgemeinen nach den Rändern der Netzhaut hin gleichmäßig ab, nur die Stelle des directen Sehens zeichnet sich besonders durch geringe Helligkeit und eine mehr gelbliche Farbe vor ihrer Nachbarschaft aus, was bei der stärkeren Beleuchtung nicht der Fall ist. Der Grund davon ist wohl darin zu suchen, daß bei schwacher Beleuchtung nicht merklich viel Licht durch die Pigmentschicht hin und zurück geht, daher der wahrnehmbare Lichtreflex hauptsächlich von den Theilen der Netzhaut, namentlich ihren Gefäßen herrührt. Letztere fehlen an der Stelle des directen Sehens.

Die letztere Stelle zeigt bei beiden Beobachtungsweisen ein kleines lichtetes Fleckchen von querovaler Form, welches COCCIVS, der es zunächst bemerkte, als den Reflex der Netzhautgrube bezeichnet, während DONDERS später direct nachwies, daß dieser kleine Lichtreflex die Stelle des directen Sehens einnimmt.

Man muß zu diesem Versuche einen ebenen Spiegel anwenden, hinter welchem eine Concaulinse steht (DONDERS-EPKENS oder HELMHOLTZ). Als Gesichtsubject benutze man eine Lichtflamme oder das Mikrometer an DONDERS' Instrumente. Das beobachtete Auge sieht das gewählte Object im Spiegelbilde; man Sorge, daß es sich gehörig dafür accommodiren könne, und lasse es einen bestimmten Punkt des Objects fixiren. Der Beobachter erblickt dann ein ganz scharf gezeichnetes umgekehrtes Bild des Objects auf der Netzhaut des beobachteten Auges und an der direct fixirten Stelle den Reflex der Netzhautgrube. Sollte dieser zu schwach sein, um von Anfang her wahrgenommen zu werden, so geschieht dies leichter, wenn der Beobachter den Beobachteten bald auf diesen, bald auf jenen Theil des Gesichtsubjects seinen Blick zu richten heisst. Der kleine Reflex wandert dann dem entsprechend auf dem Netzhautbilde umher.

Um die Genauigkeit des Netzhautbildes zu prüfen, ist das von DONDERS an dem Augenspiegel von EPKENS angebrachte Mikrometer zweckmäßig zu gebrauchen. Für meinen Spiegel wähle ich zu dem gleichen Zwecke als Gesichtsubject einen vor einem Lichte in horizontaler Richtung ausgespannten Faden. Von verticalen feinen Linien giebt mein Instrument nämlich wegen der mehrfachen reflectirenden Flächen **mehrfache** 189 Bilder. Sobald das beobachtete Auge sich scharf für das betreffende Object accommodirt, erscheint es auch im Netzhautbilde ganz scharf. Sowie sich die Accommodation ändert, wird es verwaschen. Übrigens braucht man gar nicht so feine Objecte, um die Veränderung des Bildes bei der Accommodation zu sehen. Es genügt, wenn das beobachtete Auge nicht kurzsichtig ist, in der Ferne ein Licht aufzustellen, dessen Netzhautbild im beobachteten Auge man betrachtet, während dieses Auge abwechselnd nach einem fernen oder nahen Gesichtspunkte, die in gleicher Richtung liegen, hinblickt. Bei der Accommodation für die Ferne erscheint auch das Bild des fernen Lichts deutlich, bei der Accommodation für die Nähe wird es verwaschen. Meistens verschwinden dem Beobachter dabei auch die Netzhauttheile des beobachteten Auges, wenn er mit der Accommodation seines Auges der neuen Lage des Bildes nicht folgen kann, und er muß dann ein anderes Concavglas gebrauchen, um sich zu überzeugen, daß auf der deutlich gesehenen Netzhaut des beobachteten Auges ein undeutliches Bild des fernen Lichts entworfen sei. Der Versuch kann auch so abgeändert werden, daß das beobachtete Auge fortdauernd in die Ferne sieht, das Licht aber in die Nähe gebracht wird, damit sich der Beobachter überzeuge, daß von dem nahen Lichte ein undeutliches Bild entworfen werde.

**Historisch.** Das Augenleuchten ist seit ältester Zeit bekannt an den Augen von Hunden, Katzen und anderen Thieren, welche im Hintergrunde ihres Auges ein Tapetum, d. h. eine pigmentlose, mit stark reflectirenden dünnen Fasern oder Lamellen belegte Stelle haben. Bei diesen ist der Lichtreflex so stark, daß er unter einigermassen günstigen



Umständen leicht gesehen wird. Eine sehr allgemein verbreitete alte Meinung war es, daß die sogenannten leuchtenden Thieraugen Licht entwickeln sollten, namentlich wenn die Thiere gereizt würden, daher man denn geneigt war, diese angeblich vorhandene Lichtentwicklung dem Einflusse des Nervensystems zuzuschreiben. Man sieht das Leuchten der Thieraugen in dunklen Räumen am auffallendsten, wenn Licht von der Rückseite des Beobachters dicht neben seinem Kopfe vorbei in das Auge des Thieres fällt, und eben deshalb konnte den Beobachtern oft das wirklich einfallende Licht verborgen bleiben. Ebenso sollten die pigmentlosen Augen weißer Kaninchen und albinotischer Menschen durch eigene Lichtentwicklung leuchten. PREVOST<sup>1</sup> zeigte zuerst, daß das sogenannte Leuchten der Thieraugen niemals in vollkommener Dunkelheit und weder willkürlich noch durch Affecte hervorgebracht wird, sondern stets nur durch Reflexion von einfallendem Lichte entstehen kann. GRUTHUISEN<sup>2</sup> hat unabhängig hiervon dasselbe gefunden; er weist nach, daß das Tapetum daran Schuld sei, verbunden mit einer „außerordentlichen Brechung“ der Linse. Auch in den Augen todter Thiere sah er das Leuchten. Diese Thatfachen bestätigten RUDOLPHI<sup>3</sup>, J. MÜLLER<sup>4</sup>, ESSEN<sup>5</sup>, TIEDEMANN<sup>6</sup>, HASSENSTEIN<sup>7</sup>. RUDOLPHI macht darauf aufmerksam, daß man in einer bestimmten Richtung in das Auge sehen müsse, um das Leuchten wahrzunehmen. ESSEER erklärt richtig den Wechsel der Farbe daraus, daß verschiedene gefärbte Theile der Netzhaut durch die Pupille erblickt würden, HASSENSTEIN endlich findet, daß das Leuchten hervortritt, wenn die Augen in Richtung ihrer Axe comprimirt werden, und vermuthete, daß auch beim lebende Thiere das Leuchten willkürlich erregt werde, indem durch den Druck der Muskeln die Augenaxe verkürzt werde. Man erkannte also das Leuchten als ein Reflexphänomen an, ohne sich aber klar zu machen, von welchen Bedingungen das Leuchten oder Nichtleuchten abhinge.

An menschlichen Augen war das Leuchten früher nur bei seltenen Krankheitszuständen beobachtet worden, namentlich bei Geschwülsten im Hintergrunde des Auges. Auch bei Mangel der Iris hat BEHR<sup>8</sup> es gesehen und gefunden, daß die Augen des Beobachters fast ganz parallel mit den einfallenden Strahlen nach den Augen der Kranken blicken mußten, welches die Grundbedingung von BRÜCKES Methode, das Augenleuchten zu beobachten, ist. Das Leuchten ist in solchen Fällen von Irismangel auffallender, weil die Beleuchtung der Netzhaut viel stärker ist; außerdem fehlt die Accommodationsfähigkeit des Auges.

Endlich fanden W. CUMMING<sup>9</sup> und BRÜCKE<sup>10</sup> unabhängig von einander das Verfahren, gesunde menschliche Augen leuchtend erscheinen zu machen, indem der Beobachter den einfallenden Lichtstrahlen nahe parallel hineinblickt. Letzterer hat dieselbe Methode schon vorher auf die mit einem Tapetum versehenen Thieraugen angewendet. Endlich erwähnt WHARTON JONES<sup>11</sup>, daß BABBAGE ungefähr zu derselben Zeit ihm einen belegten Glasspiegel gezeigt habe, von dessen Belegung eine kleine Stelle weggenommen war, um Licht in das Auge zu werfen und durch die Öffnung hineinzusehen. Dies erinnert schon sehr an den Augenspiegel von COCCIVS; aber da BABBAGE keine Linsen mit seinem Spiegel verbunden zu haben scheint, so hat er höchstens ausnahmsweise von den Theilen der Netzhaut etwas erkennen können, und hat deshalb wohl seine Erfindung damals nicht veröffentlicht.

<sup>1</sup> PREVOST, *Biblioth. britannique*. 1810. T. 45.

<sup>2</sup> F. GRUTHUISEN, *Beiträge zur Physiognosie und Eutognosie*. S. 199.

<sup>3</sup> RUDOLPHI, *Lehrbuch der Physiologie*. I. 197.

<sup>4</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie d. Gesichtsinns*. Leipzig 1826. S. 49. — *Handbuch der Physiologie*. 4. Aufl. I. 89.

<sup>5</sup> ESSEER, *Kastners Archiv für die genannte Naturlehre*. Bd. VIII. S. 399.

<sup>6</sup> F. TIEDEMANN, *Lehrbuch der Physiologie*. S. 509.

<sup>7</sup> HASSENSTEIN, *De luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto lucido*. Jenae 1836.

<sup>8</sup> BEHR, *Heckers Annalen*. 1839. I. S. 373.

<sup>9</sup> W. CUMMING, *Medico-chirurgical Transactions*. XXIX. p. 284.

<sup>10</sup> E. BRÜCKE, *J. Müllers Archiv für Anat. u. Physiologie*. 1847. S. 225.

<sup>11</sup> WHARTON JONES, *Archives générales de Médecine*. 1854. II.

Die andere Seite der Frage, warum nämlich die Theile der Netzhaut, auch wenn sie beleuchtet sind, z. B. in Thieraugen mit Tapetum, in Augen von Albinos, dem Beobachter nicht erkennbar sind, ist öfter besprochen worden. Ihre Lösung lag mehr auf der Hand. Schon im Anfange des 18. Jahrhunderts hatte MÉRY<sup>1</sup> beobachtet, daß er bei einer Katze, die er unter Wasser getaucht hatte, in den Augen, welche stark leuchtend erschienen, die Netzhautgefäße erkennen konnte. LA HIRE<sup>2</sup> gab von diesem letzteren Umstande die richtige Erklärung. Daß eine veränderte Brechung der Strahlen nothwendig sei, um das Auge leuchtend erscheinen zu machen, sah er ein, aber eine nähere Erklärung weiß er nicht zu geben. Ebenso KUSSMAUL<sup>3</sup>. Letzterer zeigt, daß die Netzhaut hell und erkennbar werde, wenn man entweder vorn vom Auge die Hornhaut und Linse entfernt, oder etwas vom Glaskörper herausnimmt und dadurch die Augenaxe verkürzt.

Ich selbst<sup>4</sup> bin, so viel ich finde, der Erste gewesen, welcher sich den Zusammenhang zwischen den Richtungen der einfallenden und ausgehenden Strahlen klar machte, den wahren Grund für die Schwärze der Pupille und dadurch auch das Princip für die Construction der Augenspiegel fand. Zur Beleuchtung wendete ich ebene unbelegte Glasplatten an, zur Erkennung der Netzhaut Concavgläser. TH. RUEDE war dagegen der Erste, welcher einen durchbohrten Spiegel anwandte, und die Beobachtung durch Convexlinsen. Da das neue Instrument in kurzer Zeit eine außerordentliche Wichtigkeit in der Augenheilkunde erreichte, sind nachher noch eine große Zahl verschiedener Formen von Augenspiegeln construirt worden, von denen ich oben die wichtigsten aufgeführt habe. Wesentlich neue Principien für die Erleuchtung oder Erkennung der Netzhaut sind dabei aber nicht mehr gefunden worden.

Die von mir aufgestellte Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel hat keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Die Verbesserungen, welche STELLWAG VON CARION daran anzubringen gesucht hat, kann ich nicht als solche anerkennen. Dieser übrigens um die Einführung physikalischer Kenntnisse in seine Wissenschaft eifrig bemühte Augenarzt ist bei den hierher gehörigen Arbeiten durch falsche Grundprinzipien über die Stärke der Beleuchtung und Helligkeit durchaus irre geführt worden.

<sup>1</sup> J. MÉRY, *Annales de l'Acad. d. sc.* 1704.

<sup>2</sup> PH. DE LA HIRE, ebenda. 1709.

<sup>3</sup> KUSSMAUL, *Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges.* Heidelberg 1845.

<sup>4</sup> H. HELMHOLTZ, *Beschreibung eines Augenspiegels zur Beobachtung der Netzhaut im lebenden Auge.* Berlin 1851. — Ferner in *Vierordt's Archiv für physiol. Heilkunde.* II. 827.

## **Zweiter Abschnitt.**

### **Die Lehre von den Gesichtsempfindungen.**

#### **§ 17. Von der Reizung des Sehnervenapparates.**

Die Nervenapparate des menschlichen und thierischen Körpers werden <sup>191</sup> durch Einwirkung äußerer Agentien verschiedener Art in einen veränderten Zustand versetzt, den man einerseits an ihnen durch physikalische Hilfsmittel, nämlich durch die Untersuchung ihrer elektromotorischen Wirksamkeit erkennen kann, und der sich andererseits durch Wirkungen zu erkennen giebt, welche die Nerven in anderen mit ihnen organisch verbundenen Theilen des Körpers hervorbringen. So verräth sich dieser veränderte Zustand einiger Nerven durch Zusammenziehungen der mit ihnen verbundenen Muskeln; diese werden motorische Nerven genannt. Andere erregen unter denselben Umständen Empfindungen in dem Gehirne, als dem körperlichen Organe des Bewusstseins, und heißen deshalb sensible Nerven. Bei den motorischen Nerven ist nun der auffälligste Erfolg der verschiedenartigsten äußeren Einwirkungen, des Zerrens, Quetschens, Zerschneidens, des Brennens, Anätzens, der elektrischen Durchströmungen, immer die Zusammenziehung des zugehörigen Muskels, welche nur quantitative Unterschiede der Stärke zeigt. Man faßt deshalb die genannten verschiedenartigen Einwirkungen <sup>192</sup> in ihrem Verhältnisse zu den motorischen Nerven unter einen Namen, den der Reize, zusammen, indem man von ihren qualitativen Verschiedenheiten abstrahirt und sie nur nach der verschiedenen Stärke der Zuckungen, welche sie hervorbringen, quantitativ als stärker oder schwächer reizend von einander unterscheidet. Den veränderten Zustand im Nerven selbst, welcher in Folge der Einwirkung eines Reizes eintritt, nennt man die Reizung, und die Fähigkeit des Nerven, nach Einwirkung von Reizen Muskelzuckungen hervorzubringen, die Reizbarkeit. Diese Fähigkeit kann durch Absterben und mancherlei äußere Einwirkungen beeinträchtigt werden.

Bei den sensiblen Nerven läßt sich das Schema dieser Begriffe noch insofern wieder anwenden, als auch in ihnen die äußeren Einwirkungen, welche, auf einen motorischen Nerven angewendet, Zuckungen hervorzubringen vermögen, wiederum alle eine andere Wirkung eigenthümlicher Art, nämlich eine Empfindung hervorrufen, so lange der Nerv noch nicht abgestorben und vom Gehirn getrennt ist. Aber allerdings tritt hier schon der wesentliche Unterschied ein, daß die Empfindung qualitative Unterschiede zeigt, entsprechend den qualitativen Unterschieden der Einwirkung. Indessen, wenn auch verschiedene Reize verschiedene Empfindungen hervorrufen, so sind die Wirkungen der Reize doch immer Empfindungen, also immer Wirkungen, von einer sonst nicht vorkommenden, dem lebenden Körper eigenthümlichen Art, und eben deshalb hat man den zuerst für die Verhältnisse der motorischen Nerven abstrahirten Begriff der Reize und der Reizung auch auf die der sensiblen Nerven übertragen, und man nennt deshalb ebenso die äußeren Einwirkungen, welche auf lebende sensible Nerven angewendet die Entstehung von Empfindungen veranlassen, Reize, die im Nerven eingetretene Veränderung selbst die Reizung.

Der Zustand der Reizung, welcher an jeder Stelle einer Nervenfasern durch Einwirkung von Reizen eingeleitet werden kann, pflanzt sich stets auch auf alle anderen Theile der Nervenfasern fort, und giebt sich auch in diesen theils durch die veränderten elektromotorischen Wirkungen zu erkennen, theils durch seinen Einfluß auf die anderen organischen Gebilde, Muskeln, Gehirn, Drüsen u. s. w., mit denen der Nerv verbunden ist, indem Zusammenziehung des Muskels, oder Empfindung, oder vermehrte Absonderung der Drüse eintritt. Nur wo eingreifende Veränderungen der Structur des Nerven durch mechanische oder chemische Eingriffe, durch Gerinnung des Inhalts der Nervenfasern beim Absterben eingetreten sind, findet die Fortleitung der Reizung ein Hinderniß. Jeder Stelle einer unverletzten Nervenfasern kommt deshalb nicht bloß Reizbarkeit, d. h. die Fähigkeit, in Reizung versetzt zu werden, sondern auch Leitungsfähigkeit für die Reizung zu. Eine Trennung beider Fähigkeiten ist noch nicht beobachtet worden. Übrigens sind bisher noch keine Unterschiede in der Structur und Function der sensiblen und motorischen Fasern bekannt, welche nicht von ihrer verschiedenen Verbindung mit anderen organischen Systemen hergeleitet werden könnten. Die Fasern selbst scheinen nur die Rolle indifferenten leitender Fäden zu spielen, die, je nachdem sie mit einem Muskel oder mit empfindenden Gehirntheilen organisch verbunden sind, als motorische oder sensible Nerven wirken.

- 193 Die Empfindungen des Menschen zerfallen ihrer Qualität nach in fünf Gruppen, welche den sogenannten fünf Sinnen entsprechen, in der Weise, daß nur die Qualitäten derjenigen Empfindungen unter einander vergleichbar sind, welche dem Qualitätskreise desselben Sinnes, nicht aber solche, welche zwei verschiedenen Sinnen angehören. So können wir z. B. zwei verschiedene

Empfindungen, die dem Gesichtssinne angehören, nach Lichtintensität und Farbe vergleichen, aber keine von ihnen mit einer Tonempfindung oder Geruchsempfindung.

Die physiologische Erfahrung hat, soweit Prüfung möglich war, gefunden, daß durch Reizung jeder einzelnen sensiblen Nervenfasern nur solche Empfindungen entstehen können, welche dem Qualitätenkreise eines einzigen bestimmten Sinnes angehören, und daß jeder Reiz, welcher diese Nervenfasern überhaupt zu erregen vermag, nur Empfindungen dieses besonderen Kreises hervorruft. Vollständig experimentell beweisen läßt sich der Satz nur für solche Nervenfasern, die in besonderen Nervenstämmen, getrennt von allen Fasern, die anderen Sinnen angehören, zusammenliegen, wie die des Gesichtssinnes im *Nervus opticus*, die des Gehörs im *Nervus acusticus*, die des Geruchs im *Nervus olfactorius*, die des Tastsinns in den hinteren Rückenmarkswurzeln. Läßt man auf diese Nervenstämmen verschiedene Reizmittel einwirken, so entstehen zwar verschiedene Empfindungen, aber nur Empfindungen, die dem Qualitätenkreise des betreffenden Sinnes angehören. Für solche sensible Nervenfasern dagegen, die mit Fasern anderer Art in demselben Stamme verlaufen, wie die Geschmacksnerven mit Tastnerven der Zunge im *Nervus glossopharyngeus* und *lingualis* vereinigt sind, läßt sich dasselbe Verhältniß wenigstens daraus wahrscheinlich machen, daß in Krankheitszuständen zuweilen isolirt Lähmung der Geschmacksempfindungen allein ohne Lähmung der Tastempfindungen oder umgekehrt vorkommt, und auch daraus, daß alle anderen Tastnerven der Fähigkeit, Geschmacksempfindungen zu vermitteln, ermangeln.

Dem Kreise des Gesichtssinns gehören die Lichtempfindungen an, welche alle unter sich in Bezug auf Lichtstärke und Farbe vergleichbar sind. Denjenigen Theil der Nervenmasse des Körpers, durch dessen Reizung dergleichen Empfindungen entstehen können, nennen wir nach J. MÜLLER die Sehsinnssubstanz, oder auch wohl den Sehnervenapparat. Dazu gehört die Netzhaut, der Sehnerv und ein begrenzter Theil des Gehirns, in welchen die Wurzelfaserungen des Sehnerven eintreten. Kein anderer Nervenapparat des Körpers kann Lichtempfindung, d. h. eine Empfindung von derselben Qualität wie der Sehnervenapparat vermitteln, obgleich die leuchtenden Ätherschwingungen auch durch die Tastnerven wahrgenommen werden können, aber freilich in einer ganz anderen Empfindungsqualität, nämlich als Empfindung strahlender Wärme. Es findet hier dasselbe statt, wie bei den Luftschwingungen, welche der Hörnerv als Ton empfindet, während sie gleichzeitig in der Haut die Tastempfindung des Schwirrens erregen, dasselbe wie bei dem Essig, den die Zunge als sauer schmeckt, und der in einer entblößten Hautstelle oder auf einer zarten Schleimhaut, wie die Bindehaut des Auges ist, durch eine Tastempfindung, nämlich durch schmerzhaftes 194 Brennen, sich bemerklich macht.

Andererseits können nicht blos die leuchtenden Ätherschwingungen den Sehnervenapparat erregen, sondern auch mannigfache andere Reizmittel, namentlich mechanische Einwirkungen und elektrische Ströme, welche ja auch alle anderen Nervenapparate des Körpers in den Zustand von Reizung zu versetzen vermögen. Wenn aber diese Reize den Sehnerven oder die Netzhaut treffen, bringen sie immer nur Gesichtsempfindungen hervor, nicht Gehörs- oder Geruchsempfindungen, und wenn sie etwa gleichzeitig Tastempfindungen erregen, so müssen wir voraussetzen, daß dies geschieht, weil sich im Auge und vielleicht selbst in der Masse des Sehnerven, wie in allen inneren Theilen des Körpers, auch besondere Tastnerven verbreiten. Diese Tastempfindungen, welche durch Einwirkung von Druck oder Elektrizität auf das Auge entstehen, unterscheiden sich übrigens noch dadurch von den gleichzeitig erregten Lichtempfindungen, daß jene am Orte der Reizung wahrgenommen werden, letztere dagegen von der Vorstellung als helle Objecte in das Gesichtsfeld verlegt werden. Wir kommen darauf bei der genaueren Beschreibung der mechanischen Reizung des Auges noch einmal zurück.

Da es sich mit den übrigen Sinnesnerven ebenso verhält, so geht daraus hervor, daß die Qualität der sinnlichen Empfindung hauptsächlich von der eigenthümlichen Beschaffenheit des Nervenapparats abhängt, erst in zweiter Linie von der Beschaffenheit des wahrgenommenen Objects. Zu dem Qualitätenkreise welches Sinnes die entstehende Empfindung gehört, hängt sogar gar nicht von dem äußeren Objecte, sondern ausschließlich von der Art des getroffenen Nerven ab. Welche besondere Empfindung aus dem betreffenden Qualitätenkreise hervorgerufen wird, erst dies hängt auch von der Natur des äußeren Objectes ab, welches die Empfindung erregt. Ob uns die Sonnenstrahlen als Licht- oder Wärmestrahlung erscheinen, hängt nur davon ab, ob wir sie durch den Sehnerven oder durch die Hautnerven empfinden; ob sie aber als rothes oder blaues, schwaches oder starkes Licht, sengende oder milde Wärme erscheinen, hängt gleichzeitig von der Art der Strahlen, wie von dem Zustande des Nervenapparates ab. Die Qualität der Sinnesempfindung ist also keineswegs identisch mit der Qualität des Objects, durch welche sie hervorgerufen wird, sondern sie ist in physischer Beziehung nur eine Wirkung der äußeren Qualität auf einen besonderen Nervenapparat, und für unsere Vorstellungen ist die Qualität der Empfindung gleichsam nur ein Symbol, ein Erkennungszeichen für die objective Qualität.

Das erste und hauptsächlichste Reizmittel des Sehnerven ist das objective Licht. Ich nenne es das erste und hauptsächlichste, weil es bei weitem häufiger und anhaltender auf den Sehnerven einwirkt, als andere Reize, und weil demgemäß auch fast nur die durch objectives Licht hervorgerufenen Empfindungen des Sehnervenapparates zur Wahrnehmung äußerer Objecte verwendet werden. Eine besondere specifische Beziehung oder Homogenität zwischen dem objectiven Lichte und dem Nervenagens der Sehnerven, wie sie von älteren Philosophen und Physiologen meist vorausgesetzt

wurde, brauchen wir deshalb nicht anzunehmen. Denn weder ist der Sehnerv der einzige Nerv, welcher durch objectives Licht gereizt wird — auch die 195 Hautnerven können es werden — noch ist das objective Licht das einzige Reizmittel des Sehnerven. Dafs es das häufigste, und deshalb wichtigste ist, erklärt sich einfach aus der geschützten Lage des Sehnerven und der Netzhaut, die dem Lichte sehr leicht, mechanischen Eindrücken und elektrischen Strömungen viel schwerer zugänglich sind. Diese überwiegende Häufigkeit und Wichtigkeit der Reizung durch objectives Licht hat nun auch die Menschen bestimmt, denjenigen Theil der Ätherschwingungen, welche Lichtempfindung zu erregen im Stande ist, mit dem Namen Licht zu belegen, welcher eigentlich nur der dadurch erregten Empfindung zukommen sollte. Man schied die Sonnenstrahlen in Sonnenlicht und Sonnenwärme, nach den beiden Empfindungsweisen, welche sie zu erregen im Stande sind. So lange die Menschen über die Natur ihrer Sinnesempfindungen nicht weiter nachgedacht hatten, mußten sie geneigt sein, die Empfindungsqualitäten unmittelbar auf die äußeren Dinge zu übertragen, und so in den Sonnenstrahlen zwei, den zwei Empfindungen entsprechende Objecte voraussetzen. Man wufste außerdem zunächst über die Sonnenstrahlen weiter nichts, als was die Empfindung aussagte, und man beobachtete neben solchen Strahlungen, bei denen, wie in den Sonnenstrahlen, die schneller schwingenden Wellenzüge überwiegen, die das Auge viel stärker afficiren als die Haut, andere, in denen die langsameren Oscillationen überwiegen, und die die Haut kräftig, das Auge schwach oder gar nicht afficiren, so dafs auch objectiv eine Trennung beider Agentien vorzukommen schien. Erst in der neuesten Zeit hat eine sorgfältige Untersuchung der von unseren Nervenapparaten unabhängigen Eigenschaften der leuchtenden und nicht leuchtenden Wärmestrahlen die Physiker überzeugt, dafs zwischen ihnen kein anderer Unterschied als der der Schwingungsdauer besteht, und hat dadurch die Physik von dem Einflusse, den die Sinnesempfindungen in diesem Falle so lange unberechtigter Weise ausgeübt hatten, befreit. Die nähere Besprechung des objectiven Lichtes als Reizmittel der Netzhaut bleibt den nächstfolgenden Paragraphen vorbehalten.

Die Erscheinungen bei mechanischer Reizung des Sehnervenapparates sind nach der Ausdehnung der Reizung verschieden. Bei einem plötzlichen Schlag oder Stofs auf das Auge entsteht ein blitzähnlich erscheinender und wieder verschwindender, oft sehr heller Lichtschein über das ganze Gesichtsfeld hin. Älteren irrthümlichen Erklärungen dieser Erscheinung gegenüber mag hier hervorgehoben werden, dafs wenn dies im Dunkeln geschieht, ein anderer Beobachter dabei in dem Auge des Getroffenen keine Spur von objectivem Lichte erblickt, so lebhaft auch der subjective Blitz sein mag, und dafs es ebenso wenig möglich ist, durch diese subjective Erleuchtung des dunkeln Gesichtsfeldes irgend etwas von den wirklichen Objecten der Außenwelt zu erkennen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ueber einen gerichtlichen Fall, wo Jemand im Finstern einen Schlag auf das Auge bekommen und bei dem dadurch erregten Lichtschein den Angreifer erkannt haben will, s. J. MÜLLER, *Arch. f. Anat.* 1834. S. 140.

196 Besser untersuchen läßt sich die Wirkung beschränkten Druckes. Wenn man irgendwo am Rande der Augenhöhle mit einer stumpfen Spitze, z. B. der des Fingernagels, gegen den Augapfel drückt, so entsteht eine Lichterscheinung, Druckbild oder Phosphen, und zwar an derjenigen Stelle des Gesichtsfeldes, welche der gedrückten Stelle der Netzhaut entspricht. Wenn man oben drückt, erscheint also der helle Fleck an der unteren Grenze des Gesichtsfeldes, drückt man am äußeren Augenwinkel, so erscheint er am Nasenrücken, drückt man unten oder innen, so erscheint er oben oder außen. Wenn der drückende Körper nicht breit ist, hat die Erscheinung gewöhnlich ein helles Centrum, umgeben von einem dunklen und einem hellen Kreise, Ich finde, daß sie am hellsten ist, wenn der Druck etwa den Äquatorialumfang des Auges trifft, wo die Sclerotica am dünnsten ist. Das Druckbild erscheint dann an der Grenze des dunkeln Gesichtsfeldes als eine helle Bogenlinie, etwa halbkreisförmig. Es ist unter diesen Umständen ziemlich weit von dem Gesichtspunkte (dem am genauesten gesehenen Punkte des Gesichtsfeldes, welcher dem gelben Fleck entspricht) entfernt, und fällt deshalb, wenn man die Augen öffnet, mit dem Bilde äußerer Gegenstände zusammen, die nur undeutlich wahrgenommen werden. Doch erkennt man bei einiger Übung im indirecten Sehen, namentlich wenn sich auffallend helle Gegenstände am scheinbaren Orte des Druckbildes befinden, daß die Objecte in der Gegend des Druckbildes Verzerrungen (wegen der Einbiegung der Sclerotica und Retina) erleiden, und oft auch stellenweise verdunkelt werden. Man kann aber das Druckbild auch dem Gesichtspunkte näher bringen, wenn man das Auge stark nach innen wendet, während man außen drückt oder stark nach außen wendet, während man am inneren Augenwinkel drückt, dabei wird es ein wenig schwächer, weil die hintere Fläche der Sclerotica dem Drucke größeren Widerstand leistet. Einzelnen Personen (z. B. THOMAS YOUNG) gelingt es auch wohl durch Druck am äußeren Augenwinkel das Druckbildchen bis an die Stelle des directen Sehens vorzubringen. Mir gelingt dies nicht, doch kommt das Druckbildchen dem Gesichtspunkte so nahe, daß ich wahrnehmen kann, wie in seinem Centrum die Bilder der äußeren Gegenstände verschwinden. In *Fig. 8, Taf. I.* ist das Druckbild dargestellt, wie es mir erscheint, wenn ich zwischen Auge und Nase ein weißes Papierblatt gegen das Gesicht stelle, das Auge möglichst nach der inneren Seite wende, und mit einer stumpfen Spitze am äußeren Rande der Augenhöhle drücke. *N* bezeichnet die Nasenseite; das Druckbild besteht aus einem dunkeln Flecke, von einem hellen senkrechten Streifen durchzogen. Von dem dunkeln Flecke geht, wenn man in richtiger Höhe drückt, ein horizontaler Fortsatz aus, dessen Spitze bei *a* den Fixationspunkt berührt, und außerdem ist in der Gegend des Sehnerveneintritts ein unbestimmt gezeichneter Schatten *b* sichtbar. Wie man die Stelle des Sehnerveneintritts im Gesichtsfelde erkennen kann, wird in § 18 auseinandergesetzt werden. Ein System feiner paralleler bogenförmiger Linien zwischen dem dunkeln Druckbilde und dem Gesichtspunkte hat schon PURKINJE bemerkt und ab-



gebildet. Ich sehe sie nicht so ausgebildet, wie er sie abbildet, am besten, wenn die Helligkeit der entsprechenden Stelle des Gesichtsfeldes groß ist.

Im dunkeln Gesichtsfelde dagegen erscheint eine helle gelbliche Kreisfläche, in deren Innerem sich zuweilen ein dunkler Fleck oder ein dunkler Ring abzeichnet. Ein schwaches Licht erscheint auch an der Eintrittsstelle des Sehnerven, sodass die Erscheinung ungefähr der *Fig. 8, Taf. I.* entspricht, wenn man Hell und Dunkel vertauscht denkt. Nur den Fortsatz <sup>197</sup> zum gelben Fleck hin habe ich im dunkeln Felde nicht sehen können.

Wieder anders sind die Erscheinungen, wenn man längere Zeit einen mäßigen Druck gleichmäßig auf den Augapfel wirken lässt, indem man ihn von vorn her entweder mit den weichen Stellen der Handwurzel oder mit den zusammengelegten Fingerspitzen einer Hand drückt. Nach kurzer Zeit treten dann sehr glänzende und wechselnde lichte Figuren im Gesichtsfelde auf, die ein wunderliches, phantastisches Spiel vollführen und oft den glänzendsten kaleidoskopischen Darstellungen, wie sie in neuerer Zeit mit Hilfe des elektrischen Lichts entworfen werden, ähnlich sind. PURKINJE hat diese Erscheinungen sehr genau verfolgt, beschrieben und abgebildet; sie scheinen in seinen Augen eine große Regelmäßigkeit gehabt zu haben. Meist zeigten sich auf einem mit feinen Vierecken regelmäßig gemusterten Grunde entweder achtstrahlige sternförmige Figuren, oder dunkle oder helle rhombische Flächen, deren Diagonalen vertical und horizontal gerichtet waren, und die von abwechselnd hellen und dunkeln Bändern umgeben waren. Bei mir selbst finde ich keine solche Regelmäßigkeit der Figuren; der Grund des Gesichtsfeldes ist meist anfangs fein gemustert, aber in den mannigfaltigsten Weisen und mit den verschiedensten Farben, sehr oft als wären sehr viele feine Blättchen oder Moosstengel ausgestreut, ein anderes Mal erscheinen allerlei Vierecke, hell braungelb, mit dunkeln griechischen Linienmustern, zuletzt entwickeln sich meist auf braungelbem Grunde dunkle Liniensysteme, die zuweilen sehr verwickelte sternförmige Figuren, zuweilen nur ein unentwirrbares labyrinthisches Knäuel bilden, und in fortdauernder schwankender oder strömender Bewegung begriffen sind. Außerdem pflegen sich sehr helle blaue oder rothe Funken in einzelnen Stellen des Feldes längere Zeit zu erhalten. Lässt man mit dem Drucke nach, wenn die Erscheinung im größten Glanze entwickelt ist, ohne daß äußeres Licht in das Auge dringt, so dauert das Spiel ähnlicher Figuren noch eine Zeit lang fort, und verschwindet, allmählig dunkler werdend. Öffnet man dagegen das Auge, indem man mit dem Drucke nachläßt, gegen helle äußere Objecte, so herrscht im ersten Momente Dunkelheit, dann werden allmählig in der Mitte des Gesichtsfelds einzelne helle Objecte, aber mit intensivem Glanze sichtbar. So sehe ich z. B. einzelne weiße Papierblätter in ihrer wahren Gestalt in blendender Helligkeit auftauchen, auf ihnen aber noch Reste des vorher vorhandenen Figurenmusters sichtbar, dessen dunkle Theile hier hell erscheinen. Allmählig verliert sich dann die abnorme Helligkeit in demselben Maße, wie es die Druckbilder vor dem geschlossenen Auge thun, aber

noch längere Zeit unterscheidet sich das gedrückte Auge von dem andern dadurch, daß ihm das Gesichtsfeld mehr violett erscheint, dem ungepressten Auge dagegen gelblich. VIERORDT und LAIBLIN berichten, bei anhaltendem Druck auf das Auge die Verästelungen der Gefäße der Netzhaut roth auf dunklem Grunde gesehen zu haben, was ich bisher vergebens versucht habe. Außerdem erscheinen VIERORDT die Retinalgefäße dabei häufig in einer bläulich glänzenden Färbung. Ferner haben sie, wie auch früher STEINBACH und PURKINJE, ein Gefäßnetz mit strömendem Inhalte gesehen. Letzterer erklärte es für das venöse Adernetz der Retina; LAIBLIN schließt aus seinen 198 Beobachtungen, da es neben den vorher erwähnten Retinalgefäßen sichtbar war, daß die wahrgenommene Circulation „einer anderen gefäßreicheren mehr nach außen gelegenen Retinalschicht“ angehören müsse. MEISSNER und mir selbst ist es nie gelungen, unter den Druckbildern des Auges außer zuweilen aufblitzenden Zügen der bekannten Aderfigur der Netzhaut etwas einem Gefäße Ähnliches zu sehen, und wenn ich auch als Schlufsstadium fast immer labyrinthische Liniensysteme in strömender Bewegung sehe, so ist deren Anordnung doch mit keinem Gefäßnetze zu vergleichen. Zu bemerken ist übrigens für die Theorie dieser Erscheinungen, daß nach den von DONDERS mit dem Augenspiegel ausgeführten Untersuchungen durch Druck auf das Auge allerdings Veränderungen in den Netzhautgefäßen eintreten, indem zuerst die Venen zu pulsiren anfangen und später das Blut aus ihnen sich ganz entleert. Diese veränderten Zustände der Gefäße mögen von manchen Augen empfunden werden können. Sonst möchte ich die unruhigen und wechselnden Bilder, welche durch anhaltenden Druck im Auge erzeugt werden, mit dem Gefühle des Ameisenlaufens vergleichen, welches in eingeschlafenen Gliedern, deren Nervenstämme längere Zeit einem Drucke ausgesetzt gewesen sind, eintritt. Wenn wir, schief auf einer Hüfte sitzend, den Hüftnerven drücken, verliert bald der Fuß und Unterschenkel die Fähigkeit, Berührung äußerer Objecte zu empfinden; dagegen tritt ein heftiges Kriebeln in den taub gewordenen Theilen der Haut ein, welches in ähnlicher Weise schnell wechselnde Erregungen der empfindenden Nervenfasern verräth, wie sie bei dem entsprechenden Zustande der Netzhaut sich durch die wechselnden feinen Figuren im Gesichtsfelde zeigen. Wenn dann der Druck nachläßt, sind bei wiederkehrender Fähigkeit äußere Objecte wahrzunehmen, die ersten Berührungen des Fußes oft schmerzhaft, während das Auge äußere Gegenstände in blendendem Lichte wahrnimmt.

Ein anderes Phänomen, was einer mechanischen Reizung der Netzhaut anzugehören scheint, sind gewisse lichte Flecke, welche empfindliche Augen im dunkeln Gesichtsfelde sehen, wenn sie eine schnelle Bewegung des Auges vollführen. In *Taf. I, Fig. 9*, sind sie abgebildet, wie sie im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beider Augen mir erscheinen, wenn die Augen in Richtung des Pfeils nach links hin bewegt worden sind. Das mit *L* bezeichnete gehört dem linken, das andere dem rechten Auge an. Die Erscheinung ist in dem nach einwärts bewegten Auge, hier dem rechten, weniger entwickelt

als in dem nach auswärts bewegten. Ich selbst sehe sie nur des Morgens gleich nach dem Erwachen, oder bei Unwohlsein; andere Beobachter, wie PURKINJE und CZERMAK<sup>1</sup>, sehen sie zu jeder Tageszeit im Dunkeln als feurige Ringe oder Halbringe. Ihre Entfernung vom Gesichtspunkte ist eine solche, daß ein Beobachter, der die später zu beschreibenden Phänomene des sogenannten blinden Flecks gut kennt, daraus schließen kann, daß sie der Eintrittsstelle des Sehnerven angehören. Sie entstehen also wahrscheinlich dadurch, daß bei schnellen Bewegungen des Auges der Sehnerv vom Augapfel mit in Bewegung gesetzt und an seiner Eintrittsstelle 199 gezerzt wird. PURKINJE<sup>2</sup> sieht an der Eintrittsstelle des Sehnerven auch dauernd einen lichten Ring, wenn er das Auge stark nach innen wendet, nach der Mitte des Gesichtsfeldes umgeben von concentrischen hellen Streifen, während bei mir die Erscheinungen nur immer momentan auftauchen. Stellt man den Versuch mit offenem Auge vor einer weißen gleichmäßig beleuchteten Fläche an, so erscheinen bei starker Drehung des Auges dunkle Flecken dem Sehnerveneintritt entsprechend, die, wie CZERMAK bemerkt, beim Drehen nach innen leichter eintreten, und eine regelmäsigere Kreisform annehmen als beim Drehen nach außen. In dem rötlichen Felde, welches die geschlossenen und von außen beleuchteten Augenlider geben, erscheinen diese dunkeln Flecke blau. Ich selbst erkenne übrigens auch in den dunkeln Flecken Spuren derselben Ährenform, welche die Lichterscheinung im dunkeln Felde zeigt, während CZERMAK hervorhebt, daß bei ihm letztere Erscheinung nicht das negative Abbild der ersteren sei. Auch hier scheinen also die gereizten Nervenfasern ihre Empfindlichkeit gegen äußere Reize durch die Zerrung zu verlieren. Als gereizt muß man in diesem Falle wohl die Fasern betrachten, die in unmittelbarer Nähe des Sehnervenden, da die Eintrittsstelle des Sehnerven selbst gegen Lichtreiz unempfindlich ist, und daher nicht zu erwarten ist, daß dort irgend welche der Lichtempfindung fähige Fasern enden, bei deren Reizung eine Lichtempfindung gerade an diese Stelle des Gesichtsfeldes verlegt werden könnte. Endlich ist hierher auch wohl das von PURKINJE<sup>3</sup> und CZERMAK<sup>4</sup> beobachtete Accommodationsphosphen zu rechnen. Wenn man im Finstern die Augen für das Sehen in nächster Nähe einrichtet und dann plötzlich wieder für die Ferne accommodirt, so bemerkt man nahe an der Peripherie des Gesichtsfeldes einen ziemlich schmalen feurigen Saum, welcher, ringförmig in sich selbst zurücklaufend, in dem Momente aufblitzt, wo man mit der fühlbaren Anstrengung fürs Nahesehen nachläßt. PURKINJE sah die Erscheinung auch bei plötzlichem Nachlaß gleichmäßigen Drucks auf das Auge. Ich selbst habe sie früher nicht, neuerdings zuweilen undeutlich sehen können. CZERMAK erklärt sie dadurch, daß im Momente, wo der Zug des Ciliarmuskels

<sup>1</sup> J. CZERMAK, *Physiologische Studien*. Abtheilung I. § 5. S. 42 u. Abth. II. S. 32. — *Wiener Sitzungsber.* 54.

<sup>2</sup> J. E. PURKINJE, *Beiträge zur Kenntniss des Sehens*. S. 78.

<sup>3</sup> J. E. PURKINJE, *Zur Physiologie der Sinne*. Bd. I. 126. II. 115.

<sup>4</sup> J. CZERMAK, *Wiener Sitzungsber.* XXVII. 78.

nachläßt, die erschlaffte Zonula sich wieder spannt, während die Linse noch in radialer Richtung verkürzt ist und dadurch eine plötzliche Zerrung des äußersten Randes der Netzhaut eintritt, dessen Ende mit der Zonula verklebt ist.

Accommodire ich stark für die Nähe, während das Auge nach einer gleichmäßig erleuchteten weißen Fläche gekehrt ist, so entsteht im Fixationspunkte ein schattiger Fleck, am Rande braun abschattirt, von dem auch wohl braune oder hell violette Streifen sich nach verschiedenen Seiten hinziehen. Dann pflegt sich das Gesichtsfeld schnell zu verdunkeln, während netzförmige Zeichnungen und Theile der Aderfigur, dunkel auf weißem Grunde darin sichtbar werden. Bei Nachlaß der Accommodation für die Nähe schwindet alles. PURKINJE beschreibt den braunen Fleck, sah aber 200 dessen Centrum weiß. Hierher gehört auch ein elliptischer gefleckter Lichtschein, den PURKINJE<sup>1</sup> bei dunklem Gesichtsfelde erblickte, wenn er mit dem Druck der Augenlider plötzlich nachließ. Damit die Erscheinung zu Stande kam, war es nöthig, daß kurz vorher äußeres Licht auf das Auge gewirkt hat. Ich selbst kann sie nicht sehen.

Durchschneidung und Zerrung der bloßgelegten Sehnerven bei Hunden ruft keine Schmerzensäußerungen hervor, während die gleichen Verletzungen ebenso starker Hautnervenstämmen die allerheftigsten Schmerzen erregen. Beim Menschen wird durch krebsige Entartungen des Auges zuweilen die Exstirpation des Augapfels nöthig. Wenn der Sehnerv in solchen Fällen noch nicht selbst entartet ist, werden im Augenblicke der Durchschneidung des Sehnerven große Lichtmassen gesehen<sup>2</sup>, während die Kranken dabei etwas größeren Schmerz haben, als bei der Durchschneidung der übrigen benachbarten Theile. Daß die Durchschneidung des Sehnerven ganz ohne solchen Schmerz, wie ihn die Tastnerven empfinden, vor sich gehen sollte, dürfen wir nicht erwarten, da wenigstens die übrigen größeren Nervenstämmen ihre *Nervi nervorum* haben, besondere empfindende Fasern, die ihnen ebenso gut zukommen, wie allen übrigen inneren Theilen des Körpers, und welche ihre örtliche Empfindlichkeit vermitteln. Bei den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven, durch welche nur motorische Fasern aus dem Rückenmark austreten, kann man nachweisen, daß solche *Nervi nervorum* ihnen aus den hinteren sensiblen Wurzeln zugeschickt werden. Wenn der *Nervus ulnaris* hinter dem inneren Ellenbogenhöcker gestossen wird, giebt sich die Reizung der durchlaufenden Fasern des Nerven durch einen Schmerz kund, der scheinbar im Verbreitungsbezirke des Nerven am fünften und vierten Finger stattfindet, während ein anderer Schmerz an der gestossenen Stelle selbst, welcher unangenehmer ist, als wenn nur die Haut getroffen wäre, den Nerven des Nervenstammes zugeschrieben werden muß. Ebenso fühlen wir, indem wir am äußeren Augenwinkel den Augapfel drücken, örtlich den

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, *Zur Physiologie der Sinne*. II. 78.

<sup>2</sup> TOURNAI in *J. Müller's Handbuch der Physiologie*. Coblenz 1840. Bd. II. S. 239.

Schmerz des Druckes mittels der empfindenden Nerven dieser Stelle, und sehen einen Lichtschein, den wir in die Gegend des Nasenrückens verlegen. Etwas Ähnliches kann bei der Reizung des Sehnervenstammes vorkommen.

Dafs der Sehnerv und die Netzhaut, welche fähig sind ein so feines Agens, wie das Licht ist, zu empfinden, gegen die gröbste mechanische Mißhandlung ziemlich unempfindlich bleiben, d. h. keinen in das Gebiet der Tastempfindungen gehörigen Schmerz empfinden, erschien früher als ein wunderbares Paradoxon. Die Lösung ergibt sich einfach daraus, dafs die Qualität aller Empfindungen des Sehnerven in den Kreis der Lichtempfindungen gehört. Es fehlt ihm also nicht die Empfindlichkeit, aber die Form der Empfindung ist eine andere.

Sehr mannigfaltig ist ferner das Gebiet der Lichtempfindungen aus inneren Ursachen. Es gehören dahin eine Menge von Lichterscheinungen im Gesichtsfelde, welche in allerlei Krankheitszuständen des Auges oder des ganzen Körpers auftreten, bald über das ganze Feld ergossen, bald räumlich begrenzt, und im letzteren Falle bald in Form unregelmäßiger Flecken, bald als Phantasmen, Menschen, Thiere u. s. w. nachahmend. Vielfach mögen dabei mechanische Ursachen mitwirken, vermehrter Druck des Blutes in den Gefäfsen oder der Augenflüssigkeiten; so sieht man beim Nachlasse gleichmäßigen Drucks auf den Augapfel häufig Stücke der Gefäfsfigur aufblitzen, oder sieht nach heftigen Anstrengungen theils einzelne pulsirende Stellen, theils gröfsere Stücke der Gefäfsfigur<sup>1</sup>. In anderen Fällen mag es eine Art chemischer Reizung durch veränderte Zusammensetzung des Blutes sein, z. B. im Falle narkotischer Vergiftungen. Endlich sind manche von diesen Erscheinungen auch wohl zu erklären durch Ausbreitung des Reizungszustandes innerhalb der Centraltheile von anderen Theilen des Nervensystems auf die Wurzeln des Sehnerven. Übertragung der Reizung von einem ursprünglich erregten empfindenden Nerven auf einen anderen solchen Nerven, der von keinem äufseren Einflusse getroffen ist, nennen wir Mitempfindung. So erregt der Anblick grofser heller Flächen, z. B. von der Sonne beleuchteter Schneefelder, bei vielen Personen gleichzeitig Kitzel in der Nase, oder das Hören gewisser kratzender und quiekender Töne ein Kältegefühl, welches längs des Rückens herabläuft. Dergleichen Mitempfindungen scheinen auch im Sehnervenapparate vorkommen zu können, wenn andere Empfindungsnerven erregt sind, z. B. die des Darms durch Eingeweidewürmer bei Kindern oder durch aufgehäuften Darmcontenta, Blutstockungen und andere Abnormitäten bei Hypochondern. Eigentliche Phantasmen, d. h. Lichtbilder, welche das Ansehen bekannter Objecte der Außenwelt an sich tragen, scheinen durch eine ähnliche Übertragung des Erregungszustandes von den bei der Bildung von Vorstellungen thätigen Theilen des Gehirns auf den Sehnervenapparat entstehen zu können. Es sind dergleichen gesehen worden

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, *Zur Physiologie der Sinne*. I. 134. II. 115, 118. — *Subjective Erscheinungen nach Wirkung der Digitalis*. II. 120.

von vielen Beobachtern, welche sich, während sie es sahen, der subjectiven Natur des Phantasma durchaus bewußt waren<sup>1</sup>. Einige, wie GOETHE und J. MÜLLER, konnten sogar zu jeder Zeit, wenn sie lange in das dunkle Gesichtsfeld der geschlossenen Augen hineinsahen, dergleichen Erscheinungen sehen. AUBERT<sup>2</sup> beschreibt ebenfalls Phantasmen, die durch Vorstellungen erregt werden, ohne doch in ihrem Inhalt von diesen bedingt zu sein.

201 Übrigens ist das Gesichtsfeld auch des gesunden Menschen zu keiner Zeit ganz frei von solchen Erscheinungen, die man das Lichtchaos, den Lichtstaub des dunkeln Gesichtsfeldes genannt hat; da sie bei manchen Erscheinungen, z. B. den Nachbildern, eine wichtige Rolle spielen, wollen wir sie das Eigenlicht der Netzhaut nennen. Wenn man die Augen schließt und das dunkle Gesichtsfeld aufmerksam betrachtet, wird man anfangs häufig noch Nachbilder der vorher gesehenen äußeren Objecte wahrnehmen (über deren Entstehung siehe unten § 24 und 25), später ein unregelmäßiges schwach beleuchtetes Feld mit mannigfach sich wandelnden Lichtflecken, die häufig Gefäßverästelungen oder ausgestreuten Moosstielen und Blättern ähnlich sind, und bei manchen Beobachtern auch in Phantasmen übergehen. Eine ziemlich häufige Form dieser Lichterscheinungen scheint 202 die zu sein, welche GOETHE<sup>3</sup> wandelnde Nebelstreifen nennt. PURKINJE beschreibt sie als „breite mehr oder weniger gekrümmte Bänder mit zwischenliegenden schwarzen Intervallen, die entweder als concentrische Kreise gegen den Mittelpunkt des Sehfeldes sich bewegen, und dort sich verlieren, oder als wandelnde Bögen an ihm sich brechen, oder als krumme Radien um ihn im Kreise sich bewegen. Ihre Bewegung ist langsam, so daß es gewöhnlich acht Secunden braucht, bis ein solches Band den Weg vollendet und völlig verschwunden ist“. Ich selbst sehe sie meist wie zwei Systeme kreisförmiger Wellen, die langsam gegen ihre Mittelpunkte zu beiden Seiten des Gesichtspunktes zusammenlaufen. Die Lage der Mittelpunkte scheint mir den Eintrittsstellen der beiden Sehnerven zu entsprechen; der Rhythmus fällt mit dem der Respirationsbewegungen zusammen. PURKINJE hatte ein schwächeres Auge und sah nur mit dem rechten Auge ein solches System von Nebelstreifen. Übrigens wird auch der Grund des Gesichtsfeldes, auf dem sich diese Erscheinungen entwerfen, nie ganz dunkel, man sieht im Gegentheile abwechselnde Verfinsterungen und Aufhellungen des Grundes, die oft mit den Athemzügen in gleichem Rythmus geschehen (J. MÜLLER<sup>4</sup>, ich selbst). So bringt auch jede Bewegung der Augen oder Augenlider, jede Veränderung der Accommodation Veränderungen des Lichtstaubes hervor. Auffallend sind diese Gestalten besonders, wenn man in einem unbekannten ganz dunkeln Raume, z. B. in einem dunkeln Treppenflur, den Weg tappend sucht, weil

<sup>1</sup> Fälle dieser Art sind zusammengestellt in J. MÜLLER *Über phantastische Gesichtsercheinungen*. Coblenz 1826. S. 20.

<sup>2</sup> H. AUBERT, *Physiologie der Netzhaut*. S. 335.

<sup>3</sup> GOETHE, *Farbenlehre*. Abth. I. § 96.

<sup>4</sup> J. MÜLLER, *Phantastische Gesichtsercheinungen*. S. 16.

sie sich dann an die Stelle der wirklichen Objecte stellen. Dabei bemerkt PURKINJE, daß jede unvermuthete Berührung, jede unsichere Bewegung momentane Oscillationen des Auges hervorruft, die von zarten Lichtwölkchen und anderen Lichtgebilden begleitet sind, welche Veranlassung zu manchen Gespenstergeschichten gegeben haben mögen. AUBERT<sup>1</sup> erwähnt plötzlich auftretende sehr helle Punkte des Sehfeldes, und helle, langsam bewegte Zickzacklinien.

Nach körperlicher Anstrengung und Erhitzung sah PURKINJE<sup>2</sup> im dunkeln Gesichtsfelde ein mattes Licht wallen und flackern, wie die auf einer horizontalen Fläche verlöschende Flamme von ausgegossenem Weingeiste. Bei schärferer Betrachtung sah er darin unzählige, äußerst kleine lichte Pünktchen, die sich lebhaft durch einander bewegen, und lichte Spuren ihrer Bewegung hinter sich lassen. Eine ähnliche Erscheinung trat ein, wenn er bei geschlossenem rechten Auge das schwache linke zum Sehen anstrengte.

Wichtig ist noch die Erfahrung, daß auch bei Leuten, deren Auge durch Operation entfernt, oder deren Sehnerven und Augen desorganisirt und functionsunfähig geworden waren, subjective Lichterscheinungen vorgekommen sind<sup>3</sup>. Aus diesen Erfahrungen geht hervor, daß nicht bloß die Netzhaut, sondern auch der Stamm oder die Wurzeln des Sehnerven im Gehirn fähig sind in Folge von Reizungen Lichtempfindung zu erzeugen.

Endlich sind die elektrischen Ströme ein mächtiges Mittel, den Sehnervenapparat, wie die übrigen Nerven zu erregen. Während in der Regel die motorischen Nerven nur in den Augenblicken Zuckung bewirken, wo die Stärke des sie durchfließenden elektrischen Stromes einer schnellen Steigerung oder Abnahme ausgesetzt ist, werden in den Sinnesnerven nicht nur durch Stromesschwankungen, sondern auch durch einen Strom von gleichmäßig anhaltender Stärke Empfindungen hervorgerufen, deren Qualität im letzteren Falle von der Stromesrichtung abhängt.

Wenn der Sehnerv durch Stromesschwankungen gereizt wird, entstehen starke Lichtblitze, die das ganze Gesichtsfeld überziehen. Man kann dieselben sowohl durch Entladungen von Leydener Flaschen als von galvanischen Säulen erzielen, wenn man die Elektrizität so durch den Körper leitet, daß hinreichend starke Zweige der Strömung durch den Sehnerven möglichst parallel seinen Fasern gehen. Man legt also zweckmäßig den einen Zuleiter an die Stirn oder auf die geschlossenen Augenlider, den anderen in den Nacken, oder wenn man bei hinreichend kräftigen Apparaten einen großen Widerstand nicht zu scheuen hat, nimmt man ihn in die Hand. Um den Schmerz in der Haut zu mildern, ist es vortheilhaft, die Zuleiter, welche die Form von Platten oder Cylindern haben können, mit nassen

<sup>1</sup> H. AUBERT, *Physiologie der Netzhaut*. S. 334.

<sup>2</sup> J. H. PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche u. s. w.* I. 63, 134. II. 115.

<sup>3</sup> Beispiele bei J. MÜLLER, *Phantastische Gesichtserscheinungen*. S. 30. — A. V. HUMBOLDT, *Gereizte Muskel- und Nervenfasern*. Th. II. S. 444. — LINCKE, *de fungo medullari*. Lips. 1834.

Pappscheiben zu bedecken und die zu berührende Hautstelle einige Zeit vorher schon anzufeuchten. Mit den Schlägen von Leydener Flaschen sind bisher wenig hierher gehörige Versuche angestellt worden, auch ist große Vorsicht wegen der Nähe des Gehirns nothwendig, da FRANKLIN und WILCKE<sup>1</sup> beobachtet haben, daß durch den Kopf geleitete Schläge ein bewußtloses Zusammenstürzen zur Folge haben können. LE ROY<sup>2</sup> ließ den Entladungsschlag auf einen am Staar erblindeten jungen Mann wirken, indem er dessen Kopf und rechtes Bein mit einem Messingdrahte umwand und durch die Enden der Drähte eine Leydener Flasche entlud. Bei jeder Entladung glaubte der Patient eine Flamme sehr schnell von oben nach unten vorbeigehen zu sehen, und hörte einen Knall wie von grobem Geschütze. Wenn LE ROY den Schlag durch den Kopf des Blinden allein leitete, indem er über den Augen und am Hinterkopfe Metallplatten befestigte, die mit den Belegungen einer Flasche verbunden wurden, so sah der Kranke Phantasmen einzelner Personen, in Reihe gestellte Volkshaufen u. s. w.

Reicher sind die Erfahrungen über die Wirkungen der galvanischen Ströme. Will man nur die Lichtblitze wahrnehmen, die durch Schließung oder Unterbrechung des Stromes entstehen, so genügen schon wenige Zinkkupferelemente, bei reizbaren Augen sogar schon ein einfaches Plattenpaar. Wenn z. B. ein Stück Zink an die befeuchteten Lider des einen, Silber an die des anderen Auges gelegt wird, und man die beiden Metalle in Berührung bringt, so erscheint im Momente der Berührung und dann wieder im Momente der Trennung ein Blitz. Belehrender ist der Versuch, wenn man das eine Metall an ein Auge legt, das andere in den Mund nimmt, weil dabei zugleich die Abhängigkeit der Stärke des Blitzes von der Stromrichtung erkannt werden kann. Der Blitz bei Schließung der Kette ist nach den Beobachtungen von PFAFF stärker, wenn man das positive Metall (Zink) an 204 das Auge, das negative (Silber) in den Mund bringt, wobei also der Sehnerv von der positiven Elektrizität in aufsteigender Richtung durchflossen wird. Ich bemerke hierbei, daß mir selbst die Versuche mit der einfachen Kette wahrscheinlich wegen zu geringer Reizbarkeit meines Auges, nie gelungen sind. Dagegen sind die Lichtblitze sehr glänzend, wenn man eine kleine galvanische Säule von etwa zwölf Elementen benutzt. Wählt man eine Batterie von constanter Stromstärke, z. B. von DANIELL'schen Elementen, so findet man, daß der Schließungsblitz bei aufsteigender Stromesrichtung, der Öffnungsblitz bei absteigender stärker ist. Ähnliche Unterschiede der Wirkung je nach der Richtung des Stroms sind auch für die Muskelnerven bekannt, sie sind dort aber auch von der Stärke des angewendeten Stroms abhängig.

Um die dauernde Wirkung eines gleichmäfsig anhaltenden Stroms wahrzunehmen, brauchen wohl die meisten Augen eine kleine Säule. obgleich RITTER auch diese mit der einfachen Kette wahrgenommen hat.

<sup>1</sup> B. FRANKLIN, *Briefe über Elektrizität*. Leipzig 1785. S. 312.

<sup>2</sup> LE ROY, *Mém. de mathém. de l'Acad. de France*. 1755. p. 86–92.



Um die Blendung des Auges durch Lichtblitze und das unangenehme Muskelzucken bei Öffnung und Schließung des Stroms zu vermeiden, finde ich es vortheilhaft, am Rande des Tisches, neben welchen sich der Experimentirende hinsetzt, zwei mit Pappe, die mit Salzwasser getränkt ist, umwickelte Metallcylinder hinzulegen, die mit den beiden Polen einer DANIELL'schen Batterie von 12 bis 24 Elementen verbunden sind. Man stützt zuerst die Stirne fest auf einen der Cylinder und berührt dann mit der Hand den anderen, wobei man durch langsames Anlegen der Hand erreichen kann, daß die Wirkungen der Stromesschwankung sehr gering sind, dann nach Belieben wieder öffnen oder schliessen kann. Die Stromesrichtung läßt sich wechseln, indem man die Stirn bald auf den einen, bald auf den anderen Cylinder legt. Das Auge ist hierbei auch keinem Drucke ausgesetzt, worauf wohl zu achten ist.

Wenn ein schwacher aufsteigender Strom durch den Sehnerven geleitet wird, wird das dunkle Gesichtsfeld der geschlossenen Augen heller als vorher und nimmt eine weißlich violette Farbe an. In dem erhellten Felde erscheint in den ersten Augenblicken die Eintrittsstelle des Sehnerven als eine dunkle Kreisscheibe. Die Erhellung nimmt schnell an Intensität ab, und verschwindet ganz bei der Unterbrechung des Stroms, die man bei langsamer Lösung der Hand von dem zweiten Cylinder ohne Lichtblitz ausführen kann. Dafür tritt nun, im Gegensatz zu dem vorausgegangenen Blau, mit der Verdunkelung des Gesichtsfeldes auch eine röthlich gelbe Färbung des Eigenlichts der Netzhaut ein,

Bei der Schließung der entgegengesetzten, absteigenden Stromesrichtung tritt der auffallende Erfolg ein, daß das nur mit dem Eigenlicht der Netzhaut gefüllte Gesichtsfeld im Allgemeinen dunkler wird als vorher, und sich etwas röthlich gelb färbt; nur die Eintrittsstelle des Sehnerven zeichnet sich als eine helle blaue Kreisscheibe auf dem dunkeln Grunde ab, von welcher Scheibe häufig auch nur die der Mitte des Gesichtsfeldes zugekehrte Hälfte erscheint. Bei Unterbrechung dieser Stromesrichtung wird das Gesichtsfeld wieder heller und zwar bläulichweiß beleuchtet und der Sehnerveneintritt erscheint dunkel.

AUBERT<sup>1</sup> sieht bei aufsteigendem Strome und nach Unterbrechung des absteigenden Stroms die Eintrittsstellen der Sehnerven als gelbe, helle Ringe, in der Mitte aber dunkel; bei absteigendem Strome und nach Unterbrechung des aufsteigenden bezeichnet er die Farbe des dunkleren Feldes als grünlich; die Sehnerven erscheinen als gelbe Scheiben.

Bewegungen des Auges bringen nach demselben Beobachter an der Peripherie des Sehfeldes große blitzartige Helligkeit (wohl wegen der Stromesschwankungen) hervor.

Bei stärkeren Strömen von 100 bis 200 Zink-Kupferplatten hat RITTER 205 eine Umkehr der Färbung gesehen, während die Vermehrung oder Verminderung der Helligkeit dieselbe blieb, wie bei schwachen Strömen. Starke aufsteigende Ströme erregten ihm also die Empfindung von lichtstarkem

<sup>1</sup> H. AUBERT, *Physiol. der Netzhaut*. S. 345.

Grün, noch stärkere von lichtstarkem Roth, starke absteigende von lichtschwachem Blau. Nach der Unterbrechung des Stroms sah er im ersten Falle zuerst Blau, was schnell in das zurückbleibende Roth der schwachen Ströme umschlug. Nach der Unterbrechung des starken absteigenden Stroms sah er dagegen im ersten Augenblicke Roth, was schnell in das gewöhnliche 206 Blau umschlug. Ich selbst fand, dafs bei stärkeren Strömen<sup>1</sup> ein wildes Durcheinanderwogen von Farben entstand, in welchem ich keine Regel zu entdecken vermochte.

RITTER giebt auch noch an, dafs das aufsteigend durchströmte Auge die äufseren Gegenstände nicht blos undeutlicher, sondern auch verkleinert sehe. Das läfst vermuthen, dafs er die Augen für die Nähe accommodirt habe. Man kann sich unter Einfluß des heftigen Hautschmerzes, den die einströmende Elektricität erregt, kaum erwehren, die benachbarten Muskeln zu spannen, die Stirn zu runzeln, die Augenlider zusammenzukneifen. Die meisten Personen sind geneigt, bei jeder Anstrengung des Auges oder seiner Nachbartheile für die Nähe zu accommodiren, und das hat dann auch einen gewissen Einfluß auf die Vorstellung von der Gröfse der gesehenen Dinge. E. DU BOIS-REYMOND<sup>2</sup> macht darauf aufmerksam, dafs Zusammenziehung der Pupille bei elektrischer Durchströmung des Auges bemerkt sei, wobei wohl auch eine Veränderung des Accommodationsapparates eintreten könne. Bei absteigendem Strome giebt RITTER umgekehrt an, die Gegenstände deutlicher und gröfser gesehen zu haben.

n Die Undeutlichkeit schwach sichtbarer äufserer Objecte bei aufsteigenden Strömen scheint sich zunächst aus dem sich darüber deckenden subjectiven Lichtscheine zu erklären.

Die elektrische Reizung läfst sich auch auf einzelne Theile der Netzhaut beschränken, wenn sie auch nicht örtlich scharf begrenzt werden kann. Diese Erscheinungen sind in ihren wesentlichen Zügen schon von PURKINJE beschrieben worden. Ich selbst habe es nützlich gefunden, den einen Zuleiter aus einem dünnen Cylinder von Badeschwamm zu bilden, der um ein Kupferstäbchen mit isolirendem Handgriff festgebunden, und reichlich mit Salzwasser getränkt ist. Die andere Elektrode legt man in den Nacken oder fafst sie mit der linken Hand, und berührt mit dem Schwamm die Haut neben dem äufseren oder inneren Augenwinkel, während man unter den geschlossenen Augenlidern das Auge hin und herbewegen kann.

Ist der Schwamm die positive Elektrode, so dringt der elektrische Strom auf der ihm zugewendeten Seite des Auges durch die Netzhaut von ausen nach innen, auf der abgewendeten von innen nach ausen; umgekehrt wenn der Schwamm negative Elektricität zuleitet. Dabei zeigt sich, dafs die von

<sup>1</sup> Der Strom von 24 DANIELL'schen Elementen wurde durch breite, mit nasser Pappe belegte Metallplatten in Stirn und Nacken eingeleitet. Da der Widerstand in diesem Kreise sehr viel geringer war als bei RITTER's Anordnung, welcher eine Säule von großem Widerstande, und auch noch seinen Arm in dem Kreise hatte, so läfst sich das Verhältniß der Stromstärke in meinen und RITTER's Versuchen nicht wohl bestimmen.

<sup>2</sup> E. DU BOIS-REYMOND, *Untersuchungen über thierische Elektricität*. Berlin 1848. Bd. I. S. 353.

ausen nach innen durchflossene Hälfte der Netzhaut Dunkel empfindet, die von innen nach ausen durchflossene dagegen Helligkeit. Zu beachten ist, daß diese Empfindungen vom Beobachter immer in die gegenüberliegende Hälfte des Gesichtsfeldes verlegt werden, als wäre diese elektrische Helligkeit von ausen kommendes Licht.

Unter dieselbe Regel fallen auch die Erscheinungen, welche man beobachtet, wenn man die Elektrode vorn auf die von den Lidern bedeckte Hornhaut setzt. Dann giebt eine positive Elektrode Strom von innen nach ausen durch die ganze Netzhaut, und diese sieht hell.

Die Eintrittsstelle des Sehnerven zeigt bei mir immer den entgegengesetzten Zustand des Feldes, in dem sie liegt. Ihre starke Sehnenscheide könnte als schlecht leitende Masse in Betracht kommen, und bewirken, daß die dicht davor liegenden Nervelemente, die das Mark des eintretenden Nerven unmittelbar umgeben, vor der Durchströmung verhältnismäßig geschützt sind. Deren Zustand aber pflegen wir (s. unten § 28) auf die ganze Ausdehnung des Sehnervenquerschnitts zu übertragen.

Wenn man nun, während das Auge von der Seite her durchströmt wird, den Blick unter den geschlossenen Lidern gegen die Grenze des hellen und dunkeln Feldes richtet, so erscheinen rechts und links neben dem Fixationspunkte zwei querovale Felder, von denen das in die helle Hälfte des Sehfeldes hineinragende dunkel, das in die dunkle hineinragende hell erscheint. Ihrer Größe nach erscheinen sie der Ausdehnung des gelben Flecks zu entsprechen. An dieser Stelle verlaufen die Faserzüge der Netzhaut von den Zapfen aus radial divergirend gegen die dazu gehörigen Ganglienzellen, und es werden die elektrischen Ströme bei der angegebenen Richtung des Blicks im gelben Fleck parallel der Fläche der Netzhaut fließen müssen.

Tritt nun positive Elektrizität auf der Schläfenseite in das Auge ein, so ist der peripherische Theil der Netzhaut von ausen nach innen, d. h. von den Zapfen zu den Ganglienzellen durchströmt, und sieht dunkel. Die nach der Schläfenseite gerichteten Faserzüge des gelben Flecks aber werden von den Ganglienzellen zu den Zapfen hin durchströmt, und sehen hell. In diesem Sinne kann man die beobachteten Erscheinungen zusammenbegreifen in die Regel: Elektrische constante Durchströmung der Netzhaut in der Richtung von den Zapfen zu den zugehörigen Ganglienzellen giebt die Empfindung von Dunkel; die entgegengesetzte Durchströmung giebt die Empfindung von Hell.

Es zeigen nun auch die Muskelnerven des thierischen Körpers ausser den schon erwähnten Erscheinungen der Reizung durch Stromesschwankungen einen Einfluß der constanten Ströme auf die Reizempfindlichkeit. Durch schwache Ströme, wie diejenigen immer sind, die bei den beschriebenen Versuchen die Netzhaut treffen, wird nach den von PFLÜGER<sup>1</sup> aufgestellten Gesetzen die Reizbarkeit des Nerven an der Strecke gesteigert, wo die

<sup>1</sup> W. PFLÜGER, *Untersuchungen über die Physiologie des Elektotonus*. Berlin 1859.

positive Elektrizität hinfließt, an der Strecke vermindert, wo jene Elektrizität herkommt. Dies angewendet auf die Fasern der mittleren Schichten der Netzhaut würde ergeben, daß die Stelle, deren vermehrte oder verminderte Erregbarkeit sich in den Lichterscheinungen bei elektrischer Durchströmung geltend macht, in den hintersten Schichten der Netzhaut zu suchen ist, was mit den Erfahrungen über die Erregung durch Licht, wie der folgende Paragraph zeigen wird, zusammenstimmt.

Elektrotonischer Zustand des Sehnerven oder der Sehnervenausbreitung macht sich hierbei also nicht geltend. Übrigens fragt es sich, ob sich derselbe durch die Schicht der Ganglienzellen hindurch würde fortpflanzen können. Wir kennen bisher nur seine Ausbreitung in Nervenfasern.

207 Die Lehre von den Gesichtsempfindungen fiel in älterer Zeit noch ganz der Philosophie anheim, so lange positive Kenntnisse darüber fehlten. Zunächst mußte eingesehen werden, daß die Empfindungen nur Wirkungen der Außendinge auf unseren Körper seien, und daß die Wahrnehmung erst durch psychische Prozesse aus der Empfindung gebildet würde. Mit dieser Einsicht ringt die griechische Philosophie<sup>1</sup>. Sie beginnt mit naiven Voraussetzungen über die Möglichkeiten, wie Bilder, die den Gegenständen entsprechen, in die Seele kommen sollten. DEMOKRIT und EPIKUR lassen solche Bilder sich von den Gegenständen lösen und in das Auge fließen. EMPEDOKLES läßt Strahlen sowohl vom Lichte wie vom Auge nach den Gegenständen fließen, und mit letzteren die Gegenstände gleichsam betasten. PLATO scheint zu schwanken. Im Timaeus schließt er sich dieser Vorstellungsweise des EMPEDOKLES an; er erklärt die vom Auge ausgehenden Strahlen für ähnlich dem Lichte, aber nicht brennend, und läßt das Sehen nur zu Stande kommen, wo das innere Licht herausgehend an den Gegenständen das verwandte äußere Licht trifft. Im Theaetetus dagegen nähert er sich durch Untersuchungen über die geistige Thätigkeit bei den Wahrnehmungen schon dem reiferen Standpunkte des ARISTOTELES.

Bei letzterem<sup>2</sup> findet sich eine feine psychologische Untersuchung über die Mitwirkung geistiger Thätigkeit in den Sinneswahrnehmungen, das Physikalische und Physiologische, die Empfindung ist deutlich unterschieden von dem Psychischen; die Wahrnehmung äußerer Objecte beruht nicht mehr auf einer Art feiner Fühlfäden des Auges wie die Gesichtsnerven des EMPEDOKLES, sondern auf Urtheil. Das Physikalische an seinen Vorstellungen ist freilich sehr unentwickelt, doch könnte man in den Grundzügen desselben Spuren der Undulationstheorie finden. Denn das Licht ist bei ihm nicht Körperliches, sondern eine Thätigkeit (*ἐνέργεια*) des zwischen den Körpern enthaltenen Durchsichtigen, welches im Zustande der Ruhe Dunkelheit ist. Doch erhebt er sich noch nicht zu der Vorstellung, daß die Wirkung des Lichtes auf das Auge nicht nothwendig dem erregenden Lichte gleichartig zu sein braucht. Er sucht vielmehr diese Gleichartigkeit dadurch zu begründen, daß auch das Auge Durchsichtiges enthalte, welches in dieselbe Art von Thätigkeit wie das äußere Durchsichtige treten kann.

Im Mittelalter blieben die eigentlichen und entscheidenden Fortschritte, welche ARISTOTELES in der Theorie des Sehens gemacht hatte, unbeachtet, erst BACO von VERULAM und seine Nachfolger nehmen diesen Faden wieder auf, discutiren scharf die Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen, bis KANT in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ den Abschluß ihrer Theorie liefert. Vieles Richtige, scharf ausgesprochen, findet sich auch bei J. G. FICHTE in den „Thatsachen des Bewußtseins“, namentlich die

<sup>1</sup> W. WUNDT, *Zur Geschichte der Theorie des Sehens, Hentle und Pfeuffers Zeitschrift für rationelle Medizin*. 1859.

<sup>2</sup> ARISTOTELES, *De sensibus, de anima lib. II. c. 5—8 und de coloribus*.

Zusammenfassung der Empfindungen in Qualitätenkreise, den fünf Sinnen entsprechend. Was in SCHOPENHAUER's einschlägigen Erörterungen richtig ist, wird meist auf diese Quelle zurückzuführen sein.

In derselben Zeit waren die Naturforscher meist nur mit dem seit KEPLER sich 207 schnell entwickelnden physikalischen Theile der Theorie des Sehens beschäftigt. Durch HALLER wurde zunächst im Allgemeinen die Lehre von der Reizbarkeit der Nerven fest- 208 gestellt; dem entsprechend beschreibt dieser auch ganz richtig und klar das Verhältniß des Lichtes zur Empfindung, dieser zur Wahrnehmung<sup>1</sup>. Aber es fehlte noch die genauere Kenntniß der durch andere Reizmittel entstehenden Erregungen des Auges, oder wenigstens, was man davon kannte, war vereinzelt, und wurde deshalb nur als Curiosum betrachtet. Das Verdienst, die Aufmerksamkeit der deutschen Naturforscher auf die Wichtigkeit dieser Kenntniß hingeleitet zu haben, gebührt GOETHE in seiner Farbenlehre, wenn ihm auch der Hauptzweck dieses Buches, eine Reform der physikalischen Lichtlehre, die sich der unmittelbaren sinnlichen Anschauung besser anschliesse, zu erzwingen, fehlschlug. Darauf folgen nun die reichen Beobachtungen über Erregungen der Empfindungsnerven von RITTER und den andern Galvanikern, namentlich aber die Beobachtungen von PURKINJE, so daß im Jahre 1826 J. MÜLLER die Hauptsätze dieses Gebiets hinstellen konnte in seiner Lehre von den specifischen Sinnesenergien, wie er sie in seinem Werke über die vergleichende Physiologie des Gesichtsinns zuerst vortrug, und wie sie im Anfange dieses Paragraphen dargestellt ist. Dies Werk und das von PURKINJE stehen in ausgesprochener Beziehung zu GOETHE's Farbenlehre, wenn auch J. MÜLLER deren physikalische Sätze später aufgegeben hat. Das MÜLLER'sche Gesetz von den specifischen Energien war ein Fortschritt von der außerordentlichsten Wichtigkeit für die ganze Lehre von den Sinneswahrnehmungen, ist seitdem das wissenschaftliche Fundament dieser Lehre geworden, und ist in gewissem Sinne die empirische Ausführung der theoretischen Darstellung KANT's von der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens.

Die Druckbilder kannte schon ARISTOTELES. NEWTON<sup>2</sup> giebt die hypothetische Erklärung, daß die mechanische Erschütterung der Netzhaut eine ähnliche Bewegung in ihr erzeuge, wie die auf diese Haut stoßenden Lichtstrahlen. Diese Bewegung der Netzhaut betrachtet er als Ursache der Lichtempfindung. Die Meinung, daß bei den Druckbildern sowohl, als auch bei anderen Gelegenheiten im Auge sich objectives Licht entwickle, hat übrigens bis in neuere Zeit ihre Anhänger gehabt, wovon der oben erwähnte gerichtsärztliche Fall ein Beispiel giebt, in welchem der begutachtende Medicinalrath SEILER die Möglichkeit eines solchen Ereignisses glaubte zulassen zu müssen. Es hat aber niemals ein zweiter Beobachter objectiv das so entwickelte Licht wahrnehmen können. Um diese Meinung wahrscheinlich zu machen stützte man sich theils auf Fälle von Menschen, die in der Dunkelheit, d. h. bei sehr wenig Licht, hatten sehen können, wie Kaiser TIBERIUS, CARDANUS, KASPAR HAUSER, theils auf das sogenannte Leuchten der Thieraugen, der albinotischen oder sonst krankhaft verbildeten Menschengen, welches nur auf Reflexion des Lichts beruht, theils auf stark entwickelte Nachbilder, die des Abends nach verloschtem Licht bei älteren Männern zuweilen lange zurückzubleiben scheinen; sie sollten die Möglichkeit der Lichtentwicklung im Auge beweisen. Genauere Beschreibungen der Druckbilder sind in späterer Zeit von PURKINJE, SERRES D'UZES gegeben worden. Der Gebrauch, den THOMAS YOUNG in der Accommodationslehre davon machte, ist oben Seite 149 erwähnt.

Den Öffnungs- und Schließungsblitz bei elektrischer Durchströmung beobachtete schon VOLTA; RITTER nahm selbst mit der einfachen Kette die dauernden Lichtwirkungen wahr, später gab namentlich PURKINJE eine ausführliche Beschreibung.

<sup>1</sup> A. V. HALLER, *Elem. Physiol.* Tom. V. lib. 16 u. 17.

<sup>2</sup> J. NEWTON, *Optice*, am Schluß Quæstio XVI.

## § 18. Von der Reizung durch Licht.

Wir haben jetzt das objective Licht, die Ätherschwingungen, als Erregungsmittel des Sehnervenapparates zu betrachten. Die Ätherschwingungen gehören nicht zu den allgemeinen Reizmitteln der Nerven, die wie Elektrizität und mechanische Mißhandlung jede Stelle einer jeden Nervenfasern erregen könnten; und es läßt sich nachweisen, daß die Nervenfasern des Sehnerven innerhalb des Stammes dieses Nerven und innerhalb der Netzhaut von ihnen ebenso wenig wie die motorischen und sensiblen Nervenfasern der übrigen Nerven erregt werden. Es sind vielmehr gewisse Hilfsapparate nothwendig, die an den Enden der Opticusfasern in der Netzhaut liegen, in denen das objective Licht den Anstoß zu einer Nervenregung zu geben im Stande ist.

Wir wollen hier zunächst nachweisen, daß die Nervenfasern im Stamme des Sehnerven durch objectives Licht nicht erregt werden. Die Masse dieser Fasern liegt an der Stelle, wo der Sehnerv durch die Sclerotica in das Auge eintritt, frei gegen die durchsichtigen Mittel des Auges gekehrt, sie ist nicht von schwarzem Pigment bedeckt, und zugleich durchscheinend genug, daß das Licht, was auf sie fällt, merklich in die Masse des Nerven eindringen kann. Man erkennt dies bei den Untersuchungen mit dem Augenspiegel daran, daß man häufig noch Windungen der Centralgefäße innerhalb des Sehnerven erkennen kann, die von der Nervenmasse ganz überdeckt  
210 sind. Wenn dergleichen Gefäßwindungen im Innern der Nervensubstanz erkannt werden sollen, muß Licht bis zu ihnen hindringen und von ihnen aus wieder bis zum Auge des Beobachters gelangen können. Es ist also kein Hinderniß für das in das Auge fallende Licht vorhanden, bis zu einer gewissen Tiefe in die Sehnervensubstanz einzudringen. Aber dieses Licht, was auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, wird nicht empfunden.



Fig. 117.

Man schliesse das linke Auge und fixire mit dem rechten das weiße Kreuzchen in Fig. 117, alsdann bringe man das Buch bei der gewöhnlichen horizontalen Richtung der Zeilen in eine Entfernung von etwa einem Fuß

vom Auge, so wird man finden, daß es hier eine gewisse Stellung giebt, wo der weiße Kreis gänzlich verschwindet und der schwarze Grund ohne Lücke erscheint. Damit der Versuch gelinge, achte man aber sorgfältig darauf, daß man den Blick fest auf das Kreuzchen hefte und nicht seitwärts blicke. Nähert man das Buch mehr oder entfernt es weiter, so kommt der weiße Kreis wieder zum Vorschein, und wird im indirecten Sehen deutlich wahrgenommen; ebenso wenn man das Buch schief hält, so daß der weiße Kreis etwas höher oder tiefer zu stehen kommt. Wie der weiße Kreis, verschwinden alle anderen Gegenstände, weiße, schwarze, farbige, welche nicht größer sind als der Kreis, wenn man sie auf denselben legt, und wie vorher verfährt. Man erkennt daraus, daß es im Gesichtsfelde eines jeden einzelnen Auges eine Stelle giebt, in welcher nichts erkannt wird, und daß es also in der Fläche der Netzhaut eine entsprechende Stelle giebt, welche die auf sie fallenden Bilder nicht wahrnimmt. Man nennt diese Stelle den blinden Fleck. Da die blinde Stelle im Gesichtsfelde des rechten Auges nach rechts vom Fixationspunkte, in dem des linken Auges links davon liegt, so muß der blinde Fleck der Netzhaut vom gelben Fleck aus nach der Nasenseite herüber liegen, in welcher Gegend sich die Eintrittsstelle des Sehnerven befindet.

Daß der blinde Fleck wirklich mit der Eintrittsstelle des Sehnerven identisch sei, hatte man schon früher durch Messung seiner scheinbaren Größe und seines scheinbaren Abstandes vom Fixationspunkte des Auges nachgewiesen. Einen noch directeren Beweis hat DONDERS<sup>1</sup> mittels seines Augenspiegels gegeben. Er warf mit diesem Instrumente das Licht einer kleinen entfernt stehenden Flamme in das Auge des Beobachteten, und ließ dieses so wenden, daß das Flammenbildchen auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fiel. Auf dieser Stelle ist das Flammenbildchen nicht scharf gezeichnet, und es erscheint gleichzeitig die ganze Eintrittsfläche des Sehnerven, obgleich mindestens 20 mal größer als das Flammenbildchen, ziemlich hell, was sich aus der durchscheinenden Beschaffenheit der Nervenmasse erklärt. Auf der Netzhaut selbst neben dem Eintritt des Sehnerven bemerkte er kaum eine Spur von Licht, was entweder in den durchsichtigen Mitteln des Auges zerstreut sein konnte, oder von der hell erleuchteten Fläche des Sehnerven seitlich reflectirt war. So lange das Lichtbildchen ganz auf den Eintritt des Sehnerven fiel, hatte der Beobachtete keine Lichtempfindung. Einige meinten einen sehr schwachen Schimmer wahrzunehmen, der wohl durch die erwähnte schwache Erleuchtung der Netzhaut veranlaßt sein mochte. Durch kleine Bewegungen des Spiegels konnte er das Lichtbildchen von einer Seite nach der anderen über die Eintrittsstelle des Sehnerven wandern lassen, und niemals trat Lichtwahrnehmung ein, ehe nicht ein Theil der Flamme deutlich die Grenze überschritt, und so ein Stelle erreichte, wo

<sup>1</sup> F. C. DONDERS, *Onderzoekingen gedaan in het Physiol. Labor. d. Utrechtsche Hoogeschool*. VI. 134.

die verschiedenen Schichten der Netzhaut schon vorhanden sind. Hieraus folgt, daß der blinde Fleck der ganzen Eintrittsstelle des Sehnerven, und namentlich nicht etwa bloß den eintretenden Gefäßen entspricht.

Denselben Versuch hat später COCCIUS<sup>1</sup> an dem eigenen Auge des Beobachters auszuführen gelehrt, wodurch er noch belehrender wird. Man braucht dazu einen durchbohrten Spiegel, plan oder convex, wie er in den Augenspiegeln üblich ist, und hält diesen nahe vor das eigene Auge, während durch die Öffnung des Spiegels das Licht einer Lampe in das Auge fällt. Richtet man zunächst das Auge gerade nach dem Rand der Öffnung hin, so gelingt es leicht, das umgekehrte rothe Flammenbildchen auf der Netzhaut des eigenen Auges zu sehen, und indem man dann das Auge mehr und mehr einwärts dreht, während man das Flammenbildchen festzuhalten sucht, gelingt es endlich das Flammenbild auf die Eintrittsstelle des Sehnerven zu bringen und die beschriebenen Beobachtungen anzustellen. Für diesen Zweck ist es übrigens rathsam, die Flamme klein zu machen, oder weit zu entfernen, weil sonst die große Menge Licht, die in das Auge dringt, hinderlich ist. Man sieht dabei auch die Gefäßstämme, hat aber natürlich immer nur ein sehr kleines Gesichtsfeld. Nimmt man eine größere Flammenfläche, so wird das Auge zu sehr geblendet, als daß man viel sehen könnte. Ist die Lichtmenge, welche auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, bedeutend, so nimmt das Auge allerdings einen schwachen Lichtschein wahr, aber, wie wir aus diesen Versuchen schließen müssen, nur deshalb, weil ein Theil des Lichtes sich auf die anstoßenden Theile der Netzhaut ausbreitet. Zuweilen entsteht auch bei solchen Versuchen ein rother Lichtschimmer im Auge, wohl wenn ein Gefäßstamm auf der Sehnervenfläche stark erleuchtet wird und Licht reflectirt. Dies beobachteten A. FICK und P. DU BOIS-REYMOND, wenn sie das Sonnenbildchen einer Convexlinse als Object benutzten.

Die Form und scheinbare Größe des blinden Flecks im eigenen Gesichtsfelde kann man leicht in folgender Weise bestimmen. Man gebe dem Auge 8 bis 12




Fig. 118.

Grenze auf, wo sie anfängt, sichtbar zu werden. In dieser Weise habe ich in Fig. 118 den blinden Fleck meines rechten Auges, bezogen auf den Fixations-

auf dem Papier ein Kreuzzeichen als Fixationspunkt für das Auge. Dann führe man die in Tinte getauchte Spitze einer weißen oder mindestens hell gefärbten Feder auf dem Papiere in die Projection des blinden Flecks hinein, so daß die schwarze Spitze verschwindet, und schiebe sie dann von dessen Mittelpunkt aus nach einander in den verschiedenen Richtungen gegen die Peripherie des Flecks vor, und zeichne die

<sup>1</sup> A. COCCIUS, *Über Glaukom, Entzündung und die Autopsie mit d. Augenspiegel*. Leipzig 1859. S. 40 u. 52.



punkt  $a$ , dargestellt.  $AB$  ist der dritte Theil der zugehörigen Entfernung des Auges von der Papierfläche. Man sieht, daß die Gestalt des Fleckes eine unregelmäßige Ellipse ist, an der ich selbst, wie HUECK, die Anfänge von den stärkeren Gefäßstämmen erkennen kann, welche austreten. Wenn man einen kleinen schwarzen Fleck auf das Papier macht, und nach einander verschiedene Gesichtspunkte fixirt, so findet man noch, daß die Fortsetzungen der Gefäße weit in das Feld der Netzhaut hinein blinde Stellen sind. Am leichtesten gelingt dies, wenn man nach COCCIUS sich die Richtung der Gefäßstämmen im eigenen Auge schon aufgesucht hat.

Bezeichnen wir die Entfernung des Auges vom Papier mit  $f$ , die Entfernung des zweiten Knotenpunktes von der Netzhaut, welche im Mittel 15 mm beträgt, mit  $F$ , den Durchmesser des blinden Flecks in unserer Zeichnung, oder irgend eine andere lineare GröÙe in der Zeichnung mit  $d$ , die entsprechende GröÙe auf der Netzhaut mit  $D$ , so haben wir

$$\frac{f}{F} = \frac{d}{D},$$

woraus wir  $D$  berechnen können. Will man sich bei einer solchen Messung von der GröÙe  $F$ , welche für das individuelle Auge nie ganz genau bestimmt werden kann, unabhängig machen, so mißt man besser den Gesichtswinkel, d. h. den Winkel zwischen den Richtungslinien (siehe S. 69), welche den verschiedenen Punkten der Zeichnung entsprechen. Wenn wir voraussetzen dürfen, die auf den Punkt  $a$  der *Fig. 118* gerichtete Gesichtslinie sei senkrecht zur Ebene der Zeichnung und die Entfernung  $ad$  mit  $\beta$  bezeichnen, den Gesichtswinkel, unter dem  $ad$  erscheint, mit  $\alpha$ , so ist

$$\frac{\beta}{f} = \operatorname{tg} \alpha,$$

woraus  $\alpha$  berechnet werden kann; ebenso ist der Gesichtswinkel zwischen  $a$  und jedem anderen Punkte der Zeichnung zu finden. Folgendes sind die Resultate, welche verschiedene Beobachter in dieser Weise erhalten haben:

- 1) Scheinbarer Abstand des Gesichtspunktes von dem ihm nächsten Theile des Randes des blinden Flecks: LISTING<sup>1</sup> 12° 37',5; HELMHOLTZ 12° 25'; TH. YOUNG 12° 56'.
- 2) Scheinbarer Abstand des entferntesten Theils des Randes: LISTING 18° 33',4; HELMHOLTZ 18° 55'; TH. YOUNG 16° 1'.
- 3) Scheinbarer Durchmesser des blinden Flecks in horizontaler Richtung: HANNOVER und THOMSEN<sup>2</sup> bei 22 Augen 3° 39' bis 9° 47', Mittel aller Messungen 6° 10', LISTING 5° 55',9; GRIFFIN<sup>3</sup> im Maximo 7° 31; HELMHOLTZ 6° 56'; TH. YOUNG, der nicht ganz zweckmäßig zwei Lichter gebraucht hatte, um die Grenze des Flecks zu finden, 3° 5'.
- 4) Wahrer Durchmesser des blinden Flecks, mit LISTINGs Werth für  $F = 15$  mm berechnet, in LISTINGs Auge 1<sup>mm</sup>,55; HELMHOLTZ 1,81. HANNOVER und THOMSON im Mittel 1<sup>mm</sup>,116. Eine Messung von E. H. WEBER des Durchmessers der Eintrittsstelle des Sehnerven in den Augen zweier Leichen ergab

<sup>1</sup> J. LISTING, *Berichte der Königl. sächs. Ges. der Wiss.* 1852. S. 149. Ebenda die Beobachtungen von E. H. WEBER.

<sup>2</sup> A. HANNOVER, *Bidrag til Oiets Anatomie*. Kjöbenhavn. 1850. Cap. VI. S. 61.

<sup>3</sup> GRIFFIN, *Contributions to the physiology of vision*. London, Medical Gazette. 1838 Mai. p. 230.

2<sup>mm</sup>,10 und 1<sup>mm</sup>,72 (0,93 und 0,76 Par. Lin.). Der Abstand seiner Mitte von der Mitte des gelben Flecks war in dem einen Auge 3<sup>mm</sup>,8 (1,69 Par. Lin.); derselbe, in LISTINGS Auge berechnet, 4<sup>mm</sup>,05. Der größte und kleinste Durchmesser des Gefäßstrangs in der Mitte des Nerven waren 0,313 und 0,139 Lin., der größte in dem anderen Auge 0,28 Lin.

Aus diesen Messungen konnte schon vor den Versuchen von DONDERS geschlossen werden, daß die ganze Eintrittsstelle des Sehnerven unempfindlich gegen das Licht sei.

Um die scheinbare GröÙe des blinden Flecks im Gesichtsfelde noch anders zu bezeichnen, wollen wir anführen, daß auf seinem Durchmesser neben einander 11 Vollmonde Platz haben würden, und daß in ihm ein 6 bis 7 FuÙs entferntes menschliches Gesicht verschwinden kann.

Daß die Sehnervenfasern im Stamme des Sehnerven nicht durch Licht in Reizung versetzt werden können, geht aus den beschriebenen Erscheinungen des blinden Flecks hervor. Daß auch ihre Fortsetzungen, welche von der Eintrittsstelle des Sehnerven über die vordere Fläche der Netzhaut hin ausstrahlen, gegen Licht unempfindlich sind, kann aus dem Umstande geschlossen werden, daß wir begrenzte helle Stellen des Gesichtsfeldes auch wirklich begrenzt sehen. Wenn Licht auf irgend eine Stelle *A* der Netzhaut fällt, so trifft es hier nicht bloß diejenigen Nervenfasern, welche in *A* endigen, sondern auch solche, welche über *A* hinausgehen, und an den mehr peripherisch gelegenen Stellen der Netzhaut endigen. Da nun der Ort, an welchem eine Nervenfaser gereizt worden ist, in der Empfindung nicht unterschieden wird, so würde dadurch für die Empfindung derselbe Erfolg eintreten, als wäre Licht auf jene peripherischen Stellen der Netzhaut gefallen. Wir würden unter diesen Umständen von jedem erleuchteten Punkte einen Lichtschweif nach den Grenzen des Gesichtsfeldes sich hinziehen sehen, was nicht der Fall ist. Es können also auch die vor der Netzhaut ausgebreiteten Fasern des Sehnerven nicht durch objectives Licht reizbar sein.

Daß dagegen die hinteren Schichten der Netzhaut gegen Licht empfindlich sind, geht daraus hervor, daß man den Schatten der NetzhautgefäÙe wahrnehmen kann (§ 15, S. 192). Die NetzhautgefäÙe liegen in der Schicht der Sehnervenfasern, die feineren zum Theil auch noch in der unmittelbar dahinter liegenden Schicht der Nervenzellen (S. 31, *Fig. 16*, 2, 3) und in der fein granulirten Schicht (*Fig. 16*, 4). Aus den Bewegungen des Schattens dieser GefäÙe bei Bewegungen der Lichtquelle haben wir geschlossen, daß die den Schatten empfindende Schicht, die Schicht, in welcher das den Schatten begrenzende Licht Nervenirregung hervorruft, in geringer Entfernung hinter den GefäÙen liegen müsse. Die Messungen von H. MÜLLER (S. 200) ergeben, daß die Entfernung der GefäÙe von der Fläche, die ihren Schatten empfindet, zwischen 0,17 und 0,36 mm betragen muß. Die Entfernung der GefäÙe von der hintersten Schicht der Netzhaut, der der Stäbchen und Zapfen (*Fig. 16*, 5, 6), beträgt nach demselben Beobachter 0,2 bis 0,3 mm, so daß die empfindende Schicht jedenfalls eine der hintersten Schichten der

Netzhaut sein muß, d. h. die Schicht der Zapfen und Stäbchen, oder die äußere Körnerschicht. Da an der Stelle des deutlichsten Sehens, in der centralen Grube des gelben Flecks nach allen neueren Beobachtungen nur Nervenzellen und Zapfen mit Zapfenkörnern vorkommen, so folgt sicher, daß die Zapfen verbunden mit den Zapfenkörnern genügen, um bei Lichteinwirkung Empfindung zu erregen. Bei der ganz analogen anatomischen Bildung der Stäbchen ist es höchst wahrscheinlich, daß auch diese die genannte Fähigkeit besitzen, wie schon H. MÜLLER und KOELLIKER ausgesprochen haben. Indessen müssen sie bei der Localisation der Empfindungen eine ganz andere Rolle spielen, da trotz ihrer größeren Feinheit und Anzahl dort, wo sie überwiegend vorkommen, in den peripherischen Theilen der Netzhaut, das Unterscheidungsvermögen für nah benachbarte Eindrücke im Gegentheile unvollkommener ist als in der Netzhautgrube.

Da die Untersuchung über die Feinheit der Wahrnehmung von Ortsunterschieden beim Sehen wesentlich mit der Frage zusammenhängt, welche Elemente der Netzhaut lichtempfindlich sind, (das heißt hier immer: bei Lichteinwirkung Empfindung erregen) und wie sie mit den Nervenfasern zusammenhängen, so wenden wir uns zunächst dieser Frage zu.

Da diejenige Stelle der Netzhaut, welche der feinsten Ortsunterscheidung fähig ist, ein regelmäßig gebildetes Mosaik von einander trennbarer Theile, der Zapfen, hat, von denen jeder einzelne mit einer Nervenfaser zusammenhängt, die zunächst zu den Nervenzellen der Netzhaut hinüberführt, so scheint die Annahme nicht unwahrscheinlich, daß jeder einzelne Zapfen seine eigene abgesonderte Nervenleitung zum Gehirn hat, und daß dem entsprechend die in ihm erregte Empfindung von qualitativ gleicher Empfindung in den benachbarten Zapfen unterschieden werden könne. Um diese Hypothese zu prüfen, wäre zu erörtern, wie sich in diesem Falle die Größe der Zapfen verhalten muß, und welche Art von sichtbaren Objecten dabei die sichersten Schlüsse zulassen würden.

Das Licht, welches auf ein einziges empfindendes Element fällt, kann nur eine einzige Lichtempfindung hervorbringen, in der nicht mehr unterschieden wird, ob einzelne Theile des Elements stark, andere schwach erleuchtet sind. Es können lichte Punkte wahrgenommen werden, deren Netzhautbild sehr viel kleiner ist, als ein empfindendes Netzhautelement, vorausgesetzt, daß die Lichtmenge, die von ihnen in das Auge fällt, groß genug ist, ein Netzhautelement merklich zu afficiren. So werden z. B. die Fixsterne, als Objecte von großer Lichtstärke, trotz ihrer verschwindend kleinen scheinbaren Größe, vom Auge wahrgenommen. Ebenso können auch dunkle Objecte auf hellem Grunde wahrgenommen werden, obgleich ihre Bilder kleiner sind, als ein empfindendes Nervelement, vorausgesetzt nur, daß die Lichtmenge, welche auf das Element fällt, durch das dahin treffende dunkle Bild um einen wahrnehmbaren Theil verringert wird. Kann das Auge z. B. bei der angewendeten Beleuchtungsstärke Unterschiede der Lichtintensität von  $\frac{1}{50}$  erkennen, so würde ein dunkles Bildchen, dessen Flächeninhalt  $\frac{1}{50}$  von

dem eines empfindenden Elements ist, noch wahrgenommen werden können. Dagegen ist es klar, daß zwei helle Punkte nur dann als zwei erkannt werden können, wenn der Abstand ihrer Bilder größer ist, als die Breite eines Netzhautelements. Wäre er kleiner, so würden beide Bilder immer auf dasselbe oder auf zwei benachbarte Elemente fallen müssen. Im ersten Falle würden beide nur eine einzige Empfindung erregen, im zweiten Falle zwar zwei Empfindungen, aber in benachbarten Nervelementen, wobei nicht unterschieden werden könnte, ob zwei gesonderte Lichtpunkte, oder einer da ist, dessen Bild auf die Grenze beider Elemente fällt. Erst wenn der Abstand der beiden hellen Bilder, oder wenigstens ihrer Mitte von einander größer ist als die Breite eines empfindenden Elements, erst dann können die beiden Bilder auf zwei verschiedene Elemente fallen, die sich gegenseitig nicht berühren, und zwischen denen ein Element zurückbleibt, welches nicht oder wenigstens schwächer als die beiden ersten von Licht getroffen wird.

Nach den Angaben von HOOKE<sup>1</sup> erscheinen zwei Sterne, deren scheinbare Entfernung weniger als 30 Secunden beträgt, stets wie ein Stern, und  
 216 von Hunderten kann kaum einer die beiden Sterne unterscheiden, wenn ihre scheinbare Entfernung weniger als 60 Secunden beträgt. Die übrigen Beobachter, welche nicht an Sternen, sondern an weißen beleuchteten Strichen oder Vierecken ihre Beobachtungen angestellt haben, fanden eine etwas geringere Genauigkeit. Es wurden von dem besten, von E. H. WEBER untersuchten Auge zwei weiße Striche unterschieden, deren Mittellinien  
 \* 73 Secunden von einander entfernt waren. Bei stärkerer Beleuchtung komme ich selbst unter möglichst günstigen Umständen bis 64 Secunden. In LISTING'S schematischem Auge entspricht auf der Netzhaut

ein Gesichtswinkel von	einem Abstände von
73"	0,00526 mm
63"	0,00464 "
60"	0,00438 "

Nach KOELLIKER'S Messungen beträgt die Dicke der Zapfen im gelben Flecke 0,0045 bis 0,0054 mm (siehe S. 38), was fast genau mit den vorigen Zahlen übereinstimmt, so daß auch durch diese Messungen die Annahme, daß die Zapfen die letzten empfindenden Elemente der Netzhaut bilden, bestätigt wird.  
 n Spätere Beobachter haben etwas kleinere Zahlen gefunden: M. SCHULTZ 0,0020 bis 0,0025, H. MÜLLER 0,0015 bis 0,0020, WELCKER 0,0031 bis 0,0036 mm.

216 Gleichzeitig ergibt sich, daß die optische Beschaffenheit eines gut gebauten und richtig accommodirten Auges vollkommen genügt, um den Grad von Genauigkeit, welchen die Größe der nervösen Elemente möglich macht, wirklich zu erreichen. Wir haben freilich (§ 13, S. 163) gefunden, daß

<sup>1</sup> R. SMITH, *A complete System of optics*, übers. v. KAESTNER. S. 20.

bei einem Durchmesser der Pupille von 4 mm der durch Farbenzerstreuung erzeugte Zerstreuungskreis einen Durchmesser von 0,0426 mm hat, also fast 10 mal gröfser ist, als die Dicke der Zapfen, aber dort auch schon die Gründe angegeben, warum diese Zerstreuungskreise trotz ihrer Gröfse das Sehen nicht erheblich beeinträchtigen. Die Abweichungen wegen Asymmetrie des Auges (§ 14, S. 182) sind meist viel geringer, und beeinträchtigen das Sehen weniger, wenn nicht gleichzeitig horizontale und verticale Linien gesehen werden sollen.

Auf den Seitentheilen der Netzhaut ist die Unterscheidungsfähigkeit viel geringer als im gelben Flecke, und zwar ist die Abnahme in der Nähe des Netzhautcentrum geringer, als in gröfserer Entfernung davon. Nach den Messungen von AUBERT und FÖRSTER ist die Abnahme nach verschiedenen Richtungen hin vom Centrum aus verschieden schnell, und zwar geschieht sie nach oben und unten am schnellsten, nach der äufseren Seite der Netzhaut hin am langsamsten; dabei scheinen die individuellen Unterschiede ziemlich bedeutend zu sein. Ein auffallendes Resultat ihrer Messungen ist auch, dafs bei der Accommodation für die Ferne die Abnahme nach den Seiten der Netzhaut hin schneller zu geschehen scheint, als beim Nahesehen. Sie fanden, dafs eine ähnliche Abnahme der Genauigkeit der optischen Bilder wenigstens in Kaninchenaugen nach den Seiten der Netzhaut hin nicht stattfindet. Dadurch wird constatirt, dafs die Unvollkommenheit des Sehens auf den seitlichen Netzhauttheilen nur von der Beschaffenheit der Netzhaut, nicht von der der optischen Bilder abhängt.

Als Object für die Feststellung der kleinsten zu unterscheidenden Distanzen hat TOB. MAYER und nach ihm E. H. WEBER weisse parallele Linien benutzt, welche durch gleich breite schwarze getrennt waren, VOLKMANN benutzte Spinnwebfäden auf hellem Grunde, ich selbst fand der Beleuchtung wegen passender ein Gitter von schwarzen Drähten zu benutzen, dessen Zwischenräume gleich dem Durchmesser der Drähte waren, und welches vor den hellen Himmel gestellt wurde. Außerdem hat TOB. MAYER auch weisse Vierecke benutzt, theils durch ein schwarzes Gitter getrennt, theils schachbrettartig geordnet. 217

Man mufs bei der Anstellung der Versuche darauf achten, dafs das Auge vollständig accommodirt werden könne, und nöthigenfalls ein passendes Brillenglas vor das Auge nehmen. Die Beleuchtung mufs stark sein, ohne doch blendend zu werden.




Fig. 119.

Bei diesen Versuchen bemerkte ich eine auffallende Formveränderung der geraden hellen und dunkeln Linien. Die Breite jedes hellen und jedes dunkeln Streifen des von mir gebrauchten Gitters betrug  $\frac{13}{24} = 0,4167$  mm. In dem Ab-

stande von 1,1 bis 1,2 m fing die Erscheinung an sichtbar zu werden. Das Gitter bekam etwa das Aussehen wie in Fig. 119 A; die weissen Streifen erschienen zum Theil wellenförmig ge-

krümmt, zum Theil perlschnurförmig mit abwechselnd dickeren und dünneren Stellen. Es seien in Fig. 119 B die kleinen Sechsecke Querschnitte der Zapfen

des gelben Flecks, *a*, *b* und *c* drei optische Bilder von den gesehenen Streifen. diese sind oberhalb *dd* in ihrer wirklichen Form dargestellt, unterhalb *dd* aber sind alle Sechsecke, deren grössere Hälfte schwarz war, ganz schwarz gemacht, deren grössere Hälfte weiss war, ganz weiss, weil in der Empfindung immer nur die mittlere Helligkeit jedes Elements wahrgenommen werden kann. Man sieht, dass dadurch in der unteren Hälfte von *Fig. 119 B* ähnliche Muster entstehen, wie in *A*. PURKINJE<sup>1</sup> hat Ähnliches gesehen, und auch BERGMANN hat beobachtet, dass zuweilen, ehe die Streifen des Gitters ganz verschwinden, dasselbe schachbrettartig erscheint, zuweilen Streifen in querer Richtung gegen die wirklich vorhandenen gesehen werden, was sich alles durch ähnliche Verhältnisse, wie die hier berührten, erklären lässt<sup>2</sup>.

Wenn bei den Beobachtungen zwei leuchtende Objecte benutzt worden sind, deren Breite gegen ihren Abstand verschwindet, so können sie als zwei nur erkannt werden, wenn zwischen den Netzhautelementen, welche ihre Bilder empfangen, ein anderes zurückbleibt, welches dunkel bleibt. Der Durchmesser eines solchen Elements muss also jedenfalls kleiner sein, als der Abstand der beiden hellen Bilder. Ist die Breite der Objecte aber gleich dem dunkeln Streifen zwischen ihnen, so ist es nicht gerade nöthig, dass die Netzhautelemente schmaler seien, als das Bild des dunkeln Streifens. Ein Netzhautelement, welches von dem Bilde des dunkeln Streifens getroffen wird, und mit seinen Seitenrändern noch zum Theil in die hellen Streifen hineinragt, wird deshalb doch noch weniger Licht als seine Nachbarn empfinden können, vorausgesetzt, dass die ganze Lichtmenge, von der es getroffen wird, kleiner ist, als die der Nachbarn. Wir können in solchen Fällen deshalb mit Gewissheit nur soviel folgern, dass die Netzhautelemente kleiner seien als die Entfernung der Mittellinien der hellen Streifen. Auch zeigt sich in der That in den unten angeführten Versuchen von TOB. MAYER, dass bei parallelen Linien die Unterscheidbarkeit dieselbe bleibt, wenn sich die Breite des Schwarz oder Weiss ändert, aber die Summe der Breite eines schwarzen und eines weissen Streifen constant bleibt. Deshalb habe ich als Breite des Objects immer die Summe angegeben, welche der Entfernung der Mittellinien zweier benachbarter Objecte gleich ist, abweichend von MAYER, WEBER und VOLKMANN, und danach auch den kleinsten Gesichtswinkel berechnet.

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche*. I. 122.

<sup>2</sup> BERGMANN, *Henle und Pflueger, Zeitschrift für ration. Medicin.* (3.) II. 88.

Beobachter.	Object.	Größe des Objects.	Entfernung vom Auge.	Entfernung dividirt durch Größe des Objects.	Gesichtswinkel in Sekunden.	* 17
1) HOOKE . . . . .	Fixsterne . . . . .	—	—	—	60	
2) TOR. MAYER..	a) Parallele Linien mit gleichen Zwischenräumen. . . . .	0,72 Par. Lin.	11 Par. Fuß	2200	94	
	b) Eben solche mit breiteren und schmaleren Zwischenräumen. . .	0,6 " "	9 1/2	2275	90	
3) Derselbe . . . .	Weisse Quadrate durch ein schwarzes Gitter getrennt. . . . .	0,88 " "	15 1/2	2422	80	
4) Derselbe . . . .	Schachbrettmuster . . . . .	1,04 " "	12	1661	124	
5) VOLKMANN . . .	Spinnwebfaden . . . . .	0,0052 Par. Zoll	7 Par. Zoll	1346	147,5	
6) N. N. bei VOLK-MANN . . . . .	Dieselben . . . . .	—	13	2500	80,4	
7) TH. WEBER bei E. H. WEBER.	Parallele Linien mit gleich breiten Zwischenräumen. . . . .	0,05 Par. Lin.	110 1/2 Par. Lin.	2210	90,6	
8) N. N. 1 bei demselben . . . . .	Dieselben . . . . .	—	138	2760	73	
9) N. N. 2 bei demselben . . . . .	Dieselben . . . . .	—	110 1/2	2210	90,6	
10) HELMHOLTZ..	Stabgitter . . . . .	1,083 mm	3500 mm	3235	63,75	
11) O. II. bei demselben . . . . .	Dasselbe . . . . .	—	2400	2215	93	
12) BERGMANN . .	Parallele Linien mit gleich breiten Zwischenräumen. . . . .	2 mm	5500 bis 8000	2750 4000	75 51,6	
13) HIRSCHMANN.	Parallele Drähte . . . . .	—	—	4125	50	

Die zweite Methode der Untersuchung wurde mittels des in *Fig. 120* abgebildeten Apparats bei gewöhnlichem Tageslichte ausgeführt. *A* ist ein weiß




Fig. 120.

lackirter Blechstreifen von 0,3 m Länge und 0,5 m Breite, welcher nach Art der Flügel einer Windmühle um die Axe *u* gedreht werden kann. Der Blechstreifen mit seiner Axe läßt sich an einer verticalen Stahlstange *B* auf- und abschieben, welche auf einem Brettchen *C* befestigt ist. Am andern Ende des Brettchens, gegenüber der Axe des Blechstreifens, befindet sich das eine Auge des Beobachters, während sein anderes Auge durch den schwarzen Papierschirm *D* verdeckt ist, welcher an einem Holz-

stabe *d* so befestigt ist, daß er nach links und rechts gedreht werden kann. Die Axe des Blechstreifens ist 0,2 m von dem Mittelpunkt der Grundlinie beider Augen des Beobachters entfernt. Das Brettchen *C* hat unten eine Handhabe. Bei den Versuchen legte der Beobachter die Nase an den Holzstab *d*, verdeckte mit dem Schirm das eine Auge, stützte sein Kinn auf das Brett vor dem Schirm und stellte die Axe der Blechtafel in gleiche Höhe mit den Augen. Nun fixirte er den Mittelpunkt der Tafel (oder die Spitze ihrer Axe) unverwandt, und schob allmählig von der Seite her in den Falzen der Blechtafel eine weiße Karte *b* mit 2 Punkten nach dem fixirten Punkte hin. Sobald er, bei ununterbrochen fester Fixation, mit den seitlichen Theilen der Retina die zwei Punkte unterschied, hielt er die Karte fest und las die Entfernung der beiden Punkte von dem Fixationspunkte an einer Metereintheilung, welche sich an den Falzen der Blechtafel befand, ab, und dies wurde für verschiedene Neigungen der Blechtafel gegen den Horizont ausgeführt. Die schwarzen Flecke auf der Karte waren rund, von verschiedener Größe und verschiedenem gegenseitigen Abstände. Beide Punkte standen immer gleich weit von der Drehungsaxe ab.

Die *Fig. 121* stellt die Resultate dieser Messungen für ein Paar schwarze Flecke von 2,5 mm Durchmesser und 14,5 mm gegenseitigen Abstand dar. Die




Fig. 121.

tung nach den verschiedenen Stellungen der Blechtafel. *A* außen, d. h. Schläfenseite, *I* innen oder Nasenseite.

ausgezogene Grenzlinie bezieht sich auf AUBERT's, die punktirte auf FÖRSTER's Augen. Der Schnittpunkt der *Radii vectores* entspricht dem Fixationspunkte der Augen, die gezogenen *Radii vectores* selbst entsprechen den einzelnen Messungen und ihrer Richtung. *O* bedeutet oben, *U* unten. Die Linie *ab* bezeichnet



die entsprechende Entfernung von der Blechtafel, welche 0,2 m betrug. Alle Lineardimensionen sind auf  $\frac{1}{5}$  reducirt<sup>1</sup>. Es stellen also diese Flächen zunächst diejenigen Theile des Gesichtsfeldes dar, innerhalb deren man zwei Punkte von der angegebenen Gröfse und Entfernung von einander unterscheiden kann; will man die entsprechenden Flächen der Netzhaut haben, so mufs man sie umkehren. Die unregelmäfsig ovale Gestalt dieser Flächen zeigt beträchtliche individuelle Abweichungen selbst zwischen den beiden Augen derselben Person.

Die mittleren Resultate der Messungen an verschiedenen Paaren von schwarzen Flecken sind in *Fig. 122* dargestellt. Der Fixationspunkt ist *a*, und *ab*, *ac* sind die Mittel sämmtlicher Entfernungen; welche bei allen vier Augen in je 8 verschiedenen Meridianen für das bezüglich bei *b*, *c* u. s. w. stehende Paar von Punkten an der Blechtafel eingestellt wurden. Bei *c* ist das Paar von Punkten, auf welche sich *Fig. 121* bezieht. Man sieht, dafs in gröfserer Entfernung die Breite des Objects schneller




Fig. 122.

zunehmen mufs, als bei kleineren Entfernungen. Die gefundenen Mittelzahlen selbst sind folgende:

Entfernung der Punkte in mm.	Durchmesser der Punkte in mm.	Mittlerer Abstand vom Centrum der Blechtafel in mm.
3,25	1,25	31
6,5	2,5	50
9,5	3,75	55
12	1,25	60
14,5	2,5	65
20,5	3,75	77

Bei diesen Versuchen fanden die beiden Beobachter übrigens noch öfters unempfindliche Stellen der Netzhaut, gleichsam kleine blinde Flecke, wo einer der Punkte oder beide plötzlich verschwanden. Ausser solchen Stellen, wo nur eine vorübergehende Blendung stattzufinden schien, waren auch constante vorhanden, die immer wieder zu finden sind. 222

Dafs die Ortsunterscheidung auf den Seitentheilen der Netzhaut so viel schwächer ist, könnte man, indem man nur die Zapfen als lichtempfindlich ansieht, durch die auf gleiche Fläche fallende sparsamere Zahl der durch Stäbchen getrennten und andererseits auch dickeren Zapfen zu erklären suchen. Indessen sind nach AUBERT's und FÖRSTER's Messungen die Unterschiede zwischen Centrum und Peripherie gröfser, als man nach einer solchen Hypothese erwarten sollte. Die Zählungen von F. SALZER zeigen Unterschiede, die das Verhältnifs von 2 zu 5 Zapfen auf gleicher Fläche erreichen, meist aber lange nicht so weit gehen. Gleichzeitig ergibt sich aus diesen Zählungen, dafs die Anzahl der Zapfen auf der menschlichen Netzhaut gegen 3 Millionen beträgt, während von Nervenfasern im Sehnerven etwa nur 1 Million vorhanden sein können, dafs also nicht jeder Zapfen einer Nervenfaser entsprechen kann.

<sup>1</sup> Die Angabe AUBERT's, dafs sie auf  $\frac{1}{4}$  reducirt seien, paßt nicht zu den angegebenen Zahlen.

Man muß deshalb auch für das Auge an eine andere Hypothese denken, die wahrscheinlich bei den Tastnerven zutrifft. Man denke eine mit empfindenden Elementen bedeckte Fläche, deren Nerven in ein feines anastomosirendes Netz von Nervenfasern aufgelöst sind, welches einerseits mit den zahlreichen empfindenden Elementen, andererseits mit der sehr viel kleineren Zahl zum Gehirn leitender Nervenfasern in Verbindung steht. Man setze ferner voraus, daß jede Erregung eines empfindlichen Elements sich durch das Netz hindurch den in der Nähe aus dem Netz entspringenden Nervenfasern mittheilen könnte, aber um so schwächer, je weiter entfernt diese entspringen. Unter diesen Umständen würde jeder Punkt der Fläche empfindlich sein und die Erregung verschiedener zwischen den Abgangsstellen derselben drei Nervenfasern liegenden Punkte würde dadurch verschiedenen Eindruck machen, daß die Erregung sich in verschiedenem Maasse auf diese drei Nervenfasern vertheilte, je nachdem der erregte Punkt der einen oder der andern unter ihnen näher gelegen wäre. Wenn man also sehr feine Abstufungen im Verhältniß der Erregungsstärken solcher benachbarten Nervenfasern noch erkennen könnte, würde auch eine sehr feine Unterscheidung verschiedener Lagen eines einzelnen erregten Punktes und seiner Bewegung noch möglich sein. Aber zwei Eindrücke würden zwischen denselben ableitenden Nervenfasern immer nur als ein mittlerer erscheinen können. Eine solche Einrichtung würde also eine sehr beschränkte Unterscheidung zweier gleichzeitig gereizten Stellen, und dabei doch eine feine Wahrnehmung der Fortbewegung einer gereizten Stelle geben können.

Die von TOBIAS MAYER schon beobachtete Abhängigkeit der Unterscheidung kleiner Objecte von der Lichtstärke, auf welche wir näher in § 21 eingehen werden, würde bei der zuletzt erörterten Hypothese davon abhängen können, daß die kleineren localen Unterschiede nur durch Unterschiede der Lichtstärke angezeigt wären, und wir bei schwacher Helligkeit nur grössere Bruchtheile von Lichtstärke unterscheiden.

Aber auch für das Sehen mit gesonderten empfindlichen Elementen, wie es wahrscheinlich in der Netzhautgrube stattfindet, können die oben erwähnten Zeichnungen und Muster des Eigenlichts der Netzhaut schwach beleuchtete und wenig ausgedehnte Bilder leicht unkenntlich machen, während gleichmäßige schwache Belichtung einer ausgedehnten Fläche leichter als von außen kommend zu erkennen wäre.

842 Die ärztlichen Bestimmungen der Sehschärfe werden in der Regel mit Buchstaben von verschiedener Grösse ausgeführt, welche man aus grösserer Entfernung und mit passender Unterstützung der Accommodation durch Brillengläser betrachten läßt. Als Maass der Sehschärfe eines Auges benutzt man einen Bruch, dessen Zähler der Abstand ist, in welchem jene Buchstaben noch gelesen werden konnten, dessen Nenner dagegen die Entfernung ist, aus der sie unter einem Winkel von 5 Winkelminuten erscheinen. Die letzteren Entfernungen sind bei Buchstabenproben, welche SNELLEN veröffentlicht hat, schon angegeben.

Im Durchschnitt findet sich nach VROESOM DE HAAN diese Genauigkeit im 10. Lebensjahre gleich 1,1, im 40. gleich 1,0, im 80. gleich 0,5 und nimmt überhaupt mit steigendem Lebensalter continuirlich ab.

Nach den Beobachtungen von E. JAVAL ist aber bei Correction des Astigmatismus und guter Beleuchtung (gleich der von 500 Kerzen in 1 m Entfernung) die Genauigkeit des Sehens um  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$  grösser, als DE HAAN angab.

Veränderungen in der Netzhaut, welche bei der Reizung durch Licht eintreten. Dergleichen sind erst in neuester Zeit beobachtet worden, sie sind Bleichung des Sehroth, Bewegungen der Pigmentkörnchen in dem Pigmentepithel der Netzhaut, und elektrische Ströme.

Bleichung des Sehroth. Dafs die Aufsenglieder der Stäbchen der Frösche unter Umständen roth aussehen, war gelegentlich schon von H. MÜLLER, LEYDIG und MAX SCHULTZE beobachtet worden, von letzterem auch bei der Ratte und Eule. FR. BOLL<sup>1</sup> fand, dafs es hauptsächlich das Licht ist, welches dieses Pigment, das er „Sehroth“ nannte, zerstört, und dafs man dasselbe regelmäfsig beobachten kann, wenn man die Frösche vor ihrem Tode im Dunkeln aufbewahrt, und das Auge schnell, bei möglichst geringem Lichte präparirt. Die genauere physikalische und chemische Kenntnifs der Bedingungen, die hierauf Einflufs haben, und der Vorgänge dabei, verdanken wir Herrn W. KÜHNE, nach dessen Darstellung<sup>2</sup> ich hier referire. Wenn man die Präparation des Auges im Natronlicht vornimmt, ist gar keine grofse Eile nöthig. Der Sehpurpur ist in den Stäbchen fast aller Wirbelthiere, auch beim Menschen gefunden worden. In der Nähe des vorderen Randes der Netzhaut fehlt er beim Menschen, Affen und andern Thieren, bei ersteren scheinen auch die im Umkreise der Netzhautgrube spärlich zwischen den Zapfen des gelben Flecks stehenden Stäbchen purpurfrei zu sein. Die Aufsenglieder der Zapfen sind nicht gefärbt, die Netzhautgrube eines frisch, unter den nöthigen Vorsichtsmafsregeln exstirpirten menschlichen Auges fand KÜHNE durchaus farblos<sup>3</sup>.

Das rothe Pigment kann durch Lösung reiner gallensaurer Alkalisalze gelöst werden. Die Lösungen sind klar, purpurn in verschiedener Tiefe und Farbenton, am Lichte werden sie schnell roth, dann gelb, zuletzt farblos. Durch Dialyse kann das gallensaure Salz ausgewaschen werden, unter Rücklassung einer weichen purpurfarbigen Masse, die vom Lichte ebenfalls schnell gebleicht wird.

Die Lösung des Sehpurpur im Dunkeln verdünnt wird rosenroth, stärker verdünnt lila. Frischer Sehpurpur in Lösung läfst Roth und Violet durch; von *D*.  $\frac{1}{2}$ . *E* im Gelbgrün bis *G* an der Grenze des Violet ist die Absorption ziemlich gleich stark, an der erstgenannten Grenze ein wenig stärker, nach den Enden des Spectrum hin schwächer. Gelb gewordenes Sehroth absorbiert das Violet, läfst aber Grün wieder durch.

Im lebenden Auge mit Hülfe des Augenspiegels ist der Sehpurpur wegen des dunklen, vom Blut gerötheten Hintergrundes der Netzhaut nicht sichtbar.

Im Interferenzspectrum wird der Sehpurpur zuerst im Gelbgrün, am Orte der stärksten Absorption gebleicht; das durch die Bleichung veränderte Pigment (Sehgelb) wird dagegen durch die blauen und violetten Strahlen schneller als durch die weniger brechbaren farblos gemacht.

<sup>1</sup> F. BOLL, Berlin. Monatsber. 12. Nov. 1876. Acad. dei Lincei. 3. Decbr. 1876. Derselbe, du Bois-Reymond's Archiv für Anatomie und Physiologie. 1877. S. 4.

<sup>2</sup> Zusammengefaßt in L. HERMANN, Handbuch der Physiologie. Bd. III. Th. 1. Chemische Vorgänge in der Netzhaut von W. KÜHNE. Leipzig. 1879.

<sup>3</sup> W. KÜHNE, Untersuchungen des physiol. Institute der Univers. Heidelberg. Bd. III. Heft 1 und 2. Bd. IV. Heft 3.

Bei Mensch und Thieren fluorescirt die Stäbchenschicht ungebleicht schwach und mit bläulichem Scheine, bedeutend stärker und grünlich, nachdem sie durch Licht vollkommen entfärbt worden. Stäbchen ohne Purpur, wie sie am vorderen Rande der menschlichen Netzhaut vorkommen, lassen kaum Fluorescenz erkennen, ebenso wenig die purpurfreien Zapfen; die Netzhautgrube erscheint in gut conservirten menschlichen Netzhäuten, auch wenn ihre langen Zapfenaufsglieder noch vorhanden sind, im Focus über-violetter Strahlen immer als dunkler Fleck, und um so auffallender dunkel, je mehr die Stäbchen der Umgebung zu fluoresciren beginnen.

Die Bleichung des Sehpurpurs geschieht auch während des Lebens durch das in das Auge fallende Licht. Ein lebender Frosch braucht nur 10 bis 15 Minuten gegen die unbedeckte Sonne gehalten zu werden, oder 30 Minuten im Freien gutem Tageslichte ausgesetzt zu sein, um den Purpur zu verlieren. Bei einem Kaninchen mit erweiterten Pupillen genügt ebenfalls ungehindertes Tageslicht in einer Viertelstunde. Wenn man die Augen nachher bei Natronlicht unter aller Vorsicht präparirt, sind die Netzhäute farblos, beziehlich gelb oder chamois, wenn das Licht schwächer war.

Die Bleichung geschieht nur so weit die Netzhaut vom Lichte getroffen wird. Wenn also das Auge unbeweglich so aufgestellt wird, daß es scharfe Bilder auf seiner Netzhaut entwirft, so erhält man eine Art photographischer Bilder auf derselben, Optogramme, wie sie ihr erster Darsteller, Herr W. KÜHN, genannt hat.

An einigermaßen frischen, ausgeschnittenen Kaninchen- und Rindsaugen erhält man die Bilder leicht durch Exponiren auf dem Grunde eines cylindrischen, innen geschwärzten Kastens von 50 cm Durchmesser und 50 cm Höhe, der mit einer matten Glastafel bedeckt ist, auf welcher Streifen schwarzen Papiers das Object bilden. Die Belichtung erfordert 2—7 Minuten guten Himmelslichts. Die Netzhaut muß dann bei Natronlicht unter Salzwasser sogleich, oder nach 24stündigem Liegen des durchschnittenen Auges in Alaunlösung von 4 pCt. abgehoben und flottirend, oder auf ein glasiertes weißes Porcellanschälchen ausgebreitet betrachtet werden.

Auch im Auge gefesselter lebender Kaninchen mit durch Atropin erweiterter Pupille und unbeweglich gemachten Augen können in 10 Secunden bis 7 Minuten Optogramme erzeugt, und nach schneller Tödtung des Thieres beobachtet werden. Die aus der Alaunlösung genommenen Netzhäute, 8 Tage lang im Dunkeln getrocknet, haben ziemlich echt gefärbtes Sehgelb, welches am Licht kaum noch verändert wird.

Im Froschauge bildet das Haften des schwarzen Epithels an den belichteten Stellen ein Hinderniß. Am besten wird dies überwunden, wenn man die curare-sirten Frösche durch Liegen im Wasser ödematös macht und dann das Lichtbild entwickelt.

Die Verfärbung des Purpurs geht im lebenden Auge durch dieselben Farbenstufen, wie im Tode, aus purpurroth wird sie reinroth, ziegelroth, orange, rosa, chamois, gelb, bevor sie ganz farblos wird.

Im lebenden Auge stellt sich der Sehpurpur im Dunkeln wieder her: bei Fröschen selbst in ausgeschnittenen Augen, die dem Blutumlauf entzogen

sind. Das geschieht im Dunkeln sogar noch an der ausgeschnittenen Netzhaut, so lange sie mit dem Pigmentepithel ihrer Rückseite in Berührung ist, auch wenn sie schon abgehoben worden und dann wieder aufgelegt ist. Die regenerative Fähigkeit des Pigmentepithels kann schnell durch Erhitzen der Augen bis 45° C. aufgehoben werden, sonst geht sie durch Absterben langsamer verloren, bei Säugern schneller als bei Fröschen. Übrigens wirkt auch das nicht pigmenthaltige Epithel albinotischer Kaninchenaugen regenerierend, wenn auch solche Versuche am Säugethierauge wegen des schnellen Absterben des Epithels nur unvollständig gelingen.

Ein ganz entfärbtes Auge eines lebenden Frosches braucht 20 Minuten Dunkelheit, um die erste Spur der Stäbchenfärbung wieder zu gewinnen, 1 bis 2 Stunden, im Eiswasser sogar bis 9 Stunden, um den Purpur wieder herzustellen. Kaninchen brauchen 7 Minuten Dunkelheit, um den ersten Anflug. 33 bis 38 Minuten, um die volle Sättigung des Purpurs herzustellen. Darüber kann sehr scharf durch Optogramme entschieden werden, die man im lebenden Auge erzeugt, und nachher in der Dunkelheit wieder ausblenden läßt, ehe man das Thier zur Untersuchung des Auges tödtet.

Der sich regenerierende Sehpurpur zeigt nicht die gelblichen Färbungen des bleichenden Purpurs, sondern tritt gleich lila oder rosenroth hervor. Es wird also bei der Regeneration ganz gebleichten Purpurs kein Sehgelb wieder gebildet. Sehr viel schneller geht dagegen die Herstellung des Purpur von statten, wenn die Bleichung nur bis zur Bildung von Sehgelb fortgeschritten ist, also muß dies in Purpur zurückgeführt werden können. Und auch an Froschnetzhäuten, die vom Epithel getrennt, gebleicht, und dann auf das Epithel zurückgelegt sind, beobachtet man diese schnellere Regeneration durch gelb hindurch. Herr W. KÜHNÉ nimmt an, daß in diesen Fällen das Sehgelb, beziehlich dessen farbloses Product das Sehweiß der Stäbchen noch nicht verloren gegangen sei, und das Material zur Neubildung des Purpurs gebe. Ist aber das Sehweiß den Stäbchen im lebenden stark belichteten Auge verloren gegangen, so müssen die Epithelzellen neues Material liefern, welches nicht gelb wird.

Übrigens zeigen auch Lösungen von Sehpurpur schwache Regeneration, um so deutlicher, wenn die Netzhaut in die Cholatlösung mit der Epithelschicht eingebracht war. Die regenerierende Substanz aus dem Epithel scheint also in kleinen Mengen löslich zu sein.

Die Epithelzellen scheinen selbst gegen Licht empfindlich zu sein und ihre regenerierende Fähigkeit dadurch zu verlieren, wobei rothes Licht, wie es auch durch die natürlich gefärbten Stäbchen ihnen zukommt, weniger schädlich ist, als andres. Es zeigt sich dies, wenn man von dem Pigment abgezogene Netzhäute von ödematösen Curarefröschen auf die mehr oder weniger dem Lichte ausgesetzt gewesene Pigmentschicht eines andern Frosch- auges bringt. Rothe Belichtung zeigt sich dabei sehr wenig nachtheilig für die regenerativen Processe. Die Schwächung der Epithelwirkung durch Belichtung zeigt sich auch darin, daß eine gewisse Stärke rother Belichtung,

welche die Augen von Dunkelfröschen nicht bleicht, doch im Stande ist, die Wiederfärbung gebleichter Augen zu verhindern.

Da Sehpurpur in den Aufsengliedern der Zapfen bisher nie gefunden wurde, auch nicht bei der größten Schnelligkeit der Präparation und Vorsicht in der Belichtung des Auges, und die Netzhautgrube, in der wir die schärfste Localisation beim Sehen finden, keine Stäbchen und keinen Purpur enthält, außerdem ganze Thierclassen keinen Purpur in ihren Augen zeigen (Schlangen, die meisten Wirbellosen), so kann zweifellos ohne Purpur gesehen werden. Ja auch bei Thieren, welche nur Stäbchen, oder wenigstens nur purpurhaltige Elemente in ihrer Netzhaut haben, wie die Kaninchen, ist es nach KCHNES Beobachtungen sicher, daß sie sehen, selbst wenn man sie vorher so lange dem Sonnenlichte ausgesetzt hat, daß ihre Netzhaut vollständig gebleicht sein muß.

Man wird dem Sehpurpur nur Functionen zuschreiben können, durch welche sich die peripherischen Theile der Netzhaut vor dem Centrum auszeichnen. Wir werden später sehen, daß jene für schwache Lichteindrücke, namentlich bewegter Gegenstände empfindlicher sind. Bekannt ist, daß feine Lichtpunkte, wie die Plejaden, direct fixirt, fast verschwinden, bei Fixation eines nahe gelegenen andern Sterns dagegen viel heller zum Vorschein kommen. Wir kommen in § 21 und 23 hierauf zurück.

Einwirkung des Lichts auf das Pigmentepithel. Bewegungen der Pigmentkörnchen im Innern von Zellen, wo sie in contractiles Protoplasma eingelagert sind, kommen auch außerhalb des Auges unter dem Einfluß von Licht vor. Am auffallendsten sind sie in der Haut der Chamäleonten, wo sie von E. BRÜCKE untersucht worden sind, ebenso in der Haut der Frösche. Daß die Pigmentschicht nach Belichtung der Netzhaut stärker anhaftet, war von BOLL<sup>1</sup> bemerkt worden, die Bewegung der Körnchen von CZERNY<sup>2</sup>, ANGELUCCI<sup>3</sup>, W. KÜHNE erkannt und studirt. Ich referire wieder nach des Letzteren zusammenfassender Darstellung.

Bei Fröschen, die im Dunkeln gesessen haben, liegen die Pigmenthäufchen um die äußeren Enden der Stäbchen zusammengedrängt, so daß die Endflächen der Stäbchen, die den Pigmentzellen anliegen, unbedeckt bleiben, und Licht von der Außenseite der Netzhaut durch die Axe der Stäbchen nach innen durchgehen kann. Versucht man, die Netzhaut abzuziehen, so löst sie sich in der Regel von der Schicht der Pigmentzellen, indem deren zwischen die Stäbchen eindringenden Fortsätze herausgezogen werden.

Wirkt Licht ein, so verbreitet sich das Pigment sowohl hinter der Endfläche des Stäbchens, als in die Fortsätze zwischen die Aufsenglieder, theilweis sogar zwischen die Innenglieder der Stäbchen und Zapfen, und da auch gleichzeitig die Aufsenglieder der Stäbchen schwellen, so liegen sie

<sup>1</sup> F. BOLL, *Monatsber. d. Akad. Berlin.* 1877. Jan. 11.

<sup>2</sup> CZERNY, *Wiener Sitzungsber.* LVI.

<sup>3</sup> A. ANGELUCCI, *Atti dell' Acad. d. Lincei.* 1877—78. Ser. III. Vol. 2. p. 1031—1055, auch im *Archiv für Anat. u. Physiol.* 1878.

fester zusammengedrängt zwischen den gefüllteren Pigmentfortsätzen. Dadurch scheint das Haften derselben bedingt zu sein. Bei niederer Temperatur tritt es weniger stark ein. Die Wanderung des Pigments beginnt, noch ehe die Bleichung des Sehpurpurs erheblich vorgeschritten ist, sie schreitet nach KÜHN<sup>e</sup> am weitesten fort in rother Beleuchtung, welche den Purpur nur langsam bleicht. ANGELUCCI fand blaues Licht wirksamer. Zum vollständigen Vordringen des Pigments genügen nach ihm 10—15 Minuten, zur Rückbildung sind 1½ bis 2 Stunden nöthig.

Die Erscheinungen sind am vollständigsten an Fröschen zu studiren, doch zeigt sich das stärkere Haften nach Belichtung deutlich auch bei Vögeln und Säugethieren, und ist in einem geeigneten Falle von KÜHN<sup>e</sup> auch am Menschen beobachtet worden.

Dafs das Vortreten des Pigments die Regeneration des Sehpurpurs sehr erleichtern, seine Bleichung verzögern werde, scheint wahrscheinlich, dafs es Ausbreitung und Reflexion des Lichtes in der musivischen Schicht der Netzhaut beschränke, ebenfalls. Dagegen erscheint die Bewegung des Pigments, so weit wir sie bisher kennen, viel zu träge, als dafs sie dem schnellen Wechsel von Licht und Dunkel auf der Netzhaut entsprechen könnte, und die Pigmentzellen zu grofs, als dafs sie Sehelemente darstellen könnten. Zu bemerken ist freilich, dafs auch die sehr schnelle Flimmerbewegung der mit Wimperhäärchen versehenen thierischen Zellen durch Protoplasma vermittelt ist. Wenn also Lichtreiz in den Pigmentkörperchen vibrirende Bewegungen, ähnlich denen der Brownschen Molecularbewegung hervorbringen könnte (wofür aber bisher noch jede Beobachtung fehlt), so könnten dadurch auch wohl die zwischen den Pigmentfortsätzen liegenden Aufsenglieder der Stäbchen und Zapfen gereizt werden.

Neuerdings hat Herr VAN GENDEREN STORT<sup>1</sup> gefunden, dafs sich auch die Innenglieder der Zapfen unter Lichteinwirkung zusammenziehen, kürzer und dicker werden. Die gewöhnlich gegebenen Abbildungen der Zapfen entsprechen diesem belichteten Zustand. Mäfsiges Tageslicht bringt dies in 10—15 Minuten hervor; die brechbaren Strahlen wirken schneller, doch ist schliesslich das Maximum der Contraction immer dasselbe. Die Veränderung kann in rothem Licht ohne gleichzeitiges Hervortreten des Pigments vorkommen. Übrigens wirkt nicht blos Licht, was die Netzhaut trifft, sondern reflectorisch auch solches, was das andere Auge oder die Haut des Frosches trifft.

Electrische Ströme des Sehnervenapparates.

Nach den Entdeckungen von E. DU BOIS-REYMOND erregen alle Nervenstämmen des thierischen Körpers electrische Ströme, wenn an ihnen in noch reizbarem Zustande ein Querschnitt angelegt, und ein leitender Bogen mit einem Ende an die natürliche Oberfläche des Nerven (natürlichen Längsschnitt) mit dem andern an den Querschnitt angelegt wird. Der Bogen mufs

<sup>1</sup> VAN GENDEREN STORT, *Akad. zu Amsterdam*. Sitzung 28. Juni 1884.

so eingerichtet sein, daß in ihm keine selbständige elektromotorische Kraft ihren Sitz hat, namentlich nicht an den Stellen, wo die feuchten Leiter, die zunächst den thierischen Theilen anliegen, an die metallischen Elektroden stoßen, die das Ende des Galvanometerdrahtes bilden. Der Strom geht im ungereizten Zustande des Nerven vom Längsschnitt durch den Bogen zum Querschnitt. Diesen Strom bezeichnet E. DU BOIS REYMOND als den ruhenden Nervenstrom. Er verschwindet, wenn der Nerv abstirbt.

Um die galvanische Polarisirung bei solchen Versuchen möglichst zu vermeiden, werden nach des genannten Autors neueren Vorschriften<sup>1</sup> die Enden der Multiplicatorleitung mit zwei kleinen amalgamirten Zinkplättchen versehen, die in Glasröhren mit concentrirter Lösung von Zinksulphat gefüllt stecken, an ihrem unteren Ende verengert und durch Pfröpfe von plastischem Thon geschlossen sind. Der Thon ist mit 0,75 bis 2 procentiger Kochsalzlösung durchtränkt, weil dies eine Flüssigkeit ist, deren Berührung den Lebenseigenschaften der thierischen Gewebe sehr wenig nachtheilig ist. Bei den Versuchen über Ströme der Netzhaut hat neuerdings Herr W. KÜHNE noch feine Membranstücke der Froschlunge über den Thon gebreitet.

Wenn der Nerv, von dessen Querschnitt der Strom abgeleitet wird, gereizt wird, sei es durch eine Reihe hin- und hergehender elektrischer Inductionsströme, sei es in andrer Weise, so tritt eine Verminderung des Stromes, beziehlich Umkehr desselben ein, die negative Schwankung des Nervenstroms. Dieselbe schwindet ebenfalls beim Absterben des Nerven, pflanzt sich im lebenden Nerven mit derselben Geschwindigkeit fort, wie die Reizung, und zwar nach aufwärts, wie nach abwärts, und ist nach allem, was wir darüber wissen, die stete Begleiterin des Eintritts der Reizung. Beim Aufhören der Reizung schwindet sie wieder ziemlich schnell, indem der Strom des ruhenden Nerven wieder eintritt.

Die beschriebenen Erscheinungen sind nach den Untersuchungen von Herrn W. KÜHNE auch am Stamm des Sehnerven zu beobachten, ganz in derselben Weise wie an den motorischen Nerven, und es ist ihm sogar gelungen die negative Schwankung am Sehnerven des Frosches bei Reizung der Netzhaut durch Licht nachzuweisen. Der Versuch wird nur schwierig durch die Kleinheit der Objecte und die Nothwendigkeit die subtile Präparation bei schwacher Beleuchtung mit rothem Licht oder Natronlicht in einem übrigens dunklen Raum schnell zu vollenden, da eines der zwischen Netzhaut und Sehnerven eingeschalteten Gebilde verhältnißmäßig schnell seine Reizbarkeit verliert, während die genannten Organe selbst ziemlich ausdauernd sind.

Die Sehnerven größerer Fische (Barsch, Hecht) lassen sich bequemer präpariren; aber die Reizbarkeit der Augen ist nicht so ausdauernd, wie

<sup>1</sup> E. DU BOIS-REYMOND, *Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen zu electrophysiologischen Zwecken*. Abhandl. d. Akad. zu Berlin. 1862. Phys. Cl. S. 65; auch in *Gesammelte Abhandlungen über Muskel- u. Nervenphysik*, Bd. I. Berlin 1875. S. 145—168.



die der Frösche, deren Sehnerven bei den größten Exemplaren nur 4 bis 4,5 mm lang ist. Bei letztern ist es Herrn KÜHNE gelungen, indem er die Elektroden nur am Längsschnitt und Querschnitt des Sehnerven verlegte, eine allerdings kleine negative Schwankung bei Einwirkung des Lichts auf den Bulbus von der Hornhaut her zu beobachten. Der einzige Unterschied der sich zeigte war eine meist noch bei Unterbrechung der Beleuchtung eintretende kurze Verstärkung der negativen Schwankung, nach welcher erst der Ruhezustand wieder eintrat. Herr KÜHNE bezeichnet dies als die negative Schlusschwankung. Sie schwindet im Laufe des Absterbens eher als die gewöhnliche negative Schwankung, die wir von den Muskelnerven kennen.

Auffallendere Abweichungen von dem Gesetze der Muskelnerven zeigt die Netzhaut, der auch in ihrer elektrischen Wirksamkeit eine ungemein feine Empfindlichkeit zukommt, welche sich sogar im isolirten Zustande als ziemlich ausdauernd erweist.

Der Ruhestrom der Netzhaut, wenn man die Elektroden an die entgegengesetzten Seiten der Membran anlegt, geht von der vorderen Seite, wo die Sehnervenfasern liegen, durch den leitenden Bogen zur Stäbchenseite. Er hat also die Richtung des Stromes der ruhenden motorischen Nerven, wenn wir die Ausbreitung der Sehnervenfasern als die hier wirksame Faserschicht betrachten, die hinteren Schichten der Netzhaut als deren natürliche Querschnitte.

Betrachten wir diese Richtung des Ruhestromes als die positive Richtung der Netzhautströme, so giebt plötzliche Belichtung der Netzhaut des Frosches, sei es mit blauem, grünem, gelbem, rothem oder weißem Lichte, erst einen ganz kurzen Ausschlag in positivem Sinne, dann eine negative Schwankung, welche eine verhältnißmäßig constante Ablenkung des Galvanometers hervorbringt, die nur langsam bei gleichmäßig andauernder Belichtung sich dem ursprünglichen Ruhezustande wieder nähert. Diese negative Schwankung ist nicht nothwendig absolut negativ, d. h. die Stromstärke geht nach Ablauf des anfänglichen positiven Ausschlags allerdings zurück, aber sie bleibt dann gerade bei den frischesten Präparaten oft bei einem höher positiven Werthe als dem des Ruhestromes stehen. Bei abnehmender Reizbarkeit schwindet der positive Vorschlag und tritt die negative Schwankung ohne einen solchen ein. Dasselbe geschieht, wenn die Thiere vor dem Versuch im Hellen gesessen haben.

Wenn man die Beleuchtung plötzlich unterbricht, so tritt erst wieder ein kurzer positiver Ausschlag ein, ehe die Netzhaut auf den Ruhestrom zurückkehrt. Auch dieser positive Nachschlag fehlt den Muskelnerven und schwindet bei abnehmender Reizbarkeit der Netzhaut in der Regel erst später, als der positive Vorschlag bei beginnender Reizung.

An Kaninchenaugen haben HOLMGREN wie KÜHNE nur das Stadium der einfachen negativen Schwankung ohne positiven Vorschlag gesehen; wohl aber kam der Nachschlag vor.

Das Pigmentepithel der Netzhaut scheint keine elektromotorische Kraft zu haben. Die Netzhaut mit Pigment bedeckt wirkt ebenso, wie ohne dasselbe, das Pigment ohne Netzhaut auf der Aderhaut haftend, zeigt keinerlei elektrische Änderung bei eintretender Beleuchtung.

Die Lichtempfindlichkeit der isolirten Netzhaut kann noch erstaunlich groß sein. Herr KÜHNE hat negative Schwankung durch eine glimmende Cigarre 50 cm entfernt erhalten, ebenso durch das von seinem Gesicht zurückgeworfene Licht einer Kerze, ja sogar durch das Phosphoreszenzlicht der jetzt käuflichen Leuchtfarbe.

Spuren der Lichtempfindlichkeit fanden sich bis 24 Stunden nach der Isolation der Netzhaut des Frosches, wenn sie in der feuchten Kammer und im Dunkeln aufbewahrt war.

Der ganze Bulbus zeigt bei Fröschen auf Lichteinwirkung im frischesten Zustande nur das Auftreten eines andauernden positiven Stroms, dem bei Aufhören der Belichtung der positive Nachschlag und Rückgang in die Ruhelage folgt. Erst beim Absterben oder nach Mißhandlung fängt die negative Schwankung an sich zu zeigen.

Im Innern des ausgeschnittenen Bulbus verliert die Netzhaut ihre Erregbarkeit, namentlich schnell auch durch Belichtung, während sie isolirt, in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft, sich wieder erholen kann.

Die Bulbusströme bleiben unverändert, auch wenn man die ganze vordere Hälfte der Augenkapsel mit der Iris wegnimmt, ja selbst die Zonula ausschneidet und die Linse vorsichtig entfernt. Erst wenn man an der Zonula zerrt, etwas Glaskörper abfließen läßt, oder hineinbläst, tritt die negative Schwankung der Netzhautströme hervor. Diese scheint deshalb von einer Störung des natürlichen Zusammenhanges der Netzhaut herzuführen; Herr KÜHNE vermuthet eine Störung ihrer Verbindung mit dem regenerirenden Pigmentepithel.

Eine einigermaßen ähnliche Erscheinung kommt beim gewöhnlichen Strome des ruhenden Muskels vor, der von den Sehnenflächen aus, die nach E. DU BOIS-REYMOND den natürlichen Querschnitt des Muskels bilden, verhältnißmäßig schwach elektromotorisch gegen den Längsschnitt wirkt, ehe der Querschnitt in irgend einer Weise verletzt, und in seinem Absterben beschleunigt ist. Der genannte Autor schließt daraus, daß in den Enden der Muskelfasern unter der Sehnenfläche eine eigenthümlich wirkende Schicht von elektromotorisch wirksamen Molekeln liege, die er die *parelektronische* Schicht nennt, die, so lange sie kräftig wirksam ist, die übrigen elektrischen Anordnungen des ruhenden Muskels nach außen hin nahezu unwirksam macht. Diese macht aber die negative Stromesschwankung bei der Reizung nicht aus.

In der Netzhaut müßte die leicht zerstörbare Schicht die Schwankung bei der Reizung mitmachen, so daß sie die negative Schwankung der dauerhafteren Elemente nach außen hin verdeckt, so lange sie kräftig ist.

Bei den Fischen ist die Schwankung auf Belichtung von Anfang negativ, und sogar im Anfang am stärksten, so daß Herr KÜHNE in seinen Figuren einen stärker negativen Vorschlag anzeigt.

Wenn die bei diesen Erscheinungen sich zeigenden entgegengesetzt gerichteten Wirkungen nicht ganz gleich schnell eintreten und aufhören, könnten sich daraus auch die Vorschläge und Nachschläge bei Eintritt und Aufhören der Reizung erklären, die von den Erscheinungen an den Nervenstämmen abweichen. Zur Zeit ist es noch nicht möglich in einem Gebilde von so verwickeltem Bau, wie es die Netzhaut ist, in der überdies verschiedene nach verschiedenen Richtungen hin elektromotorisch wirkende Theile von verschiedenem Grade der Verletzbarkeit vorkommen, den Einfluß, den die einzelnen haben, von einander zu sondern. Zunächst aber ist die wichtige Thatsache festgestellt, daß Änderungen in der elektromotorischen Wirksamkeit auf Reizung im Sehnerven und in der Netzhaut ebensogut, wie in den Nervenstämmen und Muskeln erfolgen. Diese Vorgänge, sowie die beobachteten chemischen Änderungen und Bewegungen sichtbarer Theilchen zeigen, daß auch in der Netzhaut durch das Licht zunächst Wirkungen auf die ponderablen Theile derselben hervorgebracht werden, ähnlich denen, die in den gereizten Muskeln und Nervenstämmen vorgehen. Da elektrische Ströme die feuchten thierischen Gebilde nicht durchfließen können, ohne elektrische Zersetzungen hervorzurufen und die Ionen in ihrem Sinne wandern zu lassen, so ist auch von dieser Seite her der Eintritt chemischer Bewegungen während der Lichtwirkung constatirt.

Die Erscheinungen des blinden Flecks wurden von MARIOTTE entdeckt, der 222 mit der Absicht an diese Versuche ging, zu untersuchen, welcher Art das Sehen auf der Eintrittsstelle des Sehnerven sei. Der Versuch erregte damals solches Aufsehen, daß er ihn 1668 vor dem Könige von England wiederholte. PICARD gab dem Versuche eine Form, bei der man beide Augen offen halten kann, und doch eine Sache nicht sieht. Zu dem Ende befestigte er an einer Wand ein Papier, stellte sich in die Entfernung von etwa 10 Fuß davon, und liefs die Augen nach dem nah vor das Gesicht gehaltenen Finger convergiren, so daß in beiden Augen das Bild auf den blinden Fleck fällt, und deshalb gar nicht gesehen wird, während es sonst unter diesen Umständen doppelt erscheint. MARIOTTE überbot ihn, indem er bei zwei offenen Augen zwei Objecte verschwinden liefs. Man befestigt an der Wand zwei Papiere gleich hoch, drei Fuß von einander, stellt sich 12 bis 13 Fuß von der Wand entfernt, hält den Daumen etwa 8 Zoll weit vom Auge, so daß er dem rechten Auge das linke Papier, dem linken Auge das rechte Papier verdeckt, und fixirt den Daumen, dann verschwinden auch die beiden Papiere, weil sie in demjenigen Auge, dem sie nicht verdeckt sind, auf den blinden Fleck fallen. LE CAT versuchte auch schon die Gröfse des blinden Flecks auf der Netzhaut zu berechnen, wobei er ihn freilich viel zu klein, nämlich  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{4}$  Linie fand. DANIEL BERNOUILLI zeichnete seine Form auf den Fußboden, indem er eine Münze auf den Fußboden eines Zimmers legte, ein Pendel nahm, dessen eines Ende er an das rechte Auge hielt, und das andere den Boden fast berühren liefs. Das linke Auge verschlofs er, mit dem rechten sah er am Pendel herunter, und suchte nun die Stellen auf dem Fußboden auf, wo die Münze anfang unsichtbar zu werden; er fand eine fast elliptische Figur. Die Berechnung der Gröfse des blinden Flecks auf der Netzhaut lieferte ihm aber wegen ungenügender Kenntniß der optischen Constanten des Auges einen zu hohen Betrag, nämlich  $\frac{1}{4}$  des Augendurchmessers.

Es knüpft sich an die Entdeckung von MARIOTTE sogleich eine weitläufige Discussion über eine Frage, die bei den damaligen geringen Kenntnissen der Nervenleistungen natürlich gleich entstehen mußte, nämlich die Frage, ob denn überhaupt die Netzhaut es sei, wie KEPPLER und SCHEINER vorausgesetzt hatten, welche das Licht empfände. MARIOTTE schloß, daß es vielmehr die Aderhaut sei, denn diese fehlt im blinden Flecke, während die Fasern der Netzhaut dort gerade recht dicht zusammenliegen. In der That schlossen sich eine Reihe namhafter Optiker der Meinung von MARIOTTE an, wie MERT, LE CAT, MICHELL, unter den Neueren D. BREWSTER. Es wurde namentlich hervorgehoben, daß die Netzhaut das Licht wegen ihrer Durchsichtigkeit nicht zurückhalte, daß sie zu dick sei, um ein scharfes Bild zu geben; auch suchte LE CAT nachzuweisen, daß die Aderhaut eine Fortsetzung der *Pia Mater* des Gehirns sei. Die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut wurde vertheidigt, durch PECQUET, DE LA HIRE, HALLER, PORTERFIELD, PERRAULT, ZINN. Der Hauptgrund für die Meinung dieser Männer war eigentlich immer nur, daß die Netzhaut die anatomische Entfaltung eines mächtigen Nerven ist, während die Aderhaut nur wenige dünne Nerven enthält. Was sie sonst von Gründen beibringen konnten, um ihre Meinung zu stützen und die Schwierigkeiten des MARIOTTE'schen Versuchs zu beseitigen, war nicht viel werth. PORTERFIELD nahm an, daß der Sehnerv, an seiner Eintrittsstelle noch von den sehnigen Nervenscheiden umgeben und durchzogen, nicht weich und zart genug sei, um ein so feines Agens, wie das Licht sei, zu empfinden. HALLER hebt ebenfalls hervor, daß an der Eintrittsstelle des Sehnerven keine eigentliche Netzhaut vorhanden sei, sondern eine weiße cellulöse und poröse Haut, die zum Sehen untauglich sein könne, ohne daß die Netzhaut es sei. Andere, wie RUDOLPHI, anfangs auch COCCICUS, glaubten, daß die unempfindliche Stelle nur den Centralgefäßen der Sehnerven entspräche, was aber widerlegt wurde, sobald man die optischen Constanten des Auges besser kennen lernte, z. B. durch HANNOVER, E. H. WEBER, A. FICK und P. DE BOIS-REYMOND. J. MÜLLER glaubte die Erscheinung durch die Annahme erklären zu können, daß die MARIOTTE'sche Erscheinung analog sei dem Verschwinden der Bilder gefärbter

223 Objecte, die auf weißem Grunde liegen auf den Seitentheilen der Netzhaut, worauf wir in § 23 zurückkommen werden. Es geschieht dies durch Ermüdung der Netzhaut. Auf der Eintrittsstelle des Sehnerven, meinte er, geschehe es nur sehr viel schneller und plötzlicher. Dagegen ist einzuwenden, daß ein helles Object, welches in dem ungesehenen Raume des Gesichtsfeldes plötzlich auftaucht, gar nicht wahrgenommen wird, also auch die Sehsinns substanz gar nicht reizt, also auch nicht ermüden kann.

Die oben gegebenen nothwendigen Folgerungen aus den Thatfachen stellte Referent im Jahre 1851 auf, und dehnte den Schluß, daß das objective Licht unfähig sei, die Sehnervenfaser zu afficiren, auch gleich auf die an der vorderen Fläche der Netzhaut verlaufenden Fasern aus. Da ein anatomischer Zusammenhang der Stäbchenschicht mit den Nervenelementen der Netzhaut damals noch nicht bekannt war, so blieb nur die Annahme, daß die Nervenzellen oder Körner der Netzhaut die lichtempfindenden Elemente seien. Bald darauf entdeckte H. MÜLLER die Radialfasern der Netzhaut, welche die Zapfen und Stäbchen mit den Elementen verbinden, KOELLIKER wies dieselben am Menschen nach, und beide schlossen daran die Vermuthung, daß die Elemente der Stäbchenschicht die lichtempfindlichen seien, für welche schließlich von H. MÜLLER auch der physiologische Beweis gegeben wurde. Dieselbe Ansicht war übrigens, freilich ohne genügende Kenntniß der mikroskopischen Elemente, früher von TREVIRANUS aufgestellt worden, der die lichtempfindlichen Elemente Nervenpapillen nannte.

Die Genauigkeit des Sehens hat man viel untersucht seit der Zeit, wo man anfangs Teleskope zu bauen. HOOKE wendete gleich zuerst das richtige Princip an, indem er untersuchte, bei welchem Winkelabstande Doppelsterne als solche erkannt werden können. Die meisten folgenden Beobachter dagegen suchten nach der kleinsten Größe eines schwarzen Flecks, der noch erkannt werden könnte, und erhielten natürlich sehr abweichende Resultate, so HEVELIUS, SMITH, JURIN, TOB. MAYER, COURTIVRON, MUNCKE, TREVIRANUS. Den Einfluß der Erleuchtung bei diesen Versuchen erkannten JURIN und MAYER. Ersterer glaubte die Thatsache, daß zwei Striche von einander zu trennen, erst

bei einem gröfseren Schwinkel möglich sei, als jeden einzelnen von ihnen zu erkennen, daraus zu erklären, dafs das Auge zitterte und deshalb die Bilder zweier Stäbe sich deckten. Die Gründe, warum nur die Trennung distincter Objecte ein constantes Maafs geben kann, entwickelte VOLKMANN, und nach dieser Methode wurden Messungen von E. H. WEBER, BERGMANN, MARIÉ DAVY und die oben angeführten ausgeführt.

Für die Entdeckung des Sehpurpurs sind im Text schon die hauptsächlichsten Litteraturnachweise gegeben. Die übrigen werden in der vollständigen Litteraturübersicht am Schlusse des Werkes folgen.

Die Reizungströme der Netzhaut wurden von HOLMGREN<sup>1</sup> 1870 gefunden, unabhängig von ihm (1874) auch von den Herrn DEWAR und M'KENDRICK<sup>2</sup>. Die feinere Ausarbeitung dieses Gegenstandes, welche erst unter Berücksichtigung der mittels des Sehpurpurs constatirten grofsen Lichtempfindlichkeit der Netzhaut, und unter Anwendung der dabei gefundenen Methoden sie unversehrt zu halten, möglich wurde, verdanken wir hauptsächlich Herrn W. KÜHNE<sup>3</sup>.

### § 19. Die einfachen Farben.

Wir gehen jetzt über zur Untersuchung der Empfindungen, welche verschiedenartiges Licht im Sehnervenapparat erregt. Es giebt, wie wir schon im § 8 aneinandergesetzt haben, Licht von verschiedener Schwingungsdauer, welches sich ausserdem in physikalischer Beziehung durch seine Wellenlänge, seine Brechbarkeit und Absorptionsfähigkeit in gefärbten Mitteln unterscheidet. In physiologischer Beziehung unterscheidet sich Licht von verschiedener Schwingungsdauer im Allgemeinen dadurch, dafs es im Auge die Empfindung verschiedener Farben erregt.

Fast alle Lichtquellen, welche wir kennen, entsenden gleichzeitig Licht verschiedener Schwingungsdauer. Um aus solchem gemischten Lichte einfaches Licht, d. h. Licht von einem einzigen Werthe der Schwingungsdauer auszusondern, ist die Brechung in durchsichtigen Prismen das vollkommenste Mittel. Wenn von einer entfernten Lichtquelle *a* (Fig. 123) einfaches blaues Licht durch ein Prisma *P* in das Auge des Beobachters *O* fällt, so werden die Lichtstrahlen im Prisma gebrochen, von ihrem früheren Wege abgelenkt, und der Beobachter erblickt daher das Bild der Lichtquelle verschoben in der Richtung, nach welcher der brechende Winkel *p* des Prisma gekehrt ist, etwa bei *b*, natürlich in der Farbe des Lichts,




Fig. 123.

<sup>1</sup> F. HOLMGREN, *Upsala Läkareförenings Förhandlingar*. Vol. VI. 1870—71. No. 5. p. 419. Auch in *Untersuchungen aus dem Physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg*. Bd. III. S. 278.

<sup>2</sup> DEWAR und M'KENDRICK, *on the Physiological action of light*. *Transact. of the R. Society of Edinburgh*. Vol. XXVII. p. 141.

<sup>3</sup> W. KÜHNE, *Untersuchungen aus dem Physiologischen Institute d. Univ. Heidelberg*. Bd. III. S. 327—377. (1880.) Bd. IV. S. 1 bis 106 (1881).

welches von  $a$  ausgegangen ist, hier also blau. Fällt einfaches Licht anderer Brechbarkeit, etwa rothes, von  $a$  durch das Prisma in das Auge des Beobachters, so sieht er wieder ein Bild der Lichtquelle, jetzt roth, und weniger weit verschoben, als das blaue war, etwa bei  $r$ . Geht gleichzeitig rothes und blaues Licht von  $a$  aus, so sieht der Beobachter auch gleichzeitig das rothe Bild bei  $r$  und das blaue Bild bei  $b$ ; und geht endlich weißes Licht von  $a$  aus, welches sowohl rothes, als blaues, als auch Licht von allen anderen Stufen der Brechbarkeit enthält, so entspricht jeder einzelnen Farbe ein besonderes Bild der Lichtquelle, und zwar so, daß die Bilder der zwischen roth und blau liegenden Farben sich nach der Ordnung ihrer Brechbarkeit zwischen  $r$  und  $b$  einreihen. Sind sehr viele solche farbige Bilder zwischen  $r$  und  $b$  eingeschoben, und hat jedes eine gewisse Breite, die der Breite des leuchtenden Objects bei  $a$  nahehin gleich ist, so wird jedes einzelne farbige Bild einen Theil seiner Nachbarbilder verdecken. Auch ist leicht einzusehen, daß es desto weniger die Nachbarbilder decken und sich mit ihnen vermischen wird, je schmäler das leuchtende Object ist, und je schmäler daher auch jedes einzelne farbige Bild wird, verglichen mit der ganzen Länge des Spectrum  $rb$ . Wenn in dem von der Lichtquelle ausgehenden Lichte Strahlen von allen continuirlich in einander übergehenden Stufen der Brechbarkeit vorkommen, kann man zwar nicht vollständig verhindern, daß die nächst benachbarten Bilder der Lichtquelle sich decken, aber man kann die Lichtquelle und ihre Bilder so schmal machen, daß sich nur noch solche Bilder decken, welche Farben angehören, für welche die Unterschiede der Brechbarkeit verschwindend klein sind.

Wenn die Lichtquelle ein sehr feiner Spalt ist, durch den zusammengesetztes Licht fällt, so bildet jeder einzelne Punkt des Spaltes nach der eben gemachten Auseinandersetzung ein linienförmiges Spectrum. Das prismatische Bild des ganzen Spaltes erscheint demnach dem Beobachter als ein farbiges Rechteck, dessen der Lichtquelle zugekehrtes Ende roth, das entgegengesetzte violett ist. Dazwischen finden sich allmählig in einander übergehend eine Reihe anderer Farben, nämlich, vom Roth anfangend, zunächst Orange, dann Gelb, Grün, Blau, endlich Violett. Man nennt ein solches durch das Prisma mit getrennten Farben entworfenen Bild einer Lichtlinie ein prismatisches Spectrum, und zwar ist es, nach der bisher beschriebenen Beobachtungsweise entworfen, ein subjectives Spectrum, da es nur einem virtuellen Bilde der Lichtquelle entspricht. Man kann es aber auch zu einem reellen Bilde machen, indem man hinter das Prisma da, wo sich bisher das Auge des Beobachters befand, eine Sammellinse aufstellt, welche die durch das Prisma gebrochenen Lichtstrahlen zu einem reellen Bilde von  $rb$  in oder hinter ihrem Brennpunkte vereinigt. So erhält man ein objectives Spectrum. Ein solches wird schon bei der ersten Beobachtungsweise auf der Netzhaut des Beobachters entworfen. Wenn das von der Lichtquelle ausgehende Licht alle continuirlich in einander übergehenden Grade der Brechbarkeit darbietet, ist, wie wir gesehen haben, auch das

Spectrum eine continuirlich beleuchtete Fläche. Wenn aber von der Lichtquelle nur Licht von bestimmten einzelnen Werthen der Brechbarkeit ausgeht, so kann das Spectrum auch nur so viele einzelne verschiedenfarbige Bilder der Lichtquelle enthalten, als Grade der Brechbarkeit unter den Strahlen vorkommen, und man wird dann die Lichtquelle und ihre Bilder so schmal machen können, daß das jeder Farbe angehörige Bild von seinen Nachbarn durch einen dunklen Zwischenraum getrennt ist. So haben wir vorher angenommen, daß nur rothes und blaues Licht in dem Lichte des Punktes *a* *Fig. 123* vorkäme, und gesehen, daß dann bei *b* ein blaues Bild, bei *r* ein rothes erscheint, beide durch den dunklen Zwischenraum *br* von einander getrennt. Dasselbe ist natürlich der Fall, wenn nicht zwei, sondern zehn oder hundert oder tausend verschiedene Arten einfachen Lichtes in dem Lichte von *a* vorkommen.

Von dieser Art ist die Zusammensetzung des Sonnenlichts. Wenn wir ein möglichst vollkommenes Spectrum des Sonnenlichts herstellen, finden wir es von einer großer Zahl dunkler Linien getheilt, den FRAUNHOFER'schen Linien, aus deren Vorhandensein wir schließen müssen, daß gewisse Stufen der Brechbarkeit unter den Strahlen des Sonnenlichts nicht vorkommen. Je vollkommener die Trennung der Farben im Spectrum ist, desto größer ist auch die Zahl der dunkeln Linien. Die stärksten von ihnen sind von FRAUNHOFER und STOKES mit Buchstaben bezeichnet worden, weil sie ein außerordentlich sicheres und bequemes Mittel abgeben, im Spectrum Strahlen von genau bestimmten Werthen der Schwingungsdauer und Brechbarkeit immer wieder zu finden, und wir werden uns deshalb im Folgenden auch dieser Bezeichnung bedienen, so oft es darauf ankommt, die Art einer Farbe genau zu bestimmen. Auf *Taf. II, Fig. 2* ist das Sonnenspectrum mit seinen dunkeln Linien abgebildet. Da die einzelnen Theile des Spectrums bei Prismen aus verschiedenen Stoffen verschiedenes Längenverhältniß haben, und wieder ein ganz anderes Verhältniß in den durch Diffraction erzeugten Spectren, wo die Vertheilung der Farben nur von ihrer Wellenlänge abhängt, so ist die Vertheilung der Farben in einer solchen Zeichnung bis zu einem gewissen Grade willkürlich. In unserer Abbildung ist die Anordnung, wie es für die physiologischen Betrachtungen am wichtigsten schien, nach dem Principe der musikalischen Scale getroffen, so daß Farben, deren Wellenlängen sich zu einander verhalten wie die zweier um ein halbes Tonintervall verschiedener Töne, überall gleich weit von einander entfernt sind. Mathematisch ausgedrückt, entsprechen also gleiche Distanzen in der Zeichnung gleichen Unterschieden der Logarithmen der Schwingungsdauer. Die Ziffern auf der einen Seite bezeichnen die Anzahl der halben Tonintervalle, die Buchstaben auf der anderen bezeichnen die Namen der stärkeren dunkeln Linien, wie sie von FRAUNHOFER und STOKES gewählt worden sind.

Da in der Benennung der verschiedenen Farben einige Unsicherheit herrscht, wollen wir für das vorliegende Werk folgendes darüber festsetzen:

Roth nenne ich die Farbe des weniger brechbaren Endes des Spectrum, welche von der äußersten Grenze desselben bis etwa zur Linie *C* keine merkliche Änderung des Farbentons zeigt. Der Repräsentant unter den Farbstoffen ist etwa der Zinnober. Von ihm zu unterscheiden ist das Purpurroth, welches in seinen weißlicheren Abstufungen Rosenroth wird und dem reinen Roth gegenüber bläulich erscheint. Dieser Farbenton, für dessen gesättigteste Abstufung wir den Namen Purpur bewahren wollen, während die röthlicheren Abstufungen desselben Karminroth heißen mögen, kommt im Spectrum nicht vor, sondern kann nur durch Mischung seiner äußersten Farben, des Roth und Violett, hervorgebracht werden.<sup>1</sup>

Von der Linie *C* bis zur Linie *D* geht das Roth über durch Orange, d. h. Gelbroth mit überwiegendem Roth, in Goldgelb, d. h. Gelbroth mit überwiegendem Gelb. Ersterem entspricht unter den metallischen Farbstoffen etwa die Mennige, letzterem die Bleiglätte (Bleioxyd).

Von *D* bis zur Linie *b* hin finden wir sehr schnelle Farbenübergänge. Zunächst folgt ein sehr schmaler Strich reinen Gelbs, welcher etwa dreimal so weit von *E* als von *D* absteht. Dann folgt Grüngelb und zwischen *E* und *b* reines Grün. Für das reine Gelb und Grün haben wir zwei sehr gute Repräsentanten unter den Malerfarben, nämlich für ersteres das fein niedergeschlagene, hellere chromsaure Bleioxyd (Chromgelb) und für das letztere das arsenigsaure Kupferoxyd (SCHÆEL'sches Grün).

Zwischen *E* und *F* geht das Grün durch Blaugrün in Blau über, zwischen *F* und *G* folgen verschiedene Töne des Blau. Wegen der verhältnißmäßig grossen Breite der blauen Töne in dem durch Brechung erzeugten Spectrum des Sonnenlichts hat NEWTON hier verschiedene Namen angewendet, englisch: *blue* und *indico*, lateinisch der Reihe nach *thalassinum*, *cyaneum*, *coeruleum*, *indicum*, worauf dann Violett, *violaceum*, folgt. Wir können den Namen Indigblau beibehalten für die nach *G* hinliegenden zwei Drittheile des Raumes *FG*. Für das weniger brechbare Blau des ersten Drittel von *FG* hat man bisher meist einfach den Namen Blau angewendet, auch wohl unrichtig Himmelblau, aber die Ähnlichkeit mit dem Himmelblau bekommt dieses Blau in einem Spectrum von bequemer Helligkeit nur durch die gröfsere Lichtstärke, während das Indigblau, dem der Farbenton des blauen Himmels angehört, in einem solchen Spectrum für diesen Vergleich zu dunkel erscheint. Da nun der gemeine Sprachgebrauch den reinen Himmel als den Hauptrepräsentanten des Blau betrachtet, und ihm den Namen des Blau bewahrt, wenn er es mit weniger brechbarem Blau vergleicht und letzteres bei einem solchen Vergleiche als grünlich bezeichnet, so können wir im wissenschaftlichen Sprachgebrauche nicht wohl das letztere einfach als Blau im Gegensatz zum Indigblau bezeichnen, und ich habe deshalb den  
228 Namen Cyanblau dafür gewählt mit Rücksicht auf die Bezeichnung *cyaneum* bei NEWTON für die grünlich blauen Töne des Spectrum. Zur Bezeichnung

<sup>1</sup> In den Schriften von Herrn E. HERING und seinen Anhängern ist unter Roth immer Purpurroth verstanden.



des Farbentons allein würde auch der Namen Wasserblau gut passen, denn grosse Massen sehr reinen Wassers (Genfer See, Gletschereis) zeigen in ihrem Innern in der That diese Farbe. Hat man z. B. längere Zeit in das Wasser des Genfer Sees an einem hellen Tage geblickt, und sieht zum Himmel auf, so erscheint dieser im Contrast violett, oder selbst rosaroth. Da indessen die Farbe der gewöhnlich gesehenen Wassermassen sehr weislich ist, mit Ausnahme etwa tiefer Eisspalten, so ziehe ich vor, den Namen Wasserblau nur für die weislichen Abstufungen des Cyanblau anzuwenden. Unter den Farbstoffen entspricht das Berliner Blau (Eisencyanürcyanid) dem Cyanblau, das Ultramarin dem Indigblau.

Jenseits der Linie *G* bis nach *H* oder *L* folgt Violett (Farbe der Veilchen); es ist von manchen Schriftstellern auch Purpur genannt worden. Violett und Purpur bilden den Übergang der Farbentöne von Blau und Roth. Wir wollen, wie gesagt, den Namen Purpur nur auf die röthlicheren Farbentöne dieses Übergangs anwenden, welche im Spectrum nicht vorkommen.

Schliesslich folgt als Ende des Spectrum auf der brechbarsten Seite das Ultraviolett. Dieser Theil von *L* bis zum Ende bei *R* kann nur gesehen werden, wenn die bisher beschriebenen helleren Theile des Spectrum sehr sorgfältig abgeblendet sind. Die Anwesenheit von Lichtstrahlen besonderer Art an dieser Stelle lernte man zuerst durch die chemischen Wirkungen derselben kennen, und nannte sie deshalb unsichtbare chemische Strahlen. In Wahrheit sind diese Strahlen aber nicht unsichtbar, wenn sie auch allerdings das Auge verhältnissmässig viel schwächer afficiren, als die Strahlen des mittleren leuchtenden Theils des Spectrum zwischen den Linien *B* und *H*. Sobald man die letzteren durch geeignete Apparate vollständig entfernt, sind die ultravioletten Strahlen dem Auge ohne Schwierigkeit sichtbar, und zwar bis zum Ende des Sonnenspectrum. Ihre Farbe ist bei geringer Lichtintensität indigblau, bei gröfserer Intensität bläulich grau. Am leichtesten nachgewiesen wird die Anwesenheit dieser Strahlen durch das Phänomen der Fluorescenz. Beleuchtet man nämlich mit ultraviolettem Lichte eine klare Lösung von saurem schwefelsaurem Chinin, so geht von allen Punkten dieser Lösung, welche von dem ultravioletten Lichte getroffen werden, weifs bläuliches Licht nach allen Richtungen aus, welches etwa wie ein leuchtender Nebel erscheint, der die Lösung durchzieht. Untersucht man dies weifs bläuliche Licht mit dem Prisma, so erkennt man, dafs es nicht ultraviolettes Licht ist, sondern gemischtes weisliches Licht mittlerer Brechbarkeit. Am einfachsten kann man die Erscheinung deshalb so beschreiben: So lange die ultravioletten Strahlen auf die Chininlösung wirken, ist diese selbstleuchtend, und sendet gemischtes weislich blaues Licht von mittlerer Brechbarkeit aus. Da nun das Auge für Licht der letzteren Art ausserordentlich viel empfindlicher ist, als für ultraviolettes Licht, so nimmt es bei gewissen Graden der Lichtstärke von letzterem nicht das geringste wahr, bis es eine fluorescirende Substanz trifft, und auf dieser wird dann das bisher unsichtbare Licht sichtbar. Zu den Körpern, welche das Phänomen der Fluorescenz in hohem 229

Grade zeigen, gehören aufer dem Chinin noch das mit Uran gefärbte Glas, das Äsculin, Kaliumplatincyauür u. s. w.

Da wir an den fluorescirenden Substanzen keine andere Veränderung bemerken, die Fluorescenz mag noch so oft hervorgerufen werden, da auch keine Wärme dabei zu verschwinden scheint, so müssen wir aus dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft schliessen, daß die lebendige Kraft des durch die Fluorescenz erzeugten Lichtes nicht gröfser ist trotz seiner stärkeren Wirkung auf das Auge, als die des einfallenden ultravioletten Lichts. Genaue Untersuchungen über das Verhältniß der Helligkeit des durch Fluorescenz veränderten und unveränderten ultravioletten Lichts sind noch nicht angestellt. Doch kann man aus gewissen Thatsachen, die später bei Beschreibung der Methoden erwähnt werden sollen, schliessen, daß das erstere etwa 1200 mal heller ist als das letztere. Davon, daß die Helligkeit beider Lichter für das Auge wirklich auferordentlich verschieden sei, überzeugt man sich auch ohne Messung, wenn man ultraviolettes Licht, welches von allem brechbareren Lichte gehörig gereinigt und in einen Focus vereinigt ist, erst auf einen nicht fluorescirenden Schirm, z. B. weißes Porzellan, und dann auf Chinin fallen läfst. Daß das Sonnenspectrum, wenigstens nachdem das Sonnenlicht durch die Atmosphäre gegangen ist, wirklich nicht weiter reicht, als das Auge bei geeigneter Abblendung des helleren Lichts ultraviolettes Licht wahrnimmt, folgt daraus, daß auch, wenn man durch Quarzprismen und Quarzlinsen ein objectives Spectrum auf ein Uranglas oder einen anderen fluorescirenden Körper wirft, das Phänomen der Fluorescenz nur genau ebenso weit auftritt, als das Auge ultraviolettes Licht wahrnehmen kann. Andererseits aber hat STOKES gefunden, daß das Spectrum des elektrischen Kohlenlichts, durch Quarzapparate auf einen fluorescirenden Schirm geworfen, viel weiter reicht als das Sonnenspectrum. Seine Methode ist also in der That geeignet, auch noch brechbareres Licht sichtbar zu machen, als das Sonnenlicht enthält, und wir müssen daraus schliessen, daß das Spectrum des durch die Atmosphäre gegangenen Sonnenlichts wirklich da aufhört, wo das Auge und die fluorescirenden Körper die Grenze anzeigen.

„ Sehr weit reichendes ultraviolettes Licht zeigen die Funken großer Inductionsapparate zwischen Cadmielektroden. Bei Entladungen, die durch hoch evacuirte Räume gehen, kommen Strahlen vor, die fast alle durchsichtigen festen Körper fluoresciren machen, aber nicht durchgehen.

229 Auch am anderen Ende des Spectrum gelingt es bei sorgfältiger Abblendung des helleren gewöhnlich sichtbaren Lichts Theile des Spectrum sichtbar zu machen, die für gewöhnlich unsichtbar bleiben. Genügende Abblendung ist hier sehr leicht durch ein rothes Glas, welches man in den Weg der Lichtstrahlen einschiebt, zu erreichen. Oder da die rothen (mit Kupferoxydul gefärbten) Gläser viel Orange durchlassen, kann man nöthigenfalls zu dem rothen Glase noch ein blaues, mit Kobaltoxyd gefärbtes fügen, welches Orange absorbirt, aber das äußerste Roth ungeschwächt durchläßt. Aber es ist wenig, was man am rothen Ende durch eine solche Beobachtungsweise

gewinnt, verglichen mit der großen Ausdehnung des ultravioletten Spectrum. 230 Der Streifen rothen Lichts, welcher jenseits der Linie *A* hinzukommt, hat etwa die Breite des Abstandes *AB*. Der Farbenton des Roth ist bis zum äußersten Ende hin unverändert, und nähert sich keineswegs dem Purpur.

Am rothen Ende reicht nun aber in der That das Sonnenspectrum weiter, als es vom Auge wahrgenommen wird. Bisher hat man die Anwesenheit solcher überrothen Strahlen nur durch ihre Wärmewirkungen wahrnehmbar machen können, und sie deshalb dunkle Wärmestrahlen genannt. Da sie vom Glase, Wasser und vielen anderen durchsichtigen Substanzen stärker als die leuchtenden Strahlen absorbiert werden, so muß man Steinsalzprismen und Steinsalzlinsen anwenden, um die ganze Ausdehnung des dunkeln Wärmespectrum kennen zu lernen. Im prismatischen Spectrum ist die Breite des dunkeln Wärmespectrum jedenfalls eine beschränkte, weil nämlich, der Theorie der elastischen Ätherschwingungen gemäß, bei zunehmender Wellenlänge der Strahlen die Brechung sich einem Minimum

nähert, welches nicht überschritten werden kann, und bei welchem die Dispersion der Farben aufhört. In *Fig. 124* sind als horizontale Abscissen die Wellenlängen aufgetragen, und zwar von einem Anfangspunkte an gerechnet, der von *H* ebenso weit entfernt liegt wie der Punkt *b*, aber in der Verlängerung der Linie *bH*. Die Buchstaben *B* bis *H* entsprechen den FRAUNHOFER'schen Linien und ihrer Stellung in einem Interferenzspectrum.




Fig. 124.

Als verticale Coordinaten sind die Brechungsverhältnisse für eines der von FRAUNHOFER benutzten Flintglasprismen aufgetragen.

Linie	B	C	D	E	F	G	H
Brechungsverhältniß	1,6277	1,6297	1,6350	1,6420	1,6483	1,6603	1,6711

Die Buchstaben *B*, bis *H*, bezeichnen die Stellung der dunkeln Linien in dem Spectrum dieses Flintglases. Die Grundlinie *Hb* entspricht dem Brechungsverhältniß 1,6070, welches für diese Glasart das Minimum ist, dem sich bei steigender Wellenlänge die Brechungsverhältnisse asymptotisch nähern müssen<sup>1</sup>. Die punktirte Curve *H, d* drückt also die Brechbarkeit

<sup>1</sup> Der Werth dieses Minimum ist nach der Berechnung von BADEN POWELL (Pogg. XXXVII) genommen worden, dessen Interpolationsformel nahe genug mit den theoretisch abgeleiteten Formeln von CAUCHY übereinstimmt.

der Strahlen als Function der Wellenlänge aus, sie würde bei weiterer  
 231 Fortsetzung sich asymptotisch der Grundlinie  $Hb$  anschließen. Daraus  
 folgt, daß, wenn wir uns das Brechungsspectrum  $H, B$ , über sein rothes  
 Ende bei  $B$ , fortgesetzt denken durch dunkle Wärmestrahlen, das Spectrum  
 seine äußerste Grenze an der Grundlinie bei  $H$  finden muß<sup>1</sup>, welche von  
 $B$ , dem Ende des gewöhnlich sichtbaren Roth, ungefähr so weit absteht,  
 wie  $B$  von  $F$ , der Grenze zwischen Grün und Blau, eine Entfernung, die  
 ungefähr der Hälfte der Länge des gewöhnlich sichtbaren Spectrum entspricht.  
 Übrigens fällt es in der *Fig. 124* leicht auf, wie in dem Brechungsspectrum  
 $B, H$ , wenn man es mit dem Interferenzspectrum  $BH$  vergleicht, die Strahlen  
 des blauen Endes  $F, G, H$ , auseinandergezogen, die des rothen Endes  $B, C, D$ ,  
 aneinandergedrängt sind. Dieses Zusammendrängen der Strahlen im Brechungs-  
 spectrum muß natürlich zunehmen, je mehr man sich im Raum der dunkeln  
 Wärmestrahlen der Grenze nähert. Am blauen Ende, wo das Spectrum ge-  
 dehnt ist, wird dabei die Zahl der sichtbaren dunkeln Linien größer, und  
 weil die gleiche Quantität Licht oder Wärme über einen größeren Raum  
 verbreitet ist, werden Helligkeit und Erwärmung geringer. Umgekehrt am  
 rothen Ende wird die Zahl der sichtbaren dunkeln Linien geringer, Hellig-  
 keit und Erwärmung größer, als in dem Interferenzspectrum. Wenn also  
 auch das Wärmemaximum im prismatischen Spectrum außerhalb des Roth  
 liegt, so folgt daraus nicht, daß die dunkeln Wärmestrahlen der betreffenden  
 Wellenlänge in größerer Menge im Sonnenlicht vorhanden seien, als irgend  
 eine Art leuchtender Strahlen; im Gegentheil scheint im Interferenzspectrum  
 das Wärmemaximum auf Gelb zu fallen.

Die Bestimmung der größten Wellenlängen, welche in den dunkeln  
 Wärmestrahlen des Sonnenlichts vorkommen, ist äußerst schwierig, eben  
 231 wegen der beschriebenen Eigenthümlichkeiten des Brechungsspectrum. Mittels  
 der von ihm vervollkommenen photographischen Methoden hat ABNEY die  
 größte Wellenlänge gleich 0,0027 mm gefunden. Es ist dies mehr als die  
 dreifache Wellenlänge der äußersten rothen Strahlen, die nach meinen  
 Messungen 0,00081 mm beträgt. Es zeigen übrigens diese dunkeln Wärme-  
 strahlen die Erscheinungen der Interferenz, wie die Lichtstrahlen, woraus  
 folgt, daß sie wie diese in einer schwingenden Bewegung bestehen; sie  
 zeigen genau dieselben Gesetze der Polarisation, woraus folgt, daß auch in  
 ihnen die Schwingungsrichtung senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung ist, und  
 unterscheiden sich also von den leuchtenden Strahlen nur durch ihre größere  
 Wellenlänge und die damit verbundene geringere Brechbarkeit.

Der Grund für die Unsichtbarkeit der überrothen Strahlen könnte ent-  
 weder darin zu finden sein, daß sie von den Augenmedien absorbirt werden,  
 oder daß die Netzhaut für sie nicht empfindlich ist. Daß Wasser die dunkeln

<sup>1</sup> Diese Grenze scheint nach einer Bemerkung von FR. EISENLOHR in den Versuchen von MELLONI  
 wirklich erreicht zu sein. *Kritische Zeitschr. für Chemie*. Erlangen 1858. S. 229. Theoretisch ist eine  
 solche durchaus zu erwarten, LANGLEY, *Phil. Magaz.* Vol. 21. p. 349 (1866), hat aber bei seinen Beobach-  
 tungen über dunkle Strahlen, die viel weiter gehen als alle bisherigen, keine solche Grenze erreicht.

Wärmestrahlen in hohem Maße absorbirt, hat schon MELLONI nachgewiesen. Mit den durchsichtigen Mitteln des Ochsenauges haben BRÜCKE und KNOBLAUCH Versuche angestellt. Es wurden nämlich Hornhaut, Glaskörper und Linse eines Ochsenauges in eine passende röhrenförmige Fassung so eingeschaltet, daß Hornhaut und Linse die vordere und hintere Begrenzung bildeten, der Glaskörper zwischen beiden lag. Durch dieses vollkommen durchsichtige System fiel Sonnenlicht, von einem Heliostaten in ein dunkles Zimmer geworfen, auf eine thermoelektrische Säule. Es brachte eine Ablenkung des damit verbundenen Multiplicators von 26 bis 30° hervor. Nachdem aber die beiden Seiten des Auges über einer Terpentinflamme beruht waren, was vollkommen gut und, wie die nachherige Untersuchung zeigte, ohne alle sonstige Veränderung der Hornhaut und Linse gelang, konnte keine Wärme mehr durch das Auge hindurchstrahlen. Rufsschichten sind aber für die dunkeln Wärmestrahlen durchgängig, nicht für die leuchtenden. Hätte also ein Theil der durch die Augenmedien gehenden Strahlen aus dunkeln Wärmestrahlen bestanden, so hätte sich von diesen auch noch nach der Berussung eine Wirkung zeigen müssen. Es läßt sich durch diesen Versuch allerdings nicht genau nachweisen, daß die Grenzen der Sichtbarkeit des Roth mit den Grenzen der Diathermansie der Augenmedien zusammen treffen, aber jedenfalls steht fest, daß von den unsichtbaren überrothen Strahlen wenig oder nichts mehr zur Netzhaut gelangen kann, und es scheint dieser Umstand zu genügen, um ihre Unsichtbarkeit zu erklären.

CIMA<sup>1</sup> hat ähnliche Versuche angestellt, wobei er als Wärmequelle eine LOCATELLI'sche Lampe benutzte, deren Strahlen durch die Augenmedien auf eine thermoelektrische Säule fielen. Er fand, daß die Krystalllinse 13 Procent, der Glaskörper allein 9 Procent und das ganze Auge auch 9 Procent der einfallenden Wärme durchließ. Dasselbe fanden J. JANSSEN<sup>2</sup> und R. FRANZ<sup>3</sup>; die Absorption war der des Wassers sehr ähnlich. Hornhaut und Linse schienen etwas stärker zu wirken. Untersuchungen von ENGELMANN<sup>4</sup> haben ein ähnliches Resultat ergeben.

Daß die ultraviolette Strahlen die Augenmedien durchdringen können, folgt direkt schon aus der Möglichkeit das ultraviolette Spectrum mit seinen dunkeln Linien zu sehen. DONDERS<sup>5</sup> und REES haben objectiv nachgewiesen, daß diese Strahlen durch Glasgefäße, welche mit Glasfeuchtigkeit vom Ochsen gefüllt waren, und in die auch Hornhaut und Linse eingebracht wurden, ohne auffallend geschwächt zu werden, hindurchgehen. Um das ultraviolette Licht nach dem Durchgange durch die Augenflüssigkeiten sichtbar zu machen, fingen sie es auf der Fläche einer Chininlösung auf, wo es die blaue Fluorescenz hervorrief. BRÜCKE hatte ähnliche Versuche schon früher angestellt, bei denen er die Wirkung des Lichts auf Guajak-

<sup>1</sup> CIMA, *Sul potere degli umori dell' occhio a trasmettere il calorico ruggionante*. Torino 1852.

<sup>2</sup> J. JANSSEN, C. R. LI. 128—131, 373—374; *Ann. de chir.* (3) XL. 71—93.

<sup>3</sup> R. FRANZ in *Poggend. Ann.* CXV. 26—279.

<sup>4</sup> TH. W. ENGELMANN, *Onderz. ged. in het physiol. Laborat. te Utrecht*. 3de Reeks D. VII. Bl. 291. 1882.

<sup>5</sup> F. C. DONDERS, *Onderzoekingen gedaan in het physiol. Laborat. te Utrecht*. Jaar VI. p. 1. *Müller's Archiv für Physiol.* 1853. 8. 459.

lösung und auf photographisches Papier untersuchte, nachdem es durch die Augenmedien gegangen war.

Guajakharz, frisch aus der alkoholischen Lösung durch Eintrocknen im Dunkeln gewonnen, wird von den blauen, violetten und übvioletten Strahlen blau gefärbt, von den schwächer brechbaren wieder entbläut. Im gewöhnlichen Tageslichte überwiegt die Wirkung der bläuenden Strahlen. Tageslicht aber, welches durch die Krystalllinse eines Ochsenauges gegangen ist, färbt das Harz nur gelbgrün, und eine schon gebläute Harzschicht wird durch dasselbe Licht wieder bis zu demselben Gelbgrün entbläut. Daraus folgt, daß die Linse die bläuenden Strahlen des Tageslichts stärker absorbt, als die nicht bläuenden. Bei starker Absorption der gewöhnlich sichtbaren blauen und violetten Strahlen müßte die Linse selbst gelblich gefärbt erscheinen. Da sie im normalen Zustande ziemlich ungefärbt erscheint, so können es unter den Guajak bläuenden Strahlen nur die übvioletten sein welche die Linse verhältnißmäßig beträchtlich absorbt. Für die Hornhaut und den Glaskörper ergeben ähnliche Versuche von BRÜCKE, daß sie eine ähnliche Wirkung wie die Linse, aber in einem viel schwächerem Grade besitzen. Damit stimmt überein, daß die Hornhaut und Linse des Auges, wie man auch am lebenden Auge leicht sehen kann, selbst einen ziemlichen Grad von Fluorescenz besitzen, wenn violettes oder übviolettes Licht auf sie fällt. Sie strahlen dabei weißblaues Licht aus, ähnlich dem der Chininlösungen. Fluorescirende Körper aber absorbiren stets merklich die Strahlen, durch welche ihre Fluorescenz erregt wird.

Wenn nun auch die Versuche von BRÜCKE lehren, daß die ultravioletten Strahlen beim Durchgang durch die Augenmedien, namentlich die Krystalllinse, merklich geschwächt werden, wie namentlich bei der Wirkung auf Guajaktinctur sich zu erkennen giebt: so lehren andererseits doch die Versuche von DONDEES, daß diese Schwächung nicht so bedeutend ist, um bei der gewöhnlichen Vergleichung der Helligkeit durch das ununterstützte Auge aufzufallen. Andererseits ist schon oben angeführt worden, daß die Helligkeit des unveränderten ultravioletten Lichts gegen die des ungefähr gleich aussehenden durch Fluorescenz des Chinin erzeugten Lichts sich etwa wie 1 : 1200 verhält. Daraus schliessen wir, daß Absorption des Lichts in den Augenmedien nur zum allerkleinsten Theile Schuld sein kann an der geringen subjectiven Helligkeit des Ultraviolett, daß diese vielmehr in einer Unempfindlichkeit der Netzhaut ihren Grund haben muß.

Zu erwähnen ist noch, daß der Farbeindruck, welchen einfaches Licht im Auge hervorruft, abhängig ist von der Lichtintensität, in der Weise, daß alle einfachen Farben bei gesteigerter Helligkeit sich dem Weiß oder Weißgelb nähern. Am leichtesten geschieht dies mit dem Violett, welches sich desto mehr vom Blau entfernt und dem Purpur nähert, je lichtschwächer es ist, und im Gegentheil bei einem mäßigen Grade von Helligkeit, wie ihn das Spectrum der Sonne im Fernrohr leicht erreicht, schon weißgrau erscheint, und nur einen schwachen bläulich violetten



Schein behält. Nach dem Vorschlag von MOSER sieht man dies auch sehr gut, wenn man bei halb bewölktem Himmel sich die Sonne mit einem ziemlich dunkeln violetten Glase bedeckt. Dann erscheint die Sonnenscheibe, durch das Glas gesehen, vollständig ebenso weifs, wie, neben dem Glase vorbei gesehen, die hellbeleuchteten Wolken erscheinen. Ebenso wird das Blau des Spectrum bei geringer Helligkeit mehr indigblau, bei gröfserer himmelblau, und bei noch gröfserer, welche übrigens immer noch ohne Belästigung des Auges zu ertragen ist, weifsblau, endlich weifs. Daher die oben erwähnte fälschliche Anwendung der Benennung Himmelblau für das brechbarere und gleichzeitig lichtstärkere Cyanblau des Spectrum. Das Grün geht durch Gelbgrün in Weifs, Gelb direct in Weifs über, aber erst bei blendender Helligkeit. Roth zeigt die Erscheinung am schwersten, und nur bei den höchsten Graden der Helligkeit habe ich es sowohl im Spectrum, als durch ein rothes Glas nach der Sonne blickend, hellgelb werden sehen. Alle diese Versuche gelingen gleich gut mit sorgfältig gereinigtem einfachen, wie mit gemischtem Lichte von der betreffenden Farbe, wie es durch gefärbte Gläser gegeben wird.

Unter allen Theilen des Spectrum ist der Farbenton des violetten und übvioletten Lichts am veränderlichsten bei veränderter Lichtstärke. Um Farbtöne des brechbarsten Endes mit einander zu vergleichen, muß man sie nahe auf gleiche Intensität bringen. Bei schwacher Helligkeit nähern sich die blauen Töne des Spectrum mehr dem Indigo, das Violett dem Rosa, wie schon angegeben wurde; etwa von der Linie *L* ab bis zum Ende des Spectrum findet aber eine Umkehr in der Reihe der Farben statt; der Farbenton wird nämlich nicht weiter dem Rosa ähnlicher, sondern kehrt von hier wieder zum Indigoblau zurück. Bei mäfsiger Steigerung der Lichtstärke dagegen erscheint das übviolette Licht bläulich weifsgrau, weifslicher als gleich starkes indigblaues Licht, und man hat es deshalb auch lavendelgrau genannt.

Die Umkehr in der Farbenreihe, welche das übviolette Licht bei geringer Helligkeit zeigt, beruht wahrscheinlich nicht auf der Reactionsweise des Nervenapparats, sondern scheint dadurch bedingt zu sein, daß die Netzhaut selbst fluorescirt, d. h. unter der Einwirkung übvioletter Strahlen Licht niederer Brechbarkeit, und zwar solches von bläulich oder grünlich weisser Farbe aussendet. Wenigstens die Netzhaut aus dem Auge einer Leiche, welche ich selbst<sup>1</sup> untersuchte, und die Netzhäute aus ganz frischen Augen von eben getödteten Ochsen und Kaninchen, welche SETSCHENOW<sup>2</sup> untersuchte, zeigten einen freilich sehr geringen Grad von Fluorescenz, und das Licht, welches sie dabei aussandten, hatte die angegebene Farbe. Die Stärke ihrer Fluorescenz war geringer, als die von Papier, Leinwand und Elfenbein, aber erschien doch immer noch stark genug, um die Farbe, in der das übviolette Licht empfunden wird, verändern zu können. Ich

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, *Poggend. Ann.* XCIV. 205.

<sup>2</sup> J. SETSCHENOW, *Gruefe's Archiv für Ophthalmologie.* Bd. V. (2.) S. 205. 1859.

verglich zu diesem Ende das Licht, was durch Fluorescenz der Netzhaut erzeugt wurde, und sich von den fluorescirenden Stellen dieser Membran nach allen Seiten in den Raum hinein verbreitete, mit ultraviolettem Licht, welches diffus von einem weissen Porzellanplättchen reflectirt wurde, also  
 235 ebenso wie jenes sich nach allen Seiten hin verbreitete. Die Netzhaut und das Porzellanplättchen wurden hierbei durch ein schwach brechendes Prisma angesehen, welches das veränderte von dem unveränderten ultravioletten Lichte schied. Es erschien unter diesen Umständen das durch Fluorescenz in der Netzhaut erzeugte Licht ebenso hell, wie die unveränderte ultraviolette Beleuchtung der Porzellanplatte.

n Nach den Beobachtungen von W. KÜHNÉ, die auf S. 266 angeführt sind, fluorescirt das ungebleichte Sehroth nur schwach in weifsblauer Farbe, das gebleichte Sehweifs dagegen stärker und grünlich. Die von mir und SETSCHENOW beobachtete Fluorescenz todter Netzhäute ist die des Sehweifs gewesen. Die der lebenden Membran würde danach in der Farbe dem Lavendelgrau des ultravioletten Spectrum ganz ähnlich sein können, und es wird fraglich, ob wir diesen Theil des Spectrum vielleicht nur sehen, weil in ihm die Netzhaut fluorescirt, und dieses Fluorescenzlicht, was grössere Wellenlängen hat, dieselbe reizt. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dafs die ultravioletten Strahlen auch direct erregen. Vor Herrn KÜHNÉ's Untersuchungen hatte ich auf eine solche gemischte Erregung der Netzhaut geschlossen, und das Lavendelgrau als Mischung des direct gesehenen Violet und des grünlich weissen Fluorescenzlichtes betrachtet.

235 Wenn man ein prismatisches Spectrum von geringer Länge betrachtet, so dafs man das Ganze gleichzeitig vor Augen hat, so erscheint es nur aus vier Farbenstreifen zusammengesetzt: Roth, Grün, Blau und Violet, während durch den Contrast mit diesen Hauptfarben ihre Übergänge fast ganz verschwinden, höchstens erkennt man noch, dafs das Grün an der Seite des Roth gelblich wird. Noch verstärkt wird die Trennung der Farben dadurch, dafs drei von den stärkeren dunkeln Linien des Sonnenspectrum *D*, *F* und *G* ungefähr den Grenzen der genannten vier Farben entsprechen. Aber auch, wenn man die Linien nicht erkennen kann, tritt dieselbe Scheidung der Farben ein. Bei längeren Spectris gelingt es zwar eher die Übergangsfarben zu erkennen, indessen wird doch immer der Eindruck im Auge durch die Nachbarschaft von so lebhaften und gesättigten Farben, wie sie das Spectrum zeigt, beträchtlich verändert, so dafs die Übergangsfarben nicht recht ungestört zur Erscheinung kommen. Um die Reihe der einfachen Farben genau kennen zu lernen, mufs man sie isoliren. Zu dem Ende entwirft man ein recht reines objectives Spectrum auf einem Schirme, der einen schmalen Spalt hat, so dafs nur ein schmaler Farbenstreifen des Spectrum durch den Spalt dringen und einen dahinter aufgestellten weissen Schirm erleuchten kann. Indem man den Spalt langsam die Länge des Spectrum durchwandern läfst, bekommt man nach einander die Reihe der Farbentöne, die es enthält, einzeln zu Anschauung. Dabei zeigt sich, dafs nirgends ein



Sprung in der Farbenreihe ist, sondern die Farbentöne continuirlich in einander übergehen. Es ist dieser Versuch gleichzeitig eines der prachtvollsten Schauspiele, welches die Optik darbietet, wegen des Reichthums, der intensiven Sättigung und der zarten Übergänge der Farbentöne.

Wegen der allmäligen Übergänge ist es auch unmöglich, den einzelnen Farben im Spectrum naturgemäß eine bestimmte Breite anzuweisen. Um die Stelle und Vertheilung der Farben, so weit es möglich ist, zu bezeichnen, <sup>236</sup> will ich hier die den FRAUNHOFER'schen Linien entsprechenden Farbentöne hersetzen mit ihren Wellenlängen, letztere ausgedrückt durch Milliontel eines Millimeters:

Linie.	Wellenlänge.	Farbe.
<i>A</i>	760,40	Äußerstes Roth.
<i>B</i>	686,853	Roth.
<i>C</i>	656,314	Grenze des Roth und Orange.
<i>D</i>	{ 589,625 589,023	Goldgelb.
<i>E</i>	526,990	Grün.
<i>F</i>	486,164	Cyanblau.
<i>G</i>	430,825	Grenze des Indigo und Violet.
<i>H</i>	396,879	Grenze des Violet.
<i>L</i>	381,96	} Übeviolet.
<i>M</i>	372,62	
<i>N</i>	358,18	
<i>O</i>	344,10	
<i>P</i>	336,00	
<i>Q</i>	328,63	
<i>R</i>	317,98	
<i>U</i>	294,77	

Da der Unterschied der Farbenempfindung im Auge wie der der Tonhöhe im Ohre dem Unterschiede in der Schwingungsdauer der erregenden Licht- oder Tonwellen entspricht, so hat man vielfältig versucht, die Farbenstufen des Spectrum nach demselben Principe abzutheilen, wie es bei den ganzen und halben Tönen in der musikalischen Tonleiter geschieht. NEWTON versuchte es zuerst. Da er aber noch nicht die Abhängigkeit der Breite, welche die einzelnen Farben im prismatischen Spectrum einnehmen, von der Natur der brechenden Substanz kannte, und der damals noch sehr unentwickelten Undulationstheorie des Lichtes abgeneigt war, so theilte er unmittelbar das Spectrum von Glasprismen, so weit er es kannte, ungefähr zwischen den Linien *B* und *H*, in 7 Streifen ein, deren Breite dem Verhältnisse der Intervalle in einer Tonleiter, d. h. den Zahlen  $\frac{9}{8}, \frac{16}{15}, \frac{10}{9}, \frac{9}{8},$

$$\frac{10}{9}, \frac{16}{15}, \frac{9}{8},$$

proportional war, und unterschied, diesen sieben Intervallen entsprechend, sieben Hauptfarben, nämlich: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violet. Dafs in dieser Reihe zwei Arten des Blau genannt sind, während Goldgelb, Gelbgrün, Meergrün fehlen, die dem Auge von den benachbarten Hauptfarben mindestens ebenso gut verschieden erscheinen, wie  
 237 Indigo von Cyanblau und Violet, rührt von der auf S. 282 erwähnten Eigenthümlichkeit der Brechungsverhältnisse in den durchsichtigen Substanzen her, vermöge deren in jedem prismatischen Spectrum die brechbareren Farbtöne stärker ausgedehnt werden, als die weniger brechbaren. In den Interferenzspectris, wo die Vertheilung der Farben nur von der Wellenlänge, nicht von der Natur eines brechenden Medium abhängt, ist der blauviolette Raum viel schmaler, und würde bei einer ähnlichen Eintheilung nicht in drei Streifen zerfallen sein, dagegen der Raum des Roth und Orange etwa drei eingenommen hätte.

Wenn wir jetzt mit Hülfe der seitdem gemachten Entdeckungen und Messungen das Spectrum eintheilen, indem wir das Eintheilungsprincip der musikalischen Tonleiter auf die Schwingungsdauer der Lichtwellen anwenden, wie es in *Taf. II, Fig. 2* geschehen ist, und das Gelb dem Grundtone *c*, die Linie *A* dem tieferen *G* entsprechend machen, so bekommen wir für die einzelnen halben Töne folgende Farbenstufen:

<i>Fis.</i>	Ende des Roth	<i>fis.</i>	Violet
<i>G.</i>	Roth	<i>g.</i>	Überviolet
<i>Gis.</i>	Roth	<i>gis.</i>	Überviolet
<i>A.</i>	Roth	<i>a.</i>	Überviolet
<i>B.</i>	Rothorange	<i>b.</i>	Überviolet
<i>H.</i>	Orange	<i>h.</i>	Ende des Sonnenspectrum.
<i>c.</i>	Gelb		
<i>cis.</i>	Grün		
<i>d.</i>	Grünblau		
<i>dis.</i>	Cyanblau		
<i>e.</i>	Indigblau		
<i>f.</i>	Violet.		

Die Töne, welche Octaven bilden, sind nebeneinander gestellt. In *Taf. II Fig. 2* sind rechts die den Tonintervallen entsprechenden Stellen durch Linien bezeichnet.

n Nach derselben Berechnungsweise würde die von Herrn ABNEY gefundene Grenze des Ultraroth im Sonnenspectrum auf *A*—, zwei Octaven unter dem helleren Roth liegen. Herrn LANGLEY'S<sup>1</sup> Messungen führen noch viel weiter und machen es überhaupt zweifelhaft, ob eine Grenze des Spectrum für die überrothen Strahlen grosser Wellenlänge existirt. Andererseits führen Herrn CORNU'S<sup>2</sup>

<sup>1</sup> S. P. LANGLEY, *Researches of Solar Heat. Professional papers of the Signal Service.* Washington 1884. — *Sittim. Journ.* Vol. XXVII. March 1884 und Vol. XXXII. August 1886.

<sup>2</sup> CORNU, C. R. 88. p. 1285—1290 (1879).

mit Sonnenlicht ausgeführte Spectralphotographien bis zur Wellenlänge 293,2 dem oben angeführten  $\lambda$  entsprechend für das äußerste Ultraviolett, was die Atmosphäre noch bis zum Riffelhause bei Zermatt (2570 m hoch) durchdringt. Im elektrischen Kohlenlicht kommen nach seinen Untersuchungen noch Strahlen vor, die schneller schwingen, aber durch die Luft schnell absorbiert werden; solche von 211,84 Wellenlänge schon in 10 m, von 184,21 in 1 m, von 156,58 in 0,1 m verlöschend. Dadurch ist für unsere Beobachtungen im Luftraum die Grenze gezogen.

Danach würde, akustisch berechnet, die äußerste Grenze des elektrischen Kohlenlichts bei  $\lambda'$ , eine Octave höher als die Grenze des Sonnenspectrum liegen.

Aus der gegebenen Vergleichungstafel der halben Töne und Farbenstufen <sup>237</sup> geht nun hervor, daß an beiden Grenzen des Spectrum die Farbe sich innerhalb mehrerer halber Tonstufen nicht merklich ändert, in der Mitte dagegen die sehr mannigfaltigen Übergangsfarben des Gelb in Grün alle in die Breite eines einzigen halben Tones zusammengedrängt sind. Daraus folgt, was im folgenden Paragraphen weiter zu besprechen ist, daß in der Mitte des Spectrum das Auge für die Änderung der Schwingungsdauer des Lichts viel empfindlicher ist, als an den Enden des Spectrum, und daß die Farbenstufen ihrer Größe nach keineswegs in ähnlicher Weise von der Schwingungsdauer abhängen, wie die Abstufungen der Tonhöhe.

Da die vorliegenden physiologischen Untersuchungen eine viel genauere Scheidung des einfachen Lichts von einander nothwendig machen, als es bei physikalischen Untersuchungen im Allgemeinen erfordert wird, will ich hier die Theorie der Brechung in Prismen besprechen, soweit sie für die Herstellung reiner Spectra nöthig ist. Man hatte früher, so viel ich gefunden habe, immer nur die Brechung einzelner Lichtstrahlen in den Prismen untersucht, aber nicht die Lage und Beschaffenheit der prismatischen Bilder, und doch, wenn man mit dem Auge durch ein Prisma sieht, oder das aus dem Prisma tretende Licht durch Linsen und Fernröhre gehen läßt, kommt es wesentlich darauf an, die prismatischen Bilder <sup>238</sup> für jede Art homogenen Lichtes zu kennen, denn sie sind dann als die Objecte für die weiteren optischen Bilder zu betrachten, welche die Augenmedien und Linsen entwerfen.

Diese Lücke habe ich selbst in der ersten Auflage dieses Werkes auszufüllen gesucht. Da die betreffende mathematische Untersuchung aber seitdem anderwärts <sup>1</sup> veröffentlicht worden, und rein physikalischer Natur ist, möge es hier genügen, ihre Ergebnisse auseinanderzusetzen.

Bilder entworfen bei parallelen einfallenden Strahlen. Wenn die einfallenden Strahlen untereinander parallel sind, so fallen sie alle unter gleichen Einfallswinkeln und in parallel liegenden Einfallsebenen auf die erste Fläche des Prisma, haben also auch nach der ersten und demzufolge ebenso nach der zweiten Brechung parallele Richtung. Unter diesen Umständen können sie nach der Brechung im Prisma, wie vorher, angesehen werden wie Strahlen, die von einem unendlich entfernten leuchtenden Punkte kommen; sie sind vor wie nach der Brechung homocentrisch, und das durch das Prisma gegangene Bündel kann

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, *Wissenschaftliche Abhandlungen*. Bd. II. S. 147—182. Leipzig 1883.

V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik.* 2. Aufl.

also ebenso gut wie das einfallende benutzt werden, um durch Linsen oder Kugelspiegel genaue Bilder des unendlich entfernten leuchtenden Punktes, beziehlich seines ebenfalls unendlich entfernten prismatischen Bildes zu geben.

Bei den neueren Spectralapparaten benutzt man meistens diese Eigenthümlichkeit der parallelen Strahlenbündel vollkommene optische Bilder zu geben, indem man die lichtgebende Linie, sei es nun ein feiner Spalt, durch den äußeres Licht eindringt, oder ein glühender Draht, oder eine mit elektrischem Glimmlicht gefüllte Capillarröhre, in die Brennebene einer achromatischen Convexlinse bringt (Collimatorlinse), in der alle von einem Punkt der Lichtquelle ausgehenden Strahlen erst durch Brechung parallel gemacht werden, ehe sie auf das Prisma fallen. Um diesen Vortheil aber vollständig zu haben, muß man darauf achten, daß die lichtgebende Linie sich genau in der Brennebene der Collimatorlinse befindet.

### I. Bilder unendlich entfernter leuchtender Flächen.

Nur wenn die Flächen verschwindend kleine Ausdehnung haben, sind die prismatischen Bilder derselben ihren Objecten geometrisch ähnlich, da die Ablenkung der Strahlen, welche in verschiedenen Richtungen durch das Prisma gehen, verschieden groß ist.

Wir wollen eine senkrecht zur brechenden Kante des Prisma gelegte Ebene eine Hauptebene desselben nennen. Die Einfallslothe liegen immer in einer Hauptebene.

A. Ablenkung von Strahlen, die in einer Hauptebene verlaufen  
Für die Anwendung ist dies der wichtigste Fall. In *Fig. 125* sei die Ebene der

der Zeichnung ist also Einfallsebene, folglich auch Brechungsebene für den Strahl; also liegt auch der dem gebrochenen Punkte angehörige Punkt  $b$ , wie das zweite Einfallslot  $nn$ , in derselben; folglich auch der zweite gebrochene Strahl  $bk$ , und da  $ha$  und  $bk$  in derselben Ebene liegen und nicht parallel sind, müssen sie passend verlängert sich in dieser Ebene schneiden. Der Schnittpunkt sei  $c$ .

Die Winkel, welche die Strahlen der Reihe nach mit den beiden Einfallsloten verbinden, bezeichne ich mit

$$\begin{aligned}\angle ham &= \epsilon & \angle hbn &= \eta \\ \angle bam &= \epsilon, & \angle abn &= \eta,\end{aligned}$$

Den brechenden Winkel des Prisma bezeichne ich

$$\angle ACB = \gamma.$$

Nun ist, wenn wir mit  $R$  einen rechten Winkel bezeichnen,

$$\angle abB = \eta, + R$$

und Außenwinkel zum Dreieck  $bCa$ ; als solcher ist

$$\begin{aligned}abB &= bCa + Cab, \text{ oder} \\ \eta, + R &= \gamma + R - \epsilon,,\end{aligned}$$

also:

$$\gamma = \eta, + \epsilon, \dots \dots \dots 1).$$

Dazu kommt, wenn  $n$  das Brechungsverhältniß des Prisma bezeichnet:

$$\left. \begin{aligned} \sin \epsilon &= n \cdot \sin \epsilon, \\ \sin \eta &= n \cdot \sin \eta, \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots 2).$$

Der Ablenkungswinkel  $\omega$  zwischen den beiden Strahlen ist Außenwinkel zum Dreieck  $abc$ , also

$$\begin{aligned}\omega &= \epsilon - \epsilon, + \eta - \eta, \\ &= \epsilon + \eta - \gamma \dots \dots \dots 3).\end{aligned}$$

Aus der allgemeinen trigonometrischen Formel

$$\sin \epsilon + \sin \eta = 2 \cdot \sin \frac{\epsilon + \eta}{2} \cdot \cos \frac{\epsilon - \eta}{2}$$

ergibt sich bei Berücksichtigung der Gleichungen 1), 2) und 3)

$$\sin \left( \frac{\omega + \gamma}{2} \right) = n \cdot \sin \left( \frac{\gamma}{2} \right) \cdot \frac{\cos \left( \frac{\epsilon, - \eta,}{2} \right)}{\cos \left( \frac{\epsilon - \eta}{2} \right)} \dots \dots 4).$$

Daraus folgt, dafs, wenn der Strahl durch beide Prismenflächen unter gleichen Winkeln geht, also

$$\epsilon = \eta,$$

wobei auch

$$\epsilon, = \eta,$$

sein mufs, die Gröfse der Ablenkung sich durch die Gleichung bestimmt

$$\sin \left( \frac{\omega + \gamma}{2} \right) = n \cdot \sin \left( \frac{\gamma}{2} \right), \dots \dots \dots 5).$$

welche Gleichung zur Bestimmung des  $n$  für die Substanz der Prismen vorzugsweise gebraucht wird.

Wenn dagegen  $\varepsilon > \eta$ , ist auch nothwendig  $\varepsilon, > \eta$ , nach Gleichungen 2). Diese differentirt ergeben dann

$$\cos \varepsilon \cdot d\varepsilon = n \cdot \cos \varepsilon, \cdot d\varepsilon,$$

$$\cos \eta \cdot d\eta = n \cdot \cos \eta, \cdot d\eta,$$

und ebenso folgt aus Gleichung 1), worin  $\gamma$  unveränderlich ist:

$$d\eta, = - d\varepsilon,.$$

Dividirt man die ersteren Gleichungen durch einander, so giebt dies

$$\frac{d\eta}{d\varepsilon} = - \frac{\cos \eta, \cdot \cos \varepsilon}{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon,}, \dots \dots \dots 6).$$

was sich umschreiben läßt nach Gleichungen (2) in:

$$\begin{aligned} \frac{d\eta}{d\varepsilon} &= - \sqrt{\frac{(1 - n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon,) \cdot (1 - \sin^2 \eta,)}{(1 - n^2 \cdot \sin^2 \eta,) \cdot (1 - \sin^2 \varepsilon,)}} \\ &= - \sqrt{\frac{(1 + n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon, \cdot \sin^2 \eta,) - (n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon, + \sin^2 \eta,)}{(1 + n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon, \cdot \sin^2 \eta,) - (\sin^2 \varepsilon, + n^2 \sin^2 \eta,)}}. \end{aligned}$$

Nun wird  $\left(-\frac{d\eta}{d\varepsilon}\right)$  gröfser als 1 sein, wenn in dem letzten Ausdruck unter dem Wurzelzeichen der Zähler gröfser als der Nenner ist, d. h. wenn

$$(n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon, + \sin^2 \eta,) < (\sin^2 \varepsilon, + n^2 \sin^2 \eta,)$$

oder

$$(n^2 - 1) \cdot \sin^2 \varepsilon, < (n^2 - 1) \cdot \sin^2 \eta,$$

oder

$$\varepsilon, < \eta,.$$

Es ist aber nach Gleichung 3)

$$\begin{aligned} d\omega &= d\varepsilon + d\eta = d\eta \cdot \left(\frac{d\varepsilon}{d\eta} + 1\right) \\ &= d\varepsilon \cdot \left(1 + \frac{d\eta}{d\varepsilon}\right). \end{aligned}$$

Es ist also bei der gemachten Annahme, wonach

$$\eta, > \varepsilon,$$

sein soll, und also auch

$$\eta > \varepsilon,$$

$d\omega$  positiv, wenn der gröfsere Winkel  $\eta$  steigt, der kleinere abnimmt, der Strahl sich also immer weiter von der Symmetrielage entfernt. Das Gleiche ist übrigens auch der Fall, wenn  $\varepsilon > \eta$ , und nun umgekehrt  $\varepsilon$  wächst.

Daraus geht hervor, dafs wir in der Symmetrielage ein Minimum der Ablenkung  $\omega$  haben.

Die Grenzwinkel für die durchzulassenden Strahlen werden durch die Grenzen der totalen Reflexion bestimmt. Diese tritt ein, wenn die Gleichungen 2) entweder für  $\sin \varepsilon$  oder für  $\sin \eta$  einen Werth gröfser als 1 ergeben würden, der dem Sinus eines reellen Winkels nicht zukommen kann. Daraus folgt, dafs der gröfste Werth der Winkel  $\varepsilon$ , und  $\eta$ , den wir mit  $h$  bezeichnen wollen, gegeben wird durch die Gleichung

$$\sin h = \frac{1}{n}.$$

Für Glas vom Brechungsverhältniß  $\frac{3}{2}$  ist  $h = 41^\circ 49'$ , für Flintglas mit  $n = \frac{5}{3}$  ist es  $36^\circ 52'$ .

Da nun nach Gleichung 1)

$$\gamma = \varepsilon + \eta,$$

so folgt, daß

$$\gamma < 2h$$

sein muß, wenn der brechende Winkel überhaupt Licht durchlassen soll. Das giebt für die beiden eben genannten Glasarten die Grenzen  $83^\circ 38'$  und  $73^\circ 44'$  für die größten brechenden Winkel, die überhaupt Licht durchlassen.

Ist der brechende Winkel kleiner als  $2h$ , so sind die Grenzen der durchzulassenden Strahlen dadurch gegeben, daß einerseits  $\varepsilon$ , andererseits  $\eta$ , gleich  $h$  werden können. An der einen Grenze ist also

$$\begin{aligned} \varepsilon &= h & \varepsilon &= R \\ \eta &= \gamma - h \text{ und } \sin \eta = n \cdot \sin(\gamma - h). \end{aligned}$$

An der andern Grenze vertauschen sich nur die Werthe von  $\varepsilon$ , und  $\eta$ , sowie von  $\varepsilon$  und  $\eta$  untereinander. Der Winkel  $(\gamma - h)$  kann bei kleinen Werthen des brechenden Winkels  $\gamma$  auch negativ werden, d. h. der betreffende Strahl liegt dann im Prisma auf der der brechenden Kante abgekehrten Seite des Einfallslotes, außerhalb des Prisma auf der zugekehrten Seite.

Die scheinbare Breite des Spalts im prismatischen Bilde für monochromatisches Licht ergibt sich aus Gleichung 6), wenn wir  $d\varepsilon$  als den Werth der scheinbaren Breite des wirklichen Spalts vom Orte des Prisma gesehen nehmen. Dann ist  $d\eta$  die entsprechende Größe im prismatischen Bilde. Wie wir eben gesehen haben, ist  $d\eta > d\varepsilon$ , wenn  $\eta > \varepsilon$ . Schmalere Spaltbilder bekommen wir also für ein größeres  $\varepsilon$ , kleineres  $\eta$ , d. h. wenn wir in die uns zugekehrte Seite des Prisma senkrechter hineinsehen, als dem Minimum der Ablenkung entspricht.

Größe der Zerstreuung für Licht von verschiedener Brechbarkeit. Wenn die einfallenden Strahlen aus fester Richtung kommen, der Winkel  $\varepsilon$  für sie also nicht variirt, so ändert sich doch  $\eta$  mit dem Brechungsverhältniß  $n$ . Die Größe

$$d\eta = \frac{d\eta}{dn} \cdot dn$$

giebt dann die scheinbare Breite des Farbestreifens im Spectrum, der dem Intervall des Brechungsverhältnisses  $d\eta$  entspricht.

Um den Differentialquotienten  $\frac{d\eta}{dn}$  zu bilden, können wir die Gleichungen 2) und 1) differentiiren, indem wir  $\varepsilon$  und  $\gamma$  als unveränderlich betrachten. Dies giebt:

$$\begin{aligned} 0 &= dn \cdot \sin \varepsilon + n \cdot \cos \varepsilon \cdot d\varepsilon, \\ \cos \eta \cdot d\eta &= dn \cdot \sin \eta + n \cdot \cos \eta \cdot d\eta, \\ d\varepsilon + d\eta &= 0. \end{aligned}$$

Multiplizieren wir die erste der drei Gleichungen mit  $\cos \eta$ , die zweite mit  $\cos \varepsilon$ ,



und addiren mit Berücksichtigung der dritten, so giebt dies

$$\begin{aligned} \cos \eta \cdot \cos \epsilon, \cdot d\eta &= dn \cdot \sin \gamma \\ \frac{d\eta}{dn} &= \frac{\sin \gamma}{\cos \eta \cdot \cos \epsilon}, \dots \dots \dots 7). \end{aligned}$$

Das Product der beiden Cosinus im Nenner dieses Ausdrucks ist veränderlich, wenn man das Prisma dreht. An der einen Grenze, wo der austretende Strahl streifenden Austritt hat, ist  $\cos \eta = 0$ , also  $\frac{d\eta}{dn} = \infty$ . An der andern Grenze ist dagegen  $\epsilon, = h$  und

$$\cos \eta = \sqrt{1 - n^2 \cdot \sin^2 (\gamma - h)};$$

also

$$\frac{d\eta}{dn} = \frac{\sin \gamma}{\cos h \cdot \sqrt{1 - n^2 \cdot \sin^2 (\gamma - h)}}.$$

Zwischen beiden giebt es aber noch ein Minimum des Werthes dieser GröÙe, welche einem Maximum von  $(\cos \epsilon, \cdot \cos \eta)$  entspricht. Die genaue Richtung dieses Minimum wird durch eine Gleichung dritten Grades gegeben. Es liegt zwischen dem streifenden Austritt und der Richtung der kleinsten Ablenkung des Strahls.

Reinheit des Spectrum. Diese wird, so weit sie von dem regelmäÙig gebrochenen Lichte abhängt, bedingt sein durch das Verhältniß zwischen der Breite der Farbenstreifen und der scheinbaren Breite des Spalts im prismatischen Bilde.

Erstere, die wir mit  $P$  bezeichnen wollen, ist gegeben durch das  $\frac{d\eta}{dn}$  der Gleichung 7), letztere durch das  $\frac{d\eta}{d\epsilon}$  der Gleichung 6),

$$P = \frac{\frac{d\eta}{dn}}{\frac{d\eta}{d\epsilon}} = \frac{\sin \gamma}{\cos \eta, \cdot \cos \epsilon} \dots \dots \dots 8).$$

Die Form dieses Ausdrucks ist ganz dieselbe, wie in Gleichung 7), nur dafs die Winkel für die beiden Seiten des Prisma mit einander vertauscht sind. Die Reinheit wird also am größten bei streifender Incidenz der einfallenden Strahlen vom dickeren Ende des Prisma her, wo der Spalt sehr schmal erscheint. Ein Minimum der Reinheit tritt zwischen dieser Richtung und der der kleinsten Ablenkung ein; dann wächst die Reinheit wieder ein wenig, wenn der Austrittswinkel sich der streifenden Incidenz nähert.

Die streifenden Incidenzen schwächen aber das Licht sehr durch starke Reflexion und erfordern große Genauigkeit der ebenen Flächen, so dafs sie deshalb praktisch wenig zu empfehlen sind. Die Lage der kleinsten Ablenkung hat unter anderen Vorzügen den, dafs der Lichtverlust der geringste ist.

B. Brechung von Strahlen, welche in einer zur brechende Kante parallelen Ebene sich ausbreiten. Gerade Linien, welche der brechenden Kante parallel sind, wie es bei den als Lichtquelle dienenden Spalten und glühenden Drähten gewöhnlich der Fall ist, erscheinen gekrümmt, an ihren Enden stärker



abgelenkt, als in derjenigen Stelle, die in einer durch das Auge des Beobachters gelegten Hauptebene liegt.

Die Einfallsebene und die Hauptebene, welche zu jedem der beiden Einfallspunkte des durchgehenden Strahls gehören, schneiden sich im Einfallslot, das in dem betreffenden Einfallspunkte errichtet ist. Bezeichnen wir nun wie bisher mit  $\epsilon$  und  $\epsilon_1$  den Einfalls- und Brechungswinkel, mit  $\delta$  und  $\delta_1$  die Projectionen dieser Winkel auf die Hauptebene, und mit  $\varphi$  den Winkel zwischen der Einfallsebene und der Hauptebene, so ist nach einem bekannten Satze der sphärischen Trigonometrie

$$\begin{aligned} \tan \delta &= \cos \varphi \cdot \tan \epsilon \\ \tan \delta_1 &= \cos \varphi \cdot \tan \epsilon_1. \end{aligned}$$

Das Brechungsgesetz aber ergibt:

$$\sin \epsilon = n \cdot \sin \epsilon_1.$$

Ersetzt man hierin die Sinus durch die Tangenten, und erhebt auf das Quadrat, so giebt dies:

$$\frac{\tan^2 \epsilon}{1 + \tan^2 \epsilon} = n^2 \cdot \frac{\tan^2 \epsilon_1}{1 + \tan^2 \epsilon_1},$$

als eine andere Form des Brechungsgesetzes. Ersetzt man hierin  $\epsilon$  und  $\epsilon_1$  durch ihre Projectionen auf eine Hauptebene, so ergibt sich

$$\frac{\tan^2 \delta}{\cos^2 \varphi + \tan^2 \delta} = n^2 \cdot \frac{\tan^2 \delta_1}{\cos^2 \varphi + \tan^2 \delta_1},$$

oder

$$\left. \begin{aligned} \tan^2 \delta &= \frac{n^2 \cdot \tan^2 \delta_1 \cdot \cos^2 \varphi}{\cos^2 \varphi - (n^2 - 1) \cdot \tan^2 \delta_1} \\ \tan^2 \delta_1 &= \frac{\tan^2 \delta \cdot \cos^2 \varphi}{n^2 \cdot \cos^2 \varphi + (n^2 - 1) \cdot \tan^2 \delta} \end{aligned} \right\} \quad \dots \quad 9)$$

so daß jeder dieser Winkel aus dem andern gefunden werden kann.

Wenn wir die beiden Winkel  $\eta$  und  $\eta_1$  ebenso auf dieselbe Hauptebene projicirt denken, und ihre Projectionen  $\zeta$  und  $\zeta_1$  nennen, den Winkel zwischen den Ebenen der beiden Winkel dagegen  $\psi$ , so erhalten wir entsprechende Gleichungen, wie 9) auch für  $\zeta$  und  $\zeta_1$ , also mit kleiner Änderung der Schreibweise:

$$\tan^2 \zeta = \frac{n^2 \cdot \tan^2 \zeta_1}{1 - \frac{n^2 - 1}{\cos^2 \psi} \cdot \tan^2 \zeta_1}, \quad \dots \quad 9a).$$

Wieder haben wir für den brechenden Winkel des Prisma

$$\gamma = \delta + \zeta, \quad \dots \quad 10)$$

und wenn wir mit  $O$  die Projection des Ablenkungswinkels  $\omega$  auf die Hauptebene bezeichnen

$$O + \gamma = \delta + \zeta \quad \dots \quad 10a).$$

Die Winkel  $\psi$  und  $\varphi$  sind miteinander verbunden durch die Gleichung

$$\frac{\cos^2 \varphi}{\cos^2 \varphi \cdot \cos^2 \delta + \sin^2 \gamma} = \frac{\cos^2 \psi}{\cos^2 \psi \cdot \cos^2 \zeta + \sin^2 \gamma}, \quad \dots \quad 10b)$$

welche sich ergibt, wenn man durch den Strahl im Prisma und seine Projection

auf die Hauptschnitte eine Ebene legt, die demzufolge der brechenden Kante parallel sein muß, und berücksichtigt, daß die in dieser Ebene liegenden Winkel zwischen dem Strahl und seinen beiden Projectionen gleich sein müssen.

Die in Gleichung 9a) gegebene Form läßt am leichtesten erkennen, daß wenn der Winkel  $\varphi$  oder  $\psi$  wächst, sein Cosinus also abnimmt, auch der Nenner des Bruchs kleiner und  $\tan \varphi$  oder  $\tan \zeta$  größer wird. Die Brechung in den Projectionen des Strahls ist also stärker, je mehr die Einfallsebene von der Hauptebene abweicht. Da dies bei beiden Brechungen im Prisma stattfindet, muß auch die Gesamtablenkung der Projection von Strahlen, die geneigt zur Hauptebene durchgehen, stärker sein, als für solche, die in der Hauptebene verlaufen und bleiben.

Gleichung 10b) ergibt, daß auch die Größen  $\cos \varphi$  und  $\cos \psi$  nur gleichzeitig zu- und abnehmen können.

Wegen der hieraus resultirenden Krümmung prismatischer Bilder von leuchtenden Linien, dürfen letztere keine große Länge haben, wenn man genaue Spectren haben will und die brechende Kante des Prisma muß senkrecht gegen die Gesichtslinie des Beobachters und parallel dem Spalt sein.

## II. Bilder näherer Punkte für Strahlen in der Hauptebene.

In Fig. 126 sei  $ab$  ein auf die Grenzfläche zweier durchsichtiger Medien fallender Strahl,  $ab$ , ein zweiter ihm sehr nahe benachbarter von demselben leuchtenden Punkte  $a$  ausgehender in derselben Einfallsebene gelegen. Das von  $b$  auf  $ab$ , gefallene Loth treffe den letzteren Strahl in  $d$ . Dies Loth macht mit der Ebene  $cb$ , denselben Winkel, wie die zu beiden normalen Linien  $c$  und  $ac$ , also ist

$$bd = bb, \cdot \cos \alpha.$$

Wenn wir  $bb, = dx$  und den sehr kleinen Winkel  $b,ab$  mit  $d\alpha$  bezeichnen, können wir diese Gleichung schreiben

$$r \cdot d\alpha = dx \cdot \cos \alpha.$$

Sind nun  $b,f$ , und  $bf$  die gebrochenen Strahlen, die sich rückwärts verlängert schneiden müssen, da sie beide in der Ebene der Zeichnung (Einfallsebene) liegen, und ist  $e$  deren Schnittpunkt,  $cb = r$ , so besteht die entsprechende Beziehung zwischen diesen

$$r, \cdot d\beta = dx \cdot \cos \beta.$$

Daraus folgt:

$$\frac{r,}{r} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \cdot \frac{d\alpha}{d\beta}.$$

Nach dem Brechungsgesetz ist

$$\sin \alpha = n \cdot \sin \beta,$$

also wenn wir  $\alpha$  und  $\beta$  ändern:

$$\cos \alpha \cdot d\alpha = n \cdot \cos \beta \cdot d\beta.$$




Fig. 126.

Dies in die obige Gleichung gesetzt, giebt

$$\frac{r_1}{r} = \frac{n \cdot \cos^2 \beta}{\cos^2 \alpha} \quad 11).$$

Wenn  $b$ , die Kante eines Prisma ist, und an der zweiten Fläche desselben der Einfallswinkel im Glase  $\beta$ , ist, außerhalb desselben  $\alpha$ , wenn ferner  $r_2$  die Entfernung des scheinbaren Convergenzpunktes der Strahlen nach der zweiten Brechung anzeigt, so ist hierfür entsprechend

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{n \cdot \cos^2 \beta}{\cos^2 \alpha}, \quad 11a).$$

Also aus 11) und 11a)

$$\frac{r_2}{r} = \frac{\cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \beta}{\cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \beta}, \quad 11b).$$

Es ist dies dieselbe GröÙe, die oben in Gleichung 6) schon vorgekommen ist als Werth von  $\left(\frac{d\alpha}{d\beta}\right)^2$ , und es lassen sich dieselben Betrachtungen anwenden, um den Gang dieser Function darzustellen.

Im Minimum der Ablenkung ist  $\alpha = \beta$ ,  $\alpha_1 = \beta_1$ , folglich auch  $r_2 = r$ . Wenn  $\alpha_1 < \alpha$  ist  $r_2 > r$ , umgekehrt  $r_2 < r$ , wenn  $\alpha_1 > \alpha$ . Man merkt dies sehr deutlich bei der Einstellung des Fernrohrs auf die FRAUNHOFER'schen Linien eines endlich entfernten Spaltes.

## IIa. Astigmatismus der Bilder näherer Lichtpunkte.

Wenn man sich *Fig. 126* um das vom leuchtenden Punkte  $a$  auf die brechende Fläche gefällte Loth  $ac$  als Axe gedreht denkt, so ändert die brechende Fläche ihre Lage nicht, indem sie sich in sich selbst verschiebt; der Einfallspunkt des Strahls  $ab$  aber verschiebt sich in der brechenden Fläche senkrecht zur Linie  $cb$ , während wir ihn in II. sich in Richtung dieser Linie selbst verschieben lassen;  $bf$  bleibt der zu  $ab$  gehörige gebrochene Strahl, und wenn  $h$  der Punkt ist, wo derselbe die Axe  $ac$  schneidet, so bleibt auch dieser Schnittpunkt bei der Drehung unverändert. Während also  $a$  der Ausgangspunkt aller in der Entfernung  $cb$  einfallenden Strahlen ist, ist  $h$  der Schnittpunkt der zugehörigen gebrochenen Strahlen. Bezeichnen wir  $bh = r_3$ , so ist

$$\sin \alpha = \frac{x}{r}$$

$$\sin \beta = \frac{x}{r_3},$$

also nach dem Brechungsgesetz

$$\frac{x}{r} = n \cdot \frac{x}{r_3}$$

oder

$$r_3 = n \cdot r.$$

Bezeichnet man mit  $r_4$  den Abstand des Convergenzpunktes der betreffenden Strahlen nach der Brechung an der zweiten Prismenfläche, indem wir wieder die brechende Kante senkrecht zur Ebene der Zeichnung durch  $b$  gehend annehmen,

so wird für ein schmales Strahlenbündel der angegebenen Art wieder

$$r_3 = n \cdot r_4,$$

folglich

$$r_4 = r \dots \dots \dots 12).$$

Dies gilt also für schmale Strahlenbündel, die in Ebenen senkrecht zur Einfallsebene divergiren, wenn die mittlere Einfallsebene gleichzeitig Hauptebene ist. Für die in der Hauptebene divergirenden Strahlenbündel dagegen gelten die Gleichungen des Abschnitts II. Diese zeigen, daß  $r_2 = r$  nur im Minimum der Ablenkung wird. In diesem Falle ist ein durch das Prisma gegangenes homocentrisches Strahlenbündel auch nach der Brechung homocentrisch; in andern Fällen astigmatisch.

Im Allgemeinen ist es für die Reinheit der Farbenstreifen und die Schärfe der FRAUNHOFER'schen Linien nicht erforderlich, daß die gebrochenen Strahlen homocentrisch seien. Nur ist zu bemerken, daß man bei astigmatischen Strahlen die Einstellung des Fernrohrs nicht gleichzeitig für die FRAUNHOFER'schen Linien und für die Ränder des Spectrum, die den Enden des Spalts entsprechen, oder für ZANTEDESCHI's Linien, die quer durch die Farbenstreifen ziehen und von kleinen Ungleichheiten des Spalts herrühren, genau machen kann.

260 Was die Helligkeit des Spectrum betrifft, so verhält sich die Helligkeit  $h$  des Spaltes, die er für irgend eine einzelne homogene Farbe hat, zu der seines Bildes umgekehrt wie seine Breite  $d\varepsilon$  zu der des Bildes  $d\eta$ , wenn man übrigens von den Verlusten absieht, die das Licht durch Reflexion an den Glasflächen erleidet, und wenn die Apertur des Prisma größer als die Pupille ist, oder beim Gebrauch eines Fernrohrs größer als das Objectivglas. Also

$$h \cdot d\varepsilon = h_1 \cdot d\eta$$

oder mit Benutzung des früher gefundenen Verhältnisses von  $d\varepsilon$  und  $d\eta$

$$h_1 = h \cdot \frac{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon_1}{\cos \varepsilon \cdot \cos \eta_1}.$$

Nun ist die Helligkeit  $H$  irgend einer Stelle des Spectrum aber gleich der Summe der Helligkeiten  $h_1$  aller einzelnen homogenen Farben, welche sich dort decken. Im Allgemeinen können wir annehmen, daß einfache Farben von sehr kleinem Unterschiede der Wellenlänge  $\lambda$  nahehin dieselbe Helligkeit haben. Bezeichnen wir also mit  $d\lambda$  und  $dn$  dies Intervall der Wellenlänge und Brechbarkeit, innerhalb deren die sich deckenden Farben liegen, so können wir setzen

$$H = h_1 \cdot d\lambda = h_1 \cdot \frac{d\lambda}{dn} \cdot dn,$$

woraus mit Berücksichtigung des in 7) gefundenen Werthes von  $dn$  folgt:

$$H = h \cdot \frac{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon_1}{\sin \gamma} \cdot d\varepsilon \cdot \frac{d\lambda}{dn},$$

wo  $d\varepsilon$  die scheinbare Breite des Spaltes bezeichnet. Um die Bedeutung dieses Ausdruckes von  $H$  zu verstehen, bemerken wir noch, daß, wenn wir unter Voraussetzung einer geometrischen Lichtlinie statt des Spaltes den Gesichtswinkel  $d\eta$  bestimmen, unter welchem die innerhalb des Intervalls  $dn$  vorkommenden Farben in dem ideell reinen Spectrum erscheinen, sich das Verhältniß  $\frac{d\eta}{d\lambda}$ , dessen Werth

wir mit  $l$  bezeichnen wollen, durch eine ähnliche Differentiation wie vorher findet

$$\frac{d\eta}{dn} = \frac{d\eta}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dn} = l \cdot \frac{d\lambda}{dn} = \frac{\sin \gamma}{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon_1}.$$

Dann wird

$$H = \frac{h \cdot d\varepsilon}{l}.$$

Abgesehen also von dem Verluste durch Reflexion und Absorption, ist die Helligkeit des Spectrum, unabhängig von der Brechkraft des Prisma und den Brechungswinkeln, direct proportional der Helligkeit der betreffenden Farben im Spectrum, der scheinbaren Breite des Spaltes und umgekehrt proportional der scheinbaren Länge des betreffenden Theils des Spectrum.

Wenn die Brechung im Minimum der Ablenkung geschieht, ist die scheinbare 261  
Breite des Spaltes der seines Bildes gleich, und man kann  $\frac{l}{d\varepsilon}$  als Mafs der Reinheit des Spectrum betrachten. Dann ist also die Helligkeit des Spectrum bei gleichbleibender Helligkeit des durch den Spalt dringenden Lichts einfach umgekehrt proportional seiner Reinheit. Daraus folgt also, dafs zur Erreichung der grössten Reinheit auch das intensivste Licht nöthig ist.

Dagegen würde es theoretisch möglich sein, etwas gröfsere Helligkeit bei gleicher Reinheit des Spectrum zu gewinnen, wenn man den Einfallswinkel an der ersten brechenden Fläche vergröfsert, und den Spalt breiter macht; um aber die Länge des Spectrum constant zu erhalten, müfste man auch noch den brechenden Winkel vergröfsern. Indessen läfst sich praktisch dadurch nichts gewinnen, weil der Lichtverlust durch Reflexion immer gröfser wird, und die kleinen Abweichungen der brechenden Flächen von einer vollkommenen Ebene das Bild desto mehr verwirren, je gröfser der Einfallswinkel ist.

Bisher ist der Gebrauch des Prisma ohne Vergröfserungsgläser vorausgesetzt worden. Das prismatische Spectrum kann nun aber auch wie jedes andere optische Bild als Object für ein Fernrohr gebraucht und beliebig vergröfsert werden. Dabei wird die Reinheit des Spectrum natürlich nicht verändert, und wenn das Fernrohr eine hinreichend grofse Apertur hat, um die gesehenen Gegenstände in ihrer natürlichen Helligkeit zu zeigen, und die Apertur des Prisma dieser gleichkommt, so ist auch die Helligkeit des vergröfserten Bildes unverändert. Auch bleiben die in dem Vorausgehenden hingestellten Regeln über Helligkeit und Reinheit des Spectrum unverändert, wenn man unter  $d\varepsilon$  die scheinbare Gröfse des Spaltes, unter  $d\eta$  die seines Bildes, unter  $l$  die Länge des bestimmten Theils des Spectrum versteht, wie sie durch das Fernrohr erscheinen. Aus der für die Helligkeit hingestellten Bedingung ergibt sich übrigens, warum für Versuche ohne Fernrohr ganz kleine Prismen ausreichen, während man für Fernrohrversuche desto gröfsere haben mufs, je stärker die Vergröfserung.

Um ein Spectrum herzustellen, läfst man Licht durch einen engen Spalt auf ein Prisma fallen, das hindurchgegangene Licht kann man entweder direct in das Auge oder ein Fernrohr fallen lassen, oder es durch eine Linse zu einem objectiven Bilde des Spectrum condensiren.


Als Lichtquelle kann man jeden leuchtenden Körper benutzen, bekanntlich ist die Helligkeit der einzelnen Farben in dem Lichte verschiedener selbstleuchtender Körper,



262 irdischer sowohl als himmlischer, von verschiedener Stärke, die Anordnung der dunklen und hellen Linien ist verschieden. Will man das Spectrum des Sonnenlichts zu den Versuchen benutzen, so genügt für Spectren, in denen man nur die gröberen dunklen Linien und nur die gewöhnlich sichtbaren Farben sehen will, das von einem Spiegel reflectirte Licht des Himmels oder ein von der Sonne beschienenes Papierblatt; nur ist in dem ersteren das Gelb und Orange ein wenig schwach. Man hat hierbei den Vortheil, daß diese Art der Beleuchtung lange Zeit unverändert sich erhält. Um die stärkeren dunklen Linien *D*, *F* und *G* zu sehen genügt schon ein Spalt von 1 mm Breite in 400 mm Entfernung durch ein Flintglasprisma, dessen brechender Winkel  $50^\circ$  beträgt, mit bloßem Auge betrachtet; entfernt man sich doppelt so weit vom Spalte, so sieht man schon die meisten von FRAUNHOFER mit großen Buchstaben bezeichneten Linien. Man muß nur gerade die Stellung des Prismas suchen (nach S. 296), bei welcher sich das Auge für die Linien accommodiren kann.

Braucht man ein Spectrum von größerer Reinheit, in welchem auch die feineren dunkeln Linien sichtbar werden sollen, oder will man die äußersten Grenzen des Spectrum sichtbar machen, so muß man einen Spiegel aufstellen, welcher Licht von den der Sonne benachbarten Theilen des Himmels, oder von der Sonne selbst durch den Spalt auf das Prisma wirft, und diesen Spiegel, da die Sonne ihren Ort am Himmel ändert, entweder etwa alle drei Minuten von neuem einstellen oder ihn an einen Heliostaten befestigen, welcher ihm eine entsprechende Bewegung mittheilt.

Den Spalt, durch welchen das Licht dringt, und welcher das eigentliche Object des prismatischen Bildes ist, kann man für Versuche, bei denen es nicht auf die feineren dunkeln Linien ankommt, oder wenn man seine Entfernung vom Prisma sehr groß machen kann, leicht aus undurchsichtigem Papier schneiden. Muß man dagegen einen sehr feinen Spalt anwenden, so dienen dazu am besten die GRAVESANDE'schen Schneiden.



*Fig. 127.*

Auf einer viereckigen Messingplatte *Fig. 127* sind zwei gerade Schienen *ab*, *ab* befestigt, zwischen deren Enden *aa* eine Platte *aa* *cc* festliegt, deren Rand *cc* zugeschräfft ist. Ihm gegenüber steht der zugeschräfft Rand *dd* einer anderen zwischen den Schienen verschiebbaren Platte *ddee*. Letztere wird mittels einer Schraube *f* mit sehr feinen Windungen, deren Mutter in dem auf der Grundplatte drehbar befestigten Zapfen *g* liegt, bewegt. Man kann auf diese Weise die beiden Schneiden *cc* und *dd* in sehr kleine Entfernungen von einander fein einstellen, wobei sie, wenn das Instrument gut gearbeitet ist, stets parallel bleiben. Die Grundplatte hat an der den Schneiden ent-

sprechenden Stelle einen Ausschnitt, welcher das zwischen den Schneiden durchgegangene Licht frei weiter gehen läßt.

Die GRAVESANDSchen Schneiden müssen in der Mitte eines hinreichend großen dunkeln Schirms befestigt und ihre dem Beobachter zugekehrte Seite selbst geschwärzt sein. Der Schirm muß groß genug sein, daß in der Nähe des Spaltes nirgends ein beleuchteter Gegenstand sichtbar ist, dessen Spectrum bis zu dem des Spaltes hinreichen könnte. Bei allen Versuchen, wo nicht die vollständige Entfernung der letzten Reste weissen Lichtes erfordert wird, kommt es mehr darauf an, daß der Schirm, in welchem sich der Spalt befindet, gleichmäßig dunkel, als daß er absolut dunkel sei. Überall wo eine Verschiedenheit der Beleuchtung, selbst nur der Gegensatz von Sammet-schwarz und Grauschwarz sich findet, zeigt das Prisma Farben, während eine gleichmäßig beleuchtete Fläche dergleichen nicht zeigt. Man kann also eine große Zahl solcher Versuche vollständig gut in einem hellen Zimmer auführen, wenn man nur den Spalt in einem genügend großen und gleichmäßig schwarz gefärbten Schirm anbringt.

Für viele Versuche, bei denen es nicht auf sehr sorgfältige Reinigung des farbigen  $n$  Lichtes ankommt, sind die Spectroskope sehr bequem. Das Prisma ist darin auf einem drehbaren Stativ aufgestellt, welches auch zwei Röhren trägt, von denen die eine ein vollständiges, auf Unendlich eingestelltes Fernrohr ist, die andre von einem solchen nur die Objectivlinse als Collimatorlinse enthält, statt des Oculars dagegen den Spalt mit GRAVESANDE'S Schneiden in einer Auszugsröhre trägt. Das Innere dieser Röhre ist sorgfältig geschwärzt, der Raum zwischen beiden Röhren, in dem das Prisma steht, wird mit einem schwarzen Tuche überdeckt, um alles fremde Licht abzuhalten. Der Spalt wird genau in den Brennpunkt der Collimatorlinse eingestellt, so daß diese die Strahlen von jedem Punkt des Spaltes einander parallel macht; so fallen sie auf das Prisma, und nachdem sie von diesem abgelenkt sind, in das Fernrohr, durch welches der Beobachter das in ein Spectrum ausgezogene Bild des Spaltes sieht. Sind die beiden Röhren an Armen befestigt, die um die verticale Axe des Stativs drehbar sind, und deren Drehungswinkel durch eine passend angebrachte Winkeltheilung gemessen werden kann, so nennt man die Apparate Spectrometer. Die Construction derselben findet sich in den physikalischen Lehrbüchern beschrieben.

Für viele physiologisch optische Fragen ist es wichtig etwas größere Felder nur mit einer der Spectralfarben ausgefüllt, vor sich zu haben. Dazu kann man das Spectroskop leicht einrichten, wenn man für das Fernrohr eine zweite Auszugsröhre mit GRAVESANDE'S Schneiden anfertigen läßt, die an Stelle der Ocularröhre in das Fernrohr eingesetzt werden kann. Das Schema dieser Anordnung ist in *Fig. 128* dargestellt; darin ist  $k$  eine Sammellinse, welche die ankommenden Lichtstrahlen auf den Spalt des Schirmes  $b$  concentrirt;  $l$  ist die Collimatorlinse, in deren Brennpunkt der Spalt von  $b$  steht,  $P$  das Prisma,  $m$  das Fernrohrobjectiv, in dessen Brennpunkt statt des Oculars der zweite Schirm  $a$  steht; hinter diesem das Auge des Beobachters. Wenn die beiden




Fig. 128.

Spalte dann genau so eingestellt werden, daß für eine gewählte Farbe der zweite genau das optische Bild des ersten ist, so geht durch den zweiten nur farbiges Licht von der Brechbarkeit dieser Farbe hindurch, alles andere wird neben dem Spalte abgefangen. Der Beobachter sieht dann durch den zweiten Spalt die ganze brechende Fläche des Prismas vor sich mit nur dieser einen Farbe beleuchtet. Sollte dieselbe noch nicht ganz homogen erscheinen, so sind die beiden Spalten nicht in genau zusammengehörigen Vereinigungspunkten. Erscheint die Farbe durch den oberen Theil des Ocularspalts gesehen etwas anders, als durch den untern Theil, so sind die Spalte nicht parallel.

Um hierbei gleichmäßige Beleuchtung des Prismas zu erhalten, und andererseits um bei der Beobachtung des Spectrum durch das Fernrohr nicht durch Diffractionen und halbe Zerstreuungskreise gestört zu werden, muß man dafür sorgen, daß von jedem Punkt des Spaltes volle Lichtkegel zu der Collimatorlinse, beziehlich durch das Prisma zum Objectiv des Fernrohrs gehen. Deshalb ist es bei schmalen Lichtquellen oft nöthig, vor dem ersten Spalt  $b$  noch eine Brennlinse  $k$  aufzustellen, die ein Bild der Sonne oder der Beleuchtungsflamme auf der Ebene des Spaltes entwirft. Übrigens ist zu

bemerken, daß die Collimatorlinse die im Folgenden zu besprechenden Störungen durch Licht, welches unregelmäßige Wege einschlägt, vermehrt.

262 Wenn es dagegen auf vollständige Entfernung des weissen Lichtes  
263 ankommt, wie bei den Versuchen, welche die Unzerlegbarkeit und Unveränderlichkeit  
des homogenen Lichtes nachweisen sollen, und bei den Untersuchungen der Grenzen  
des Spectrum, muß der Schirm, in welchem sich der Spalt befindet, absolut dunkel sein.  
Am leichtesten ist dies zu erreichen, wenn man über ein zu optischen Versuchen ein-  
gerichtetes dunkles Zimmer mit verschlossenen und dicht eingefügten Fensterläden ver-  
fügen kann. Man setzt dann die Platte mit den Schneiden gleich in eine Öffnung der  
Läden selbst ein. Übrigens läßt sich dasselbe oft auch in den gewöhnlichen Wohn-  
zimmern erreichen, wenn man die Fenstervorhänge und Fensterläden bis auf eine schmale  
Spalte schließt, durch welche das Licht einfällt. Die Spalte wird im Boden eines schwarz  
ausgestrichenen Kastens angebracht, dessen offene Mündung dem Beobachter zugekehrt  
ist. Die Seitenwände des Kastens halten das seitlich einfallende Licht vom Grunde des  
Kastens ab, so daß dieser schon sehr dunkel wird. Neben den Spalt klebt man dann  
zwei Streifen schwarzen Sammets in den Grund des Kastens, deren Breite der Länge  
des Spaltes gleich ist, und deren Länge die Länge des auf die Ebene des Spaltes projicirten  
Spectrum um etwas übertrifft, so daß sich das ganze Spectrum auf der Fläche des  
Sammets entwirft. Außerdem muß man durch Aufstellung passender dunkler Schirme  
dafür sorgen, daß kein Licht von den noch übrig gebliebenen helleren Stellen des Zimmers  
auf das Prisma oder die Linsen des Fernrohrs und das Auge des Beobachters fällt.

Die Herstellung eines absolut dunkeln Schirms in einem dunkeln Zimmer genügt  
aber noch nicht, um das Spectrum von den letzten sichtbaren Resten weissen Lichts zu  
befreien, so lange noch intensives Licht von mehreren Farben das Prisma selbst, die  
Linsen des Fernrohrs und das Auge des Beobachters trifft. In der oben entwickelten  
Theorie für die Entstehung der prismatischen Bilder haben wir nur das regelmässig ge-  
brochene Licht berücksichtigt. Wir müssen aber bedenken, daß an jeder brechenden  
Fläche auch noch Licht reflectirt wird, und in jeder festen oder flüssigen durch-  
sichtigen Substanz eine kleine Menge Licht unregelmässig nach allen Richtungen hin  
zerstreut wird.

Was zunächst die Reflexionen betrifft, so kommen dergleichen erstens im Prisma  
vor, wenn diejenige Fläche des Prisma, welche der brechenden Kante gegenüberliegt,  
nicht mit schwarzer Ölfarbe oder Asphaltlack überzogen und ihrer Reflexionsfähigkeit  
beraubt ist. Ist sie matt geschliffen, so wird sie in der Regel, so oft Licht durch das  
Prisma geht, erleuchtet werden. Ist in Fig. 129 *abcd* der Weg eines von *d* kommen-




Fig. 129.

weisses Bild des Spalts ist allerdings bei unseren Versuchen weniger zu fürchten, weil  
es einen verhältnissmässig kleinen Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, es ist weniger  
schädlich, als das Spiegelbild der Fläche *fe*, wenn diese matt geschliffen ist. Dagegen



kann nun auch durch diese Fläche Licht von seitlichen Gegenständen in das Auge des Beobachters kommen, für dessen Abblendung man sorgen muß. Am besten ist es jedenfalls, mit Ausnahme der beiden brechenden Flächen des Prisma alle übrigen zu schwärzen.

Wenn man das Spectrum durch ein Fernrohr beobachtet, kommen auch die Reflexionen an den vorderen und hinteren Flächen der Linsen in Betracht. Es werden dadurch kleine lichtschwache regelmäßige Bildchen der vor dem Fernrohr liegenden Objecte entworfen, die aber meist so liegen, daß der Beobachter sein Auge nicht für sie accommodiren kann, und die deshalb eine schwache weiße Beleuchtung des Gesichtsfeldes geben. Man bemerkt diese Beleuchtung leicht, wenn man ein Fernrohr auf einen tief schwarzen Gegenstand richtet, während seitwärts sich sehr helle befinden. Das Gesichtsfeld grenzt sich dann als schwach erleuchtet gegen die schwarze Blendung des Oculars ab. 264

Einen ähnlichen, aber schwerer zu beseitigenden Effect hat die Zerstreuung des Lichts in den Glasmassen. Eine jede noch so klare Glasmasse erscheint weißlich trübe, sobald man sie scharf von der Sonne beschienen vor dunklem Grunde betrachtet, namentlich wenn das Auge sich nahehin in der Richtung der durchgelassenen Strahlen befindet. Dasselbe ist, wie wir schon früher bemerkt haben<sup>1</sup>, der Fall mit der Hornhaut und Linse des menschlichen Auges. Wir müssen also berücksichtigen, daß jede der vom Lichte durchlaufenen Glasmassen eine, wenn auch verhältnißmäßig kleine Menge des Lichtes, welches überhaupt durch sie hingeht, diffus zerstreut und mit solchem Licht das Gesichtsfeld des Beobachters anfüllt. Ebenso ist auch stets eine sehr kleine Menge von jeder Art Licht, welche überhaupt in das Auge dringt, über die ganze Netzhaut ausgebreitet. Solches unregelmäßig zerstreute Licht ist allerdings von außerordentlich geringer Lichtstärke, wenn man es mit dem regelmäßig gebrochenen oder reflectirten Lichte vergleicht. Doch wird es merklich, wenn man sehr lichtschwache Theile des Spectrum zu untersuchen hat. Es ist z. B. der Grund, warum man bei den gewöhnlichen Einrichtungen der Spectralversuche das äußerste Roth der Linie A und das Ultraviolett nicht wahrnimmt, und es macht sich auch sehr bemerklich, wenn man einzelne Stellen des Spectrum durch farbige Gläser oder Flüssigkeiten sehr abschwächt, dann kann der Farbenton solcher Stellen durch das diffus im Gesichtsfelde verbreitete schwache Licht sehr beträchtlich geändert werden.

Diese Schwierigkeiten lassen sich bei Untersuchungen über lichtschwache Theile des Spectrum nur dadurch vollständig überwinden, daß man durch den Spalt nur noch




Fig. 130.

solches Licht in größerer Stärke auf das Prisma und Fernrohr fallen läßt, wie es gerade untersucht werden soll, und alles Licht anderer Art, so weit man kann, ausschließt. In einzelnen Fällen kann man dies einfach dadurch erreichen, daß man farbige Gläser zwischen die Lichtquelle und den Spalt einschaltet, z. B. rothes Glas, um die Grenze des äußersten Roth im Spectrum sichtbar zu machen. Allgemeiner und vollständiger erreicht man den Zweck, wenn man hintereinander zwei Spalten und zwei Prismen aufstellt, in der Weise, daß durch den zweiten Spalt, dessen Bild das Spectrum geben soll,

<sup>1</sup> 8. oben S. 25 und 177.

nur noch Licht der betreffenden Art hindurchgeht. Das Schema dieser Anordnung ist in *Fig. 130* gegeben. Der einfallende Lichtstrahl *ab* trifft bei *b* auf den Spiegel des Heliostaten, geht durch einen Spalt in dem Schirme *c*, der im Allgemeinen nicht sehr eng zu sein braucht, fällt dann auf die Linse *d* und das Prisma *e* auf den Schirm *f*, welcher so weit von der Linse absteht, daß die vom Spalte *c* ausgegangenen Strahlen auf ihm vereinigt werden, so daß auf ihm ein in ein Spectrum ausgezogenes Bild dieses Spaltes entsteht. Dieses erste Spectrum braucht im Allgemeinen nicht rein zu sein. Es muß vielmehr, so oft man einen etwas breiteren Theil des Spectrum untersuchen will, wie z. B. das Ultraviolett, so unrein sein, daß es eine Stelle giebt, wo sich sämtliche ultraviolette Strahlen decken. Um dies nach Belieben zu reguliren, ist es eben vortheilhafter, das Prisma zwischen Linse und Schirm zu stellen. Nähert man den Schirm dem Prisma, und entfernt die Linse um ein entsprechendes Stück, so wird das Spectrum kürzer und unreiner. Entfernt man den Schirm von dem Prisma, so wird er länger und reiner. In dem Schirme *f* befindet sich zwischen GRAVESANDE'schen Schneiden ein feiner Spalt, den man so stellt, daß gerade die Farbe des Spectrum, welche untersucht werden soll, sich auf ihm projicirt. Will man z. B. das Ultraviolett untersuchen, so rückt man den Spalt so, daß er neben dem äußersten Rande des sichtbaren Violet steht. Unter diesen Umständen geht nun regelmäsig gebrochenes Ultraviolett, so lichtstark als es eben die Sonne liefert, durch den Spalt, und gleichzeitig etwas weißes von der Substanz des Prisma und der Linse diffus zerstreutes oder an ihren Flächen mehrfach reflectirtes Licht. Das letztere ist allerdings außerordentlich viel schwächer, als das regelmäsig gebrochene Sonnenlicht im Spectrum, aber doch stark genug, um auf dem Schirme *f* das Ultraviolett ganz zu verdecken. Das durch den Spalt *f* gegangene Licht fällt nun auf das zweite Prisma *g* und dahinter entweder unmittelbar oder durch ein Fernrohr in das Auge des Beobachters, wenn man nicht vorzieht, statt des Fernrohrs eine Linse aufzustellen, und in ihrem Brennpunkte auf einem Schirme ein objectives Bild des Spectrum aufzufangen. Da durch den Spalt *f* noch etwas weißes Licht gegangen ist, bekommt man auch hier ein vollständiges Spectrum, aber alle seine Theile sind sehr lichtschwach mit Ausnahme des Ultraviolett, oder welche andere Farbe des im ersten Prisma regelmäsig gebrochenen Lichtes man eben durch den Spalt *f* hat gehen lassen. Wenn auch nun im zweiten Prisma *g* und in den Linsen des Fernrohrs *h* oder im Auge des Beobachters *o* Licht unregelmäsig zerstreut wird, so ist alles andere Licht außer dem Ultraviolett jetzt schon zu schwach, als daß die geringen zerstreuten Theile desselben noch sollten wahrgenommen werden können. In der That gelingt es unter diesen Umständen das Spectrum auch im Fernrohr auf ganz tief schwarzem Grunde projicirt zu sehen, dessen Schwärze nicht mehr zu unterscheiden ist von der der Ocularblendung, so daß sich deren Rand nur da noch abzeichnet, wo er das Spectrum bedeckt. Erst wenn man diese tiefe Schwärze des Grundes erreicht hat, kann man sicher sein, reines einfarbiges Licht vor sich zu haben. Unter diesen Umständen wird denn auch das Ultraviolett des Sonnenlichts dem Auge direct sichtbar, und nur bei solchen Vorsichtsmaßregeln gelingt es die Unveränderlichkeit der Farbe des homogenen Lichts, wenn es durch farbige Gläser hindurchgeht, nachzuweisen. So lange dem Spectrum noch eine kleine Menge diffusen weißen Lichtes beigemischt ist, verändern farbige Medien, welche die betreffende Farbe durch Absorption sehr schwächen, auch scheinbar ihren Farbenton. Ein blaues mit Kobalt gefärbtes Glas zum Beispiel löscht das Gelb des Spectrum fast ganz aus, läßt aber die blauen Strahlen des zerstreuten weißen Lichts ungeschwächt durchgehen, so daß diese, mit dem durch Absorption geschwächten Gelb sich mischend, eine weißliche oder selbst blauweiße Mischfarbe an Stelle des Gelb geben, welche Mischfarbe aber nicht, wie D. BREWSTER glaubte, Licht von einem einzigen Grade der Brechbarkeit enthält, sondern deren Licht durch ein zweites Prisma wieder zerlegt werden kann in verschiedenfarbiges und verschieden brechbares Licht. Stellt man denselben Versuch dagegen an einem von diffusem Lichte vollständig befreiten Spectrum an, so bleibt das homogene Gelb auch bei den äußersten Graden der Schwächung durch ein blaues Glas rein gelb. Wir dürfen deshalb auch nicht, wie BREWSTER es gethan hat,

aus diesem und ähnlichen Versuchen schliessen, dass das Licht gleicher Brechbarkeit und Wellenlänge noch wieder aus drei verschiedenen Lichtarten von rother, gelber und blauer Farbe zusammengesetzt sei, welche verschiedenfarbigen Lichter nur in verschiedenen Theilen des Spectrum verschieden gemischt seien, und durch die Absorption in farbigen Medien von einander getrennt werden könnten. Die Versuche, auf welche er diese Resultate gründet, beruhen theils auf dem erwähnten Umstande, zum Theil auf Contrastwirkungen, zum Theil auf der schon oben erwähnten Abhängigkeit des Farbentons von der Intensität des Lichts<sup>1</sup>.

266

Nach der beschriebenen und in *Fig. 130* schematisch dargestellten Methode kann man das übrviolette Spectrum in ganzer Länge dem Auge direct sichtbar machen, ohne eine fluorescirende Substanz anzuwenden, doch müssen für das äusserste Ultraviolett die Prismen und Linsen alle aus Bergkrystall gefertigt sein, nicht aus Glas, weil letzteres die äussersten ultravioletten Strahlen des Sonnenspectrum merklich absorbiert. Man sieht dann auch sehr deutlich die ausserordentlich grosse Zahl dunkler Linien, welche dieser Theil des Spectrum enthält. Ich glaubte die Helligkeit des im Fernrohre gesehenen ultravioletten Spectrum verstärken zu können, wenn ich in die Ocularblende eine dünne Schicht Chininlösung zwischen zwei Quarzplatten einschaltete. Dann wird das Spectrum gerade auf die Chininlösung projicirt und erregt deren Fluorescenz. Die fluorescirende Chininfläche wird durch die Ocularlinse betrachtet, und es erscheint nun dem Beobachter ein ähnliches Bild, wie es ohne Chininschicht erscheint, nur ist das Bild dann nicht aus ultraviolettem Lichte, sondern aus weissblauem Lichte mittlerer Brechbarkeit gebildet. Die Helligkeit dieses Bildes war aber in meinem Fernrohr nicht, wie ich erwartet hatte, grösser als die des direct gesehenen ultravioletten Lichts, sondern fast gleich, eher kleiner, und die Linien waren wegen der Dicke der Chininschicht undeutlicher. Der Grund davon ist darin zu suchen, dass durch das Objectivglas des Fernrohrs nur ein schmaler Lichtkegel in das Instrument eindringt, alles oder fast alles Licht dieses Kegels aber auch in das Auge fällt und die Netzhaut beleuchtet, wenn keine Chininschicht eingeschaltet ist. Wenn aber das ultraviolette Licht auf eine Chininlösung fällt, so verbreitet sich das vom Chinin ausgehende Licht nach allen Richtungen des Raums hin, und nur ein sehr kleiner Theil desselben trifft das Auge des Beobachters, daher dessen Netzhaut trotz der grossen Steigerung der Helligkeit des fluorescirenden Lichts nicht stärker beleuchtet wird. Auf diese Erfahrung ist die oben gegebene Angabe über das Verhältniss der Helligkeit des unveränderten ultravioletten Lichts und der dadurch auf Chinin erregten Fluorescenz gegründet.

Ist  $a$  die Apertur des Objectivglases oder des davor stehenden Prisma, wenn letzteres die Grundfläche des Lichtkegels begrenzt, und  $r$  der Abstand des Bildes, und denkt man sich ferner um den Ort des Bildes als Mittelpunkt eine Kugelfläche vom Radius  $r$  geschlagen, so würde das ultraviolette Licht, wenn es sich ungestört fortpflanzt, von der Kugelfläche nur eine Fläche von der Grösse  $a$  beleuchten. Wäre das Bild aber auf Chinin gefallen, so würde es die ganze Kugelfläche, deren Grösse  $4\pi r^2$  ist, gleichmässig beleuchten. Im ersteren Falle ist das Licht also concentrirter in dem Verhältnisse  $\frac{4\pi r^2}{a}$  im Vergleich zum letzteren Falle, und wenn ein Auge, dessen Pupille ganz in das Strahlenbündel beider Lichtarten eingetaucht ist, sie beide gleich hell sieht, so folgt, dass bei gleicher Verbreitungsweise das Fluorescenzlicht im Verhältniss  $\frac{4\pi r^2}{a}$  heller sein würde. Letzterer Bruch war bei meinem Apparat, nach Anstellung der nöthigen Correctionen, gleich 1200. Daraus folgt also, dass das ultraviolette Licht auf einem Chininschirme aufgefangen etwa 1200 Mal heller erscheinen muss, als wenn es auf einer nicht fluorescirenden matten weissen Fläche von Porzellan aufgefangen wird.

<sup>1</sup> HELMHOLTZ, *Pogg. Ann.* LXXXVI. 501. 1852. — BERNARD, *Ann. de Chim.* XXXV. 385—438. 1852.  
V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik.* 2. Aufl.

Die Fluorescenz der stark fluorescirenden Substanzen kann man in jedem Spectrum leicht beobachten und erkennen. Handelt es sich aber darum die schwächsten Grade der Fluorescenz wahrzunehmen, wie z. B. die der Netzhaut, so kann man den in Fig. 130 dargestellten Apparat mit folgenden Abänderungen benutzen. Man macht das erste Spectrum sehr unrein, indem man den ersten Spalt bei *c* ganz wegnimmt und das Prisma *e* ziemlich nahe an den Schirm *f* heranrückt; dabei läßt man die Grenze des Violet auf dem Schirme *f* gerade dessen weit geöffneten Spalt berühren. Von dem Fernrohr *A* läßt man nur die Objectivlinse stehen, und bringt dann in deren Brennpunkt, wo das ultraviolette Licht am meisten concentrirt und von allem weißen Lichte gereinigt ist, die fraglichen Substanzen. Es giebt kaum irgend welche Stoffe, an denen man unter solchen Umständen nicht Spuren von Fluorescenz wahrnehme. Da bei diesen Versuchen auch das unveränderte ultraviolette Licht noch sichtbar sein kann, so blickt man nach 267 der untersuchten Substanz entweder durch ein gelbes oder grünes Glas (am besten Urnglas), welches das Ultraviolet auslöscht, oder durch ein schwach brechendes Prisma, welches das Ultraviolet von den Farben mittlerer Brechbarkeit trennt. Die Fluorescenz der Linse und der Hornhaut des Auges ist leicht nachzuweisen, wenn man ein lebendes Auge in den Focus ultravioletten Lichts bringt. Die Linse wird so stark beleuchtet, daß man noch viel besser als bei der Beleuchtung mit gewöhnlichem Licht (S. 25–26) ihre Lage dicht hinter der Iris und ihre Form erkennen kann. Die fluorescirende Linse zerstreut natürlich eine große Menge blauweißen Lichts gleichmäßig über den ganzen Hintergrund des Auges. Wenn man dagegen ein ultraviolettes Spectrum betrachtet, sieht man dies sehr scharf und fein gezeichnet. Daher darf man nicht daran denken, daß das überviolette Licht dem Auge etwa wegen der Fluorescenz der Linse sichtbar würde. Letztere könnte nie ein scharf begrenztes Netzhautbild geben.

In derselben Weise wie das Ultraviolet untersucht man das äußerste Roth.

Die Methoden der Wellenmessungen gehören in die physikalische Optik, auf welche ich in dieser Beziehung verweisen muß.

Vor NEWTON's Zeit bestand die Farbentheorie meist aus unbestimmten Hypothesen. Da das aus dem gesammten weißen Lichte ausgeschiedene farbige Licht als Theil notwendig immer geringere Intensität hat als das Ganze, so betrachtete man in älterer Zeit diese Verminderung der Lichtintensität als das Wesentlichste der Farbe, und die Meinung des ARISTOTELES, Farbe entstehe durch die Mischung von Weiß und Schwarz, zählte viele Anhänger. Er selbst ist unschlüssig, ob er diese Vermischung als eine wahre Verschmelzung oder mehr als ein atomistisches Über- oder Nebeneinanderliegen denken soll. Das Dunkel, meint er, müsse durch die Reflexion an den Körpern entstehen, da jede Reflexion das Licht schwäche. Es ist dies die durchgängige Ansicht bis zum Anfange der neueren Zeit z. B. bei MAUROLYCUS, JOH. FLEISCHER, DE DOMINIS, FUNK, NUGER (siehe GOETHE's Geschichte der Farbenlehre), und in neuerer Zeit hat GOETHE<sup>1</sup> sie noch einmal in seiner Farbenlehre zu vertheidigen gesucht. Dieser geht eigentlich nicht darauf aus eine Erklärung der Farbenerscheinungen im physikalischen Sinne zu geben — als solche genommen, würden seine Sätze sinnlos sein —, sondern er sucht nur die Bedingungen allgemein aufzustellen, unter denen Farben entstehen; diese sollen sich in einem „Urphänomen“ deutlich darlegen. Als solches betrachtet er die Farben trüber Medien. Eine große Zahl solcher Medien machen durchgehendes Licht roth, auffallendes läßt sie vor dunklem Hintergrunde blau erscheinen. Während nun GOETHE im Allgemeinen der Ansicht des ARISTOTELES folgt, daß das Licht verdunkelt, oder mit Dunkel gemischt werden müsse, um Farben zu erzeugen, glaubt er in den Erscheinungen der trüben Medien die besondere Art der Verdunkelung gefunden zu haben, welche nicht Grau, sondern Farben erzeuge. Was dadurch am Lichte selbst geändert werde, erklärt er nie. Er spricht wohl davon, daß das trübe Medium dem Lichte etwas Körperliches, Schattiges gebe, wie es zur Erzeugung der Farbe nöthig sei. Wie er sich dies denkt, deutet er nicht näher an. Unmöglich kann er meinen, daß von den Körpern etwas

<sup>1</sup> GOETHE, Beiträge zur Optik. Weimar 1791. 92. — Zur Farbenlehre. 1810.



Körperliches mit dem Lichte davonfliege; und einen andern Sinn könnte es doch kaum haben, wenn es eine physikalische Erklärung sein sollte.

GOETHE betrachtet ferner alle durchsichtigen Körper als schwach trübe, so auch das Prisma, und nimmt an, daß das Prisma dem Bilde, welches es dem Beobachter zeigt, von seiner Trübung etwas mittheile. Er scheint dabei gemeint zu haben, daß das Prisma nie ganz scharfe Bilder entwirft, sondern undeutliche, verwaschene; denn er reiht sie in der Farbenlehre an die Nebenbilder an, welche parallele Glasplatten und Krystalle von Kalkspath zeigen. Verwaschen sind die Bilder des Prisma allerdings im zusammengesetzten Lichte, vollkommen scharf im einfachen, welches GOETHE, wie es scheint, aber nie vor sich gehabt hat, da er die zusammengesetzten Methoden, welche es liefern können, einzuschlagen verschmähte. Betrachte man, meint er, durch das Prisma eine helle Fläche auf dunklem Grunde, so werde das Bild vom Prisma verschoben und getrübt. Der vorangehende Rand desselben werde über den dunklen Grund hinübergeschoben, und erscheine als helles Trübes vor Dunklem blau. Der hinterher folgende Rand der hellen Fläche werde aber von dem vorgeschobenern trüben Bilde des darnach folgenden schwarzen Grundes überdeckt und erscheine als ein Helles hinter einem dunkeln Trüben gelbroth. Warum der vorangehende dunkle Rand vor dem Grunde, der nachbleibende hinter demselben erscheine, und nicht umgekehrt, erklärt er nicht. Auch diese Darstellung der Sache, wenn man sie als physikalische Erklärung fassen wollte, wäre sinnlos. Denn das prismatische Bild, welches in diesen Fällen gesehen wird, ist ein potentiell, also nur der geometrische Ort, in welchem rückwärts verlängert, sich die Lichtstrahlen, welche in das Auge des Beobachters fallen, schneiden würden, und kann also nicht die physikalischen Wirkungen eines trüben Mittels ausüben. Es sind diese GOETHE'schen Darstellungen eben nicht als physikalische Erklärungen, sondern nur als bildliche Versinnlichungen des Vorgangs aufzufassen. Er geht überhaupt in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten darauf aus, das Gebiet der sinnlichen Anschauung nicht zu verlassen, jede physikalische Erklärung muß aber zu den Kräften aufsteigen, und die können natürlich nie Object der sinnlichen Anschauung werden, sondern nur Objecte des begreifenden Verstandes. 268

Die Versuche, welche GOETHE in seiner Farbenlehre angiebt, sind genau beobachtet und lebhaft beschrieben; über ihre Richtigkeit ist kein Streit. Die entscheidenden Versuche mit möglichst gereinigtem einfachen Lichte, auf welche NEWTON's Theorie gegründet ist, scheint er nie nachgemacht oder gesehen zu haben. Seine übermächtig heftige Polemik gegen NEWTON gründet sich mehr darauf, daß dessen Fundamentalthypothesen ihm absurd erscheinen, als daß er etwas Erhebliches gegen seine Versuche oder Schlusfolgerungen einzuwenden hätte. Der Grund aber, weshalb ihm NEWTON's Annahme, das weiße Licht sei aus vielfarbigem zusammengesetzt, so absurd erschien, liegt wieder in seinem künstlerischen Standpunkte, der ihn nöthigte alle Schönheit und Wahrheit unmittelbar in der sinnlichen Anschauung ausgedrückt zu suchen. Die Physiologie der Sinnesempfindungen war damals noch unentwickelt; die Zusammensetzung des Weißen, welche NEWTON behauptete, war der erste entschiedene empirische Schritt zu der Erkenntniß der nur subjectiven Bedeutung der Sinnesempfindungen. Und GOETHE hatte daher ein richtiges Vorgefühl, wenn er diesem ersten Schritte heftig opponirte, welcher den „schönen Schein“ der Sinnesempfindungen zu zerstören drohte.

Das große Aufsehen, welches GOETHE's Farbenlehre in Deutschland machte, beruhte zum Theil darauf, daß das große Publicum, ungeübt in der Strenge wissenschaftlicher Untersuchungen, natürlich mehr geneigt war einer künstlerisch anschaulichen Darstellung des Gegenstandes zu folgen, als mathematisch physikalischen Abstractionen. Dann bemächtigte sich auch die HEGEL'sche Naturphilosophie der GOETHE'schen Farbenlehre für ihre Zwecke. HEGEL wollte ähnlich wie GOETHE in den Naturerscheinungen den unmittelbaren Ausdruck gewisser Ideen oder gewisser Stufen des dialectisch sich entwickelnden Denkens sehen, darin liegt seine Verwandtschaft mit GOETHE und sein principieller Gegensatz gegen die theoretische Physik.

DESCARTES<sup>1</sup> machte bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über die Theorie des Regenbogens eine neue Hypothese, indem er annahm, die Theilchen, aus denen das Licht bestehe, hätten nicht bloß eine geradlinige Bewegung, sondern rotiren auch noch um ihre Axe und von der Rotationsgeschwindigkeit hänge die Farbe ab. Die Rotation und somit auch die Farbe könne übrigens geändert werden durch Einwirkung durchsichtiger Körper. Ähnliche mechanische Vorstellungen bildeten sich HOOKE und DE LA HIRE; letzterer liefs die Farben von der Stärke abhängen, mit der das Licht den Sehnerven trifft.

Endlich bewies NEWTON<sup>2</sup> die Zusammensetzung des weissen Lichts, und schied einfaches Licht aus, zeigte, dafs dies farbig erscheine, dafs dessen Farbe durch Absorption und Brechung nicht weiter verändert werden könne, dafs verschiedenfarbiges Licht verschiedene Brechbarkeit besitze, und dafs die Farben der natürlichen Körper durch verschiedene Absorption und Reflexion der verschiedenartigen Lichtstrahlen entstünden. Übrigens erklärt er die Farbe der Lichtstrahlen schon durchaus aus ihrer Wirkung auf die Netzhaut; nicht die Lichtstrahlen selbst seien roth, sondern sie bewirkten die Empfindung des Roth. Er folgte der Emanationstheorie des Lichtes; Hypothesen über den physikalischen Unterschied der verschiedenfarbigen Lichtarten machte er nicht.

Ziemlich gleichzeitig, 1690, hatte HUYGHENS die Hypothese aufgestellt, dafs das Licht in Undulationen eines feinen elastischen Medium bestehe; diese Hypothese brachte EULER<sup>3</sup> mit NEWTON's Entdeckungen in Verbindung, und folgerte daraus, dafs die einfachen Farben sich durch ihre Schwingungsdauer unterschieden; aber freilich nahm er zuerst an, die rothen machten die schnelleren Schwingungen, und fand erst später das Richtige; HARTLEY stützte diese Ansicht richtig auf die Farben dünner Blättchen. Eine bestimmte Entscheidung darüber wurde erst möglich, als TH. YOUNG und FRESNEL das Princip der Interferenz entdeckt hatten, und durch diese Entdeckung gewann auch erst die Undulationstheorie eine allgemeine Anerkennung.

Gegen NEWTON's Folgerung, dafs die Farbe der Strahlen von der Brechbarkeit abhängen, Strahlen von einem constanten Grade der Brechbarkeit übrigens homogen und von unveränderlicher Farbe seien, trat D. BREWSTER auf. Er meinte beobachtet zu haben, dafs homogenes Licht, wenn es durch farbige Mittel gehe, seine Farbe ändern könne, und meinte auf diese Weise aus homogenem Lichte Weiss ausscheiden zu können. Er schlofs daraus, dafs es dreierlei verschiedene Arten Licht, den drei sogenannten Grundfarben entsprechend, gebe, rothes, gelbes und blaues, und dafs jede dieser Lichtarten Strahlen von jedem Grade der Brechbarkeit innerhalb der Grenzen des Spectrum liefere, aber so, dafs das rothe Licht am rothen Ende, das gelbe in der Mitte, das Blau am blauen Ende überwiege. Farbige Mittel sollten die verschiedenfarbigen Lichter gleicher Brechbarkeit in verschiedener Stärke absorbiren und dadurch von einander trennen können<sup>4</sup>. 269 Gegen BREWSTER opponirten AIRY, DRAPER, MELLONI, HELMHOLTZ<sup>5</sup>, F. BERNARD<sup>6</sup>. Außer einigen Fällen, wo durch Contrastwirkungen der nebenstehenden lebhafteren Farben der Farbenton der durch farbige Gläser sehr geschwächten Strahlen verändert erschien, und anderen Fällen, wo die oben erwähnte Änderung der Farbe mit der Lichtstärke in Betracht kam, rühren die meisten von BREWSTER geltend gemachten Beobachtungen von dem oben schon erwähnten Umstande her, dafs kleine Mengen weissen Lichts durch mehrfache Reflexion an den Oberflächen oder durch diffuse Reflexion in der Substanz der Prismen und der Augenmedien über das Gesichtsfeld zerstreut waren.

Die Vergleichung der einfachen Farben mit den Tönen wurde von NEWTON zuerst angestellt; er verglich aber nur die Breite der Farbstreifen im Spectrum von Gläsern mit den musikalischen Intervallen der phrygischen Tonleiter. Schon LAMBERT

<sup>1</sup> R. CARTESIUS, *de meteoris*. 1637. Cap. VIII.

<sup>2</sup> J. NEWTON, *Philosoph. Transact.* 1675. — *Optics*, London 1704.

<sup>3</sup> L. EULER, *Nova theoria lucis colorum*, in *Opusculis*. Berol. 1746. — *Mém. d. l'Acad. de Berlin*. 1752. p. 271.

<sup>4</sup> D. BREWSTER, *Edinb. Transact.* IX. P. II. p. 433. 1831. — *Ebenda* XII. P. I. 123. *Poggend. Ann.* XXIII. 435.

<sup>5</sup> H. HELMHOLTZ, *Poggend. Ann.* LXXXVI. 501. 1852.

<sup>6</sup> F. BERNARD, *Ann. d. Chim.* (3.) XXXV. 385-438. 1852.

bemerkte, daß in dieser Abtheilung viel Willkürliches wäre, da keine festen Grenzen im Spectrum beständen. Nur soviel sei richtig, daß die Farbenstreifen vom Roth gegen das Violet dergestalt in der Breite anwachsen, daß man nicht sowohl die Summe ihrer Breiten, als die Summe ihrer Verhältnisse zum Maasse derselben nehmen muß, so wie es in der Musik mit den Tönen geschieht. Ähnlich urtheilte DE MAIRAN. Indessen suchte doch Pater CASTEL auf diese Vergleichung ein Farbenclavier zu gründen, welches durch eine gewisse Farbenfolge ähnliche Wirkungen, wie die Musik hervorbringen sollte. HARTLEY, welcher die Unterschiede der Farben auf Schwingungen verschiedener Länge zurückzuführen suchte, gewann dadurch die Möglichkeit einer directeren Vergleichung mit den Schwingungszahlen der Töne. In demselben Sinne bemerkte auch TH. YOUNG, daß der ganze Umfang des damals bekannten Theils des Spectrum einer großen Sexte gleich kommt, daß Roth, Gelb, Blau etwa den Verhältnissen 8 : 7 : 6 entsprechen. Nach dem nun in neuerer Zeit die Größe der Wellenlängen für die verschiedenen Farben namentlich durch FRAUNHOFER's Messungen genauer bekannt geworden ist, hat DROBISCH<sup>1</sup> wieder versucht, die Vergleichung der Farbenscala mit der Tonscala herzustellen. Er vergleicht wie NEWTON die Breite der Farben mit den Intervallen der sogenannten phrygischen Tonart  $1 : \frac{9}{8} : \frac{6}{5} : \frac{4}{3} : \frac{3}{2} : \frac{5}{3} : \frac{16}{9} : 2$ . Da aber das Verhältniß der Wellenlängen für die Grenzen des gewöhnlich sichtbaren Spectrum, wie es FRAUNHOFER ausgemessen hat, kleiner ist als eine Octave, so erhebt er alle jene Verhältnißzahlen in eine Potenz, als deren Exponent er erst  $\frac{2}{3}$ , später  $\frac{6}{7}$  wählte. Dadurch erhält er folgende Tafel, in der die Wellenlängen in Milliontheilen eines Millimeters ausgedrückt sind:

Roth	{ 688,1	Linie B = 687,8
		C = 655,6
Orange	{ 622,0	D = 588,8
	588,6	
Gelb	{ 537,7	E = 526,5
Grün	{ 486,1	F = 485,6
Blau	{ 446,2	G = 429,6
Indigo	{ 420,1	H = 396,3.
Violet	{ 379,8	

Die Grenzen der Farben unter sich stimmen in diesem Schema ziemlich gut mit den natürlichen überein; zweckmäßiger möchte es vielleicht sein statt der kleinen Terz die große zu nehmen, also die ganze Vergleichung auf die Durtonleiter zu bauen, wie DROBISCH auch selbst bemerkt; dann fiel die Grenze des Orange und Gelb, die im obigen Schema im Goldgelb bei D liegt, dem reinen Gelb näher. Aber wenn auch in sofern die Vergleichung stimmt, so vergesse man nicht, daß der ganze Sinn der Vergleichung zwischen Schall- und Lichtwellen schon durch die Erhebung der musikalischen Verhältnisse in eine gebrochene Potenz verloren gegangen ist, daß die Enden des

<sup>1</sup> DROBISCH, Abhandlung der rücks. Gesellsch. der Wiss. Bd. II. Sitzungsberichte derselben Novbr. 1852. -- Poggend. Ann. LXXXVIII. 519–526.

270 Spectrum willkürlich abgebrochen sind, da in der That die schwach wirkenden Endfarben des Spectrum an beiden Seiten viel weiter reichen, daß die NEWTON'sche Abtheilung der 7 Hauptfarben schon willkürlich gemacht und nur der musikalischen Analogien wegen so gewählt ist — Goldgelb verdiente mindestens ebenso gut seinen Platz zwischen Gelb und Orange, wie Indigo zwischen Blau und Violet, ebenso Gelbgrün und Blaugrün, — und daß endlich Grenzen der Farben im Spectrum wirklich nicht existiren, sondern von uns nur der Nomenclatur zu Liebe willkürlich gezogen werden. Ich selbst glaube deshalb, daß diese Vergleichen gar keinen Werth haben.

Endlich hat auch UNGER<sup>1</sup> versucht, auf die Vergleichung der Lichtwellenverhältnisse mit den musikalischen Intervallen eine Theorie der ästhetischen Farbenharmonie zu gründen. In seinen factischen Angaben über die harmonirenden Farben scheint viel Wahres zu sein, was großentheils aus Kunstwerken richtig abstrahirt ist, aber seine Theorie, die Vergleichung mit den musikalischen Verhältnissen, ist etwas gewaltsam erzwungen. Auf seiner chromharmonischen Scheibe hat er Farbentöne zusammengestellt, die den 12 halben Tönen der Octave entsprechen sollen, zu welchem Zweck er aber zwischen Violet und Roth purpurrothe Farben einschaltet, die als einfache Farben nicht existiren. In diese purpurnen Töne läßt er die FRAUNHOFER'schen Linien *G*, *H*, *A* fallen, während die beiden ersteren das reine Violet begrenzen, die letztere dem reinen Roth angehört. Die einfachen Farben, welche über das Violet hinausliegen, sind in Wahrheit blau, nicht purpurroth. Die vollkommenste Harmonie soll dem Duraccord entsprechen. Dieser liefert auf seiner Scheibe z. B. die viel gesehene Zusammenstellung der italienischen Maler: Roth, Grün, Violett. Aber der richtige Duraccord, wenn man Grün als große Terz nimmt, wäre Roth, Grün, Indigblau. Den antiken Malern fehlt ein gutes Roth, sie brauchen Mennige, Orange, dafür und bilden den Accord: Orange, Grünblau, röthlich Violet. Die Mollaccorde geben einen sanfteren und trüberen Eindruck, die verminderten und übermäßigen Dreiklänge geben einen pikanten, weniger künstlerisch reinen Eindruck. Ich glaube, daß man für die richtigen Beobachtungen der Farbenwirkung, die sich bei UNGER finden, statt der erzwungenen musikalischen Analogien einen anderen Grund suchen muß. Die gesättigten Farben bilden in der That eine in sich zurücklaufende Reihe, wenn wir die Lücke zwischen den Enden des Spectrum durch die purpurnen Töne ergänzen, und dem Auge scheint es angenehm zu sein, wenn ihm drei Farben geboten werden, die ungefähr gleichweit in der Reihe auseinanderliegen. Die oben erwähnte berühmte Zusammenstellung der italienischen Maler: Roth, Grün, Violett, welche keinem richtigen Duraccorde entspricht, entspricht in Wirklichkeit den drei Grundfarben von TH. YOUNG, und darin kann der Grund ihrer ästhetischen Wirkung liegen. Andere Farben, in richtiger Distanz von einander gewählt, machen einen ähnlichen befriedigenden Eindruck. Wo zwei derselben sich zu sehr nähern, wird der Eindruck minder rein. Das ist vielleicht die Bedeutung von UNGER's Beobachtungen; übrigens kann offenbar bei der sogenannten Farbenharmonie von einer so strengen Bestimmung wie bei den musikalischen Intervallen nicht die Rede sein.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UNGER, *Disque chromharmonique*. Göttingen 1854. *Poggend. Ann.* LXXXVII. 121—128. C. R. XL. 239.

<sup>2</sup> Eingehendere Auskunft über die bisher angestellten Vergleichen der einfachen Farben mit den Tonintervallen findet man:

1703. I. NEWTON. *Optics*. Lib. I. Pars 2. Prop. 3.  
1725—35. L. B. CASTEL. *Clavierin oculaire* in *Journ. de Trevoux*.  
1737. DE MAIRAN *Mém. de l'Acad. des Sc.* 1737. p. 61.  
1772. LAMBERT. *Farbenpyramide*. Augsburg 1772. § 19.  
1772. HARTLEY in *PRIESTLEY Geschichte der Optik*. S. 549.  
1802. TH. YOUNG *Phil. Transact.* 1802. p. 38.



### § 20. Die zusammengesetzten Farben.

Wir haben gesehen, daßs homogenes Licht von verschiedener Brech- 272  
barkeit und Schwingungsdauer die Empfindung verschiedener Farben in unserem Sehnervenapparate hervorbringt. Wenn nun ein und dieselbe Stelle der Netzhaut gleichzeitig von Licht zweier oder mehrerer verschiedener Grade der Schwingungsdauer getroffen wird, so entstehen neue Arten von Farbenempfindungen, welche im Allgemeinen von denen der einfachen Farben des Spectrum verschieden sind, und welche das Eigenthümliche haben, daßs aus der Empfindung der zusammengesetzten Farbe nicht erkannt werden kann, welche einfache Farben in ihr enthalten sind. Es läßt sich vielmehr im Allgemeinen die Empfindung jeder beliebigen zusammengesetzten Farbe durch mehrere Arten der Zusammensetzung verschiedener Spectralfarben hervorbringen, ohne daßs es auch dem geübtesten Sinnesorgane möglich wäre, ohne Hülfe physikalischer Instrumente zu ermitteln, welche einfache Farben in dem zusammengesetzten Lichte verborgen sind. Es unterscheidet sich dadurch das Auge in seiner Reaction gegen die Ätherschwingungen wesentlich vom Ohre, welches, von Tonwellen verschiedener Schwingungsdauer getroffen, die einzelnen Töne zwar zu einer Gesammtempfindung eines Accords verbindet, aber doch jeden einzelnen einzeln darin wahrnehmen kann, so daßs zwei aus verschiedenen Tönen zusammengesetzte Accorde dem Ohre niemals identisch erscheinen, wie es für das Auge verschiedene Aggregate zusammengesetzter Farben sein können.

Was hier gesagt ist, bezieht sich auf die unmittelbare Sinnesempfindung, und wird keineswegs umgestoßen durch die Erfahrung, daßs uns ein Act des Urtheils zuweilen die Zusammensetzung wenigstens der Hauptsache nach richtig erkennen läßt. Wer einige Erfahrung über die Resultate der Mischung farbigen Lichtes hat, glaubt zuweilen in einer Mischfarbe die einfachen 273  
Farben, welche sie zusammensetzen, wirklich zu sehen, und giebt an, ob mehr von der einen oder anderen darin sei. Indessen wird dann ein Act des auf Erfahrung gegründeten Urtheils mit einem Acte der Empfindung verwechselt. Wenn man z. B. Purpur betrachtet, so kann man wissen, daßs es überwiegend aus Roth und Violet zusammengesetzt sei, und in welchem Verhältnisse beide ungefähr gemischt sind. Aber man kann nicht wissen, ob in der Farbe noch untergeordnete Mengen von Orange oder Blau ent-

- 
1852. DROBISCH. *Abhandl. d. sächsischen Gesellsch. der Wiss.* Bd. II. *Sitzungsberichte derselben.* Novbr. 1852. *Pogg. Ann.* LXXXVIII. 519—526.  
UNGER, *Pogg. Ann.* LXXXVII. 121—128. C. R. XL. 239.  
1854. UNGER, *Disque chromharmonique.* Göttingue.  
1855. H. HELMHOLTZ, *Sitzbr. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin* 1855. S. 760. *Inst.* 1856. p. 222.  
J. J. OPPEL. *Über das optische Analogon der musikalischen Tonarten.* *Jahresber. der Frankf. Vers.* 1854—55. p. 47—55.  
E. CHEVREUL. *Remarques sur les harmonies des couleurs.* C. R. XL. 239 bis 242; *Edinb. Journ.* (2.) I. 166—168.

halten sind. Wäre es die Empfindung und nicht bloß das auf Erfahrung gestützte Urtheil, so müßte man das letztere ebenso gut ermitteln können, als das erstere. Beim Weißen, welches die größte Mannigfaltigkeit der Zusammensetzung zuläßt, wird es Niemandem einfallen, heraussehen zu wollen, welche einfachen Farben darin enthalten sind, ob zwei, oder drei, oder vier, und welche besonderen. Wie leicht aber Täuschung hier möglich ist, zeigt das Grün, in welchem, getäuscht durch die Mischung der Malerfarben, sowohl das Gelb als das Blau zu sehen Männer wie GOETHE und BREWSTER behauptet haben, während jetzt nachgewiesen worden ist, daß Grün aus jenen Farben gar nicht zusammengesetzt werden kann, wenn man nicht Modificationen derselben nimmt, die selbst schon grünlich sind.

Am auffallendsten wird die Täuschung, als könnte man zwei einfache Farben gleichzeitig an demselben Orte sehen, wenn eine Fläche gleichzeitig von zwei verschiedenen Farben erleuchtet wird, aber so daß an einzelnen Stellen die eine, an anderen Stellen die andere überwiegt, namentlich wenn die eine den Grund füllt, die andere darauf eine regelmäßige Zeichnung bildet. Besonders günstig ist es auch, wenn die Zeichnung oder die Flecken ihren Ort wechseln. Dann glauben wir oft die beiden Farben gleichzeitig, die eine gleichsam durch die andere hindurch an demselben Orte zu sehen. Wir verfahren in solchen Fällen ebenso, als sähen wir Objecte durch einen farbigen Schleier, oder von einer farbigen Fläche gespiegelt. Wir haben durch Erfahrung gelernt, uns auch unter solchen Umständen ein richtiges Urtheil über die wahre Farbe des Objectes zu bilden, und dieselbe Scheidung zwischen der Farbe des Grundes und des darauf unregelmäßig verbreiteten Lichts nehmen wir dann auch in allen ähnlichen Fällen im Urtheile vor, wobei uns später zu beschreibende subjective Wirkungen der Nachbilder unterstützen. Will man die Empfindung der Mischfarben ungestört haben, so muß eben das gemischte Licht in dem ganzen Felde, wo es verbreitet ist, gleichmäßig gemischt sein.

In einzelnen Fällen, namentlich wenn zwei Farben, die im Spectrum weit auseinander liegen, ein scharf begrenztes Feld füllen, erkennen wir die Farben an den Rändern mittels der Farbenzerstreuung im Auge<sup>1</sup> von einander gesondert. Auch das giebt natürlich keinen brauchbaren Einwurf gegen den aufgestellten Satz, da in diesem Falle das Auge selbst wie ein Prisma wirkt, und bewirkt, daß verschiedene Theile der Netzhaut von dem verschiedenfarbigen Lichte getroffen werden.

Die Methoden um verschiedenfarbiges Licht zusammenzusetzen, und die Wirkung des zusammengesetzten Lichts auf das Auge zu prüfen, sind die folgenden:

- 274 1) Man bringt verschiedene Spectra oder verschiedene Theile desselben

<sup>1</sup> S. oben S. 158.

Spectrum zum Decken. So erhält man die Zusammensetzungen je zweier einfacher Farben.

2) Man blickt durch eine ebene Glastafel in schräger Richtung nach einer farbigen Fläche, während die dem Beobachter zugekehrte Seite der Glastafel ihm gleichzeitig Licht eines andersfarbigen Objects durch Reflexion zusendet. So gelangt in das Auge des Beobachters gleichzeitig von der Glastafel durchgelassenes Licht der einen und reflectirtes Licht der anderen Farbe, und beide treffen dieselben Theile der Netzhaut. Auf diese Weise kann man namentlich bequem die zusammengesetzten Farben der Naturkörper weiter zusammensetzen.

3) Man läßt auf dem Farbenkreisel Scheiben schnell rotiren, auf denen verschiedenfarbige Sektoren angebracht sind. Ist die Rotation schnell genug, so verbinden sich die Eindrücke, welche die verschiedenen Farben auf der Netzhaut machen, zur Empfindung einer einzigen Farbe, der Mischfarbe.

4) Man betrachtet die Grenze zweier verschiedenfarbiger Felder durch ein doppeltbrechendes Prisma aus Kalkspath, so daß die Doppelbilder der Grenzlinie auseinander geschoben werden. Zwischen diesen beiden Bildern der Grenzlinie erscheint dann die Mischfarbe.

Alle vier Methoden geben in Rücksicht der Farbenmischung gleiche Resultate, ihre Ausführung wird unten specieller beschrieben werden. Nicht angewendet werden darf die Methode der Mischung pulveriger oder flüssiger Pigmente, welche von NEWTON und vielen anderen Physikern als gleichgeltend mit der ersten Methode, der Mischung von Spectralfarben, betrachtet worden ist. Denn der gemischte Farbstoff giebt keineswegs ein Licht, welches die Summe der von den einzelnen, in der Mischung enthaltenen Farbstoffen reflectirten Lichter wäre.

Nehmen wir, um dies deutlich zu machen, zunächst farbige Flüssigkeiten. Das Licht, welches durch sie hindurchgeht, wird durch Absorption gefärbt, d. h. es werden von den verschiedenfarbigen Strahlen des weißen Lichts einige, schon nachdem sie eine kurze Strecke in der Flüssigkeit zurückgelegt haben, so geschwächt, daß sie verschwinden, während andere längere Strecken der Flüssigkeit durchlaufen können, ohne merklich geschwächt zu werden. In dem ausgetretenen Lichte überwiegen die letzteren, und dieses Licht hat also die Farbe derjenigen Strahlen, welche am wenigsten von der Flüssigkeit absorbirt werden. Diese Absorption einzelner Farben des Spectrum kann man nachweisen, wenn man solches Licht, welches durch eine farbige Flüssigkeit (oder farbiges Glas) gegangen ist, nachher ein Prisma passiren läßt, und ein Spectrum bildet. In dem Spectrum fehlt dann eine Reihe von Farben, oder ist sehr schwach, während die Theile des Spectrum, deren Farbe der der Flüssigkeit entspricht, die gewöhnliche Helligkeit haben.

Mischt man nun zwei farbige Flüssigkeiten miteinander, welche sich gegenseitig chemisch nicht verändern, so daß die Absorptionskraft jeder einzelnen für die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen unverändert bleibt, so gehen nur solche Strahlen durch die Mischung, welche von keiner der beiden

Flüssigkeiten absorbirt werden. Das sind gewöhnlich die Strahlen, welche in der prismatischen Reihe in der Mitte liegen zwischen den Farben der beiden gemischten Flüssigkeiten. Die meisten blauen Körper, z. B. die Kupferoxydsalze, lassen die blauen Strahlen ungeschwächt, etwas weniger gut die grünen und violetten, schlecht dagegen die rothen und gelben hindurch. Die gelben Farbstoffe dagegen lassen fast alle das Gelb ungeschwächt, gut auch noch Roth und Grün, schlechter Blau und Violet hindurch. Unter solchen Umständen wird durch eine Mischung einer gelben und blauen Flüssigkeit meistentheils das Grün am besten hindurchgehen, weil die blaue Flüssigkeit die rothen und gelben, die gelbe Flüssigkeit die blauen und violetten Strahlen zurückhält. Es ist eine Wirkung derselben Art, als wenn man Licht durch zwei verschiedenfarbige Glasplatten hinter einander gehen läßt, wodurch es immer viel mehr geschwächt wird, als wenn es durch zwei Platten gleicher Farbe gegangen ist. Aber es ist klar, daß hierbei keine Summation des Lichtes stattfindet, welches jede einzelne Flüssigkeit für sich hindurchläßt, sondern im Gegentheil eine Art von Subtraction, insofern die gelbe Flüssigkeit von den durch die blaue gegangenen Strahlen noch alle die wegnimmt, welche in ihr der Absorption verfallen. Daher sind auch Mischungen farbiger Flüssigkeiten in der Regel viel dunkler als jede einzelne Flüssigkeit für sich.

Bei den pulverigen Farbstoffen verhält es sich ganz ähnlich. Wir müssen jedes einzelne Pulvertheilchen eines Farbstoffes als ein kleines durchsichtiges Körperchen betrachten, welches das Licht durch Absorption färbt. Allerdings ist das Pulver solcher Farbstoffe im Ganzen genommen in hohem Grade undurchsichtig. Indessen wo wir Gelegenheit haben Farbstoffe in zusammenhängenden Massen von gleichmäßig dichter Structur zu sehen, finden wir sie wenigstens in dünnen Blättern durchsichtig. Ich erinnere an den krystallisirten Zinnober, Grünspan, Chromblei, das blaue Kobaltglas u. s. w., welche wir in fein pulverigem Zustande als Farbstoffe benutzen.

Wenn nun Licht auf ein solches aus durchsichtigen Theilen bestehendes Pulver fällt, wird ein kleiner Theil an der oberen Fläche reflectirt, der Rest dringt ein, und wird erst von den tiefer liegenden Begrenzungsflächen der Pulvertheilchen zurückgeworfen. Eine einzelne Tafel von weißem Glase reflectirt von senkrecht einfallendem Lichte  $\frac{1}{25}$ , zwei solche  $\frac{1}{13}$ , eine große Zahl fast alles. Bei Pulver aus weißem Glase müssen wir folglich schließen, daß bei senkrechter Incidenz ebenfalls nur  $\frac{1}{25}$  des auffallenden Lichts von der obersten Schicht reflectirt wird, das übrige von den tieferen Schichten. Ebenso muß es sich für blaues Licht bei blauem Glase verhalten. Es wird also bei farbigen Pulvern stets nur ein sehr kleiner Theil des Lichtes, welches sie geben, von der obersten Schicht reflectirt, bei weitem das meiste aus tieferen Schichten. Das von der obersten Fläche reflectirte Licht ist weiß, wenn die Reflexion nicht eine metallische ist; erst das aus den tieferen Flächen zurückkehrende ist durch Absorption gefärbt, um so tiefer, je länger sein Weg in der Substanz gewesen ist. Daher ist auch gröberes Pulver

desselben Farbstoffs dunkler gefärbt als feineres. Bei der Reflexion kommt es nämlich nur auf die Zahl der Oberflächen an, nicht auf die Dicke der Theilchen. Sind letztere größer, so muß das Licht einen längeren Weg in der Substanz zurücklegen, um die gleiche Menge reflectirender Oberflächen zu treffen, als wenn sie kleiner sind. Die Absorption der absorbirbaren Strahlen ist also in einem groben Pulver stärker, als in einem feineren. Jenes hat eine dunklere und gesättigtere Farbe als letzteres. Die Reflexion an den Oberflächen der Pulvertheilchen wird geschwächt, wenn wir ein flüssiges Verbindungsmittel zwischen sie bringen, dessen Brechungsvermögen dem ihrigen näher steht als das der Luft. Trockene Pulver von Pigmenten sind deshalb in der Regel weißlicher, als wenn sie mit Wasser oder mit dem noch stärker brechenden Öl durchtränkt sind. 276

Wenn nun ein gemischtes farbiges Pulver Licht nur aus der obersten Schicht reflectirte, in welcher Theilchen von beiden Farben gleichmäÙig durch einander liegen, würde das zurückgeworfene Licht wirklich die Summe der Lichter sein, welche die einzelnen ungemischten Pulver geben. Für die größere Menge reflectirten Lichtes aber, welches aus den tieferen Schichten zurückkommt, ist das Verhältniß ebenso wie bei gemischten farbigen Flüssigkeiten, oder hinter einander gelegten farbigen Gläsern. Dieses Licht hat auf seinem Wege Pulvertheilchen von beiderlei Art passiren müssen, und enthält also nur noch diejenigen Lichtstrahlen, welche durch beide Arten von Pulverkörnchen hindurchgehen können. Für den größeren Theil des Lichtes, welches von gemischtem Farbenpulver zurückgeworfen wird, findet also nicht eine Addition beider Farben, sondern in dem Sinne, wie vorher erläutert wurde, eine Subtraction statt. Daher erklärt sich auch die Thatsache, daß die Mischungen von Pigmenten viel dunkler sind, als die einfachen Pigmente, namentlich, wenn ihre Farben weit auseinander liegen. Zinnober und Ultramarin geben z. B. ein Schwarzgrau, welches kaum einen Schein von Violet, der Mischfarbe des rothen und blauen Lichtes, hat, weil das eine Pigment die Strahlen des anderen fast vollständig ausschließt. Bequem kann man diese Unterschiede sichtbar machen, wenn man auf einen Farbenkreis, *Fig. 131*, am Rande Sektoren *a* und *b* mit zwei einfachen Farbstoffen überzieht, in der Mitte *c* aber die Mischung der Farbstoffe selbst aufträgt. So geben Kobaltblau und Chromgelb am Rande, wo sie getrennt aufgetragen sind, und beim Drehen der Scheibe sich der Eindruck ihres farbigen Lichtes erst in der Netzhaut verbindet, weißliches Grau, während ihre materielle Mischung ein viel dunkleres Grün giebt.

Es dürfen also die Resultate der Mischung von Malerfarben durchaus nicht benutzt werden, um daraus Schlüsse auf die Mischung farbigen Lichtes zu machen. So ist z. B. der Satz, daß Gelb und Blau Grün giebt, für die Mischung von Malerfarben ganz richtig, aber fälschlich auf die Mischung farbigen Lichtes übertragen worden.




Fig. 131.



Oggleich nun die Bezeichnungen Farbenmischung und Mischfarbe von der Mischung der Farbstoffe hergenommen sind, so wollen wir sie zunächst auch für die Zusammensetzung farbigen Lichtes beibehalten, auf welche sie nicht ganz rechtmässiger Weise übertragen wurden, machen aber darauf aufmerksam, dafs, wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil gesagt ist, darunter nicht die Mischung von Farbstoffen und deren Resultat verstanden werden darf.

" Wo dies deutlicher hervorgehoben werden soll, können wir diese Zusammensetzung auch als Addition der Farben bezeichnen, was später gerechtfertigt werden soll.

276 Durch die gleichzeitige Einwirkung verschiedener einfacher Farben auf dieselbe Stelle der Netzhaut entsteht nun eine neue Reihe von Farbenempfindungen, welche durch die einfachen Spectralfarben nicht hervorgebracht werden. Diese neuen Empfindungen sind die des Purpurs, des Weifs und der Übergangsstufen des Weifs einerseits in die Spectralfarben und Purpur andererseits.

277 Purpurroth entsteht durch Mischung derjenigen einfachen Farben, welche am Ende des Spectrum stehen. Am gesättigtesten fällt es aus, wenn man Violet und Roth mischt; weifslicher wird es, Rosenroth, wenn man statt des Violet Blau und statt des Roth Orange nimmt. Das Purpurroth, welches durch Carminroth in das Roth des Spectrum übergeht, ist durchaus verschieden von den beiden Farben Roth und Violet, welche an den äufsersten Grenzen des gewöhnlich sichtbaren Spectrum stehen, bildet aber für das Auge einen Übergang zwischen beiden mit continuirlichen Zwischenstufen, so dafs dadurch die Reihe der gesättigten Farben, d. h. derjenigen, welche die wenigste Ähnlichkeit mit Weifs haben, in sich zurücklaufend wird.

Weifs entsteht durch Zusammensetzung verschiedener Paare von einfachen Farben. Farben, welche in einem bestimmten Verhältnisse gemischt Weifs geben, nennt man complementäre Farben. Es sind unter den Spectralfarben complementär:

Roth	und	Grünlich Blau
Orange		Cyanblau
Gelb		Indigblau
Grünlich Gelb		Violet.

Das Grün des Spectrum hat keine einfache Complementärfarbe, sondern nur eine zusammengesetzte, nämlich Purpur.

Um zu ermitteln, ob etwa regelmässige Verhältnisse zwischen den Wellenlängen der einfachen complementären Farben bestehen, habe ich für eine Reihe complementärer Farbenpaare die Wellenlängen bestimmt, und lasse diese Messungen hier folgen. Die Längeneinheit ist ein Milliontheil eines Millimeters.

Farbe.	Wellenlänge.	Complementärfarbe.	Wellenlänge.	Verhältniſſe der Wellenlängen.
Roth	656,2	Grünblau	492,1	1,334
Orange	607,7	Blau	489,7	1,240
Goldgelb	585,3	Blau	485,4	1,206
Goldgelb	573,9	Blau	482,1	1,190
Gelb	567,1	Indigblau	464,5	1,221
Gelb	564,4	Indigblau	461,8	1,222
Grüngelb	563,6	Violet	von 433 ab	1,301

Im Violet mußten seiner Lichtschwäche wegen die äußersten Strahlen von der Wellenlänge 433 ab alle zusammengefaßt werden.

Nach diesen Messungen sind in *Fig. 132* in horizontaler Richtung die Wellenlängen der Farben von 400 bis 700 der obigen Einheiten aufgetragen, in verticaler die der zugehörigen Complementärfarben. Die Curven drücken also die Wellenlänge der Complementärfarbe als Function der Wellenlänge jeder einfachen Farbe aus. Am Rande stehen die Namen der den Wellenlängen entsprechenden Farben. Die wirklich gemessenen Werthe sind durch Kreuzchen bezeichnet.

Diese Curven zeigen eine auffallende Unregelmäßigkeit der Vertheilung <sup>278</sup> der complementären Farben im Spectrum an. Wenn man auf der horizontalen Abscissenlinie vom Violet zum Roth fortschreitet, ändert sich die Wellenlänge der Complementärfarbe zuerst, wie die fast horizontal liegende Curve anzeigt, äußerst langsam. Gelangt man zu den grünlich blauen Farben, so ändert sich jene Länge dagegen außerordentlich schnell, der absteigende Ast der Curve nähert sich einer senkrechten Linie. Das letztere ist ebenso im Gelb der Fall, während am rothen Ende die Änderung wieder äußerst langsam wird. Es hängt dies damit zusammen, daß, wie ich schon im vorigen Paragraphen bemerkt habe, der Farbenton an den Enden des Spectrum sich im Verhältniß zu den Wellenlängen außerordentlich langsam, in der Mitte dagegen sehr schnell ändert. Demgemäß ist denn auch zwischen den Wellenlängen verschiedener Complementärfarben durchaus kein einfaches oder constantes Verhältniß aufzufinden. Es schwankt, wenn man die musikalische




Fig. 132.

Bezeichnungsweise anwendet, zwischen dem der Quarte (1,333) und dem der kleinen Terz (1,20).

Seitdem ich diese Messungen ausgeführt habe, ist noch von vier andern Personen die Reihe ihrer Complementärfarben bestimmt worden, nämlich von den Herrn J. VON KRIES, M. VON FREY<sup>1</sup>, A. KÖNIG und C. DIETERICI<sup>2</sup>. Die Resultate weichen nur unbedeutend von den meinigen ab, doch sind die Unterschiede wohl nicht auf Beobachtungsfehler, sondern auf individuelle Eigenthümlichkeiten der Farbensysteme zu schieben.

Es ergab sich  
bei Herrn VON KRIES:

656,2 $\mu\mu$ complementär zu 492,4 $\mu\mu$		
626.—	"	" 492,2 "
612,3	"	" 489,6 "
599,5	"	" 487,8 "
587,6	"	" 484,7 "
579,7	"	" 478,7 "
577.—	"	" 473,9 "
575,5	"	" 469,3 "
572,9	"	" 464,8 "
571,1	"	" 460,4 "
571.—	"	" 452,1 "
570,4	"	" 440,4 "
570,1	"	" 429,5 "

bei Herrn VON FREY:

656,2 $\mu\mu$ complementär zu 485,2 $\mu\mu$		
626.—	"	" 484,6 "
612,3	"	" 483,6 "
599,5	"	" 481,8 "
587,6	"	" 478,9 "
586,7	"	" 478,7 "
577,7	"	" 473,9 "
572,8	"	" 469,3 "
570,7	"	" 464,8 "
569.—	"	" 460,4 "
568,1	"	" 452,1 "
566,3	"	" 440,4 "
566,4	"	" 429,5 "

<sup>1</sup> M. VON FREY und J. VON KRIES. *Archiv für Anat. und Physiol.* Physiol. Abth. Jahrgang 1881. S. 336. Die in dieser Abhandlung nach einer willkürlichen Scale angegebenen Complementärfarben sind in Wellenlängen umgerechnet worden von A. KÖNIG (Verhdl. der physikal. Gesellschaft in Berlin. Sitzung vom 13. Juni 1884)

<sup>2</sup> A. KÖNIG und C. DIETERICI. *Wied. Ann.* 33. 1887.



bei Herrn A. KÖNIG:

675.—	$\mu\mu$	complementär zu	496,5 $\mu\mu$
663.—	"	"	495,7 "
650.—	"	"	496,7 "
638.—	"	"	495,9 "
615,3	"	"	496.—"
582,6	"	"	483,6 "
578.—	"	"	476,6 "
576.—	"	"	467.—"
574,5	"	"	455.—"
573.—	"	"	450.—"

bei Herrn C. DIETERICI:

670.—	$\mu\mu$	complementär zu	494,3 $\mu\mu$
660.—	"	"	494.—"
650.—	"	"	494,3 "
635.—	"	"	494.—"
626.—	"	"	493,1 "
610.—	"	"	492,2 "
588.—	"	"	485,9 "
585,7	"	"	485,7 "
578.—	"	"	476,6 "
575,6	"	"	470.—"
571,5	"	"	455.—"
571,3	"	"	448.—"
571,4	"	"	442.—"

Ich bemerke übrigens hier noch, daß die Lichtintensitäten zweier 278 complementärer einfacher Farben, welche zusammen gerade Weiß geben, dem Auge durchaus nicht immer gleich hell erscheinen. Nur bei der Mischung von Cyanblau und Orange sind Mengen beider Farben von einer dem Auge ungefähr gleich erscheinenden Lichtmenge nothwendig. Sonst erscheinen Violett, Indigblau und Roth dunkler als die complementären Mengen des dazu gehörigen Grünlichgelb, Gelb oder Grünlichblau. Da, wie sich im nächsten Paragraphen ergeben wird, die Vergleichen der Helligkeit proportionaler Mengen verschiedenfarbigen Lichtes durch das Auge verschieden ausfallen bei verschiedener absoluter Lichtstärke, so lassen sich auch für die Verhältnisse der Helligkeit complementärer Mengen verschiedener Farbenpaare keine bestimmten Zahlen angeben.

Die Spectralfarben haben demnach in Mischungen verschiedene färbende Kraft, sie sind gleichsam Farben von verschiedenem Sättigungsgrade. Violett ist am meisten gesättigt, die anderen folgen ungefähr in folgender Reihe:

Violett  
Indigblau  
Roth    Cyanblau  
Orange   Grün  
Gelb.

279 Endlich haben wir noch die Resultate der Mischung solcher Farben zu untersuchen, welche nicht complementär sind. Darüber läßt sich folgende Regel aufstellen: Wenn man zwei einfache Farben mischt, die im Spectrum weniger von einander entfernt sind, als Complementärfarben, so ist die Mischung eine der zwischenliegenden Farben und zieht im Allgemeinen desto mehr in das Weiße, je größer der Abstand der gemischten Farben ist, wird dagegen desto gesättigter, je kleiner ihr Abstand. Mischt man dagegen zwei Farben, die in der Spectralreihe weiter von einander abstehen, als Complementärfarben, so erhält man Purpur oder solche Farben, die zwischen einer der gemischten und dem entsprechenden Ende des Spectrum liegen. In diesem Falle ist die Mischung desto gesättigter, je größer der Abstand der gemischten Farben im Spectrum ist, sie ist desto weißlicher, je kleiner ihr Abstand ist, vorausgesetzt, daß er immer größer bleibt, als der von zwei Complementärfarben.

22 Die Herren A. KÖNIG und C. DIETERICI<sup>1</sup> haben bei ihren weiter unten zu beschreibenden Versuchen gefunden, daß für die große Majorität der menschlichen Augen an beiden Enden des Spectrum zwei Strecken vorkommen, von ihnen Endstrecken genannt, in denen nur Unterschiede der Helligkeit, nicht solche des Farbentons zu finden sind. Die rothe Endstrecke reicht bis etwa zur Wellenlänge 655, nahe der Linie C, die violette beginnt bei 430, nahe der Linie G. An diese schlossen sich zwei Strecken, Zwischenstrecken genannt, deren Farben vollständig genau durch Mischung der an den Enden dieser Strecken stehenden Farben wiedergegeben werden können. Die weniger brechbare Zwischenstrecke geht vom Roth bis in das Orange, etwa von Wellenlänge 655 bis 630, die brechbarere von 430 bis 475 (Cyanblau). Zwischen den beiden Zwischenstrecken bleibt eine Mittelstrecke übrig von 630 bis 475, deren Farben nicht mehr aus zwei entfernter stehenden gemischt werden können.

279 So geben Gelb und Cyanblau gemischt ein sehr weißliches Grün. Ferner giebt Roth, dessen Complementärfarbe Grünlichblau ist, mit Grün gemischt weißliches Gelb, welches bei wechselnden Mengenverhältnissen der einfachen Farben entweder durch Orange in Roth, oder durch Grünlichgelb in Grün übergehen kann. Orange und Grünlichgelb können gemischt auch reines Gelb geben, welches gesättigter ist, als das aus Roth und Grün erzeugte. Mischen wir dagegen Roth und Cyanblau, so bekommen wir Rosa (weißliches Purpurroth), welches bei verändertem Mischungsverhältnisse in Roth oder durch weißliches Indigblau in Cyanblau übergehen kann. Dagegen giebt Roth mit Indigblau, und noch mehr mit Violet ein gesättigtes Purpurroth.

Die folgende Tabelle zeigt diese Resultate übersichtlich. An der Spitze der verticalen und horizontalen Columnen stehen die einfachen Farben; wo

<sup>1</sup> A. KÖNIG und C. DIETERICI. Sitzungsberichte der Berliner Akad. Sitzung vom 29. Juli 1886. S. 805.

sich die betreffende verticale und horizontale Columnne schneiden, ist die Mischfarbe angegeben, welche übrigens immer bei verändertem Mischungsverhältnisse durch die in der Spectralreihe dazwischenliegenden Farben in jede der beiden einfachen Farben der Mischung übergehen kann.

	Violet	Indigblau	Cyanblau	Blaugrün	Grün	Grüngelb	Gelb
Roth	Purpur	dk. Rosa	wfs. Rosa	Weifs	wfs. Gelb	Goldgelb	Orange
Orange	dk. Rosa	wfs. Rosa	Weifs	wfs. Gelb	Gelb	Gelb	
Gelb	wfs. Rosa	Weiss	wfs. Grün	wfs. Grün	Grüngelb		
Grüngelb	Weiss	wfs. Grün	wfs. Grün	Grün			
Grün	wfs. Blau	Wasserblau	Blaugrün				
Blaugrün	Wasserblau	Wasserblau					
Cyanblau	Indigblau						

dk. = dunkel.  
wfs. = weifslich.

Übrigens zeigt es sich auch bei diesen Mischungen wieder, daß die Spectralfarben einen verschiedenen Sättigungsgrad der Farbe haben. So giebt Roth mit gleich hellem Grün gemischt ein röthliches Orange, Violet mit gleich hellem Grün ein dem Violet nahestehendes Indigblau. Dagegen geben Farben von gleicher Sättigung in gleicher Helligkeit gemischt auch Mischfarben, die von ihren beiden Constituenten ungefähr um gleichviel verschieden sind.

Durch Mischung von mehr als zwei homogenen Lichtern bekommen wir also keine neuen Farbeindrücke mehr, sondern die Zahl derselben ist durch die Mischungen je zweier einfacher Farben schon erschöpft; ja wir haben bei den letzteren Mischungen gefunden, daß die meisten Mischfarben durch verschiedene Paare von einfachen Farben erzeugt werden konnten. Die Mischungen von zusammengesetzten Farben haben im allgemeinen dasselbe Ergebniss, wie die Mischung der ihnen ähnlichen Spectralfarben; nur fällt die Mischung um so weifslicher aus, als die in die Mischung eintretenden Farben selbst schon weifslicher sind als Spectralfarben.

Somit führen alle möglichen Combinationen von Ätherwellensystemen verschiedener Schwingungsdauer nur zu einer verhältnismässig geringen Anzahl verschiedenartiger Erregungszustände des Sehnervenapparats, die sich in verschiedenen Farbenempfindungen zu erkennen geben. Und zwar unterscheiden wir in der Empfindung und demgemäss auch in der Sprache nicht mehr als dreierlei Arten von Unterschieden in dem Aussehen verschieden beleuchteter Theile des Sehfeldes, welche wir bezeichnen können als

1. Unterschiede der Helligkeit,
2. Unterschiede des Farbentons,
3. Unterschiede der Farbensättigung.

Die gesättigtesten objectiven Farben, die wir kennen, sind uns in der Reihe der Spectralfarben gegeben. Die Enden dieser Reihe können wir zusammenschliessen durch das aus Mischung von Roth und Violet entstehende

Purpurroth. Die Unterschiede, welche zwischen den Empfindungen dieser Farben bestehen, bezeichnen wir als solche des Farbentons. Denken wir uns eines dieser gesättigten farbigen Lichter mit mehr oder weniger Weiß gemischt, so bekommen wir Farbeneindrücke, die sich dem des Weiß mehr oder weniger nähern, und als die weniger gesättigten oder weißlicheren  
 280 Abstufungen derselben Farbe zu bezeichnen sind. In der Sprache bezeichnen wir nur selten die weißlicheren Farben durch besondere Namen, wie z. B. weißliches Purpur als rosenroth, weißliches Roth als fleischfarben, sondern setzen, um sie bezeichnen zu können, vor den Namen der Farbe die Zusätze „hell“, „blafs“ oder „weiß“, wie z. B. „hellblau“, „blafsblau“, „weißblau“. eine Reihe von Übergängen aus dem gesättigten Blau in Weiß bezeichnen Betreffs der Bezeichnung weißlicher Farben durch die Vorsetzsilbe „hell“ ist noch zu bemerken, daß diese ihrem Sinne nach eigentlich eine lichtstarke Farbe bezeichnen sollte, und hier der Sprachgebrauch eine lichtstarke Farbe nicht von einer weißlichen unterscheidet, was der im vorigen Paragraphen erwähnten Thatsache entspricht, daß auch dem Auge die lichtstarken gesättigten Farben des Spectrum weißlich, d. h. weniger unterschieden von lichtstarkem Weiß, als die weniger lichtstarken Abstufungen derselben Farbtöne erscheinen.

Unterschiede der Lichtstärke werden von der Sprache nur, insofern dadurch eine Eigenschaft von Körpern angegeben werden soll, als Farben bezeichnet. Mangel des Lichts nennen wir Dunkelheit; einen Körper aber, der kein Licht zurückwirft, wenn solches auf ihn fällt, nennen wir schwarz; einen Körper, welcher alles auffallende Licht diffus reflectirt, nennen wir weiß. Ein Körper, der von allem auffallenden Licht einen gleichen Bruchtheil zurückwirft, ist grau; und einer der Licht gewisser Wellenlängen in stärkerem Verhältniß als das anderer zurückwirft, ist farbig.

281 In diesem Sinne also sind auch Weiß, Grau und Schwarz Farben. Lichtschwache gesättigte Farben unterscheiden wir durch den Zusatz „dunkel“, wie dunkelgrün, dunkelblau; bei äußerst geringer Lichtstärke wenden wir für sie aber auch dieselben Namen an, wie für lichtschwache weißliche Farben, nämlich für lichtschwaches Roth, Gelb, Grün die Namen Rothbraun, Braun und Olivengrün; für überwiegend weißliche Farben von geringer Lichtstärke wählt man dagegen Bezeichnungen wie röthlichgrau, blaugrau u. s. w.

n Bezüglich des Weiß ist wohl zu beachten, daß wir weiß diejenigen Körper nennen, die Licht aller Art, so weit unser Auge es wahrnehmen kann, möglichst vollständig reflectiren. Eben deshalb erscheinen sie bei jeder Art der Beleuchtung mindestens ebenso hell, meist heller, als alle farbigen Körper. Dadurch ist der Begriff des Weiß als Körpereigenschaft in der Wahrnehmung unzweideutig festgestellt; er ist aber zunächst ganz unabhängig von dem Verhältniß, in dem die einzelnen Farben im beleuchtenden Lichte gemischt sind, d. h. von dem Farbenton dieser Mischung. In der

That unterscheiden wir bei jeder Art der Beleuchtung weisse Körper sicher als solche, wenn es auch vorkommen kann, daß wir Körper für weifs halten, die bei Sonnenbeleuchtung besehen uns schwach farbig erscheinen, der vorher gebrauchten künstlichen Beleuchtung ähnlich. So halten wir bei Kerzenbeleuchtung gelegentlich auch gelbliche Papiere oder Zeuge für weifs.

Nun ist die Sonne bei weitem die reichlichste und mächtigste Lichtquelle, die wir kennen, und bei deren Beleuchtung wir am häufigsten und meisten unser Auge brauchen, die auch alle Unterschiede der Färbung am klarsten hervortreten läßt, namentlich nach der Seite der blauen Töne. Wir betrachten daher auch als vorzugsweise weifs die Farbe des vollen Sonnenlichts. Schwache Farbenabweichungen einer andern Lichtquelle von dem Sonnenlicht, oder die kleinen Abweichungen in der Färbung des Tageslichts, die dadurch entstehen, daß dasselbe bald von der Sonne direct, bald vom blauen Himmel, bald von beleuchteten Wolken, bald von dicken grauen Wolkenschichten herrührt, bemerken wir entweder nur bei grösserer Aufmerksamkeit, oder auch wohl gar nicht, wenn wir nicht Gelegenheit haben die verschiedenen Beleuchtungsweisen unmittelbar hinter einander zu sehen. Hierbei wirken auch die Ermüdungsvorgänge im Auge mit, die wir in der Lehre von den Nachbildern weiter unten erörtern werden. Bei stark farbiger Beleuchtung ist aber allerdings die Erinnerung an das viel gesehene Sonnenlicht in unsrem Gedächtniß treu genug, um die bestehende Abweichung der zeitweiligen Beleuchtung zu erkennen.

Wie unsicher und schwankend aber unsre Vorstellung von dem, was wir Weifs nennen, ist, zeigt sich am deutlichsten, sobald wir versuchen Weifs durch Mischung von Spectralfarben herzustellen, wenn dabei jedes andre weisse Licht ausgeschlossen ist. Wenn wir nicht daneben eine Probe von normalem Weifs des Tageslichts vor Augen haben, mit dem wir die gebildete Mischfarbe vergleichen können, so kommen wir nur zu einer groben und schwankenden Annäherung an Weifs.

Es ist meines Erachtens daher ungerechtfertigt, wenn man die grofse Bestimmtheit, welche der Begriff des objectiven Weifs, als Eigenschaft von Körpern, hat, auch auf die Lichtmischung und entsprechende Empfindung Weifs übertragen will. Allerdings können die, welche dies thun, GOETHE als Gewährsmann anführen. Als Körperfarbe ist es durch seine Lichtstärke ausgezeichnet, und als solche mag man es in bildlicher Redeweise als das ungetrübteste und reinste Licht bezeichnen. Aber wenn wir von der Beschaffenheit der objectiven Lichtquellen absehen, so ist bis jetzt noch kein einziges Kennzeichen aufgefunden worden, wodurch unter den verschiedenen Abstufungen weifslicher Farbtöne einer als das normale Weifs eine besonders ausgezeichnete Rolle spielte. Da übrigens die thierischen Organe in der Reihe der Generationen sich ihren am häufigsten eintretenden Aufgaben anpassen, so ist es allerdings nicht auffallend, daß die Farbe des Sonnenlichtes eine centrale, wenn auch nicht gerade bestimmt zu definirende Stellung im Farbensystem einnimmt.



281

Das Schwarz ist eine wirkliche Empfindung d. h. Wahrnehmung eines bestimmten Zustandes unseres Organs, wenn es auch durch Abwesenheit alles Lichts hervorgebracht wird. Wir unterscheiden die Empfindung des Schwarz deutlich von dem Mangel aller Empfindung. Ein Fleck unseres Gesichtsfeldes, von welchem kein Licht in unser Auge fällt, erscheint uns schwarz; aber die Objecte hinter unserem Rücken, von denen auch kein Licht in unser Auge fällt, mögen sie nun dunkel oder hell sein, erscheinen uns nicht schwarz, sondern für sie mangelt alle Empfindung. Bei geschlossenen Augen sind wir uns sehr wohl bewußt, daß das schwarze Gesichtsfeld eine Grenze hat, wir lassen es keineswegs sich bis hinter unseren Rücken erstrecken. Nur diejenigen Theile des Gesichtsfeldes, deren Licht wir wahrnehmen können, wenn solches vorhanden ist, erscheinen schwarz, wenn sie kein Licht aussenden.

Daß Grau identisch sei mit lichtschwachem Weiß, Braun mit lichtschwachem Gelb, Rothbraun mit lichtschwachem Roth, erkennt man am leichtesten durch die prismatische Analyse des Lichts von grauen, blauen oder rothbraunen Körpern, schwerer durch Projection des Lichts von der betreffenden Farbe und Stärke auf einen Schirm, weil wir fortdauernd die Neigung haben zu trennen, was in der Farbe oder dem Aussehen eines Körpers von der Beleuchtung und was von der Eigenthümlichkeit der Körperoberfläche selbst herrührt. Der Versuch muß deshalb so eingerichtet werden, daß der Beobachter verhindert wird zu erkennen, es sei eine besondere Beleuchtung vorhanden. Ein graues Papierblatt, welches im Sonnenschein liegt, kann heller aussehen, als ein weißes, welches im Schatten liegt, während doch das erstere grau, das zweite weiß erscheint; denn wir wissen, daß das weiße Blatt, in den Sonnenschein gelegt, viel heller sein würde, als das graue, welches zur Zeit darin sich befindet. Wenn man aber eine graue Kreisfläche auf weißem Papier anbringt, und durch eine Sammellinse Licht auf sie concentrirt, ohne daß das weiße Papier gleichzeitig mitbeleuchtet wird, so kann man das Grau weißer erscheinen lassen, als das weiße Papier, so daß in diesem Falle sich die Empfindungsqualität durchaus nur als abhängig von der Lichtstärke zeigt.

Ebenso gelang es mir homogenes Goldgelb des Spectrum als Braun erscheinen zu lassen, indem ich mittels einer unten auseinander zu setzenden Methode auf einem weißen unbeleuchteten Schirme ein rechteckiges Feldchen damit beleuchtete, daneben ein größeres Feld des Schirms dagegen mit hellerem weißen Lichte. Roth in derselben Weise angewendet gab Rothbraun, Grün Olivengrün.

282

Berücksichtigen wir also noch die Lichtintensität, so finden wir, der oben gemachten Angabe entsprechend, daß die Qualität eines jeden Farbeindrucks von drei veränderlichen Größen abhängt, nämlich der Lichtstärke, dem Farbentone und seinem Sättigungsgrade. Andere Unterschiede der Qualität des Lichteindrucks existiren nicht. Man kann dieses Resultat in folgender Weise aussprechen:

Der Farbeindruck, den eine gewisse Quantität  $x$  beliebig gemischten Lichtes macht, kann stets auch hervorgebracht werden durch Mischung einer gewissen Quantität  $a$  weissen Lichtes und einer gewissen Quantität  $b$  einer gesättigten Farbe (Spectralfarbe oder Purpur) von bestimmtem Farbentone.

Dieser Satz beschränkt die Menge der verschiedenartigen Farbeindrücke, wenn sie auch noch unendlich groß bleibt, doch auf ein kleineres Maass, als wenn jede mögliche Combination verschiedener einfacher Lichtstrahlen einen besonderen Farbeindruck gäbe. Wollen wir die objective Natur eines gemischten Lichts vollständig bestimmen, so müssen wir angeben, wieviel Licht von jeder Grösse der Wellenlänge darin ist. Da es nun unendlich verschiedene Wellenlängen giebt, ist die physikalische Qualität eines gemischten Lichts nur darzustellen als eine Function von unendlich vielen Unbekannten. Dagegen kann der Eindruck, den beliebig gemischtes Licht auf das Auge macht, immer dargestellt werden als eine Function von nur drei Variablen, die in Zahlen ausgedrückt werden können, nämlich 1) der Quantität gesättigten farbigen Lichts, 2) der Quantität weissen Lichts, die gemischt dieselbe Farbenempfindung geben, 3) der Wellenlänge des farbigen Lichts. Dadurch gewinnen wir auch endlich ein Princip, wonach wir die Farben in eine systematische Ordnung bringen können. Abstrahirt man nämlich zunächst von den Unterschieden der Lichtstärke, so bleiben noch zwei Veränderliche übrig, von denen die Qualität der Farbe abhängt, nämlich der Farbenton und das Verhältniss des farbigen zum weissen Lichte, und wir können uns die Menge der Farben, wie die verschiedenen Werthe einer jeden Grösse, welche von zwei Variablen abhängt, in einer Ebene nach ihren zwei Dimensionen hin ausgebreitet denken. Die Reihe der gesättigten Farben ist in sich zurücklaufend, sie muss also auf einer geschlossenen Curve angebracht werden, für welche NEWTON einen Kreis, *Fig. 133*, wählte. Er selbst brachte auf seinem Farbenkreise nur sieben gesättigte Spectralfarben in Sektoren an, deren Farbenton und Breite er nach einer akustischen Analogie wählte. Für den hier verfolgten Zweck dagegen wären die gesättigten Farben in continuirlichem Übergange längs der Peripherie: und in die Mitte des Kreises Weiss zu setzen, und auf die Verbindungslinien des Mittelpunktes mit den einzelnen Punkten der Peripherie die Übergangsstufen zwischen dem Weiss und der an dem betreffenden Punkte der Peripherie stehenden Farbe anzubringen, so dass die weisslicheren unter ihnen dem Mittelpunkte, die gesättigten der Peripherie näher stehen. So erhielte man eine Farbetafel, die alle möglichen Arten gleich lichtstarker Farben in ihren continuirlichen




Fig. 133.

n

282

Übergängen geordnet darböte. Wollte man auch noch die verschiedenen Grade der Lichtstärke der Körperfarben berücksichtigen, so müßte man, wie LAMBERT es that, noch die dritte Dimension des Raums zu Hülfe nehmen, und zwar kann man die dunkelsten Farben, bei denen die Zahl der unterscheidbaren Töne immer geringer wird, endlich in eine Spitze, dem Schwarz entsprechend, zusammenlaufen lassen. So erhält man eine Farbenpyramide




Fig. 134.

oder einen Farbenkegel. In Fig. 134 sind drei Querschnitte eines solchen Kegels über einander liegend dargestellt. Der größte, der Grundfläche entsprechend, würde dieselbe Farbenvertheilung wie der Farbenkreis Fig. 133 zeigen müssen. Der mittlere, aus der Mitte des Kegels genommen, zeigt am Rande das Rothbraun, Braun, Olivengrün, Graublau und in seiner Mitte Grau, endlich der kleinste, nahe an der Spitze des Kegels genommen, zeigt Schwarz, wie es die Figur anzeigt.

#### Geometrische Darstellung des Farbenmischungsgesetzes.

Das Princip einer solchen Darstellung ist zuerst von J. NEWTON hingestellt worden, obgleich er auf der erwähnten in sieben Sektoren getheilten Farbenscheibe nicht gerade die volle Bedeutung desselben darlegen konnte. Er dachte sich nämlich die zu mischenden Farben durch Gewichte dargestellt, die in die Schwerpunkte der zugehörigen Sektoren eingesetzt wurden. Dann construirte er den gemeinsamen Schwerpunkt dieser Gewichte. Dessen Lage zeigt dann den Farbenton der Mischfarbe an, seine Entfernung vom Mittelpunkt den Grad ihrer Sättigung.

Die physiologischen Voraussetzungen, welche der Ausführbarkeit und Richtigkeit eines solchen Verfahrens zu Grunde liegen, hat Herr H. GRASSMANN herausgesondert und hingestellt. Außer dem schon oben erwähnten Satze, dafs:

- 1) Jede beliebig zusammengesetzte Mischfarbe gleich aussehen müsse, wie die Mischung einer bestimmten gesättigten Farbe mit Weiße, sind dazu noch folgende Sätze nothwendig:
- 2) Wenn von zwei zu vermischenden Lichtern das eine sich stetig ändert, ändert sich auch das Aussehen der Mischung stetig.
- 3) Gleich aussehende Farben gemischt geben gleich aussehende Mischungen.

Wenn wir diese drei Grundsätze annehmen, läßt sich eine Anordnung der Farben in einer Ebene herstellen, welche erlaubt die Mischfarbe durch eine Schwerpunktsconstruction zu finden. Wir wollen eine solche Farben-



tafel, in welcher die Mischfarben nach dem Princip der Schwerpunktsconstructionen gefunden werden, eine geometrische Farbentafel nennen. Da die Lichtquanta verschiedenfarbigen Lichtes keine allgemein gültige quantitative Vergleichung durch das Auge zulassen, so darf man sich bei der Construction einer solchen Tafel vorbehalten die Einheit der Lichtquantität jeder Farbe durch die NEWTON'sche Regel der Farbenmischung selbst festzusetzen. Wenn man drei Farben beliebig wählt, von denen aber keine durch Mischung der beiden anderen erzeugt werden kann, ihnen drei beliebige Orte in der Farbentafel anweist, die nicht in einer geraden Linie liegen, und die Einheiten ihrer Lichtquanta beliebig festsetzt, so ist nachher der Ort und die Einheit des Lichtquantum jeder anderen Farbe in der Farbentafel fest bestimmt.

Construction der Farbentafel. Wenn die drei Farben  $A, B, C$ , von denen man ausgehen will, gewählt, die Einheiten ihrer Lichtmengen und ihre Orte in der Farbentafel bestimmt sind, die wir mit  $a, b$  und  $c$  in *Fig. 135* bezeichnen wollen, so mische man die Quantitäten  $\alpha$  der Farbe  $A$  und  $\beta$  der Farbe  $B$ , und setze die Mischfarbe in den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der Gewichte  $\alpha$  und  $\beta$ , von denen  $\alpha$  im Punkt  $a$  und  $\beta$  im Punkt  $b$  befindlich gedacht wird. Der Schwerpunkt  $d$  liegt in der Verbindungslinie  $ab$  der beiden Gewichte und zwar so daß

$$\alpha \cdot ad = \beta \cdot bd.$$

So liegen denn überhaupt alle Mischfarben von  $A$  und  $B$  auf der Linie  $ab$ . Soll nun mit den Quantitäten  $\alpha$  und  $\beta$  der Farben  $A$  und  $B$  auch noch die Quantität  $\gamma$  der Farbe  $C$  gemischt werden, so können wir erst  $\alpha$  und  $\beta$  wie vorher gemischt denken, die Mischfarbe, deren Quantität mit  $(\alpha + \beta)$  bezeichnet werden muß, in  $d$  eingesetzt, und nun den Schwerpunkt  $e$  der beiden Gewichte  $(\alpha + \beta)$  in  $d$  und  $\gamma$  in  $c$  construiren, welcher in der Linie  $cd$  liegen muß. Hier ist der Ort der gemeinsamen Mischfarbe, deren Quantität  $\varepsilon$  gesetzt werden muß


$$\varepsilon = \alpha + \beta + \gamma.$$

Dadurch ist auch die Einheit des Lichtquantum für diese Farbe bestimmt; diese ist

$$1 = \frac{\varepsilon}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Es ist dabei ersichtlich, daß jede aus den drei Farben  $A, B, C$  mischbare Farbe innerhalb des Dreiecks  $abc$  liegen muß; für jede ist in der angegebenen Weise Ort und Einheit der Lichtmenge zu bestimmen.

Denkt man sich die Orte und Maafseinheiten aller aus den drei Farben  $A, B$  und  $C$  mischbaren Farben bestimmt, so kann man nun auch die Orte und Maafseinheiten der aus  $A, B$  und  $C$  nicht mischbaren Farben bestimmen. Es sei  $M$  eine solche Farbe. Man kann jedenfalls eine so kleine Quantität  $\mu$  dieser Farbe wählen, daß, wenn man sie mit einer der Farben des Dreiecks mischt, die Mischfarbe auch noch innerhalb des Dreiecks liegt. Man mische sie z. B. mit der Quantität  $\varepsilon$  (diese nach der schon festgesetzten Einheit gemessen) der in  $e$  befind-



*Fig. 135.*

lichen Farbe. Denkt man sich die Quantität der Farbe  $M$  anfangs unendlich klein, und stetig steigend bis  $\mu$ , so wird die Mischfarbe anfangs die in  $e$  befindliche Farbe selbst sein, sich nach GRASSMANN's zweitem Grundsatz stetig ändern, d. h. continuirlich in die benachbarten Farben übergehen. Ist die Quantität von  $M$  bis  $\mu$  gewachsen, so möge  $f$  der Ort und  $\varphi$  die Quantität der betreffenden Mischfarbe sein, und  $f$  noch innerhalb des Dreiecks liegen. Gemäß unserer Regel muß erstens sein

$$\varphi = \varepsilon + \mu.$$

Dadurch ist die Quantität  $\mu$  auf die von uns festgesetzten Maasseinheiten zurückgeführt. Zweitens muß  $f$  der Schwerpunkt von  $\mu$  in  $m$  und  $\varepsilon$  in  $e$  sein, d. h. es muß  $m$  in der Verlängerung der Linie  $ef$  liegen, und

$$\frac{mf}{ef} = \frac{\varepsilon}{\mu}.$$

Dadurch ist also auch die Lage und die Maasseinheit der Farbe  $M$  festgesetzt und kann ebenso für alle anderen aus  $A$ ,  $B$  und  $C$  nicht mischbaren Farben bestimmt werden.

285 Beweis der Richtigkeit dieser Construction. Es muß nun gezeigt werden, daß unter Voraussetzung der Richtigkeit von GRASSMANN's Sätzen in einer so construirten Farbentafel, für welche auch die Maasseinheiten der Lichtquantität der verschiedenen Farben in der angegebenen Weise festgesetzt sind, die Mischfarbe zweier beliebigen Farben sich im Schwerpunkte der gemischten Farben vorfindet, und ihr Lichtquantum, nach den festgesetzten Einheiten gemessen, gleich ist der Summe der Quantitäten der gemischten Lichter.

Wenn wir uns die Lage der Massenpunkte  $m_1, m_2, m_3$  u. s. w. durch rechtwinkelige Coordinaten  $x_1, y_1; x_2, y_2; x_3, y_3$  u. s. w. gegeben denken, so sind die Coordinaten  $X$  und  $Y$  des Schwerpunkts gegeben durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} X (m_1 + m_2 + m_3 + \text{etc.}) &= m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \text{etc.} \\ Y (m_1 + m_2 + m_3 + \text{etc.}) &= m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Im Folgenden bezeichnen wir die Coordinaten des mit irgend einem beliebigen Buchstaben  $n$  bezeichneten Punktes mit  $x_n$  und  $y_n$ .

A. Es sollen gemischt werden zwei Farben  $E_0$  und  $E_1$ , welche selbst aus den drei ursprünglich gewählten Farben  $A, B$  und  $C$  gemischt werden können. Es seien die Quantitäten  $\varepsilon_0$  und  $\varepsilon_1$  der Farben  $E_0, E_1$  mischbar aus den Quantitäten  $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$  und beziehlich  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$  der Farben  $A, B, C$ , so ist nach der Constructionsregel, wenn wir mit  $x_0, y_0$  die Coordinaten des Ortes von  $\varepsilon_0$  mit  $x_1, y_1$  die von  $\varepsilon_1$  in der Farbentafel bezeichnen

$$\begin{aligned} x_0 (\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0) &= \alpha_0 x_a + \beta_0 x_b + \gamma_0 x_c \\ x_1 (\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) &= \alpha_1 x_a + \beta_1 x_b + \gamma_1 x_c \\ y_0 (\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0) &= \alpha_0 y_a + \beta_0 y_b + \gamma_0 y_c \\ y_1 (\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) &= \alpha_1 y_a + \beta_1 y_b + \gamma_1 y_c \\ \varepsilon_0 &= \alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 \\ \varepsilon_1 &= \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1. \end{aligned}$$

Nun ist nach dem Grundsatz, daß gleichaussehende Farben gemischt gleichaussehende Mischfarben geben, die Mischfarbe von  $\varepsilon_0$  und  $\varepsilon_1$  dieselbe wie von

$\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$  und  $\alpha_1, \beta_1$  und  $\gamma_1$ ; die Coordinaten  $X$  und  $Y$  des Ortes der letzteren Mischung sind bei der Construction der Farbentafel durch die Gleichungen

$$X(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = (\alpha_0 + \alpha_1)x_a + (\beta_0 + \beta_1)x_b + (\gamma_0 + \gamma_1)x_c$$

$$Y(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = (\alpha_0 + \alpha_1)y_a + (\beta_0 + \beta_1)y_b + (\gamma_0 + \gamma_1)y_c$$

gegeben oder indem man mittels der obigen sechs Gleichungen  $x_a, x_b, x_c$  und  $y_a, y_b$  und  $y_c$  eliminirt

$$X(\epsilon_0 + \epsilon_1) = \epsilon_0 x_0 + \epsilon_1 x_1$$

$$Y(\epsilon_0 + \epsilon_1) = \epsilon_0 y_0 + \epsilon_1 y_1$$

d. h. die Coordinaten  $X, Y$  der Mischfarbe von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  sind dieselben, wie die des Schwerpunkts von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$ .

Die gesammte Lichtquantität  $q$  der Mischung von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  muß wiederum gleich sein der Lichtquantität, welche bei Mischung der gleichaussehenden Quantitäten  $(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0)$  einerseits und  $(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1)$  andererseits entsteht, d. h.

$$q = \alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = \epsilon_0 + \epsilon_1,$$

womit die Richtigkeit der gegebenen Constructionsregel für alle aus  $A, B$  und  $C$  mischbaren Farben auf der in gesagter Weise construirten Farbentafel erwiesen ist.

B. Wenn zwei nicht aus  $A, B$  und  $C$  mischbare Farben  $M_0$  und  $M_1$  gemischt werden sollen. Es seien  $x_0, y_0$  die Coordinaten,  $\mu_0$  die Quantität der Farbe  $M_0$ ,  $x_1$  und  $y_1$  seien die Coordinaten,  $\mu_1$  die Quantität der Farbe  $M_1$ . Es sei der Ort von  $M_0$  in der Farbentafel dadurch gefunden worden, daß die Quantität  $\mu_0$  mit der Quantität  $\epsilon_0$  der im Punkte  $e$  befindlichen Farbe  $E$  gemischt, die Quantität  $q$  der in  $f$  befindlichen Farbe  $F$  gegeben hat, so ist

$$\begin{aligned}\epsilon_0 + \mu_0 &= q \\ q x_f &= \epsilon_0 x_e + \mu_0 x_0 \\ q y_f &= \epsilon_0 y_e + \mu_0 y_0.\end{aligned}$$

Ebenso sei der Ort der Farbe  $M_1$  dadurch gefunden worden, daß  $\mu_1$  gemischt mit der Quantität  $\epsilon_1$  der Farbe  $E$  die Quantität  $\psi$  der im Punkte  $g$  befindlichen Farbe  $G$  gegeben hat. Es ist

$$\begin{aligned}\epsilon_1 + \mu_1 &= \psi \\ \psi x_g &= \epsilon_1 x_e + \mu_1 x_1 \\ \psi y_g &= \epsilon_1 y_e + \mu_1 y_1.\end{aligned}$$

Um den Ort der Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$  in derselben Weise zu bestimmen, mische man diese mit der Quantität  $\epsilon_0 + \epsilon_1$  der Farbe  $E$ . Dies kommt aber nach GRASSMANN's drittem Satze darauf hinaus, daß man die Quantitäten  $q$  und  $\psi$  der Farben  $F$  und  $G$  mischt. Die Coordinaten dieser Mischfarbe seien  $\xi$  und  $v$ , gegeben durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}(q + \psi)\xi &= q x_f + \psi x_g \\ (q + \psi)v &= q y_f + \psi y_g.\end{aligned}$$

Dann sind die Coordinaten  $X$  und  $Y$  der Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$ , deren noch unbestimmte Quantität mit  $\eta$  bezeichnet werde, gegeben durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}(q + \psi)\xi &= (\epsilon_0 + \epsilon_1)x_e + \eta X \\ (q + \psi)v &= (\epsilon_0 + \epsilon_1)y_e + \eta Y \\ q + \psi &= \epsilon_0 + \epsilon_1 + \eta.\end{aligned}$$

Indem man mit Hülfe der früheren Gleichungen hieraus  $g$ ,  $\psi$ ,  $x_e$  und  $y_e$  eliminiert, erhält man:

$$\begin{aligned}\mu_0 x_0 + \mu_1 x_1 &= \eta X \\ \mu_0 y_0 + \mu_1 y_1 &= \eta Y \\ \mu_0 + \mu_1 &= \eta,\end{aligned}$$

wonach die Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$  wirklich, wie verlangt wurde, im Schwerpunkte beider Massen liegt, und ihre Quantität der Summe beider Quantitäten gleich ist.

C. Wenn eine aus  $A$ ,  $B$ ,  $C$  mischbare und eine nicht mischbare Farbe gemischt werden sollen, ist ähnlich zu verfahren, wie im Falle B. Es sei  $\mu_0$  die Menge der aus  $A$ ,  $B$ ,  $C$  nicht mischbaren Farbe und ihre Coordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  seien dadurch gefunden, daß sie mit der Quantität  $\varepsilon_0$  der im Punkte  $E$  stehenden Farbe gemischt, die Quantität  $g$  der in  $F$  stehenden Farbe gegeben habe. Demnach ist

$$\begin{aligned}\mu_0 x_0 + \varepsilon_0 x_e &= g x_f \\ \mu_0 y_0 + \varepsilon_0 y_e &= g y_f \\ \mu_0 + \varepsilon_0 &= g.\end{aligned}$$

Der Ort der Mischfarbe  $\eta$  aus  $\mu_0$  und einer aus  $A$ ,  $B$ ,  $C$  mischbaren Farbe  $\mu_1$  im Punkte  $G$  befindlich, ergibt sich, indem man  $\eta$  mit  $\varepsilon_0$  mischt, und dann nach 287 der gegebenen Constructionsregel weiter verfährt. Da aber  $\eta$  aus  $\mu_0$  und  $\mu_1$  zusammengesetzt ist, kann man auch zuerst  $\mu_0$  und  $\varepsilon_0$  mischen, wobei man nach der Voraussetzung die Quantität  $g$  der in  $F$  stehenden Farbe erhält, und dann  $g$  mit  $\mu_1$ . Der gemeinsame Schwerpunkt beider ist der Ort der Mischfarbe von  $\eta$  und  $\varepsilon_0$ , seine Coordinaten  $\xi$  und  $v$  sind durch folgende Gleichungen gegeben:

$$\begin{aligned}(g + \mu_1) \xi &= g x_f + \mu_1 x_g \\ (g + \mu_1) v &= g y_f + \mu_1 y_g.\end{aligned}$$

Die Coordinaten  $X$  und  $Y$  von  $\eta$  sind nun nach der aufgestellten Constructionsregel zu finden durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned}(g + \mu_1) \xi &= \eta X + \varepsilon_0 x_e \\ (g + \mu_1) v &= \eta Y + \varepsilon_0 y_e \\ g + \mu_1 &= \eta + \varepsilon_0.\end{aligned}$$

woraus schliesslich folgt:

$$\begin{aligned}\eta X &= \mu_0 x_0 + \mu_1 x_g \\ \eta Y &= \mu_0 y_0 + \mu_1 y_g \\ \eta &= \mu_0 + \mu_1,\end{aligned}$$

was zu erweisen war.

Bisher haben wir zur Bestimmung des Ortes der aus  $A$ ,  $B$ ,  $C$  nicht mischbaren Farben immer nur ihre Mischung mit einer einzigen Farbe  $E$  angewendet. Der letzte Satz zeigt aber, daß auch die Anwendung jeder anderen Farbe  $G$  dieselben Bestimmungen der Farbenorte geben würde.

#### Veränderlichkeit der Form der Farbentafel.

Es läßt sich nicht von vorn herein übersehen, welche Gestalt die Curve

haben werde, in welche bei einer solchen Construction die einfachen Farben zu stehen kommen. Diese Curve wird, abgesehen von individuellen Verschiedenheiten der Beobachter, je nach der Wahl der drei Farben, mit denen man die Construction beginnt, und ihrer drei Maafseinheiten, die man willkürlich festsetzt, sehr mannigfach sein können. Eine Maafseinheit muß immer willkürlich bleiben, ebenso die Lage zweier Punkte, in die man zwei der gewählten Farben setzt. Erst von den anderen 4 Stücken hängt dann die Form jener Curve ab. Man kann also noch vier Bedingungen festsetzen, welche sich im allgemeinen durch eine entsprechende Wahl der vier anderen willkürlich gebliebenen Gröfsen werden erfüllen lassen. So würde man z. B. verlangen können, daß in der Farbentafel die Entfernung fünf beliebig gewählter einfacher Farben vom Weiße gleich groß sein solle. Es würde alsdann die Grenzcurve der Farbentafel, welche die einfachen Farben enthält, sich kaum merklich von NEWTON's Kreise unterscheiden, wie er in *Fig. 133* dargestellt ist, nur würde zwischen dem äußersten Roth und Violet die Sehne, welche dort gezeichnet ist, statt des Bogens die Fläche begrenzen müssen, weil das Purpur, welches nur aus den beiden genannten Farben gemischt werden kann, auf der geraden Verbindungslinie beider Farben liegen müßte. Außerdem folgt aus den Principien der Construction, daß jede zwei Complementärfarben an entgegengesetzten Enden eines Durchmessers des Kreises liegen müssen, weil die Mischfarbe Weiße immer in der Verbindungslinie derjenigen Farben liegen muß, aus denen sie gemischt ist. Diese Bedingung ist auch in *Fig. 133* erfüllt.

Was die festzusetzenden Maafseinheiten der Lichtquanta verschiedenfarbigen Lichts betrifft, so würden für diesen Fall, wo man das Farbenfeld durch eine Kreislinie begrenzen läßt, complementäre Mengen der Complementärfarben, d. h. solche Mengen, welche gemischt weiß geben, als gleich groß angesehen werden müssen, weil nach der Voraussetzung ihre Mischfarbe Weiße gleich weit von ihnen entfernt liegt. Der Schwerpunkt zweier Gewichte kann aber nur dann im Mittelpunkte ihrer Verbindungslinie liegen, wenn die Gewichte gleich sind. Ferner würden von anderen nicht complementären Farben solche Mengen als gleich groß angesehen werden, welche mit einer genügenden Quantität ihrer Complementärfarbe vereinigt gleiche Quantitäten Weiße geben. Aus dem, was ich früher über die verschiedene Sättigung der Spectralfarben angeführt habe, geht schon hervor, daß die Quantitäten, welche hier als gleich betrachtet werden, dem Auge durchaus nicht gleich hell erscheinen. Im nächsten Paragraphen indessen wird sich zeigen, daß Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben durch das Auge bei verschiedener absoluter Lichtstärke nicht ganz übereinstimmende Resultate ergiebt, während im Gegentheil, soweit GRASSMANN's Gesetze gelten, eine Festsetzung der Maafseinheiten verschiedener Farben durch die Ergebnisse der Farbenmischung von der absoluten Helligkeit unabhängig sein muß.



Will man dagegen in der Farrentafel als gleich groß solche Quantitäten verschiedenfarbigen Lichts betrachten, welche dem Auge wenigstens innerhalb gewisser Grenzen der Lichtintensität als gleich hell erscheinen, so erhält die Curve der einfachen Farben nach meinen älteren Beobachtungen<sup>1</sup> eine ganz andere Gestalt ähnlich wie in *Fig. 136*. Die ge-




Fig. 136.

sättigten Farben Violett und Roth müssen weiter vom Weiss entfernt sein, als ihre weniger gesättigten Complementärfarben, weil nach dem Urtheile des Auges bei der Mischung von Gelbgrün und Violett zu Weiss die Quantität violetten Lichtes viel kleiner ist, als die des gelbgrünen, und wenn das Weiss

im Schwerpunkte beider liegen soll, die kleinere Quantität Violett an einem größeren Hebelarme wirken muß, als die größere Lichtmenge des Gelbgrün. Übrigens würden auch hier wieder die Spectralfarben an der Peripherie der Curve, das Purpur auf einer Sehne stehen müssen, Complementärfarben an den entgegengesetzten Enden von Sehnen, welche durch den Ort des Weiss gelegt sind, wie bei der kreisförmigen *Fig. 133*.

Die Zurückführung des Farbenmischungsgesetzes auf Schwerpunktsconstructionen wurde zuerst von NEWTON nur als eine Art mathematischen Bildes vorgeschlagen, um die große Menge der Thatsachen dadurch auszudrücken, und er stützte sich nur darauf, daß die Folgerungen aus jener Darstellung qualitativ mit den Erfahrungsthatsachen übereinstimmten, ohne daß er quantitative Prüfungen ausgeführt hätte. Dergleichen quantitative Prüfungen sind in neuerer Zeit zunächst von MAXWELL vorgenommen worden. Er verfertigte sich eine Reihe Kreissectoren von größerem, eine andere von kleinerem Radius, welche mit Pigmenten (Ziunober, hellem Chromgelb, Pariser Grün, Ultramarin, Weiss und Schwarz) überzogen waren, und befestigte dieselben so auf einer rotirenden Scheibe, daß beliebige größere und kleinere Stücke der einzelnen Sectoren sichtbar wurden, und zwar wurde in der Mitte der Scheibe eine andere Zusammenstellung gemacht als am Rande. Die Breite der Sectoren wurde so lange abgeändert, bis beide Farbenmischungen bei schneller Rotation der Scheibe ganz gleich erschienen, dann der Winkel bestimmt, in dem die einzelnen Sectoren sichtbar waren. So lassen sich unzählig viele Farbenzusammenstellungen machen, und das Mischungsgesetz läßt sich an ihnen prüfen. Der Sinn dieser Prüfung läßt sich unserer bisher gewählten Darstellungsweise gemäß folgendermaßen deutlich machen. Man construirt eine Farrentafel, in welcher drei von den Farben der Scheibe, z. B. Roth, Grün und Blau, als Grundfarben be-

<sup>1</sup> In wie weit die Helligkeit und die Unterschiedsempfindlichkeit der Farben in der Farrentafel ausgedrückt werden kann siehe § 21.

trachtet, ihre Helligkeiten gleich der willkürlichen Maafseinheit gesetzt werden. Dann sind bei jedem Mischungsversuche aus diesen drei Farben die angewendeten Helligkeiten derselben gleich dem Bogen ihres Sectors dividirt durch die Kreisperipherie zu setzen. Zuerst wird es möglich sein, aus den drei Farben ein Grau zusammenzusetzen, und gleich zu machen einem aus Schwarz und Weiß zusammengesetzten Grau. Dadurch bestimmt sich die Stelle und Maafseinheit des Weiß in der Farbentafel. Dann wird es möglich sein, aus Roth und Grün einerseits, Gelb, Weiß und Schwarz andererseits zwei gleiche graugelbe Mischungen zu erzeugen, und dadurch nach der oben gegebenen Constructionsregel den Ort und die Maafseinheit des Gelb in der Farbentafel zu bestimmen. Sobald dies geschehen ist, läßt sich durch Construction in der Farbentafel oder Rechnung für jede andere Mischung aus drei von den fünf Farben Roth, Gelb, Grün, Blau, Weiß vollständig berechnen, wie dieselbe aus anderen drei zusammengesetzt werden kann, und dies am Versuche prüfen, so daß jede solche Prüfung eine Prüfung der Principien ist, auf welche die Schwerpunktsconstructionen bei der Farbenmischung gegründet sind. MAXWELL hat die Versuche in guter Übereinstimmung mit dem Gesetze gefunden. Viel empfindlichere und schärfere messende Prüfungen lassen sich mit Hülfe von Spectralfarben ausführen; die Methoden für die praktische Durchführung dieser Messungen werden unten beschrieben werden.

Grundfarben. Wir haben gesehen, daß alle Verschiedenartigkeit des Lichteindrucks als die Function dreier unabhängig veränderlicher Größen betrachtet werden kann, und hatten bisher als solche Veränderlichen 1. die Lichtstärke, 2. den Farbenton und 3. die Sättigung bezeichnet oder auch 1. die Quantität Weiß, 2. die Quantität, 3. die Wellenlänge einer Spectralfarbe. Statt dieser drei Variablen kann man aber auch andere drei einführen, wie dies schon in den gegebenen Constructionsregeln geschah, indem man alle Farben als Mischungen von veränderlichen Quantitäten dreier Farben, der sogenannten drei Grundfarben, betrachtet, zu welchen man früher meistens Roth, Gelb und Blau wählte. Wenn man diese Lehre objectiv auffassen wollte, d. h. behaupten, es gäbe im Spectrum drei objective einfache Farben, durch deren Zusammensetzung man einen gleichen Eindruck auf das Auge hervorbringen könnte, wie durch jedes beliebige andere einfache oder zusammengesetzte Licht, so wäre dies unrichtig. Es giebt keine solche drei einfachen Farben, durch deren Zusammensetzung man auch nur erträglich die zwischenliegenden Farben des Spectrum nachbilden könnte. Die letzteren erscheinen immer viel gesättigter, als die zusammengesetzten Farben. Am wenigsten passen dazu Roth, Gelb und Blau, denn wenn man als Blau eine dem Farbentone des Himmels ähnliche Farbe wählt, und nicht ein dem Grünlichen sich näherndes Blau, so kann man durch Mischung dieser Farben gar kein Grün erhalten; nimmt man ein grünliches Gelb und ein grünliches Blau, so erhält man nur ein sehr weißliches Grün. Diese drei Farben konnten nur so lange gewählt werden, als man, auf die Mischung der Pig-

289

290

mentfarben vertrauend, fälschlich meinte, gelbes und blaues Licht gebe Grün. Erheblich besser geht es, wenn man als Grundfarben Violet, Grün und Roth wählt. Aus Violet und Grün kann man Blau mischen, aber freilich nicht das gesättigte Blau des Spectrum, und aus Grün und Roth kann man ein mattes Gelb zusammensetzen, was sich aber ebenfalls auf den ersten Blick von dem glänzenden Gelb des Spectrum unterscheidet.

Denken wir uns die Farben nach der oben geschilderten Methode in eine Farbentafel eingetragen, so ist aus der dort gegebenen Constructionsregel klar, daß alle Farben, welche aus drei gegebenen zu mischen sind, in dem Dreieck liegen müssen, dessen Ecken mit dem Orte der drei Grundfarben in der Farbentafel zusammenfallen. So würde in dem nebenstehenden




Fig. 137.

Farbenkreise Fig. 137, in welchem die Farben durch ihre Anfangsbuchstaben bezeichnet sind (I = Indigoblau, C = Cyanblau), das Dreieck RCG alle Farben umfassen, welche aus Roth, Cyanblau und Gelb zusammensetzen sind. Dabei fallen wie man sieht zwei große Stücke des Kreises weg, es würde nur sehr weißliches Violett und sehr weißliches Grün herzustellen sein. Wählten wir aber statt Cyanblau die Farbe des blauen Himmels, das Indigoblau, so würde das Grün ganz weg-

fallen. Das Dreieck VRGr enthält die aus Violet, Roth, Grün mischbaren Farben, und würde schon eine größere Zahl der vorhandenen Farben vertreten. Aber wie man in der Figur sieht, fehlen noch immer beträchtliche Fragmente des Kreises, übereinstimmend mit den angeführten Erfahrungen über Mischung von Spectralfarben, aus denen eben folgt, daß die Grenzkurve der Farbentafel eine von den Seiten des Dreiecks merklich abweichende krumme Linie sein müsse.

Die objective Natur dreier Grundfarben hat BREWSTER zu vertheidigen gesucht, indem er behauptete, für jeden Grad der Brechbarkeit der Lichtstrahlen existirten drei verschiedene Arten Licht, rothes, gelbes und blaues, welche nur in verschiedenen Verhältnissen gemischt seien, so daß dadurch die verschiedenen Farben des Spectrum entstünden. Die Spectralfarben seien also noch zusammengesetzt aus dreierlei qualitativ verschiedenen Lichtarten, deren Strahlen aber für jede einzelne einfache Farbe denselben Grad von Brechbarkeit hätten. Durch absorbirende farbige Medien sollte sich nach BREWSTER Licht aller drei Grundfarben in den verschiedenen einfachen Farben nachweisen lassen. Daß diese letztere Behauptung, auf welcher seine ganze Beweisführung ruht, nicht richtig sei, ist schon im vorigen Paragraphen S. 308 besprochen.

NEWTON's Schwerpunktsconstruction, welche wir bisher angewendet haben, ist, wie die besprochene Zerlegung in Grundfarben deutlich erkennen läßt, nur ein



veranschaulichendes Bild für eine viel allgemeiner vorkommende Form des Zusammenwirkens qualitativ unterschiedener Größen, welcher, wie ebenfalls H. GRASSMANN<sup>1</sup> in sehr allgemeiner Weise gezeigt hat, die wesentlichen Kennzeichen der Addition zukommen. Das erste wichtige Beispiel einer additiven Verknüpfung von nicht homogenen Größen war durch GAUSS gegeben worden, indem er den complexen Größen der Algebra geometrischen Sinn unterlegte. In anderer Form erweitert, kehrt dasselbe wieder in der von B. HAMILTON entwickelten Lehre von den Quaternions.

Als Addition kann im allgemeinen jede Art der Verknüpfung physikalischer oder geometrischer Größen bezeichnet werden, deren Ergebnis eindeutig und unabhängig ist von irgend welcher Reihenfolge, in der die zu verknüpfenden Größen sich darbieten, unabhängig auch von der Reihenfolge, in welcher die einzelnen vorgeschriebenen Verknüpfungsacte nach einander ausgeführt werden. Endlich ist bei einer additiven Verknüpfung von Größen zu fordern, daß die Summe ihren Theilen gleichartig sei, d. h. daß über die Gleichheit oder Ungleichheit der Summe mit ihren Theilen oder anderen ähnlichen Summen durch dasselbe Verfahren entschieden werden kann, wie über die Gleichheit oder Ungleichheit der Theile untereinander.<sup>2</sup>

In diesem Sinne ist die Mischung zweier Farben als eine additive Verknüpfung charakterisirt. Über ihre physiologische Gleichheit entscheidet nur das Auge; gleichaussehende Lichtmischungen sind physiologisch als gleiche Farben zu betrachten; in welcher Weise jede derselben aus anders aussehenden Farben vorher zusammengesetzt worden sei, darauf kommt es nicht mehr an. Für das Endergebnis ist es gleichgültig, ob ich Roth zu Blau oder Blau zu Roth setze, wie bei der Addition  $a + b = b + a$ . Es kommt nicht darauf an, ob ich Roth und Grün erst zu Gelb verbinde, und dann dieses oder ein gleich aussehendes Gelb mit Violet zu Weiß verbinde; oder ob ich andererseits ebensoviel Grün und Violet erst zu Blau zusammenfüge, und dann dieses, beziehlich ein gleich aussehendes Blau, mit soviel Roth wie im ersten Falle zu Weiß. Das Resultat ist dasselbe wie bei der Addition

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Endlich sind die Ergebnisse der Verbindung Mischfarben, über deren Gleichheit mit andern Mischfarben oder den ursprünglichen Farben ebenso wieder durch Vergleichung der von ihnen erregten Empfindung, durch das gleiche Aussehen zu entscheiden ist, wie bei allen farbigen Feldern. Die Mischfarbe als Summe ist eine ihren Theilen gleichartige GröÙe.

Alle ursprüngliche Bestimmung von physikalischen und geometrischen Größen beruht nun, wie ich l. c. zu zeigen versucht habe, darauf, daß man additive Verknüpfungsweisen derselben zu finden wisse. Sobald man diese kennt, kann man zwei gleiche Größen derselben Art zusammenfügen, und dadurch eine von doppelter, dreifacher etc. GröÙe herstellen. Man kann dann die Größen durch benannte Zahlen definiren, d. h. man kann sie messen.

Nun giebt es aber Größen, die erst durch mehrfache Bestimmungsstücke vollständig gegeben sind, wie z. B. die geradlinige Strecke, um welche ein Punkt aus

<sup>1</sup> H. GRASSMANN, Die Ausdehnungslehre von 1844. 2. Aufl. Leipzig, 1878. Darin Begriff des Schwerpunkts (Mitte eines Punktsystems) erörtert S. 42–47.

<sup>2</sup> H. v. HELMHOLTZ, „Zahlen und Messen erkenntnisstheoretisch betrachtet“ in: Philosophische Aufsätze, EDUARD ZELLER gewidmet. Leipzig. Fues. 1887.

einer ersten Lage in eine zweite fortbewegt worden ist. Es genügt nicht ihre Länge zu kennen, sondern auch ihre Richtung muß gegeben sein, was durch zwei Winkel, die sie mit bekannten Richtungen macht, geschehen kann; im Ganzen also gehören dazu drei meßbare Größen. Statt dessen kann ich aber auch angeben, wenn ich meinen eigenen Körper als feststehend denke, um wieviel der Punkt nach oben, um wieviel nach rechts, um wie viel nach vorn verschoben sei. Um die neue Lage des Punktes vollständig zu geben, sind drei Bestimmungsstücke nöthig und im Allgemeinen auch genügend. Verschiebe sich der Punkt in einer Ebene, so wären zwei solche Abmessungen nöthig und genügend. Deshalb schreibt man dem Raume drei, der Ebene zwei Dimensionen zu, oder nach der von RIEMANN eingeführten Terminologie ist der Raum eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, die Ebene eine solche von zwei Dimensionen. In diesem Sinne nun sehen wir, daß der Inbegriff aller möglichen Farben einer Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen entspricht, die nur in einem räumlichen Volumen von drei Dimensionen, wie in LAMBERT's Pyramide so anzuordnen wäre, daß jede Farbe ihren besonderen Ort findet, und ähnliche Farben einander um so näher liegen, je ähnlicher sie sind. Dagegen wenn wir uns auf den Inbegriff der Farben von gleichem Lichtquantum beschränken, bilden diese eine Mannigfaltigkeit von zwei Dimensionen, welche man in einer ebenen Farbentafel abbilden kann. Die Gewichte werden in der Farbentafel nur zu Hülfe genommen, um die dritte unabhängige Variable auch für Constructionen in der Ebene ausdrücken zu können. Und die Schwerpunktsconstruction wird hierbei nur deshalb herbeigezogen, weil auch sie ein additiver Proceß in der Ebene ist.

Denn wenn ich zwei Massen  $m_1$  und  $m_2$  in der Ebene habe, und  $x_1 y_1$  die Coordinaten der ersten,  $x_2 y_2$  die der zweiten,  $\xi$  und  $\zeta$  die ihres Schwerpunkts sind, so sind wie schon S. 328 bemerkt, diese zu finden durch die Gleichungen

$$(m_1 + m_2) \cdot \xi = m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2$$

$$(m_1 + m_2) \cdot \zeta = m_1 \cdot y_1 + m_2 \cdot y_2$$

oder wenn wir viele solche Massenpunkte haben und mit  $\Sigma$  die Summe aller entsprechenden Größen bezeichnen

$$\xi \cdot \Sigma(m) = \Sigma(m \cdot x)$$

$$\zeta \cdot \Sigma(m) = \Sigma(m \cdot y)$$

Für das Resultat, den Ort des Schwerpunkts kommt es hierbei also nicht bloß auf die Größe jeder Masse, sondern auch auf ihren Ort in der Tafel an. Ebenso bei den Farben, wenn wir deren besondere Qualität durch den Ort in der Tafel bezeichnen.

Darstellung der Farben durch geometrische Strecken. In NEWTON's Construction wird also nur ein additiver Proceß durch einen andern bildlich dargestellt, in welchem Größen von derselben Anzahl von Dimensionen sich verbinden. Dafür könnte aber jede andre additive Verknüpfung ebenso gewählt werden. Nicht selten erweist es sich als vortheilhaft, nach dem Vorbild von LAMBERT's Farbenpyramide ein rechtwinkliges Coordinatensystem zu benutzen, und die Quanta dreier Grundfarben als Coordinaten  $x, y, z$  längs der drei Axen aufzutragen, und indem wir das rechtwinklige Parallelepipedon, dessen drei Seiten  $x, y, z$  sind, vervollständigen, die dem Nullpunkte des Coordinatensystems gegenüberliegende neuentstehende Ecke als Ort der Mischfarbe anzusehen. Die vom Nullpunkt nach dieser Stelle gezogene gerade Linie würde durch ihre Länge den Lichtwerth, durch ihre Richtung die Art der Farbe anzeigen. Alle aus den drei Grundfarben mischbaren Lichter würden demnach in der einen rechtwinkeligen Ecke des Raumes liegen, die zwischen

Halften der drei Coordinataxen liegt. Wenn wir durch Punkte der welche um gleiche Distanzen  $c$  von dem Nullpunkt entfernt sind, gehen, so schneidet diese die Grenzebenen der rechtwinkligen Ecke in geraden Linien und bildet die Basis einer dreikantigen Pyramide, der Nullpunkt ist; sie entspricht LAMBERT's Farbenpyramide. Die so weit sie in der genannten Ecke liegt, würde die Form eines Dreiecks haben, und von allen den geraden Linien, die von dem gehen und die den verschiedenen Farben entsprechen sollen, geschnitten. Der Schnittpunkt einer dieser Linien mit der Ebene des Dreiecks würde entsprechenden Farbe in diesem anzeigen, und zwar würde die Vereinzelnen Farben darin genau der durch Schwerpunktsconstructionen Ordnung entsprechen. In jeder solchen Ebene würden aber nur die Helligkeit angeordnet sein, welche durch die Summe der Werthe gegeben ist. Die Gleichung der genannten Ebene wäre nämlich

$$x + y + z = c \cdot \sqrt{3}.$$

drei Farben, deren eine die Coordinaten  $x, y, z$  hat, die andere acht werden, so würde bei ihrer Verbindung die Mischfarbe die  $(x + \xi), (y + \eta), (z + \zeta)$  erhalten. In Fig. 138 ist eine solche Helligkeit für zwei Coordinaten dargestellt. Wenn die eine Farbe durch  $oc = q$

dargestellt, und man  $q$  gleich  $c$  von  $a$  aus nach  $b$  so hat die Strecke  $ab$  die Länge  $(x + \xi), (y + \eta)$ , und repräsentirt in Newton's Sinne die geometrische Summe der Strecken  $c$ . Man sieht leicht, dass  $ob$  auch die Diagonale des Parallelogramms ist, von dem die Seiten  $oa$  und  $oc$

Die Art der Vertheilung ist also dieselbe, wie bei der Construction der Resultante aus zwei Componenten.




Fig. 138.

stimmt diese Construction der Resultante mit der des Schwerpunkts.

Die Schnittfläche, die in der Linie  $fg$  (Fig. 138) die Zeichnung schneidet, wird von den Linien  $oa$  und  $oc$  in  $k$  und  $e$  getroffen werden, wobei die Längen  $ok$  gleichzeitig die Gewichtseinheiten der in der Ebene  $fg$  zu construierenden Resultanten stellen sollen. Wie der Schwerpunkt zweier in  $e$  und  $k$  angebrachten Massen sich der Schnittpunkt  $h$  der Resultante  $ob$  zunächst in der geraden durch  $h$  und  $o$  Linie liegen. Dann ergibt sich aus bekannten trigonometrischen Sätzen

$$ao : ab = \sin(oba) : \sin(bok)$$

$$r : q = \sin(hoc) : \sin(hoa).$$

Ferner ist

$$kh : ko = \sin(hoa) : \sin(ohk)$$

$$eh : eo = \sin(eoh) : \sin(ohc)$$

Da  $(kho)$  und  $(eho)$  Nebenwinkel sind, sind ihre Sinus einander gleich. Folglich

$$\frac{eo \cdot kh}{ko \cdot eh} = \frac{\sin(hoa)}{\sin(eoh)} = \frac{r}{r}$$

$$\frac{r}{ko} \cdot kh = \frac{r}{eo} \cdot eh$$

Da die Verhältnisse  $\frac{r}{ko}$  und  $\frac{r}{eo}$  die Lichtmengen, gemessen durch die in der Farbentafel zu brauchenden Gewichtseinheiten darstellen, so entspricht diese letzte Bestimmung des Ortes der Mischfarbe  $h$  in der ebenen Farbentafel ganz der Regel bei den Schwerpunktsconstructionen.

Übrigens gilt dieser letzte Beweis für jede in beliebiger Richtung durch drei Punkte der positiven Coordinataxzen gelegte Schnittebene, welche Dreiecke von sehr verschiedenen Formen darbieten könnte, deren jedes eine mögliche Form der Farbentafel darstellen würde. Wenn man sich die geometrische Farbentafel auf einer elastischen Platte dargestellt dächte, die man in irgend einer beliebig gewählten Richtung gleichmäfsig ausdehnt, würde man eine ähnliche Reihe von Gestaltveränderungen erhalten; doch würde jede dieser Farbentafeln noch richtig bleiben. Wir werden zunächst also noch zu überlegen haben, was das Bleibende in diesen Veränderungen ist.

#### Einfluss der Lichtquellen auf die Farbengleichungen.

Wenn man Farbengleichungen mit Körperfarben herzustellen sucht, wird man bald eine grofse Veränderlichkeit derselben nach der Art der Beleuchtung erkennen. Ja die Unterschiede zwischen Tageslicht und Lampenlicht sind hierbei außerordentlich grofs. Da gefärbte Körper fast ausnahmslos Licht aus sehr breiten Theilen des Spectrum hindurchgehen lassen, hängt die Mischung des von ihnen reflectirten oder durchgelassenen Lichts in hohem Grade von der Mischung des beleuchtenden Lichtes ab und ändert sich mit dieser. Im Allgemeinen senden leuchtende Körper desto mehr blaues und violettes Licht aus, je höher ihre Temperatur ist; die Sonne am meisten. Eben deshalb überwiegen in dem Lichte der gewöhnlichen Flammen die rothen und gelben Strahlen, und sowohl die Substanz des Brennstoffs, wie die Regulirung des Verbrennungsprocesses haben sehr erkennbaren Einfluss auf die relative Lichtstärke der verschiedenen Spectralfarben. Auch das Sonnenlicht, welches die Atmosphäre unter wechselnden meteorologischen Verhältnissen durchzogen hat, ist nicht frei von Veränderungen seiner Mischung.

Eben deshalb ist die bequeme und leicht auszuführende Methode der Mischung auf dem Farbenkreisel wenig brauchbar zu genauen Messungen.

Wendet man dagegen einfaches Licht eines gut gereinigten Spectrum an, so ist man wenigstens sicher, dafs das Licht derselben Wellenlänge immer dieselbe Qualität habe, welche also durch Angabe der Wellenlänge vollständig bestimmt ist. Schwieriger ist es feste Verhältnisse der Lichtmengen verschiedener Spectralfarben herzustellen, festzuhalten und zu definiren. Man kann darin zunächst nur so weit kommen, als es gelingt, eine Lichtquelle unveränderlicher Art festzuhalten.

Dazu kommt, dafs in den prismatischen Spectren, welche hier vorzugsweise gebraucht werden müssen, da sie reiner und lichtstärker sind als die Diffractionsspectra, die Helligkeit der einzelnen Farbenbänder auch von der Breite, welche

dieselben im Spectrum einnehmen, und daher von dem besonderen Dispersionsverhältniß des gebrauchten Glases abhängen.

Weiteren Einfluß in derselben Richtung können absorbirende Mittel, namentlich schwache Färbungen des Glases im Prisma und in den Linsen der Fernröhre haben.

Die brechenden Medien des Auges zeigen merkliche Färbung wohl nur in krankhaften Zuständen. Aber die Färbung des gelben Flecks wirkt auf spectrales Grünblau (nahe der Linie  $F'$ ) sehr deutlich, und wie schon bemerkt, sehen Mischungen, die dieses Blau enthalten, im Fixationspunkte des Sehfeldes anders aus, als in kurzer Entfernung davon.

Unter diesen Umständen ist es wichtig hier diejenigen Bestimmungen anzuzeigen, die unabhängig von Intensitätsmessungen sind.

#### Festhaltung einzelner Farben unter Vermeidung von Intensitätsmessungen.

Zunächst ist zu bemerken, daß jede der Spectralfarben, und alle Mischungen innerhalb der beiden Endstrecken des Spectrum, welche gleichaussehend sind, wie gewisse Spectralfarben, durch die Wellenlängen dieser letzteren definiert werden können.

Für Mischungen, welche merklich weißlicher sind als die entsprechenden Farbentöne des Spectrum, ist es dagegen immer möglich verschiedene Farbenpaare anzugeben, aus denen sie gleichaussehend hergestellt werden können. Denn da die ganze Reihe von Mischfarben, welche aus zwei bestimmten Spectralfarben zusammengesetzt werden können, in einer geraden Linie der Farbentafel liegt, so kann eine Farbe, die gleichaussehend aus zwei verschiedenen Paaren von Spectralfarben gemischt werden kann, nur im Schnittpunkte der beiden geraden Linien liegen, welche in der Farbentafel die Orte der beiden je zu einem Paar zugehörigen Spectralfarben verbindet. Zugleich ergibt sich daraus, daß nur eine einzige solche Farbe existiren kann, da sich zwei gerade Linien nur in einem Punkte schneiden. Durch die angegebene Bestimmung ist also die betreffende Farbe unzweideutig bestimmt.

So kann man also zum Beispiel die Angaben über die complementären Farben verschiedener Beobachter auf S. 317—319, ansehen als Definitionen desjenigen Weißs, welches jene Beobachter ihren Bestimmungen zu Grunde gelegt haben.

Auf diese Weise wird also ein Beobachter das Weiß eines bestimmten Tageslichts auch durch Gaslicht wieder herstellen können.

Es ist ferner zu bemerken, daß wenn man zwei Farbenpaare  $a_1, a_2$  und  $b_1, b_2$  und noch eine Farbe  $c_1$  aus dem Spectrum als gegeben ansieht, die sechste Spectralfarbe  $c_2$ , welche mit  $c_1$  dieselbe Mischfarbe bilden kann, wie  $a_1$  mit  $a_2$  einerseits, und  $b_1$  mit  $b_2$  andererseits, fest bestimmt wäre. Sie müßte in der Farbentafel da liegen, wo die von  $c_1$  aus durch den Ort der gemeinsamen Mischfarbe von  $a_1$  und  $a_2$ , beziehlich  $b_1$  und  $b_2$  gezogene gerade Linie die Spectralcurve schneidet.


Es wären dies Beziehungen zwischen den Farben, welche unabhängig von ihren Helligkeitsverhältnissen in der betreffenden Lichtquelle bestehen müssen. Eben deshalb wären sie auch unabhängig von der Einschaltung schwach gefärbter Medien zwischen Lichtquelle und Auge oder im Auge selbst, da solche nichts weiter bewirken, als die Helligkeitsverhältnisse zwischen den einzelnen Farben des Spectrum zu verändern.

Andrerseits wären solche Messungen auch sehr geeignet Änderungen der objectiven Lichtintensität verschiedener Theile des Spectrum erkennen zu lassen; denn sobald solche einträten, würde das Mengenverhältniß der beiden Componenten beider Paare geändert werden müssen.

#### Curve der Spectralfarben.

Wenn man die Curve der Spectralfarben in der Farbebene darzustellen sucht, so lassen die oben S. 320 gegebenen Versuchsergebnisse schon erkennen, daß diese einen offenen Bogen darstellen wird, der in beiden Zwischenstrecken sich einer geraden Linie eng annähert, während in der Mitte eine gekrümmte Mittelstrecke bleibt, und die Endstrecken sich in einen Punkt zusammenziehen.

Ich gebe in *Fig. 139* eine von den Herren A. KÖNIG und C. DIETERICH nach ihren gemeinschaftlich ausgeführten Messungen construierte Tafel,<sup>1</sup> in der die Buchstaben *A* bis *H*, sowie *a* und *b* die entsprechenden FRAUNHOFER'schen Linien bezeichnen. Die Farben jenseits *B* im äußersten Roth und jenseits *G* im Violet fallen in die Endpunkte der Curve zusammen, während andererseits die Farben zwischen *C* und *E*, und noch mehr die im bläulichen Grün zwischen *b* und *F* sich sehr weit auseinanderziehen. In der That liegen hier (S. 317) die Stellen des Spectrum, wo der Farbenton sich sehr schnell ändert. Die rothe Zwischenstrecke reicht von dem Endpunkte bis etwa zur Mitte zwischen *C* und *D*, die violette umfaßt das geradlinige umgeknickte Ende der Curve. Der Knick könnte wohl davon herrühren, daß sich hier bläulichweiße Fluorescenz der Netzhaut zu dem unmittelbaren Einfluß des Lichtes gesellt, und die violetten Farben sich deshalb in der Richtung gegen das Weiß hin verschoben haben.



*Fig. 139*

<sup>1</sup> A. KÖNIG. *Rep. of the British Assoc.* Birmingham 1886. pag. 431. — *Naturwiss. Rundschau* Jahrg. II. 1886. S. 457.

Es sind zwei Dreiecke um diese Curve gelegt worden, das eine gleichseitige mit ausgezogenen Seiten beruht auf einem Versuche der Herren KÖNIG und DIETERICI, die physiologischen Grundfarben durch Vergleichung der normalen Augen mit den farbenblinden zu finden, wovon später mehr. Das andre punktirt sucht die Spectralcurve möglichst eng zu umschließen, wobei die Abweichung im Violet als verursacht durch die Fluorescenz angesehen wird. Die Ecken dieses Dreiecks  $B$ ,  $K$ ,  $V$  entfernen sich am wenigsten von den Spectralfarben. Das darin vorkommende Grün im Punkte  $K$  würde im Farbenton den Magnesiumlinien  $b$  im Sonnenspectrum entsprechen, müßte aber etwas gesättigter sein.

#### Allgemeine theoretische Erörterungen.

Jede Art additiver Verknüpfung irgend welcher natürlicher Größen, welche aufgefunden worden ist, kann unmittelbar zur Grundlage eines Messungssystems dieser Größen gemacht werden; so auch das Gesetz der Farbenmischung. Haben wir es mit Größen aus einer Mannigfaltigkeit von einer Dimension zu thun, so genügt es dann eine bestimmte Größe dieser Art als die Maasseinheit zu wählen. Wie groß wir sie wählen, ist der Regel nach willkürlich. Wenn aber die betreffenden Größen einem Gebiete von drei Dimensionen angehören, so haben wir im allgemeinen drei willkürliche Einheiten zu wählen nicht nur der Größe nach, sondern auch der Qualität nach. Auch in den Raummessungen ist nicht nur die gewählte Längeneinheit willkürlich, sondern auch die drei Richtungen der Coordinaten, auf welche wir alle andern Lagenbestimmungen beziehen wollen. Da wir jedoch in diesem Falle denselben Längenmaassstab an jede der Coordinatenrichtungen anlegen können, so können wir wenigstens dieselbe Längeneinheit nach allen Richtungen hin zu Grunde legen. Im Farbensystem haben wir ebenfalls eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, und müssen daher drei Einheiten willkürlich wählen. Die Willkürlichkeit der gewählten Ausgangsfarben entspricht hier der Willkürlichkeit der Coordinaten-Richtung des Raumes. Über die Möglichkeit, die Quanta der drei verschiedenen Lichter auf ein gemeinsames Grundmaass zurückzuführen, werden wir im nächsten Paragraphen zu verhandeln haben. Es sind zunächst auch hier, wie bei den Raumcoordinaten, nebensächliche Verhältnisse oder auch hypothetische Ansichten, die uns die Wahl des einen oder andern Coordinatensystems bevorzugen lassen.

Wenn wir nun die Grundfarben und ihre quantitativen Einheiten  $R$ ,  $G$ ,  $V$  gewählt haben, dann kann der physiologische Eindruck jeder andern Farbe  $F$  dadurch vollkommen beschrieben werden, daß wir sagen, sie sehe so aus, wie eine Vereinigung von so und so viel Einheiten  $R$ ,  $G$  und  $V$ . Also wenn wir mit  $x$ ,  $y$ ,  $z$  Zahlen bezeichnen

$$F = x \cdot R + y \cdot G + z \cdot V.$$

Wir erreichen dadurch zunächst ebenso viel, als wenn wir die Länge eines Stabes uns oder Andern dadurch bezeichnen, daß wir dieselbe in Centimetern ausdrücken.

Was aber hier verglichen und messend bestimmt wird, ist eine physiologische Wirkung des Lichtes auf das Auge, welche überdies noch beeinflusst wird durch allerlei individuelle und physiologische Verhältnisse, die theils schon besprochen sind, theils später noch besprochen werden sollen. Die objectiven Lichtmengen kommen hier nur als Empfindungsreize in Betracht, und haben als solche einen physikalisch meßbaren Werth. Wenn wir also z. B., was zunächst noch willkürlich



ist, als Grundfarbe gewisse Quanta Roth, Grün, Violet mit den Einheiten  $R$ ,  $G$ ,  $V$  gewählt haben und für gemischtes farbiges Licht  $F$  die Farbengleichung

$$F = x \cdot R + y \cdot G + z \cdot V$$

hätten, so wäre  $x$  der Rothwerth,  $y$  der Grünwerth,  $z$  der Violetwerth des Lichtes  $F$  zu nennen.

Es folgt nun aber daraus auch weiter, daß es in der Empfindung des Auges drei entsprechende Arten der Thätigkeit geben muß, die, ohne sich gegenseitig zu stören, neben einander bestehen können, und von denen alle Verschiedenheit der Farbenempfindung abhängt.

Nehmen wir an, es sei irgend ein Verfahren gefunden, sei es innere Beobachtung, die z. B. Herr E. HERING dazu für brauchbar hält, oder irgend ein anderes, um drei meßbare Größen  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  zu bestimmen, die zusammengenommen die Art der Empfindung des Auges vollständig definiren: so würde jedenfalls durch Beobachtung ermittelt werden können, wie die Werthe dieser Größen  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  abhängen von den Werthen  $x$ ,  $y$ ,  $z$  des einfallenden Lichts. Es würden also einmal  $\varphi$ ,  $\psi$  und  $\chi$  als drei Functionen der  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , wie auch umgekehrt  $x$ ,  $y$ ,  $z$  als Functionen der  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  dargestellt werden können. Da keine zwei verschiedene Werthegruppen der  $x$ ,  $y$ ,  $z$  dieselbe Empfindung, d. h. dieselben Werthe der  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  geben, so müssen die  $x$ ,  $y$ ,  $z$  auch eindeutig durch die  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  ausgedrückt werden können. Diese die Werthe der  $x$ ,  $y$ ,  $z$  darstellenden Functionen der  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  wären also Größen, die nur von den Eigenthümlichkeiten der Empfindung abhängen und durch die Art der Empfindung bestimmt wären, denen andererseits eine gewisse Selbständigkeit der Existenz zukäme, da jede neben beiden andern, und ungestört durch die andern im Nervenapparate erregt werden, bestehen und wieder verschwinden könnte. Dieses ungestörte neben einander Bestehen ist es aber gerade, was wir verlangen müssen, wenn wir von Elementen oder Bestandtheilen der Empfindung reden sollen. Wenn wir also die  $x$  darstellende Function von  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  mit  $r$ , entsprechend die beiden andern mit  $g$ ,  $v$  bezeichnen, so wären diese Größen  $r$ ,  $g$ ,  $v$  in der That als Elemente der Farbenempfindung zu bezeichnen. Aber auch allen additiven Aggregaten ersten Grades von der Form  $(a \cdot r + b \cdot g + c \cdot v)$ , worin  $a$ ,  $b$ ,  $c$  Zahlen sind — positive, oder soweit das einen Sinn haben sollte, auch negative — würden dieselbe Art ungestörten Nebeneinanderbestehens zeigen können. Welche von solchen linearen Functionen der  $r$ ,  $g$ ,  $v$  wir am zweckmäßigsten als Elemente wählen, bleibt zunächst noch unentschieden.

Andererseits aber giebt es keine anderen als diese linearen Functionen der  $r$ ,  $g$ ,  $v$ , welche, wenn zwei Lichter mit den Farbenwerthen  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  zusammenkommen, sich einfach addiren, und die dementsprechend als Elemente der Farbenempfindung angesehen werden könnten. Natürlich schließt dies nicht aus, daß andere Wirkungen im Bereich der Gesichtsempfindungen zu Stande kommen, die in verwickelterer Weise von den  $x$ ,  $y$ ,  $z$  abhängen. Eine solche Wirkung werden wir in der Unterschiedsempfindlichkeit des Auges und der nach dieser bestimmten Intensität der Empfindung kennen lernen. Aber solche Größen, für welche nicht die Möglichkeit auch quantitativ ungestörten Nebeneinanderbestehens erwiesen ist, werden wir, wenn wir genau reden wollen, auch nicht Elemente der Empfindung nennen dürfen.

Da die Verkennung dieses Satzes große Verwirrung in der Farbenlehre angerichtet hat, erlaube ich mir, seinen verhältnismäßig einfachen analytischen Beweis hierher zu setzen.



Die Frage ist also, ob es irgend eine Function  $F$  der Größen  $x, y, z$  geben könne, welche addirt zu derselben Function andrer Werthe  $\xi, \eta, \zeta$  derselben Variablen, eine Function von  $(x + \xi), (y + \eta), (z + \zeta)$  gäbe. Es fragt sich also, unter welchen Bedingungen eine Gleichung

$$F(x + \xi), (y + \eta), (z + \zeta) = Fx, y, z + F\xi, \eta, \zeta$$

für beliebig wechselnde Werthe der Variablen bestehen könne.

Wenn sie für einen gegebenen Werth von  $x$  besteht, und auch für einen unendlich wenig davon verschiedenen bestehen soll, so muß die Gleichung nach  $x$  differentiirt wieder eine für alle Werthe der Variablen gültige Gleichung geben.

$$\frac{dF(x + \xi)}{d(x + \xi)} = \frac{dFx}{dx}$$

Die Function  $F(\xi)$ , welche von  $x$  nicht abhängig ist, fällt dabei fort. Differentiirt man die letzte Gleichung ebenso, sei es nach  $\xi$  oder nach  $\eta$  oder nach  $\zeta$ , so fällt auch die zweite Function, die von den  $x$  allein abhängt, weg, und es ergibt sich, daß sämtliche zweiten Differentialquotienten der Function  $F(x + \xi)$  nach irgend welchen ihrer Variablen  $(x + \xi), (y + \eta)$  oder  $(z + \zeta)$  genommen gleich Null sind.

Wenn aber für eine Function von  $x, y, z$  gleichzeitig

$$\frac{d^2 F}{dx^2} = 0, \quad \frac{d^2 F}{dx \cdot dy} = 0, \quad \frac{d^2 F}{dx \cdot dz} = 0,$$

so folgt aus diesen Gleichungen nach einander, daß  $\frac{dF}{dx}$  weder von  $x$ , noch von  $y$ , noch von  $z$  abhängig, also eine Constante sei. Dasselbe folgt für  $\frac{dF}{dy}$  und  $\frac{dF}{dz}$ . Daraus folgt schließlich in bekannter Weise, daß  $F$  nur die Form haben könne

$$F = ax + by + cz,$$

wo  $a, b, c$  von den  $x, y, z$  unabhängig sind.

Im ganzen ist aus diesen Erörterungen also zu schließen,

1. daß in irgend einem Abschnitte der leitenden Nervensubstanz unter dem Einflusse farbigen Lichts drei verschiedene, von einander unabhängige und sich gegenseitig nicht störende Elementarthatigkeiten zu Stande kommen; wir wollen sie die Elementarerregungen nennen. Ihre Größe ist den entsprechenden Farbenwerthen  $x, y, z$  des objectiven Lichts direct proportional; sie entsprechen den  $r, g, v$  der obigen Darstellung.

2. daß alle weiter nach dem Gehirn hin auftretenden Thatigkeiten, auch die eigentlich zum Bewußtsein gelangenden Empfindungen bei gegebenem Zustande der reagirenden Hirntheile nur Wirkungen, und der Größe nach Functionen  $q, \psi, \chi$  der drei Elementarerregungen  $r, g, v$  sind.

3. daß entweder die Elementarerregungen selbst oder drei von ihnen abhängige, sich gegenseitig nicht störende Wirkungen derselben getrennt dem Centralorgan zugeleitet werden.

Über diese weiteren Thatigkeiten in den tieferen Organen wissen wir nun nichts mit Sicherheit. Gewisse Anhaltspunkte wird uns die Untersuchung der erkennbaren Unterschiede und der Nachwirkungen der Empfindung geben.

Selbstverständlich ist, da wir es in diesem ganzen Gebiete immer nur mit Wirkungen des objectiven Lichtes auf Organe des lebenden Körpers zu thun haben, daß die physiologischen Zustände dieser Organe, die Änderungen ihrer Reizbarkeit, wie sie in der Physiologie bezeichnet werden, Einfluß auf die Größe und Art der Wirkung haben, und somit die Abhängigkeit zwischen den  $q, \psi, \chi$

einerseits und den  $x, y, z$  andererseits beeinflussen, so daß in die Gleichungen, welche diese Abhängigkeit ausdrücken, noch andere veränderliche, von den Zuständen der Organe, aber nicht von dem zur Zeit einfallenden Lichte abhängige Größen eingehen. Diese würden also dann auch in die durch  $\varphi, \psi, \chi$  ausgedrückten Werthe der  $r, g, v$  eintreten und eine gewisse Veränderlichkeit in der GröÙe oder Art der elementaren Vorgänge anzeigen. Änderungen in der GröÙe sind in der That bekannt, und werden in der Lehre von den Nachbildern besprochen werden.

Ferner ist zunächst kein Grund da anzunehmen, daß wir diese so bestimmten Elemente der Empfindung durch einen unmittelbaren Act des Bewußtseins sollten von einander scheiden können, um sie unmittelbar als Elemente zu erkennen. Der Regel nach heften wir unsre Aufmerksamkeit nur auf solche Unterschiede der Empfindungen, welche in regelmäÙiger Weise mit gewissen objectiven Verhältnissen der uns umgebenden Natur zusammenhängen. Betreffs der Farben ist das Hauptziel unsrer Aufmerksamkeit die richtige Abschätzung der Körperfarben. Darin erlangen wir in der That groÙe Sicherheit, während schon besondere Einübung oder günstige Bedingungen für die Beobachtung dazu gehören, die Veränderungen der Körperfarben durch Luftfarben, durch die Beleuchtung, durch Contraste sicher aufzufassen. Im Gebiete der Körperfarben hat nun in der That das Weiß eine hervorragende Stellung; weißliche Farben werden am meisten gesehen. Sie bilden den Mittelpunkt der ganzen Farbenwelt, und was nicht weiß ist, erscheint nur als Abweichung von Weiß. Wir schätzen es nach der GröÙe dieser Abweichung (Sättigung) und ihrer Richtung (Farbenton). Diese Verhältnisse sind es auch, wie schon bemerkt, die wir in der Sprache festzulegen suchen. Dabei ist im ganzen darauf zu rechnen, daß die Sprache ungefähr gleich deutlich für die unmittelbare Empfindung hervortretende Unterschiede durch besondere Namen zu unterscheiden suchen wird.

Immerhin ist es beachtenswerth, daß dieses nur zur Bezeichnung der unmittelbar wahrzunehmenden Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Farben ausgearbeitete System von Namen, wenigstens in seinen Hauptzügen, mit der in der Farrentafel oder der Farbenpyramide dargestellten Anordnung der Farben übereinstimmt, woraus es einigermaßen wahrscheinlich wird, daß die bewußtwerdenden Empfindungen selbst verhältnismäÙig wenig verwickelten oder veränderten Functionen gewisser Elementarerregungen entsprechen.

Andre Forscher freilich, wie E. HERING und C. DONDERS nehmen an, daß hier neue Combinationen aus den Elementarerregungen entstehen, die unabhängig neben einander in das Bewußtsein treten und als gesondert unterschieden werden.

Hypothesen. Die aus dem Farbenmischungsgesetze zu erschließende Thatsache, daß drei von einander unabhängig verlaufende Empfindungscomponenten durch die äußere Reizung hervorgerufen werden, haben ihren bestimmteren und anschaulicheren Ausdruck in den Hypothesen erhalten, welche annehmen, daß diese verschiedenen Componenten der Empfindung in verschiedenen Theilen des Sehnervenapparats erregt und fortgeleitet werden, dann aber gleichzeitig zur Wahrnehmung gelangen und dabei, so weit sie von derselben Stelle der Netzhaut aus erregt worden sind, auch in derselben Stelle des Sehfeldes gleichzeitig localisirt werden.

Eine solche Theorie wurde zuerst von THOMAS YOUNG<sup>1</sup> aufgestellt. Die nähere Durchführung derselben ist wesentlich bedingt dadurch, daß ihr Autor den lichtempfindenden Nerven des Auges nur diejenigen Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben wollte, welche wir für die motorischen Nerven der Thiere und des Menschen sicher kennen. Diese letzteren durch Versuche zu ermitteln haben wir viel günstigere Gelegenheit als bei den Empfindungsnerven, da wir die feinsten Veränderungen ihrer Erregung und Erregbarkeit durch die in den Muskeln erregten Contractionen und deren Veränderungen verhältnißmäßig leicht und deutlich erkennen und abmessen können. Was wir übrigens sonst über den Bau, die chemische Beschaffenheit, die Erregbarkeit, Leitungsfähigkeit, das elektrische Verhalten der sensiblen Nerven haben ermitteln können, stimmt so vollständig mit dem entsprechenden Verhalten der motorischen Nerven überein, daß fundamentale Verschiedenheiten in der Art ihrer Thätigkeit, soweit sie nicht von den mit ihnen verbundenen anderen organischen Apparaten abhängen, auf die sie ihre Wirkung ausüben, äußerst unwahrscheinlich sind. Diese Verhältnisse sind zum Theil schon in § 17 besprochen.

Nun kennen wir für die motorischen Nerven nur den Gegensatz zwischen dem Zustande der Ruhe und der Thätigkeit. Im ersteren kann der Nerv lange Zeit unverändert erhalten werden, ohne erheblichen Stoffwechsel oder Wärmeentwicklung; dabei bleibt der von diesem Nerven abhängige Muskel schlaff. Wenn man den Nerven reizt, entwickelt sich Wärme in ihm, stoffliche Änderungen, elektrische Oscillationen sind nachzuweisen, der Muskel contrahirt sich. Im ausgeschnittenen Nervenpräparat geht die Leistungsfähigkeit dabei schnell verloren, wahrscheinlich wegen des Verbrauchs der zur Thätigkeit nöthigen chemischen Bestandtheile. Unter Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs, oder besser noch des sauerstoffhaltigen arteriellen Bluts stellt sich langsam die Reizbarkeit ganz oder theilweise wieder her, ohne daß diese Wiederherstellungsprocesse Zusammenziehungen des Muskels oder die mit der Thätigkeit zusammenfallenden Änderungen des elektrischen Verhaltens in Nerv oder Muskel erregen. Auch kennen wir kein äußeres Mittel, welches diesen Wiederherstellungsproceß so schnell und intensiv hervorrufen und ihn dabei auch so plötzlich eintreten und wieder aufhören lassen könnte, wie es nöthig sein würde, wenn dieser Proceß als physiologische Grundlage kräftiger und präcis eintretender Empfindung dienen sollte.

Wenn wir unsere Annahmen bei der Ausbildung der Theorie des Farbensehens auf diese den Nerven sicher zukommenden Fähigkeiten beschränken, so ist dadurch in ziemlich festen Umrissen die Theorie von TH. YOUNG gegeben.

Die Empfindung von Dunkel entspricht dem Ruhezustand des Sehnerven, die von farbigem oder weißem Licht einer Erregung desselben. Die drei einfachen Empfindungen, welche der Erregung nur eines einzigen der drei

<sup>1</sup> TH. YOUNG, *Lectures on Natural Philosophy*. London. 1807.

Nervenapparate entsprechen und aus denen sich alle anderen zusammensetzen lassen, müssen in der Farbentafel den drei Eckpunkten des Farbendreiecks entsprechen.

Um möglichst wenige durch objective Erregung nicht nachweisbare Farbenempfindungen anzunehmen, scheint es zweckmässig, die Ecken des Farbendreiecks so zu wählen, daß dessen Seiten die Curven der Spectralfarben möglichst eng umschließen.

291

Dem entsprechend hat nun TH. YOUNG<sup>1</sup> angenommen:

1. Es giebt im Auge drei Arten von Nervenfasern. Reizung der ersten erregt die Empfindung des Roth, Reizung der zweiten die des Grün, Reizung der dritten die Empfindung des Violet.
2. Objectives homogenes Licht erregt diese drei Arten von Fasern je nach seiner Wellenlänge in verschiedener Stärke. Die rothempfindenden Fasern werden am stärksten erregt von dem Lichte grösster Wellenlänge, die grünempfindenden von dem Lichte mittlerer Wellenlänge, die violetempfindenden von dem Lichte kleinster Wellenlänge. Indessen ist dabei nicht ausgeschlossen, muß vielmehr zur Erklärung einer Reihe von Erscheinungen angenommen werden, daß jede Spectralfarbe alle Arten von Fasern erregt, aber die einen schwach, die andern stark. Denken wir uns in Fig. 140 in horizontaler Richtung die Spectralfarben in ihrer natürlichen Reihenfolge aufgetragen, anfangend von Roth *R* bis zum Violet *V*, so können die drei Curven etwa die Erregungsstärke der drei Arten von Fasern darstellen, No. 1 die der rothempfindenden, No. 2 der grünempfindenden, No. 3 der violetempfindenden.<sup>2</sup>




Fig. 140.

Das einfache Roth erregt stark die rothempfindenden, schwach die beiden andern Faserarten; Empfindung: roth.

Das einfache Gelb erregt mässig stark die roth- und grünempfindenden, schwach die violetten; Empfindung: gelb.

Das einfache Grün erregt stark die grünempfindenden, viel schwächer die beiden anderen Arten; Empfindung: grün.

Das einfache Blau erregt mässig stark die grün- und violetempfindenden, schwach die rothen; Empfindung: blau.

<sup>1</sup> TH. YOUNG, *Lectures on Natural Philosophy*. London, 1807.

<sup>2</sup> Genauere nach Messungen ausgeführte Constructionen dieser Curven folgen unten in Fig. 149.



Das einfache Violet erregt stark die gleichnamigen, schwach die anderen Fasern; Empfindung: violet.

Erregung aller Fasern von ziemlich gleicher Stärke giebt die Empfindung von Weifs oder weifslichen Farben.

Vielleicht nimmt bei dieser Hypothese zunächst mancher daran Anstofs, dafs die Zahl der vorauszusetzenden Nervenfasern und Nervenendigungen verdreifacht werden mufs, im Vergleich mit der älteren Annahme, wo nan jede einzelne Nervenfasern alle möglichen Farberregungen leiten liefs. Ich glaube aber nicht, dafs in dieser Beziehung die Annahme von YOUNG mit den anatomischen Thatsachen in Widerspruch steht; schon auf S. 264 ist eine Hypothese erörtert worden, welche die Genauigkeit des Sehens mit Hülfe einer viel kleineren Zahl von Sehnervenfasern erklärt, als die der unterscheidbaren Örter im Sehfelde ist.

Die Wahl der drei Grundfarben hat, wie schon oben bemerkt wurde, zunächst etwas Willkürliches. Es könnten beliebig jede drei Farben gewählt werden, aus denen Weifs zusammengesetzt werden kann. YOUNG ist wohl durch die Rücksicht geleitet worden, dafs die Endfarben des Spectrum eine ausgezeichnete Stellung zu beanspruchen scheinen. Würden wir diese nicht wählen, so müfste eine der Grundfarben ein purpurner Farbenton sein, und die ihr entsprechende Curve in *Fig. 140* zwei Maxima haben, eines im Roth, eines im Violet.

Der einzige Umstand, welcher direct in der Empfindungsweise sich geltend macht, und einen Anhalt für die Bestimmung der Grundfarben zu gewähren scheint, ist die anscheinend gröfsere Farbensättigung des Roth und Violet, die auch, weniger entschieden freilich, für das Grün sich noch merklich macht. Da wir die Farben um so gesättigter nennen, je mehr sie von Weifs unterschieden sind, so müssen wir erwarten, dafs grofse Sättigung namentlich denjenigen Spectralfarben zukommen müsse, die die einfachsten Farbenempfindungen am reinsten hervorrufen. In der That haben diese Farben, wenn sie sehr rein sind, selbst bei geringer Helligkeit etwas intensiv Glühendes, fast Blendendes. Namentlich giebt es manche rothe, violete oder blauviolete Blüthen, z. B. von Cinerarien, deren Farben diese eigenthümliche Verbindung von Dunklem und Blendendem zeigen. YOUNG'S Hypothese giebt dafür eine einfache Erklärung. Eine dunkle Farbe kann eine intensive Erregung eines der drei Nervenapparate geben, während entsprechend helles Weifs viel schwächere Erregung dreier Nervenapparate giebt. Der Unterschied erscheint analog dem zwischen der Empfindung von sehr heifsem Wasser auf einer kleinen Hautstelle und lauwarmem Wasser, was eine gröfsere Hautfläche trifft.

Am meisten macht mir das Violet diesen Eindruck einer tief gesättigten Farbe, aber bei der geringen Lichtstärke der eigentlich violetten Strahlen, wie sie selbst im Sonnenlicht vorkommen, und der Einmischung des Fluorescenzlichtes, kommt ihm das durch gröfsere Lichtstärke begünstigte Ultramarinblau verhältnifsmäfsig nahe. Das eigentlich reine Violet des Spectrum

ist im Laienpublicum sehr wenig gekannt, da die violetten Farbstoffe fast immer etwas zugemischtes Roth geben, oder sehr dunkel erscheinen. Eben deshalb erregen die dem Violet nahe kommenden Abstufungen des Ultramarinblau viel mehr die allgemeine Aufmerksamkeit und sind viel besser bekannt und durch einen älteren Namen, den des Blau ausgezeichnet, als das eigentliche Violet. Außerdem hat man in dem tiefen Ultramarinblau der reinsten Himmels ein höchst imponirendes, allbekanntes und constantes Muster dieser Farbe.

Ich suche hierin den Grund, warum in älteren Zeiten immer Blau als die eine Grundfarbe angesehen worden ist. Und auch die neueren Beobachter, welche Farbengleichungen aufgesucht haben, wie MAXWELL, A. KÖNIG sind zum Theil dazu zurückgekehrt. Für beide letzteren lag freilich ein bestimmter Grund in der schon oben erwähnten Krümmung der Curve der Spectralfarben im Violet.

Zu erwähnen wäre hier noch, daß die Venetianische Malerschule, die besonders durch die tiefe Farbengluth ihres Colorits wirkt, die Zusammenstellung der drei Farben Roth, Grün und Violet vorzugsweise liebt.

Ich bezweifle übrigens durchaus die von einzelnen Forschern ausgesprochene Meinung, daß in den Namen der Farben sich das Bedürfnis, die Grundempfindungen zu bezeichnen, ausgesprochen habe, und diese deshalb bei der Bestimmung Anhaltspunkte geben könnten. Unsere Voreltern hatten in den Farben ein Gebiet fließender Unterschiede vor sich. Wollten sie darin bestimmte Stufen festhalten, so mußten sie vor allen Dingen nach guten allgemein bekannten, und immer wieder zu beachtenden Mustern auffallender Färbung suchen. Die Namen für Roth führen zurück auf Sanskrit: rudhira = Blut, und auch „roth“. Davon *ῥοῦθρος*, rufus, ruber, roth, red u. s. w. Für „Blau“ haben die Griechen *πορφυρεος* und *κυανεος*, die sich auf das Meer zu beziehen scheinen, die Lateiner coeruleus von coelum, die Deutschen „blau“, englisch: blue, holländisch: blau, altddeutsch: blaw, die auf englisch: blow, blasen d. h. Farbe der Luft, zu führen scheinen. Die Namen für Grün führen auf die Vegetation zurück, *πρασινος* (wiesenfarbig), *πορρωδες* (lauchartig), viridis von vis, virescere; deutsch: grün, englisch green, führen auf grow, wachsen.

Die ältesten Farbenbezeichnungen waren sehr unbestimmt; *ξανθός* scheint von goldgelb bis blaugrün gereicht zu haben. Es war offenbar eine schwere Aufgabe, dieses fließende Gebiet in festen Stufen zu fixiren. Noch jetzt wird es selbst begabten Kindern schwer, die Farbennamen zu lernen. Man darf daraus nicht auf Farbenblindheit der alten Völker schließen wollen.

Daß es unmöglich ist aus der Reihe der durch objectives Licht erzeu- baren Farben drei auszulesen, die als Grundempfindungen angesehen werden könnten, ist schon oben S. 320 erörtert worden. Es ist eben deshalb von den Herren A. KÖNIG und C. DIETERICI die Mittelstrecke des Spectrum unterschieden worden, deren Farben nicht mehr aus den Endfarben und

iner in ihr liegenden Spectralfarbe gemischt werden können. Die nach den Messungen derselben Beobachter entworfene Farbentafel *Fig. 139* zeigt dieselbe Thatsache in graphischer Darstellung. Eben deshalb ist für TH. YOUNG'S Theorie die Annahme nothwendig, daß im allgemeinen jede Spectralfarbe gleichzeitig, wenn auch in verschiedener Stärke, nicht bloß einen, sondern zwei oder alle drei von den drei farbenempfindenden Nervenapparaten erregt. Höchstens für die Endfarben des Spectrum, Roth und Violet, würde die Annahme der Einfachheit zulässig sein. Aber gerade beim Violet wissen wir, daß die von den violetten Strahlen hervorgerufene Fluorescenz der Netzhaut die Reinheit der Empfindung trüben muß, und es scheint mir nicht unwahrscheinlich, daß die schon von MAXWELL gefundene und auch in *Fig. 139* bemerkbare Krümmung der Linie zwischen *F* und *G* von der Fluorescenz der Netzhaut bedingt ist.

Daraus folgt nun weiter, daß es theoretisch möglich erscheinen muß, durch andere Bedingungen der Erregung Empfindungen gesättigterer Farben hervorzurufen. Daß dies auch praktisch möglich ist, und diese Forderung von YOUNG'S Theorie wirklich erfüllt werden kann, werde ich bei der Beschreibung der Nachbilder zu erörtern haben.

Die geschilderte Farbentheorie von TH. YOUNG ist der allgemeinen Theorie der Nerventhätigkeit gegenüber, wie sie von JOHANNES MÜLLER ausgearbeitet worden ist, eine speciellere Durchführung des Gesetzes von specifischen Empfindungen. Ihren Annahmen entsprechend wären die Empfindung des Roth, des Grün, des Violet als bestimmt durch die specifische Empfindungsenergie der entsprechenden drei Nervenapparate anzusehen. Jede beliebige Art der Erregung, welche den betreffenden Apparat überhaupt erregen kann, würde in ihm immer nur seine specifische Empfindung hervorrufen können. Den Grund der besonderen Qualität dieser Empfindungen dürfen wir wohl nicht in der Netzhaut oder der Beschaffenheit ihrer Fasern, sondern in der Thätigkeit der mit ihnen verbundenen centralen Gehirntheile suchen.

Ich habe bis hierher die Auseinandersetzung dieser Theorie verhältnißmäßig abstract gehalten, um dieselbe möglichst frei von weiter gehenden hypothetischen Zusätzen zu halten. Indessen hat es andererseits große Vortheile für das sichere Verständniß solcher Abstractionen, wenn man sich möglichst concrete Bilder davon zu machen sucht, selbst wenn diese manche Voraussetzung hineinbringen, die für das Wesen der Sache nicht gerade nothwendig ist. In diesem Sinne erlaube ich mir, die folgende etwas handgreiflichere Gestalt der YOUNG'schen Theorie vorzutragen. Daß Einwände gegen diese Zusätze das Wesen von YOUNG'S Hypothese nicht widerlegen, brauche ich wohl nicht auseinanderzusetzen.

1. In den Endorganen der Sehnervenfasern sind dreierlei Arten photochemisch ersetzbarer Substanzen abgelagert, welche für verschiedene Theile des Spectrum verschiedene Empfindlichkeit haben. Die drei Farbenwerthe der Spectralfarben hängen wesentlich von der photochemischen Reaction dieser drei Substanzen gegen das Licht ab. In den Augen der Vögel und Reptilien kommen neben farblosen

Zapfen in der That noch Stäbchen mit rothen, und solche mit gelbgrünen Öltröpfchen vor, die eine Begünstigung einzelner einfacher Lichter in der Wirkung auf das hintere Glied dieser Gebilde bewirken könnten. Bei den Säugethieren und dem Menschen ist bisher nichts Ähnliches gefunden worden.

2. Durch die Zersetzung jeder der lichtempfindlichen Substanzen wird die damit beladene Nervenfaser in den Zustand von Erregung versetzt. Es giebt nur eine Art von empfindungserregender Thätigkeit in jeder Nervenfaser, die mit Zersetzung der organischen Substanz und Wärmeentwicklung einhergeht, wie wir sie von den Muskelnerven her kennen. Diese Vorgänge in den drei Fasersystemen sind wahrscheinlich auch unter einander durchaus gleichartig. Sie wirken im Hirn dadurch verschieden, daß sie mit verschiedenen functionirenden Hirnthteilen verbunden sind. Die Nervenfasern brauchen hier wie überhaupt nur die Rolle von Telegraphendrähten zu spielen, durch welche durchaus gleichartige electriche Ströme fließen in den damit verbundenen Endapparaten die verschiedensten Thätigkeiten auslösen oder hervorrufen können. Diese Erregungen der drei Fasersysteme bilden die abgesonderten drei Elementarerregungen, vorausgesetzt, daß die Erregungsstärke für welche wir noch kein allgemeingültiges Maas haben, dabei der Lichtstärke proportional gesetzt wird. Das hindert nicht, daß diese Intensität der Elementarerregung irgend welche verwickelte Function des Stoffverbrauchs oder der negativen Stromesschwankung im Nerven sein könnte, welche letzteren Vorgänge etwa auch als Maas der Erregung gelegentlich verwendet werden könnten.

3. Im Hirn stehen die drei Fasersysteme mit drei verschiedenen functionirenden Systemen von Ganglienzellen in Verbindung, die vielleicht räumlich so aneinander gelagert sind, daß die denselben Netzhautstellen entsprechenden dicht zusammen liegen. Das scheint aus den neueren Untersuchungen über den Einfluß von Hirnverletzungen auf das Gesichtsfeld hervorzugehen.

Die neuere von Herrn E. HERING aufgestellte Modification der YOUNG'schen Hypothese, in der Gegensatz positiver und negativer Nerventhätigkeiten angenommen wird, soll weiter unten besprochen werden.

305 Methoden zur Mischung farbigen Lichts. Um das farbige Licht der Pigmente und anderer Naturkörper zu mischen, ist das einfachste Verfahren folgendes. In einiger Entfernung (30–40 cm) über einer schwarzen Tischplatte bringt man eine kleine ver-




Fig. 141.

farbige Licht von *b* fortgeht, und beide Lichter fallen also gemischt in das Auge *a*, das von ihm gesehene gemeinsame Bild von *b* und *c* muß also in der Mischfarbe erscheinen.



Das Intensitätsverhältniß regulirt man durch Verschiebung der beiden Oblaten. Je näher sie an  $d$  liegen, desto stärker ist das reflectirte Licht von  $c$ , desto schwächer das durchgelassene von  $b$ .

Man kann auf diese Weise auch Licht, welches durch farbige Gläser oder Flüssigkeiten gegangen ist, zur Mischung anwenden. Dazu macht man in der Platte  $bc$  Öffnungen, durch welche das Licht gelangt. So kann man auch das durch einen Spiegel reflectirte Licht des blauen Himmels mit dem von Chromgelb mischen und sich überzeugen, daß beide, wie Ultramarin und Chromgelb, ein röthliches Weiß geben, daß das Himmelblau also weißliches Indigblau ist, nicht aber dem weniger brechbaren Blau des Spectrum entspricht, welches wir Cyanblau genannt haben. Diese Methode hat vor den Mischungen auf dem Farbenkreisel den Vorzug, daß die weißlichen Mischungen nicht grau, sondern weiß erscheinen.

Die Einrichtung der Farbenkreisel wird in § 22 näher beschrieben werden.

Von andern Methoden, farbiges Licht zusammenzusetzen, ist noch zu erwähnen ein Versuch von VOLKMANN, der durch gefärbte Gewebe, die er dicht vor das Auge hielt, nach farbigen Flächen hinsah. Die Mischung beider Farben wird aber nicht recht gleichmäßig, und es kann auch die Durchsichtigkeit der Fäden stören, indem die Fäden theilweise wie ein farbiges Glas wirken, durch welches man eine farbige Fläche sieht. CZERNIAK hat den SCHEMKE'schen Versuch benutzt, indem er durch einen Schirm mit zwei engen Öffnungen sah, welche mit verschiedenfarbigen Gläsern bedeckt waren. Soweit die Objecte einfach erscheinen, erscheinen sie auch in der Mischfarbe. HOLTZMANN läßt das diffus reflectirte Licht zweier farbigen Papiere auf weißes Papier fallen. CHALLIS erwähnt Versuche, wie sie übrigens schon MILE angestellt hatte, bei denen Papiere, die mit Streifen verschiedener Farben versehen waren, aus solcher Entfernung betrachtet wurden, daß die Streifen einzeln nicht mehr erkannt werden konnten. Endlich hat DOVE Methoden beschrieben, um Interferenz- und Absorptionsfarben zu mischen. Er benutzt dazu Spiegel, die aus farbigen Gläsern mit Silber belegt gebildet sind. Die vordere Fläche solcher Spiegel giebt polarisirtes weißes Licht, die hintere unpolarisirtes durch Absorption gefärbtes. Geht nun das so gemischte Licht durch eine Glimmerplatte und ein Nicol'sches Prisma, so bleibt das letztere Licht unverändert. Das polarisirte Licht dagegen wird durch die Interferenz des ordentlichen und außerordentlichen Strahls im Krystall so gefärbt, daß seine Farbe einer der Farbenstufen von NEWTON's Ringssystemen entspricht. Beide Arten von Licht fallen vermischt in das Auge des Beobachters.

Eine verhältnißmäßig günstige und auch leicht auszuführende Methode für die Mischung des Lichts zweier neben einander liegender farbiger Felder besteht darin, daß man diese Grenze durch ein achromatisirtes doppeltbrechendes Prisma von Kalkspath oder Bergkrystall betrachtet, so daß die Grenzlinie in Doppelbildern auseinander geschoben wird. Zwischen den beiden Bildern der Grenze sieht man dann die Ränder beider Felder übereinandergeschoben, und die beiden Farben durch Überdeckung vereinigt. Seitlich dagegen bleiben die Farben der beiden Felder ungemischt stehen.

Für die Prüfung von GRASSMANN's Satz, daß gleichaussehende Farben gemischt, wiederum gleichaussehende Mischungen geben, lassen sich nach einem Vorschlag von E. HERING sowohl die spiegelnde Glasplatte, wie das Kalkspathprisma sehr leicht in der Weise anwenden, daß man mit ihrer Hülfe irgend welches andre farbige Licht über die Grenze zweier Felder der rotirenden Farbenscheiben ausbreitet, die gleich aussehen, aber verschieden zusammengesetzt sind. Die Verschiedenheit wird durch die Deckung mit andrem Licht nicht sichtbar.

Die einfachste unter den Methoden, um prismatische einfache Farben zu mischen, und gleichzeitig alle Combinationen aus je zwei solchen zu erhalten, ist die, daß man in einem dunklen Schirme einen V-förmigen Spalt anbringt, dessen beide Schenkel wie  $ab$  und  $bc$  in Fig. 142 unter  $45^\circ$  gegen den Horizont geneigt sind, und diesen Spalt, der vor einen hellen Hintergrund gestellt ist, durch ein Prisma mit senkrecht stehender

brechender Kante betrachtet. Die Spectra haben dann die Form wie in *Fig. 143*, wo  $\alpha\beta\beta\alpha$ , das Spectrum des Schenkels  $ab$  und  $\gamma\beta\beta\gamma$ , das Spectrum von  $bc$  ist. In dem ersteren laufen die Farbenstreifen parallel  $ab$  und  $\alpha\beta$ , im zweiten parallel  $bc$  und  $\beta\gamma$ , wie die gestrichelten Linien. In dem mittleren dreieckigen Felde  $\beta\delta\beta$ , welches beiden Spectren gemeinsam ist, schneiden alle Farbenstreifen des einen Spectrum alle Farben-




Fig. 142.



Fig. 143.

streifen des andern, und es entstehen dadurch an diesen Stellen alle aus je zwei einfachen Farben gebildeten Mischfarben. Wenn die Breite der Spalten unveränderlich ist, so kann doch das Verhältniß der Quantitäten des gemischten Lichtes dadurch geändert werden, daß man das Prisma aus der senkrechten Stellung in eine geneigte bringt, wodurch die Spectra die Form wie *Fig. 144* annehmen und das eine  $\beta\gamma\beta\gamma$ , in welchem dieselbe Lichtmenge auf einen kleineren Raum vertheilt wird, heller wird, während das andere  $\alpha\beta\beta\alpha$ , dessen Flächenraum vergrößert ist, an Helligkeit verliert.

Man kann durch diese Methode die meisten der oben angeführten Resultate gewinnen. Eine genaue Beurtheilung der Mischfarben, namentlich der weißlicheren, ist aber erstens dadurch erschwert, daß die einzelnen Farben einen zu kleinen Raum einnehmen, selbst wenn man die Beobachtung mit einem Fernrohr ausführt, zweitens dadurch, daß man im Gesichtsfelde eine Menge anderer glänzender Farben daneben hat, welche durch Contrastwirkungen das Ansehen der minder gesättigten Farben stark verändern.

Diese Übelstände sind bei einer zweiten Methode vermieden; für diese wird ein complicirter Apparat gebraucht, von dem *Fig. 145* eine horizontale Projection dar-




Fig. 144.



Fig. 145.

stellt. Man läßt Sonnenlicht, welches von einem Heliostaten reflectirt ist, durch einen verticalen Spalt in ein dunkles Zimmer fallen, läßt es durch ein Prisma *P* *Fig. 145* und eine achromatische Linse *L*, gehen, in deren Brennpunkt ein Schirm *S*, steht, auf dessen

vorderer Fläche ein objectives Spectrum entworfen wird. Zwischen Linse und Schirm befindet sich ein Diaphragma  $D$  mit rechteckigem Ausschnitt. Der Schirm  $S$ , hat zwei verticale Spalten bei  $\gamma$ , und  $\gamma''$ , welche von dem Lichte, das hier zu dem Spectrum vereinigt ist, zwei Farbstreifen durchgehen lassen, während alles andere farbige Licht von dem Schirme zurückgehalten wird. Hinter diesem Schirme ist eine zweite achromatische Linse  $L''$ , von kürzerer Brennweite angebracht, welche auf dem zweiten Schirme  $S''$  ein Bild  $\delta$ ,  $\delta''$  des Diaphragma  $D$  entwirft. Die Breite des einfallenden weißen Strahlenbündels ist  $\alpha$ ,  $\alpha''$ ; hinter der Linse  $L$ , sind die Grenzstrahlen der beiden verschiedenfarbigen Strahlenbündel, deren Brennpunkte mit den beiden Spalten  $\gamma$ , und  $\gamma''$ , zusammenfallen, dadurch unterschieden, daß die brechbareren gestrichelt, die weniger brechbaren punktirt sind. Die Öffnung des Diaphragma  $D$  muß so eng gemacht werden, daß sie ganz von Strahlen beider Bündel ausgefüllt ist, so daß von jedem Punkte der Öffnung Strahlen der betreffenden Farbe auf jeden Punkt der Spalten  $\gamma$ ,  $\gamma''$ , fallen. Macht man die vordere Seite des Diaphragma weiß, so sieht man darauf das Strahlenbündel als weißen Fleck mit farbigen Rändern sich projectiren (bei  $\epsilon$ , blau, bei  $\epsilon''$ , roth). Um die genannte Bedingung zu erfüllen, muß die Öffnung ganz in der weißen Mitte der beleuchteten Stelle liegen. Unter diesen Umständen ist die Öffnung des Diaphragma gleichsam das leuchtende Object, von welchem zweierlei Licht durch die Spalten des Schirms  $S$ , auf die Linse  $L''$ , fällt. In dem Bilde  $\delta$ ,  $\delta''$ , welches die Linse von dem Diaphragma  $D$  entwirft, ist beiderlei Art Licht über dieselbe gleichmäßig ausgebreitet, und diese Fläche erscheint daher in der Mischfarbe, oder wenn man einen der Spalten verdeckt, in einer der einfachen Farben.




Fig. 146.

Um den Farbenton und die Intensität der gemischten Lichter nach Belieben und sehr allmählig ändern zu können, ist eine besondere Construction des Schirms  $S$ , nöthig, und ist derselbe in Fig. 146 abgebildet. Der Schirm besteht aus einer viereckigen Messingplatte  $AABB$ , die bei  $C$  durch einen cylindrischen Stab getragen wird. Letzterer verschiebt sich in einer gespaltenen cylindrischen Hülse  $D$ , die in der Mitte eines mit drei Stellschrauben versehenen Brettes befestigt ist. Der Schirm kann also mit seinem Träger  $C$  auf und nieder geschoben, und in jeder Höhe mittels des gespaltenen und durch eine Schraube zusammengezogenen Ringes  $E$  festgestellt werden.

Auf der Messingplatte  $AABB$  sind in schräger Richtung zwei Schlitten beweglich, deren Grundlagen die Messingplatten  $aa$  und  $aa'$  sind. Mit  $bb$ ,  $\beta\beta$ ,  $c$  und  $c'$  sind die Schienen bezeichnet, zwischen denen sich die Platten verschieben. Diese Platten werden durch die Schrauben  $d$  und  $d'$  bewegt, deren Mütter in die an der großen Platte  $AABB$  befestigten Messingklötze  $e$  und  $e'$  eingeschnitten sind, und deren Enden drehbar in den Klötzen  $g$  und  $g'$  befestigt sind, welche von den beweglichen Platten getragen werden.



Durch Drehung der Schrauben  $d$  und  $\delta$  verschiebt man also die Platten  $aa$  und  $aa'$  parallel den Schienen, zwischen denen sie als Schlitten gehen.

Auf der beweglichen Platte  $aa$  ist nun wieder als Schlitten beweglich die Platte  $f$  zwischen horizontalen Schienen angebracht, und durch die Schraube  $m$  zu verstellen. Ebenso auf der Platte  $aa'$  die Platte  $\varphi$  mit der Stellschraube  $\mu$ . Zwischen den einander zugekehrten Rändern der Platten  $f$  und  $\varphi$  liegen noch die beiden dreieckigen ebenen Platten  $l$  und  $\lambda$ , jene auf  $aa$ , letztere auf  $aa'$  befestigt. Die einander zugekehrten und zugeschärften Ränder von  $f$  und  $l$ , sowie von  $\varphi$  und  $\lambda$  bilden zwei Paare GRAVE-SANDE'scher Schneiden.

Dahinter befindet sich in der großen Platte  $AABB$  ein entsprechender Ausschnitt, um das Licht, welches durch die beiden Spalten gegangen ist, weiter hindurchzulassen. Die vorderen Flächen von  $f$ ,  $l$ ,  $\varphi$  und  $\lambda$  sind matt versilbert, um das Spectrum darauf gut projectiren zu können. Der Ort des Spectrum ist durch das kleine punktirte Rechteck angedeutet.

Verschiebt man mittels der Schrauben  $d$  und  $\delta$  die Platten  $aa$  und  $aa'$ , so treten die Spalten unter einen andern Ort des Spectrum, und es gehen andere Farbtöne durch sie hindurch. Durch die Schrauben  $m$  und  $\mu$  dagegen ändert man die Breite der Spalten und damit auch die Menge des durchgelassenen Lichtes.

Es kommt darauf an, daß der Vereinigungspunkt gleichfarbiger Strahlen, welche durch die Linse  $L$ , gegangen sind, genau auf der Ebene des Schirms  $S$ , liegt, sonst zeigt das Farbenfeld auf  $S$ , von rechts nach links verschiedene Farbtöne. Die Spalten müssen den dunklen Linien des Spectrum parallel sein, was durch die Stellschrauben am Fusse des Schirms  $S$ , bewirkt werden kann. Auch müssen alle Unreinigkeiten an der Linse und Prisma, welche gefärbte Flecke in dem Farbenfelde geben würden, sorgfältig entfernt werden. Zwischen den beiden einzelnen Linsen der achromatischen Doppellinse  $L$ , bilden sich leicht NEWTON'sche Ringe, die im Farbenfelde abgebildet werden. Diese entfernt man, indem man Canadabalsam zwischen die Linsen bringt. Je weiter man übrigens das Diaphragma  $D$  von der Linse  $L$ , entfernt, desto verwaschener ist das Bild solcher Flecken in den Gläsern, und desto weniger stören sie. Es ist deshalb die hier abgebildete Anordnung des Apparats besser, als die früher von mir beschriebene.

Bei dieser Methode hat das farbige Feld eine größere Ausdehnung als bei der ersten, und alle anderen Farben, welche durch Contrastwirkungen stören könnten, sind entfernt. Doch bleiben noch in vielen Fällen manche Hindernisse bestehen, die eine ruhige und sichere Beurtheilung der Mischfarbe erschweren. Es macht sich erstens die Farbenzerstreuung im Auge bei Zusammensetzungen nur zweier einfacher Farben von sehr verschiedener Brechbarkeit viel bemerkbarer als bei weißem Lichte (s. oben S. 159). Der Rand des Farbenfeldes färbt sich deshalb leicht mit einer von beiden Farben, während in der Mitte die andere überwiegt. Dann ist das Auge bei einigen weißen Mischfarben, namentlich bei dem aus Roth und Grünblau zusammengesetzten Weiß, außerordentlich empfindlich gegen die kleinsten Einmischungen einer der ursprünglichen Farben, so daß die kleinsten Ungleichmäßigkeiten des Apparats und etwa vorhandene Nachbilder im Auge, namentlich bei größerer Lichtstärke, sehr stören. Endlich sind hierbei auch die Verschiedenheiten des Eindrucks zwischen Mitte und Randtheilen der Netzhaut sehr auffallend. Verhältnißmäßig am leichtesten ist es, Weiß aus Gelb und Indigo zusammenzusetzen, schwerer aus Gelbgrün und Violet oder Goldgelb und Wasserblau, am schwersten aus Roth und Grünblau. Letzteres erscheint in geringer Entfernung vom Fixationspunkte blau, wenn es auf diesem weiß ist.

Die Wellenlängen der complementären einfachen Farben habe ich in der Weise bestimmt, daß ich die Linse  $L$ , und den Schirm  $S$ , entfernte und aus einiger Entfernung die Spalten des Schirms  $S$ , durch ein Fernrohr betrachtete, vor dessen Objectiv eine Glasplatte mit feinen äquidistanten verticalen Linien angebracht war. Man sieht dann Diffractionsspectra der Spalten, deren scheinbare Entfernung von dem betreffenden

Spalte der Wellenlänge proportional ist. Man braucht also nur in derselben Weise die Entfernung der Diffractionsspectra für eine der dunklen Linien des Spectrums zu messen, deren Wellenlänge FRAUNHOFER bestimmt hat, so ergeben sich daraus leicht die Wellenlängen der beobachteten gemischten Farben.




Fig. 147.

Spectrophotometer für Farbenmischung. Zu Messungen geeigneter ist eine Abänderung der Methode, bei welcher die Mischfarben nicht objectiv projectirt werden, sondern als potentielle Bilder im Sehfelde erscheinen. Sie beruht darauf, daß, wenn man ein Bild des Spectrum auf einen Schirm, der einen Spalt hat, entwirft, so daß ein sehr schmaler Streifen des Spectrum scharf abgebildet auf und durch den Spalt fällt, ein durch diesen Spalt blickendes Auge von allen Theilen der Prismenfläche nur Licht dieser Farbe kommen sieht, so daß die ganze Fläche des Prisma als ein gleichmäßiges Feld einer Farbe erscheint. Diese Methode, auf eine einzelne Farbe angewendet, ist schon auf S. 301 besprochen, und dort sind auch die Vorsichtsmafsregeln angegeben,

die zu beachten sind, um reine und gleichmäßige Felder zu erhalten. Zur Farbmischung wurde sie zuerst von MAXWELL verwendet. Ich beschreibe hier eine von mir construirte Form des Apparats,<sup>1</sup> die sich bei den Messungen der Herren R. SCHELSKE, A. KÖNIG und C. DIETERICI als zweckmäßig bewährt hat. Derselbe ist in horizontalem Schnitt in *Fig. 147* abgebildet.

Darin ist *P* ein großes gleichseitiges Prisma, welches auf dem centralen schweren Fusse des Instruments unverrückbar befestigt ist. *B* und *C* sind zwei um eine unter *P* liegende senkrechte Axe drehbare Collimatoren, aus denen das zu mischende Licht zunächst auf die in der Zeichnung nach unten sehende horizontale Fläche des Prisma *P* fällt, um von diesem nach oben in das Fernrohr *A* hinein gebrochen zu werden. Dabei tritt das aus *B* kommende Licht durch die rechte obere Fläche des Prisma, das von *C* kommende durch die linke, und der Beobachter, dessen Auge sich bei *A* befindet, sieht also das aus dem rechten Fernrohre herrührende Licht durch die linke Seite des Prisma auftauchen, und umgekehrt. Für die Beobachtungen der Farbgemische wird das Ocular des Fernrohrs entfernt; statt dessen bleibt nur ein rechteckiger schmaler Spalt an der Stelle des Brennpunkts des Objectivs stehen, dessen Breite durch Schrauben verändert werden kann. Zwei andere feinere Spalten, deren Breite an dem Kopf der sie verengernden und erweiternden Mikrometerschraube abgelesen werden kann, befinden sich an den Enden der Röhre *B* und *C*. Bei den Verengerungen und Erweiterungen dieser drei Spalten kommt es darauf an, daß deren Mittellinie festgehalten werde, damit sich nur die Helligkeit, aber nicht die Farbe des Bildes ändere, und deshalb werden ihre beiden Schneiden durch Drehung derselben Schraube gleich viel in entgegengesetzter Richtung bewegt<sup>2</sup>. In *Fig. 147 D* und *E* sind die Einrichtungen dieser Spalte skizziert. Um nun aus jedem der beiden Collimatoren *B* und *C* je zwei Farben zur Vereinigung zu bringen, befindet sich im Innern beider Röhren ein doppeltbrechendes Prisma von Kalkspath *a* der Figur, welches mit einem Glasprisma so verbunden ist, daß die mittlere Richtung, in der man die beiden Bilder sieht, nicht abgelenkt wird. Die Strahlen, welche durch diese Prismen hindurchgegangen sind, verhalten sich bei ihren weiteren Brechungen, als kämen sie von zwei getrennten Bildern jedes Spaltes her, die um so weiter auseinanderliegen, je entfernter das Prisma vom Spalte ist. Jeder der beiden Doppelspathe kann mittels eines Triebes, der in eine Zahnstange eingreift, hin und her geschoben werden. Zu dem Ende sind die beiden Röhren *B* und *C* seitlich aufgeschnitten, so daß das Prisma *a* mit seinem Trieb frei hin und hergleiten kann. Die beiden Strahlenbündel aber, welche diesen beiden Bildern entsprechen, sind rechtwinkelig zu einander polarisirt. Setzt man also vor jeden Spalt noch ein Nicol'sches Prisma *n*, welches drehbar ist, so kann man das Verhältniß der Intensitäten beider Lichtbündel beliebig ändern, oder sogar eines der Bilder ganz auslöschen, wobei das andre seine größte Intensität erhält. Die GröÙe der Drehung wird mittels zweier getheilter Kreise *m m* gemessen, welche an den Röhrenstücken befestigt sind, die die Nicols enthalten.

Das Prisma *P* entwickelt nun jedes der beiden Spaltbilder in ein Spectrum. Die beiden Spectren sind aber, entsprechend der scheinbaren Distanz der beiden Spaltbilder, mehr oder weniger gegen einander verschoben, so daß verschiedene Farbenpaare darin zur Deckung kommen. Die Objectivlinse des Fernrohrs *A* entwirft endlich ein objectives Bild dieser beiden Spectrenpaare in der Ebene des Spaltes, der in ihrem Brennpunkte steht, und es geht also von jeder Seite des Prismas her Licht der beiden Farben durch diesen Querspalt, deren Strahlen in dem Spalt vereinigt werden. Man sieht also schließlich, durch diesen Spalt nach dem Prisma hinblickend, ein Feld von der Form *Fig. 148*. Die feine mittlere Trennungslinie entspricht der vorderen Kante des Prisma *P*, die kreisförmige seitliche Umgrenzung dem Umfange der Objectivlinse von *A*, die kleinen Bogenstücke den Grenzen der Objectivlinse von *B* und *C*. Man kann nunmehr die Färbung und

<sup>1</sup> Beschreibung desselben im Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879. Berlin. 1880, S. 520 und von R. SCHELSKE, Wiedemann's Annalen Bd. 16, S. 349. 1882.

<sup>2</sup> Diese Einrichtung ist durch Herrn A. KÖNIG getroffen.



Helligkeit der beiden Felder vergleichen und sie gleich zu machen suchen, wenn sie es noch nicht sind, und so eine Farbengleichung herstellen.

In jeder der Mischfarben kann man durch Drehung des entsprechenden Rohres *B* oder *C* beide Farben gleichzeitig dem Roth oder dem Violet nähern; dagegen durch Vorwärtsschiebung des Doppelpaths *a* die eine gegen das Roth, die andre zum Violet wandern machen. Die Intensität der Componenten ändert man in genau meßbarer Weise durch Drehen des Nicols *n*, das Helligkeitsverhältniß beider Paare dagegen durch Änderungen der Spaltbreite am Ende von *B* oder *C*.

Um die Wellenlängen zu bestimmen, wurde die Ocularlinse von *A* eingesetzt. Dann sieht man bei Anwendung von Sonnenlicht im Ocularspalte die *FRAUNHOFER*'schen Linien der vier Spectra erscheinen, die man auch einzeln abblenden kann. Da die Wellenlängen auch der feineren Linien genau bekannt sind, so kann man in dieser Weise bestimmen, welche Wellenlänge den vier mittleren Farben des Spaltes zukommt.

Die gemessenen Intensitätsverhältnisse beziehen sich zunächst auf die Helligkeiten, mit denen die entsprechenden Farben in dem prismatischen Spectrum der angewendeten Lichtquelle erscheinen. Es waren dies bei den Versuchen der Herren A. KÖNIG und C. DIETERICH Gasflammen, für deren Constanz möglichst gesorgt wurde. Es wurden schliesslich noch die Werthe der Helligkeiten der einzelnen Farbenstreifen dieses Lichts in diejenigen des Interferenzspectrum des Sonnenlichts umgerechnet. Die Reductionscoefficienten für die Umrechnung auf das Interferenzspectrum wurden aus den Brechungs-Indices des benutzten Prisma berechnet, hingegen die Coefficienten für die Umrechnung auf das Sonnenlicht durch besondere photometrische Messung gewonnen.<sup>1</sup> Unter Sonnenlicht ist hier immer das Licht verstanden, welches eine mit Magnesiumoxyd überzogene Fläche, die bei unbewölktem Himmel von directen Sonnenstrahlen getroffen wird, diffus reflectirt. Betreffs der Einzelheiten in der praktischen Ausführung der Versuche muß hier auf die Publicationen der Autoren verwiesen werden.



Fig. 148

Die Ergebnisse der messenden Farbenmischungsversuche für die individuellen Unterschiede menschlicher Augen. Die große Mehrzahl menschlicher Augen gehört betreffs ihres Farbensinns einer und derselben Klasse an; da ihr Farbensystem die Annahme von drei Grundfarben erfordert, so nennen wir die Augen dieser Klasse normale trichromatische Augen. Die Herren A. KÖNIG und C. DIETERICH, welche Augen dieser Art besitzen, haben sehr ausgedehnte Messungsreihen mit dem eben beschriebenen Apparate zur Mischung von Spectralfarben ausgeführt, aus denen sie schliesslich die Form ihrer Empfindlichkeitscurven für drei Elementarempfindungen berechnet haben. Sie haben dabei zunächst äußerstes Roth und äußerstes Violet als diejenigen zwei Elementarempfindungen angenommen, welche in den Endstrecken des Spectrum allein erregt werden. Als Endstrecken sind, wie oben schon bemerkt, diejenigen angesehen, deren einzelne Farbenbänder sich nur durch ihre Helligkeit, nicht durch den Farbenton unterscheiden, nämlich Roth mit Wellenlängen größer als  $655 \mu\mu$  und Violet mit solchen, kleiner als  $430 \mu\mu$ . Die Zwischenstrecken (Orange

<sup>1</sup> Vergleiche A. KÖNIG, *Verhandl. d. Physik. Ges. in Berlin* vom 22. Mai 1885 und 19. März 1886. — *Gruebe's Archiv* Bd. 30(2) S. 162. 1884. und *Wied. Annalen*. Bd. 22. S. 572. 1884.

von  $655 \mu\mu$  bis  $630 \mu\mu$ , und Blau von  $475$  bis  $430 \mu\mu$ ), sind angesehen als Mischungen aus einer dritten grünen Elementarfarbe mit Roth einerseits, und Violet andererseits, so daß diese Strecken noch in die Seiten des Dreiecks hineinfallen, welches die drei Elementarfarben als Ecken hat. Dadurch wäre theoretisch, unbedingte Genauigkeit der Messungen vorausgesetzt, die Art der dritten Elementarfarbe fest bestimmt. In Wirklichkeit war der Weg ihrer Bestimmung langwieriger und nicht so direct, weil nicht alle Mischungen gleich gut zu brauchen waren. In sehr weifslichen Mischungen entfernter Farben verschwinden leicht die Unterschiede des Farbentons, und bei Mischung zu nahe benachbarter Farben bringen kleine Fehler der Beobachtung grofse Unterschiede in den Rechnungsergebnissen hervor. Schliesslich wurde, um das Verhältniß der Intensität der verschiedenen Grundempfindungen festzustellen, angenommen, daß die drei Helligkeiten derselben, die im Weifs vereinigt sind, gleich grofs seien. Das Farbdreieck wird also unter dieser Annahme ein gleichseitiges Dreieck, in dessen Mittelpunkt das Weifs gelagert ist.




Fig. 149.

Die Endergebnisse, welche die beiden genannten Beobachter unter solchen Annahmen aus ihren Messungen berechnet haben, sind in *Fig. 149* graphisch dargestellt. Die Abscissenlinie entspricht den Wellenlängen, die unten in Milliontelmillimetern angegeben sind, während darunter FRAUNHOFER's Linien durch ihre Buchstaben angezeigt sind. Die Curven *R* für das Gewicht der Rothempfindung und für das der Violetempfindung waren bei den beiden genannten Beobachtern hinreichend nahe übereinstimmend, daß sie in je eine Curve vereinigt werden konnten. In der Curve für Grün sind die Abweichungen etwas gröfser, deshalb sind die beiden Curven (*K* für Herrn



A. KÖNIG, *D* für Herrn C. DIETERICI) getrennt gezeichnet. Die Höcker am violetten Ende der Grüncurve könnten von der Absorption durch das gelbe Pigment der Netzhautgrube herrühren, welche sich vorzugsweise in der FRAUNHOFER'schen Linie *F* geltend macht. Die entsprechende Ausbuchtung in der Violetcurve ist nicht deutlich, da deren Führung überhaupt in ihren Anfängen, wo sie von andrem starken Lichte überstrahlt wird, verhältnismässig unsicher bleibt.

Die punktirte Curve entspricht einer zweiten selteneren Abart der trichromatischen Augen, deren Vorkommen schon von Lord RAYLEIGH<sup>1</sup> und Herrn DONDEERS<sup>2</sup> nachgewiesen war. Die Grüncurve nähert sich bei ihnen beträchtlich der Rothcurve, namentlich in ihrem vorderen Theile. Die Abweichung zwischen beiden Arten trichromatischer Augen zeigt sich deutlich, wenn man von ihnen das Verhältniss bestimmen läßt, in welchem spectrales Roth und Grün (etwa der Lithium- und Thalliumflamme entsprechend) zu Goldgelb (Natriumflamme) verbunden werden. Die normalen Augen nehmen dazu meist mehr als dreimal soviel Grün, als die der Minorität. Die Rothcurve der letzteren zeigte kleine Abweichungen. Hingegen war die Violetcurve innerhalb der Genauigkeit der Beobachtungen mit der normalen übereinstimmend.

Zu bemerken ist, dafs bei den Grundsätzen, die der Construction der Fig. 149 zu Grunde liegen, die Stelle des Spectrum, wo sich die Roth- und Grüncurve schneiden, complementär sein mufs zum Violet, und die Stelle, wo sich die Grün und die Violetcurven schneiden, complementär sein mufs zum äufsersten Roth. Die entsprechenden Wellenlängen, welche schon aus den S. 318 und 319 gegebenen Tabellen hervorgehen, ergaben sich für beide Beobachter in gleichem Werthe auch aus den Curven, worin eine Controlle für die Richtigkeit ihres Verfahrens liegt.

Dichromatische Augen. Von grossem Interesse für die Theorie der Farbenempfindungen sind die Wahrnehmungen solcher Augen, welche weniger Farben als die gewöhnlichen Augen unterscheiden (Farbenblindheit, *Achromatopsia*, *Achrupsia*). Verhältnismässig selten sind Augen, denen alle Farbenunterschiede fehlen, Monochromaten; häufiger sind solche, die gewisse Farbenunterschiede gut unterscheiden, andere verwechseln, Dichromaten. Schon A. SEEBECK hat nachgewiesen, dafs es zwei Klassen der letzteren giebt. Innerhalb jeder dieser Klassen machen die einzelnen Augen nahehin dieselben Verwechselungen zwischen verschiedenen Farben. Dagegen erkennt jede Klasse die meisten Verwechselungen, welche Individuen der andern Klasse gemacht haben. 294

Zuerst lernte man überwiegend Fälle von SEEBECK's zweiter Klasse kennen, deren Eigenart auch oft nach dem bekannten Chemiker J. DALTON,

<sup>1</sup> RAYLEIGH. *Nature*. Vol. XXV. p. 64. 1881. Gelesen in Section A der British Association Sept. 2. 1881.

<sup>2</sup> F. C. DONDEERS. *Onderzoekingen etc.* 3. Reeks. D. VIII. 170. Auch in *Du Bois Reymond's Archiv für Physiologie*. 1884. S. 518.

der zu ihnen gehörte und zuerst eine genauere Untersuchung dieses Zustandes gab, Daltonismus (*Anerythropsia* nach GOETHE) genannt wird. Da die englischen Naturforscher gegen diese Art, den Namen ihres berühmten Landsmannes durch einen seiner Fehler zu verewigen, Einsprache erheben, wollen wir den Zustand Rothblindheit nennen. Individuen, bei denen dieser Zustand vollständig entwickelt ist, sehen im Spectrum nur zwei Farben, die sie meist Blau und Gelb nennen. Zum letzteren rechnen sie das ganze Roth, Orange, Gelb und Grün. Die grünblauen Töne nennen sie grau, den Rest blau. Das äußerste Roth, wenn es lichtschwach ist, sehen sie gar nicht, wohl aber wenn es intensiv ist. Sie zeigen deshalb die rothe Grenze des Spectrum gewöhnlich an einer Stelle an, wo die normalen Augen noch deutlich schwaches Roth sehen. Unter den Körperfarben verwechseln sie das Roth (d. h. Zinnoberroth und röthlich Orange) mit Braun und Grün, wobei dem normalen Auge im allgemeinen die verwechselten rothen Farbentöne viel heller erscheinen, als die braunen und grünen; Goldgelb unterscheiden sie nicht von Gelb, Rosaroth nicht von Blau. Die Mischungen verschiedener Farben dagegen, welche dem normalen Auge gleich erscheinen, erscheinen meist auch den Rothblinden gleich. Schon J. HERSCHEL<sup>1</sup> stellt in Bezug auf DALTON'S Fall die Ansicht auf, daß alle Farben, welche er unterschiede, aus zwei statt aus drei Grundfarben zusammengesetzt gedacht werden könnten. Diese Meinung ist später durch MAXWELL mittels seiner Methode, die Farbenmischung auf dem Farbenkreisel zur Messung zu benutzen, geprüft und bestätigt worden. Für das gesunde Auge läßt sich, wie wir sahen, zwischen jeder vorkommenden Farbe, drei passend gewählten Grundfarben, ferner Weiß und Schwarz eine Farbengleichung herstellen. Bei den Rothblinden braucht man, wovon ich mich selbst überzeugt habe, außer

295 Weiß und Schwarz nur zwei Farben (z. B. Gelb und Blau), um mit jeder anderen Farbe die Farbengleichung auf der rotirenden Scheibe herzustellen. Ich benutzte bei meinen Versuchen mit Herrn M., einem jungen Polytechniker, der an physikalische Untersuchungen gewöhnt war, und sich ziemlich empfindlich gegen die Farbenunterschiede zeigte, die für sein Auge noch vorhanden waren, als Hauptfarben Chromgelb und Ultramarin.

Mit Roth (etwa dem des Siegelacks) war ihm identisch eine Mischung von 35° Gelb, 325° Schwarz, die für das normale Auge ein dunkles Olivengrün gab.

Mit Grün identisch (im Farbenton etwa FRAUNHOFER'S Linie *E* entsprechend) ergibt sich aus den Versuchen eine Mischung von 327° Gelb 33° Blau, für das normale Auge Graugelb. Mit Grau identisch 165° Gelb und 195° Blau, für das normale Auge ein schwach röthliches Grau.

Da man nun aus Roth, Gelb, Grün, Blau alle anderen Farbentöne würdemischen können, so ergibt sich, daß für Herrn M. alle aus Gelb und Blau gemischt werden könnten.

<sup>1</sup> In einem Briefe, der angeführt ist in G. WILSON, *on Colour Blindness*. Edinburgh. 1855. p. 60.

Was nun die andere Klasse der Farbenblinden, SEEBECK's erste Klasse, 299 betrifft, so unterscheiden sie sich nach SEEBECK's Angaben von den Rothblinden dadurch, daß sie leicht und sicher über die Übergänge zwischen Violet und Roth urtheilen, die jenen gleichmäßig als Blau erscheinen. Dagegen machen sie Verwechslungen zwischen Grün, Gelb, Blau und Roth. Wenn beide Klassen denselben Farbenton mit Grün verwechseln, so wählen die Individuen dieser Klasse ein gelberes Grün als die Rothblinden. Sie zeigen keine Unempfindlichkeit gegen das äußerste Roth, und verlegen die größte Helligkeit des Spectrum in das Gelb. Auch sie unterscheiden nur zwei Farbtöne im Spectrum, die sie (wahrscheinlich ziemlich richtig) Blau und Roth nennen. Danach kann man vermuthen, daß ihr Übel in einer Unempfindlichkeit der grünempfindenden Nerven besteht.

Violetblindheit ist bisher sehr selten als dauernder Zustand gefunden 847 worden, doch besitzt man im Santonin ein Mittel, welches einen der Violetblindheit ähnlichen Zustand hervorruft. Damit die Wirkung schnell 848 eintrete und nicht zu lange anhalte, nimmt man 10 bis 20 Gran santoninsauren Natrons. Nach 10 bis 15 Minuten fängt die Veränderung an und dauert mehrere Stunden. Uebrigens treten dabei auch Uebelkeiten, große Müdigkeit und Gesichtshallucinationen auf, so daß ein solcher Versuch nicht ohne Beschwerde ist. Durch größere Dosen werden Thiere getödtet. Die der Wirkung des Santonins unterworfenen Personen sehen helle Objecte grüngelb, dunkle Flächen zuweilen mit Violet überzogen; das violette Ende des Spectrum verschwindet. Ihr Farbensystem ist dichromatisch, oder wenigstens annähernd so. Bei den Versuchen von E. ROSE<sup>1</sup> zeigte sich, daß bei mäßiger Stärke der Beleuchtung Farbengleichungen mit nur zwei Grundfarben im Santoninrausch hergestellt werden konnten, aber nicht bei größerer Lichtstärke. Die hergestellten Farbengleichungen blieben aber nicht längere Zeit constant, sondern der Zustand veränderte sich fortdauernd ziemlich merklich. Es waren gelbe und violette Mischfarben, die für gleich erklärt wurden.

Der Querschnitt der Sehnerven, mit dem Augenspiegel betrachtet, zeigte sich nicht gelbgefärbt, so daß keine, oder wenigstens keine merkliche gelbe Färbung der Augenflüssigkeiten vorhanden war. Dagegen waren die Blutgefäße der Netzhaut stark gefüllt.

Auch A. KÖNIG<sup>2</sup> hat Versuche über die Santonwirkung angestellt und 77 gefunden, daß weiße Gegenstände nahehin die Farbe von der Wellenlänge 570—573  $\mu\mu$  zeigen; letztere ist die Complementärfarbe des Violet. Er bestätigt, daß selbst bei hochgesteigerten Santonwirkungen von einer vollständigen Dichromasie des Auges keine Rede ist. Während das violette Ende des Spectrum verschwand, blieb Grünblau und Blau noch erkennbar. Er findet die Erscheinungen mehr denen der Absorption durch ein grüngelbliches Glas (ein

<sup>1</sup> E. ROSE, *Virchow's Archiv* XVI. 283—283. (1859). — XIX. 522—536. (1860). — XX. 245—290. (1860). XXVIII. (1868) und *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* VII. (2) 72—108. (1861).

<sup>2</sup> A. KÖNIG, *Centralblatt für praktische Augenheilkunde* 1888 Decemberheft.

dicke Uranglas) ähnlich, welches das Violet auslöscht, Blau und Blaugrün erheblich schwächt, aber diese Farben doch immerhin deutlich erkennbar läßt. Das Violetsehen auf dunklem Grunde war bei ihm nicht sehr hervortretend. Eine solche Erscheinung der Complementärfarbe auf dunklem Grunde kommt auch sonst vor, wenn man längere Zeit durch starkgefärbte Medien, z. B. ein rothes Glas, gesehen hat. Davon mehr in § 23. W. PREYER<sup>1</sup> sah helles Violet erscheinen, wenn er bei dunkel gehaltenem Auge Santonin nahm; fand dagegen die Auslöschung des spectralen Violet auf den gelben Fleck der Netzhaut beschränkt. A. KÖNIG<sup>2</sup> fand bei einem Kranken, der in einem Skotom der Netzhaut vollkommene Violetblindheit zeigte, den neutralen Punkt im Gelbgrün von 560,4  $\mu$ .

295

**Farbensystem der Dichromaten.** Wenn man GRASMANN'S Sätze über Farbmischung auf ein Auge anwendet, welches die Farbengleichungen des trichromatischen Auges anerkennt, aber Roth mit Grün verwechselt, so folgt, daß die Farbentöne, welche es überhaupt unterscheidet, alle aus zwei anderen Farben, etwa Gelb und Blau, zu mischen seien. Denn wenn Roth und Grün identisch erscheinen, müssen nach jenen Sätzen auch alle Mischfarben aus Roth und Grün identisch erscheinen. Da gleich aussehende Farben gemischt gleich aussehende Mischfarben geben, muß ferner jede Mischung einer bestimmten Quantität Gelb mit passenden Quantitäten aller der Mischfarben aus Roth und Grün, die für das farbenblinde Auge gleiches Aussehen haben, für dieses Auge gleich aussehende Mischfarben geben. Eine der Mischfarben aus Roth und Grün ist aber für das gesunde Auge auch durch Gelb und Blau herzustellen, und kann daher für das farbenblinde Auge statt sämtlicher Mischfarben aus Roth und Grün substituirt werden. Daraus folgt, daß sämtliche Mischfarben aus Gelb, Roth und Grün, für das letztere Auge auch aus Gelb und Blau herzustellen sind, und dasselbe läßt sich ebenso für sämtliche Mischungen aus Blau, Roth und Grün beweisen. Da endlich aus Roth, Gelb, Grün, Blau sämtliche Farbentöne für das gesunde Auge mischbar sind, sind es für das farbenblinde alle Farbentöne aus Gelb und Blau.

Sind die Farben in der Ebene nach den Principien der Schwerpunktsconstruction geordnet, so müssen alle solche Farben, welche den Farbenblinden bei passender Lichtstärke gleich erscheinen, in einer geraden Linie liegen, da auf der Verbindungslinie zweier Farbenorte deren Mischfarben liegen, und diese von gleichem Farbenton erscheinen müssen, wenn die ursprünglichen Farben gleich aussehen. Ferner läßt sich zeigen, daß alle diese geraden Linien entweder parallel sind, oder sich in einem Punkte schneiden, und daß die diesem Schnittpunkte angehörige Farbe dem farbenblinden Auge unsichtbar sein muß.

Es erscheine dem Farbenblinden die Quantität  $r$  der in *R Fig. 150* befindlichen Farbe gleich der Quantität  $g$  der in *G* befindlichen. Nun ist

$$r = nr + (1 - n)r.$$

<sup>1</sup> W. PREYER, *Pflüger's Archiv*. Bd. I. S. 303—305. 1868.

<sup>2</sup> A. KÖNIG, *Verhandl. d. Physik. Gesellsch. zu Berlin*. 1885. Nov. 6.



Mit der Menge  $nr$  der Farbe  $R$  ist gleich aussehend die Menge  $ng$  der Farbe  $G$ ; also wenn  $n$  ein ächter Bruch, ist gleich aussehend die Menge  $r$  der Farbe  $R$  mit der Mischung  $(1-n)r$  von  $R$  und  $ng$  von  $G$ . In der Farbenfläche ist diese Mischfarbe zu finden im Punkte  $S$  der Linie  $RG$ , wenn

$$RS : SG = ng : (1-n)r \dots\dots\dots 1)$$

und die Quantität  $s$  der so gewonnenen Mischfarbe ist

$$s = ng + (1-n)r.$$

Das Aussehen dieser Quantität  $s$  von der Farbe  $S$  ist für das farbenblinde Auge unabhängig von dem Werthe von  $n$ .

Wenn wir nun die Quantität  $b$  der Farbe  $B$  mit der Quantität  $s$  der Farbe  $S$  mischen, so erhalten wir eine Mischfarbe, deren Aussehen für das farbenblinde Auge unabhängig von der veränderlichen Gröfse  $n$  ist. Der Ort der Farbe sei  $T$ , ihre Menge  $t$ , so ist

$$t = b + s = b + ng + (1-n)r$$

$$TS : BT = b : s = b : [ng + (1-n)r] \dots\dots\dots 1a).$$

Fällen wir aus  $B$  das Loth  $BH$  auf  $RG$  und aus  $T$  das Loth  $TL$  auf  $BH$ , nennen wir

$$\begin{array}{ll} LH = x & BH = h \\ TL = y & HG = a \\ & RG = c \end{array}$$

so ist nach 1a)

$$\frac{x}{h} = \frac{LH}{BH} = \frac{TS}{BS} = \frac{b}{b + ng + (1-n)r} \dots\dots\dots 1b)$$

$$\frac{y}{h-x} = \frac{TL}{BL} = \frac{SH}{BH} = \frac{SG-a}{h}.$$

Nun folgt aus 1)

$$SG = c \cdot \frac{(1-n)r}{ng + (1-n)r},$$

also

$$\frac{y}{h-x} = \frac{(c-a)(1-n)r - ang}{h[ng + (1-n)r]} \dots\dots\dots 1c).$$

wenn man aus 1b) und 1c) die veränderliche Gröfse  $n$  eliminirt, so erhält man eine Gleichung zwischen den rechtwinkligen Coordinaten des Punktes  $T$ , nämlich

$$0 = ybh(g-r) - x[crh + br(c-a) + abg] + bh[(c-a)r + ag] \dots\dots\dots 1d).$$




Fig. 150.

Da dies eine lineare Gleichung zwischen den rechtwinkligen Coordinaten  $x$  und  $y$  ist, so liegen die betreffenden Orte  $T$  der für das farbenblinde Auge gleichaussehenden Mischfarben in einer geraden Linie. Es sei  $TQ$  diese gerade Linie,  $Q$  ihr Schnittpunkt mit der Richtung  $RG$ , so ist  $QH = y_0$  der Werth, welchen  $y$  annimmt, wenn man  $x = 0$  setzt

$$y_0 = \frac{(c-a)r + ag}{r-g} \dots\dots\dots 1e)$$

297 Dieser Werth von  $y_0$  ist unabhängig von der Quantität  $b$  der zugemischten Farbe  $B$ , also schneiden sich alle geraden Linien, welche gleich aussehende Mischfarben von  $R$ ,  $G$  und  $B$  enthalten, in demselben Punkte  $Q$ , oder sind sich parallel, wenn  $r = g$  und also  $y_0$  unendlich.

Die Entfernung des Schnittpunktes  $Q$  vom Punkte  $R$  ist

$$y_0 - c + a = \frac{cg}{r-g} = QR \dots\dots\dots 1f)$$

Mischen wir eine Quantität  $q$  der Farbe  $Q$  mit der Quantität  $g$  der Farbe  $G$ , so daß die Farbe  $R$  entsteht, so muß sein

$$\frac{QR}{RG} = \frac{q}{g}$$

oder nach 1f) da  $RG = c$

$$\frac{g}{r-g} = \frac{q}{g}$$

$$q = r - g.$$

Die Quantität der Mischfarbe  $R$  wird dann

$$r = g + q.$$

Da nun  $r$  nach der Voraussetzung dem farbenblinden Auge gleichaussehend ist mit  $g$ , die Quantität  $q = r - g$  aber im allgemeinen nicht Null ist, so folgt daraus, daß das farbenblinde Auge die Farbe  $Q$  gar nicht empfinden kann.

Der Schnittpunkt der geraden Linien, welche die gleichaussehenden Farben enthalten, fällt also in den Ort einer Farbe, welche dem farbenblinden Auge fehlt. " Aber es ist hierbei nicht ausgeschlossen, daß diese fehlende Farbe auch dem normalen Auge fehlen könnte, und das Gewicht Null hätte. Das würde heißen, daß zwei der Grundempfindungen des normalen Auges dem farbenblinden durch alle Reizmittel gleich stark erregt würden. In der That ist es neuerdings wahrscheinlich geworden, daß in dieser Richtung die Lösung des Räthfels zu suchen ist.

Die älteren Erklärungsversuche der Farbenblindheit gingen von der erstgenannten Annahme aus, daß den dichromatischen Augen eine der Grundempfindungen fehlte. Ich habe dies in der ersten Auflage dieses Handbuchs selbst angenommen.

297 In der Young'schen Hypothese könnte die dem farbenblinden Auge unsichtbare Farbe natürlich nur eine der Grundfarben sein; denn wenn alle Grundfarben empfunden werden, kann keine andere Farbe, die ja aus den

ben zusammengesetzt ist, fehlen. Wenn man nun diejenigen Farben welche dem Weiße (beziehlich Grau) gleich erscheinen, so werden sein, die für das gesunde Auge entweder Farben vom Farbentone den Grundfarbe oder von ihrer Complementärfarbe sind, in verschiedenen Graden mit Weiße gemischt. Denn alle diese dem Weiße gleich den Farben müssen auf einer geraden Linie liegen. Jede gerade Linie, die in der Farbenfläche durch den Ort des Weiße gezogen ist, in jeder ihrer beiden Hälften Farben von gleichem Farbentone und in gleichen Graden der Sättigung. Die Farben der einen Hälfte sind den der anderen complementär. Jede solche Linie, welche gleiche Farben enthält, muß aber auch, wie eben bewiesen, durch den fehlenden Grundfarbe gehen, folglich in ihrer einen Hälfte die vom gleichen Farbentone mit der Grundfarbe enthalten. Bei den Linien, welche ich mit Herrn M. anstellte, zeigte sich, daß dem reinen Roth erschien ein Roth, welches sehr nahe dem äußersten Roth des Spectrum im Farbentone entsprach ( $38^{\circ}$  Ultramarin,  $322^{\circ}$  Zinnoberroth), ein wenig nach der Seite des Purpur abwich, und ein entsprechendes, ein wenig bläueres Blaugrün ( $59^{\circ}$  Ultramarin,  $301^{\circ}$  Parisergrün). MAXWELL hat gefunden für das Roth  $6^{\circ}$  Ultramarin,  $94^{\circ}$  Zinnober, für das Blau Ultramarin,  $60^{\circ}$  Parisergrün. Da nun außerdem das Roth für Augen viel dunkler erschien als das Grau, dieses aber heller als das Roth, so wird kein Zweifel bleiben, daß das Roth und nicht das Grün den Farben entsprechen mußte. Die Rothblindheit würde also nach der Hypothese für eine Lähmung der rothempfindenden Nerven zu erklären.<sup>1</sup>

298

nun wirklich ein dem äußersten Roth des Spectrum nahe stehendes eine Grundfarbe ist, so können die beiden anderen wenigstens weitgehend von dem von YOUNG gewählten Grün und Violet abweichen. Es würde nun folgen, daß die Rothblinden nur Grün, Violet und Blau empfinden. Das spectrale Roth, welches nur für die grünempfindenden, fast gar nicht die violetempfindenden Nerven scheint, müßte ihnen danach als gesättigtes, lichtschwaches Roth erscheinen, und zwar gesättigter als uns das wirkliche Grün des Spectrum erscheint, dem schon merkliche Mengen der anderen Farben beigemischt sein müssen. Lichtschwaches Roth, welches die rothempfindenden normalen Augen noch genügend erregt, erregt dagegen ihre

<sup>1</sup> Ich finden kann, gebührt Herrn W. PREYER (vergl. W. PREYER, *Pflüger's Archiv*, 481; auch separat erschienen unter dem Titel: *Über den Farben- und Temperatursinn in Beziehung auf Farbenblindheit*, Bonn 1881) das Verdienst, zuerst auf die Priorität YOUNG's Erklärung der sog. „Farbenblindheit“ durch das Fehlen oder die Lähmung einer der drei Netzhaut hingewiesen zu haben. YOUNG spricht die hier erwähnte Auffassung aus in einer Stelle, er in dem von ihm herausgegebenen „*Catalogue of works relating to natural philosophy and the arts*“ an die von J. DALTON verfaßte Abhandlung „*on some facts relating to the colour vision*“ (*Memoirs of Lit. and Phil. Soc. of Manchester* V. 28) anknüpft. Die bezügliche Stelle lautet: „*it is more simple to suppose the absence or paralysis of those fibres of the retina, which are sensitive to red*“.

grünempfindenden Nerven nicht mehr genügend, und erscheint ihnen deshalb schwarz.

Spectrales Gelb würde als lichtstarkes gesättigtes Grün erscheinen, und da es eben eine lichtstärkere und beinahe gesättigte Abstufung dieser Farbe bildet, erschiene es erklärlich, daß danach die Rothblinden den Namen der Farbe wählen, den sie von Andern dafür brauchen hören, und alle diese eigentlich grünen Töne Gelb nennen.

Grün wird schon im Vergleich zu den vorigen eine Einmischung von der anderen Grundfarbe zeigen, also eine zwar lichtstärkere aber weißliche Abstufung derselben Farbe sein wie Roth und Gelb. Die größte Lichtintensität des Spectrum erscheint den Rothblinden nach den Beobachtungen von SEEBECK auch nicht wie normalen Augen im Gelb, sondern im Grünblau. In der That, wenn die Erregung der grünempfindenden Nerven, wie wir voraussetzen müssen, im Grün am stärksten ist, wird für die Rothblinden das Maximum der gesamten Erregung etwas nach der Seite des Blau fallen, weil hier die Erregung der violetempfindenden Nerven steigt. Weiß im Sinne der Rothblinden ist natürlich eine Mischung ihrer beiden Grundfarben in einem bestimmten Verhältniß, welche uns grünblau erscheint, daher sie denn auch die Übergangsstufen im Spectrum von Grün zu Blau für graue Farben erklären.

Weiter im Spectrum gewinnt die zweite Grundfarbe das Übergewicht, die sie Blau nennen, weil das Indigblau, wenn auch in ihrem Sinne noch etwas weißlich, doch durch seine Lichtstärke ihnen ein mehr in die Augen fallender Repräsentant dieser Farbe sein wird als das Violet. Sie erkennen den Unterschied im Aussehen zwischen Blau und Violet. Der von SEEBECK untersuchte H. wußte die Grenze zu zeigen, erklärte aber, er würde das Violet lieber Dunkelblau nennen. Übrigens müssen ihnen die blauen Töne ziemlich ebenso erscheinen, wie den normalen Augen, weil hier auch für diese die Einmischung des Roth sehr klein sein wird.

Da ihnen alle diese Farben des Spectrum noch gewisse, wenn auch feinere Unterschiede zeigen müssen, ist es erklärlich, daß sie bei größerer Aufmerksamkeit und Übung auch wohl lernen, sehr gesättigte Farben richtig zu benennen. Bei weißlicheren Farben aber müssen die genannten Unterscheidungsmerkmale sie im Stich lassen; da können sie sich der Verwechslung nicht entziehen.

n Da es immerhin zweifelhaft erscheint, welchen Empfindungen des normalen Auges die beiden Farbenempfindungen der Dichromaten entsprechen, so hat Herr DONDERS vorgeschlagen, nach dem Sprachgebrauche der Male die der rothen weniger brechbaren Hälfte des Spectrum entsprechende Farbe als die warme Farbe, die der blauen Hälfte als die kalte Farbe zu bezeichnen, wie auch wir im Folgenden thun wollen.

Da man jede Farbe des dichromatischen Auges aus den zwei Grundfarben des Spectrum mischen kann, so ist die Aufgabe, die Curve der



Empfindungen durch Messungen zu bestimmen, für diese Augen viel  
 er, als für die dreifarbigigen. Es war das schon nach einer von  
 vorgeschlagenen Methode durch Herrn VAN DER WEYDE<sup>1</sup> geschehen,  
 dann von den Herren A. KÖNIG und C. DIETERICI<sup>2</sup> ebenfalls durch-  
 worden mit geringen Abweichungen in den Resultaten, die sich aus  
 etwas anderen Wahl des als normal betrachteten Weifs zu erklären  
 n.




Fig. 151.

Fig. 151 sind unter  $W_1$  und  $K$  die Curven für die beiden Empfin-  
 zweier Grünblinden dargestellt (Herr W. WALDEYER und E. BRODHUN),  
 und  $W_2$  und  $K$  die für zwei Rothblinde (Herrn L. KRANKE und Herrn  
 LAKY) giebt. Die Curve  $H$  endlich bezieht sich auf ein monochroma-  
 Auge, welches gar keine Farben und nur Helligkeiten unterscheidet.  
 der letzteren Art sind verhältnißmäfsig selten und auch in andern  
 ungen als leidend und krank zu bezeichnen.

Die Erklärung der Dichromasie wurde bezweifelt, weil die augenärztlichen  
 nachungen eine grössere Mannigfaltigkeit von Fällen anzuzeigen schienen,  
 der Annahme des Mangels einer der Grundempfindungen entspricht,  
 auch die extremen Fälle, welche man als Rothblindheit oder Grün-  
 mit bezeichnen kann, verhältnißmäfsig häufiger constatirt wurden, als  
 Übergänge zwischen beiden. Aber sowohl die scheinbar weisse Stelle

<sup>1</sup> A. VAN DER WEYDE, *Onderzoekingen gedaan in het Physiolog. Labor. d. Utrechtsche Hoogeschool*. 3 R.  
 Bl. 1. 1881. — *Graefes Archiv* Bd. 28 (1). S. 1. 1882.

<sup>2</sup> A. KÖNIG und C. DIETERICI, *Sitzungsberichte der Berl. Akademie* vom 29. Juli 1886. Seite 805.

des Spectrum fiel in verschiedene Wellenlängen hinein, als auch variierte das Roth einerseits, und Blaugrün andererseits, welches auf der Farbenscheibe dem Grau gleichaussehend erschien, während dabei doch einzelne dichromatische Beobachter eine große Sicherheit und Feinheit in der Unterscheidung derjenigen Unterschiede zeigten, die sie überhaupt erkennen konnten, zum Theil sogar eine größere Sicherheit, als die Trichromaten mit ihrem verwickelteren Farbensystem.

Die genaueren mit dem Apparate zur Mischung der Spectralfarben angestellten Versuche der Herren A. KÖNIG und C. DIETERICI haben dagegen, obgleich sie sich auf eine große Zahl von Farbenblinden bezogen, Übergangsfälle noch nicht gezeigt, sondern alle ließen sich unzweifelhaft in die Klasse der Rothblinden oder in die der Grünblinden einreihen; wobei die Individuen jeder Klasse unter einander nur verhältnißmäßig geringe Abweichungen zeigten.

Auch in *Fig. 151* sind die Höhen der Curven so gewählt, daß die Mengen beider Grundfarben, die sich zu Weiß vereinigen, gleich groß genommen sind. Deshalb sind auch hier die Stellen, welche den beiden Arten dichromatischer Augen weiß erscheinen müssen, diejenigen, wo sich die Curve des entsprechenden *W* mit der Curve *K* schneidet. Sie liegen ziemlich nahe zusammen über etwa 502 bis 492  $\mu$  der Grundlinie. Da nun diese Stelle außerdem genau in das Band der starken Absorption des gelben Flecks fällt, so erklärt sich daraus der Umstand, daß die Wellenlänge der weiß erscheinenden Farbe bei den Dichromaten etwas schwankend ist, und sich Fälle beider Seiten gelegentlich der Mitte des schmalen Intervalls nähern. Daher ist in der That die Wellenlänge der weiß erscheinenden Spectralfarbe kein scharfes Merkzeichen für den Unterschied beider Klassen.<sup>1</sup>

Die wichtigste Frage für die Theorie ist hierbei die, ob im dichromatischen Auge die Curven, welche die Abhängigkeit der drei Elementarerregerungen von den Wellenlängen darstellen, unveränderlich und unverändert seien. Dies schien allerdings aus der Erfahrung hervorzugehen, daß wenigstens im Gebiete der stärker gemischten Körperfarben die Dichromaten keine Unterschiede machen zwischen Farbenpaaren, die den Trichromaten gleich erscheinen. Freilich darf man diesen Satz nur als sehr angenähert richtig betrachten. Derselbe, ganz streng genommen, würde zunächst erfordern, daß alle trichromatischen Augen in ihren Aussagen über Farbenmischung unter einander übereinstimmen, was durchaus nicht der Fall ist. Jedenfalls müssen wir hierbei zunächst die zweite Klasse der trichromatischen Augen ausscheiden. Einfaches Natriumlicht und eine Mischung von Grün und Roth, die der einen Klasse gleich erscheinen würde, wird von der anderen unterschieden. Aber auch bei den Beobachtungen mit dem Leukoskop,<sup>2</sup> wo man zwei complementäre Farben, welche dickere Quarzplatten im polarisirten Licht geben, möglichst nahe gleich unter einander zu machen strebt, zeigen sich kleine Unter-

<sup>1</sup> A. KÖNIG. *Gräfe's Archiv für Ophthalm.* Bd. 30(2) S. 155. 1884 und *Wiedemann's Annalen* Bd. 22. S. 567. 1884.

<sup>2</sup> DIRO KITAO. *Zur Farbentheorie.* Dissertation. Göttingen, 1878.

A. KÖNIG. *Wiedemann's Annalen* Bd. 17. p. 990. 1882.—*Zeitschrift für Instrumentenkunde* 1883. p. 20.

E. BRODHUN. *Wiedemann's Annalen.* Bd. 34. p. 897. 1888.



ede bei fast allen trichromatischen Beobachtern ebenso in der Verschieden-  
der Curven der *Fig. 145* für verschiedene Beobachter. Färbung der Augen-  
lien würde allerdings solche Veränderungen der Curven auch hervor-  
gen können, weil dadurch die Lichtintensität verschiedener Theile des  
pectrum in verschiedenem Maasse geändert werden würde. Aber  
so starke Absorption, wie sie vorhanden sein müßte, um den  
verschied der beiden Klassen der Trichromaten zu erklären, wo bis zu  
i Dritteln der einen Farbe bei der einen oder andern Klasse absorbiert  
den müßten, würde sich nur durch eine hochgradige blaugrüne oder  
erthothe Färbung der Augenmedien erklären lassen, die sicher nicht da  
Unter diesen Umständen kann es nicht zweifelhaft sein, dafs es Fälle  
et, wo die Intensität der Erregung jeder Grundfarbe in verschiedenen  
gen eine verschiedene Function der Wellenlänge des Lichts ist, und  
nte hierin auch der Grund der verschiedenen Gestalt der Curven in  
149 für verschiedene Beobachter gesucht werden.

Wenn wir dabei von der Hypothese der Erregung der Netzhaut durch photo-  
mische Zersetzungen ausgehen, so könnte man an Änderungen in der Beschaffenheit  
Mischung solcher Substanzen denken, die in den Endelementen der Netzhaut  
en, wodurch die Abhängigkeit ihrer Zersetzbarkeit von der Wellenlänge geändert  
den könnte. Wie sehr eingreifende Änderungen in dieser Beziehung bei den  
ersalzen, je nach der Art der Präparation oder bei Zumischungen fremder Stoffe  
erzielen sind, haben die neueren Fortschritte der Photographie gezeigt.

Während nun die Eigenthümlichkeit der anomalen Trichromaten dadurch  
ärt werden könnte, dafs ihre grünempfindliche Substanz der rothemphindlichen  
licher geworden ist, würden sich dichromatische Augen ergeben, wenn der  
verschied beider Substanzen ganz verschwände, wobei sie entweder beide der  
anomalen rothemphindlichen, oder beide der normalen grünempfindlichen ähnlicher  
den. Die Gehirnapparate könnten dabei unverändert functioniren.

Unter diesen Umständen würde in beiden Klassen von Farbenblinden jedes  
ut der normalen Endstrecke und Zwischenstrecke die Empfindung erregen,  
ehe das normale Auge im Gelb hat, und in der Mittelstrecke würde dies Gelb  
ch Zumischung von Violet weifslicher werden, in der brechbareren Endstrecke  
Violet übrig bleiben. Dagegen würden sich die beiden Klassen dadurch unter-  
iden, dafs für die, deren Grüncurve in die Rothcurve hinübergewandert ist, die  
ben des rothen Endes verhältnißmäfsig lichtstark erscheinen, die des mittleren  
n dagegen lichtschwächer. Diese würden SEEBECK's Grünblinden entsprechen.

Wenn dagegen die Rothcurve zur Grüncurve hinübergewandert ist, hätten wir  
nge Empfindlichkeit für das Licht des rothen Endes zu erwarten, vermehrte  
das mittlere Grün. Es würde dies dem Zustande der Rothblindheit ent-  
prechen. Dazwischen könnten Übergänge vorkommen. Doch scheinen, wie schon  
erkt, die Übergänge mindestens viel seltener zu sein, als die an beiden Grenzen  
enden Fälle.

Wenn man ein trichromatisches Auge und ein dichromatisches vergleicht  
denen letzteres alle Farbengleichungen des ersteren als richtig anerkennt,  
die beide NEWTON's Gesetze folgen, so würden die Schlüsse, die oben

S. 363 und 364 gezogen sind, streng richtig sein. Die dem dichromatischen Auge fehlende Grundfarbe wäre dadurch zu finden. Wie schon erwähnt, haben die älteren Farbenmischungsversuche auf den rotirenden Scheiben in dieser Beziehung eine gute Übereinstimmung zwischen den Farbengleichungen der normalen Trichromaten und der Dichromaten ergeben. Diese bestätigt sich aber auch für die Mischungen von Spectralfarben in den Versuchsreihen von A. KÖNIG und C. DIETERICI. Diese haben gefunden, daß man bei der Annahme etwas anderer Grundempfindungen als der anfangs gewählten beiden Grenzfarben des Spectrum die beiden dichromatischen ziemlich gut mit denen der normalen trichromatischen Augen vereinigen kann, der älteren Hypothese entsprechend, wonach bei den Dichromaten eine der Grundempfindungen fehlen sollte. Die hierzu nöthigen Grundfarben wären, wenn wir mit  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{B}$  die der normalen Trichromaten bezeichnen:

$$\mathfrak{R} = \frac{R - 0,15 \cdot G + 0,1 \cdot V}{0,95}$$

$$\mathfrak{G} = \frac{0,25 \cdot R + G}{1,25}$$

$$\mathfrak{B} = V.$$




Fig. 152.

Das Roth hierfür wäre also etwas mehr zum Purpur hinüberziehend, als das äußerste Roth des Spectrum. Diese Curven sind in Fig. 152 dargestellt.  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{B}$  wären die Curven der von den genannten Beobachtern neu gewählten Grundempfindungen für die normalen Trichromaten,  $\mathfrak{R}_2$  und  $\mathfrak{B}_2$  für die Rothblinden,  $\mathfrak{R}_1$  und  $\mathfrak{B}_1$  für die Grünblinden. Die anomalen Trichromaten und die Monochromaten sind aber nicht in dieser Weise unter-



en; bei ihnen müssen wirklich individuelle Änderungen in der Ab-  
 eit der Empfindlichkeit von der Wellenlänge vorkommen. Die ersteren  
 dem entsprechend auch weit abweichende Farbengleichungen. Die  
 n können überhaupt keine solche geben.

Die Darstellung des Farbdreiecks in *Fig. 139* bezieht sich auf diese  
 art der Berechnung aus den Elementarfarben  $R$ ,  $G$  und  $B$ . Es ist  
 zu beachten, daß die beiden Endfarben des Spectrum, welche die  
 Beobachter zuerst als  $R$  und  $V$  gebraucht haben, reelle Farben sind,  
 h YOUNG'S Theorie nur aus positiven Werthen der Grundfarben zu-  
 gesetzt sein können. Ihr ursprüngliches elementares Grün ist dagegen  
 eine Rechnungsgröße, welche auch negative Bestandtheile enthalten

Wenn man aber negatives Roth darin annimmt, würde dieses sich  
 m positiven Roth der Rothcurve abziehen können, so weit diese  
 Jenseits ihres brechbaren Endes aber müßte dann auch positives  
 Violet angenommen werden, damit nirgends negatives Roth übrig  
 Ähnlich, wenn man negatives Violet im erstgefundenen Grün an-  
 müßte auch das spectrale Roth eine Zumischung von positivem  
 enthalten. In dieser Weise sind die Annahmen, die man über die  
 ensetzung der erstgewählten Elementarfarben aus Grundfarben machen  
 doch einigermaßen eingeschränkt.

is die Untersuchung Farbenblinder betrifft, so wird durch Fragen, wie sie 299  
 er jene Farbe nennen, natürlich nur außerordentlich wenig ermittelt werden,  
 e Farbenblinden befinden sich in der Lage, das System von Namen, welches  
 Empfindungen des normalen Auges zurecht gemacht ist, auf ihre Empfin-  
 anwenden zu müssen, für die es nicht paßt. Es paßt nicht nur nicht,  
 zu viele Namen für Farbentöne enthält, sondern in der Reihe der Spectral-  
 bezeichnen wir Unterschiede als solche des Farbentons, die für die Farben-  
 nur Unterschiede der Sättigung oder der Lichtstärke sind. Ob das, was  
 o und Blau nennen, unserem Gelb und Blau entspricht, ist durchaus zweifel-  
 Deshalb erfolgen ihre Antworten auf Fragen über Farben meist langsam und  
 , und erscheinen uns verwirrt und widersprechend.

el besser, aber doch noch sehr unzureichend ist die Methode von SEEBECK,  
 ebenblinden eine Auswahl gefärbter Papiere oder Proben von Stickwolle zu  
 mit der Aufforderung, sie nach ihrer Ähnlichkeit zusammen zu ordnen.  
 e Anzahl der Farbenproben müßte ungeheuer groß sein, wenn darin die  
 ristisch verwechselten Farbentöne auch genau gerade in der nöthigen Ver-  
 g mit Weiß, und der nöthigen Helligkeit vorkommen sollen, daß die voll-  
 Gleichheit für das farbenblinde Auge erzielt wird. So lange aber nur  
 keit da ist, wird man sich schwer darüber verständigen, ob die Differenz  
 s Farbentons, oder der Sättigung, oder der Helligkeit ist. Man wird also  
 ch Zufall einige wenige bestimmte Resultate erhalten können.

gegen erlaubt der nach MAXWELL'S Methode eingerichtete Farbenkreisel  
 die nothwendigen Data mit großer Genauigkeit zu erhalten, weil man sehr  
 eine Reihe von Farben durch Mischung erzeugen kann, die dem farbenblinden  
 vollkommen gleich erscheinen. Dabei ist die Hauptsache, die den Grund-  
 er des Mangels bezeichnet, zu ermitteln, welche zwei Farben mit reinem

300 Grau, wie man es durch die Mischung von Weiß und Schwarz auf dem Kreisel erhält, verwechselt werden. Eine davon, die dann dem farbenblinden Auge verhältnißmäßig viel dunkler als dem normalen erscheint, wäre die fehlende Grundfarbe. Dabei wird sich auch leicht ermitteln lassen, ob noch ein gewisser Rest von Empfindlichkeit für die fehlende Grundfarbe vorhanden ist.

„ Sehr zweckmäßig ist auch für die schnelle Bestimmung der wesentlichen Züge einer Dichromasie die zuerst von E. ROSE angewendete, schon oben S. 361 erwähnte Methode, die von einer Quarzplatte zwischen einem NICOL'schen Prisma und einem Doppelspath erzeugten complementären Farben zu vergleichen. Man läßt den Nicol so drehen, bis dem Dichromaten die beiden complementären Farben gleich erscheinen, und sieht dann zu, welche Farben er verwechselt. Sehr gut und vollständig lassen sich solche Beobachtungen auch mit dem Leukoskop machen (Siehe oben S. 368), einem Instrumente ähnlicher Art, in welchem die Dicke der eingeschalteten Quarze geändert werden und genaue Bestimmungen der Drehung des Nicol gemacht werden können. Ich hatte dieses Instrument construiren lassen, um für die von der Temperatur der Flammen herrührenden Unterschiede in der Mischung des Lichts ein Maafs zu gewinnen. Trichromaten bekommen darin bei mäßigen Quarzdicken überhaupt keine vollkommene Uebereinstimmung der beiden complementären Farben, d. h. keine von diesen wird vollkommen weiß; doch können sie ziemlich gut so einstellen, daß keine der beiden Farben röther als die andere erscheine. Dabei zeigen sich aber auffallende individuelle Unterschiede, selbst zwischen den beiden Augen desselben Beobachters. Dichromaten dagegen stellen auf absolute Gleichheit ein, und der Winkel, um den der Nicol gedreht ist, giebt dann ein Maafs für die Art ihrer Dichromasie.<sup>1</sup>

300 Will man die hier auseinander gesetzte Theorie prüfen, so muß man ferner bestimmen, ob jede gegebene Farbe, namentlich die Hauptfarben des Spectrum, für den Farbenblinden aus zwei passend gewählten Farben zusammengesetzt werden könne.

G. WILSON hat namentlich darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich die Farbenblindheit auf Schiffen und Eisenbahnzügen werden könne, wo es darauf ankommt, farbige Signale zu erkennen. Er fand im Durchschnitt einen Farbenblinden unter 17,7 Personen.

### Farbenblindheit der Netzhautperipherie.

„ Ähnliche Abweichungen, wie bei den vollständigen Dichromaten kommen auch in der Peripherie des Gesichtsfeldes bei den normalen Trichromaten vor, und zwar am stärksten entwickelt in dem lateralen Theile der Netzhaut, der in gewöhnlicher Augenstellung das Bild des Nasenrückens empfängt. Wenn man das rechte Auge, ohne den Kopf zu drehen, stark nach rechts wendet, und nun ein Quadrat farbigen Papiers von etwa 3 bis 10 cm Seite mit ausgestrecktem linken Arm von der Seite her vorschiebt, so daß es anfängt, vor dem seitlich das Gesichtsfeld begrenzenden Nasenrücken sichtbar zu werden, so bemerkt man eine äußerste Zone, in der überhaupt keine Farben unterschieden werden, auch nicht Ultramarinblau von einem

<sup>1</sup> A. KÖNIG, *Centralbl. für prakt. Augenheilk.* 1884. Decemberheft.



sig dunklen Grau, und wo überhaupt alle Farben nur als Abstufungen der Helligkeit von bläulichem Grau erscheinen, Roth am dunkelsten. Man sieht an dieser Stelle des Sehfeldes auch die Umrisse verhältnißmäßig schlecht, und erkennt nur größere, namentlich bewegte Objecten. Aber der Farbeindruck fehlt doch noch an Stellen, wo man die Umrisse der helleren und, die noch weiter nach den Grenzen des Gesichtsfeldes hin liegt als das farbige Papier, erkennen kann. Man muß natürlich dafür sorgen, daß die betreffenden Papiere von vorn voll beleuchtet sind, und auch, um das Verlöschen der Farben durch Nachbilder zu vermeiden, sie hin und her bewegen dem Rande des Gesichtsfeldes parallel. Der Hintergrund, auf den sich projeciren, muß dunkel sein.

Weiter gegen die Mitte des Gesichtsfeldes schließt sich daran eine Zone, in der der Unterschied von gelb und blau deutlich hervortritt, dagegen das getriggerte Roth fast schwarz oder dunkelgelbbraun, Blattgrün gelblich weiß erscheint. Zwischen diesen beiden Zonen ist für mein Auge die Grenze ziemlich scharf, ja bei schmalen Objecten scheint mir das auftauchende Roth plötzlich etwas anders localisirt, als das vorher graue Bild hervorzutreten, so daß das Gesamtbild eine Art plötzlichen Ruckes erleidet, als ob es über eine Falte der Netzhaut spränge. Endlich noch weiter der Rand zu tritt auch der Gegensatz zwischen Roth und Grün voll zur Erscheinung.

Auch die Herren SCHELSKE<sup>1</sup>, AUBERT<sup>2</sup>, KLUG<sup>3</sup>, J. v. KRIES<sup>4</sup> haben mit ihren Abweichungen übereinstimmende Angaben gemacht. Der erstgenannte hat auch mit spectrumem Licht beobachtet, wobei spectrumales Gelb und Blaugrün (Linie F) durch grünlichere Farbentöne hindurchgingen, ehe sie farblos wurden. Er maß auch die Winkelausdehnung, und fand für die normale Empfindung an der Nasenseite des Gesichtsfeldes 53°, an der Temporalseite 68°, nach oben 38°, nach unten 37°. Derselbe hat auch Vergleichungen für die rothblinde Zone der Netzhaut mittels rotirender Scheiben hergestellt, und diese dem Zustande eines dichromatischen Auges entsprechend gefunden.

Die Benennungen, welche wir den Farbeindrücken auf der Peripherie der Netzhaut geben, erklären sich am leichtesten unter der Annahme, daß die rothblinden Zone die rothempfindliche, photochemische Substanz der Netzhaut empfindlichen ähnlich geworden sei, in der äußersten Zone alle drei Empfindungen gleich. Dieselben Bezeichnungen sind übrigens auch von den Autoren in denjenigen seltenen Fällen für die Farben des dichromatischen Auges angewendet worden, wo ein früher trichromatisches Auge durch Krankheit dichromatisch wurde, oder von den beiden Augen desselben Individuum eines dichromatisch, das andre trichromatisch war.

<sup>1</sup> R. SCHELSKE, *Graefes's Archiv für Ophthalmol.* IX (3). S. 39.

<sup>2</sup> H. AUBERT, *Physiol. Optik.* S. 544.

<sup>3</sup> KLUG, *Graefes's Archiv für Ophthalmol.* XXXI (1).

<sup>4</sup> J. v. KRIES, *Die Gesichtsempfindungen.* Leipzig, 1882. S. 93.

Übrigens will ich dabei bemerken, daß ich diesen Umstand nicht für beweisend für die genannte Hypothese des Übergangs einer lichtempfindlichen Endsubstanz in eine andere halte, obgleich die Thatsachen sich so am leichtesten erklären lassen. Denn auch wenn eine der Grundempfindungen fehlte, würden wir lernen, welche Empfindungen in den peripherischen Theilen dem häufigsten und intensivsten Lichteindrücke, der Farbe der am hellsten erleuchteten Körper entsprechen. Dieser verkündet uns objectives Weiß: was wir davon unterscheiden können, würde dann nach der Art seines Unterschiedes von der dem Weiß entsprechenden Empfindung abgeschätzt werden. Wenn uns also eine Grundempfindung, z. B. Roth, fehlt, so deuten wir den Rest wahrnehmbarer Farben als Farben einer Linie, die im Farbendreieck durch den Ort des Weißs parallel der Verbindungslinie der beiden noch erhaltenen Grundfarben gelegt ist. Diese würde, wenn Roth fehlt, von Gelb durch Weiß zu Blau gehen.

Da wir überhaupt im Stande sind, den Unterschied des dichromatischen Farbensehens in der Peripherie unserer Netzhaut mit dem trichromatischen der Mitte zu übersehen, und er durch Jahrtausende übersehen worden ist, bis die physiologische Beobachtung besonders auf diesen Punkt gerichtet wurde, können wir daran ermessen, bis zu welchem Grade unsere auf die Beurtheilung der Körperfarben gerichtete Einübung bei der Abschätzung qualitativer Unterschiede der gesehenen Objecte mitwirkt.

#### Farben kleiner Felder.

300 Schliesslich muß noch erwähnt werden, daß Farben vom Auge nur dann unterschieden werden, wenn sie ein Feld von gewisser Ausdehnung bedecken, und eine gewisse Menge farbigen Lichts in das Auge fällt. Je weiter das farbige Feld nach den Grenzen des Gesichtsfeldes und der Netzhaut hin liegt, desto größer muß es sein, damit seine Farbe noch erkannt werden könne. Ist das farbige Feld zu klein, so erscheint es auf hellerem Grunde grau oder schwarz, auf dunklerem Grunde grau oder weiß. Indessen kann auch die Farbe von unendlich kleinen Feldern erkannt werden, wenn die Menge des Lichts, die sie aussenden, endlich ist, wie z. B. bei den Fixsternen, deren Farben wir unterscheiden. Nach den Versuchen von AUBERT<sup>1</sup> erschien ein Quadrat von 1 Millimeter Seite, wenn es blau auf weißem Grunde war, in 10 Fufs Entfernung schwarz, ebenso ein rothes in 20 Fufs Entfernung. Ein gelbes und grünes verschwammen schon in 12 Fufs vollständig mit dem weißen Grunde. Auf schwarzem Grunde dagegen erschienen das grüne und gelbe Quadratmillimeter in 16 Fufs Entfernung als graue Punkte, das rothe bei 12 Fufs. Blau erschien blau, wenn es überhaupt gesehen wurde.

Nach demselben Beobachter verschwindet die Farbe von farbigen Quadraten in 200 Millimeter Entfernung im Mittel unter folgenden Abweichungswinkeln von der Gesichtslinie:

<sup>1</sup> H. AUBERT, *Graefe's Archiv für Ophthalmologie*. Bd. 3(2).



	Roth.				Blau.				Gelb.				Grün.			
Quadrats.....	1.	2.	4.	8.	1.	2.	4.	8.	1.	2.	4.	8.	1.	2.	4.	8.
Grund .....	16°	19°	26°	37°	15°	22°	36°	49°	21°	31°	44°		20°	36°	44°	50°
Grund .....	30	32	42	53	36	48	54	72	30	32	49	47°	24	27	35	45
.....	23	26	34	45	26	35	45	61	26	32	42		22	32	40	47

bei ist zu bemerken, daß der Farbenton desto eher verschwindet, je die Verschiedenheit der Helligkeit von der des Grundes ist, woher verschiedene zwischen den Resultaten auf weißem und schwarzem rühren. Das Blau war die dunkelste der von AUBERT benutzten

die Farben ganz verschwinden, erleiden sie noch eine ähnliche g des Farbentons, wie bei der Vermehrung ihrer Intensität. Roth werden nämlich sehr deutlich Gelb, Blau scheint direct in Grauerzugehen. Ich komme auf diese Erscheinungen noch einmal im Paragraphen zurück.

Genauigkeit der Genauigkeit für das Farbenmischungsgesetz.

Das Gesetz der ungestörten Superposition der Elementarerregungen ist ein verhältnißmäßig recht genauer Ausdruck eines breiten Gebietes Erscheinungen, und hatte sich den älteren Beobachtungsmethoden gegenüber bewährt, namentlich wo man die matten Farbeneigenen und geringen Lichtstärken von Pigmentfarben für die Versuche benutzte. Die Abweichungen sind bei diesen schon deshalb nicht sicher festzuweil kleine Änderungen in der Mischung des beleuchtenden Lichtes Fehlbildungen etwas zu verändern im Stande sind. Die neueren messenden Versuche mit Spectralfarben scheinen aber doch zu zeigen, Genauigkeit von NEWTON'S Gesetz keine unbeschränkte ist.

Die ersten Beobachtungen dieser Art sind an Dichromaten gemacht von PREYER<sup>1</sup>, A. KÖNIG<sup>2</sup>, VAN DER WEYDE<sup>3</sup>. Sie ergaben, daß schwächerer Beleuchtung weiß erscheinende Farbe des Spectrum seiner Helligkeit gelblicher erschien, und durch eine bläulichere werden mußte, um dem Weiß des beleuchteten Lichtes gleich zu Farbengleichungen zwischen einer einfachen mittleren Spectralfarbe, dem Gemisch von zwei andern hat dann Herr E. BRODHUN<sup>4</sup> (grün unter Herrn A. KÖNIG'S Leitung aufgestellt, und dabei ebenfalls gelaß bei steigender Intensität mehr von der wärmeren Farbe genommen

<sup>1</sup> PREYER, *Pflüger's Archiv* Bd. 25. S. 31. 1881.

<sup>2</sup> KÖNIG, *Wiedemann's Annalen* Bd. 22. S. 561. 1884. — *Graefe's Archiv für Ophthalmol.* S. 155. 1881.

<sup>3</sup> J. VAN DER WEYDE, *Onderzoekingen. Physiol. Labor. Utrecht. R.* (3.) D. VII. Bl. 1. 1881.

<sup>4</sup> KÖNIG, *Sitz-Berichte d. Akademie in Berlin*, 1887, 31. März. S. 311.

werden mußte, um die Gleichung wiederherzustellen. Die Änderungen der Lichtintensität wurden dabei in verschiedener Weise vorgenommen, um jede Änderung der Wellenlänge der verglichenen Farben auszuschließen, theils durch geänderte Stellung der Nicols, theils durch Erweiterung des Ocularspalts, theils durch die der Collimatorspalten. Diese Erweiterung der Spalten erfolgte, der Einrichtung des Apparats gemäß, immer gleichmäßig nach beiden Seiten.

Andeutungen solcher Änderungen sind auch für trichromatische Augen wahrgenommen worden von Herrn ALBERT<sup>2</sup> und A. KÖNIG<sup>3</sup>. Letzterer fand aber nur, daß die Unterschiede der Sättigung zwischen ungemischten oder fast ungemischten gelben Farbentönen und gemischten deutlicher bei schwacher Helligkeit erscheinen.

Bei der in § 18 erörterten grossen Veränderlichkeit der lichtempfindlichen Substanzen der Netzhaut erscheint eine Änderung ihrer photochemischen Zersetzbarkeit den verschiedenen Wellenlängen gegenüber nicht unmöglich. Machen wir die einfachste Annahme, auf die uns schon die Existenz der anomalen Trichromasie geführt hat, daß eine Mischung zweier photochemisch verschiedener Stoffe an den Retinalenden der Sehnervenfaser vorkommen könne, und daß von diesen beiden die eine durch Licht schneller zerstört, beziehlich langsamer hergestellt werde, so würde intensives Licht das Mischungsverhältniß und damit auch die Form der Empfindlichkeitscurve ändern können. Gerade bei Dichromaten, bei denen die eine Curve schon geändert ist, und Uebergänge zwischen den beiden extremen Formen vorzukommen scheinen, wäre eine solche grössere Veränderlichkeit der Mischung wahrscheinlicher.

Man könnte sich etwa denken, daß in einer Gruppe von Netzhautelementen des normalen Auges grünempfindlicher Stoff in den rothempfindlichen regelmäßig übergeführt werde, daß in einzelnen Individuen dies nicht vollständig oder gar nicht gelingt. Diese würden rothblind sein. Wenn in anderen Individuen auch die andere Gruppe von Netzhautelementen, die gegen die Umwandlung geschützt bleiben sollten, vollständig oder unvollständig in die Veränderung hineingezogen würde, so würde Grünblindheit oder anomale Trichromasie entstehen. Wenn starke Lichtwirkung einen kleinen Theil der rothempfindlichen Substanz zunächst in die grünempfindliche zurückführte, ehe diese weiter zerstört wird, würde das Maximum der Empfindlichkeit sich wieder dem Grün nähern, und dadurch der neutrale Punkt des dichromatischen Spectrum gegen das Blau hin verschoben werden.

Ich gebe diese ganz hypothetische Betrachtung hier nur, um zu zeigen, daß die angeführten Thatsachen durchaus nicht NEWTON's Gesetz aufheben; sie würden nur zeigen, daß dasselbe, ähnlich sehr vielen anderen Naturgesetzen, eine erste immerhin sehr gute und innerhalb weiter Grenzen ausreichende Annäherung an die volle Wahrheit giebt.

#### E. HERING's Farbentheorie.

Diese viel besprochene Theorie ist eine Modification von YOUNG's Theorie, welche durch die Wahl anderer Grundempfindungen sich dem, was sie für unmittelbare Thatsachen der inneren Beobachtung ansehen zu müssen glaubt, besser anzu-

<sup>2</sup> E. ALBERT, *Wiedeman's Annalen*. Bd. XVI. S. 129. 1882.

<sup>3</sup> A. KÖNIG *Sitz.-Ber. d. Berl. Akad.* 1887. 81. März S. 317.



versucht. Es werden darin auch drei Elementarempfindungen angenommen, physiologische Vorgänge in drei verschiedenen Theilen des Nervenapparats oder Substanz“ gebunden sind. Mindestens zwei von diesen physiologischen Processen über den Gegensatz von positiv und negativ zeigen. Die eine dieser Sehempfindungen würde im Zustande der Erregung die Empfindung des Weiß geben, in der Ruhe die des Schwarz, die zweite die beiden als „Gegenfarben“ bezeichnenden Empfindungen das Blau und Gelb, die dritte das zweite Paar der Gegenfarben das Roth und Grün. Mit Roth bezeichnet aber Herr HERING eine Farbe, die bisher nicht genannt wurde, die Complementärfarbe des Grünen. Man kann Elementarempfindungen (das Wort in dem oben von uns definirten Sinne gebraucht) angeben, diesen HERING'schen Elementarempfindungen entsprechen, und aus denen sich die Empfindungen zusammensetzen lassen würden.

Wenn man LAMBERT's Farbenpyramide zwischen drei rechtwinkligen Coordinaten aufstellt, so würde die die Weißempfindung darstellende Coordinate  $w$  etwa der Richtung der Pyramide entsprechen, wie schon oben erörtert:

$$u = \sqrt{\frac{1}{3}} [x + y + z]$$

Die Richtung, die den Gegenfarben Roth, Grün entspricht, würde in eine Ebene der Axe des Weiß und des Grün gelegte Ebene fallen, die dritte in eine Ebene gegen diese durch die Axe des Weiß gelegte. Die Entfernung von der Weiß-Ebene wäre in diesem Coordinatensystem

$$v = \sqrt{\frac{1}{2}} (x - z)$$

$v$  würde bei positivem Werthe der Wurzel der Empfindung Gelb, negatives  $v$  die Empfindung Blau entsprechen. Die Entfernung von der Grün-Weiß-Ebene wäre

$$w = \frac{1}{\sqrt{6}} [x - 2y + z]$$

Wenn man drei lineare Functionen der Elementarempfindungen der YOUNG'schen Theorie gewonnen, welche selbst als solche gebraucht werden könnten, und der sie nach den von Herrn HERING verlangten Elementarempfindungen entsprechen. Bei positivem Werthe der Wurzeln würde  $u$  der Weißempfindung, positives  $v$  der Gelb, positives  $w$  dem Purpurroth entsprechen, negatives  $v$  dem Blau, negatives  $w$  dem Grünen.

Die Gleichungen gebe ich hier nur deshalb in so bestimmter Form, um an sie Vorstellungen anzuknüpfen, da die Willkürlichkeit der zu wählenden Grundrichtungen  $x, y, z$  übrigens hinreichende Breite der Veränderlichkeit gewähren würde, um recht verschiedene Deutungen der Coordinaten  $u, v, w$  im Sinne der YOUNG'schen Ansicht zuzulassen. Die Werthe der Coefficienten sind so gewählt, daß  $u, v, w$  in demselben Längenmaßstab zu messen sind, wie die  $x, y, z$ .

Wenn wir für die Werthe der  $x, y, z$  nur positive Grössen zulassen, ergiebt sich zunächst aus dem Werthe von  $w$ , daß jede Art von Licht die Weißempfindung im objectivem Sinne erregen muß, daß im Gegentheil keinerlei Art von objectivem

Licht die Empfindung einer der HERING'schen Gegenfarben rein erregen kann, daß also diese Empfindungen der reinen unvermischten Gegenfarben solche sind, die wir nie gehabt haben, noch jemals werden haben können, und die durch einen viel breiteren unvermittelten Sprung von Allem, was wir je empfunden haben, getrennt sind, als die von der YOUNG'schen Theorie geforderten Farbenempfindungen, welche etwas über das Gebiet der objectiven Farben hinausreichen. Letzteren können wir, wie wir in der Lehre von den Nachbildern sehen werden, durch besondere Behandlung einzelner Netzhautstellen uns wenigstens annähern, während diese selben Methoden das Gegentheil des nach der HERING'schen Theorie zu erwartenden Erfolgs hervorgerufen, wenn man sich seinen hypothetischen reinen Farbenempfindungen zu nähern versuchen möchte.

Ganz in Übereinstimmung mit meiner in diesen Gleichungen dargestellten kurzen Zusammenfassung seiner Theorie nimmt denn auch Herr HERING an, daß weißes Licht nur die weißempfindende Sehsubstanz erregt, und diese immer in positive Thätigkeit versetzt, gelbes Licht daneben auch die Blau-Gelb empfindende Substanz erregt, blaues Licht dieselbe ebenfalls, aber in entgegengesetzter Weise. Wenn beide Lichter sich gerade im Gleichgewicht halten, haben sie dagegen keine Wirkung auf die blaugelbe Sehsubstanz<sup>1</sup>. Gleiches gilt für die Erregungen der rothgrünen Sehsubstanz durch rothes und grünes Licht.

Die Empfindung der Helligkeit identificirt Herr HERING mit der Weißempfindung. Er behauptet deshalb folgerichtig, daß mit der reinen Blau- oder Gelbempfindung keine Empfindung von Helligkeit verbunden sei. Ich muß gestehen, daß ich persönlich mir keine Anschauung bilden kann von einer Farbe, die nicht irgend einen Grad von geringerer oder größerer Helligkeit hätte, und finde deshalb eine solche Abstraction nicht recht verträglich mit einem System, welches sich in letzter Instanz auf die unmittelbaren Aussagen innerer Anschauung berufen zu dürfen glaubt, und sich dadurch den andern überlegen meint.

Intensitätsunterschiede indessen in den reinen Empfindungen der Gegenfarben müssen vorkommen können, wenn diese auch nicht Empfindungen verschiedener Helligkeit sind. Bei der Vergleichung gleich hellen gesättigten und weißlichen Blaus würde nach HERING die Weißempfindung in beiden gleiche Intensität haben, die Blauempfindung aber größere in dem gesättigten Blau.

Als die physiologische Grundlage der entgegengesetzten Empfindungen betrachtet Herr HERING die entgegengesetzten Processe des organischen Stoffwechsels, die Zersetzung der organischen Masse bei ihrer Thätigkeit (*Dissimilierung*) und die Wiederherstellung (*Assimilierung*) derselben unter dem Einfluß des Blutlaufs und des im Blute aufgespeicherten, schwach gebundenen Sauerstoffs. Welche Farbe übrigens in der blaugelb, beziehlich rothgrün empfindenden Substanzen der Assimilierung, welche der Dissimilierung entspreche, bleibt unentschieden. Die physiologischen Unwahrscheinlichkeiten dieser Annahme sind zum Theil schon oben erwähnt, theils werden wir in der Lehre von den Nachbildern darauf zurückkommen.

Diese Annahme doppelter Nervenwirkung hat Herr E. HERING ursprünglich auch auf die weiß-schwarz empfindende Sehsubstanz übertragen. Indessen bleibt er hier insofern mit der bisherigen Nervenphysiologie in Übereinstimmung, als in dieser Substanz

<sup>1</sup> Es war dies ein Punkt, den Herr HERING in den älteren Darstellungen seines Systems zweifelhaft gelassen hatte, so daß nicht klar war, ob er drei oder sechs unabhängige Variable zählte; nach den neuerdings von ihm gegebenen Erklärungen darf das im Text Gesagte wohl als zugegeben betrachtet werden.

alles Licht nur Dissimilierung und die Empfindung von Weiß erregen soll, andererseits Mangel des Lichts nur Assimilierung d. h. Wiederherstellung der Erregbarkeit. Dafs während dieses letzteren Vorganges eine Empfindung der Dunkelheit wirklich besteht, darüber sind wir alle einig. Hier ist die Differenz nur eine theoretische. Nach der älteren und auch von mir vertretenen Meinung, müssen wir, um wahrzunehmen, dafs es zur Zeit in einer bestimmten Richtung des Sehfeldes hell sei, auch unterscheiden können, dafs zu anderer Zeit diese Wahrnehmung fehle. Diese Wahrnehmung, dafs eine Empfindung, die da sein könnte, zur Zeit nicht da sei, enthält immerhin eine Aussage über den jetzigen Zustand des Organs, der von allen Empfindungen irgend welches einfallenden Lichtes unterschieden ist, und in diesem Sinne bezeichnen wir ihn auch als eine Empfindung, nämlich die von „Dunkel“. Herr HERING glaubt dagegen, dafs auch die Empfindung von Schwarz ihren besonderen physiologischen Erregungsgrund haben müsse und sucht ihn in der Assimilierung innerhalb der weifs-schwarzen Sehsubstanz.

Aus der gegebenen Darstellung wird der Leser zunächst entnehmen, dafs Herrn HERING's Theorie, wenn man über ihre physiologischen Bedenken fortsehen will, alle bisher besprochenen Thatsachen der Farbmischung ebenso gut, aber auch nicht besser zu erklären vermag, wie TH. YOUNG's Theorie. Sie ist ja von dieser nur durch die besondere Wahl der Elementarerregungen unterschieden und diese ist, wie wir erörtert, wenn man negative Werthe derselben zuläfst, den bisher besprochenen Thatsachen gegenüber so gleichgültig, wie die Wahl der Coordinatenrichtungen bei einem Problem der analytischen Stereometrie.

Was Herr E. HERING gegen TH. YOUNG's Theorie einzuwenden hat, reducirt sich in seiner neuesten Darstellung<sup>1</sup> auf Folgendes: „An der Theorie von YOUNG-HELMHOLTZ wirkt von vornherein die Annahme der drei farbigen Grundempfindungen abstossend, weil dieselben gar nicht aufzeigbar sind (?), und bekanntlich je nach Bedürfnifs (?) bald diese, bald jene Farbentöne als diesen Grundempfindungen entsprechend angenommen werden.“ Hierzu ist schon bemerkt, dafs man sich den Grundempfindungen der YOUNG'schen Theorie, soweit sie nicht zu den objectiven Farben gehören, in der That durch die Methode partieller Netzhautermüdung viel mehr annähern kann, als den reinen HERING'schen Gegenfarben. Dann haben allerdings verschiedene Bearbeiter der YOUNG'schen Theorie verschiedene Annahmen über die drei Grundfarben gemacht und verschiedenes Gewicht auf Thatsachen gelegt, die auf die Entscheidung hindeuteten; dafs aber nach Bedürfnifs gewechselt worden sei, ist eine ungerechtfertigte Verdächtigung. Vorhandene Zweifel einzugestehen ist jedenfalls besser als sich in dogmatischer Sicherheit wiegen.

Herr HERING fährt fort: „Wenn die den drei Urvalenzen entsprechenden Erregungen eine physiologisch so ausgezeichnete Stellung einnehmen würden, so sollte man doch meinen, dafs auch die zugehörigen Empfindungen etwas Besonderes haben müssten.“ Das haben sie, wie ich meine, in der hervortretenden Gluth der Farbensättigung, wofür wiederum die Theorie der Gegenfarben keinen Erklärungsgrund giebt.

Weiter: „Gelb macht z. B. viel mehr den Eindruck einer einfachen oder Grundempfindung als Violet; und doch soll letzteres eine Grundempfindung, ersteres aber ein Gemisch aus gleichzeitiger Roth- und Grünempfindung, oder wenigstens irgendwie

<sup>1</sup> E. HERING, *Über Newton's Gesetz der Farbmischung* (Jahrbuch „Lotos“, Bd. VII, Prag, 1887.) (S. 70 der Separatausgabe.)



das Ergebniss des gleichzeitigen Bestehens der diesen beiden Grundempfindungen entsprechenden Principalerregungen sein.“ Welch trügerisches Mittel die angebliche innere Anschauung in solchen Dingen ist, zeigt am besten das Beispiel von zwei solchen Autoritäten, wie GOETHE und Sir D. BREWSTER, die beide glaubten, im Grün das Blau und Gelb zu sehen, aus denen sie es, getäuscht durch die Erfahrungen an Malerfarben, gemischt glaubten.

Weiter: „HELMHOLTZ sagt ganz richtig: »Soviel ich sehe, giebt es bisher kein anderes Mittel, eine der Grundfarben zu bestimmen, als die Untersuchung der Farbenblinden.« Dies Mittel hat sich bekanntlich für die YOUNG'sche Theorie nicht bewährt.“ Das wäre, selbst wenn es richtig wäre, immerhin kein Grund gegen die Zulässigkeit der Theorie. Gerade die Theorie der Farbenblindheit scheint, wie wir noch sehen werden, ein besonders schweres Kreuz der HERING'schen Theorie werden zu sollen, während die bisher genau constatirten Thatsachen der Rothblindheit und Grünblindheit sich verhältnissmässig leicht und vollständig unter die beiden Erklärungsformen der YOUNG'schen Theorie einreihen lassen.

Endlich: „Auch die drei Faserarten, welche übrigens, wie HELMHOLTZ selbst schon bemerkte, für die Theorie nicht unentbehrlich sind, wurden bisher vergebens gesucht.“ Dies trifft HERING's Theorie genau ebenso, wie YOUNG's.

Der Leser wird sich leicht überzeugen, dass diese Einwendungen ohne alle Gewicht sind.

Dazu kommt nun noch eine Reihe von angeblichen Widersprüchen und Ungenauigkeiten, die er in GRASSMANN's und meiner Erklärung von NEWTON's Farbmischungsgesetz, zum Theil auch bei Herrn v. KRIES entdeckt haben will (l. c. § 34), die, auch wenn sie begründet wären, keineswegs gegen YOUNG's Theorie sprechen würden sondern nur gegen deren Interpreten. Hier aber scheint mir die Unklarheit auf Seiten unseres Gegners zu liegen.

Diese Einwürfe gehen davon aus, dass bei Mischungen einer gesättigten Farbe mit Weiss zuweilen auch der Farbenton der Mischfarbe geändert erscheine. Rothweiss z. B. mehr dem Rosenroth, Blauweiss dem Violet sich nähere, und dass andererseits bei grosser Lichtintensität die Spectralfarben in der oben beschriebenen Weiss theils weisslicher, theils gelblicher erscheinen.

Wenn man aber von denjenigen Elementarerregungen redet, die auf Grund von NEWTON's Gesetz einzig mit Sicherheit diesen Namen verdienen, da sie ungestört neben einander bestehen können: so ist nur diejenige Empfindung sicher als entsprechend der Coexistenz einer weissen und einer rothen Elementarempfindung anzuerkennen, welche durch gleichzeitige Einwirkung des entsprechenden weissen und rothen Lichts zu Stande kommt. Der Begriff der Elementarerregung ist hierbei natürlich nicht in dem engeren Sinne von YOUNG's Hypothese, sondern in dem oben erörterten weiteren Sinne genommen, wo darunter auch lineare Verbindungen von Grundempfindungen verstanden sind. Von anderen als diesen superponirbaren Elementen im Gebiete der Farbeempfindung wissen wir überhaupt nichts; und wollen wir einen festen Sinn für unsere Farbenbezeichnungen behalten, so müssen wir diese so durchführen, wie ich oben auseinandergesetzt, und wie ich es in meinen früheren Schriften schon immer gethan, wie es auch H. GRASSMANN jedenfalls gemeint hat.

Dabei können nun abweichende Schätzungen des Unterschieds zwischen einer weisslichen und mehreren gesättigten Farben vorkommen, welche nicht immer die wirklich mit Weiss gemischte Farbe als die der weisslichen Farbe ähnlichste erscheinen lassen; und wenn man ohne genügende Erfahrung über Farbmischung

der Ähnlichkeit der Empfindung schätzen soll, welche Farbe mit Weiß sei, kann man sich irren. Wir werden darüber bei den Unterschiedsempfindungen zu handeln haben. Weiter zeigt es sich, daß die Farben von sehr Lichtstärke kleinere Unterschiede in der Empfindung zeigen, als die mittleren, wofür wir ebenfalls den Grund, und zwar aus YOUNG's Theorie nachher. Sie erscheinen also einander und dem Weiß ähnlicher; das drückt nur aus, daß wir sie weißlicher nennen, als die lichtschwächeren Farben. Art. Ich habe aber schon oben erwähnt, daß die Unterschiedsempfindungen mehr in die Reihe der reinen Superpositionerscheinungen gehören, wie nächsten Paragraphen zeigen wird.

Den ungeachtet sind die lichtstarken einfachen Farben immer noch so als Farben ihrer Lichtstärke sein können, und es ist nicht nöthig, oder einen festen Wortsinn behalten will, nicht zulässig, sie als weniger gesättigt zu nennen. Vielmehr ist nur zu sagen, daß die Empfindung für Unterschiede des Grades bei hoher Lichtstärke ebenso undeutlicher wird, wie dies für die verschiedenen Grade der Lichtstärke selbst schon längst constatirt ist.

In die Weißempfindung, und die Empfindungen der Gegenfarben in der Hering'schen Theorie wirklich den Namen von Elementen oder Bestandtheilen der Empfindung verdienen sollen, was er doch offenbar meint, da er ihnen einzelne „Sehsubstanzen“ anweist, so muß er sie entweder als die aus dem additiven zusammengesetzten Elementarerregungen anerkennen, oder es sind ganz hypothetische von deren gesonderter Existenz und Superponirbarkeit niemand etwas wissen kann. Man bedeutet seine Polemik gegen GRASSMANN und mich nur, daß wir zu wissen, wo seine Hypothese noch nicht erfunden war, nicht im Sinne seiner Theorie geredet haben.

Vorzüge seiner eigenen Hypothese scheint Herr HERING hauptsächlich darin zu bestehen, daß sie sich dem in der Sprache fixirten System von Namen, die sich, wie erörtert, wesentlich auf das System der Körperfarben beziehen, näher anpaßt. Diesem Umstande verdankt sie in der That eine gewisse Gemeinfaßlichkeit und Popularität. Er selbst nimmt an, daß diese Namen einer unmittelbaren Anschauung der einfachen Empfindungselemente durch eine Art innerer Anschauung entsprechen, und glaubt durch diese auch sehr sichere unmittelbare Kenntniss der Rothempfindung, Weißempfindung u. s. w. zu haben.

Seiner Veröffentlichung von 1887 hat er sogar die Möglichkeit discutirt, statt der sechs einfacher Empfindungsprocesse deren noch mehr, vielleicht unendlich vielen, und eine entsprechende Menge von „Urvalenzen“ für die einzelnen Lichtarten. Die geometrischen Darstellungen solcher Wirkungen giebt er immer in solcher Weise, daß thatsächlich alle diese Valenzen von denselben Variablen abhängen. Dagegen über diese unabhängigen Variablen, welche das Wichtigste für den ganzen Zusammenhang des Gebietes sind, giebt er gut wie keinen Aufschluß, er sucht sie nur möglichst aus der physiologischen Anschauung zu entfernen. Ich selbst weiß mir diese ganze Reihe von Voraussetzungen etwa so zu interpretiren, daß eine beliebige Anzahl von „Sehsubstanzen“ im Gehirn angenommen werden könnte, deren Erregungsstärke für jede einzelne Funktion der drei Elementarerregungen wäre, jede unabhängig von den übrigen Sehsubstanzen, und jede für sich auch directer Wahrnehmung das Bewußtsein zugänglich.

Ich glaube nicht, daß es in diesem Buche nöthig ist, sich eingehender mit hypothetischen Ansichten zu beschäftigen.

Für die Farbenblindheit namentlich beansprucht Herr HERING den Ruhm, das Verständniß derselben eröffnet zu haben.

Alle Dichromasie sucht er auf ein einziges Schema zu reduciren; die roth-grüne Sehsubstanz soll unempfindlich geworden sein. Die Unterschiede zwischen Rothblinden und Grünblinden sucht er auf verschiedene Färbungen der Augenmedien, theils des gelben Flecks der Netzhaut, theils der Krystalllinse zurückzuführen. Den letzteren kommen höchstens bei kranken oder sehr alten Leuten vor, und sind auch da wohl bei übrigen brauchbaren Augen nie von der Stärke, daß sie erhebliche Abweichungen in der Helligkeit verschiedener Theile des Spectrum hervorbringen könnten.

Die Färbung des gelben Flecks der Netzhaut macht sich in einem sehr beschränkten, aber allerdings wichtigen Theile des Sehfeldes geltend, und in einem schmalen Bande des Spectrum, wie oben bemerkt ist. Die wichtigsten Beobachtungen über die Abhängigkeit des Rothwerths und des Grünwerths von der Wellenlänge beziehen sich dagegen auf Farben, die der Absorption durch das gelbe Pigment nicht in merklichem Grade unterliegen. Im ganzen macht sich deshalb diese Pigmentirung auch nur bei solchen Versuchen subjectiv geltend, wo die Strahlen aus der Nähe der Linie *F* eine hervortretende Rolle spielen, wie bei der oben S. 354 erwähnten Mischung dieses Blaus mit Roth, welche, wenn sie im Fixationspunkte weiß erscheint, schon in geringer Entfernung von demselben das Blau überwiegend zeigt. Es erscheint schon nach den bis jetzt vorliegenden Thatsachen sehr unwahrscheinlich, daß sich die HERING'sche Theorie der Dichromasie durchführen lasse. Indessen sind weitere Beobachtungen in dieser Richtung doch noch wünschenswerth. Der Einfluss, den die Färbung des gelben Flecks im individuellen Auge hat, wird sich durch Vergleichung von Farbmischungen auf und dicht neben dem Centrum des Sehfeldes abschätzen lassen, und sicher wird sich constatiren lassen, wo ein solcher Einfluss besteht, wo nicht.

306

Die Lehre von der Farbmischung ging von den Erfahrungen der Maler über Mischung der Pigmente aus. Schon PLINIUS erwähnt, daß die älteren griechischen Maler mit vier Farbstoffen alles darzustellen gewußt hätten, während man zu seiner Zeit deren viel mehr besäße, und doch nicht so viel wie jene leistete. Und doch ist auch in dem berühmten Gemälde der Aldobrandischen Hochzeit aus der Römerzeit der Aufwand von Farbstoffen sehr klein, wie DAVY's chemische Untersuchungen zeigten.<sup>1</sup> LEONARDO DA VINCI nennt außer Schwarz und Weiß, welche jedoch nicht im eigentlichen Sinne Farben wären, vier einfache Farben, nämlich Gelb, Grün, Blau und Roth; sonst fordert er noch an einer anderen Stelle für die Malerei Orange (*lionato*) und Violet (*morello, cioè pavonazzo*). Daß LEONARDO das Grün stets als einfache Farbe zählt, obgleich er weiß, daß es gemischt werden kann, widerspricht eigentlich seiner Definition der einfachen Farben als solcher, die nicht gemischt werden können. Sollte er bemerkt haben, daß das ungemischte Grün viel lebhafter ist als das gemischte? Die nachher gewöhnlich angenommenen drei Grundfarben Roth, Gelb und Blau findet man schon vor NEWTON'S Untersuchungen, als eine damals allgemein anerkannte wissenschaftliche Thatsache erwähnt in einem Versuch zur Classification der Farben und Farbstoffe von WALLIS. Darin, daß man drei Grundfarben ausreichend findet, liegt schon die Anerkennung der

<sup>1</sup> H. DAVY, *Gilbert's Annalen*. LII, 1.



he, daß die Beschaffenheit des farbigen Lichtes eine Function nur dreier Variablen die Wahl der Grundfarben, welche erst viel später WUNSCH und THOMAS YOUNG suchten, hatten die Erfahrungen über gemischte Pigmente den entschiedensten Man meint aus Gelb und Blau Grün zusammensetzen zu können. Das ist wenn man es auf die Pigmente bezieht, aber nicht für farbiges Licht.

NEWTON setzte zuerst farbiges Licht zusammen, und zwar das des prismatischen n, benutzte aber daneben für Aufstellung der Regel der Farbenmischung die g farbiger Pulver, und legte auf die Abweichungen zwischen beiden, die ihm anz entgangen zu sein scheinen, kein großes Gewicht, da ihm die experimentellen tel noch fehlten, die Sache genauer zu verfolgen. Er erwähnt, daß aus *subflavum* neum (d. h. gründlich Gelb und Cyanblau) nur ein weißliches Grün zu erzeugen wton stellte auch zuerst einen genaueren Ausdruck des Gesetzes der Farben- g hin, indem er es auf die oben besprochene graphische Darstellung und Schwer- nstructionen zurückführte. Sein Gesetz entsprach den vorliegenden experimen- fahrungen, eine genauere Prüfung hat er nicht versucht. Seine Darstellung des der Farben auf einem Kreise war eine Erweiterung des Systems dreier objectiver rben; über das Ungenügende des letzteren Systems spricht er sich aber nir- us.

307

gegen kehrten die späteren Physiker bei ihren Versuchen, das System der Farben en. meist zum System der drei Grundfarben zurück, so LE BLOND 1735, DU FAY OBAS MAYER 1758, J. H. LAMBERT 1772, D. R. HAY, J. D. FORBES. Ihre Farben- sind praktisch ausgeführt meist in der Weise, daß sie bestimmte Pigmente nach ten Gewichtsverhältnissen mischten. MAYER brauchte Zinnober, Königsgelb, aures Bleioxyd) und Bergblau (Kobaltglas), LAMBERT Carmin, Gummigutt, Berliner- encyanürcyanid). Letzterer bestimmte auch die Sättigungsverhältnisse dieser fe, indem er die Gewichtsmengen bestimmte, in denen je zwei gemischt werden um eine Mischfarbe hervorzubringen, welche gleich weit von den Farben ihrer Bestandtheile entfernt sei. Er mußte nehmen von Carmin 1 Theil, von Berliner- Theile, von Gummigutt 10 Theile. Letztere Gewichte wählte er dann als Maß- n bei Anfertigung der Mischungen. Übrigens fallen die Mischungen so weit von entfernter Farbstoffe immer ziemlich unansehnlich und grau aus.

uere Beobachtungen, welche unter Umständen, wo Mischung farbigen Lichts zu a war, von den bisherigen Regeln abweichende Resultate lieferten, machten 1829 am Farbenkreisel, VOLKMANN 1838 an Zerstreuungsbildern, ohne aber dadurch näheren Untersuchung des Widerspruchs geführt zu werden. Ich selbst wurde Versuche über Mischung der Spectralfarben zu der Erkenntniß geführt, daß g des Lichts und Mischung von Pigmenten verschiedene Resultate gebe, rterte die Gründe davon. Ich hatte hierbei die Mischung der Spectralfarben des v förmigen Spaltes benutzt und nur aus Gelb und Indigoblau Weiß, nicht aus irgend welchen anderen Paaren von Spectralfarben. Dies widersprach schungsgesetz von NEWTON und veranlaßte GRASSMANN zu einer ausführlichen ung der Principien von NEWTON's Mischungsgesetz. Die Untersuchung der ten Spectralfarben nach einer besseren Methode, welche ich ausführte, hob die ren Widersprüche gegen NEWTON's Regel auf, so weit sie sich auf die Anwend- der Schwerpunktsconstructionen beziehen; dagegen mußte ich freilich die m des Farbenfeldes GRASSMANN gegenüber für unerwiesen erklären. Endlich e Principien von NEWTON's Mischungsgesetz experimentell geprüft worden 1857 MAXWELL.

t. YOUNG's Theorie der Farbenempfindungen ist wie so vieles, was dieser bewun- würdige Forscher seiner Zeit voraneilend geleistet hatte, unbeachtet liegen ge- bis ich selbst und MAXWELL wieder auf sie aufmerksam machten. Man begnügte t der Annahme, daß der Sehnerv verschiedenartiger Empfindungen fähig sei.

ohne weiter nach dem Grunde zu suchen, warum das System dieser Empfindungen eben ein solches sei, wie es das Auge darbietet.

Bald nach der Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches erschien die Farben-<sup>21</sup>theorie von E. HERING.<sup>1</sup>

309

### § 21. Von der Intensität der Lichtempfindung.

Die Intensität des objectiven Lichts ist gleich zu setzen der lebendigen Kraft der Ätherbewegung, und diese bei einfarbigem, geradlinig polarisirtem Lichte proportional dem Quadrate der grössten Geschwindigkeit der Äthertheilchen. Wenn Licht aus verschiedener Quelle oder von verschiedener Polarisationsrichtung zusammentrifft, wird die Gesamt-Intensität gleich der Summe der einzelnen Intensitäten.

Wir wollen zunächst untersuchen, wie die Intensität der Lichtempfindung sich verhält, wenn die Intensität des objectiven Lichts sich verändert, ohne daß die Farbe geändert wird. Wir können diese Verhältnisse an weissem Lichte studiren; einfaches Licht verhält sich nicht wesentlich anders.

Zunächst ist nachzuweisen, daß die kleinsten wahrnehmbaren Abstufungen der Lichtempfindung nicht gleichen Differenzen der objectiven Helligkeit (S. 209) entsprechen. Man beleuchte eine weiße Tafel mit einem schwachen Lichte, welches die Helligkeit  $h$  erzeuge, und stelle einen Körper auf, der auf die Tafel einen Schatten wirft, so daß innerhalb der Grenzen des Schattens die Tafel von jenem ersten Lichte nicht getroffen wird. Dann bringe man ein zweites Licht hinzu von der Helligkeit  $H$ , welche dadurch verändert werden kann, daß man dies zweite Licht der Tafel nähert und entfernt. Dann ist die objective Helligkeit im Schatten  $H$ , außerhalb des Schattens  $H + h$ . Ist nun die Helligkeit  $H$  sehr gering, so wird das Auge den Schatten erkennen, d. h. die Helligkeit  $H$  von der  $H + h$  unterscheiden. Aber der Versuch lehrt, daß, wie groß auch  $h$  sein mag, doch stets eine größere Helligkeit  $H$  existirt, bei welcher der Schatten unsichtbar wird, bei welcher die Differenz  $h$  der objectiven Helligkeit also nicht mehr eine wahrnehmbare Steigerung der Empfindung hervorbringt.

310

Ein Licht von der Stärke des Mondlichts wirft einen wahrnehmbaren Schatten auf weißes Papier. Bringt man eine gut brennende Lampe nahe an das Blatt, so verschwindet der Schatten. Wiederum verschwindet der Schatten, den das Lampenlicht wirft, wenn man die Sonne auf das Papier scheinen läßt. Ja, die Helligkeit einer Flammenfläche einer gut brennenden Lampe mit ringförmigem Dochte ist für das Auge kaum noch von der doppelten Helligkeit zu unterscheiden. Es sind solche Flammen hinreichend durchsichtig, wie man das leicht erkennt, wenn man ihr lichtschwaches Spiegelbild in einer unbelegten Glastafel betrachtet und dann eine zweite Flamme

<sup>1</sup> E. HERING. *Sitzungsber. der Wiener Akad.* vom 15. Mai 1874.

— *Zur Erklärung der Farbenblindheit.* *Lotos, Neue Folge* I. 1880. Prag.

— *Kritik einer Abhdlg. von Donders.* *Lotos, Neue Folge* II. 1882. Prag.

— *Individuelle Verschiedenheiten des Farbensinnes.* *Lotos, Neue Folge* VI. Prag. 1885.

— *Newton's Gesets der Farbenmischung.* *Lotos, Neue Folge* Bd. VII. Prag. 1887.

— *Pflüger's Archiv* Bd. XLI S. 20. 1887. Bd. XLII S. 488. 1888.



Die erste schiebt. Man erkennt dann die zweite in ihren Umrissen genau. Sieht man aber mit bloßem Auge nach den beiden Flammen, so erkennt man die zweite wenigstens durch den hellsten Theil der Zeichnung nicht mehr, oder höchstens nachdem man durch längeres Hinsehen die Sensibilität der Empfindung abgestumpft hat. Ebenso wenig erkennt man die zweite mit bloßem Auge, daß der Rand der Flammenfläche, wo man die zweite nach durch die glühende Gasschicht hindurchsieht, ein sehr viel helleres Licht, als die Mitte hat, wo man die kleinste Tiefe der glühenden Zeichnung vor sich hat. Auch dies wird ebenfalls leicht sichtbar, wenn man die Zeichnung in einem unbelegten Glase gespiegelt betrachtet. Dahin gehört auch die Thatsache, daß die Sterne bei Tage verschwinden, daß die Sterne hinter einer Glasplatte verschwinden, wenn die Glasplatte spiegelt.

Während wir bisher die Differenz der Helligkeit constant erhielten, und die absolute Werth der ganzen Helligkeit veränderten, können wir die Differenz in demselben Verhältniß wachsen lassen, wie die Helligkeit wächst. Man bringe auf einer durchsichtigen Glastafel eine Zeichnung einer verdünnten schwarzen Tuschfarbe an, oder lasse sie mit einem leichten Hauch von Lampenruß anlaufen, und zeichne darin; oder man suche ein photographisches auf durchsichtigem Glase ausgeführtes Bild, das theils sehr zarte, theils stärkere Schatten hat, und halte eine Zeichnung vor einen hellen Grund von immer steigender Helligkeit. Man wird finden, daß bei geringer Helligkeit des Grundes sehr zarte Zeichnungen unsichtbar sind, bei größerer sichtbar werden, dann bei immer größerer Helligkeit eine ziemliche Zeit hindurch ungefähr denselben Grad der Sichtbarkeit erhalten, endlich aber wieder anfangen zu verschwinden. Je dunkler der Schatten in der Zeichnung ist, desto kleiner ist die Helligkeit, bei der er anfängt sichtbar zu werden, und desto größer ist die Helligkeit, bei der er angewendet werden muß, damit er wieder verschwinde. Nun ist die Helligkeit des Schattens um einen ganz bestimmten Theil der ganzen Helligkeit kleiner, als die Helligkeit der lichten Stellen. Nennen wir letztere  $H$ , so können wir die Helligkeit des Schattens gleich  $(1 - \alpha)H$  setzen,  $\alpha$  einen für dieselbe Stelle der Zeichnung constanten ächten Bruch bedeuten, so daß also die Differenz der Helligkeit zwischen der betreffenden Stelle der Zeichnung und dem hellen Grunde, welche  $\alpha H$  ist, mit der Helligkeit gleichzeitig größer und kleiner wird. Trotzdem also bei steigender Helligkeit die Unterschiede der absoluten Helligkeit zwischen den verschiedenen Theilen der Zeichnung größer werden, entsprechen diesen Unterschieden nicht mehr wahrnehmbare Unterschiede der Empfindung. Es geht also hervor, daß es gewisse mittlere Grade der Lichtstärke geben muß, innerhalb welcher das Auge am empfindlichsten ist für eine Veränderung der Helligkeit um kleine Bruchtheile ihrer Größe. Es sind diese von uns gewöhnlich beim Lesen, Schreiben, Arbeiten gebrauchten, für das Auge angenehmsten und bequemsten Grade der Helligkeit. Aber

innerhalb weiter Grenzen, etwa von derjenigen Beleuchtung ab, bei welcher man ohne Schwierigkeit lesen kann, bis etwa zu der Helligkeit einer von den directen Sonnenstrahlen getroffenen weißen Fläche ist die GröÙe der Empfindlichkeit nahezu constant, wie sich denn überhaupt der Werth continuirlich veränderlicher Functionen in der Nähe ihres Maximum verhältnißmäÙig wenig zu verändern pflegt. Es geht dies schon für die gewöhnliche Beobachtung aus dem Umstande hervor, daß man Gemälde und Zeichnungen, welche mannigfaltige Abstufungen des Schattens darbieten, ziemlich gleich gut bei Kerzenlicht und bei starkem Tageslicht erkennt, daß nur ausnahmsweise bei starker Beleuchtung neue Gegenstände und Schattenstufen darauf sichtbar werden, die man nicht schon bei schwacher Beleuchtung gesehen hätte. Ebenso erwähnt schon FECHNER, daß wenn man durch verdunkelnde graue Gläser nach hellen Gegenständen, z. B. dem Himmel mit hellen Wolken hinsieht, dadurch keine Abstufungen des Schattens verschwinden, die man vorher gesehen hätte, oder neu sichtbar werden. In den meisten Fällen ist dies richtig, für sehr zarte Schatten jedoch nicht.

311 Dasselbe ergeben genauer die photometrischen Messungen. Es hat sich bei diesen Messungen im Allgemeinen gezeigt, daß bei sehr verschiedenen Graden der Helligkeit die Differenz der Helligkeit, welche noch unterschieden werden konnte, nahe denselben Bruchtheil der ganzen Helligkeit bildete. Die GröÙe dieses Bruchtheils ist von BOUGUER und FECHNER in der Weise aufgesucht worden, daß dieselben eine weiÙe Tafel mit zwei gleichen Kerzenflammen beleuchteten, und einen Stab davor aufstellten, der nun zwei Schatten auf die Tafel warf. Das eine Licht wurde dann so weit entfernt, bis der entsprechende Schatten aufhörte sichtbar zu sein. Ist  $a$  die Entfernung des näheren Lichts von der Tafel,  $b$  die Entfernung des entfernteren, so verhält sich die Beleuchtungsstärke der Tafel durch beide Lichter wie  $a^2:b^2$ . BOUGUER fand, daß das eine Licht etwa 8mal, FECHNER mit Hülfe von VOLKMANN und anderen Beobachtern, daß es ungefähr 10mal so weit, als das andere entfernt sein müsse, damit der Schatten verschwinde, so daß BOUGUER also  $\frac{1}{64}$

der Lichtstärke, FECHNER's Freunde dagegen  $\frac{1}{100}$  noch unterscheiden konnten.

ARAGO bemerkte, daß bei Bewegung des Objects noch feinere Unterschiede erkannt werden konnten, und kam unter günstigsten Bedingungen bis auf  $\frac{1}{131}$ .

MASSON wendete zur Prüfung rotirende weiÙe Scheiben mit kleinen schwarzen Sektoren an. Er fand, daß bei schwachem Gesicht zuweilen nur Unterschiede von  $\frac{1}{50}$  erkannt wurden, bei guten Augen zuweilen aber noch weniger als

$\frac{1}{120}$ . Indessen erfordern die Messungen mit den rotirenden Scheiben große Vorsicht; darüber später mehr. Er fand außerdem, daß die Grenze der



chkeit auch für instantane Beleuchtung durch den elektrischen von der Lichtstärke ziemlich unabhängig ist. Bei dieser Beleuchtung nämlich, wenn sie stark genug ist, die schwarzen und weißen für einen Augenblick sichtbar. Läßt man nun die rotirende Scheibe 312 von einer Lampe mit der Helligkeit  $L$  beleuchten und dann auch von elektrischen Funken mit der Helligkeit  $l$ , so hat man für einen Augenblicke der weißen Sektoren die Helligkeit  $L + l$ , am Orte der schwarzen Helligkeit  $L$ , und man wird die Sektoren nur erkennen, wenn  $L + l$  verschieden werden kann. Veränderte man die Entfernung beider Lichtquellen von der Scheibe, so mußten  $L$  und  $l$  proportional verändert werden, um an der Grenze der Empfindlichkeit des Auges zu bleiben, woraus denn dasselbe Gesetz wie für constantes Licht, auch für die Wahrheit instantaner Lichtunterschiede gilt.

WEBER hat die Thatsache, daß innerhalb eines großen Intervalls der kleinsten wahrnehmbaren Differenzen der Lichtempfindung constanten Bruchtheilen der Helligkeit entsprechen, zur Aufstellung eines allgemeineren Gesetzes benutzt, welches er als ein psychophysisches Gesetz, und welches auch in anderen Gebieten der Sinnesempfindungen gilt. So erscheinen uns namentlich Differenzen der Tonhöhe als gleich groß, wenn die Differenzen der Schwingungsdauer gleiche Theile der ganzen Schwingungsdauer betragen. Ähnlich verhält es sich nach E. H. WEBER's Untersuchungen mit unserer Fähigkeit, die Unterschiede von Gewichten und Lineargrößen zu erkennen. Wir messen nun die Unterschiede durch den Logarithmus der Schwingungszahl, so erscheint die Empfindungsstärke ähnlich zu messen, indem wir in diesem Falle gleich deutlich wahrnehmbare Unterschiede  $dH$  der Empfindungsstärke  $E$  als gleich groß ansehen. Dann wäre also innerhalb weiter Grenzen der objectiven Helligkeit  $H$  nahehin

$$dE = A \cdot \frac{dH}{H}$$

ne Constante ist. Daraus folgt durch Integration

$$E = A \cdot \log H + C,$$

ne zweite Constante bezeichnet. Wenn wir für die Helligkeit  $h$  die Empfindungsstärke gleich  $e$  setzen, wird die letztere Gleichung:

$$E - e = A \cdot \log \frac{H}{h}.$$

WEBER hat gezeigt, daß diese Art, wie das Auge Helligkeiten mißt, auch bei der Aufstellung der Sterngrößen einen bestimmenden Einfluß geübt. Die Größenklassen der Sterne hat man bestimmt nach dem Eindruck, den sie auf das menschliche Auge machen, zunächst ohne photometrische Messungen der objectiven Lichtmenge. Erst in neuerer Zeit sind letztere eingeführt worden, und erlauben nun die objective Lichtmenge mit der ange-

nommenen Gröfsenklasse zu vergleichen. FECHNER hat eine solche Vergleichung nach den photometrischen Bestimmungen von J. HERSCHEL und STEINHEIL ausgeführt, und findet die Gröfsenklasse  $G$  ausgedrückt, für HERSCHEL's Messungen durch die Formel

$$G = 1 - 2,8540 \log H$$

313 für STEINHEIL's Messungen durch

$$G = 2,3114 - 2,3168 \log H,$$

welche Formeln mit den oben aufgestellten in Übereinstimmung sind, wenn man bemerkt, daß die Gröfsenklassen steigen, wenn die Lichtmengen fallen, und ebenso findet sich sehr genügende Übereinstimmung zwischen den Formeln und den Beobachtungen. Auch für die Messungen von STRUVE hat FECHNER eine hinreichende Übereinstimmung mit seinem Gesetze nachgewiesen. Dasselbe Gesetz ist übrigens auch von BABINET<sup>1</sup> ausgesprochen, welcher die Zahl, die dem Coefficienten von  $\log H$  in FECHNER's Formel entspricht, zu 2,5 angiebt, nach Beobachtungen von JOHNSON und POGSON.

Daß das hier aufgestellte Gesetz für die Empfindungsstärke nicht bei sehr kleinen und nicht bei sehr grofsen Helligkeiten gilt, erklärt FECHNER durch den Einflufs von störenden Nebenumständen. Bei sehr geringen Helligkeiten mufs sich nämlich der Einflufs des subjectiven Eigenlichts des Auges merklich machen. Neben der Reizung durch äufseres Licht ist immer noch eine Reizung durch innere Einflüsse vorhanden, deren Gröfse wir gleich setzen können der Reizung durch ein Licht von der Helligkeit  $H_0$ . Dann wird also genauer der Ausdruck für die kleinsten wahrnehmbaren Stufen der Empfindungsstärke

$$dE = A \frac{dH}{H + H_0}$$

oder

$$dH = \frac{1}{A} (H + H_0) dE,$$

woraus folgt, daß die Steigerung der Helligkeit etwas gröfser sein mufs, um wahrgenommen zu werden, als wenn  $H_0$  gleich Null wäre, und namentlich wird der Unterschied für kleine Werthe von  $H$  bedeutend werden.

Die Übereinstimmung mit den Beobachtungen wird allerdings durch diese Annahme von FECHNER erheblich verbessert, und läfst sich bis zu viel geringeren Helligkeiten verfolgen, aber vollständig wird sie nicht weder für die höchsten noch für die niedrigsten Helligkeiten. In der That giebt auch die innere Erregung der Netzhaut keine gleichmäfsige Lichtempfindung, sondern das sogenannte Eigenlicht der Netzhaut erscheint in ganz dunklem Grunde immer als ein fleckiger, ungleichmäfsiger Lichtschimmer, der theils breitere, theils aber auch ganz feinkörnige hellere und dunklere Flecken und

<sup>1</sup> BABINET. *Comptes rendus*. Tome 44. p. 358. 1857.



ungen zeigt. Ja, was man für gewöhnlich überhaupt von dem Eigenlicht nimmt, sind eigentlich nur diese Differenzen seiner Helligkeit, während gleichmäßige Empfindung des Grundes, die vielleicht garnicht so schwach nicht wahrgenommen wird, so lange sie nicht anderweitig verändert wird. In dieser Beziehung sind die Erfahrungen über die Verdunkelung des dunklen Gesichtsfeldes durch den absteigenden elektrischen Strom (S. 245) von Wichtigkeit. Ich werde weiter unten den Einfluss einer solchen ungleichen Beleuchtung discutiren. Die Versuche von FECHNER und VOLKMAN mit Hülfe der besprochenen Form des FECHNER'schen Gesetzes die Helligkeit des Eigenlichtes zu finden, halte ich für verfrüht. Auch haben sie offenbar viel zu kleine Werthe ergeben.

Die Fleckigkeit des Eigenlichts macht sich auch sehr geltend, wenn man versucht, kleine, durch schwache Beleuchtungsunterschiede hervorgehobene Objecte zu erkennen. Man wird dieselben in vielen Fällen nicht vom Grunde des Eigenlichts zu unterscheiden wissen. Hat dagegen das Auge bei derselben äußeren Beleuchtung eine größere Ausdehnung im Gesichtsfelde, so wird man auf einer solchen größeren Fläche trotz der geringen Helligkeit leichter erkennen können, dass ihre mittlere Helligkeit einen kleinen Unterschied über die mittlere Helligkeit des benachbarten Grundes hat, und die scheinbare Lage des helleren Flecks im Raume bei Bewegungen des Auges unverändert bleibt. Größere Objecte erkennt man also bei kleinen Beleuchtungsunterschieden leichter als kleinere. So kann man z. B. bei starker Beleuchtung oft genug nicht mehr lesen, trotzdem man den Umrandungen der weißen Seite des Buchs, und vielleicht auch die einzelnen Zeilen wohl erkennt. Ich finde es dann meist möglich, wenigstens die gröberen Theile des Lichtstaubs, die ich beim Schließen der Augen im dunklen Felde wahrnehme, auch auf dem Papiere zu erkennen.

Ubrigens ist zu bemerken, dass die Hypothese von dem netzförmigen Zusammenhange der Nervenenden in der Netzhaut, die ich auf S. 264 entwickelt habe, ebenfalls die Wahrnehmung kleiner örtlicher Unterschiede von der Wahrnehmung der Intensitätsdifferenz der Erregungen benachbarter Nervenfasern abhängig macht, und zu dem Schlusse führt, dass bei abnehmender Empfindlichkeit für Bruchtheile der Lichtintensität auch die Fähigkeit der Unterscheidung der Örter im Gesichtsfelde beeinträchtigt werden muss.

Wegen der Existenz des Eigenlichts muss nun immer eine bestimmte minimale Beleuchtungsstärke eintreten, um selbst im Gegensatze gegen einen ganz unbeleuchteten Grund überhaupt wahrgenommen zu werden. Noch unterhalb der Grade der Helligkeit üben keine wahrnehmbare Wirkung auf die Empfindung aus. Diese kleinste unterscheidbare Beleuchtung hat FECHNER die Reizschwelle genannt. Wahrnehmbar sind nur Helligkeiten, welche die Reizschwelle hinausgehen.

Die kleine Zunahme der Helligkeit  $dH$  dagegen, welche nöthig ist, um

bei der Helligkeit  $H$  die erste wahrnehmbare Zunahme dieser Helligkeit zu bewirken, nennt er die Unterschiedschwelle.

314 Die Abweichung von dem Gesetze an der oberen Grenze könnte man mit FECHNER wohl darauf schieben, daß das Organ zu leiden beginnt. Die inneren Veränderungen im Nerven, welche den Eindruck des Reizes auf das Gehirn übertragen, können eben eine bestimmte GröÙe nicht überschreiten, ohne das Organ zu schädigen, und jeder Wirkung des Reizes ist daher eine obere Grenze gesetzt, welcher ein Maximum der Empfindungsstärke entsprechen muß.

Übrigens ist denn doch zu bemerken, daß diese Umstände, welche es auch sein mögen, die an der oberen und unteren Grenze der Helligkeit die Gültigkeit von FECHNER's Gesetz stören, auch in den mittleren Graden der Helligkeit ihren Einfluß bei genauer Beobachtung geltend machen, was natürlich nicht verhindert, daß jenes Gesetz als eine erste Annäherung an die Wahrheit stehen bleibt. Allerdings sind die meisten Gemälde, Zeichnungen und Photographien von den gewöhnlich vorkommenden Gegenständen der Darstellung gleich gut bei sehr verschiedenen Graden der Lichtstärke zu erkennen. Aber, wie oben bemerkt, findet man in Photographien Schattenabstufungen, die nur bei einer bestimmten und eng begrenzten Lichtstärke ganz deutlich hervortreten. Dazu gehören namentlich Landschaftsbilder, in denen sehr ferne im Nebel halb verschwimmende Bergketten dargestellt sind, am auffallendsten aber war es mir bei einigen stereoskopischen Photographien von Alpenlandschaften auf Glas, in denen sich Theile der Firnmeere oder ganz mit Schnee bedeckte Bergspitzen zeigen. Solche Schneeflächen sehen bei Lampenlicht oder mäßig starkem Tageslicht wie einförmige weiÙe Flächen aus, während sie gegen den hellen Himmel gekehrt noch zarte




Fig. 153.

Schatten zeigen, die eine Modellirung der weiÙen Flächen andeuten, und die bei noch stärkerem Lichte wieder verschwinden. In Photographien kann man so zarte Schatten natürlich nur durch Zufall finden, in Gemälden oder Zeichnungen kann man sie nicht erwarten, dagegen geben die rotirenden Scheiben ein leichtes Mittel ab, sehr zarte Schatten zu erzeugen, deren Lichtstärke in jedem gewünschten Verhältniß zur Helligkeit des weiÙen Grundes steht, wie sie denn auch MASSON schon zu photometrischen Versuchen gebraucht hat. Leicht zu erhalten sind solche Schatten, wenn man der Scheibe die Zeichnung wie in Fig. 153

gibt. Man zieht längs eines oder zweier Radien mit einer Ziehfeder einen unterbrochenen Strich, dessen Theile alle die gleiche Dicke haben. Bei der Rotation der Scheibe geben diese schwarzen Striche graue



Kreise auf der Scheibe. Ist  $d$  die Breite der Striche,  $r$  die Entfernung eines Punktes eines schwarzen Strichs vom Mittelpunkte der Scheibe, so ist die Helligkeit  $h$  des grauen Streifens, der bei der Rotation entsteht, wenn wir die Helligkeit der Scheibe gleich 1 setzen

$$h = 1 - \frac{d}{2r\pi}.$$

Die grauen Streifen unterscheiden sich also desto weniger von der Helligkeit der Scheibe, je grösser  $r$  ist; die inneren sind dunkler, die äusseren heller und man erhält eine Folge sehr zarter Abstufungen. Beim Versuche hat man nur zu untersuchen, wie weit die Ränder der grauen Streifen noch zu erkennen sind. Man erkennt sie besser, wenn man mit dem Blicke zu den verschiedenen Stellen eines Kreises hin- und hergeht, als wenn man eine Stelle fixirt; im letzteren Falle verschwinden die schwächeren Kreise schnell wieder, auch wenn man sie vorher gesehen hat. Doch erkennt man sie gewöhnlich auch nicht gleich beim ersten Hinsehen nach der Scheibe, sondern man muß letztere erst eine Zeitlang aufmerksam betrachten. Übrigens muß, man darauf achten, daß die Scheibe schnell genug umläuft, damit die grauen Kreise ganz continuirlich erscheinen, und nicht flimmern; auch sind schnelle „ Bewegungen des Blicks zu vermeiden, welche die Striche sichtbar machen. Auf der flimmernden Scheibe erkennt man auch die schwächeren Kreise, weil die Verdunkelung sich dann nicht mehr gleichmäfsig auf die ganze Zwischenzeit von zwei Vorübergängen des schwarzen Streifens vertheilt, sondern unmittelbar nach dem Vorübergange grösser, nachher schwächer ist, als sie bei gleichmäfsiger Vertheilung sein sollte. Es scheint mir deshalb nothwendig, diese Messungen von Unterschiedsschwellen nur an Scheiben auszuführen, die viel schneller umlaufen, als zur Beseitigung des Flimmerns nöthig ist. Ich habe deshalb auch nicht mehr volles Vertrauen in meine eigenen früheren Messungen, die ich in der ersten Auflage dieses Werkes mitgetheilt habe, da ich mit dem gebrauchten Apparate die vollkommene Gleichmäfsigkeit der Ringe nur noch eben erreichen konnte. Ich fand damals, daß ich an hellen Sommertagen am Fenster bei Bewegung des Blicks noch einen Rand scharf sehen konnte, wo der Unterschied der Helligkeit  $\frac{1}{133}$  war, und verwaschen erschien mir auch noch ein Rand von  $\frac{1}{150}$ , auf Augenblicke sogar einer von  $\frac{1}{167}$  Unterschied. Mühsamer und anstrengender erschienen die Wahrnehmungen bis zu  $\frac{1}{150}$  bei directer Sonnenbeleuchtung der Scheibe. In der Mitte des Zimmers konnte ich zu derselben Zeit nur Ränder von  $\frac{1}{117}$  Unterschied wahrnehmen, den von  $\frac{1}{133}$  nur selten und unbestimmt. 315

bei der Helligkeit  $H$  die erste wahrnehmbare Zunahme dieser Helligkeit zu bewirken, nennt er die Unterschiedschwelle.

314 Die Abweichung von dem Gesetze an der oberen Grenze könnte man mit FECHNER wohl darauf schieben, daß das Organ zu leiden beginnt. Die inneren Veränderungen im Nerven, welche den Eindruck des Reizes auf das Gehirn übertragen, können eben eine bestimmte GröÙe nicht überschreiten, ohne das Organ zu schädigen, und jeder Wirkung des Reizes ist daher eine obere Grenze gesetzt, welcher ein Maximum der Empfindungsstärke entsprechen muß.

Übrigens ist denn doch zu bemerken, daß diese Umstände, welche es auch sein mögen, die an der oberen und unteren Grenze der Helligkeit die Gültigkeit von FECHNER's Gesetz stören, auch in den mittleren Graden der Helligkeit ihren Einfluß bei genauer Beobachtung geltend machen, was natürlich nicht verhindert, daß jenes Gesetz als eine erste Annäherung an die Wahrheit stehen bleibt. Allerdings sind die meisten Gemälde, Zeichnungen und Photographien von den gewöhnlich vorkommenden Gegenständen der Darstellung gleich gut bei sehr verschiedenen Graden der Lichtstärke zu erkennen. Aber, wie oben bemerkt, findet man in Photographien Schattenabstufungen, die nur bei einer bestimmten und eng begrenzten Lichtstärke ganz deutlich hervortreten. Dazu gehören namentlich Landschaftsbilder, in denen sehr ferne im Nebel halb verschwimmende Bergketten dargestellt sind, am auffallendsten aber war es mir bei einigen stereoskopischen Photographien von Alpenlandschaften auf Glas, in denen sich Theile der Firnmeere oder ganz mit Schnee bedeckte Bergspitzen zeigen. Solche Schneeflächen sehen bei Lampenlicht oder mäßig starkem Tageslicht wie einförmige weiÙe Flächen aus, während sie gegen den hellen Himmel gekehrt noch zarte




Fig. 153.

Schatten zeigen, die eine Modellirung der weiÙen Flächen andeuten, und die bei noch stärkerem Lichte wieder verschwinden. In Photographien kann man so zarte Schatten natürlich nur durch Zufall finden, in Gemälden oder Zeichnungen kann man sie nicht erwarten, dagegen geben die rotirenden Scheiben ein leichtes Mittel ab, sehr zarte Schatten zu erzeugen, deren Lichtstärke in jedem gewünschten Verhältniß zur Helligkeit des weiÙen Grundes steht, wie sie denn auch MASSON schon zu photometrischen Versuchen gebraucht hat. Leicht zu erhalten sind solche Schatten, wenn man der Scheibe die Zeichnung wie in Fig. 153

gibt. Man zieht längs eines oder zweier Radien mit einer Ziehfeder einen unterbrochenen Strich, dessen Theile alle die gleiche Dicke haben. Bei der Rotation der Scheibe geben diese schwarzen Striche graue

auf der Scheibe. Ist  $d$  die Breite der Striche,  $r$  die Entfernung eines schwarzen Strichs vom Mittelpunkte der Scheibe, so ist die Helligkeit  $h$  des grauen Streifens, der bei der Rotation entsteht, wenn wir die Helligkeit der Scheibe gleich 1 setzen

$$h = 1 - \frac{d}{2r\pi}.$$

Die grauen Streifen unterscheiden sich also desto weniger von der Helligkeit der Scheibe, je größer  $r$  ist; die inneren sind dunkler, die äußeren heller. Man erhält eine Folge sehr zarter Abstufungen. Beim Versuche hat man zu untersuchen, wie weit die Ränder der grauen Streifen noch zu sehen sind. Man erkennt sie besser, wenn man mit dem Blicke zu den dunkleren Stellen eines Kreises hin- und hergeht, als wenn man eine kreisförmige Scheibe betrachtet; im letzteren Falle verschwinden die schwächeren Kreise schnell, auch wenn man sie vorher gesehen hat. Doch erkennt man sie genau auch nicht gleich beim ersten Hinsehen nach der Scheibe, sondern man muß sie erst eine Zeitlang aufmerksam betrachten. Übrigens muß man darauf achten, daß die Scheibe schnell genug umläuft, damit die grauen Streifen ganz continuirlich erscheinen, und nicht flimmern; auch sind schnelle Bewegungen des Blicks zu vermeiden, welche die Striche sichtbar machen. Auf der flimmernden Scheibe erkennt man auch die schwächeren Kreise, weil die Dunkelung sich dann nicht mehr gleichmäßig auf die ganze Zwischenraum zwischen zwei Vorübergängen des schwarzen Streifens vertheilt, sondern nur nach dem Vorübergange größer, nachher schwächer ist, als sie bei gleichmäßiger Vertheilung sein sollte. Es scheint mir deshalb nothwendig, die Messungen von Unterschiedsschwellen nur an Scheiben auszuführen, die schnell umlaufen, als zur Beseitigung des Flimmerns nöthig ist. Ich habe deshalb auch nicht mehr volles Vertrauen in meine eigenen früheren Angaben, die ich in der ersten Auflage dieses Werkes mitgetheilt habe, da der dem gebrauchten Apparate die vollkommene Gleichmäßigkeit der Bewegung nur noch eben erreichen konnte. Ich fand damals, daß ich an Sommertagen am Fenster bei Bewegung des Blicks noch einen Rand zu sehen konnte, wo der Unterschied der Helligkeit  $\frac{1}{133}$  war, und vorher erschien mir auch noch ein Rand von  $\frac{1}{150}$ , auf Augenblicke son-  
 315  
 der von  $\frac{1}{167}$  Unterschied. Mühsamer und anstrengender erschienen die Wahrnehmungen bis zu  $\frac{1}{150}$  bei directer Sonnenbeleuchtung der Scheibe. In der Mitte des Zimmers konnte ich zu derselben Zeit nur einen Unterschied von  $\frac{1}{117}$  wahrnehmen, den von  $\frac{1}{133}$  nur selten und un-  
 316  
 bemerkt.



Dasselbe Verhältniß ist später durch andre Beobachter bestätigt worden. Sehr deutlich zeigt es sich in den Versuchen von Herrn EBBINGHAUS.<sup>1</sup> Derselbe hatte sich eine Reihe von grauen Papieren hergestellt, welche 53 verschiedene, möglichst gleich breit gemachte Helligkeitsstufen zwischen Schwarz und Weiss darstellten. Die objectiven Helligkeiten wurden mit Hülfe des Farbenkreisels zahlenmäfsig bestimmt, und dann suchte der Beobachter Paare von Papierscheibchen dieser Art aus verschiedenen Gegenden der Scala, welche ihm gleich grofse Unterschiede zu haben schienen. Auch hierbei fand sich, dafs die objectiven Helligkeitsunterschiede an den Enden der Scala gröfser ausfielen, als in der Mitte. Zum Beispiel bei einem Versuch, die ganze Scala in sieben subjectiv gleiche Helligkeitsstufen zu theilen, ergaben sich die Quotienten von je zwei auf einander folgenden Helligkeiten von unten nach oben in folgender Reihe

2,25; 2,11; 2,05; 1,77; 1,72; 1,68; 1,98.

Wir werden dieselbe Thatsache bestätigt finden bei den später zu erwähnenden Versuchen der Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN über die Unterschiedsempfindlichkeiten für das Licht der Spectralfarben.

Für die objective Wahrnehmung der uns umgebenden Gegenstände ist das WEBER'sche Gesetz von grofser Wichtigkeit, namentlich für die richtige Auffassung der Modellirung ihrer Oberfläche. Wenn diese Fläche Wölbungen, schwache Vorsprünge oder Vertiefungen hat, so verrathen sich diese in der Regel durch entsprechende Abänderungen der Helligkeit. Die dem Licht zugekehrten Theile der Oberfläche sind heller beleuchtet, als die mehr oder weniger seitwärts gewendeten, geschweige denn die abgekehrten. Wenn die beleuchtende Fläche sehr ausgedehnt ist, wie der Tageshimmel, sind diese Unterschiede von Schatten und Licht oft sehr zart, und doch geben sie einen sehr deutlichen Eindruck der Form der Fläche, wie man besonders an guten Gemälden und Photographien erkennen kann, wo nur dieses Hülfsmittel zur Bezeichnung der Raumform der dargestellten Gegenstände übrig geblieben ist. Ebenso sind die Schlagschatten von grofser Wichtigkeit, da sie ein untrügliches Zeichen dafür geben, dafs der Schatten werfende Körper von der Richtung der Lichtquelle aus gesehn, sich vor der den Schatten empfangenden Fläche befindet. Auch die Schlagschatten können auf sehr zarte Andeutungen zurückgeführt sein, wenn die Lichtquelle sehr ausgedehnt ist.

Nun wird bei allen diesen Beschattungen die Lichtintensität der hellsten Theile in den beschatteten um einen gewissen Bruchtheil vermindert, welcher bei unveränderter Lage und Form der Lichtquelle unabhängig ist von der Intensität der Lichtquelle. Daraus folgt also, dafs innerhalb des sehr breiten Gebietes der Lichtstärken, für welche in hinreichender Annäherung das psychophysische Gesetz gilt, die Deutlichkeit der Wahrnehmung dieser Schatten und daher auch die Deutlichkeit der Modellirung der Ober-

<sup>1</sup> H. EBBINGHAUS, *Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin*. Sitzung vom 1. Dec. 1887. S. 995.

fast unabhängig ist von der absoluten Lichtstärke. Wesentlich darauf beruht, daß ein geschickter Maler auf den verhältnißmäßig schwach beleuchteten Flächen eines in einem Zimmer hängenden Gemäldes sowohl den Eindruck der von grellem Sonnenlicht wie von schwachem Mondlicht beleuchteten Gegenstände gut nachahmt, obgleich er weder so hohe Lichter anwenden kann, wie die Wirklichkeit bei ersterem, noch so tiefe Schatten, wie sie sie bei letzterem zeigt.

Bestimmt sich die Lichtstärke aber ihrer oberen oder unteren Grenze, so unterscheiden sich die Schwellen, die gleich deutlicher Empfindung entsprechen, so wird die Unterscheidung der zarten Schatten, und damit auch die Modellirung der Oberflächen undeutlicher. Diejenige mittlere Lichtstärke also, welche die größte Feinheit in der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede gewährt, ist auch diejenige, bei der wir die feinste Modellirung der uns gegenüberstehenden Körperoberflächen haben.<sup>1</sup>

Nicht in anderer Beziehung kommt es auf die Helligkeit für die Deutlichkeit des Sehens an, nämlich bei der Unterscheidung sehr kleiner Objecte. Wie schon erwähnt, daß die Unterscheidung kleiner Gegenstände, wie der Buchstaben eines Buches mühsamer wird bei sehr groben, wie bei sehr feinen Helligkeiten, während sie in breiten Stufen mittlerer Helligkeit gleich leicht merklich ist. Der Unterschied bleibt bestehen, wenn man durch eine Öffnung sieht, die enger ist als die Pupille, und dadurch die breiteren Zerstreuungskreise, die bei weiter Pupille in der Beleuchtung, wie die Diffractionerscheinungen und entoptischen Bilder, die bei enger Pupille in starkem Licht entstehen könnten, unverändert lassen.

Sehr feine dunkle Objecte auf hellem Grunde erscheinen überaus deutlich als feine schattige Flecke, selbst wenn sie sich auf einem einseitigen Zapfen des Netzhautcentrum abbilden. Sobald ihr optisches Bild nicht mehr ist, als der Querschnitt des Zapfens, wird durch das dunkle Bild nur ein Bruchtheil des Lichtes für diesen Zapfen weggenommen, und es kommt darauf an diese Verminderung um einen Bruchtheil wahrzunehmen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch unter der Annahme des Nervenverflechtens (s. S. 264).

Dadurch erlangen die Abstufungen der Helligkeit und ihre Wahrnehmung eine große praktische Wichtigkeit auch für die Wahrnehmung der räumlichen und örtlichen Unterschiede im Gesichtsfelde, und wir sind deshalb gezwungen auf die Helligkeit der Beleuchtung zu achten, und auch immer unmittelbar, ob sie zu groß oder zu klein für das Sehen feiner Objecte sei, und durch welche Art der Änderung wir sie besser machen könnten. Dadurch ist also auch ein bestimmter Grad der

<sup>1</sup> Vergleiche: H. HELMHOLTZ, *Populäre wissenschaftliche Vorträge*. Braunschweig 1876. Heft III, *Optisches über Malerei: Helligkeitsstufen*; später wieder abgedruckt in des Autors „*Vorträge und Abhandlungen*“, I. Braunschweig. 1884.

Helligkeit, die des deutlichsten Erkennens der Körperformen, als ausgezeichnet vor allen andern charakterisirt. Er ist allerdings nicht sehr scharf abzugrenzen, weil innerhalb breiter Abstufungen der Helligkeit das Verhältniß  $dH:H$  nur sehr kleine Unterschiede zeigt; auch ist die subjective Stärke der Empfindung zeitweilig durch die Wirkung vorausgegangenen Lichts großen Veränderungen unterworfen. Indessen wird sich bei dauerndem Verweilen in gleichmässig heller Umgebung doch immer wieder der gleiche Zustand des Auges für jeden Grad der Beleuchtung, und somit auch dieselbe Empfindungsstärke herstellen müssen.

Es scheint mir wünschenswerth, diese Verhältnisse durch kurze Namen zu bezeichnen. Je kleiner für eben noch wahrnehmbare Empfindungsunterschiede das Verhältniß  $dH:H$  ist, desto deutlicher erkennen wir die Objecte. Ich werde mir erlauben das umgekehrte Verhältniß  $\frac{H}{dH}$  als die Klarheit der Beleuchtungsstärke  $H$  zu bezeichnen, und diejenige Beleuchtung, bei welcher diese Gröfse ein Maximum wird, die Lichtstärke größter Klarheit, oder klarste Beleuchtung zu nennen.

316

Täuschungen, die auf dem FECHNER'schen Gesetze beruhen. Durch die oben nachgewiesene Abhängigkeit der Empfindungsstärke von der Lichtstärke erklärt sich eine Thatsache, die mir aufgefallen ist, dafs nämlich in dunklen Nächten helle Gegenstände verhältnissmässig zu ihrer Umgebung viel heller erscheinen, als bei Tage, sodafs man sich zuweilen der Voraussetzung nicht erwehren kann, sie seien selbstleuchtend. Bei sehr geringen Lichtstärken können wir nämlich die Empfindungsstärke der Lichtstärke proportional setzen, bei starker Beleuchtung dagegen ist die Empfindung für hellere Objecte relativ schwächer. Da wir nun gewöhnt sind, die Helligkeit der uns bekannten Objecte bei starker Beleuchtung zu vergleichen, so erscheinen uns bei schwacher Beleuchtung die hellen Gegenstände relativ zu hell, die dunkeln zu dunkel. Diesen Umstand benutzen auch die Maler in Mondscheinlandschaften, um den Eindruck schwacher Beleuchtung hervorzubringen. Sie heben die lichten Stellen viel greller heraus, als wenn sie Tageslicht darstellen.

321


Daraus, dafs die Empfindungsstärke der objectiven Lichtstärke nicht proportional ist, erklärt sich nun weiter eine Reihe von Thatsachen, welche man bisher unter dem Namen der Irradiation zusammengefaßt hat, und welche das Gemeinsame haben, dafs stark beleuchtete Flächen größer erscheinen, als sie wirklich sind, während die benachbarten dunklen Flächen um eben soviel kleiner erscheinen.

Die Erscheinungen selbst sind nach der Form der betrachteten Figuren sehr mannigfaltig, sie sind im allgemeinen am leichtesten sichtbar und am stärksten, wenn die Accommodation des Auges für den betrachteten Gegenstand nicht genau paßt, einerlei ob dieselbe zu fern oder zu nah ist, oder ob man das Auge mit einer Glaslinse, concav oder convex, bewaffnet, welche



Accommodation unmöglich macht. Aber die Irradiation fehlt auch dann, wenn die Accommodation genau ist, und ist auch dann bei kleinen, namentlich kleinen Gegenständen deutlich zu bemerken, bei Gegenständen offenbar deshalb, weil deren GröÙe durch die schmalen Zerstreuungskreise relativ mehr vergrößert wird, als die größerer Gegenstände, deren Dimensionen die Breite so schmalen Zerstreuungskreise, das gut accommodirte Auge liefert, verschwindet.

Helle Flächen erscheinen vergrößert. Die GröÙe von engen Spalten, durch welche helles Licht fällt, beurtheilen wir niemals richtig, sie erscheinen uns immer breiter, als sie wirklich sind, auch bei guter Accommodation. Ebenso erscheinen auch die Fixsterne als kleine Kreise, selbst wenn man sie durch ein Brillenglas betrachtet, welches die Accommodation möglich macht. In einem Gitter aus feinen dunklen Stäben mit Zwischenräumen, welche genau ebenso breit sind wie die Stäbe (gewöhnliche Drahtgitter zu Interferenzversuchen) erscheinen vor hellem Hintergrunde die Zwischenräume stets breiter als die Stäbe. Bei ungenauer Accommodation hinzu, so sind die Erscheinungen viel auffälliger, und werden auch an größeren Objecten sichtbar. *Fig. 154* zeigt



*Fig. 154.*

das Auge und die Erscheinung einer hellen Flamme hält, verschwindet, indem die beiden 322 Flächen, die im Gesichtsfelde neben ihm liegen, von beiden Seiten her zusammenfließen. Bei Mustern, die aus schwarzen und weißen Quadraten ähnlich dem eines Schachbretts zusammengesetzt sind, fließen durch die Irradiation die weißen Felder an den Ecken zusammen, und trennen die schwarzen. PLATEAU hat ein Experiment von der Art wie *Fig. 155* auch zur Untersuchung der Breite der Irradiation benutzt. Aus dunklen Schirmen waren die weißen Felder in der Mitte und von hinten erleuchtet, von den schwarzen Feldern war eines durch eine Linse horizontal verschiebbar, und wurde so verschoben, daß dem Beobachter die beiden mittleren Felder in eine zusammenzufallen schienen. Für größere Entfernungen waren die



*Fig. 155.*

schwarzen Felder aus Brettchen, für kleinere aus Stahlplättchen verfertigt. Der Fehler, welcher bei der Einstellung begangen war, bezeichnete die Breite der Irradiation.

3) Gerade Linien werden unterbrochen. Wenn man die Kante eines Lineals zwischen das Auge und eine helle Lichtflamme oder die Sonne hält, so erscheint das Lineal an der Stelle, wo der helle Körper darüber hervorblickt, einen Ausschnitt zu haben, wie *Fig. 156* darstellt.



Fig. 156.

Ich mache für den letzteren Fall gleichzeitig darauf aufmerksam, daß wenn der helle Körper eine Lampenflamme mit cylindrischem Dochte ist, der Einschnitt an den Rändern der Flamme, welche, wie oben erwähnt, eine gröfsere absolute Helligkeit haben, tiefer erscheint als in der Mitte der Flamme, trotzdem das Auge die gröfsere Helligkeit der Ränder nicht als solche empfindet.

Alle diese Erscheinungen reduciren sich darauf, daß die Ränder heller Flächen im Gesichtsfelde sich gleichsam verschieben und über die benachbarten dunkleren Flächen übergreifen. Sie greifen desto mehr über, je ungenauer die Accommodation ist, je gröfsere Zerstreuungskreise also ein jeder lichte Punkt der Fläche im Auge entwirft. Nun wissen wir aber, daß auch bei genauester Accommodation die Zerstreuungskreise nicht ganz fehlen wegen der Farbenzerstreuung und der übrigen Abweichungen des Auges, die wir in § 14 unter dem Namen der monochromatischen Abweichungen des Auges zusammengefaßt haben. Durch diese Zerstreuungskreise wird bewirkt, daß sich am Rande des Netzhautbildes einer hellen Fläche das Licht weiter verbreitet, als das geometrische Bild der Fläche reicht, aber auch die Dunkelheit greift über den Rand des Bildes, d. h. das Licht fängt schon innerhalb des Randes, wo es noch seine volle Stärke haben sollte, an abzunehmen. Es sei in *Fig. 157* *c* ein Punkt des Randes einer hellen Fläche, *bg* eine senkrecht gegen den Rand gezogene




Fig. 157.

323

Zerstreuungskreise gebildet werden, so nimmt dagegen, wie oben S. 167 gezeigt ist, die Helligkeit ab wie die Curve *afg*. Es greift dabei sowohl

gerade Linie. Senkrecht gegen dieselbe seien Coordinaten aufgetragen, welche der objectiven Helligkeit in den entsprechenden Punkten von *bg* proportional sind. Wäre das Bild der Fläche vollkommen genau, so würde die gebrauchene Linie *adcg* die Grösse der Helligkeit ausdrücken. Von *b* bis zum Rande der Fläche bei *c* würde nämlich die Fläche die volle Helligkeit *H* haben, von *c* ab nach *g* zu die Helligkeit Null.

Wenn durch Mangel der Accommodation



über das Dunkle über in  $cg$ , als das Dunkle über das Helle in  $ad$ , viel Licht sich über den Rand hinaus verbreitet, muß natürlich das des Randes der hellen Fläche entzogen werden. So lange die objective Helligkeit berücksichtigen, würden also die hellen durch die Zerstreuungskreise nicht vergrößert erscheinen können. Im Theil die Fläche, welche die volle Helligkeit zeigt, ist durch die Zerstreuungskreise kleiner geworden, wenn auch die Fläche, welche überstrahlt empfängt, größer geworden ist. Berücksichtigen wir nun aber, daß die Lichtempfindung für die höheren Stufen der objectiven Helligkeit weniger verschieden ist, so folgt daraus, daß die Verminderung der Helligkeit innerhalb der Fläche weniger bemerkt werden wird, als die Erhellung vorher dunkler Stellen jenseits ihres Randes, sodaß also für die Beurtheilung die Ausbreitung des Hellen allein, und nicht die des Dunkels in Betracht zu kommen muß. Am auffallendsten wird die Erscheinung sein, wenn die Fläche hell genug ist, daß innerhalb der Zerstreuungskreise die Lichtempfindung schon ihr Maximum erreicht. Wäre das z. B. in der That bei  $h$  der Fall, so würde die scheinbare Helligkeit bei  $h$  nicht von der vollen Helligkeit im Innern der Fläche zu unterscheiden sein. Die volle Helligkeit der Fläche würde also bis  $h$  zu reichen scheinen, und jenseits  $h$  erst sehr langsam abnehmen, ehe sie bei  $g$  ganz verstummt. Daraus erhellt auch, warum für das zu Stande kommen der Accommodation eine große Helligkeit vortheilhaft ist. Desto näher nämlich an  $g$  die Stelle, wo das Maximum der Lichtempfindung erreicht wird. Daraus erhellt auch, warum bei gesteigerter Helligkeit des Grundes, selbst wenn die Empfindung dieser Helligkeit dabei nicht weiter steigen kann, die Irradiation noch wächst. Proportional der Ordinate  $H$  wachsen auch bei gesteigerter objectiver Lichtstärke sämtliche Ordinaten der Irradiation, und desto näher an  $g$  rückt also auch die Ordinate, welche der Maximum der Empfindung genügenden Helligkeit entspricht. Messende über den Einfluß der Helligkeit hat PLATEAU ausgeführt, und hat gefunden, daß die GröÙe der Irradiation nicht proportional der Helligkeit wächst, sondern in einem geringeren Maasse, und bei steigender Helligkeit sich asymptotisch einem Maximum nähert, wie es auch aus unserer Theorie folgt.

Es ergibt sich ferner aus dieser Theorie, warum die Irradiation desto größer wird, je größere Zerstreuungskreise sich bilden.

Bei den meisten Personen die Zerstreuungskreise eines zu fernen Gegenstandes nach der Höhe größer sind, als nach der Breite, erscheinen kleine Quadrate auf dunklem Grunde in einer für die Accommodation etwas zu großen Entfernung perpendicular verlängert, und schwarze Quadrate auf hellem Grunde horizontal verlängert. Perpendicularäre Verlängerung größerer Quadrate sehen übrigens die meisten Personen auch bei genauer Accommodation. Nach den Versuchen von A. FICK<sup>1</sup> erschien einem geübten, nicht

FICK. *Hentle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin.* Neue Folge II. 8. 83.

kurzsichtigen Auge bei 4500<sup>mm</sup> Abstand ein Rechteck von 22 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als Quadrat, eines von 21 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als vertical verlängertes Rechteck. Es ist dies eine Erscheinung anderer Art, die bei weissen wie schwarzen Rechtecken gleichmäßig eintritt, und später in der Lehre vom Augenmaße § 28 behandelt werden soll.

In anderen Augen, denen ein ferner Lichtpunkt dreistrahlig erscheint, machen sich auch in den andern Fällen von Irradiation drei Hauptrichtungen bemerklich, in denen sie am stärksten ist, wie es JOSLIN<sup>1</sup> beschreibt.

Ich habe in dem Vorstehenden den Namen der Irradiation nur auf diejenigen Fälle angewendet, wo man nicht die Zerstreuungskreise als solche wahrnimmt, sondern wo sich scheinbar die Fläche, welche die volle Beleuchtungsstärke hat, vergrößert. Indessen ist vielfältig der Name der Irradiation auf die Bildung der Zerstreuungskreise überhaupt angewendet worden, auch wo man diese als lichtschwächere Theile des Bildes erkennt. Es ist aber wohl unnöthig, auf diese Fälle einen besonderen neuen Namen anzuwenden. Es können übrigens auch durch die Zerstreuungskreise neue Begrenzungslinien entstehen, welche das Object in veränderter Gröfse erscheinen lassen, ohne dafs die Lichtstärke noch einen besonderen Einfluß hätte. Namentlich hat VOLKMANN<sup>2</sup> gefunden, dafs sehr feine schwarze Fäden auf weifsem Grunde ebenso wie weisse auf dunklem Grunde für breiter gehalten werden, als sie sind, während die bisher betrachtete Art der Irradiation immer nur das Hellere vergrößert. VOLKMANN benutzte Fäden von 0,0445 Mm. Dicke in 333 Mm. Entfernung vom Auge, welche demgemäfs dem Auge viel kleiner erscheinen mußten, als die kleinsten wahrnehmbaren Distanzen. Er hatte ein Schraubenmikrometer so einrichten lassen, dafs die Fäden langsam einander genähert werden konnten, und stellte dem Experimentirenden die Aufgabe, die Fäden so zu stellen, dafs der Zwischenraum ebenso breit sei, wie die Fäden. Alle Individuen machten aber den Zwischenraum zu breit, und zwar auch, wenn er hell war, und die Fäden dunkel. VOLKMANN giebt davon die Erklärung, dafs man statt der schmalen schwarzen Streifen breitere Zerstreuungsbilder derselben sehe, denen man dann den mittleren hellen Zwischenraum gleich mache. Er benutzt deshalb auch diese Messungen, um die Breite der Zerstreuungsbildchen bei guter Accommodation zu bestimmen. Er selbst machte den Zwischenraum im Mittel gleich 0,207 Mm., während die Dicke der Fäden, denen derselbe gleich sein sollte, nur 0,0445 Mm. betrug, und berechnet daraus die Breite des Zerstreuungsbildes auf der Netzhaut gleich 0,0035 Mm., bei anderen Personen bei hellem Hintergrund schwankt diese letztere Gröfse zwischen 0,0006 und 0,0025. Diese Gröfsen sind kleiner als die kleinsten sichtbaren Abstände (0,0044 Mm.) und als die Zapfen des gelben Flecks

<sup>1</sup> Vergl. J. PLATEAU. *Prog. Ann.* Bd. 51a. S. 107. 1842.

<sup>2</sup> VOLKMANN. *Berichte der sächsischen Ges. d. Wiss.* 1857. S. 129—148.

(0,0045 bis 0,0054), sodafs möglicher Weise die letzteren die Breite des schwarzen Bildes bestimmt haben können. Dafs so grofse Unterschiede in den Einstellungen vorkamen, darf bei einer so subtilen Aufgabe wohl nicht wundern.

Aber auch schwarze Streifen von erkennbarer Breite, welche bei so ungenügender Accommodation betrachtet werden, dafs die Zerstreuungskreise viel breiter sind, als die Streifen, erscheinen breiter als sie sind. Dies scheint mir auf der Vertheilung des Lichts in dem Zerstreuungskreise zu beruhen. Es sei *Fig. 158 ab* der Durchschnitt eines Papierblatts, auf welches eine schwarze Linie gezeichnet ist, die hier im Querschnitt als Punkt *c* erscheint. Es mögen durch mangelhafte Accommodation Zerstreuungskreise vom Radius *fc* entstehen, so wird die Curve der Lichtstärke, in der die einzelnen Punkte der Linie *ab* im Netzhautbilde erscheinen, nach den in § 13 entwickelten Principien und abgesehen von den Störungen durch Asymmetrie der Linse ausgedrückt durch die Linie *αγγδβ*. Hier erleidet nun die Lichtstärke bei *γ* und *δ* einen plötzlichen Abfall, und diese Stellen erscheinen deshalb als Grenzlinien. Wäre die Linie *c* weifs auf schwarzem Grunde, so würde *αβ* als Abscissenlinie zu nehmen sein, und die negativen Ordinaten der Curve *γγδ* würden die Lichtstärke ausdrücken; auch dann haben wir bei *f* und *d* einen plötzlichen Abfall der Lichtstärke. Davon übrigens, dafs solche Linien, in denen der Differentialquotient der Lichtstärke unendlich grofs wird, als Grenzlinien erscheinen, kann man sich mittels der rotirenden Scheibe überzeugen. Wenn man eine weifse Scheibe mit einem runden kreisförmigen Flecke, wie *Fig. 159*, rotiren läfst, so erscheint der schwarze Fleck bei schneller Bewegung wie ein grauer Kreis, dessen Lichtintensität durch eine ganz ähnliche Curve wie *αγγδβ* *Fig. 158* auszudrücken sein würde, wie aus den im folgenden Paragraphen zu entwickelnden Gesetzen hervorgeht. Der graue Kreis erscheint dabei ganz scharf begrenzt an beiden Seiten, und in seinem Innern bemerkt man kaum die ungleichen Grade der Helligkeit; der Streifen erscheint vielmehr fast gleichmäfsig grau gefärbt. Übrigens mischen sich in die Zerstreuungsbilder schmaler schwarzer Streifen meist mehr oder weniger die Doppelbilder ein, welche durch Asymmetrie der Linse entstehen (*Fig. 85*, S. 172), wobei die Lichtvertheilung im Zer-




Fig. 158.




Fig. 159.

sich in die Zerstreuungsbilder schmaler schwarzer Streifen meist mehr oder weniger die Doppelbilder ein, welche durch Asymmetrie der Linse entstehen (*Fig. 85*, S. 172), wobei die Lichtvertheilung im Zer-

streuungsbilde zwar verändert wird, aber doch jedenfalls die gröfsere Breite des Bildes bestehen bleibt.

326 Sobald der schwarze Streifen nicht mehr sehr schmal ist gegen die Breite der Zerstreuungsbilder, so nimmt auch die Helligkeit an seinem Rande allmähig ab, wie in *Fig. 157*, und dann erscheinen seine Ränder verwaschen grau, seine Mitte schwarz. Man erkennt alsdann das Vorhandensein von Zerstreuungskreisen und die Täuschung schwindet. Der Unterschied zeigt sich sehr auffallend in einem von VOLKMANN angegebenen Versuche. Man betrachte die *Fig. 160* aus solcher Entfernung, dafs die Accommodation



*Fig. 160.*

beträchtlich mangelhaft ist, so wird man finden, dafs der mittlere weisse Streifen, der überall gleiche Breite hat, eine keulenförmige Gestalt bekommt, indem das zwischen den breiten schwarzen Flächen stehende Ende breit wird, das zwischen den schmalen schwarzen Streifen stehende dagegen schmaler wird und gleichsam den Griff der Keule bildet. Zwischen den breiten schwarzen Flächen breitet sich der weisse Streifen durch die gewöhnliche Art der Irradiation aus. Die schmalen schwarzen Streifen dagegen verwandeln sich in breitere graue, und beeinträchtigen dadurch die Breite des zwischen ihnen liegenden mittleren Weissen. PLATEAU hat ähnliche Phänomene beschrieben, daraus aber geschlossen, dafs die Irradiation zweier benachbarter weisser Ränder sich gegenseitig beschränke.

Diese zuletzt beschriebenen Phänomene der Ausbreitung dunkler Streifen sind deshalb einfache Fälle von Zerstreuungsbildern, unabhängig von der Beleuchtungsstärke und von dem Gesetze der Empfindungsstärke. Ich würde deshalb vorziehen, den Namen der Irradiation nicht auf sie anzuwenden, sondern diesen zu beschränken auf diejenigen Fälle, wo die Erscheinung von der Beleuchtungsstärke abhängt.

Eine sehr grofse Anzahl von Physikern und Physiologen hat eine andere Erklärung der Irradiationerscheinungen angenommen, welche namentlich von PLATEAU vertheidigt und ausführlich durchgeführt ist. Danach wird angenommen, dafs in der Netzhaut eine erregte Nervenfasern die Fähigkeit habe, den Zustand der Reizung auch in den benachbarten Fasern hervorzurufen, so dafs auch diese Lichtempfindung veranlassen, obgleich sie von keinem objectiven Lichte getroffen werden. Es würde dies ein Fall sogenannter Mitempfindung sein. Dergleichen Mitempfindungen kommen bei anderen sensiblen Nerven vor. Viele Personen empfinden z. B. Kitzel in der Nase, wenn heftiges Licht in ihr Auge fällt, empfinden ein kaltes Überlaufen in der Haut des Rumpfes, wenn sie kreischende oder quiet-schenden Töne hören. In diesen und anderen Fällen kann die Übertragung der Reizung von der primär erregten Nervenfasern auf die andere



erst innerhalb der Centralorgane geschehen, da der Sehnerv mit den sensiblen Nerven der Nase (*Nervus trigeminus*) und der Hörnerv mit den Hautnerven des Rumpfes keine andere anatomische Communication hat, als durch die Centralorgane. Übrigens kommen dergleichen Mitempfindungen immer nur in ziemlich vereinzeltten Beispielen vor, und die angeführte Deutung derselben kann nicht als fest begründet angesehen werden, weil möglicherweise auch reflectorische Entladungen nach den absondernden Drüsen der Nase oder den Gefäßmuskeln der Hautgefäße ähnliche Empfindungen mittelbar hervorrufen könnten. Dafs in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Erregung einer sensiblen Faser nicht auf andere Fasern übertragen wird, <sup>327</sup> geht schon aus der allgemeinen Erfahrung hervor, wonach wir die einzelnen Eindrücke, welche auf unsere Sinnesorgane geschehen, eben isolirt empfinden können. Wird eine Hautstelle gestochen, dadurch die zugehörige Nerven-faser erregt, so würden ausgebreitete Schmerzempfindungen in vielen Stellen der Haut entstehen müssen, wenn die Überleitung auf andere Nervenfasern regelmäfsig und constant vorkäme. Wir würden dann die primär erregte Stelle von den secundär erregten nicht sicher unterscheiden können. In der Regel empfinden wir nun Reizung einer einzelnen Hautstelle eben nur in der gereizten Stelle, und etwa ihrer allernächsten Nachbarschaft, den ziemlich grofsen Empfindungskreisen der Haut entsprechend. Es treten also keine Mitempfindungen ein. Wenn aber der örtliche Schmerz sehr heftig ist und sehr lange dauert, so treten allerdings auch Schmerzen in den benachbarten Theilen ein, welche gewöhnlich als Mitempfindungen gedeutet werden, aber freilich auch von der Ausbreitung der schmerzerregenden Schädlichkeit oder der Entzündung herrühren können. PLATEAU erinnert auch an die Thatsache, dafs, wenn das Bild eines auf weifses Papier gezeichneten schwarzen Flecks auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, in der entsprechenden Stelle des Gesichtsfeldes nur Weifs empfunden wird, und nimmt auch hier eine Ausbreitung der Erregung über die Eintrittsstelle des Sehnerven an. Dafs aber diese Erscheinung ganz anderer Art ist, werden wir später zeigen. Wenn man also die Irradiation im Auge als Mitempfung auffassen will, so würde diese Ansicht sich doch nur auf selbst noch zweifelhafte Analogien in andern Theilen des Nervensystems stützen müssen. Andererseits sind die Erscheinungen der Irradiation im Auge alle der Art, dafs immer auch objectives Licht auf die Theile der Netzhaut fällt oder fallen kann, wo man die Mitempfung vermuthet. Die Stärke der Irradiation ist durchaus der Gröfse der Zerstreuungskreise proportional und die ganze Erscheinung läfst sich mit allen ihren Einzelheiten aus anderen wohl festgestellten Erklärungs-principien herleiten, sodafs ich es für ungerechtfertigt halte, in einem solchen Falle neue Principien von zweifelhafter Richtigkeit zu Hülfe zu nehmen.

Wenn man die peripherischen Enden der Sehnervenfasern als netzförmig verästelt ansieht, wie es wahrscheinlich die der Tastnerven in der Haut sind, so würde die Reizung einer punktförmigen Stelle allerdings eine Anzahl benachbarter Nervenfasern erregen können, und wenn die Erregung

auch der etwas entfernten das Maximum der Empfindung erreichte, würde der ganze Umkreis, so weit dies geschieht, gleichmäßig beleuchtet erscheinen. Das wäre nicht im eigentlichen Sinne Mitempfindung, denn die mitempfindenden Fasern wären alle auch vom Reize mitgetroffen. Durch das Gesetz der Unterschiedsschwellen würde aber die Localisation ungenau, welche in der erwähnten Hypothese davon abhängt, daß das Verhältniß, in welchem die Erregungsstärke der verschiedenen Fasern steht, richtig abgeschätzt wird. Diese Hypothese würde also in der That eine von der Ausbreitung objectiven Lichts unabhängige Art der Irradiation geben.

Unterschiedsschwellen verschiedener Farben. Von den Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN<sup>1</sup> sind neuerdings auch Versuchsreihen angestellt worden über die Größe der Unterschiedsschwellen bei verschieden farbigem Lichte. Es hat sich dabei gezeigt, daß wenn man eine passende Wahl der Beleuchtungseinheiten für die verschiedenen Spectralfarben trifft, der Gang der Unterschiedsschwellen in ihrer Abhängigkeit von den absoluten Lichtstärken für grössere Intensitäten nur kleine unsichere Unterschiede zeigt. Dagegen zeigt sich bei den geringeren Beleuchtungsstärken ein beträchtlicher Unterschied zwischen den brechbaren und weniger brechbaren Farben. Für den ersteren, den blauen Farben sind alsdann viel kleinere Unterschiede der objectiven Lichtstärke wahrnehmbar als bei den rothgelben Farben.

Ich gebe hier Figur 161 f. S., welche von den genannten Autoren nach ihren Beobachtungen construirt worden ist, und den Unterschied für die schwächeren Intensitäten stark hervortreten läßt. Zu dem Ende sind als Abscissen horizontal nicht die Werthe der Lichtstärken, die in Ziffern darunter angegeben sind, sondern deren Logarithmen aufgetragen, und als Ordinaten die Größen  $\frac{dr}{r}$  (auch in Ziffern angegeben), welche nach dem FECHNERSchen Gesetze constant sein sollten, und je höher sie ausfallen, desto grössere Unempfindlichkeit des Auges für schwache Beleuchtungsunterschiede anzeigen. Der Zweig I der Curve bezieht sich auf die hohen Beleuchtungsstärken, II auf die blaue Hälfte des Spectrum, die Wellenlängen 505  $\mu\mu$  bis 430  $\mu\mu$  zusammenfassend, III auf die rothgelbe, zwischen den Wellenlängen 670  $\mu\mu$  und 575  $\mu\mu$ .

Die Ausführung dieser Versuche geschah in folgender Weise:

Als Lichtquelle diente entweder ein sog. Triplex-Gasbrenner oder für die grösseren Intensitäten ein LINNEMANN'sches Zirconlicht.

Ein bilateraler Spalt  $S_1$ , dessen Breite durch eine Mikrometerschraube bestimmt werden konnte, stand im Brennpuncte einer Linse  $L_1$  von 10 cm Durchmesser. Das somit fast parallel gemachte Strahlenbündel wurde in einem mit zimmtsaurem Äthyläther gefüllten Flüssigkeitsprisma  $P$  von entsprechender Größe dispersirt und dann durch die achromatische Objectivlinse  $L_2$  eines grossen astronomischen Fernrohrs zu einem Spectrum wieder vereinigt, welches von der Lithiumlinie (670  $\mu\mu$ ) bis zur G-Linie (430  $\mu\mu$ ) eine Ausdehnung von ungefähr 20 cm

<sup>1</sup> ARTHUR KÖNIG und EUGEN BRODHUN, Experimentelle Untersuchungen über die psychophysikalische Fundamentalförmel in Bezug auf den Gesichtssinn. *Sitzungsberichte d. Akad. zu Berlin*. 26. Jull. 1888.

der Ebene dieses Spectrum war ein rechteckiger Spalt  $S_2$  von etwa  
 und 7 mm Höhe aufgestellt, und hinter diesem ein Doppelspath, dessen  
 vertical und zwar senkrecht zu jener Spaltebene stand. Durch diesen  
 hindurch wurde nun der Spalt  $S_2$  vermittelt eines kurzen astrono-  
 mrohrs betrachtet, in dessen Ocular  $O$  ein NICOLsches Prisma  $N_2$  ein-

In Folge der geringen Breite des Spaltes im Vergleich zu der ganzen  
 des Spectrum war selbst in denjenigen Theilen desselben, wo der  
 am schnellsten wechselt, keine Farbendifferenz seiner beiden Ränder  
 n. Die Einstellung auf die sechs benutzten Wellenlängen geschah. in-  
 r Scala die Lage der hauptsächlichsten FRAUNHOFERSchen Linien des




Fig. 161.

timmt wurde und man dann den Spalt  $S_2$  (nebst den mit ihm fest  
 Oculartheilen des Apparates) an den durch Interpolation bestimmten  
 1 Scalentheil stellte. Die Spalthöhe von  $S_2$  war der Größe des  
 so angepaßt worden, daß die beiden durch den letzteren erzeugten  
 einander um die halbe Spalthöhe verschoben waren, man also drei  
 gleicher Größe vertical übereinander sah. Das untere wurde aber  
 gnetes Ocular-Diaphragma abgeblendet. Jedes dieser Rechtecke hatte  
 e Höhe von ungefähr  $3^\circ$  und eine scheinbare Breite von  $4\frac{1}{3}^\circ$ .  
 uptschnitt des Ocularnicol  $N_2$  parallel dem Hauptschnitte des Doppel-  
 hienen beide Rechtecke gleich hell, bei einer Drehung des Nicol um  
 gen das obere Rechteck gänzlich ausgelöscht, während das untere,  
 underlagerung entstandene, seine Intensität unverändert beibehalten  
 dieses freilich voraus, dass das den Spalt  $S_2$  erleuchtende Spectral-  
 rt oder in einer Ebene polarisirt ist, welche mit dem Hauptschnitt



des Doppelspathes einen Winkel von  $45^\circ$  bildet. Da das erstere nun in Folge der Reflexion an den Flächen des Flüssigkeitsprismas  $P$  nicht der Fall ist, so wurde unmittelbar vor den rechteckigen Spalt  $S_2$  nach der Linse  $L_2$  hin ein anderes NICOLsches Prisma  $N_1$  eingeschaltet, dessen Polarisationssebene die erforderliche Neigung hatte. Man konnte nun durch Drehen des Ocular-Nicol  $N_2$  das obere Rechteck von der constant bleibenden Intensität des unteren Rechteckes ab bis zum Verschwinden in meßbarer Weise verdunkeln, während die Grenze beider Felder durch kein andres Markzeichen als der Helligkeitsunterschied angezeigt war. Eine Einstellung zur Bestimmung der Unterschiedsschwelle bestand darin, das man das obere Rechteck eben merklich gegen das untere verdunkelte. Bezeichnen wir dann die Intensität des bei dieser Einstellung constant bleibenden unteren Rechteckes mit  $J$ , den Winkel, den die Polarisationssebene des Ocular-Nicols  $N_2$  gegen den Hauptschnitt des Doppelspathes bildet, mit  $\alpha$ , so haben wir die Relationen:

$$r + \delta r = J$$

$$r = J \cdot \cos \alpha^2$$

woraus folgt

$$\delta r = J \cdot \sin \alpha^2$$

$$\text{und } \frac{\delta r}{r} = \operatorname{tg} \alpha^2.$$

Wir brauchen also nur den Winkel  $\alpha$  und die Intensität  $J$  zu kennen.

Der erstere wurde an einem Theilkreise für jede Unterschiedsschwelle zehnmal abgelesen und hieraus das Mittel genommen. Um den Beobachter möglichst von äußeren Einflüssen zu befreien, saß er in einem durch schwarze Tücher völlig abgegrenzten und verdunkelten Raum, in den nur das Ocularende des Apparates hineinragte, und er erfuhr während des Verlaufs einer Beobachtungsreihe nicht das Resultat der von einem Gehülfen gemachten Ablesungen.

Als Einheit der Intensität  $J$  wurde die Helligkeit festgesetzt, mit welcher einem durch ein Diaphragma von 1 qmm blickenden Auge eine mit Magnesiumoxyd überzogene Fläche erscheint<sup>1</sup>, die in einem Abstand von 1 m durch eine ihr parallel stehende 0,1 qcm große Fläche von schmelzendem Platin senkrecht bestrahlt wird.<sup>2</sup> Die directe experimentelle Vergleichung geschah, indem bei der Wellenlänge 605  $\mu$  die Spaltbreite bestimmt wurde, welche zur Herstellung einer etwa 200 solcher Einheiten enthaltenden Helligkeit auf der durch das erwähnte kleine astronomische Fernrohr betrachteten Fläche des unteren Rechteckes erforderlich ist. Diese ziemlich hohe Helligkeit wurde gewählt, damit hierbei das später ausführlicher erwähnte PURKINJESche Phaenomen keine Fehlerquelle mehr bilden konnte. Die geringe Abweichung (nur etwa 2 $^0$ /100) des Mittelwerthes der von beiden Beobachtern gemachten Bestimmungen war zwar vielleicht ein glücklicher Zufall, gewährt aber doch einige Gewähr für die Berechtigung solcher Helligkeitsschätzungen verschieden gefärbter Felder. Später zu erwähnende Helligkeitsbestimmungen, welche Herr BRODHUN für die beiden Farbensysteme in dem Interferenzspectrum desselben auch hier benutzten Gasbrenners gemacht hatte, ermöglichten mit Benutzung der experimentell ermittelten Dispersionsverhältnisse in dem Flüssigkeitsprisma eine Berechnung der zur Herstellung derselben Helligkeitseinheit an den übrigen in Betracht kommenden Spectralregionen erforderlichen Spaltbreiten.

<sup>1</sup> Vergl. A. KÖNIG, *Grünes Archiv* Bd. 30 (2) S. 161. 1884 und *Wied. Ann.* Bd. 22. S. 572. 1884.

<sup>2</sup> Diese Beleuchtung entspricht etwa der von 1,5 englischen Normalkerzen aus gleicher Entfernung.

Die Reihenfolge der Intensitäten  $J$ , welche bei jeder Spectralfarbe hergestellt wurde, war nach aufwärts 1, 2, 5, 10, 20 u. s. w., nach abwärts 0.5, 0.2, 0.1, u. s. w., wobei um immer eine möglichst gleiche Reinheit des Spectrum zu sein und von der Ungenauigkeit der Mikrometerschraube des Spaltes  $S_1$  thunlichst unabhängig zu sein, Rauchgläser von genau bestimmten Absorptionscoefficienten dem Spalte  $S_1$  und der Linse  $L_1$  eingeschaltet wurden und der Spalt  $S_1$  soviel geändert wurde, als zur genauen Herstellung der genannten Stufenfolge der Intensitäten erforderlich war.

Bei der höchsten durch den Gasbrenner erreichbaren Intensität wurde dann ein kleines schmales an dem Spalte  $S_2$  angebrachtes totalreflectirendes Prisma mit demselben Wellenlänge, welches durch ein anderes seitwärts aufgestelltes Prisma erzeugt war, so hell erleuchtet, dass seine ebenfalls durch dasselbe Ocular betrachtete Fläche mit dem eigentlichen Beobachtungsfelde gleich hell erschien. Nachdem der Gas-Triplexbrenner durch das Zirconlicht ersetzt und dieses zunächst durch Absorptionsgläser und Änderung des Spaltes  $S_1$  so abgeschwächt, daß das Beobachtungsfeld wieder gleich dem inzwischen constant erhaltenen Vergleichsfelde wurde, wurde durch Wegnahme der Absorptionsgläser u. s. w. wurden dann die höheren Stufen von  $J$  hergestellt.

Werthe der Unterschiedsschwellen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die von den genannten Beobachtern bei der Bestimmung der Unterschiedsschwellen in den benutzten sechs Spectralregionen erlangten Werthe. Die Überschrift gibt die Wellenlänge und den Beobachter an. Die besonderen Überschriften der einzelnen Columnen benutzen die auf S. 404 eingeführten Bezeichnungen. Die oberen Grenzen der Beobachtungsreihen sind gegeben durch die höchste erzielte Leistung des Zirconlichtes; die unteren Grenzen schließen unmittelbar an die zu besprechenden unteren Reizschwellen an.

K.

670  $\mu\mu$

B.

$r$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
0	8°20'	48950	1050	0.0215
0	7 16	19680	320	0.0163
0	7 10	9844	156	0.0158
0	7 38	4912	88	0.0180
0	7 24	1967	33	0.0169
0	7 29	983	16.9	0.0172
0	8 10	490	10.1	0.0206
0	8 31	196	4.40	0.0224
0	9 50	97.1	2.92	0.0300
0	11 11	48.1	1.88	0.0391
0	12 10	19.1	0.89	0.0465
0	14 50	9.35	0.655	0.0701
5	17 38	4.54	0.459	0.101
2	24 27	1.66	0.343	0.207
1	30 31	0.742	0.258	0.347
	37 50	0.312	0.188	0.603

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
50000	8°33'	48895	1105	0.0226
20000	7 47	19634	367	0.0187
10000	7 19	9838	162	0.0165
5000	7 2	4925	74.9	0.0152
2000	7 25	1967	33.3	0.0169
1000	7 41	982	17.9	0.0182
500	8 22	489	10.6	0.0216
200	8 38	195	4.51	0.0230
100	9 21	97.4	2.64	0.0271
50	10 26	48.4	1.64	0.0339
20	11 44	19.2	0.827	0.0431
10	13 23	9.46	0.536	0.0566
5	16 41	4.59	0.412	0.0898
2	23 27	1.68	0.317	0.188
1	32 20	0.714	0.286	0.401
0.5	41 41	0.279	0.221	0.793



kurzsichtigen Auge bei 4500<sup>mm</sup> Abstand ein Rechteck von 22 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als Quadrat, eines von 21 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als vertical verlängertes Rechteck. Es ist dies eine Erscheinung anderer Art, die bei weissen wie schwarzen Rechtecken gleichmäfsig eintritt, und später in der Lehre vom Augenmafs § 23 behandelt werden soll.

In anderen Augen, denen ein ferner Lichtpunkt dreistrahlig erscheint, machen sich auch in den andern Fällen von Irradiation drei Hauptrichtungen bemerklich, in denen sie am stärksten ist, wie es JOSLIN<sup>1</sup> beschreibt.

Ich habe in dem Vorstehenden den Namen der Irradiation nur auf diejenigen Fälle angewendet, wo man nicht die Zerstreuungskreise als solche wahrnimmt, sondern wo sich scheinbar die Fläche, welche die volle Beleuchtungsstärke hat, vergrößert. Indessen ist vielfältig der Name der Irradiation auf die Bildung der Zerstreuungskreise überhaupt angewendet worden, auch wo man diese als lichtschwächere Theile des Bildes erkennt. Es ist aber wohl unnöthig, auf diese Fälle einen besonderen neuen Namen anzuwenden. Es können übrigens auch durch die Zerstreuungskreise neue Begrenzungslinien entstehen, welche das Object in veränderter Gröfse erscheinen lassen, ohne dafs die Lichtstärke noch einen besonderen Einflufs hätte. Namentlich hat VOLKMANN<sup>2</sup> gefunden, dafs sehr feine schwarze Fäden auf weifsem Grunde ebenso wie weifse auf dunklem Grunde für breiter gehalten werden, als sie sind, während die bisher betrachtete Art der Irradiation immer nur das Hellere vergrößert. VOLKMANN benutzte Fäden von 0,0445 Mm. Dicke in 333 Mm. Entfernung vom Auge, welche demgemäfs dem Auge viel kleiner erscheinen mußten, als die kleinsten wahrnehmbaren Distanzen. Er hatte ein Schraubenmikrometer so einrichten lassen, dafs die Fäden langsam einander genähert werden konnten, und stellte dem Experimentirenden die Aufgabe, die Fäden so zu stellen, dafs der Zwischenraum ebenso breit sei, wie die Fäden. Alle Individuen machten aber den Zwischenraum zu breit, und zwar auch, wenn er hell war, und die Fäden dunkel. VOLKMANN giebt davon die Erklärung, dafs man statt der schmalen schwarzen Streifen breitere Zerstreuungsbilder derselben sehe, denen man dann den mittleren hellen Zwischenraum gleich mache. Er benutzt deshalb auch diese Messungen, um die Breite der Zerstreuungsbildchen bei guter Accommodation zu bestimmen. Er selbst machte den Zwischenraum im Mittel gleich 0,207 Mm., während die Dicke der Fäden, denen derselbe gleich sein sollte, nur 0,0445 Mm. betrug, und berechnet daraus die Breite des Zerstreuungsbildes auf der Netzhaut gleich 0,0035 Mm., bei anderen Personen bei hellem Hintergrund schwankt diese letztere Gröfse zwischen 0,0006 und 0,0025. Diese Gröfsen sind kleiner als die kleinsten sichtbaren Abstände (0,0044 Mm.) und als die Zapfen des gelben Flecks

<sup>1</sup> Vergl. J. PLATEAU. *Pogg. Ann.* Bd. 51a. S. 107. 1842.

<sup>2</sup> VOLKMANN. *Berichte der sächsischen Ges. d. Wiss.* 1857. S. 129—148.

K.

 505  $\mu\mu$ 

B.

$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
7°59'	19610	390	0.0197
7 44	9819	181	0.0184
7 17	4920	80.0	0.0163
7 37	1965	35.0	0.0179
7 48	982	18.4	0.0188
8 0	490	9.70	0.0197
8 29	196	4.40	0.0222
8 59	97.6	2.44	0.0250
9 8	48.7	1.26	0.0258
9 55	19.4	0.59	0.0306
10 58	9.64	0.362	0.0375
12 46	4.76	0.244	0.0513
14 50	1.87	0.131	0.0701
16 28	0.920	0.0804	0.0874
17 33	0.454	0.0455	0.100
19 23	0.178	0.0220	0.124
21 26	0.0866	0.0133	0.154
25 21	0.0408	0.00917	0.224
30 5	0.0150	0.00503	0.336
31 23	0.00729	0.00271	0.372
34 34	0.00339	0.00161	0.475

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
20000	7°17'	19678	322	0.0163
10000	6 52	9857	143	0.0145
5000	7 4	4924	75.5	0.0154
2000	7 2	1970	30.0	0.0152
1000	7 7	985	15.3	0.0156
500	7 0	493	8.42	0.0151
200	7 46	196	3.65	0.0186
100	7 57	98.1	1.91	0.0195
50	8 34	48.9	1.11	0.0227
20	8 45	19.5	0.462	0.0232
10	10 21	9.68	0.323	0.0333
5	11 40	4.80	0.204	0.0426
2	13 22	1.89	0.107	0.0565
1	17 1	0.914	0.086	0.0937
0.5	19 29	0.444	0.0556	0.125
0.2	21 32	0.173	0.0269	0.156
0.1	23 38	0.0839	0.0161	0.191
0.05	25 4	0.0410	0.00897	0.219
0.02	25 25	0.0163	0.00368	0.226
0.01	26 58	0.00794	0.00206	0.259
0.005	31 4	0.00367	0.00133	0.363

K.

 470  $\mu\mu$ 

B.

$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
7°41'	1964	36.0	0.0182
7 25	983	16.7	0.0169
7 47	491	9.20	0.0187
8 28	196	4.30	0.0221
8 38	97.7	2.25	0.0230
9 7	48.7	1.25	0.0257
10 16	19.4	0.64	0.0328
11 7	9.63	0.372	0.0386
12 26	4.77	0.232	0.0486
15 30	1.86	0.143	0.0769
17 16	0.912	0.0881	0.0966
18 3	0.452	0.0480	0.106
20 53	0.175	0.0254	0.146
21 47	0.0862	0.0138	0.160
23 59	0.0417	0.00826	0.198
27 12	0.0158	0.00418	0.264
32 33	0.00710	0.00189	0.407
33 14	0.00350	0.00150	0.429

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
2000	6°50'	1972	28.4	0.0144
1000	6 40	986	13.5	0.0137
500	7 23	492	8.25	0.0168
200	7 52	196	3.75	0.0191
100	8 7	98.0	1.99	0.0203
50	9 19	48.7	1.31	0.0269
20	10 15	19.4	0.734	0.0327
10	11 17	9.62	0.383	0.0398
5	11 49	4.79	0.209	0.0438
2	12 40	1.90	0.0962	0.0505
1	14 49	0.935	0.0654	0.0700
0.5	16 28	0.460	0.0402	0.0874
0.2	19 42	0.177	0.0227	0.128
0.1	21 7	0.0870	0.0130	0.149
0.05	23 36	0.0420	0.00801	0.191
0.02	25 41	0.0162	0.00376	0.231
0.01	28 53	0.00767	0.00233	0.304
0.005	32 4	0.00359	0.00141	0.392

K.

430  $\mu\mu$ 

B.

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
1000	7°40'	982	17.8	0.0181
500	8 24	489	10.7	0.0218
200	8 58	195	4.90	0.0249
100	9 2	97.5	2.46	0.0253
50	9 29	48.6	1.36	0.0279
20	10 41	19.3	0.690	0.0356
10	11 29	9.60	0.396	0.0413
5	12 50	4.75	0.247	0.0519
2	14 10	1.88	0.120	0.0637
1	15 47	0.926	0.0740	0.0799
0.5	18 6	0.452	0.0483	0.107
0.2	19 58	0.177	0.0233	0.126
0.1	21 45	0.0863	0.0137	0.159
0.05	24 37	0.0423	0.00771	0.210
0.02	28 13	0.0155	0.00447	0.288
0.01	29 56	0.00751	0.00249	0.331
0.005	33 58	0.00344	0.00156	0.454
0.002	37 27	0.00126	0.000739	0.587

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos \alpha^2$	$\delta r = J \sin \alpha^2$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan \alpha^2}$
2000	7°14'	1968	31.8	0.0161
1000	7 54	981	18.9	0.0192
500	8 16	490	10.3	0.0211
200	8 52	195	4.75	0.0243
100	9 18	97.4	2.61	0.0268
50	10 32	48.3	1.67	0.0346
20	11 23	19.2	0.780	0.0405
10	11 59	9.57	0.431	0.0450
5	13 5	4.74	0.256	0.0540
2	14 41	1.87	0.128	0.0687
1	16 25	0.920	0.0799	0.0868
0.5	17 34	0.454	0.0455	0.100
0.2	20 18	0.176	0.0241	0.137
0.1	22 3	0.0859	0.0141	0.164
0.05	24 10	0.0416	0.00838	0.201
0.02	26 25	0.0160	0.00396	0.247
0.01	27 8	0.00792	0.00208	0.263
0.005	30 34	0.00371	0.00129	0.349

In den folgenden Tabellen sind die von denselben Beobachtern erhaltenen Werthe der Unterschiedsschwellen für weisses Licht in derselben Anordnung aufgeführt.

K.

Weiss.

B.

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos^2 \alpha$	$\delta r = J \sin^2 \alpha$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan^2 \alpha}$
1000000	10°43'	965420	34580	0.0358
500000	9 23	436710	13290	0.0273
200000	9 17	194795	5205	0.0267
100000	7 57	98087	1913	0.0195
50000	7 30	49148	852	0.0173
20000	7 32	19656	344	0.0175
10000	7 33	9827	173	0.0176
5000	7 37	4912	87.7	0.0179
2000	7 40	1964	35.6	0.0181
1000	7 36	983	17.5	0.0178
500	7 53	491	9.41	0.0192
200	8 29	196	4.35	0.0222
100	9 48	97.1	2.90	0.0298
50	10 12	48.4	1.57	0.0324
20	11 15	19.2	0.761	0.0396
10	12 19	9.54	0.455	0.0477
5	13 41	4.72	0.280	0.0593
2	17 2	1.83	0.172	0.0939
1	19 20	0.890	0.110	0.123
0.5	23 28	0.421	0.0793	0.188
0.2	28 1	0.156	0.0441	0.283
0.1	31 32	0.0726	0.0274	0.377
0.05	34 50	0.0337	0.0163	0.484
0.02	39 49	0.0118	0.0082	0.695

$J = \frac{r}{r + \delta r}$	$\alpha$	$r = J \cos^2 \alpha$	$\delta r = J \sin^2 \alpha$	$\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\tan^2 \alpha}$
1000000	11° 2'	963370	36630	0.0380
500000	10 23	483760	16240	0.0336
200000	9 47	194225	5775	0.0297
100000	8 20	97900	2100	0.0215
50000	7 55	49051	949	0.0193
20000	7 7	19693	307	0.0156
10000	7 16	9840	160	0.0163
5000	7 10	4922	77.8	0.0158
2000	7 39	1965	35.4	0.0180
1000	7 45	982	18.2	0.0185
500	8 27	489	10.8	0.0221
200	8 30	196	4.37	0.0223
100	8 35	97.8	2.23	0.0228
50	9 20	48.7	1.32	0.0270
20	10 20	19.4	0.643	0.0332
10	12 4	9.56	0.437	0.0457
5	13 0	4.75	0.253	0.0533
2	16 48	1.83	0.167	0.0912
1	18 49	0.896	0.104	0.116
0.5	22 8	0.429	0.0710	0.165
0.2	26 8	0.161	0.0385	0.241
0.1	29 55	0.0751	0.0249	0.331
0.05	35 8	0.0334	0.0166	0.495
0.02	39 4	0.0121	0.00794	0.659



h einer Theorie des Einflusses der fleckigen Vertheilung  
genlichts der Netzhaut auf die Gröfse der Unterschieds-  
schwellen.

sei  $\alpha$  die objective Lichtstärke, welche nöthig wäre, um dieselbe  
Erregung in einem Flächenstück der Netzhaut hervorzubringen, wie  
Eigenlicht derselben sich zu erkennen giebt. Da das letztere fleckig  
ist, wird  $\alpha$  auf verschiedenen Stellen der Netzhaut verschiedene Werthe  
annehmen. Der Flächenraum derjenigen dieser Membranstellen, deren  
Licht dem Intervall  $\alpha$  bis  $(\alpha + d\alpha)$  entspricht, sei  $g \cdot d\alpha$ , worin  $g$  im  
Allgemeinen eine Function von  $\alpha$  sein wird.

Wir wollen zunächst Bezeichnungen einführen für zwei Integrale. Es  
seien die höchste vorkommende Werth von  $\alpha$ . Wir setzen

$$\int_0^a g \cdot d\alpha = A \dots\dots\dots \} 1$$

Das offenbar der Werth des Flächenstücks der Netzhaut, auf welches  
das Eigenlicht bezieht. Wir setzen ferner

$$\int_0^a g \cdot \alpha \cdot d\alpha = A \cdot J \dots\dots\dots \} 1 a$$

wo  $J$  bezeichnet hiernach den mittleren Werth, den die Intensität  $\alpha$   
über die ganze Ausdehnung der Fläche  $A$  hat.

Die Empfindungsstärke  $dE$  für den Helligkeitsunterschied  $dr$  bei der objectiven  
Lichtstärke  $r$  betrachten wir als Summe aller Einzelwirkungen, die den einzelnen  
Lichtstufen  $d\alpha$  entsprechen, und setzen nach FECHNER's Gesetz

$$dE = dr \cdot \int_0^a \frac{g \cdot d\alpha}{\alpha + r} \dots\dots\dots \} 2$$

Um die Integration auszuführen, führen wir statt  $\alpha$  eine neue Variable  $\epsilon$  ein  
und setzen

$$\alpha = J + \epsilon$$

Wenn  $\alpha$  von 0 bis  $a$  steigen kann, kann  $\epsilon$  von  $(-J)$  bis  $(a-J)$  steigen. Indem wir  
den Werth von  $\alpha$  in die Function  $g$  einsetzen, stellen wir diese als Function  
von  $\epsilon$  dar.

Wir schreiben dem entsprechend die Gleichung 2)

$$dE = dr \int_{-J}^{a-J} \frac{g \cdot d\epsilon}{J + r + \epsilon} \dots\dots\dots \} 2 a$$

Da die Grenzen der Integration immer dieselben bleiben, wollen wir sie nicht  
mehr ändern.

Es ist identisch

$$\frac{1}{J+r+\varepsilon} = \frac{1}{J+r} - \frac{\varepsilon}{(J+r)^2} + \frac{\varepsilon^2}{(J+r)^3 \cdot (J+r+\varepsilon)}$$

was leicht zu verificiren ist. Wenn wir dies einsetzen in die Gleichung 2a, erhalten wir

$$dE = \frac{dr}{J+r} \int g \cdot d\varepsilon - \frac{dr}{(J+r)^2} \int g \cdot \varepsilon \cdot d\varepsilon + \frac{dr}{(J+r)^3} \int \frac{g \cdot \varepsilon^2 \cdot d\varepsilon}{J+r+\varepsilon} \dots \quad \left. \vphantom{\frac{dr}{J+r}} \right\} 2b$$

Das erste Integral ist dasselbe wie das der Gleichung 1 und hat also den Werth A. Das zweite

$$\int g \cdot \varepsilon \cdot d\varepsilon = \int g \cdot (\alpha - J) \cdot d\alpha$$

Das wird mit Berücksichtigung von (1) und (1a)

$$\int g \cdot \varepsilon \cdot d\varepsilon = JA - J \cdot A = 0.$$

Der ganze Werth von  $dE$  reducirt sich also auf folgenden Ausdruck:

$$\begin{aligned} dE &= A \frac{dr}{J+r} + \frac{dr}{(J+r)^2} \cdot \int \frac{g \cdot \varepsilon^2 \cdot d\varepsilon}{J+r+\varepsilon} \dots \dots \dots \left. \vphantom{\frac{dr}{J+r}} \right\} 2c \\ &= \frac{A \cdot dr}{J+r} + \frac{dr}{(J+r)^2} \int \frac{g (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha}{\alpha + r} \end{aligned}$$

Da in dem letzteren Integrale alle Factoren in Nenner und Zähler nothwendig positiv sind, so ist der Werth des Integrals jedenfalls positiv. Dieser zweite Summande im Werthe von  $dE$  verschwindet bei großen Werthen von  $r$  gegen den ersten, welcher dem FECHNERSchen Gesetze bei gleichmäßiger Intensität  $J$  des Eigenlichts entspricht. Für kleine objective Lichtstärken  $r$  dagegen vergrößert das zweite Glied den Werth von  $dE$  in merklicher Weise, d. h. die Wahrnehmung des Unterschieds  $dr$  wird deutlicher, als sie nach dem FECHNERSchen Gesetz für die Intensität des Eigenlichts  $J$  sein sollte, und der Schwellenwerth  $dr$  kann also kleiner gemacht werden, ohne ununterscheidbar zu werden.

Das in (2c) noch vorkommende Integral hat dieselbe Form wie das in (2a) enthaltene, mit dem einzigen Unterschiede, daß die zusammengesetztere Function

$$g \cdot \varepsilon^2 \cdot d\varepsilon = g (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha$$

unter dem Integralzeichen an Stelle von  $g \cdot d\varepsilon$  getreten ist. Man kann das neue Integral gerade wie das frühere behandeln, indem man setzt

$$\int g \cdot (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha = A_2$$

$$\int g \cdot (\alpha - J)^2 \cdot \alpha \cdot d\alpha = A_2 J_2,$$

worin  $J_2$  wiederum dem Mittelwerth der Function  $\alpha$  über die ganze Fläche genommen, aber für eine andre Vertheilung der Werthe, wie sie durch  $g (\alpha - J)^2$  gegeben ist, bezeichnet. Dabei werden die mittleren Werthe einflußlos, da für sie

$$\alpha - J = 0.$$

So erhält man

$$dE = \frac{A \cdot dr}{J+r} + \frac{A_2 dr}{(J+r)^2 \cdot (J_2+r)} + \frac{dr}{(J+r)^2 (J_2+r)^2} \int \frac{g \cdot (\alpha - J)^2 (\alpha - J_2)^2 \cdot d\alpha}{\alpha + r}$$

Auch das neue Integral ist nothwendig positiv. Man kann so weiter gehen, und es läßt sich auch zeigen, daß die entstehende unendliche Reihe convergent



selbst für kleine Werthe von  $r$ . Daß sie für größere Werthe von  $r$  convergiren muß, ist leicht ersichtlich. Da die Reihe der verschiedenen  $A$  aus lauter positive Integrale gegeben wird, müssen sie auch alle positiv sein. Dem bisher gewonnenen Material von Thatsachen wird es genügen, daß auf die ersten zwei Glieder dieser Reihe beschränken, um zu zeigen, in welchem Sinne die gemachten Annahmen das einfache FECHNERSche Gesetz verändern. Wir also

$$dE = dr \cdot \left\{ \frac{A}{J+r} + \frac{A_2}{(J+r)^2 (J_2+r)} \right\}.$$

ist dies

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dE} &= (J+r) \left[ \frac{(J+r)(J_2+r)}{A(J+r)(J_2+r) + A_2} \right] \\ &= \frac{J+r}{A} \left[ 1 - \frac{A_2}{A(J+r)(J_2+r) + A_2} \right] \\ &= \frac{J+r}{A} - \frac{A_2}{A^2(J_2+r) + \frac{A_2 A}{J+r} \dots \dots \dots } \} \text{ 2f} \end{aligned}$$

Denner des zweiten Gliedes, welches an sich schon klein ist, wird sich das  $r$  im Denner für nicht zu kleine  $r$  ebenfalls vernachlässigen lassen. Dann wird stehen

$$\frac{dr}{dE} = y = \frac{J+r}{A} - \frac{A_2}{A^2(J_2+r)}.$$

Wenn wir hierin  $r$  und  $y$  als rechtwinkelige Coordinaten, so ist dies die Gleichung einer Hyperbel, deren eine Asymptote der  $y$  Axe parallel, von dieser um  $\frac{A}{A^2}$  auf der negativen Seite hin abwärts verlaufen würde. In Fig. 162 ist die theoretische Curve dargestellt. Der Anfangspunkt der Coordinaten ist der Ursprung der horizontalen Axe OR. Die Werthe der  $r$  aufgetragen, und dazu die Werthe der  $y$ , die den Unterschiedsschwellen entsprechen, sind, hier aber vergrößert, um die Zeichnung besser zu halten. AB und CC sind die beiden Asymptoten der Hyperbel, die über OR liegendes Stück der Curve darstellen würde. Die Curve stellt die Hyperbel, wie oben beschrieben, nur eine abgekürzte Art der Formel dar. In der




Fig. 162.

würde die vollständigere Formel eine etwas niedrigere Führung der Curve dicht bedingen, und in der That lassen auch die Beobachtungen eine Abweichung im Sinne erkennen. Doch ist hier in dem Gebiete der schwachen Lichtstärken Genauigkeit der Beobachtungen wohl kaum zureichend, um noch ein weiteres

Glied der Formel zu bestimmen. Die Versuche zeigen ausserdem, dass hier Abweichungen zwischen den verschiedenen Farben bestehen, und wahrscheinlich wird ausserdem hier das Gesetz durch Mischung verschiedener Grundfarben noch verwickelter.

Die Lage der Asymptote AB indessen scheint nach den genannten Beobachtern für alle Farben ziemlich dieselbe zu sein, während die Lage der zweiten Asymptote und der Abstand des Scheitels der Hyperbel vom Scheitelpunkt der Asymptote (d. h. Mittelpunkt der Hyperbel) variiren würden, so weit eben die Hyperbeln überhaupt einen annähernden Ausdruck für den Gang der Function zu geben vermögen.

Ich gebe hier noch in Fig. 163 die nach den Beobachtungen von den genannten Beobachtern construirten Curvenformen für das spectrale Roth (Wellenlänge  $670 \mu\mu$ ), wobei die Ordinaten im zehnfachen Maassstabe der Abscissen aufgetragen sind. Die Curve K gilt für das trichromatische Auge des Herrn A. KOENIG, B für das dichromatische Auge des Herrn E. BRODHUN. Die Punkte und kleinen Kreise entsprechen den wirklich ausgeführten Beobachtungen. Die Ähnlichkeit mit hyperbolischen Bögen ist augenfällig, namentlich in der Curve B. Aber man würde geneigt sein die zweite Asymptote der Curve nicht gerade abwärts, sondern schräg geneigt zu ziehen.

Abweichend von der Deutung, welche die genannten Beobachter ihren Curven gegeben haben, würde nach den unsrer Formel zu Grunde gelegten Voraussetzungen die mittlere Stärke des Eigenlichts der Strecke AO (Fig. 162) entsprechen, welche nach der Rechnung gegen 50 der photometrischen Einheiten betragen würde, nach denen die Beobachter gerechnet haben. Dass die Strecke, die sie als Stärke des Eigenlichts deuten, verhältnissmässig zu klein ist, selbst im Vergleich zu den Flecken des Eigenlichts, ist für meine Augen unzweifelhaft. Es wäre noch erst zu ermitteln, ob etwa das Lebensalter hierin grosse Verschiedenheiten bedingt. Ich selbst kann keinen grösseren Einfluss des Lichtstaubs auf meine Schärfe erkennen, als ich seit jeher gekannt habe.




Fig. 163.

## Abweichungen für hohe Lichtstärken.

Die Abweichungen von FECHNERS Gesetz, die für hohe Werthe der Lichtstärke eintreten, können wir in der Formel ausdrücken, indem wir dem ersten und zweiten Gliede der Gleichung (2f) noch einen mit  $r$  steigenden Factor im Nenner einfügen, wie ich dies schon in der ersten Ausgabe dieses Buchs gethan. Setzen wir:

$$dE = \frac{A \cdot dr}{(J+r)(1+\epsilon r)} + \frac{A_2 \cdot dr}{(J+r)^2(J_2+r)} \dots\dots\dots 3$$

in der  $\epsilon$  eine verhältnißmäßige kleine GröÙe sein, welche für alle Farben den gleichen Werth zu haben scheint, so weit bisher die messenden Beobachtungen es erlauben.

Da die letzteren nur für die schwächeren Grade der Blendung ausführbar sind, dem bei höheren Graden der Zustand des Auges zu schnell sich ändert, so ist es in der mathematischen Formulirung höchstens ein Correctionsglied anzugeben, welches die kleinen Abweichungen der Beobachtungen einigermaßen richtig darstellt.

Ich gebe in der folgenden Tabelle einen Vergleich der Ergebnisse dieser Formel mit den Beobachtungen von Herrn A. KOENIG.<sup>1</sup> Bei

Höhere Lichtstärke  ( $r + dr$ )	Unterschiedsschwelle $dr$ für Roth von der Wellenlänge $670 \mu\mu$		Mittelwerthe für 6 beob- achtete Farben	Maas der Klarheit $\frac{r}{dr}$
	beobachtet	berechnet		
200000		7158,2	8500	27,94
100000		2684	2830	37,26
50000	1050	1080	1150	46,30
20000	320	370	371,2	54,05
10000	156	175	169,75	57,14
5000	88	85,4	82,5	58,55
2000	33	33,8	36,5	59,17
1000	16,9	17,6	18,02	56,82
500	10,1	9,30	9,57	53,76
200	4,40	4,36	4,50	45,87
100	2,92	2,64	2,59	37,88
50	1,88	1,69		29,59
20	0,89	0,98		20,41
10	0,655	0,656		15,25
5	0,459	0,457		10,94
2	0,343	0,316		6,329
1	0,258	0,255		3,921
0,5	0,188	0,240		2,083
0,06	0,060	0,217		1,000



der Rechnung ist  $A=60,8825$  der Einheiten der Lichtstärke  $r$  gesetzt,  $J=74,3933$ ,  $J_2=25$ , ferner  $A_2=2,5119$ .  $A$  und  $\frac{1}{\epsilon}=150000$ . Um ein Maafs für die relative Präcision der Beobachtungen zu geben, die bei Bestimmungen der kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede sich nie sehr weit treiben läfst, habe ich in der vorletzten Columnne für die gröfseren Lichtstärken, bei denen die verschiedenen Farben nach dem Urtheil der beiden Beobachter keine regelmässigen Differenzen der Unterschiedsschwellen zeigen, noch die Mittel der Werthe für die sechs durchgemessenen Farben hingesetzt. Die unterste Reihe der Tabelle bezieht sich auf die Reizschwelle. Hier ist eine gröfsere Abweichung vorhanden; aber auch die Abweichung der darüber stehenden Zahl ist vielleicht nicht zufällig, sondern durch die Vernachlässigung der kleineren Glieder unserer Reihe bedingt.

Die letzte Columnne giebt aus den nach der Formel berechneten Werthen das Maafs der Klarheit nach der oben gegebenen Definition dieses Begriffs.

In der letzten Columnne zeigt sich das Maximum der Klarheit bei der Lichtstärke 2000, aber von 500 bis 20000 weicht es höchstens um ein Zehntel von diesem Maximum ab, also innerhalb eines Gebiets dessen obere Grenze die untere 40 mal an Lichtstärke übertrifft.

Bei dieser Lage des Maximum hat das mit  $A_2$  multiplicirte Glied der Formel 3 kaum noch Einflufs, und man kann die Lage des Maximum allein aus dem ersten Gliede bestimmen. Nach der Definition ergiebt sich der Werth der Klarheit  $K$

$$K = \frac{r}{dr} = \frac{Ar}{(J+r)(1+\epsilon r)} = \frac{A}{1-\epsilon J} \left[ \frac{1}{1+\epsilon r} - \frac{J}{J+r} \right]$$

Um das Maximum zu bestimmen, müssen wir den Differentialquotienten von  $K$  nach  $r$  gleich Null setzen.

$$0 = \frac{dK}{dr} = \frac{A}{1-\epsilon J} \left[ \frac{J}{(J+r)^2} - \frac{\epsilon}{(1+\epsilon r)^2} \right]$$

Dies giebt das Maximum für

$$r = \sqrt{\frac{J}{\epsilon}}$$

Dieser Rechnung nach würde das Maximum der oben berechneten Reihe bei  $r=3022$  liegen und den Werth 59,50 haben. Der Werth der Empfindlichkeit ist hier merklich kleiner als man bei anderen Vergleichsmethoden erreicht zu haben glaubte, vielleicht weil die Felder nicht sehr grofs waren.

Die Messungen der Unterschiedsschwellen für weifses Licht welche von denselben Beobachtern ausgeführt wurden<sup>1</sup> und oben schon angeführt sind, ergaben ganz entsprechende Resultate, so dafs die Messungen für Weifs in den

<sup>1</sup> A. KÖNIG und E. BRODHUN, Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel. Zweite Mittheilung. *Sitzungsberichte der Akademie zu Berlin* 1889. 27. Juni.

eren Graden der Lichtstärke denselben Gang einhielten, wie für die Spectralfarben, eit diese übereinstimmende Unterschiedsschwellen gaben, für die schwächeren euchtungen dagegen zwischen die Werthe der rothgelben und blavioletten en hineinfelen. Da Herrn BRODHUN das Blaugrün weiß erscheint, so zeigte also kein wesentlicher Unterschied in dem Verhalten dieses einfachen Weiß en das zusammengesetzte Weißs.

Die unteren Reizschwellen geben diejenigen Beleuchtungsstärken welche eintreten müssen um überhaupt das Vorhandensein einer objec- en Beleuchtung im Vergleich mit dem ganz dunklen Grunde des objec- en Feldes zu erkennen. Ich bemerke hier sogleich, dafs dabei die räum- e Ausdehnung des beleuchteten Feldes einen sehr erheblichen Einfluß übt, worüber wir unten noch weiter handeln werden, dafs auch Bewe- en der Objecte, namentlich solche, welche der Beobachter mit eigener und willkürlich hervorbringt, kleinere Unterschiede der Beleuchtung erkennbar en, als sie bei ruhendem Objecte erfordert werden. Man kann zuweilen ch Nachts in einem ganz verdunkelten Schlafzimmer, wo von ruhenden Ob- ten nichts mehr zu erkennen ist, nicht einmal Spalten der Fenstervorhänge, ch welche Sternenlicht eindringen könnte, sondern scheinbar nur der Licht- ub des dunklen Gesichtsfeldes erscheint, noch zuweilen Bewegungen der Hand s Beobachters oder des mit einem weissen Hemd bekleideten Arms erkennen, d sich durch Schlufs der Augenlider doch überzeugen, dafs es sich nicht ein bloß subjectives Phänomen handelt. Doch ist zu bemerken, dafs egentlich auch Täuschungen der letzteren Art vorkommen, wenn man dem wegeten Gliede unwillkürlich mit den Augen folgt, und zufällig Flecken des genlichts da sind, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bilde des Objects en, und mit den Augen sich scheinbar im Raume fortbewegen und dem ellen Objecte folgen.<sup>1</sup>

Die Angaben der Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN beziehen sich auf eselben für die Unterschiedsschwellen gebrauchten Einheiten der Licht- rke und beleuchtete Felder der dort gebrauchten Ausdehnung. Sie sind gende:

Untere Reizschwellen.

$\lambda$	KÖNIG	BRODHUN
670 $\mu\mu$	0,060	0,11
605	0,0056	0,011
575	0,0029	0,0055
505	0,00017	0,00035
470	0,00012	0,00013
430	0,00012	0,00014
—	—	—
Weißs	0,00072	0,00073

<sup>1</sup> H. V. HELMHOLTZ, die Störung der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede durch das Brenlicht der Netzhaut, *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*. Bd. I. S. 5. 1890.



Photometrie. Die hier besprochene Fähigkeit des Auges kleine Unterschiede der Lichtstärke im Gesichtsfelde zu erkennen ist nun die Grundlage für die messende Vergleichung verschiedener Lichtstärken von Flächen. Wir können hierbei absehen von allen Methoden, wobei Strahlungsintensitäten nicht durch ihre Wirkung auf die Netzhaut sondern durch andre physikalische oder chemische Wirkungen verglichen werden z. B. durch Wärmeentwicklung durch Änderung des galvanischen Widerstandes von Selen, durch Photographie u. s. w. Diese gehören nicht in die physiologische Optik. Auf den bisher immer noch sehr schwierigen Gebrauch solcher anderer Methoden sind wir übrigens nur in dem Falle angewiesen, wo es sich um Verfolgung solcher Strahlen handelt, die das Auge gar nicht, oder nur sehr schwach afficiren, und also auch nicht in engerem Sinne als Licht bezeichnet werden können.

Für die sichtbaren Strahlen schliessen wir aus der Gleichheit ihrer Wirkung auf beliebige Stellen der Netzhaut auf Gleichheit der objectiven Lichtstärke derselben. Genau kann eine solche Gleichheit nur für gleichfarbiges Licht vorhanden sein. Wir werden demgemäss hier auch zunächst von der photometrischen Vergleichung gleichfarbigen Lichtes (isochromatische Photometrie) handeln und dann erst zu der Frage übergehen, in wie weit Vergleichungen der Helligkeit verschiedenfarbigen Lichtes (heterochromatische Photometrie) möglich sind.

Das Auge kann immer nur die Gleichheit zweier hellen Felder anerkennen, und nicht ohne weitere objective Hilfsmittel das Quantitätsverhältniß verschieden grosser Lichtmengen bestimmen.

Wir brauchen also, wenn letzteres verlangt wird, noch ein optisches Verfahren, welches die Intensität des helleren Lichtes so weit und zwar in bekanntem Verhältniß herabsetzt, bis beide zu vergleichenden Helligkeiten gleich geworden sind. Dazu können, je nach der Natur der Aufgabe, ausserordentlich verschiedene optische Methoden verwendet werden. Aber auch deren Discussion gehört wesentlich der rein physikalischen Optik an, so daß eine kurze Aufzählung der gewöhnlich praktisch gebrauchten hier genügen wird.

1) Änderung der Beleuchtung durch Änderung der Entfernung zwischen Lichtquelle und Object. Dies ist die älteste Methode ausgehend von BOUGUER.<sup>1</sup> Sie stützt sich auf den Satz, daß bei ungestörter Ausstrahlung des Lichts von einem leuchtenden Punkte in geradlinigen Strahlen die Helligkeit eines normal von den Lichtstrahlen getroffenen Flächenstücks umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem leuchtenden Punkte proportional ist. LAMBERT<sup>2</sup> machte die Methode viel leichter und geschickter, indem er von zwei nicht ganz in derselben Richtung stehenden Lichtquellen dieselbe weisse Fläche nahehin senkrecht beleuchten liess, vor diese einen verticalen Stab brachte, welcher zwei dicht neben einander liegende Schatten entwarf, und dann die stärkere Lichtquelle so weit entfernte, bis die beiden Schatten gleich hell waren. Diese Methode ist sehr viel

<sup>1</sup> PIERRE BOUGUER, *Essai d'optique sur la gradation de la lumière*. Paris 1729. 1760. Lateinische Übersetzung. Wien 1762.

<sup>2</sup> JOHANN HEINRICH LAMBERT, *Photometria s. de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrarum*. AUG. VINDEL. 1760.

nge gebraucht worden. Es ist leicht zu sehen, daß hierbei der eine r von der einen Lichtquelle, der andre von der andern Licht empfängt. 1 erscheinen sie nur, weil der umgebende Grund gleichzeitig von beiden leuchtet wird, und deshalb heller erscheint. Dies ist übrigens ein für eine sehr feine und sichere Vergleichung der Helligkeit beider Schatten, je Nähe stärkeren Lichtes in großer Ausdehnung die Pupille verengert ge geblendet wird.

r Anwendung derselben sind außerdem gewisse Vorsichtsmafsregeln zu be- n man genaue Resultate zu erhalten wünscht. Erstens muß man dafür s alles andre Licht ausgeschlossen sei, namentlich auch alles von den d andern Gegenständen reflectirte, welches die beiden zu vergleichenden te verschieden stark beleuchten könnte. Zweitens paßt die Regel vom 1 Quadrat der Entfernung streng nur für leuchtende Punkte, annähernd ichtende Körper, deren Dimensionen im Vergleich zur Entfernung der Fläche verschwinden. Daraus folgt aber, daß die Methode nur mit kleine Lichtquellen von großer Helligkeit angewendet werden kann, ihrer geringen Ausdehnung doch viel Licht aussenden. (Geometrische n, die sich auf die Theorie dieser Beleuchtungen beziehen, siehe oben 5).

a einem Punkte der letzteren aus gesehen der leuchtende Körper eine einbare Größe im Gesichtsfelde, so können auch nicht mehr alle selben senkrecht die Fläche treffen. Man würde dann nur durch Inte- Gesamtwirkung berechnen können, müßte zur Ausführung dieser er die Lichtstärke jedes Theils der Oberfläche des leuchtenden Körpers jedes Flächenelements seiner perspektivischen Projection auf eine dem Punkte concentrische Kugel kennen.

fache geometrische Formen wie z. B. kreisrunde Scheiben, oder cylin- e Drähte (Kohlenfäden in Glühlampen) läßt sich eine solche Rechnung hführen.

andre wichtige Methode zur Verminderung der Helligkeit in bekanntem : bei polarisirtem Lichte anwendbar. Geht Licht durch zwei linear Apparate hinter einander z. B. durch doppeltbrechende Prismen oder che Prismen, so ist die Intensität des austretenden Lichts dem Quadrat les Winkels, den die Hauptschnitte der beiden Polarisatoren mit ein- proportional. Dieses Verfahren ist unter Anderem schon erwähnt er Beschreibung des Farbenmischungsapparates für Spektralfarben und fethode zur Bestimmung der Unterschiedsschwellen verschiedener Farben. tchung des Lichts durch AUBERTS Episkotister. Letzterer besteht ell umlaufenden kreisrunden Doppelscheibe. Die beiden an einander ben, welche sie zusammensetzen, sind in eine gleiche Anzahl von gleich en getheilt, die abwechselnd ausgeschnitten und stehen geblieben sind, schon mehrfach erwähnten MAXWELLSchen Farbenscheiben. Wenn helle und dunkle Sectors in der Secunde das einfallende Licht- durchschneiden, erscheinen die durch dasselbe gesehenen lichten Auge des Beschauers dauernd gleichmäfsig hell, aber ihre Helligkeit in dem Verhältnifs in dem die Winkelbreite je eines durchsichtigen Summe der Winkelbreiten eines hellen und eines undurchsichtigen Das Nähere über diese Methode im nächsten Paragraphen.



Wir kommen nun zu dem von den physiologischen Fähigkeiten des menschlichen Auges abhängigen Theile der photometrischen Methoden.

Aus dem, was oben über die Unterschiedsstufen der Helligkeit gesagt ist, erhellt zunächst, daß man die kleinsten Bruchtheile der ganzen Lichtstärke nur bei derjenigen Helligkeit, die dem Maximum der Klarheit entspricht, wird wahrnehmen können. Diese wird also die größte Genauigkeit in der Vergleichung erreichen lassen; größere oder geringere Helligkeit wird unvortheilhafter sein. Insonderheit sind ungeeignet eine Reihe älterer Methoden, bei denen man zu ermitteln suchte, welche Dicke einer absorbirenden Substanz man anwenden mußte, um das Licht ganz verschwinden zu machen, weil diese von dem sehr unsicheren Werthe der kleinsten Reizschwelle abhängen.

Eine fernere wesentliche Bedingung ist die, daß die beiden Felder, deren Helligkeit verglichen werden soll, dicht an einander stoßen, mit scharf accommodirbarer, scharfer Grenzlinie, die durch nichts andres Sichtbares als durch den Unterschied der Helligkeit bezeichnet sein darf. Jede noch so feine helle oder dunkle Linie, die die Grenze markirt, macht die Vergleichung weniger sicher.

LAMBERTS oben erwähnte Methode mit den zwei Schatten desselben Stabes entspricht dieser Forderung ziemlich gut. Wenn man den Stab in solcher Entfernung von dem weißen Schirm, diesem parallel, hält, daß die zwei Schatten, welche die beiden Lichter entwerfen, sich gerade berühren, so schließensich die beiden Schattenfelder ziemlich gleichmäßig an einander. Damit sie es aber vollständig thun, würden beide Lichtquellen vom Stabe aus gesehen ganz gleiche scheinbare Breite im Gesichtsfelde haben müssen, was selten zutreffen wird. Auch würden die beiden Schattengrenzen nicht ganz scharf gezeichnet sein, sondern durch Halbschatten in Hell übergehen. Ferner ist die helle Umgebung störend, deren Beleuchtung doppelt so stark, als die der beiden zu vergleichenden Schatten ist, weil sie das Auge etwas blendet.

Noch vollkommener wurde das Verschwinden der Grenzlinie durch R. BUNSENS Photometer erreicht. Ein Papierblatt, auf dem mit heißem Wachs oder Paraffin ein Fettfleck gemacht ist, wird von vorn und hinten beleuchtet. Der nicht gefettete Theil des Papiers wirft nahehin alles Licht, was an der vordern Seite darauf fällt, zurück, und läßt nur sehr kleine Mengen von der hintern Seite durchscheinen. Umgekehrt der Fettfleck. Bei einem gewissen Verhältniß der Entfernungen beider Lichter wird der Fettfleck gerade so hell erscheinen, wie das ungefettete Papier, indem genau ebenso viel von dem hintern Lichte im Flecke nach vorn dringt, als vom vorderen Lichte verloren geht, während es seinen Weg nach hinten fortsetzt. Dann wird der Fleck unsichtbar. Bringt man das hintere Licht näher heran, erscheint er heller als der Rest des Papiers, dunkler dagegen, wenn man dasselbe Licht entfernt. Das Verhältniß, in welchem die beiden Beleuchtungen stehen müssen, um den Fettfleck unsichtbar zu machen, ergibt sich, wenn man mit zwei gleichen Kerzen die Versuche anstellt, und das Verhältniß ihrer Entfernungen vom Papier ermittelt, die den Fleck verschwinden machen. Zur Prüfung ihrer Gleichheit vertauscht man die beiden Kerzen und wiederholt die Messung.

Das BUNSENSche Photometer ist viel gebraucht worden, namentlich für die technischen Lichtmessungen. Es findet aber bei demselben der nachtheilige Umstand statt, daß der Fettfleck ein Gemisch beider Beleuchtungen zeigt, die verglichen werden sollen und nur der ungefettete Rand, wenn er ganz undurchsichtig ist, die

s vorderen Lichtes allein. Denn, wenn wir auch in dem letzteren gñle mit  $A$  die Helligkeit des von vorn beleuchteten dunkleren Randes mit  $a$  die geringere Helligkeit, welche der Fettfleck bei Beleuchtung r dunklem Hintergrunde zeigt, mit  $B$  aber seine Helligkeit, wenn er las hintere Licht beleuchtet ist; so ist der Unterschied beider Helligkeiten

$$A - (B + a) = (A - a) - B$$

beiden Helligkeiten  $(A - a)$  und  $B$ , deren Unterschied wahrgenommen, sind beide noch gleichmäÙig überdeckt von der gemeinsamen Helligkeit, durch die Wahrnehmung ihres Unterschieds erschwert wird.

leicht einzusehen, daß man gröÙere Genauigkeit in der Vergleichung fs, wenn das zweite Feld eine Helligkeit zeigt, die nur von der hinteren abhängt. Diese Aufgabe lieÙ sich mittels des von den Herrn LUMMER und DUNCAN<sup>1</sup> construirten Photometers lösen, in welchem die totale Reflexion, um die beiden beleuchteten Flächen von einander zu scheiden.

Erklärung des von den genannten Autoren benutzten Principis gehen wir von aus. Es seien  $ll$  und  $\lambda\lambda$  diffus leuchtende Flächen,  $A$  und  $B$  sei eine Combination zweier rechtwinkliger Glasprismen, daÙ an gewissen Stellen ( $p q$  und  $h i$ ) die Hypotenusenflächen des Prismas  $B$  das von  $\lambda$  kommende Licht nach  $O$  reflectirt, und an den übrigen Stellen ( $q h$ ) durch das Prisma hindurch nach  $r$  geht. Es soll bei den von  $l$  ausgehenden Strahlen in Bezug auf die Hypotenusenflächen  $A$  stattfinden. Accommodirt ein bei  $O$  befindliches Auge auf die Fläche, so sieht es also den Theil  $q h$  der Fläche  $ll$  und den Theil  $p q$  der Fläche  $\lambda\lambda$  erleuchtet. Bei der Einstellung der IntensitätsverhältniÙe der Felder  $p q h i$  als eine vollständig gleichmäÙige Fläche erscheinen.

Die Prismencombinationen lassen sich auf folgende Weise herstellen:

Die beiden Prismen  $A$  und  $B$  sind bei der Herstellung aus einer Substanz vom Brechungsindex  $n$  ammengekittet, während bei  $p q$  die Hypotenusenflächen durch Luft

Um die Grenze zwischen den beiden Feldern im Moment der Gleichheit zum Auge zu bringen, ist es nothwendig, die Prismen fest an einander zu pressen. Diese Combination bietet die Möglichkeit, auch die Helligkeit der Felder

Verschwinden zu beobachten, und es ist zeitig zwei Personen einstellen

Die Helligkeit der Felder findet hier statt, wenn  $l$  und  $\lambda$  dieselbe Intensität besitzen. Die Hypotenusenfläche des Prismas  $B$  wird versilbert und an der Stelle  $q h$  die Grenze entfernt; hierauf werden die beiden Prismen mit geeignetem Kitt verbunden. Diese Combination bewirkt, daÙ die Gleichheit der Felder nur bei ungleicher Helligkeit der Felder herbeigeführt wird. Durch Auskratzen der verschiedensten Figuren kann die Helligkeit der Felder variiren.




Fig. 164.

3. Die Hypotenusenfläche des Prismas *A* ist nicht eben, sondern kugelförmig geschliffen und an die ebene Hypotenusenfläche von *B* angepreßt (Fig. 165). Bei genügend starkem Druck entsteht eine kreisrunde Berührungsfläche bei *m*; alle auf diese Fläche auftreffenden Strahlen gehen vollständig durch sie hindurch, welches auch der Einfallswinkel sein mag. Ist es der Winkel der totalen Reflexion, so sieht man bei Abblendung der Lichtquelle *l* in der leuchtenden Hypotenusenfläche von *B* einen schwarzen elliptischen Fleck, der allmählich heller werdendem Rande. Bei kleinerem Einfallswinkel lagern sich um diesen dunklen Fleck als Centrum die Newton'schen Interferenzringe.




Fig. 165.

Bei Anwendung stärker gekrümmter Kugelflächen wird der Rand des elliptischen Flecks zwar ausreichend scharf, aber gleichzeitig damit tritt eine solche Verkleinerung des Flecks ein, daß die an demselben auftretende Beugungserscheinung das Phänomen stört.

4. Die kugelförmige Oberfläche des Prismas *A* wird bei *e* (Fig. 166) eben angeschliffen und gegen die gleichfalls ebene Hypotenusenfläche des Prismas *B* gepreßt. Der in diesem Falle auftretende, elliptisch erscheinende Fleck hat durchaus scharfe Ränder und verschwindet bei Gleichheit der Felder vollständig. Diese Combination genügt sehr gut allen Anforderungen.




Fig. 166.

5. Die beiden Prismen werden auf ihrer ganzen Hypotenusenfläche gegen einander eben abgeschliffen. Dann wird irgend eine Zeichnung in die Fläche des Prismas *A* eingätzt und wiederum das Prismenpaar innig aneinander gepreßt. Wenn die Ätztiefe tief genug ist, so befindet sich an den geätzten Stellen Luft zwischen den Hypotenusenflächen, sodaß die geätzte Figur im reflectirten Lichte hell auf schwarzem Grunde und im durchgehenden Lichte schwarz auf hellem Grunde erscheint. Der Vorzug dieser Methode ist, daß hier den Figuren jede gewünschte Form gegeben werden kann.

Bei der Anwendung aller beschriebenen Prismencombinationen müssen zum vollständigen Verschwinden der Grenze zwischen den beiden Feldern die Flächen *l* und *a* gleichmäßig diffus leuchtend sein, also etwa beleuchtete Papiere, Milchglasplatten u. s. w. Ferner darf die Fläche *l* nur Licht von der einen, *k* nur Licht von der andern der zu vergleichenden Flammen erhalten.




Fig. 167.

Es kam noch darauf an, unter Benutzung einer der angegebenen Prismencombinationen ein für die praktische Lichtmessung geeignetes Photometer herzustellen, welches also, ebenso wie das Bunsen'sche, auf einer geraden Photometerbank verschiebbar sein mußte. Die Autoren wählten die in Fig. 167 skizzierte Anordnung. Lothrecht zur Axe der Photometerbank steht der Schirm *lk*, welcher gar kein Licht hindurch läßt und dessen beide Seiten von den Lichtquellen *m* bzw. *n* erleuchtet werden. Das diffuse, von den Schirmseiten *a* und *l* ausgehende Licht fällt auf die Spiegel *e* bzw. *f*, welche es senkrecht auf die Kathetenflächen *cb* und *dp* der Prismen *B* und *A* werfen. Der



bachter bei  $o$  blickt durch die Lupe  $w$  senkrecht zu  $ac$  und stellt scharf auf die Sche  $arsb$  ein.

Figur 168 giebt eine perspectivische Ansicht des nach dieser Anordnung in der physikalisch-technischen Reichsanstalt ausgeführten Photometers. Die vertikale messingene Säule  $s$  trägt die Metallschiene  $b$ , auf welcher die Säulchen  $s_1$  und  $s_2$  aufgeschraubt sind. In den oberen Theilen der letzteren sitzen die Schrauben  $m_1$  und  $m_2$ , in deren Enden messingene Pfannen eingedreht sind. Diese Pfannen bilden das Lager für die horizontale Achse  $a$  des Photometergehäuses  $h$ . Am Gehäuse ist bei  $w$  das Rohr  $r$  mit der verschiebbaren Lupe angebracht. Im Innern des Gehäuses liegen die Prismencombination  $AB$ , die beiden Spiegel, von welchen nur der eine  $f$  zu sehen ist, und der Photometerschirm  $P$ . Der letztere sitzt im Rahmen  $n_1$ , dessen Fußplatte auf dem Boden des Gehäuses  $h$  verstellbar und feststellbar ist; der Schirm kann behufs Erneuerung oder Drehung um 180 Grad aus dem Rahmen  $n_1$  entfernt werden. Jeder der Spiegel  $e$  und  $f$  ist mit Hilfe




Fig. 168.

weiter durch den Boden von  $h$  hindurchreichender Schrauben von außen her um eine horizontale sowie um eine verticale Axe drehbar. Die Fassung  $q$  preßt die Prismen  $A$  und  $B$  innig aneinander und ruht auf einer Platte, welche in gleicher Weise beweglich wie der Rahmen  $n_1$ . Das Gehäuse  $h$  wird durch einen in der Figur abgenommenen Schlüssel mit Schlitz für den Griff des Schirmes  $P$  geschlossen. Durch die seitlichen Öffnungen kann Licht zum Papier von  $P$  gelangen. Bei der dargestellten Lage des Photometergehäuses wird ein als Anschlag dienender, in Fig. 168 nicht sichtbarer Schraubenkopf  $k_2$  durch eine an der Säule  $s_1$  verschiebbare Hülse fest an die Säule angedrückt. Die Drehung der Axe des Gehäuses um 180 Grad dient ein zweiter Schraubenkopf  $k_1$  als Anschlag. Die auf einem Schlitten der Photometerbank angebrachte Säule  $s$  kann auf und ab bewegt und um eine verticale Axe gedreht werden.

Der zu den Versuchen benutzte Schirm bestand aus doppelten Lagen Papier, welche durch ein Stanniolblatt getrennt sind. Man taucht das Papier in Wasser, trocknet es mit Fließpapier und klemmt es noch feucht zwischen die beiden Metallplatten des Schirmes  $P$ . Auf diese Weise erhält man einen vollkommen undurchsichtigen Schirm mit ebenen und diffus reflektirenden Flächen. Dasselbe erreicht man durch eine Gyps-

platte oder eine beiderseitig matt weiß angestrichene Metallplatte.  $e$  und  $f$  sind ausgesuchte, ebene, mit Quecksilberamalgam belegte Spiegel, welche von demselben Stück geschnitten sind. Statt derselben können natürlich auch total reflectirende Prismen benutzt werden. Vor der Lupe ist in gewisser Entfernung ein Diaphragma angebracht, welches größer als die Pupille sein muß. Dem Gesichtsfelde kann man dadurch eine scharfe Umgrenzung von gewünschter Form geben, daß man die äußeren Theile der Hypotenusenfläche von  $B$  mit Asphaltlack bestreicht.

Man konnte bei diesem Photometer eine Änderung von 1,5 % der Intensität einer Lichtquelle ohne Weiteres deutlich wahrnehmen; der mittlere Fehler einer Einstellung bleibt unter 0,5 %. Bei den Versuchen zur Prüfung der Genauigkeit wurden als Lichtquellen die Spiegelbilder einer und derselben von Accumulatoren gespeisten Glühlichtlampe, welche hinter der Mitte der Bank, fest mit ihr verbunden, in Höhe des Photometerschirmes aufgestellt war; verwendet. Die Spiegel sitzen auf der Bank zu beiden Seiten der Glühlichtlampe; zwischen ihnen ist das Photometer verschiebbar. Man orientirt die Spiegel so, daß die Verbindungslinie der durch sie entworfenen Bilder durch die Mitte des Schirmes geht. Der Abstand der Bilder betrug bei diesen Versuchen 2600 mm. Bei der Ablesung des Index wurden Zehntelmillimeter geschätzt. Die Versuchsreihen wurden so ausgeführt, daß Jeder der beiden Beobachter 10 Einstellungen machte, aus denen der mittlere Fehler einer Einstellung berechnet wurde.

Bei allen Empfindlichkeitsbestimmungen wurde darauf gesehen, daß sich die Helligkeit der Felder in dem Bereich befand, in dem mit großer Annäherung das psychophysische Grundgesetz gilt. Bekanntlich nimmt bei geringerer Helligkeit die Empfindlichkeit unseres Auges schnell ab. Bei praktischen Lichtmessungen ist dieser Umstand, wie schon oben erwähnt, insofern sehr störend, als man es mit sehr lichtschwachen Einheiten zu thun hat. Um mit ihnen eine genügende Beleuchtung des Schirmes zu erzielen, muß man sie so nahe an das Photometer bringen, daß die genaue Messung der Entfernung schwierig wird.




Fig. 169.

dazu hergestelltes Gestell Fig. 170 trocken übereinander, daß je eine Kathete  $ab$  jedes Dreiecks in die dem Beobachter zugekehrte Vorderebene der Glasmasse fiel, die




Fig. 170.

Nahe und enge Aneinanderstellung von Flächen, die von verschiedenen Lichtquellen her beleuchtet sind, hat Herr E. Brücke<sup>1</sup> in anderer Weise erzielt, indem er aus gleich dicken, und nicht zu dicken nahezu planparallelen schlierenfreien farblosen Glasplatten gleich große rechtwinkelige Dreiecke schneiden ließ, diese mit ihren Flächen zu einem dreikantigen Prisma aufeinander kittete, und das Prisma, wenn der Kitt hinreichend fest geworden war, an seiner Hypotenusenfläche und den beiden Kathetenflächen abschleifen und poliren ließ. Dann löste er den Kitt wieder auf und reinigte die einzelnen Dreiecke und legte sie in ein besonders

dazu hergestelltes Gestell Fig. 170 trocken übereinander, daß je eine Kathete  $ab$  jedes Dreiecks in die dem Beobachter zugekehrte Vorderebene der Glasmasse fiel, die Hypotenusen je zweier auf einanderfolgender Dreiecke  $ad$  und  $bc$  sich dagegen rechtwinkelig schnitten, wie es Fig. 169 darstellt.

Die Seitenflächen des Gestells  $ache$  und  $bdfg$  sind mit durchscheinendem Papier geschlossen und durch die zu vergleichenden Lichter beleuchtet. Der Beobachter sieht an der Vorderseite abwechselnde Streifen der einen und andern Beleuchtung, die von den Hypotenusenflächen gespiegelt sind, und versucht durch Entfernen und Annähern der Lichter dieselben gleich zu machen. Für gleichfarbige Beleuchtung würde dies ausreichen. Für Vergleichung verschieden gefärbter Lichter nimmt er dann noch Verringerung der scheinbaren Größe der Streifen zu Hülfe, indem er entweder in größere Ent-

<sup>1</sup> E. BRÜCKE, „Über zwei einander ergänzende Photometer“ in *Zeitschrift für Instrumentenkunde* 1900. Januar.




geht, dabei für vollkommen gute Accommodation durch Brillengläser sorgend, streifige Feld durch einen umgekehrten Operngucker in verkleinertem Bilde t. So sucht er zu ermitteln, bei welchem fs der Beleuchtungen der Unterschied der bei verhältnißmäßig größter scheinbarer Größe s verschwindet.

ähnlich construirter Apparat, der aber nur ere Prismen *Fig. 171* enthält, dient dazu bei Beleuchtungen Versuche über die Erkenn- kleiner Objecte anzustellen, die an den beiden en des Gestells angebracht sind z. B. Zeich- mit feinen Linien oder feine Gewebe.


ENHARD WEBER<sup>1</sup> hat ebenfalls ein Photometer n bei dem eine Nebeneinanderstellung der von htquellen gegebenen Beleuchtungen mit wenig r Trennungslinie hergestellt ist. Diese wird ch die Kante eines total reflectirende recht- n Prisma gebildet; die hellen Felder sind von transparenten Milchglasplatten von denen die eine direct, die andere reflectirt gesehen wird. Wir kommen ei der heterochromatischen Photometrie zurück.

ontrastphotometer. Die Aufgabe des Beobachters bei diesen Photometern tscheiden, ob die Deutlichkeit der Unterscheidung von zwei gleichzeitig e neben einander unter übrigens gleichen Umständen gesehenen Feldern, sehr wenig von ihrem Grunde unterscheiden, gleich oder verschieden handelt sich also darum zwei sehr kleine Lichtunterschiede in Bezug Erkennbarkeit mit einander zu vergleichen. Das Princip dieser Methode st angewendet worden von Herrn FR. RÜDORFF,<sup>2</sup> und derselbe erkannte e überlegene Genauigkeit dieser Methode, der älteren gegenüber, welche nterscheidbarkeit einstellt. RÜDORFF stellte das mit einem Fettfleck venkrechte Blatt eines BUNSENSchen Photometers zwischen zwei gegen das ter einem passenden Winkel geneigte ebenfalls senkrechte Planspiegel, so Beobachter jede der beiden Flächen des Papiers mit ihrem Fleck in je er Spiegel sah, beide dicht neben einander. Der Contrast ist aber hierbei a groß, als daß das Maximum der Empfindlichkeit erreicht wurde. Erst ch LUMMER und BRODHUN<sup>3</sup> angegebene Modification ihres oben beschrie- Photometers erlaubt die Größe des Unterschieds zu verändern und die aaftesten Bedingungen für jeden Beobachter herauszusuchen. Für sehr Beobachter ist ein kleinerer Unterschied der Beleuchtung (2 bis 3 %) am aaftesten, als für ungeübte (3,5 %).

e genannten Beobachter brauchten wiederum zwei mit den usenflächen an einander gelegte rechtwinkelige Prismen, gleiche Beleuchtungsweise, wie in ihrem vorher beschrie- Apparate, wo auf Gleichheit der Helligkeit der beiden heile eingestellt wird. Für das Contrastphotometer ist durch Sandgebläse eingätzte Figur der einen Hypoten- he abweichend, nämlich nach neuester Angabe entsprechend 172. Die punctirten Flächenstücke sind geätzt, und geben reflexion des gespiegelten Lichts, die leeren sind in opti- contact mit dem andern Prisma und zeigen das durch- Licht.



*Fig. 171.*



*Fig. 172.*

<sup>1</sup> WEBER, Mittheilung über einen photometrischen Apparat in *Wiedemann's Annalen*. XX. 326.  
<sup>2</sup> RÜDORFF, „Über das BUNSENSche Photometer“, *Pogg. Ann.* Jubelband. 8. 234.  
<sup>3</sup> LUMMER und E. BRODHUN, „Photometrische Untersuchungen II“ in *Zeitschrift für Instrumenten-*  
December 1839.

2) Um kleine veränderliche Differenzen der Lichtstärke zu erreichen, sind auf jeder Seite zwei verticale drehbare Glasplättchen hinzugefügt, nach dem in dem Grundriß *Fig. 173* hinzugefügten Schema. *ah* ist ein Horizontalschnitt der Hypotenusenflächen der Prismen; die schwarzen Stellen zeigen die Orte des optischen Contacts an, bezeichnen die der totalen Reflexion. In Folge dessen gehen Strahlen durch das Prisma, theils geradlinig, wie *cc* und *dd*, theils reflectirt, wie *ee* und *ff*. In den Weg der Strahlen *ff* und *cc* sind zwei ebene Glasplättchen *ph* und *p<sub>1</sub>h<sub>1</sub>* angefügt, den Prismenflächen parallel liegend, mit dünner Luftschicht dazwischen; in *p* und *p<sub>1</sub>* sind zwei verticale Axen angebracht, um welche sich andre Glasplatten derselben Art *pk* und *p<sub>1</sub>k<sub>1</sub>* drehen können. Durch eine Gelenkverbindung *klp<sub>1</sub>* wird bewirkt, daß der Winkel *hpk* dem Winkel *k<sub>1</sub>p<sub>1</sub>h<sub>1</sub>* immer gleich bleibt. Da die beiden Platten *kp* und *k<sub>1</sub>p<sub>1</sub>* von den Strahlen schräg durchlaufen werden, so geht in ihnen etwas mehr Licht durch Reflexion und Absorption verloren, als in *ph* und *p<sub>1</sub>h<sub>1</sub>*. Die Ränder der Glasplatten und das Gelenk *p* bleiben von *O* her gesehen hinter dem total reflectirenden Streifen  $\gamma$  versteckt. Ebenso wird *p<sub>1</sub>* so gelegt, daß sein Spiegelbild hinter dem vollkommen durchsichtigen Streifen erscheinen müßte, aber wegen mangelnder Reflexion nicht erscheint. Die Mittelfelder  $\beta$  und  $\delta$  unterliegen nur dem schwächeren Lichtverluste an den senkrecht durchstrahlten Glasplatten *ph*, die Randfelder dagegen  $\alpha\alpha$  und  $\gamma\gamma$ , dem stärkeren Verluste durch die schräg gestellten Platten *pk*. Ist das Photometer also auf Gleichheit der symmetrisch liegenden Felder eingestellt, so erscheinen beide Mittelfelder




Fig. 173.

etwas heller als die Randfelder. Kommt aber ein Helligkeitsunterschied zwischen dem durchgelassenen und total reflectirten Licht hinzu, so addirt sich derselbe in einem Felde, im andern subtrahirt er sich zu und von der Helligkeitsdifferenz der Mittelfelder. Diese wird auf der einen Seite deutlicher, auf der andern undeutlicher.

Bei geringerem Contrast als 3% sind die Einstellungen, da sie dem Schwellenwerth zu nahe liegen zu ermüdend. Bei 18% Contrast ist die Empfindlichkeit schon entschieden geringer als beim Gleichheitsphotometer, wo, wie oben erwähnt, der mittlere Fehler sich auf etwa 0,5% beläuft. Farbenunterschiede stören das Contrastphotometer mehr als das Gleichheitsphotometer.

Um einen Begriff von der Genauigkeit der Einstellungen zu geben, haben

die genannten Beobachter Messungen mit verschiedenen Contrasten angestellt, und die mittleren Fehler einer Einstellung aus je 20 hinter einander angestellten Beobachtungen berechnet, wie folgt:

Contrast	3 %	3,5 %	7 %	10 %	18 %
Mittlerer Fehler einer Einstellung	0,24 %	0,22 %	0,39 %	0,43 %	0,81 %



Sehschärfen für verschiedene Farben und Helligkeiten.

670 $\mu\mu$	605 $\mu\mu$	575 $\mu\mu$	505 $\mu\mu$	470 $\mu\mu$	430 $\mu\mu$
2,04	9,15	6,95	0,532	0,0567	0,0084
Helligkeit					
—	—	—	0,0266	—	—
—	—	—	—	0,00567	—
—	—	—	—	—	0,00168
—	—	—	—	0,01134	—
—	—	0,3475	—	—	—
—	—	—	0,0532	—	0,00504
—	—	—	—	—	0,00672
—	0,4575	—	—	—	—
—	—	—	—	0,02268	—
—	—	—	—	—	0,00840
—	—	—	—	0,03402	—
—	—	—	0,1064	—	—
—	—	—	—	—	0,0168
—	—	—	—	0,0454	—
0,204	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,0567	—
—	—	—	—	—	0,0336
—	—	—	0,1596	—	—
—	—	—	—	—	0,0504
—	—	—	—	0,1134	—
—	—	—	—	—	0,0672
0,408	—	—	—	—	—
—	—	—	0,2128	—	0,0840
—	0,915	—	—	—	—
—	—	—	—	0,2268	—
—	—	—	0,266	—	—
—	—	1,0425	—	—	—
—	—	—	0,2592	—	—
—	—	—	—	0,3462	—
0,612	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,4536	—
—	—	—	—	0,5670	—
—	—	2,085	—	—	—
—	—	—	0,3456	—	—
0,820	—	—	0,4788	—	—
—	1,830	—	—	—	—
1,224	—	—	—	—	—
1,428	—	—	0,5532	—	—
1,632	—	—	—	—	—
—	3,66	—	—	—	—
2,04	—	2,78	—	—	—
—	—	3,475	—	—	—
—	—	—	1,064	—	—
4,08	—	—	—	—	—
—	5,49	4,17	2,66	—	—
—	7,32	—	—	—	—
10,20	—	—	4,156	—	—
—	—	—	5,32	—	—
—	—	5,56	—	—	—
16,32	—	—	—	—	—

Sehschärfe	670 $\mu\mu$	605 $\mu\mu$	575 $\mu\mu$	505 $\mu\mu$	470 $\mu\mu$	430 $\mu\mu$
2,10	—	9,15	—	—	—	—
2,12	—	—	6,95	—	—	—
2,17	—	—	13,90	—	—	—
2,21	—	—	20,85	—	—	—
2,25	—	36,60	27,80	—	—	—
2,29	—	—	41,70	—	—	—
2,31	—	—	55,60	—	—	—
2,32	—	54,90	—	—	—	—
2,35	—	73,20	—	—	—	—
2,37	—	91,50	—	—	—	—

wachsend, wo die Empfindlichkeit für Unterschiede der Lichtstärke (d. h. die Klarheit), wächst und umgekehrt. Die einzige durchgehende Abweichung liegt in dem Verhältniß zwischen dem Roth einerseits, Gelb und Gelbgrün andererseits, in dem die letzteren und nicht Roth sich als diejenigen Farben zeigen, die bei niedriger Intensität die geringsten Sehschärfen geben, während andererseits die Klarheit nach den Versuchen von A. KÖNIG und E. BRODHUN für die geringen Helligkeiten gerade im Roth verhältnißmäßig am kleinsten ist, und sich dieses am meisten von den blauen Farben entfernt, die das PURKINJESche Phänomne zeigen.

Der ganze Gegenstand ist zu neu, als daß sich entscheiden liefse, wie viel individuelle Abweichungen hier mit sprechen. Bestimmteres wird sich erst sagen lassen, wenn derselbe Beobachter bei denselben Beleuchtungen Sehschärfen und Helligkeiten verglichen hat.

#### Vergleichung verschiedener Farben betreffs ihrer Helligkeit.

Daß man auch verschiedene Farben in Bezug auf ihre Helligkeit vergleichen kann, ist im Vorigen mehrfach erwähnt worden. Aber die Sicherheit und Genauigkeit einer solchen Vergleichung erweist sich als eine viel geringere, als diejenige, welche bei Vergleichung von Lichtern derselben Farbe erreicht werden kann. Selbst schon bei den sehr geringen Unterschieden des Farbentons, wie sie bei praktisch photometrischen Messungen von Flammen verschiedener Temperatur und von elektrischen Glühlampen verschiedener Stromdichtigkeit vorkommen ist die Störung sehr merklich. Sollen gar Lichter von sehr weit abweichendem Farbentone mit einander verglichen werden, so wächst die Unsicherheit und Verlegenheit der Beobachter in hohem Grade. Sehr erhebliche Unterschiede der Helligkeit zwischen ganz verschiedenen Farben werden allerdings ohne Zweifel und Schwanken anerkannt. Namentlich kann es nicht zweifelhaft sein, daß wenn die eine Farbe als die Summe aus der andern und einem andersfarbigen Summanden anzusehen ist, die Summe immer heller als jeder der Theile erscheint. Das zeigt sich, sobald man auf irgend einem farbig beleuchteten Felde einen Fleck noch mit andersfarbigem Licht beleuchtet.

Beobachter, die sich in dergleichen Beobachtungen viel geübt haben, kommen schließlic zu etwas größerer Sicherheit, die allerdings auch durch eine Art von festerer Gewöhnung, oder größere Aufmerksamkeit auf ver-

unterstützende Nebenwirkungen gewonnen werden könnte. Auf ist die grössere Sicherheit, welche hierbei dichromatische Beob- zeigen, bei denen ja übrigens auch die Aufgabe eine viel einfachere ist; ens hat sich Herr E. BRODHUN in dieser Beziehung seinen Mit- tern durchaus überlegen gezeigt, selbst in der Vergleichung solcher die auch seinem grünblinden Auge ungleich erscheinen.

Selbst muß gestehen, daß ich über eine große Unsicherheit in Vergleichen nie hinausgekommen bin, obgleich ich in der Ver- g sehr kleiner Farbenunterschiede bei gleicher Helligkeit, und sehr Helligkeitsunterschiede bei gleicher Farbe andern Beobachtern nicht stehen glaube.

Nächst ist nun hier eine Thatsache zu erwähnen, die auch ungeübten tern leicht wahrnehmbar wird, und die jetzt unter dem Namen des reschen Phänomens bezeichnet zu werden pflegt, da sie von diesem zuerst erwähnt worden ist, und welche zeigt, daß bei verschie- Farben die Empfindung der Helligkeit eine verschiedene Function der n Lichtstärke ist. Wählt man zwei verschiedene farbige Felder, die ker Lichtintensität gleich hell erscheinen, und reducirt man die Licht- beider in gleichem Verhältniß, z. B. auf ein Zehnthel, so wird man daß bei dieser geringeren Lichtstärke die blauen Farben entschieden erscheinen als die rothen oder grünen. PURKINJE<sup>1</sup> bemerkt dem- end, daß Blau bei schwächstem Licht erkannt wird, Roth erst bei m. Sodann hat DOVE<sup>2</sup> darauf aufmerksam gemacht, daß wenn man einbare Helligkeit von Flächen, die mit verschiedenen Farben über- sind, bei verschiedener Intensität derselben Beleuchtung vergleicht, e eine, bald die andere heller aussieht. Im allgemeinen überwiegen fser Beleuchtungsstärke die weniger brechbaren rothen und gelben bei geringerer die blauen und violetten. Wenn ein rothes und ein Papier bei Tageslicht gleich hell aussehen, so erscheint bei Einbruch ht das blaue heller, das rothe oft ganz schwarz. Ebenso findet man, e Gemäldesammlungen bei sinkendem Abend (einen trüben Himmel und e Abenddämmerung vorausgesetzt) die rothen Farben zuerst schwinden, uen am längsten bleiben. Auch in der dunkelsten Nacht, wenn alle n Farben fehlen, sieht man noch das Blau des Himmels.

Ich auffallender habe ich diese Erscheinungen gefunden, wenn man ische Farben vergleicht. Wenn man den in *Fig. 145* S. 352 abgebil- Apparat zur Mischung von Spectralfarben benutzt, und vor das Feld, mit den beiden Farben beleuchtet ist, ein senkrechtes Stäbchen r wirft dies zwei verschiedenfarbige Schatten, da die beiden beleuch- verschiedenfarbigen Strahlenbündel von etwas verschiedenen Rich- nämlich von den beiden Spalten des letzten Schirmes (*S'* in *Fig. 145*)

PURKINJE, *Zur Physiologie der Sinne*. Bd. II. S. 109. 1825.

DOVE, Über den Einfluß einer weißen Beleuchtung auf die relative Intensität verschiedener  
*Berl. Monatsber.* 1852. S. 69—78. — *Pogg. Ann.* LXXXV. 397—403.



herkommen. Wäre also z. B. Violett und Gelb gemischt, so würde der violette Spalt einen Schatten werfen, der nicht mehr von Violett, wohl aber von Gelb beleuchtet ist, also gelb erscheint. Der andre Spalt würde einen violetten Schatten werfen. Macht man nun den Spalt, der das Violett durchläßt breiter, so wird das Violett, also auch der violette Schatten lichtstärker, und man kann durch passende Regulirung der beiden Spalten leicht erreichen, daß der violette Schatten dem Auge etwa ebenso hell erscheint, wie der gelbe. Wenn man nun den einfachen Spalt des ersten Schirmes, durch welchen das vom Heliostaten reflectirte Licht zum Prisma tritt, erweitert oder verengt, so verstärkt oder schwächt man die ganze Lichtmasse, die in den Apparat tritt, und zwar alle ihre farbigen Lichter in gleichen Verhältnisse. Dabei zeigt sich, daß schon bei einer geringen Verstärkung des gesammten Lichts das Gelb heller, bei einer geringen Schwächung dagegen dunkler als Violett erscheint. Dieser Unterschied ist viel geringer, wenn man zwei Farben aus der weniger brechbaren Hälfte des Spectrum nimmt, größer wenn beide aus der brechbareren Hälfte sind, am größten, wenn man sie von den Enden des Spectrum nimmt.

Genauer ist diese Erscheinung an Spectralfarben für seine grünblinden Augen dann von Herrn E. BRODHUN<sup>1</sup> verfolgt worden, der die unmittelbaren Vergleichungen der Helligkeit, wie schon erwähnt, mit verhältnißmäßig großer Sicherheit ausführt und in dieser Richtung sehr geübt ist. Da die verglichenen Felder in meinen Farbenmischapparate nicht sehr groß sind, war bei 25 maliger Wiederholung gleichartiger Messungen der mittlere Fehler der einzelnen Beobachtung für die Vergleichung von

roth mit roth 3,0 %  
 blau mit blau 3,3 %  
 blau mit roth 5,8 %,

wodurch die relative Sicherheit der Beobachtungen charakterisirt ist. Bei den Versuchen wurde mein Farbenmischapparat (*Fig. 147* S. 355) benutzt, wobei aber in beiden Feldern neben einander einfache Spectralfarben erschienen. Durch Änderung der Breite des einen Spalts wurde gleiche Helligkeit auf beiden Seiten erzeugt, und die Breite beider Spalten abgelesen, der Versuch 10 mal wiederholt. Dann wurde der bisher unveränderte Spalt ebenfalls verändert, und das ganze Verfahren bei diesem veränderten Grade der Helligkeit wiederholt. Auch wurden absorbirende Gläser zu Hülfe genommen, um zu kleine Spaltbreiten zu vermeiden. Ebenso mußten zu große vermieden werden, um nicht verschiedenartige oder verschieden helle Theile des Spectrum zusammen zu mischen. Man erhielt auf diese Weise für verschiedene Farbenpaare Zahlen für die Spaltbreiten, welche gleichen Helligkeiten beider Farben entsprachen.

Dabei hat sich nun herausgestellt, daß wenn man oberhalb einer gewissen Helligkeit bleibt, die Spaltbreiten gleicher Helligkeit für alle Farbenpaare einander nahe proportional wachsen, daß bei Verminderung der Helligkeit aber schließlic die Spalten für die blauen Farben verhältnißmäßig stärker verengt werden müssen, als die für die weniger brechbaren Farben, um die gleiche Helligkeit zu erhalten.

<sup>1</sup> EUGEN BRODHUN, *Beiträge zur Farbentehre*. Inaug. Diss. Berlin 1887.

Wenn die Vergleichung mit rothem Licht von  $670 \mu\mu$  Wellenlänge geschah, so fand sich bei  $600 \mu\mu$  (orange) noch keine Abweichung von der Proportionalität, bei  $580 \mu\mu$  (gelb) eine verhältnißmäßig geringe, dagegen von  $540 \mu\mu$  (grün) ab eine solche in steigendem Maße, so daß eine Abweichung von 15 % bei den Spaltbreiten  $b$  des Lichts von  $670 \mu\mu$

gegen Licht, dessen  $\lambda = 570 \ 540 \ 510 \ 490 \ 470 \ 450$

$b = 20 \ 30 \ 36 \ 20 \ 75 \ 68$

in kleineren Helligkeiten des violetten Lichts (Spaltbreite für  $670 \mu\mu = 10$ ) sich aber die Abweichung bis auf 126 %

erhebt. Die durch Spaltbreite 16 ausgedrückte Helligkeit ist gleich der, welche man erhält, wenn eine normalweisse Fläche in einem halben Meter Entfernung durch eine WILHELMSSCHE Platinglühlampe (d. h. eine schmelzende blanke Platinfläche von 9 qmm. Oberfläche beleuchtet und eine rechteckige Öffnung von 1,98 mm. Länge und 0,77 mm. Breite betrachtet wird.

Herr A. KÖNIG glaubte anfangs für sein trichromatisches Auge dasselbe Resultat zu finden, daß nämlich bei hinreichend hohen Graden der Helligkeit gleich viele Farben bei Verdoppelung ihrer Lichtstärke gleich hell blieben. Bei neueren Versuchen über höhere Helligkeiten ausgedehnten Versuchen<sup>1</sup> zeigten sich aber die dem PURKINJES'Schen Phänomen entsprechenden Abweichungen bis zu den höchsten Helligkeiten hinauf wenn auch an GröÙe stark abnehmend. Dagegen fand sich bei einem Versuche (Herrn Dr. RITTER.) eine obere Grenze, wie bei dem grünblinden Herrn BRODHUN.

Die Versuche der Herren MACÉ DE LÉPINAY<sup>2</sup> und NICATI haben ebenfalls das Verschwinden des PURKINJES'Schen Phänomen an der oberen Grenze der Lichtstärke angezeigt; die Frage ist bei ihnen aber nicht sicher entschieden, da sie die Berechnungsweise angewandt haben, welche direkte Anwendbarkeit von FECHNER'S Formeln für alle Lichtstärken und Farben voraussetzt.

Übrigens zeigen die erwähnten neueren Beobachtungsreihen von A. KÖNIG die Abweichung der relativen Helligkeitswerthe der Spektralfarben, welche regelmäßig mit der Helligkeit des Grün der Wellenlänge 535 (Grün) verglichen wurden, den durch das PURKINJES'Sche Phänomen bedingten sehr verschiedenen Gang. Bei schwächstem Licht tritt das Maximum durchgehend bei  $\lambda = 535$ , bei starkem Licht ging es vor bis ins Orange. Übrigens zeigten selbst einige normale Trichromaten erhebliche Abweichungen im Gange der Curve, während A. KÖNIG, eine trichromatische Dame, der grünblinde Herr E. BRODHUN ziemlich übereinstimmende Curven gaben. Der rothblinde Herr RITTER zeigte eine viel geringere Helligkeit im Roth. — Bei den höchsten Helligkeiten stimmten die Curven der verschiedenen Beobachter unter sich und auch mit einigen der beobachteten Monochromaten ziemlich gut überein.

Die Beobachtungen der beiden Dichromaten, denen sich die von Herrn A. KÖNIG halb der zuerst gebrauchten begrenzteren Skala der Lichtstärken anschlossen, haben es möglich zu machen für alle Farben Lichteinheiten solcher Art zu finden, die in gleicher und genügend hoher Anzahl genommen gleiche Helligkeiten darstellen. Nun zeigt sich allerdings jetzt, daß eine ganz scharfe Bestimmung solcher

<sup>1</sup> A. KÖNIG, Über den Helligkeitswerth der Spektralfarben bei verschiedener absoluter Intensität. Beiträge zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Festschrift für H. v. Helmholtz. Leipzig. 1891. S. 309. Auch separat erschienen.

<sup>2</sup> J. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI, Ann. d. Chimie et de Phys. 5. Série. t. 24. p. 289. 1881 und t. 30. 1883.



Lichteinheiten wenigstens für trichromatische Augen nicht möglich ist, selbst innerhalb der geringen Genauigkeitsgrade, welche die heterochrome Photometrie überhaupt zuläfst. Da aber mehrere Reihen von Messungen nach solchen Einheiten ausgeführt worden sind, ist es wünschenswerth sie zu benennen. Ich habe dafür einstweilen den Namen der äquivalenten Lichteinheiten oder Einheiten gleicher Helligkeiten vorgeschlagen.

Die schon angeführten Untersuchungen von A. KÖNIG und E. BRODHUN über die Unterschiedsschwellen der Spectralfarben sind nach solchen äquivalenten Einheiten berechnet, während bei den Untersuchungen von A. KÖNIG und C. DIETERICI über die Vertheilung der Grundempfindungen im Spektrum nach ganz andern Einheiten gerechnet ist. Lichtquanta der gewählten Elementarfarben sind nämlich als gleich gesetzt worden, wenn sie zusammen Weiß gaben. Das sind also Quanta von gleicher färbender Kraft. Wir wollen die hiernach bestimmten Einheiten als colorimetrische oder Farbeneinheiten bezeichnen. Für Mischfarben würde dies colorimetrische Lichtquantum der Summe der entsprechenden Quanta der gewählten drei Grundfarben entsprechen.

Dafs diese beiden Arten von Lichteinheiten zu einander ein sehr verschiedenes Verhältnifs haben, ergab sich schon aus meinen ersten Mischungsversuchen mit Spectralfarben (S. 319 und 331), die ich unter Anwendung des Doppelspaltes angestellt hatte,<sup>2</sup> die damals gefundenen Verhältnisse der Helligkeiten waren:

	Bei starkem Licht:	Bei schwachem Licht:
Violett zu Grün gelb	1 : 10	1 : 5
Indigo zu Gelb	1 : 4	1 : 3
Cyanblau zu Orange	1 : 1	1 : 1
Grünblau zu Roth	1 : 0,44	

Neuere Bestimmungen dieser Verhältnisse ergeben sich aus den Beobachtungen, welche A. KÖNIG und E. BRODHUN über die scheinbare Helligkeit der verschiedenen Theile des Spektrum gemacht haben, da beide für ihre Augen auch die Farbengleichungen der Spectralfarben bestimmt hatten. Für das dichromatische Auge von BRODHUN stimmen die gefundenen Helligkeiten erträglich gut mit einer linearen Formel; dies gilt natürlich nur für so hohe Helligkeiten, die der Anzahl ihrer äquivalenten Lichteinheiten entsprechen. Waren  $K$  und  $W$  die Quanta der kalten und warmen Farbe (spektrales Violett und Roth) deren Mischung gleichaussehend der Spectralfarbe war, so konnte ihre Helligkeit  $J$  gesetzt werden

$$J = 1,018 \cdot W + 0,03915 \cdot K$$

woraus folgt, dafs die Helligkeiten complementärer Mengen der beiden Farben sich wie 26 : 1 verhalten.

Die Abweichungen zwischen Beobachtung und Rechnung waren hierbei wenigstens nicht viel gröfser, nämlich bis 6 % reichend, als die mittleren Fehler der Helligkeitsvergleichenungen sehr differenter Farben überhaupt. Übrigens beziehen sich die

<sup>2</sup> H. Helmholtz, Pogg. Ann. Bd. 94. S. 19.

stimmungszahlen auf das Spectrum des Gaslichts, welches nicht als unveränderlich angenommen werden kann.

Die entsprechenden Beobachtungen für das trichromatische Auge von A. KÖNIG für die Helligkeit gleicher Farbenwerthe von Violett und Roth das Verhältniß 1:13,7, während die Helligkeit des von ihm supponirten elementaren Roth gering erschien, da es bei der verhältnißmäßig größeren Ungenauigkeit der Beobachtungen wie der Helligkeitsverhältnisse im trichromatischen Auge eine Bestimmung gewonnen werden konnte. Im Roth und Gelbgrün des Spectrum von der Wavelength 670  $\mu\mu$  bis 545  $\mu\mu$ , wo der Einfluß des Violett beginnt, war die Helligkeit, so weit erkennbar, sogar nicht erheblich von der Proportionalität mit der Wavelength allein abweichend. Zu bemerken ist dabei, daß dieses supponirte elementare Grün, wie Fig. 139 S. 340 zeigt, weit jenseits der Curve der Spectralfarben lag und daß also diese letzteren nur kleine Bruchtheile desselben enthalten, die, wie nicht erheblich heller sind als gleiche Farbenquanta des Violett, sich in den Unregelmäßigkeiten der Beobachtungszahlen leicht verstecken konnten. Bei Rothblinden (Dr. RITTER) fiel die Helligkeitscurve des Spectrum ziemlich genau mit der Grüncurve zusammen.

Da übrigens das von Herrn BRODHUN seiner Rechnung zu Grunde gelegte Verhältniß für die Helligkeit gemischter Farben auch an andern Farben von großem Werthe nied des Farbentons zu prüfen, ersuchte ich Herrn E. BRODHUN, der durch das trichromatische Farbensystem in dieser Hinsicht begünstigt ist, directe Helligkeitsgleichungen am Farbenkreisel zu machen. Er verglich zunächst die Helligkeit von zwei rothen und zwei blauen Papieren mit Grau, welches auf dem Farbenkreisel aus einem hellen Grau und Schwarz gemischt wurde. Dann stellte er die Helligkeitsgleichungen her zwischen einem Roth und einem Blau einerseits, Grau und einem andrerseits, und verglich den durch diesen Versuch gefundenen Werth des Helligkeitswerthes mit dem aus den ersten Bestimmungen berechneten. Es fand sich:

$$\text{Helles Roth} \quad R_h = \frac{160}{360} \text{ Grau,}$$

$$\text{dunkles Roth} \quad R_d = \frac{110}{360} \quad "$$

$$\text{helles Blau} \quad B_h = \frac{60}{360} \text{ Grau,}$$

$$\text{dunkles Blau} \quad B_d = \frac{25}{360} \quad "$$

Die Helligkeitsgleichungen, beobachtet:

$$\text{I. } 121 \text{ Gr.} = 127 B_h + 233 R_h, \text{ berechnet} = 125 \text{ Gr.}$$

$$\text{II. } 118 \text{ Gr.} = 95 B_d + 265 R_d, \quad " \quad = 125 \text{ Gr.}$$

$$\text{III. } 98 \text{ Gr.} = 94 B_h + 266 R_d, \quad " \quad = 97 \text{ Gr.}$$

$$\text{IV. } 97 \text{ Gr.} = 70 B_d + 290 R_h, \quad " \quad = 94 \text{ Gr.}$$

Die Übereinstimmung mit dem linearen Gesetz ist hierbei eine verhältnißmäßig gute.



## Vergleichung der Helligkeit sehr wenig unterschiedener Farben.

Bei dieser großen Unsicherheit der directen Vergleichung der Helligkeiten sehr verschiedenartiger Farben, von der ich namentlich mich selbst persönlich nicht frei machen kann, habe ich versucht einen andren Weg einzuschlagen, der auf der Vergleichung sehr ähnlicher Farben beruht. Dies ist, wie schon die langjährige Erfahrung bei photometrischen Messungen lehrt, verhältnißmäßig viel sicherer und leichter auszuüben, und ich dürfte hoffen durch Verfolgung eines continuirlichen Übergangs zwischen verschiedenen Farben, die alle auf gleiche Helligkeit gebracht wurden, bessere Helligkeitsgleichungen zwischen den Endfarben zu gewinnen.

Ich ging dabei aus von dem Grundphänomen, welches in der Photometrie benutzt wird, wenn es sich darum handelt zwei etwas verschieden gefärbte Lichter ihrer Helligkeit nach zu vergleichen. Wenn man die Lichtstärke des einen von ihnen allmählig verändert, so werden sie selbstverständlich niemals ganz gleich, aber man gelangt doch zu einer Einstellung, bei welcher der genannte Unterschied ein Minimum der Deutlichkeit erreicht. Man pflegt das Verhältniß der Lichtstärken, welches dieser Einstellung entspricht, photometrisch als das Verhältniß gleicher Helligkeit zu betrachten.

Ich habe es mir nun zunächst zur Aufgabe gestellt, diese Einstellung auf das Minimum der Erkennbarkeit des Unterschiedes bei einer Reihe von Mischfarben, die aus denselben Farbelementen durch Mischung auf der Farbenscheibe erhalten wurden, durchzuführen. Die eine Mischfarbe, und zwar die etwas dunklere, blieb dabei unverändert, die andre erlitt kleine Veränderungen in ihrer Helligkeit und Mischung, indem man sehr schmale schwarze Sectoren sich einschieben ließ, um sie ein wenig dunkler zu machen, bis man die Grenzen der Ringe, in denen sich diese Farben zeigten, möglichst schwer erkennbar gemacht hatte, wobei sie dann auch gleich hell erschienen. Die dazu erforderlichen Verhältnisse wurden notirt.

Die Farbenmischungen füllten abwechselnd fünf concentrische Ringe auf der Scheibe. Die Kreisscheiben waren aus farbigen Papieren von möglichst gesättigter Farbe, aber nicht glänzender Oberfläche geschnitten; sie waren längs eines Radius gespalten nach der Methode von MAXWELL, um die Winkel beliebig ändern zu können. In umstehender Figur 174 sind die hervorstehenden Ränder der gespaltenen Scheiben abgebildet, wie sie auf deren vorderer Fläche sichtbar waren. Am oberen Umfange der Figur ist jeder vorliegenden Scheibe ein etwas kleinerer Radius gegeben, um sichtbar zu machen, wie sie zwischen einanderliegen. In Wirklichkeit waren die Scheiben hier durch congruente Kreislinien von gleichem Radius begrenzt.

Die Scheibe von etwas hellerer Farbe *R* und die schwarze haben einen einfachen radialen Einschnitt, erstere bei *bb*, letztere bei *dd*. Dagegen hat die Scheibe von dunklerer Farbe *B* eine mit zinnenförmigen Vorsprüngen versehene Grenzlinie zwischen *aa* und *cc*. Ersteres ist ein Radius, letzteres aber ist eine Parallele zu diesem Radius, so daß die Winkelwerthe der Bögen zwischen *aa* und *cc* für die inneren Kreise größer werden, als für die äußeren. Die schwarze Scheibe wurde ebenfalls so eingelegt, daß ihre Grenzlinie *dd* nicht genau die Lage eines Radius hatte, sondern parallel dem dicht daneben liegenden Radius *aa* lag, und somit der

streifen, der im Grunde der zinnenartigen Ausschnitte hervorsah, überall reite hatte, und überall die Höhe der Zinnen um den gleichen Bruchtheilerte. Die Lage des Radius  $b$  konnte beliebig um fast den ganzen erschoben werden, mit Ausschluss des von den Zinnen eingenommenen so daß man jede der beiden Farben  $R$  und  $B$  fast rein erscheinen lassen er nach Wahl alle möglichen Abstufungen ihrer Mischung. Zu der durch zwischen den Radien  $bb$  und  $aa$  liegenden Sektoren bestimmten Farben- am dann in den bis  $cc$  reichenden Vorsprüngen des Feldes  $B$  ein kleiner




Fig. 174.

ser Farbe hinzu, dafür wurde ein gleicher Bogen von  $R$  weggenommen. In mitten der Zinnen dagegen wurde nur ein schmaler Streifen  $aa dd$  von durch Schwarz weggenommen. Wenn die Farbe  $B$  etwas dunkler wo sie zwischen  $aa$  und  $cc$  statt  $R$  auftrat, etwas Helligkeit versen Verlust für die andre Mischung zu compensiren, mußte auch hier Farbe  $R$  durch Schwarz fortgenommen werden. Die Breite dieses ifens konnte verändert werden. Die Grenzen zwischen den äußeren e Winkelwerthe der Zinnen am kleinsten sind, sind natürlich am un- Ich fand es vorthellhaft, gleichzeitig mehrere Grenzen von verschie- Abstufungen der Deutlichkeit vor Augen zu haben, um bei den Ver-

gleichungen diejenige herauszusuchen, die eben der Grenze des Wahrnehmbaren am nächsten stand.

Wenn ein festes Verhältniß der Helligkeit zwischen den beiden Farben  $B$  und  $R$  auch unter diesen Umständen bestände, so müßte sich auch ein festes Verhältniß zwischen den beiden kleinen Bögen  $ac$  und  $ad$  finden lassen, welches in den Ringen von verschiedenem Farbenton immer wieder gleiche Helligkeit herstellte, unabhängig von dem Verhältniß der beiden großen Sektoren  $R$  und  $B$ .

Nähme man also z. B. an, daß Lichter gleicher Helligkeit, aber verschiedenen Farbentons durch Mischung von zwei Grundfarben nach der Formel

$$H = A \cdot x + B \cdot y$$

gegeben werden könnten, wo  $A, B$  Constanten sind,  $H$  eine Function der Helligkeit  $h$ , und  $x, y$  Quanta zweier beliebig gewählter Elementarfarben: so würde für eine benachbarte Farbe in der Reihe gleich heller Mischungen

$$o = A \cdot dx + B \cdot dy$$

sein müssen, und das Verhältniß von  $dx : dy$  würde, unabhängig von den Werthen  $x$  und  $y$ , wie der Helligkeit  $h$  immer dasselbe sein; dasselbe würde von dem Verhältniß der Breite der beiden schmalen Farbstreifen auf und zwischen den Zinnen unsrer Scheibe gelten.

Diese Vermuthung bestätigt sich nun aber nicht bei Ausführung des Versuchs. Es zeigt sich vielmehr, daß der zum Theil mit Schwarz gedeckte Vorsprung der helleren Farbe um so breiter gemacht werden muß, je mehr von seiner Farbe schon der Farbe des Grundes eingemischt ist. Es wird also bei der von mir beschriebenen Methode der Vergleichung zweier Helligkeiten — wir wollen sie die photometrische Methode nennen — die Wirkung des Zusatzes einer Farbe auf die Helligkeit wesentlich durch den schon vorhandenen Vorrath dieser selben Farbe in der Mischung geschwächt.

Ich führe zunächst einige Beispiele solcher Versuche an:

1. **Grün und Roth**, Breite  $ac = 4,5$  mm. Gleiche Helligkeit und das Minimum des Unterschieds erhielt ich

- a) für rothen Grund bei 2,5 mm Breite des Grün;
- b) für halb roth, halb grünen Grund bei 2,75 mm Grün;
- c) für grünen Grund bei 3,75 mm Grün.

Der Kreis von 50 mm Radius war eben noch wahrnehmbar, etwas deutlicher bei halb grünem, halb rothem Grunde.

2. **Blau und Roth**, Breite  $ac = 4$  mm. Gleich helle Ringe

- a) auf blauem Grunde für 1,25 mm Roth gegen 4 mm Blau;
- b) auf halb rothem, halb blauem Grunde 1,75 mm Roth;
- c) auf rothem Grunde 3 mm Roth.

Bei  $a$  und  $b$  war der Kreis von 60 mm Radius schwach zu erkennen, bei  $c$  nur der von 50 mm.

3. **Blau und Grün**, Breite der Ausschnitte 5,5 mm. Gleich helle Ringe

- a) auf blauem Grunde, bei 1,5 mm Grün gegen 5,5 mm Blau;
- b) auf halb blauem, halb grünem Grunde 1,75 mm Grün;
- c) auf grünem Grunde 2,25 mm Grün.

Sichtbar war der Kreis von 50 mm Radius, aber sehr schwach, am schwächsten bei  $c$ .

Es zeigt sich ohne Ausnahme, daß der Streifen von veränderlicher Breite auf gleichfarbigem Grund breiter genommen werden muß als auf gemischtem Grunde, und auf diesem breiter als auf dem Grunde der ungemischten andern Farbe.

e der Helligkeiten der drei gewählten Farben ist offenbar:

Grün > Roth > Blau.

stärkeren Helligkeitsdifferenzen mit Blau sind die Ringe auf dem de weniger sichtbar; bei der schwächeren Differenz Roth Grün sind den reineren Farben weniger sichtbar, als auf dem Gemisch.

die gebrauchten Pigmentfarben überhaupt gemischtes Licht aus fast n des Spectrums geben, ist es nicht auffallend, daß sie sich theilweise seitig schwächen, und daß die zackige Figur jeder Farbe auf dem e der andern Farbe nicht ganz so deutliche Ringe giebt, wie sie auf unde geben würde. Aber sehr groß ist der Unterschied in der Empfindlichkeit. Bei halb hell, halb schwarz getheiltem Grunde würden helle breite von etwa 2 mm für den Radius 60 mm haben müssen, um zu werden. Daß die erforderlichen Farbenstreifen bei unsren Ver- 3 mal so breit waren, giebt also noch keineswegs einen sicheren daß die Empfindlichkeit gegen Farbenabstufungen erheblich geringer r Helligkeitsstufen.

nun aus diesen Versuchen, daß, wenn wir auf diesem Wege von ättigten Farbe ausgehend eine Reihe gleich heller gemischter Farben wir immer nur zwei sehr nahe Glieder der Reihe mit einander ver- gesammte Quantum des gemischten Lichts in der Reihe solcher Farben lert bleiben kann. Wählen wir die Einheiten für die Lichtquanta dfarben so, daß sie in gleicher Helligkeit erscheinen, so werden wir gesättigtem Roth anfangend, durch Wegnahme eines kleinen Quantum zkeit viel weniger schwächen, als wir durch den Zusatz eines gleichen sie verstärken, da letztes noch auf kein merkliches Quantum schon laus stößt. Wir müßten also weniger Blau zusetzen, als wir Roth adurch wird die Summe der Lichtquanta kleiner werden. Dies wird t zu Mischungen mit immer mehr Blau so weiter gehen müssen, bis len Farben nahe gleiche Quantität in der Mischung haben; dann igen müssen, Blau in größerer Menge hinzuzusetzen, als man Roth s Gesamtquantum wird wieder steigen, bis wir beim reinen Blau nd.

es hier offenbar mit einem ähnlichen Einfluß zu thun, wie er sich der Intensität ohne gleichzeitige Anwesenheit einer andern Farbe Felde geltend macht. Gleiche kleine Zuwachse der Lichtmenge weniger Eindruck, je größer die schon auf dem Felde vorhandene cher Art ist. In jenen Fällen messen wir den Eindruck ab an der Wahrnehmung des Schattens. hier vergleichen wir zwei die Hellig- Abstufungen zweier Farben auf demselben Grunde mit einander.

bachtungen zeigen, daß bei den verhältnißmäßig viel sichereren Vergleichen sehr ähnlicher Farben sich wesentlich abweichende ler unmittelbaren Vergleichung sehr verschiedener Farben ergeben. e noch, daß ich die meisten Versuche mit den rotirenden Scheiben volkigen Himmels dicht am Fenster angestellt habe. Ich habe sie 1 Tagen auch unter directer Sonnenbeleuchtung mit demselben Er- . Dies, sowie der Umstand, daß bei Roth und Grün der Erfolg vie bei den beiden anderen Paaren, schließt den Einfluß des 'URKINJE aus. Denn bei Grün und Roth war die dunklere Farbe



diesem Einfluß weniger unterworfen, als die hellere, bei den anderen beiden Paaren dagegen mehr.

Es zeigt sich hierbei durchgehends, daß die Steigerung der Helligkeit, welche durch Zusatz einer bestimmten Quantität farbigen Lichts hervorgerufen wird, geringer ist auf einer gleichfarbigen Fläche, als auf einer von sehr abweichender Farbe.

#### Versuche mit prismatischen Farben.

Um diese Thatsache in noch anderer Weise zu prüfen, habe ich noch einige Versuche mit prismatischen Farben ausgeführt, Versuche, die bei methodischer Durchführung wohl noch wichtige Ergebnisse erwarten lassen. Ich stellte nämlich ein Spektroskop mit Objectiv- und Ocularspalt so auf, daß ich das Feld desselben gleichmäßig mit lichtstarkem Violett des Sonnenlichts gefüllt sah. Um das durch Diffusion in den Gläsern zerstreute weisse Licht aus dem Felde größtentheils zu beseitigen, diente die Einschaltung eines blauen Glases zwischen Heliostatenspiegel und erstem Spalt. Die Helligkeit dieses Violett wurde so groß gemacht, als es ohne merkliche Störung seiner Reinheit anging; doch blieb es bequemer erträglich für das Auge und blendete nicht. Gleichzeitig wurde von der dem Beobachter zugekehrten Seite des Prisma rothes Licht reflectirt, welches in zwei getrennten Bündeln durch eine Glasplatte und ein LUMMERsches Photometer gegangen war. Das letztere Instrument wurde so eingestellt, daß man den Helligkeitsunterschied der beiden Lichtfelder beim Ausschuß des violetten Lichtes noch gerade erkennen konnte. Dann wurde das violette Licht zugelassen, so daß beide Arten von Licht gleichzeitig im Felde sichtbar waren. Der Erfolg war in der That der erwartete; die schwache Unterschiedsstufe des rothen Lichts war kaum weniger gut erkennbar, wenn sich das Feld mit Violett überdeckte als vorher. Wenn man dagegen das ganze Feld mit Licht aus dem rothen Theile des Spectrum überdeckte, war schon eine rothe Beleuchtung von merklich geringerer Helligkeit, als das Violett gehabt hatte, ausreichend, um die Sichtbarkeit der Figur aus dem Photometer gänzlich aufzuheben. Auch Gelb und Grün tilgten die Sichtbarkeit des Unterschiedes der rothen Felder bei ziemlich mäßigen Helligkeiten. Eine genauere Vergleichung der entsprechenden Helligkeitsstufen der verschiedenen Farben konnte mit den zur Zeit vorhandenen Apparaten noch nicht durchgeführt werden.

Ich bemerke hierbei noch, daß man vollkommene Unabhängigkeit der Wahrnehmbarkeit der schwachen Farbenstufen des Roth von der übergedeckten andern Farbe nicht erwarten darf, da mancherlei schon besprochene und noch weiter zu besprechende Erscheinungen zeigen, daß auch die Endfarben des Spectrum nicht je einer unvermischten Grundfarbe entsprechen. Aber der sehr große Unterschied, den ähnliche und weit verschiedene Farben hierbei erkennen lassen, tritt bei den beschriebenen Versuchen doch sehr deutlich hervor.

Die hier besprochene verhältnismäßige Unabhängigkeit der Deutlichkeit eines Farbenunterschieds von der Zumischung sehr heterogener Farben dehnt sich aber nicht auf hohe Lichtstärken aus, welche das Gefühl der Blendung hervorbringen. Daß bei diesen die Empfindung für die Unterschiede der Lichtqualität stumpfer wird, habe ich schon im § 19, Seite 284, 285, hervorgehoben. Bei höchster erreichbarer Lichtstärke gehen alle prismatischen Farben in kaum noch unterschiedenes gelbliches oder bläuliches Weiß über.

i die größten Unterschiede des Farbentons nahehin vollständig vernachlässigen es nicht zweifelhaft sein, daß auch die von weniger verschiedenen gleichmäßigerer Helligkeit verschwinden, was beim Gelb und Grün in der That geschieht. Daher wird jede gleichmäßige Überdeckung jedes Felder-ringem Farbenunterschiede, aber großer Helligkeit mit andersfarbigem, Licht der Unterscheidung nachtheilig sein.

Untersuchungen der Herren A. KOENIG und BRODHUN über die Helligkeit geht für diese das Gleiche hervor. Wenn wir zwei Lichtstärken von Roth  $r$  und  $(r + dr)$ , und zwei solche  $b$  und  $b + db$  haben, und alle an der oberen Grenze des Gebiets liegen, wo das Gesetz gilt, und  $dr : r = db : b$  ist, so daß die Unterschiede  $dr$  und  $db$  empfunden werden, so wird eine paarweise Vereinigung dieser Bezeichnungen  $(r + dr)$  und  $(r + b + dr + db)$  zwei Helligkeiten geben, deren Unterschied nach den genannten beiden Beobachtern, welches auch die beiden in der That mögen, undeutlicher ist, als der von  $r$  und  $(r + dr)$ , so wie der von  $b$  und  $(b + db)$ . Also hat Zusatz der Farbe  $r$  und  $(r + dr)$  der Wahr-Unterschiedes geschadet, trotzdem wir hier zu dem lichtstärkeren stärkeren Roth gesetzt haben.

neu hinzukommende Farbe, je nach ihrer Lichtstärke, bald einen bald einen sehr deutlich erkennbaren Einfluß auf die Unterscheidbarkeit bestehender kleiner Abstufungen einer anderen Farbe hat, kann einen physiologischen Grund haben. Wir wissen aus den Untersuchungen über das Nervensystem im Allgemeinen und aus denen über die lichtempfindlichen Substanzen des Auges insbesondere, daß dieselben durch Erregung unter dem Einfluß des arteriellen Bluts wieder in ihre normale Leistungsfähigkeit zurückgeführt werden. Wir dürfen daraus Licht bestimmter Art, welches nur eine einzige der lichtempfindlichen Nervenetzten, auch nur deren eigene Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, und die benachbarten Nervenapparate ungestört läßt, so lange da- wesentliche Verminderung des der betreffenden Netz- r Verfügung stehenden arteriellen Sauerstoffs eintritt. Aber geschieht, wird auch die Thätigkeit benachbarter Nerven- werden können, die aus denselben Capillaren ihren Sauerstoff be- würde dem entsprechen, was wir im Auge wahrnehmen. Bei mäßigem . daß die Feinheit der Empfindung einer Grundfarbe nur unwesent- n Bedingungen vielleicht gar nicht, gestört wird durch gleichzeitige g einer andern Grundfarbe in derselben Netzhautstelle. Bei starkem en zugeführten Sauerstoffvorrath schneller verzehrt, tritt eine solche ie zweite Grundfarbe dagegen deutlich ein.

riff der Helligkeit. Ich suche hier zunächst zusammen- nan über die verschiedenen Fälle der Vergleichung der Hellig- ichteter Felder Gemeinsames aussagen kann.

elligkeit ist eine Größe, von der ein gewisser Grad jedem les Auges beizulegen ist. Die Helligkeit hat den wesentlichen r Größe, dadurch daß man der Regel nach (Ausnahmen vor- an sich der Gleichheit nähert) bestimmt erklären kann: „Die Feldes  $A$  ist größer, als die des Feldes  $B$ “, und es scheint

auch eine ausnahmslos richtige Regel zu sein, daß wenn zu einer gegebenen farbigen Beleuchtung eine zweite anders farbige desselben Feldes hinzukommt, die Summe beider eine grössere Helligkeit hat, als jede einzelne.

Dagegen ist zu bemerken, daß die Anerkennung der Gleichheit zweier Helligkeiten verschiedenfarbigen Lichtes auffallend unsicher ist, ja daß die letzten Arbeiten von Herrn A. KÖNIG es zweifelhaft machen, ob nicht weitgehende Differenzen in der Helligkeitsschätzung selbst zwischen normalen trichromatischen Augen vorkommen, wenn auch einzelne Gruppen von Beobachtern sich finden, deren Aussagen ziemlich gut mit einander übereinstimmen.

Die eigentlich charakteristische Definition der Gleichheit zweier Gröfsen, daß nämlich zwei, die einer dritten gleich sind, unter sich gleich sind, werden wir auf Helligkeiten höchstens in der Form anwenden können: „Wenn  $A > B$ , und  $B > C$ , so ist  $A > C$ “.

Ich persönlich muß wiederholt erklären, daß ich mir ein Urtheil über Gleichheit von heterochromen Helligkeiten kaum zutraue, höchstens über Gröfsen und Kleiner in extremen Fällen. Aber ich gebe zu, daß man von zwei verschiedenfarbigen Feldern das eine immer so viel verdunkeln kann, daß kein Zweifel bleibt: nun sei das andere heller.

Sicher fühle ich mich in der Beurtheilung des Unterschiedes fast nur in dem Falle, wo die eine Beleuchtung die Summe ist von der andern und einer hinzugekommenen dritten. Ist die Menge dieser dritten klein gegen die erste, so giebt sie zwar nur einen kleinen Helligkeitsunterschied, aber auch nur einen kleinen Farbenunterschied.

Für mich selbst habe ich durchaus den sinnlichen Eindruck, daß es sich bei heterochromen Helligkeitsvergleichen nicht um Vergleichung einer Gröfse, sondern um das Zusammenwirken von zweien, Helligkeit und Farbengluth, handelt, für die ich keine einfache Summe zu bilden weifs, und die ich auch wissenschaftlich noch nicht definiren kann.

Ich sehe mich also bei diesem Gegenstande vielfach darauf beschränkt zu referiren, was vertrauenswürdige Beobachter berichten.

2) Eine erheblichere Sicherheit der Vergleichung zweier Helligkeiten ist nur bei einander sehr ähnlichen Farben möglich, aber auch bei solchen nie so grofs, wie bei ganz gleichen. Ob aber bei diesen Vergleichungen ähnlichster Farben nicht Ermüdungserscheinungen des Auges Einfluß gewinnen, die wir bei den Nachbildern besprechen werden, bleibt fraglich.

3) Wenn die Farbenwerthe zweier Lichtgemische einander vollkommen gleich sind, haben sie genau dasselbe Aussehen und auch genau dieselbe Helligkeit. Man kann daraus schliesen, daß die Helligkeit eine Function der drei Farbenwerthe eines Lichtgemisches sei und daß GRASSMANN'S Satz: „Gleich aussehende Lichter gemischt geben gleich aussehende Mischungen“ auch noch dahin erweitert werden kann: „Gleich aussehende Paare von Lichtern gemischt geben gleiche Helligkeit der Mischung.“

Aber die Helligkeiten sind nicht mehr lineare Functionen der Farben-



werthe: dem widerspricht PURKINJE'S Phänomen. Auch dürfen wir nicht den Satz aufstellen: „Gleich helle Lichter addirt, geben gleich helle Mischungen“. Denn gleich helles Roth und Blau verdoppelt, geben das Roth heller als das Blau.

Nur an der unteren Grenze der Lichtstärken, wo die Verschiedenheit der Farben verschwindet, ist anzunehmen, daß die Helligkeit oder eine Function derselben einen linearen Ausdruck durch die Farbenwerthe zulasse.

Da die Helligkeit keine lineare Function der Farbenwerthe sein kann, folgt, daß sie eine Empfindung sei, die auf einer verwickelteren Art des Zusammenwirkens der drei elementaren Farbeneindrücke beruht.

Daß ein solches Zusammenwirken der in das Auge einfallenden Lichtmengen stattfindet, zeigen ganz zweifellos die motorischen Erscheinungen am Auge, die von der Helligkeit abhängen. Die auffallendste und regelmäßigste derselben ist die Wirkung auf die Pupille, wobei ein Zusammenwirken sämmtlicher Lichtmengen, die in beide Augen eingefallen sind, zu Stande kommt, am stärksten aber verhältnißmäßig diejenigen wirken, welche die gelben Flecke der beiden Netzhäute getroffen haben. Durch die photographische Abbildung der Iris des menschlichen Auges bei Magnesiumblitzen ist von Herrn CL. DU BOIS-REYMOND<sup>1</sup> nachgewiesen worden, daß eine Adaptirung der Pupille bis zu den geringsten Lichtstärken hinab stattfindet; sie ist in absoluter Dunkelheit so weit, daß die Iris hinter dem Cornealrande verschwindet. Diese Regulirung der Pupillenweite hat in hohem Grade den Charakter organischer Zweckmäßigkeit. Bei den höchsten Helligkeiten ist die Pupille eng, und das Auge wird gegen den Einfluß überflüssig starken und schädlichen Lichtes geschützt. Andererseits kommt in Betracht, daß mit engeren Lichtkegeln im Allgemeinen schärfere Netzhautbilder zu erzielen sind. Wir haben aber oben schon gesehen, daß die Sehschärfe, so weit sie von der Empfindungsweise der Netzhaut abhängt, mit abnehmender Beleuchtung abnimmt. Es ist also, wenn auch bei schwachen Beleuchtungen möglichst viel erkannt werden soll, nothwendig, eine bestimmte Ausgleichung zu treffen zwischen der optischen Bildschärfe, die durch die Verengerung der Pupille verbessert wird und dem Durchmesser der Pupille, welcher die Lichtmenge und dadurch die Sehschärfe bestimmt. Dadurch ergibt sich hier schon, daß Farben, welche bei gleicher Verminderung der objectiven Lichtmenge größere Sehschärfe zeigen, was, wie oben erwähnt, wahrscheinlich wesentlich mit feinerer Stufenempfindlichkeit zusammenhängt, bei etwas engerer Pupille noch mit Vortheil gebraucht werden können, und also reflectorisch auf die Pupille wie hellere Farben wirken müßten.

Nun wäre es nach physiologischen Gesetzen allerdings nicht nothwendig, daß wir diese Empfindung, die zu der Reflexbewegung der Iris Anlaß giebt, fühlen müßten. In der That aber fühlen wir bei sehr großen Lichtinten-

---

<sup>1</sup> CL. DU BOIS-REYMOND, Über Photographien der Augen bei Magnesiumblitz. *Archiv für Physiologie*, 1888. B. 394 u. 395. *Verhandl. d. Physiologischen Gesellschaft zu Berlin*, 23. März 1888.

sitäten doch einen Lichtschmerz, der auch willkürliche Muskeln, die der Augenlider und einige des Gesichts, reflectorisch zur Abwehr bestimmt. Dieser Schmerz ist nicht von der gesamten Lichtwirkung auf beide Sehfelder abhängig, wie der Reflex auf die Iris, sondern ist localisirt, und ist um so unangenehmer, je mehr Licht auf ein kleines Stück der Netzhaut vereinigt ist. Wir suchen deshalb unsere künstliche Beleuchtung so einzurichten, daß wir die Flammen oder elektrisch glühenden Kohlenfäden unserer Leuchtapparate mit transparenten Hüllen umgeben, welche verhindern, daß ein scharfes optisches Bild der Lichtquelle vom Auge direct gesehen wird. Das Licht der Lichtquelle erscheint uns dann vielmehr gleichmäßig über die größere Fläche des durchscheinenden Schirms verbreitet. Gute Schirme dieser Art, z. B. matt geschliffene weiße Gläser, lassen nichts von dem Lichte der Lichtquelle verloren gehn, sie vertheilen es nur über eine größere Fläche.

Übrigens findet doch auch für diese Art des Lichtschmerzes bis zu einem gewissen Grade eine Addition der verschiedenen Flächenstücke der Sehfelder statt. Wenn ein heller dünner Wolkenschleier über beschneiten Flächen oder auch nur über hellen Steinflächen im Hochgebirge liegt, ohne daß irgend eine einzelne Stelle des Bildes gerade blendend hell erscheint, kann doch der Anblick der ausgebreiteten lichten Umgebung nach kurzer Zeit höchst quälend werden.

Die störenden Veränderungen, welche durch starke Beleuchtung in der Netzhaut vorübergehend hervorgerufen werden, werden wir in den nächsten Paragraphen noch zu besprechen haben. Der Lichtschmerz charakterisirt sich in diesen Fällen als ein organisches Schutzmittel, was uns zur Wahrung der Integrität des Organs aufruft.

Da der Lichtschmerz wohl ausnahmslos eine gleichzeitig vorhandene Lichtempfindung begleitet, die die spezifische Modalität der Gesichtsempfindungen hat, so erscheint er uns als ein untrennbarer Theil von dieser. Wenn er aber als Schmerz fühlbar wird, hat er mehr den Charakter einer Tastempfindung, des Kopf- oder Augenschmerzes. Er kann sich übrigens in Krankheitszuständen, z. B. während eines Anfalls von Hemikranie zu verhältnißmäßig schwachen Lichteindrücken gesellen.

Die Frage nach der Modalität der Schmerzempfindung ist übrigens für sämtliche Gebiete der Physiologie noch nicht klar erledigt. Schmerzempfindende Nerven kommen allen blutführenden Geweben des Körpers zu, auch den motorischen Nervenstämmen und denen der höheren Sinnesnerven, welche letzteren, durchschnitten, neben der specifischen Erregung auch noch Tastschmerz erregen.

Indessen kann diese Frage hier unerledigt bleiben. Es genügt uns hier, zu wissen, daß die Spuren einer solchen Empfindung, die sich bei hoher Intensität zu Schmerz steigern kann und durch die Auslösung von Schutzvorrichtungen eine wichtige Rolle spielt, im Auge deutlich erkennbar vorhanden sind. Ihre Scheidung von den anderen specifischen Empfindungen des Auges können wir nicht glatt durchführen, weil wir überhaupt nur solche Empfindungs-

n von einander zu scheiden im Stande sind, deren objective Er-  
 wir von einander trennen und einzeln auf unsere Sinne wirken  
 1. Nun wird durch alles objective Licht, welches aus Spectral-  
 mengesetzt ist, nothwendig ein Gemisch von Empfindungen der  
 ben erregt. Es enthalten also nothwendig alle Lichtempfindungen  
 les, aber nie ganz fehlendes Quantum der Empfindung von Weifs,  
 dann noch ein oder zwei andere Farbenempfindungen gesellen  
 ch diesen gemeinsamen Bestandtheil sind sie unmittelbar als  
 mpfindungen schon charakterisirt. Dazu kommt nun die Em-  
 gemeinsam zum Schutze drängenden Schmerzes, die ja möglicher  
 uch in niederem Grade und wenig bestimmt in ihren Intensitäts-  
 en Lichtstärken vorhanden sein kann, die noch zur Regulierung  
 orte Veranlassung geben.

Urempfindungen der Netzhaut haben wir in den früheren Ab-  
 ter Untersuchung als drei unabhängig neben einander bestehende  
 isen kennen gelernt. Ein in ihrem Wesen gegründetes ge-  
 afs ihrer Intensitäten haben wir bis jetzt nicht gefunden. Das  
 vielfach angewendet haben, indem wir solche Quanta der drei  
 leich groß setzten, die zusammen das Weifs der Sonne er-  
 durch Hereinziehung eines äufseren Objects gegeben.

cksichtigung der Blendungserscheinungen gewinnen wir nun  
 en Vergleichspunct zwischen ihnen. Quanta der Grundfarben,  
 1 Grad des Lichtschmerzes erregen, bekommen dadurch eine  
 senbeziehung zu einander. Ist die organische Zweckmäfsig-  
 richtig durchgearbeitet, so werden Helligkeiten von gleichem  
 leich nachtheilig für das Auge und seinen Gebrauch sein.  
 bei an der unteren Grenze des Gebiets der blendenden Hellig-  
 so werden wir zu erwarten haben, dafs, wenn der Eindruck  
 em Lichtschmerz entspricht, gleich helle Quanta verschiedener  
 pfundung der Helligkeitsstufen gleich stark beeinträchtigen.  
 3 hat sich in der That bei den auf S. 402 bis 408 ange-  
 en der Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN bestätigt.

röfse der unterscheidbaren Helligkeitsstufen hängt aber auch  
 ie wir als Klarheit (s. S. 394) bezeichnet haben. Bei gleicher  
 wir gleich feine Modulirungen der Körperoberfläche durch  
 ennen können, und auch die Sehschärfe für kleine Objecte  
 Hauptsache nach dadurch ebenfalls mitbestimmt.

ebt sich nun für die oben gegebene Voraussetzung über den  
 es der Helligkeit, dafs wir erwarten dürfen, bei gleicher  
 h gleich viel sehend zu erkennen. Hierin liegt offen-  
 ze praktische Bedeutung der Helligkeit.

un abwärts steigen von der Helligkeit, welche dem Maximum  
 spricht, so nimmt die Klarheit immer mehr ab, ebenso die  
 le aber nehmen in den brechbaren Farben viel langsamer



ab, als in den rothen und gelben. Dementsprechend erscheinen uns die ersteren bei gleicher Abnahme der objectiven Lichtstärke auch heller, als die letzteren (PURKINJE's Phänomen).

In dieser Beziehung würde es also mit den bekannten Thatsachen gut übereinstimmen, wenn man den Satz aufstellen wollte: Heller erscheint uns von zwei verschiedenfarbigen Beleuchtungen diejenige, in der wir mehr feine Einzelheiten erkennen können, oder wissen, daß wir sie bei Anstellung des Versuchs würden erkennen können. Diese Auffassung würde auch die eigenthümliche Unsicherheit in der Schätzung der Helligkeit erklären, nur läßt sie sich nicht bis zu den Helligkeiten ausdehnen, die dem Maximum der Klarheit nahe kommen, weil da innerhalb großer Breite der Lichtstärken die Klarheit dieselbe bleibt. Und in noch höheren Helligkeiten würde die Klarheit wieder abnehmen.

Wir können also in diesen Gebieten bei unserer Erklärung wenigstens für große Helligkeiten ein hinzukommendes neues Empfindungselement, den Lichtschmerz, nicht entbehren. Andererseits wäre die Annahme zur Zeit nicht zu widerlegen, daß dieses andere Empfindungselement auch bei den niederen Lichtstärken nicht ganz fehlte, und, wenn auch nicht deutlich unterscheidbar, doch in dem Gesamteindruck des Auges mitwirkte. Sollte eine zweckmäßige Regulirung der Pupillenweite davon abhängen, so würde es, wie schon oben bemerkt, für blaues Licht die Pupille stärker verengen, als für rothes, d. h. diese Empfindung der regulirenden Innervation, welche mit der der Helligkeit zusammenfiel, müßte PURKINJE's Phänomen hervorrufen.

Im Augenblick würde es mir verfrüht erscheinen, zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden zu wollen.

E. BRÜCKES oben auf S. 422 erwähntes heterochromes Photometer, in welchem der Unterschied zweier Farben dadurch verkleinert werden soll, daß man die scheinbare Größe der gefärbten kleinen Felder immer kleiner macht, und nun untersucht, bei welchem Grade der Beleuchtung die Zeichnung am ehesten verschwindet, führt bei der Anwendung auf sehr differente Farben eigenthümliche Schwierigkeiten durch die Farbenzerstreuung im Auge herbei. Eine von zwei Farben sehr differenter Brechbarkeit erscheint immer in Zerstreuungsbildern und breitet ihr Licht auch auf die anders gefärbten Felder aus. Von zwei nahehin gleich hellen Farben erscheint deshalb die schärfer gesehene heller, und je nach der Accommodation konnte ich in einem System gleichbreiter rother und blauer Streifen bald die rothen, bald die blauen heller sehen. Genau die mittlere Accommodation einzuhalten, bei der beide Farben gleiche Zerstreuungskreise geben, ist mir bei sehr feinen Streifen nicht gelungen.

Beziehungen zwischen Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit. Bei den bisher besprochenen Untersuchungen über die wahrnehmbaren Abstufungen der Empfindungen hat man nur Helligkeitsabstufungen von Farben berücksichtigt, deren physikalische Qualität unverändert blieb. Aber dieselbe Fähigkeit des Auges, welche uns dies möglich macht, muß uns nach TH. YOUNG's Hypothese auch in den Stand setzen den Unterschied zwischen zwei ungleich gemischten Farben zu erkennen, indem sie uns lehrt, daß verschiedene Quanta der Grundfarben in

beiden stecken. Wenn die eine Farbe mehr Roth enthält, die andere mehr Blau, und die Empfindungen dieses Roth und Blau elementare, neben einander coexistirende Empfindungen sind: so würde der Unterschied des Farbentons zwei gleich heller Mengen dieser Farben constatirt sein, sobald wir eben erkennen können, daß solche Unterschiede des Gehalts an Urfarben zwischen beiden vorhanden sind.

Es entsteht also die Frage: Können wir die Unterscheidung der verschiedenen Farbtöne auf die Unterscheidung der Intensitätsabstufungen der drei Urfarben in den verglichenen Farben begründen? Zeigt sich dabei derselbe Grad von Empfindlichkeit wie für Helligkeitsstufen, oder etwa ein größerer oder kleinerer?

Es tritt dabei nur eine neue Complication dadurch ein, daß mindestens zwei, unter Umständen auch drei verschiedenartige Empfindungsunterschiede gleichzeitig vorkommen und zusammenwirken, um die beiden Felder unterscheidbar zu machen. Über die Art dieses Zusammenwirkens gleichzeitiger Empfindungsunterschiede verschiedener Art können wir nun nur eine wahrscheinliche Hypothese zu finden suchen und deren Berechtigung an ihren Resultaten prüfen.

Nennen wir  $dE_1$ ,  $dE_2$ ,  $dE_3$  die Größe (Deutlichkeit) der Empfindungsunterschiede für die Elementarempfindungen, und  $dE$  die Deutlichkeit des resultirenden Unterschiedes, so ist zunächst klar, daß  $dE$  nicht verschwinden kann, wenn nicht gleichzeitig:

$$dE_1 = dE_2 = dE_3 = 0.$$

Denn wenn auch nur eine dieser Größen von Null verschieden ist, wird ein Unterschied der beiden Felder wahrnehmbar sein, der durch keine Combination mit qualitativ unterschiedenen anderen Empfindungen ausgeglichen werden kann.

Die einfachste Form der Functionen, welche diese Eigenschaft haben, ist diejenige, wo  $dE$  eine nothwendig immer positive homogene Function zweiten Grades von den Größen  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  ist.

Da wir hier übrigens nur mit verschwindend kleinen Unterschieden zu thun haben, werden wir Glieder höherer Ordnung der kleinen Größen nicht zu berücksichtigen haben.

Wenn wir nun, im Sinne der Youngschen Theorie weitergehend, voraussetzen, daß hierbei nur die Bewußtseinsacte sich verbinden und gegenseitig verstärken, indem ein objectiver Unterschied derselben Felder durch zwei oder drei von einander unabhängige und verschiedenartige Eindrücke angezeigt wird, so werden wir aus der oben bezeichneten Function zweiten Grades die Producte der  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  wegzulassen haben. Deren Existenz würde nämlich anzeigen, daß die Art und Richtung der physiologischen Reize Einfluss auf die Endwirkung hätte, da je zwei der Producte ihr Vorzeichen ändern würden, wenn eine der Größen  $dE_1$  dasselbe änderte. Unsere jetzt festgehaltene Hypothese bezweckt im Gegentheil, auszudrücken, daß es

bei der gegenseitigen Unterstützung dieser Eindrücke nur auf die Existenz und den Grad der Einwirkung auf die Aufmerksamkeit ankommt. Dies beschränkt uns also auf die Annahme

$$dE^2 = dE_1^2 + dE_2^2 + dE_3^2 + \dots \dots \dots \} +$$

Die Coëfficienten müssen gleich Eins gesetzt werden, da, wenn zwei der drei Größen rechts gleich Null gesetzt werden,  $dE$  der Dritten gleich werden muß.

Ich bemerke bei dieser Formel, daß sie anzeigt,  $dE$  könne über die Schwelle treten, auch wenn  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  etwas darunter sind, (jede einzelne aber  $> V^{1/3} = 0,57735$  vom Schwellenwerth). Wenn aber die Werthe der drei Variablen sehr verschieden werden, verliert sich der Einfluß der kleineren auf das Resultat mehr und mehr, da die Quadrate kleiner ächter Brüche noch kleinere ächte Brüche sind.

Allgemeinerer Ausdruck für FECHNERS Gesetz. Wir haben nunmehr die Größen  $dE_1$ ,  $dE_2$ ,  $dE_3$  durch ihre ihnen nach FECHNERS Gesetz zukommenden Werthe zu ersetzen. Da es für viele Fälle genügt, den einfachsten und ältesten Ausdruck dieses Gesetzes einzusetzen, in anderen wünschenswerth wird, etwas weitergehende Annäherungen zu erreichen, so setze ich

$$\left. \begin{aligned} dE_1 &= X \cdot \frac{dx}{x} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz} \dots \dots \dots \\ dE_2 &= Y \cdot \frac{dy}{y} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz} \dots \dots \dots \\ dE_3 &= Z \cdot \frac{dz}{z} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz} \dots \dots \dots \end{aligned} \right\} 4a$$

Die Größen  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  sollen Functionen von  $x$ ,  $y$ ,  $z$  bedeuten, von denen wir wissen, daß sie bei hohen Werthen der Lichtstärken  $x$ ,  $y$ ,  $z$  nahin constant werden. Der letzte Factor in jeder Reihe bezeichnet den Einfluß der Blendung, entsprechend dem auf S. 412 in Gleichung 3 gebrauchten Factor  $\frac{1}{1 + \epsilon r}$ . Nur war dieser Blendungsfactor hier in anderer Weise zu gestalten, da nach den Versuchen von A. KÖNIG und E. BRODHUN die Dämpfung für die verschiedenen Spectralfarben von dem Maximum ihrer Stufenempfindlichkeit ab für alle gleichmäÙig nahehin in demselben Verhältnisse wächst, und der betreffende Factor also gleiche Form für alle Farben haben muß. Daß ein solcher gemeinsamer Grad der Dämpfung möglich ist durch intensive Verzehrung des arteriellen Sauerstoffs habe ich schon oben erörtert. Da nach den genannten Beobachtern gleicher Grad der Dämpfung mit gleicher Helligkeit zusammenfällt, so würde  $(lx + my + nz)$  auch eine GröÙe sein, die bei hohen Helligkeiten Function der Helligkeit ist.

Übrigens ist hier wie oben zu bemerken, daß dieser Factor nur für kleine Grade der Blendung den Gang der Function ausdrücken soll.



Gesetz der Intensitätsabstufungen für verschiedene Farben  
abgeleitet.

Wenn wir eine zusammengesetzte Farbe nur in ihrer Lichtstärke ändern,  
und wir alle ihre Bestandtheile um denselben Bruchtheil  $d\epsilon$ , und wir haben  
setzen:

$$dx = x \cdot d\epsilon, \quad dy = y \cdot d\epsilon, \quad dz = z \cdot d\epsilon.$$

ann wird nach unserer Hypothese

$$dE = \frac{d\epsilon}{1 + lx + my + nz} \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \dots\dots\dots \} 5$$

für große Intensitäten, wo, wie bemerkt,

$$X = Y = Z = k$$

onstanten  $k$  gleich werden, erhalten wir

$$dE = \frac{k \cdot d\epsilon}{1 + lx + my + nz} \sqrt{3} \dots\dots\dots \} 5a$$

n Beobachtungen über den gleichmäßigen Gang der Größe  $E$  bei allen Farben  
ne Lichtstärken entspricht.

für mäßigere Lichtstärken können wir in erster Annäherung setzen

$$X = \frac{kx}{A + x}, \quad Y = \frac{ky}{B + y}, \quad Z = \frac{kz}{C + z}$$

$B, C$  die Constanten bezeichnen, welche wir oben als die mittleren Werthe  
undfarben des Eigenlichts gedeutet haben.

unter dieser Voraussetzung wird

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = k \sqrt{\left(\frac{x}{A + x}\right)^2 + \left(\frac{y}{B + y}\right)^2 + \left(\frac{z}{C + z}\right)^2} \} 5b$$

Die drei Brüche, die unter dem Wurzelzeichen addirt sind, können jeder für  
von Null bis  $+1$  steigen. Der höchste Werth der Wurzelgröße, welcher  
wenn alle drei Grundfarben hell genug in der Mischfarbe sind, um den  
des Eigenlichts unmerklich zu machen, giebt

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = k \sqrt{3} = k \cdot (1,7320) \dots\dots\dots \} 5c$$

gegen wird die Größe

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2},$$

als Factor in dem oben gegebenen Ausdruck für das Maß der Empfindlich-  
erkennt, kleiner werden für geringere Lichtstärken einzelner oder aller



Grundfarben, und zwar wird der Werth dieses Factors am meisten beeinträchtigt werden, wenn die größeren unter den Werthen  $x, y, z$  auch durch die größeren unter den Werthen  $A, B, C$  dividirt werden. Der kleinste unter den drei letzteren Werthen  $C$  gehört dem Blau  $z$  an, während Roth und Grün nahe gleiche größere Werthe  $A, B$  zu haben scheinen. Dem entspricht die größere Stufenempfindlichkeit bei den lichtschwachen blauen Farben, die also auch von unsrer Formel angezeigt wird.

#### Ähnlichste Farben.

Wenn wir zwei sehr wenig verschiedene Farben haben, von denen der einen die Farbenwerthe der Grundfarben  $x, y, z$ , der anderen  $x + dx, y + dy$  und  $z + dz$  zukommen, und wir die erstere in ihrer Intensität um den Bruchtheil  $\varepsilon$  vermehren, so sind die Unterschiede in den Bestandtheilen der so vermehrten ersten und der zweiten Farbe  $(dx - \varepsilon x)$ ,  $(dy - \varepsilon y)$  und  $(dz - \varepsilon z)$ . Die Empfindung ihres Unterschiedes wird also nach unserer Hypothese:

$$dE = \sqrt{X^2 \left( \frac{dx - \varepsilon x}{x} \right)^2 + Y^2 \left( \frac{dy - \varepsilon y}{y} \right)^2 + Z^2 \left( \frac{dz - \varepsilon z}{z} \right)^2} \quad \} \quad 6$$

Wenn wir nun  $\varepsilon$  so bestimmen wollen, daß  $dE$  ein Minimum werde, ist zu setzen

$$\frac{\partial (dE^2)}{\partial \varepsilon} = 0 \quad \dots \dots \dots \} \quad 6a$$

Dies giebt

$$-2 X^2 \frac{(dx - \varepsilon x)}{x} - 2 Y^2 \frac{dy - \varepsilon y}{y} - 2 Z^2 \frac{dz - \varepsilon z}{z} = 0$$

oder

$$\varepsilon \left[ X^2 + Y^2 + Z^2 \right] = X^2 \frac{dx}{x} + Y^2 \frac{dy}{y} + Z^2 \frac{dz}{z} \dots \dots \} \quad 6b$$

Der Werth von  $dE$  findet sich unter diesen Umständen

$$dE^2 = \left\{ X^2 \left( \frac{dx}{x} \right)^2 + Y^2 \left( \frac{dy}{y} \right)^2 + Z^2 \left( \frac{dz}{z} \right)^2 \right\} - \varepsilon \left\{ X^2 \frac{dx}{x} + Y^2 \frac{dy}{y} + Z^2 \frac{dz}{z} \right\} \quad 6c$$

Wenn wir den Werth von  $\varepsilon$  aus Gleichung (6 b) einsetzen, giebt dies

$$dE^2 = \frac{X^2 \cdot Y^2 \left( \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right)^2 + Y^2 \cdot Z^2 \left( \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z} \right)^2 + Z^2 \cdot X^2 \left( \frac{dz}{z} - \frac{dx}{x} \right)^2}{X^2 + Y^2 + Z^2} \dots \} \quad 6d$$

Für den Fall, daß alle drei Farben hell genug sind, um  $X = Y = Z = k$  setzen zu können, giebt dies

$$dE^2 = \frac{k^2}{3} \left[ \left( d \log n. \frac{x}{y} \right)^2 + \left( d \log n. \frac{y}{z} \right)^2 + \left( d \log n. \frac{z}{x} \right)^2 \right] \dots \} \quad 6e$$

Dieser Ausdruck ist unabhängig von dem Maafs, in welchem die Quanta  $x$ ,  $y$ ,  $z$  gemessen sind. Die vorausgehende Gleichung (6d) setzt nur voraus, dafs beziehlich  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  in denselben Maafsen wie  $x$ ,  $y$ ,  $z$  ausgedrückt sind.

Die Gleichung (6d) beziehlich (6e) würde die Gröfse des Farbenunterschiedes ausdrücken zwischen zwei Farben von verschiedenem Farbenton, die man durch passende Regulirung ihrer Helligkeit einander möglichst ähnlich gemacht hat.

Es liegen nun Beobachtungen an Spectralfarben, angestellt von den Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN, vor, welche die nöthigen Data liefern, um die hier aufgestellte Formel mit Beobachtungen zu vergleichen. Die genannten beiden Herren hatten, wie schon früher angeführt, ein System von Messungen über die Resultate der Mischungen von Spectralfarben angestellt, aus denen sich die Zusammensetzung dieser aus drei passend gewählten Grundfarben, die sie mit  $R$ ,  $G$ ,  $V$  bezeichneten, berechnen liefs (S. 337—371. Zahlenangaben folgen weiter unten). Aus diesen lassen sich die Differenzen der Grundfarben berechnen, die zwei dicht neben einander liegenden Spectralfarben entsprechen. Außerdem haben dieselben Beobachter eine Reihe von Messungen der Empfindlichkeit des Auges für die Farbenunterschiede neben einander liegender Spectralfarben angestellt.<sup>1</sup> Sie haben dies so ausgeführt, dafs beide Felder meines Farbenmischapparats für Spectralfarben ähnliche Farben zeigten und der Beobachter sie dann auf Farbengleichheit einzustellen suchte. Der Fehler der Einstellung nach Wellenlängen berechnet, wurde notirt, und aus je 50 Einstellungsversuchen der mittlere Fehler berechnet.

Ich benutze hierbei nur diese letzten Beobachtungsreihen der genannten Beobachter, weil die früheren, welche Herr A. KÖNIG zusammen mit Herrn C. DIETERICI angestellt hat<sup>2</sup> nicht mit derselben Sorgfalt gegen den Einfluß von Helligkeitsunterschiede der verglichenen Farben geschützt waren.

Abgesehen von der oben schon erwähnten Aufgabe, die Empfindlichkeit gegen Helligkeitsunterschiede mit der gegen Farbenunterschiede zu vergleichen, würde die von mir formulierte hypothetische Erweiterung des psychophysischen Gesetzes, wenn sie sich durchgängig bewährt. Eines für die Theorie der Farbenempfindungen leisten können, wozu bisher noch gar kein sicherer Anhalt gegeben war, nämlich die Feststellung der wirklichen drei physiologisch einfachen Farbenempfindungen.<sup>3</sup>

Wir haben gesehen, dafs NEWTONS Farbenmischungsgesetz die ganze Mannigfaltigkeit der möglichen Farbenempfindungen zwar auf drei neben einander bestehende Erregungsweisen des Sehnervenapparates zurückzuführen erlaubt, aber ganz oder fast ganz unbestimmt läfst, welche Farbenempfindungen diesen drei elementaren Erregungen entsprechen. Denken wir uns nach NEWTONS Regel die Spectralfarben und ihre Mischungen in eine Farbentafel eingetragen, so würden die Orte der drei Grundfarben in der YOUNGSCHE Theorie nur der einzigen Beschränkung unterliegen, dafs das zwischen ihnen construirte Dreieck sämtliche Spectralfarben in sich fassen mufs; wenn wir dagegen mit Hrn. E. HERING negative Erregungswerthe zulassen wollten, würden gar keine Beschränkungen in der Wahl der drei Urempfindungen gegeben sein.

<sup>1</sup> E. BRODHUN, *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*. Bd. III. S. 89. 1892 und *Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin* 1885—1886. No. 17 u. 18.

<sup>2</sup> A. KÖNIG und C. DIETERICI, *Wied. Annalen d. Physik*, XXII. S. 579. 1884 und *Grüters' Archiv für Ophthalmologie*. Bd. 30. (2.) S. 171. 1884.

<sup>3</sup> Diese Untersuchung ist kürzlich veröffentlicht in *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*. Bd. II. S. 1—30. Bd. III. S. 1—20.

Dieses Problem erschien mir wichtig genug, um seine Lösung, so gut es eben mit den bisher vorliegenden, in vieler Beziehung unzureichenden Beobachtungen angeht, zu versuchen, auch wenn man nur hoffen durfte, eine vorläufige angenäherte Lösung zu erhalten. Gleichzeitig wird sich ja dabei zeigen müssen, ob auch die Beobachtungen über die Farbenempfindlichkeit des trichromatischen Auges sich so weit unserer psychophysischen Hypothese fügen, als es bei den bestehenden Fehlergrenzen der Beobachtungen zu erwarten ist.

In letzterer Beziehung erinnere ich hier zunächst an die zur Zeit noch bestehenden Unzulänglichkeiten der Beobachtungen. Große Genauigkeit ist überhaupt bei allen Messungen der Grenze, wo irgend eine Erscheinung noch wahrnehmbar ist, ehe sie ganz verschwindet, der Regel nach nicht zu erreichen. Hier handelt es sich um die Wahrnehmung des Farbenunterschiedes benachbarter Spektralfarben. Dabei, wie in fast allen ähnlichen Fällen, spielen allerlei uncontrollirbare Abänderungen in dem Zustande unserer Nervenapparate und psychischen Thätigkeiten mit, welche sich schliesslich in dem abweichenden Gange der Messungsergebnisse zu erkennen geben.

Die Vergleichen des Farbentons sind zwar in den letzten Messungsreihen der Hrn. A. KÖNIG und E. BRODHUN<sup>1</sup> mit gleich hell erscheinenden Farben durchgeführt worden, und wir dürfen wohl annehmen, daß die beiden Beobachter sich zu diesem Zwecke die günstigsten Helligkeiten herzustellen gesucht haben. Solche würden in den Gültigkeitsbereich des normalen FECHNERSchen Gesetzes fallen, wo die wahrnehmbaren Helligkeitsstufen der absoluten Lichtstärke proportional sind. Aber selbst, wenn sie dies für die sämtlichen Spektralfarben haben einhalten können, ist es fraglich, ob nicht Abweichungen von dieser einfachsten Form des FECHNERSchen Gesetzes da eintreten konnten, wo einer oder zwei der elementaren Farbeindrücke in der Gesamtfarbe sehr schwach vertreten waren, z. B. bei sehr gesättigten Farben, deren schwache andersfarbige Einmischungen den Farbenunterschied bedingen. Hier konnten sich solche Abweichungen von dem genannten Gesetz geltend machen, wie sie bei geringen Helligkeiten eintreten. In der That werden wir Abweichungen dieser Art zwischen Rechnung und Beobachtung begegnen. Wären Angaben über die absoluten Lichtstärken der verglichenen farbigen Felder gegeben worden, so würden wir die von dem genannten Umstand bedingte gröfsere Unempfindlichkeit gegen die betreffenden Farbenunterschiede berechnen können; sehr grofs können allerdings diese Abweichungen unter den Verhältnissen des Farbedreiecks, die wir finden werden, nicht sein, da fast alle Spektralfarben sich als stark gemischt aus den Grundfarben ergeben werden.

Die Zahlenwerthe, welche die thatsächliche Unterlage für die bezeichnete Rechnung bilden, sind bei verschiedenen, von einander unabhängigen Untersuchungen gewonnen worden, die ohne Rücksicht auf den gegenwärtig vorliegenden Zweck durchgeführt wurden. Wäre Letzteres der Fall gewesen, so hätten einige Erleichterungen der Rechnung und eine wesentliche Sicherung ihrer Genauigkeit erreicht werden können. Namentlich wird die Rechnung erschwert und die Genauigkeit der Ergebnisse dadurch erheblich beeinträchtigt, daß einerseits die Bestimmungen der Mischungsverhältnisse der Farben und die Bestimmungen der Sehschärfe für Farbenunterschiede andererseits nicht durchgängig für dieselben Wellenlängen gemacht sind.

<sup>1</sup> E. BRODHUN, *Verhandl. der physiol. Gesellschaft zu Berlin*, 1885–1886. No. 17 u. 18. — Eine ausführlichere Mittheilung über diese Beobachtungsreihen in *Zeitschrift f. Psychologie und Physiologie der Sinneorgane*. Bd. III. S. 89. 1892.

den für die Mischungsverhältnisse, die in der Rechnung gebraucht werden, von durch Interpolation gefunden werden mußten. Vollends konnten die gebrauchten Werthe der nach den Wellenlängen genommenen Differenzen der Farbenwerthe im Spectrum überhaupt nur durch Interpolation gefunden, und gerade an einigen Stellen, wo diese Differentialquotienten schnell ändern, wären engere Intervalle für die Beobachtungen höchst nützlich gewesen.

von Hrn. A. KÖNIG gefundenen Zahlen, welche selbst schon die Umkehrung dem prismatischen Spectrum des Gaslichtes auf das Interferenz-Sonnenlichtes mit Hülfe einer empirischen Formel erlitten hatten, kleine Unregelmäßigkeiten der nach ihnen construirten Intensitäts-elementarfarben erkennen ließen, schien es am besten, eine graphische Methode zu Grunde zu legen, wie eine solche übrigens der genannte Autor in seiner Arbeit und C. DIETERICI veröffentlichten Curven selbst angewendet hat. Die Methode ist von Hrn. Dr. SELL, der den größten Theil der höchst langwierigen durchgeföhrt hat, gemacht worden, und zwar zu einer Zeit, wo ich noch nicht übersehen konnte, welchen Einfluß auf die erhofften Resultate die Föhrtung der Curve haben würde.

Wellenlängen lagen ausreichende Beobachtungen vor. Wenn man anfangs durchgängig die einfache erste Form des FECHNERSchen Gesetzes betrachtet werden durfte, waren sechs Parameter zu suchen, mit denen für alle diese Wellenlängen nahehin gleiche Werthe für das Maas der Empfindlichkeit des Auges hätten ergeben müssen. Die Gleichungen, aus denen die Parameter gefunden werden mußten, waren sechsten Grades nach jedem von ihnen, durch allmähliche Annäherungsrechnungen lösbar. Es ließen sich über den Sinn der Änderungen der Werthe der Empfindlichkeit für verschiedene Wellenlängen bei Änderungen der einzelnen Parameter finden, welche für die Rechnung dienen konnten.

Die Rechnung konnte schließlich überhaupt nur so weit fortgesetzt werden, bis die kleinsten Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung keinen mehr erkennen ließen, oder wenigstens keinen, der sich nicht durch bekannten Abweichungen vom FECHNERSchen Gesetze hätte erklären lassen. Diese Arbeit, welche es gemacht hätte, die Differenzen durch Rechnung zu beseitigen, wurde nicht gemacht.

Methode der kleinsten Quadrate noch zu verkleinern, schien der ungenügenden Genauigkeit der zu Grunde liegenden Beobachtungen zukünftig unschwer werden verbessert werden können, nicht gerechtfertigt.

Untersuchung einen Zusammenhang nachzuweisen sucht zwischen der Empfindlichkeit und der Wellenlänge, ein solcher bisher durchaus nicht bekannt war, und die, wenn die gesetzte Abhängigkeit oder eine analoge zwischen ihnen nicht besteht, im Verhältnisse von 1 : 100 oder 1 : 1000 hätten stehen können, annähernd gleich zu sein, so wird es immerhin als ein vorzuziehendes zu betrachten sein, wenn dieselben, trotz aller besprochenen Unvollkommenheiten, nur im Verhältnisse von 1 : 1.5 von ihrem Mittelwerthe abweichen.

Für die durchzuföhrende Rechnung begnügen wir uns mit der einfachsten Form des FECHNERSchen Gesetzes, in dem wir die oben mit X, Y, Z bezeichneten Blendungsfactoren alle gleich Eins setzen; wir setzen also

$$\left. \begin{aligned} dE_1 &= k \cdot \frac{dx}{x} \\ dE_2 &= k \cdot \frac{dy}{y} \dots\dots\dots \\ dE_3 &= k \cdot \frac{dz}{z} \end{aligned} \right\} 7$$

Es ergibt sich also

$$dE = k \cdot \sqrt{\left(\frac{dx}{x}\right)^2 + \left(\frac{dy}{y}\right)^2 + \left(\frac{dz}{z}\right)^2} \dots\dots\dots \} 7a$$

Um die Wahrnehmbarkeit der Farbenabstufungen auf die der Helligkeitsabstufungen zurückzuführen, wenden wir diese Gleichung zunächst auf den Fall an, wo nur die Lichtstärken zweier Farben gleicher Qualität verglichen werden, also die Intensitäten aller drei Grundfarben in der einen Lichtmenge die in der anderen um einen gleichen Bruchtheil übertreffen. Wir setzen daher

$$dx = \varepsilon \cdot x, \quad dy = \varepsilon \cdot y, \quad dz = \varepsilon \cdot z,$$

worin  $\varepsilon$  einen kleinen ächten Bruch bezeichnet. Dies ergibt wie in (5c)

$$dE = k \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{3} = k \cdot \varepsilon \cdot 1,7320 \dots\dots\dots \} 8$$

Der Werth von  $k$  ist, je nach der Methode der Beobachtung, verschieden groß zu nehmen. Der aus den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung hergeleitete theoretische Werth von  $k$  bei solchen Beobachtungen, wo man  $\varepsilon$  als den mittleren Fehler bestimmt hat, ist 1,8238 mal so groß zu nehmen, als wenn  $\varepsilon$  den kleinsten Fehler bedeutet, den man in 10 Fällen immer noch wahrnehmen konnte.

Ersteres ist bei KÖNIGS und BRODHUNS Messungen der Empfindlichkeit für Farbenunterschiede, letzteres bei denen der beiden genannten Beobachter für Helligkeitsstufen geschehen.

In einer Arbeit von Hrn. UETHOFF<sup>1</sup> ist dieses Verhältniß empirisch bestimmt. Es schwankt zwischen den Werthen 1,25 und 2,44 und beträgt im Mittel 2,025, was mit der theoretischen Ableitung des Werthes ausreichend stimmt.

Bestimmung ähnlichster Farbenpaare. Die oben gegebene Gleichung (6e) ergibt, wenn wir die angeführten Vereinfachungen vornehmen, den Werth des Empfindungsunterschieds wenn er durch passende Regelung der Lichtstärke auf sein Minimum gebracht ist.

$$\frac{dE^2}{k^2} = \frac{1}{3} \left\{ \left( \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right)^2 + \left( \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z} \right)^2 + \left( \frac{dz}{z} - \frac{dx}{x} \right)^2 \right\} \dots\dots \} 8a$$

<sup>1</sup> W. UETHOFF, Über die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne im Spectrum. *Gräfe's Archiv*. Bd. XXXIV. (4). S. 1. 1888.



Wenn wir mit  $d\lambda$  den durch die Beobachtungen gefundenen mittleren Fehler der Wellenlänge  $\lambda$  bezeichnen

$$\frac{d\lambda}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda} - \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{d\lambda} - \frac{1}{z} \cdot \frac{dz}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{z} \cdot \frac{dz}{d\lambda} - \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}\right)^2} \quad 8b$$

$x, y, z$  hängen nun mit den Elementarfarben  $R, G, V$ , welche zur Angabe der Werthes der verschiedenen Spectralfarben von den Hrn. A. KÖNIG und F. ERICI gebraucht sind, nach NEWTONS Gesetz durch lineare homogene Ausdrücke zusammen, deren Coefficienten aber zunächst noch unbekannt sind. Wenn wir diese Werthe mit

$$\left. \begin{aligned} x &= a_1 \cdot R + b_1 \cdot G + c_1 \cdot V \\ y &= a_2 \cdot R + b_2 \cdot G + c_2 \cdot V \dots\dots\dots \\ z &= a_3 \cdot R + b_3 \cdot G + c_3 \cdot V \end{aligned} \right\} 9$$

zunächst zu bemerken, daß je einem der Coefficienten in jeder Horizontalreihe ein willkürlicher Werth gegeben werden kann, da

$$\frac{dx}{x}, \frac{dy}{y} \text{ und } \frac{dz}{z}$$

die Werthe nicht ändern, wenn jeder der Größen  $x, y, z$  ein willkürlicher constant Factor hinzugefügt wird. Sonst ist die Wahl der Coefficienten im Sinne NEWTONS Theorie nur der einen Beschränkung unterworfen, daß die Werthe  $a, b, c$ , welche den Spectralfarben angehören, keine negativen Werthe von sich geben dürfen. Das wird nie der Fall sein können, wenn sämtliche Coefficienten  $a, b, c$  positive Werthe haben. Wenn aber negative Werthe vorkommen, so muß man prüfen müssen, ob alle Spectralfarben positive  $x, y, z$  ergeben. Grundsätzlich wird man von jedem System von Coefficienten der  $[x, y, z]$ , was einer bestimmten Bedingung Genüge leistet, zu anderen der  $[x_1, y_1, z_1]$  übergehen können, indem man setzt

$$x_1 = x + fy + gz \\ \text{etc.}$$

Wenn die  $f$  und  $g$  positiv sind, wird auch das neue System für die Spectralfarben keine negativen Werthe ergeben.

Es kommt nun zunächst darauf an, sechs Verhältnisse der Constanten in den Gleichungen 9 so zu bestimmen, daß die Werthe von  $dE$  aus den Gleichungen 8b so weit als möglich gleich werden. Dann würde nachher der berechnete Grad der Empfindlichkeit zu vergleichen sein mit dem, der für Helligkeitsunterschiede aus der Gleichung 8 gefunden ist.

Die Werthe der Constanten, die uns bis jetzt in unseren Berechnungsversuchen zu genügen schienen, waren

$$\left. \begin{aligned} x &= 0,7964 \cdot R - 0,3515 \cdot G + 0,555 \cdot V \dots\dots\dots \\ y &= 0,2612 \cdot R + 0,3483 \cdot G + 0,3930 \cdot V \dots\dots\dots \\ s &= 0,250 \cdot R + 0,125 \cdot G + 0,625 \cdot V \dots\dots\dots \end{aligned} \right\} 9a$$

Die im Folgenden angegebenen Werthe der Differentialquotienten

$$/ \quad \frac{dR}{d\lambda}, \quad \frac{dG}{d\lambda}, \quad \frac{dV}{d\lambda},$$

sowie auch einige der Werthe von  $R$ ,  $G$ ,  $V$  wurden, wie oben bemerkt, durch graphische Interpolation theils gefunden, theils ausgeglichen.

Die  $\delta\lambda$  sind die von KÖNIG gefundenen mittleren Fehler, welche in je fünfzig Versuchen, das Spectrometer auf gleiche Farben einzustellen, begangen wurden.

Tafel I.  
Data für die Rechnung

Wellenlänge	$R$	$G$	$V$	$\frac{dR}{d\lambda}$	$\frac{dG}{d\lambda}$	$\frac{dV}{d\lambda}$	$\delta\lambda$
640 $\mu\mu$	2,66	0,22	0	— 0,116	— 0,023	0	2,37 $\mu\mu$
630 "	3,95	0,54	0	— 0,129	— 0,044	0	1,35 "
620 "	5,35	1,12	0	— 0,160	— 0,078	0	0,67 "
610 "	6,60	2,17	0	— 0,107	— 0,123	0	0,55 "
600 "	7,51	3,60	0	— 0,081	— 0,165	0	0,45 "
590 "	8,27	5,48	0	— 0,067	— 0,208	0	0,42 "
580 "	8,90	7,65	0	— 0,055	— 0,200	0	0,38 "
570 "	9,37	9,98	0	— 0,039	— 0,199	0	0,51 "
560 "	9,56	11,45	0,22	0	— 0,100	0	0,58 "
550 "	9,21	12,00	0,3	+ 0,068	0	— 0,0138	0,77 "
540 "	8,30	11,55	0,49	+ 0,121	+ 0,083	— 0,0233	0,80 "
530 "	6,54	10,36	0,75	+ 0,202	+ 0,139	— 0,0326	0,77 "
520 "	4,62	8,45	1,10	+ 0,171	+ 0,228	— 0,0400	0,71 "
510 "	3,0	5,75	1,55	+ 0,162	+ 0,271	— 0,0536	0,64 "
500 "	1,50	3,32	2,2	+ 0,114	+ 0,168	— 0,0887	0,35 "
490 "	0,78	2,24	3,6	+ 0,051	+ 0,059	— 0,208	0,31 "
480 "	0,4	1,88	7,9	+ 0,043	+ 0,028	— 0,52	0,38 "

Dies sind die durch die Beobachtungen gegebenen Grundlagen der Rechnung. Die folgende Tafel II. giebt die Ergebnisse der Rechnung.




Tafel II.

$x$	$y$	$z$	$\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}$	$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{d\lambda}$	$\frac{1}{z} \cdot \frac{dz}{d\lambda}$	$dE$
2,05	0,73	0,69	— 0,0413	— 0,0496	— 0,0455	(0,0263)
2,98	1,18	1,10	— 0,0294	— 0,0402	— 0,0346	0,0196
3,88	1,70	1,47	— 0,0261	— 0,0391	— 0,0359	0,0120
4,52	2,38	1,92	— 0,0094	— 0,0298	— 0,0221	0,0151
4,75	3,10	2,32	— 0,0014	— 0,0250	— 0,0175	0,0146
4,68	3,95	2,76	+ 0,0043	— 0,0226	— 0,0156	0,0158
4,43	4,86	3,18	+ 0,0060	— 0,0171	— 0,0122	0,0125
3,99	5,79	3,59	+ 0,0098	— 0,0136	— 0,0097	0,0173
3,77	6,43	3,96	+ 0,0093	— 0,0054	— 0,0032	0,0125
3,31	6,47	3,99	+ 0,0142	+ 0,0017	+ 0,0021	0,0146
2,86	6,26	3,82	+ 0,0210	+ 0,0078	+ 0,0064	0,0173
2,00	5,51	3,40	+ 0,0469	+ 0,0155	+ 0,0140	(0,0389)
1,37	4,51	2,90	+ 0,0196	+ 0,0300	+ 0,0159	0,0138
1,24	3,31	2,44	+ 0,0043	+ 0,0338	+ 0,0167	(0,0253)
1,33	2,38	2,16	— 0,0129	+ 0,0219	— 0,0027	0,0169
1,83	2,38	2,72	— 0,0287	— 0,0202	— 0,0404	0,0133
4,04	3,86	5,27	— 0,1028	— 0,0725	— 0,0877	0,0141

Mittel: 0,0176

Fig. 175.



um eine anschauliche Übersicht über die bisher erreichte Übereinstimmung  
 en Beobachtung und Theorie zu geben, habe ich in Fig. 175 die Werthe

des  $\delta\lambda$  dargestellt, wie sie KÖNIGS letzte Beobachtungen ergeben haben. Diese sind durch die ausgezogene Curve verbunden. Die punctirte Curve dagegen giebt die Werthe von  $\delta\lambda$ , wie sie nach der Theorie sein müßten, um ein constantes  $dE$  bei den gemachten Annahmen über die Grundfarben zu erreichen. Man sieht, daß eine ziemlich ähnlich verlaufende Curve, wie die der beobachteten Werthe, durch die gegebene Theorie erreicht werden kann. Auch würden weitere Verbesserungen der Constanten  $a, b, c$  wohl noch merklich bessere Übereinstimmung haben erreichen lassen, als es bisher gelungen ist. Die auffallendste Abweichung ist bei  $\lambda = 530 \mu\mu$ , wo ein einzelner ganz kleiner Werth von  $\delta\lambda$ , in *Fig. 175* mit  $p$  bezeichnet (bezüglich großer Werth von  $dE$ ), mitten zwischen solchen erscheint, die dem dort bestehenden Maximum von  $\delta\lambda$  entsprechen. Es liegt diese Stelle im Grün nahe bei der Linie  $E$ , und dort mußte ein besonders weites Intervall (von  $\lambda = 536 \mu\mu$  bis  $516,5 \mu\mu$ ) durch Interpolation ausgefüllt werden, wodurch die Werthe der Differentialquotienten an jener Stelle erheblich unsicher werden. Der hier vorliegende jähe Sprung zwischen den drei benachbarten Werthen läßt sich durch keine Combination der Constanten  $a, b, c$  beseitigen. Es ist hauptsächlich das Glied  $\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}\right)$ , was hier die Abweichung verursacht, und diese wird um so größer, da  $x$  hier einem Minimum ganz nahe ist und das  $x$  im Nenner deshalb sehr klein ausfällt.

Übrigens könnte es wohl sein, daß eine der Curven der Farbenwerthe der Spectralfarben eine Ecke hätte mit plötzlicher Änderung des Differentialquotienten. Unsere Interpolationsrechnungen, die von der Annahme einer continuirlichen Krümmung der Curven ausgehen, müssen an einer solchen Stelle irre führen.

Sonst ist noch zu bemerken, daß überall, wo die Lichtstärke einer der drei Farben gegen die anderen sehr zurücktritt, die verminderte Empfindlichkeit für die Unterschiedsschwellen schwachen Lichtes sich geltend macht. Dort wird, wenn nicht gleichzeitig der Differentialquotient nach  $\lambda$  sehr klein wird, zu erwarten sein, daß die Empfindlichkeit für die Farbenunterschiede in der Beobachtung sich geringer ( $\delta\lambda$  dagegen größer) zeigen wird, als sie der Theorie nach sein sollte. Das ist also außer bei der schon angegebenen Stelle zwischen  $530 \mu\mu$  und  $510 \mu\mu$ , wo das eingemischte Roth sehr schwach ist, auch für die grüne Elementarfarbe am rothen Ende des Spectrum der Fall, und dem entspricht hier die Abweichung der Curven voneinander, welche *Fig. 175* bei  $640 \mu\mu$  zeigt.

#### Die gefundenen Elementar- oder Urfarben.


Das Verhältniß der durch unsere Rechnung wenigstens provisorisch gefundenen Elementarfarben zu den Spectralfarben macht sich am besten in einem Farbendreieck anschaulich. Ein solches ist in *Fig. 176* construirt. Die Farbenwerthe der neuen Grundfarben sind einander gleich gesetzt und dieselben daher in den Ecken des gleichseitigen Dreiecks  $xyz$  angebracht, wobei nach den auf S. 454 gegebenen Werthen Weiß (nämlich das des Sonnenlichts) im Mittelpunkt des Dreiecks bei  $W$  liegt. Die Curve  $RGV$  entspricht der Reihe der Spectralfarben. Diese liegen alle ziemlich entfernt von den Ecken des Dreiecks, sind also, wie es schon die oben gegebenen Zahlenwerthe anzeigten, stark gemischt, auch die Endfarben Roth und Violett.

Das spectrale Roth würde nach den auf S. 454 angegebenen Werthen eine weißliche und ein wenig gelbliche Modification der Grundfarbe  $x$  sein; letztere also würde etwa ein höchst gesättigtes Carminroth darstellen. Das spectrale Violett

röthliche Abänderung der Urfarbe  $s$ , und diese letztere wäre dem Ultramarinblau im Farbenton zu vergleichen. Beide Farbenimmten demnach mit Hrn. E. HERINGS Vermuthungen. Endlich  $x = y$  im Farbenton der Stelle zwischen  $\lambda = 540 \mu\mu$  und  $560 \mu\mu$   $x = s$  ist; das wäre im gelblichen Grün, und zwar grüner, als Farbe des Violett, etwa dem Grün der Vegetation entsprechend.

Wölbung der Curve bei  $G$  entspricht dem spectralen Grün bei Linie  $E$ . Das ( $G$ ) außerhalb des Dreiecks bezeichnet das von C. DIETERICI ursprünglich als Grundfarbe für ihre Mischungs-

Fig. 176.



Grün  $G$ . Diese Farbe war übrigens auch schon außerhalb ihres der farbenblinden Augen construirten Farbendreiecks  $R, G, B$  gelegen. centrale Grün dem Rande des Farbendreiecks verhältnismäßig nahe eine unter den übrigen Farben, die im Farbenton der Mischung entsprechen, ziemlich hervortretende Farbensättigung. Die bei ortretende Unregelmäßigkeit der Empfindlichkeitscurve fällt gerade Krümmung der Farbencurve im Grün, was die Unsicherheit der Messungen und Interpolationen erklärlich machen mag. Ist diese Curve an, daß alle einfachen Farben die sämtlichen Nervelemente des trichromatischen Auges gleichzeitig und mit Intensitätsunterschieden erregen. Wenn wir also diese Erregungen mit dreier photochemisch zu verändernder Substanzen in der



Netzhaut hypothetisch zurückführen, so müssen wir schliessen, daß diese alle dre nahezu gleiche Grenzen der Lichtempfindlichkeit haben und nur untergeordnete Abweichungen von mäßigem Betrage im Gange der photochemischen Wirkung für die verschiedenen Wellenlängen zeigen. Ähnliche Abänderungen durch Zumischung anderer Substanzen, Substitutionen analoger Atomgruppen u. s. w. kommen ja auch bei anderen photochemisch veränderlichen Substanzen vor, wie sie in der Photographie gebraucht werden, z. B. bei den verschiedenen Haloidsalzen des Silbers.

#### Vergleich mit dichromatischen Augen.

Die hier gefundenen Grundfarben stimmen nicht mit denen überein, welche die Hrn. A. KÖNIG und C. DIETERICI aus der Vergleichung farbenblinder Augen mit normalsichtigen hergeleitet haben. Indessen liegt in den Thatsachen hierbei kein nothwendiger Widerspruch. Nur die besondere, von TH. YOUNG ausgegangene und von den meisten Bearbeitern der Theorie, auch von mir selbst, von E. HERING, A. KÖNIG, und C. DIETERICI früher angenommene Erklärungsweise, daß bei den Dichromaten einfach eine der Grunderregungen des trichromatischen Auges nicht zu Stande komme, tritt in Widerspruch mit dem bezeichneten Ergebniss. Aber es ist eine allgemeinere Hypothese über das Wesen der Dichromasie möglich, bei welcher die Nothwendigkeit aufhört, daß die fehlende Farbe eine der Grundfarben sei, und doch die Regel festgehalten wird, daß alle Farbenpaare, welche für das normale trichromatische Auge gleich aussehen, auch für das dichromatische gleich aussehend bleiben.

Um dies durch ein einfaches Beispiel anschaulich zu machen, nehme man an, daß die Lichteinwirkungen, welche sonst die Empfindung Grün erregen, die grünempfindenden Nerven nicht, wohl aber die roth- und blauempfindenden in bestimmtem festen Verhältniss erregen. Alle Empfindungen eines solchen Auges würden aus Roth und Blau gemischt erscheinen; es wäre dichromatisch. Aber die Farben, welche auf der Farbenscheibe in denjenigen Geraden liegen, die durch den Ort der grünen Grundempfindung gezogen werden, werden im Allgemeinen nicht gleich erscheinen, wie es unter der älteren Annahme der Fall sein würde, wo einfach Ausfall der grünen Erregung angenommen wurde. Denn statt der wechselnden Menge des Grün im trichromatischen Auge würde hier eine wechselnde Menge einer bestimmten Purpurfarbe zu dem schon vorhandenen, verschieden gemischten Purpur hinzukommen und diesen in der Mehrzahl der Fälle verändern. In diesem Falle würde in der That der Schnittpunkt derjenigen Linien des dichromatischen Feldes, welche dichromatisch gleich erscheinende Farben enthalten, außerhalb des Farbendreiecks jenseits der grünen Ecke desselben liegen müssen.

Dies Verhältniss bliebe ungeändert, wenn wir hierzu noch weiter annehmen wollten, daß jede Erregung des Roth, auch die eben neu angenommene, in bestimmtem Verhältniss auch die grünempfindenden Nerven theile erregte, und also eine bestimmte Art Gelb zur Empfindung brächte, und jede Erregung des Blau ebenso eine bestimmte Art Grünblau. Dann wären sämtliche Empfindungen eines solchen Auges aus Gelb und Grünblau zu mischen, während der Schnittpunkt der dichromatischen Linien gleichen Aussehens dadurch nicht geändert würde.

#### Allgemeinere Form der Dichromasie.

Bezeichnen wir, wie bisher, mit  $x, y, z$  die Farbenwerthe der verschiedenen Lichter für das trichromatische Auge und damit zugleich das Maass für die ihnen entsprechenden physiologischen Prozesse im Sehnervenapparat, welche neben einander

und sich addiren bei der Erzeugung der Farbenempfindung. Dagegen  
wir mit  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die entsprechenden physiologischen Processe im dichromatischen  
zeichnen.

Die erste Regel, die sich aus den Beobachtungen ergeben hat, ist die, daß  
Lichter, die den normalen Trichromaten gleich erscheinen, es auch für die  
Maten thun. Also wenn  $x$ ,  $y$  und  $z$  gleichen Werth für zwei aus verschiedenen  
Farben gemischte Lichter haben, haben für beide auch  $\xi$ ,  $\eta$  und  $\zeta$  gleiche  
d. h. die letzteren Größen sind Functionen von  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , und nur von diesen.  
Die zweite Regel ist die, daß NEWTONS Mischungsgesetz auch für die  
des dichromatischen Systems anwendbar ist, was zu einer Gleichung von  
m führt

$$\xi(x + x_1) = \xi(x) + \xi(x_1),$$

folgt, daß die  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  nur lineare Functionen von  $x$ ,  $y$ ,  $z$  sein können, und  
homogene lineare, da  $\xi = \eta = \zeta = 0$  sein muß, wenn  $x = y = z = 0$ .  
 $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  nur zwei Variable vertreten sollen, so wird zwischen ihren Werthen  
Gleichung stattfinden müssen, die wiederum nur eine lineare sein kann. Wir  
also zu drei Gleichungen folgender Form:

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta \dots\dots\dots \} 10 \\ \xi &= p_1x + p_2y + p_3z \dots\dots\dots \} 10a \\ \eta &= q_1x + q_2y + q_3z \dots\dots\dots \} \end{aligned}$$

Die Coefficienten  $p$  und  $q$  dieser letzteren Gleichungen müssen positiv sein,  
und  $\eta$  für alle positive Werthe von  $x$ ,  $y$  und  $z$  positiv sein müssen. Da-  
muß einer der Coefficienten der Gleichung 10 nothwendig das entgegen-  
Vorzeichen von den beiden anderen haben, da  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in TH. YOUNGS  
nothwendig positive Größen für alle physiologisch möglichen Farben-  
ungen sein müssen.

Sei  $\gamma$  dieser Coefficient mit abweichendem Zeichen. Schreiben wir

$$-\frac{\alpha}{\gamma} = a \text{ und } -\frac{\beta}{\gamma} = b,$$

$a$  und  $b$  positiv sind, so ergibt Gleichung 10

$$\zeta = a\xi + b\eta \dots\dots\dots \} 10b$$

setzen wir weiter

$$\begin{aligned} \zeta_1 &= a\xi \text{ und } \zeta_2 = b\eta \\ \zeta &= \zeta_1 + \zeta_2, \end{aligned}$$

Wenn wir die Empfindung  $\xi$  mit der ihr proportionalen  $\zeta_1 = a\xi$  zusammen-  
in die Empfindung einer Mischfarbe von bestimmter Zusammensetzung  $\zeta_1$  und  
ebenso  $\zeta_2 = b\eta$  mit  $\eta$ . Der ganze vorhandene Farbenwerth des dichro-  
nen Auges erscheint dann als Mischung in veränderlichem Verhältniß von

diesen beiden bestimmt zusammengesetzten Farben. Dadurch wäre dann auch das Aussehen der dichromatischen Farben bestimmt.

Um die besprochenen Verhältnisse in einer analytisch geometrischen Darstellung des Farbensystems anschaulich zu machen, verfahren wir am einfachsten,<sup>1</sup> wenn wir die Werthe der Grundfarben des trichromatischen Systems  $x, y, z$  als rechtwinklige Coordinaten eines die betreffende Farbe enthaltenden Punctes gebrauchen. Nach YOUNGS Hypothese, welche nur positive Werthe der physiologisch möglichen Farbewerthe zulässt, ist dann das System aller Farben in der rechtwinkligen positiven Ecke dieses Coordinatensystems angeordnet. Als Farbentafel kann jede Ebene gelten, die die drei positiven Coordinataxien schneidet, z. B. die Ebene

$$x + y + z = \text{Const.} \dots\dots\dots \} 10c,$$

in der das Farbendreieck ein gleichseitiges wird.

Unter diesen Annahmen würde die Gleichung

$$\xi = p_1 \cdot x + p_2 \cdot y + p_3 \cdot z = 0 \dots\dots\dots \} 11$$

eine Ebene darstellen, die durch den Anfangspunct der Coordinaten (die Spitze der Farbenecke) geht, aber ganz auferhalb der positiven Ecke liegt, da bei den vorausgesetzten positiven Werthen der Coefficienten  $p$  nothwendig eine oder zwei der Coordinaten negative Werthe haben müssen, um das Trinom zu Null zu machen.

Dasselbe würde gelten für die andere Gleichung

$$\eta = q_1 \cdot x + q_2 \cdot y + q_3 \cdot z = 0 \dots\dots\dots \} 11a.$$

Sollen die beiden Gleichungen gleichzeitig gelten, so würde dadurch die Schnittlinie der beiden Ebenen, beziehlich wenn wir die Gleichung der Farbentafel (10c) hinnehmen, der Punct, wo die Schnittlinie die Farbentafel schneidet, gegeben sein.

Setzen wir dagegen die Gleichung

$$B \cdot \xi = A \cdot \eta \dots\dots\dots \} 11b$$

oder

$$(Bp_1 - Aq_1) \cdot x + (Bp_2 - Aq_2) \cdot y + (Bp_3 - Aq_3) \cdot z = 0 \dots\dots \} 11c,$$

so ist dies wieder Gleichung einer Ebene, und zwar einer solchen, welche die beiden früher genannten  $\xi = 0$  und  $\eta = 0$  in derselben Schnittlinie schneidet, da diese beiden letzteren Gleichungen zusammen auch 11b erfüllen.

Die Gleichung 11b können wir aber auch schreiben

$$\xi : \eta = A : B$$

und mit Hülfe von Gleichung 5 ergibt sich dann für die Puncte der Ebene 10b weiter

$$\frac{\xi}{\xi} = a + \frac{b \cdot B}{A}$$

$$\frac{\xi}{\eta} = b + \frac{A}{B},$$

<sup>1</sup> S. oben, S. 336–338.



Die drei Farbenempfindungen haben in jeder Ebene von der Form 10b constanten Verhältniß zu einander. Die ganze Ebene ist gleichfarbig, und alle in dem dichromatischen Farbensystem gleichfarbigen Ebenen gehen durch eine gemeinsame Schnittlinie, die aber nothwendig außerhalb oder an der Grenze der positiven Farbenecke liegt. In der nach NEWTON construirten Tafel schneiden sich alle gleichfarbigen Linien eines dichromatischen Systems in einem Punkte außerhalb oder an der Grenze des dichromatischen Farbendreiecks.

Es bemerken ist, daß in diesem Punkte auch  $\zeta = 0$  werden, also jede Lichtempfindung fehlen würde, was aber thatsächlich nur dann in Betracht kommt, wenn der Punkt an der Grenze oder in einer Ecke des Farbengebietes liegt. Letzteres entspricht der älteren Annahme über die Natur der Dichromasie.

Unsere Betrachtungen sind keinerlei Beschränkung für die Lage des Schnittpunktes gegeben. Daher fällt bei dieser Verallgemeinerung der Theorie der Dichromasie die Trennung in zwei scharf getrennte Klassen Grünblinde und Rothfarbige, welche ja auch den Beobachtungen gegenüber nicht ganz gesichert erscheint. Es ist auch nachgewiesen, daß der Mangel an Übereinstimmung zwischen den Farben der dichromatischen Systeme und je einer der von uns gewählten Grundfarben keinen unlöslichen Widerspruch einschließt.

Die Messungen der Hrn. KÖNIG und DIETERICI haben für zwei Klassen von Menschen die fehlenden Farben auf die von ihnen gewählten Elementarfarben zurückgeführt.

Diejenige Grundfarbe, welche normale Trichromaten mehr haben, als Rothfarbige, ist von den beiden Autoren bezeichnet als:

$$\mathfrak{R} = \frac{20 R - 3 G + 2 V}{19}.$$

Die andere, welche normale Trichromaten mehr haben, als Grünblinde, als

$$\mathfrak{G} = \frac{1}{5} R + \frac{4}{5} G,$$

Wenn wir die oben gefundenen Gleichungen (9a), in denen die Werthe von  $x, y, z$  durch  $R, G, V$  ausgedrückt waren, benutzen, um die letzteren Größen durch  $x, y, z$  auszudrücken, erhalten wir:

$$\begin{aligned} R &= 1,328 \cdot x + 2,278 \cdot y - 2,611 \cdot z \\ G &= -0,5122 \cdot x + 2,8294 \cdot y - 1,3249 \cdot z \\ V &= -0,4288 \cdot x - 1,4771 \cdot y + 2,9094 \cdot z. \end{aligned}$$

Für die beiden fehlenden Farben

$$\begin{aligned} \mathfrak{R} &= 1,434 \cdot x + 1,797 \cdot y - 2,132 \cdot z \\ \mathfrak{G} &= -0,1442 \cdot x + 2,715 \cdot y - 1,483 \cdot z. \end{aligned}$$

Die negativen Coefficienten anzeigen, daß die definirten Farben außerhalb des Farbendreiecks liegen, so ergibt sich dies hiermit thatsächlich für die fehlenden



Farben beider Klassen von Dichromaten. Die fehlende Farbe der Grünblinden würde zwischen den verlängerten Seiten des Farbendreiecks liegen, die sich im Grün schneiden, näher dem vom Roth kommenden Schenkel, die der Rothblinden außerhalb der Roth-Grün-Linie, deren Mitte etwa gegenüber, aber ziemlich entfernt.

#### Vergleichung der Empfindlichkeit für Helligkeitsunterschiede mit der für Farbenunterschiede.

Der kleinste erkennbare Bruchtheil für Helligkeitsunterschiede bei weißer Beleuchtung in den Beobachtungen von Hrn. A. KÖNIG unter ähnlichen äußeren Einrichtungen, ähnlicher Größe des Gesichtsfeldes u. s. w., wie bei den Farbenvergleichen betrug 0,0173. Die Gleichung (8) ergibt alsdann

$$dE_k = k \cdot 0,0173 \cdot \sqrt{3}$$

Der Werth von  $k$  muß, wie oben bemerkt, bei den Farbenvergleichungsversuchen, in denen die Rechnung vom mittleren Fehler ausgeht, 1,8238 mal so groß genommen werden, als bei den Helligkeitsvergleichen, bei denen noch eben sichtbare Unterschiede gesucht sind. Wir erhalten daher aus den letzteren, wenn wir den Werth von  $dE$  hier auf dasselbe Maass zurückführen wollen, wie es in der obigen Tafel II (S. 455) gebraucht ist.

$$dE = \frac{0,0173}{1,8238} \cdot \sqrt{3} = 0,01643,$$

während der aus den Werthen der Tafel II gefundene Mittelwerth ist

$$dE = 0,0176.$$

Diese Übereinstimmung kann unter den gegebenen Umständen wohl als über Erwarten gut bezeichnet werden. Sie entspricht der Voraussetzung, von der wir hier ausgegangen sind, daß die Wahrnehmung der Farbenunterschiede ursprünglich auf der Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden beruht.

Eine weitere Prüfung des hier aufgestellten Gesetzes wird wohl besser durch directe Mischung je zweier Spectralfarben in verschiedenem Verhältnisse anzu- führen sein, bei denen das Mischungsverhältniß unmittelbar am Apparat abgelesen werden kann, und bei denen auch mannigfachere Vergleichen herzustellen sind, als sie zwischen unmittelbar benachbarten Spectralfarben eintreten.

Die Rechnung für das dichromatische Auge hatte ich schon vor der für das trichromatische durchgeführt, aber unter der älteren einfacheren Annahme, daß eine Grundempfindung ganz fehlt. Die Rechnung stimmte mit den Beobachtungen etwa ebensogut oder schlecht, wie für das trichromatische Auge. Führt man die eben gegebene allgemeinere Auffassung der Dichromasie ein, so läßt die Umformung der Formel schon übersehen, daß dabei noch eine neue Constante eintritt, über die frei zu verfügen ist, und man wird mit deren Hülfe also jedenfalls eine bessere Übereinstimmung mit der Formel herstellen können, als mit der kleineren Zahl von Constanten. Die mühsame Rechnung in diesem noch ziemlich provisorischen Zustande unserer Kenntnisse des Gegenstandes durchzuführen, schien mir überflüssig.

3 **Farbenlinien.** Die oben für den allgemeineren Werth von Formel Gl (4) macht es möglich, diejenigen Reihen von Farben gegebenen Endfarben zu bestimmen, längs deren man die e wahrnehmbarer Unterschiede durchläuft, welche Reihen also Linien im Farbensystem entsprechen würden. Ich werde mir sie den Namen der kürzesten Farbenreihen zu brauchen. Vollständig genaue Formel für die kleinsten wahrnehmbaren Helligkeits- die sie annähernd FECHNERS Gesetz giebt, noch nicht gefunden ich auf den Gebrauch der von FECHNER selbst noch gegebenen beschränken, wonach die Deutlichkeit des Unterschiedes von dem abhängt, wenn  $J$  und  $(J + dJ)$  die beiden zu vergleichenden ob- gen sind,  $A$  eine von der Qualität des Lichts abhändige Constante. spricht, wie wir gesehen, den Beobachtungen in einem außerordent- n Theil der Scala der Helligkeiten. Für sehr kleine und sehr n ist die Deutlichkeit aber etwas kleiner, als nach der Formel zu

als wahrscheinliche Hypothese aufgestellte Formel für die Deutlich- n dieses zweier Farben, von denen die eine aus den Quantis der Ur- sammengesetzt ist, die andere dagegen aus  $(x + dx)$ ,  $(y + dy)$ .

$$dE^2 = \left( \frac{dx}{a+x} \right)^2 + \left( \frac{dy}{b+y} \right)^2 + \left( \frac{dz}{c+z} \right)^2 \dots \dots \dots \} 12.$$

aber zu bemerken, daß die  $x$ ,  $y$ ,  $z$  den physiologischen Urfarben- n, und nicht, wie im Mischungsgesetz, durch lineare Functionen werden können.

n Gleichung (1) andere Variabeln einführt. und setzt:

$$\left. \begin{array}{l} \log(a+x) = \xi \dots \dots \dots \\ \log(b+y) = \eta \dots \dots \dots \\ \log(c+z) = \zeta \dots \dots \dots \end{array} \right\} 12a.$$

Gleichung (1) auch schreiben:

$$dE^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2.$$

so eine Farbenecke, in der man nicht mehr  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , sondern inaten braucht, so wäre das  $dE$  direct proportional dem Linien- den beiden durch  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  und  $(\xi + d\xi)$ ,  $(\eta + d\eta)$ ,  $(\zeta + d\zeta)$  1. In diesem letzteren Coordinatensystem würden sämtliche en durch gerade Linien dargestellt werden müssen, die aber beim ursprüngliche Coordinatensystem der  $x$ ,  $y$ ,  $z$  im Allgemeinen ge- rden.

1 einen Endpunct der Farbenreihe mit dem Index (1) bezeichnen, 2), so würde man die Gleichung einer geraden Linie im Coordi-  $\eta$ ,  $\zeta$  auf die Form bringen können:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\xi - \xi_1}{\xi_2 - \xi_1} = \frac{\eta - \eta_1}{\eta_2 - \eta_1} = \frac{\zeta - \zeta_1}{\zeta_2 - \zeta_1} \dots\dots\dots \end{aligned} \right\} 12b$$

Um die Gleichung dieser Linie in den  $x, y, z$  ausdrücken zu können, setzen wir zunächst zur kürzeren Bezeichnung:

$$\left. \begin{aligned} \lambda &= \log \cdot \left[ \frac{a + x_2}{a + x_1} \right] = \xi_2 - \xi_1 \dots\dots\dots \\ \mu &= \log \cdot \left[ \frac{b + y_2}{b + y_1} \right] = \eta_2 - \eta_1 \dots\dots\dots \\ \nu &= \log \cdot \left[ \frac{c + z_2}{c + z_1} \right] = \zeta_2 - \zeta_1 \dots\dots\dots \end{aligned} \right\} 12c$$

Dann werden die Gleichungen (12b):

$$\left( \frac{a + x}{a + x_1} \right)^\lambda = \left( \frac{b + y}{b + y_1} \right)^\mu = \left( \frac{c + z}{c + z_1} \right)^\nu \dots\dots\dots \left. \right\} 12d$$

Wenn von den sechs Größen, die in den Gleichungen 12c unter dem Logarithmenzeichen vorkommen, nicht je zwei im Nenner, oder je zwei im Zähler gleich Null werden, haben die Größen  $\lambda, \mu, \nu$  endliche reelle, positive oder negative Werthe, und die Punkte der Linie sind eindeutig bestimmt, da ihre Coordinaten nur positiv reell sein können. Da nun  $a, b, c$  (Farbencomponenten des Eigenlichts im Sinne von FECHNERS Auffassung) nur positive Werthe haben können, und  $x, y, z$  für reelle Farben ebenfalls, so kommt also für reelle Farben die oben bemerkte Ausnahme niemals vor, und zwischen jedem Paare von Punkten des reellen Farbengebiets giebt es also nur eine kürzeste Farbenlinie.

Da indessen die Punkte, in denen zwei von den Größen  $(a + x), (b + y)$  und  $(c + z)$  gleich Null werden, eine besondere Rolle bei den Constructionen spielen, mache ich hier darauf aufmerksam, daß alle drei Größen, gleich Null gesetzt, den Nullpunct allen Lichtes, Eigenlicht und objectives Licht zusammengenommen, bezeichnen; wir wollen diesen Punct deshalb im Folgenden mit (0) bezeichnen. Wenn nur zwei der genannten Größen gleich Null sind, sind dadurch die Parallelen zu den Coordinataxen gegeben, welche durch den Punct (0) gehen. Wenn von einem Punkte dieser Linien aus kürzeste Farbenreihen nach einem anderen festen Punkte zu construiren sind, so sind diese durch ihre Endpunkte nicht vollständig gegeben, sondern können in unendlicher Anzahl construirt werden.

**Ebene Curven.** Eben werden Curven, für welche einer der Exponenten  $\lambda, \mu$  oder  $\nu$  gleich Null ist, oder zwei derselben einander gleich.

Im ersteren Falle erhalten die drei Größen, welche in (12d) einander gleichgesetzt sind, alle den Werth 1, was, wenn  $\lambda = 0$ , folgern läßt

$$\begin{aligned} b + y &= b + y_1 \\ c + z &= c + z_1, \end{aligned}$$

d. h. die betreffenden kürzesten Farbenreihen liegen auf geraden Linien der  $x$ -Axe parallel.

Die Annahme  $\mu = 0$  giebt eben solche Gerade der  $y$ -Axe parallel, und  $\nu = 0$  der  $z$ -Axe parallel. Dieselben können übrigens durch jeden Punkt der Farbenpyramide gezogen werden.

Im zweiten Falle, wo zwei Exponenten einander gleich, erhalten wir entweder

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a+x_1}{a+x_2} = \frac{b+y_1}{b+y_2} \dots\dots\dots \\ \text{oder} \\ \frac{b+y_1}{b+y_2} = \frac{c+z_1}{c+z_2} \dots\dots\dots \\ \text{oder} \\ \frac{c+z_1}{c+z_2} = \frac{a+x_1}{a+x_2} \dots\dots\dots \end{array} \right\} 12c.$$

Bezeichnen wir wieder den Punkt, dessen Coordinaten  $(-a)$ ,  $(-b)$ ,  $(-c)$  sind, d. h. in welchen alle Lichtempfindung fehlt, auch die des Eigenlichts, mit dem Index 0, den Punkt  $x=y=z=0$ , wo nur die Empfindung des Eigenlichts da ist, mit  $\varepsilon$ , so sagt die erste unserer Gleichungen aus, daß die Punkte 0, 1, 2. projectirt auf die  $xy$ -Ebene in gerader Linie liegen. Die Curve liegt also in einer Ebene, die der  $z$ -Axe parallel ist, und durch den Punkt 0, sowie die beiden Endpunkte der Curve geht.

Die zweite der Gleichungen 12c würde sich auf eine Ebene beziehen, die der  $x$ -Axe parallel durch den Punkt 0 geht, die dritte auf eine Ebene, die der  $y$ -Axe parallel durch denselben Punkt geht.

Je zwei dieser Ebenen schneiden sich in geraden Linien, die dann nothwendig hinreichend verlängert durch den Punkt 0 gehen, und kürzesten Farbenreihen entsprechen.

Dagegen werden Linien, welche gleicher Qualität des objectiven Lichts entsprechen, verlängert durch den Punkt  $\varepsilon$  gehen, wo  $x=y=z=0$ . Nur eine von diesen, die gleichzeitig durch  $\varepsilon$  und 0 geht, wird einer kürzesten Farbenreihe entsprechen.

Nun liegt es im Wesen einer kürzesten Farbenreihe, daß unter solchen Farben, die von der einen Endfarbe gleich großen Unterschied zeigen, die in der kürzesten Farbenreihe liegenden auch der anderen Endfarbe ähnlicher als alle anderen benachbarten Farben erscheinen werden.

Fällt die Reihe der Farben gleicher Mischung mit der kürzesten Reihe zusammen, so werden ihre Glieder auch beim Übergang von schwacher zu hoher Lichtstärke keine Abweichung des Farbentons zeigen. Wohl aber wird dies der Fall sein, wenn die erstere Reihe keine kürzeste ist. Denn dann würde es Farben geben von anderer Mischung, durch welche man einen kürzeren Übergang von den dunkelsten zu den hellsten Tönen gleicher objectiver Qualität bahnen könnte.

Nun kommen in der That solche Unterschiede vor. Ich habe schon in meinen älteren Arbeiten<sup>1</sup> über Spectralfarben erwähnt, daß sie bei steigender

<sup>1</sup> S. oben S. 224, 225 und H. HELMHOLTZ. Über Herrn D. BREWSTER'S neue Analyse des Sonnenlichts. *Poggd. Ann.* Bd. 86. S. 520. 1852.



Helligkeit alle dem Weiss, beziehlich Gelbweiss ähnlicher werden. Am schnellsten geht bei steigender Lichtstärke Grün in Gelb, Violett in Weissblau über. Höhere Helligkeiten sind nöthig, um spectrales Roth in Gelb und Blau in Weiss überzuführen. Es giebt nur eine Farbe, nämlich Gelbweiss, welche bei allen Intensitäten merklich unverändert bleibt. Wir würden daraus schliessen haben, dass Gelbweiss dem Farbenton der geraden Linie entspricht, die durch die Punkte (0) und ( $\epsilon$ ) unseres Coordinatensystems geht. Wir wollen diese für unser hier vorliegendes Thema als die Principalinie des Farbensystems bezeichnen. Im Sinne von FECHNERS Hypothese wäre sie die Farbe des Eigenlichts der Netzhaut.

Nehmen wir dagegen eine andere Farbe, z. B. Grün, welches bei Steigerung der Intensität und unveränderter Mischung gelb wird. Offenbar müßten wir ein gesättigteres Grün höherer Helligkeit herzustellen versuchen, um unsere Farbenreihe mit dem dem unteren Ende ähnlichsten Farbentone abzuschliessen, d. h. wir müßten zu einer anderen Farbenmischung übergehen, um in einer Reihe möglichst wenig unterschiedener Farbentöne zu bleiben.

Gekrümmte Projectionslinien. Wenn wir von den drei in Gleichung (2) einander gleichgesetzten Gröfsen zwei, die nicht gleiche Exponenten haben, einander gleichsetzen, so sind die Curven verschieden, je nach dem die beiden Exponenten gleiches oder ungleiches Vorzeichen haben.

#### A. Curven durch den Punct 0.

Im ersteren Falle, wenn z. B. die beiden Exponenten  $\lambda$  und  $\mu$  gleiches Zeichen haben, würde  $\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)$  positiv sein, und die Curve

$$\frac{a+x}{a+x_1} = \left(\frac{b+y}{b+y_1}\right)^{\frac{\mu}{\lambda}}$$

würde durch den Punct 0 gehen, da dort  $a+x=b+y=0$  ist. Ist dabei  $\frac{\mu}{\lambda} > 1$ , so würde  $(a+x)$  schneller steigen, als  $(b+y)$  die Curve ihre convexe Seite der Linie  $b+y=0$  zukehren.

Umgekehrt ist  $\frac{\mu}{\lambda} < 1$ , so würde die Curve ihre convexe Seite der Linie  $a+x=0$  zukehren.

Wenn wir die Punkte (1) und (2) sehr nahe an einander liegend wählen, und ihre Abstände als kleine Gröfsen behandeln

$$x_2 - x_1 = dx$$

$$y_2 - y_1 = dy$$

$$z_2 - z_1 = dz,$$

so wird

$$\lambda = - \frac{dx}{a + x_1}$$

$$\mu = - \frac{dy}{b + y_1}$$

$$\nu = - \frac{dz}{c + z_1};$$

ann

$$\frac{dx}{dy} = \operatorname{tg} \varphi$$

$$\frac{a + x_1}{b + y_1} = \operatorname{tg} f,$$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} f}.$$

Es ist sich, daß  $\frac{\lambda}{\mu} > 1$ , wenn  $\operatorname{tg} \varphi > \operatorname{tg} f$  oder  $\varphi > f$ , d. h. wenn im  
 angente der Curve einen größeren Winkel mit der positiven  $y$ -Axe  
 ierade  $(0,1)$ . Umgekehrt, wenn  $\frac{\mu}{\lambda} > 1$ . Der entferntere Theil  
 en  $(1, \infty)$  ist convex, das Stück  $(0,1)$  derselben dagegen concav  
 e  $(0,1)$ .




Fig. 177.



Die Grenzen dieses Büschels von Curven sind die, wo  $\frac{\mu}{\lambda} = 0$  oder  $= \infty$ . Es sind dies die schon oben erwähnten geraden Linien, gezogen durch den Punct 1 parallel den Axen der  $x$  und der  $y$ .

Die *Fig. 177* stellt ein Bündel solcher Curven dar, welche alle durch denselben Punct  $\epsilon$  gehen und verschiedene Exponenten haben, deren Werthe (1 bis 1,6) am Rande angegeben sind.

#### B. Projections-Curven mit zwei Asymptoten.

Wenn die beiden Exponenten der Gleichung entgegengesetztes Zeichen haben, so können wir setzen

$$\frac{\mu}{\lambda} = -\varrho.$$

Dann ist  $\varrho$  eine positive GröÙe, und es wird

$$\frac{a+x}{a+x_1} = \left( \frac{b+y}{b+y_1} \right)^{-\varrho}.$$

Also wird für  $a+x=0$  das  $b+y=\infty$ , und für  $a+x=\infty$  das  $b+y=0$ , d. h. die durch den Punct 0 den Coordinatax parallel gezogenen Linien sind Asymptoten für die Curve, welche hyperbelähnlich mit zwei Enden in das Unendliche läuft. Aber diese in  $\infty$  auslaufenden Enden der Curven liegen außerhalb des Farbenfeldes, selbst außerhalb des physiologisch möglichen, da dieses durch zwei gerade Linien begrenzt ist, die parallel den  $x$  und den  $y$  durch den Punct  $\epsilon$  gelegt sind. Das spectrale Farbenfeld ist noch enger durch einen spitzen Winkel begrenzt, dessen Scheitel ebenfalls im Puncte  $\epsilon$  liegt, so daß von diesen hyperbelähnlichen Curven nur sehr kurze, fast gerade Stücke für kleine Lichtintensitäten, längere und gekrümmtere nur für große Intensitäten in Betracht kommen.

Wenn die oben mit  $\varrho$  bezeichnete Constante den Werth  $\varrho=1$  hat, so ist die Curve eine gleichseitige Hyperbel im strengen Sinne.

Da entweder zwei oder gar keines der Verhältnisse zwischen den Exponenten negativ ist, so können entweder zwei oder keine der Projectionscurven die hyperbelähnliche Form mit zwei Asymptoten haben. Eine von ihnen oder alle drei haben die parabelähnliche Form und gehen durch den Punct (0).

Farbenunterschiede bei gleicher Qualität und verschiedener Helligkeit. Die kürzesten Farbenreihen, welche durch den Punct  $\epsilon$  gehen, der dem Mangel alles objectiven Lichtes entspricht, geben drei parabelähnliche Projectionen, welche auch durch den Punct (0) gehen wie *Fig. 177* zeigt.

In der Mitte des Bündels liegt die als Principallinie bezeichnete Gerade, welche durch (0) und ( $\epsilon$ ) geht und die einzige Linie bildet, welche gleichzeitig einer kürzesten Farbenreihe und gleichbleibender objectiver Qualität der Farbe (gleichen Mischungsverhältnisse) entspricht.

In den drei Ebenen, welche durch diese Linie und die Coordinatax gehen, liegen ebene Curven, welche der Principallinie ihre convexen Seiten zukehren.

Um Farben dieser Ebenen objectiv herzustellen, würde man entweder einzelne Urfarben mit der Principalfarbe zu mischen haben, oder solche Farben, die, mit

den Urfarbe gemischt, die Principalfarbe geben. Ich will die letz-  
ten Gegenfarben nennen. Sind Carminroth, Ultramarinblau und Blatt-  
grün den Urfarben entsprechend, und Gelbweiß die Principalfarbe, so  
sind angrün, Gelb und Purpur die principalen Gegenfarben. Von sämt-  
lichen aller sechs Farben mit dem principalen Gelbweiß würde zu er-  
wartet werden, daß sie alle innerhalb der Reihe der Farbentöne bleiben, welche die  
Mischungen hervorbringen können, und nur das Verhältniß würde  
sich ändern, indem die lichtschwachen Farben dieser Art gesättigter er-  
scheinen, als die gleich zusammengesetzten lichtstarken, da die lichtstarken,  
auf der Farbencurve liegen, in der That sich dem Umfange der Farben-  
reihe nähern, wo die gesättigteren Farben liegen.

Also ein leichtschwaches Ultramarin und Gelb bei gleicher Qualität und  
Menge als ein weißlicheres Blau und Gelb erscheinen müssen. Die Zu-  
mischung zum Blau wird relativ stärker sein, als die zum Gelb, weil der  
Theil der Principalfarbe etwas Blau wegnimmt und dafür noch etwas  
einfaches Gelb aber sich einfach hinzufügt.

werden schwaches Urroth bis Purpur einerseits und Blattgrün bis  
Blau andererseits ihre entsprechenden lichtstarken Farben in etwas weißlicheren  
Mischungen finden.

Obgleich bei hoher Lichtstärke werden der rothen und grünen Farbentöne bei hoher Licht-  
stärke werden des Blau sind schon oben erwähnt.

indem der Zwischenfarben bei geringer Helligkeit.  
sind im Allgemeinen einer Urfarbe oder Mischungen aus-  
sehen sehr nahe in ihrem Farbentone. Wenn man die letzteren  
mit der beiden Urfarben projectirt denkt, so werden kürzeste  
die in bestimmter Richtung vom Punkte ( $\epsilon$ ), dem Punkte der  
Gesamtheit, auslaufen, wie in *Fig. 177*, alle convex gegen die Pro-  
jectionallinie sein, und also im fernerem Verlaufe sich derjenigen  
nähern, von der sie durch diese Projection nicht getrennt sind.  
Die lichtschwachen Farben, die der Mischung zweier Urfarben  
entstehen auf gleicher Seite der Gegenfarbe liegenden Urfarbe sich  
nähern nach den ähnlichsten gesättigteren lichtstärkeren Farben sucht.

Unsere Untersuchungen auf eine von W. VON BEZOLD<sup>1</sup> und E. BRÜCKE<sup>2</sup> beschrie-  
bene Erscheinung. Beide haben nämlich gefunden, daß aus einem gut  
abgegrenzten Centrum von mäßiger Länge, in dem man aber die stärkeren  
Farben Linien noch gut sehen kann, bei allmählicher Abschwächung  
sich die cyanblauen Farbentöne ganz verschwinden, und daß  
schließlich nur drei Farben, Roth, Grün und Violettblau,  
übrigbleiben. Die genannten Autoren haben damals auch schon den Schluss  
gezogen, daß die genannten drei Farben die physiologischen Grundfarben sein  
müssen, weil sie diejenigen Empfindungselemente einer gemischten Em-  
pfindung repräsentiren, die die Reizschwelle nicht überschreiten, als unwirksam auch in

<sup>1</sup> D. Über das Gesetz der Farbenmischung und die physiologischen Grundfarben.  
S. 237—239. 1873.

<sup>2</sup> Über einige Empfindungen im Gebiete des Sehnerven. *Wiener Sitzungsbericht*.  
I. 1878. Febr. 28.

der gemischten Empfindung betrachten. Es ist dies eine Betrachtungsweise, die der hier eingeschlagenen wesentlich verwandt ist.

Mischungen mit Weifs. Ähnliche Abweichungen, wie die bisher besprochenen, zwischen dem Farbentone einer lichtschwachen und lichtstarken Farbe von gleicher objectiver Qualität kommen auch zwischen denen einer isolirten gesättigten Farbe und deren Mischung mit sehr vielem Weifs vor.<sup>1</sup>

Wenn Weifs und eine Mischung dieses Weifs mit einer kleinen Menge einer Spectralfarbe als gegeben nach ihrem Orte in der Farbenpyramide angesehen werden, so läßt sich die kürzeste Farbenreihe, die durch die beiden Punkte führt, construiren. Diese wird gegen einen Theil der Oberfläche der Farbenpyramide hin gerichtet sein, an der die gesättigten Farben derselben Reihe liegen, als deren stark mit Weifs verdünnte Modification die gegebene Mischung erscheint.

Dabei ist zu bemerken, daß, wenn man zu dem Weifs reine Urfarben hinzumischen könnte, die Verbindungslinie beider eine der entsprechenden Coordinatixe parallele Gerade werden würde, welche selbst eine kürzeste Farbenreihe ist und ihre Richtung nicht ändert. Die kürzeste Farbenreihe würde also mit der Mischungsreihe zusammenfallen und keinerlei Farbenänderung entstehen.

Da aber die Spectralfarben als zusammengesetzte Farben anzusehen sind, in denen nur eine oder zwei der Urfarben erhebliches Übergewicht haben, so werden dadurch Krümmungen der kürzesten Farbenreihen möglich.

Um die Form der betreffenden Farbenreihe vollständig übersehen zu können, wird man sich im Allgemeinen je zwei Projectionen auf Grenzflächen der Farbenpyramide entwerfen müssen.

Das Curvenbündel der *Fig. 177* würde auch bei etwas abgeänderten Verhältnissen seinen Charakter behalten. Deuten wir es jetzt so, daß wir den Punct  $\epsilon$  als die Projection des Weifs auf eine der Coordinatebenen betrachten;  $\epsilon x$  sei die Coordinatrichtung für die eine Grundfarbe, die zum Weifs hinzugethan werden kann,  $\epsilon y$  für die andere. Beide Linien entsprechen kürzesten Farbenreihen. Dann wird noch die mit  $y = x$  bezeichnete Gerade sehr nahesten wenigstens eine kürzeste Farbenlinie sein. Die Gleichung der letzteren, die in diese Richtung fällt, würde allerdings, streng genommen, nicht  $x = y$ , sondern  $a + x = b + y$  sein. Wenn aber die Coordinaten des Weifs so groß sind, daß die des Eigenlichts  $a, b$  dagegen verschwinden, wird der Unterschied unerheblich.

Nun sieht man, daß alle Curven, welche zwischen  $\epsilon x$  und  $y = x$  liegen concav gegen  $x$ , die anderen concav gegen  $y$  sind. Verfolgt man sie von  $\epsilon$  aus, so nähern sie sich im Fortlauf der näheren Grundfarbe und weisen auf gesättigtere Abstufungen von dieser hin. Wenn wir also die Art der eingemischten Farbe nach den ähnlichsten, vom Weifs weniger überdeckten Farbentönen beurtheilen, werden wir die Einnischung der reinen Urfarbe  $x$  ähnlicher halten.

<sup>1</sup> Auch schon von W. v. BEZOLD erwähnt. *Pogg. Ann.* Bd. 150. S. 245. 1873.

3 Roth kann nach meinen neueren Bestimmungen als Urroth und grünlicher Einnischung betrachtet werden. In der Mischung rde das Grünliche mehr zurücktreten, die Farbe dem Urroth mehr rosenroth erscheinen, was in der That der Fall ist und von Hrn. E. HERING bemerkt worden ist.

was aus gleichen Quantis Urroth und Urblau zusammengesetzt in der Projection auf die Blauroth-Ebene mit der Projection it dieselbe Richtung haben. und seine kürzeste Farbenreihe ; sein. Es käme bei spectrumalem Violett nur in Betracht, dafs Einmischung von Grün hat, die in der Grünroth-Ebene, wie in Ebene gegen das überwiegende Roth. bezüglich Blau mit fernung vom Weiss schwinden würde. Dadurch würde die Farbe ent des Grün, dem Rosenroth ähnlicher gemacht.

i zu bläulichen violetten Einnisungen über, so würde neben Blau der rothe Bestandtheil des Violett zu schwinden anfangen, och durch das stärkere Schwinden des Grüns compensirt würde. wischen  $\lambda = 450 \mu\mu$  bis  $\lambda = 430 \mu\mu$  der Zusatz des spectrumalen ifs eine ziemlich deutlich rosenrothe Färbung gab; erst bei hwand dieser röthliche Ton.

nterschiede schwächsten Lichtes. So wie bei hohen ie Farbenunterschiede schwächer werden und zum Theil ver- let dasselbe auch bei schwächstem Licht statt. Ich habe . dafs bei allmäliger Abnahme der Lichtstärke zuerst die im Spectrum schwinden, Gelb und Grünblau, und der von mene Raum zwischen Roth, Grün und Violettblau sich theilt. bnahme tritt an Stelle der letzteren Rothbraun, Olivenbraun endlich schwinden alle Farbenunterschiede, am spätesten das s schwächste Licht wird, so lange es überhaupt noch wahr- len kann. gleichmäfsig grau gesehen.

dunkler Umgebung sieht man deshalb auch ein sehr licht- ctrum als einen schwachen Lichtstreifen ohne Farbenunter- var liegt nach den in dieser Beziehung übereinstimmenden F. HILLEBRAND<sup>2</sup> und A. KÖNIG<sup>3</sup> das Maximum der Helligkeit im Grün. Auch schliessen sich einige von den Curven der ien Augen derselben Helligkeitscurve ziemlich gut an.

rste schwache Licht, was ein erglühender Körper in ganz zuerst ausgiebt, erscheint nach Versuchen von FR. WEBER<sup>4</sup> elgrau“. nach des Autors Benennung. bei steigender Tempe-

e. dafs Blau zuletzt schwinde, bezieht sich auf gleichmäfsige Abnahme des objec- urch PURKINJES Phänomen bedingt.

D (in E. HERINGS Laboratorium angestellte Versuche in *Sitzungsber. der Wiener ing* vom 21. Febr. 1889.

ber den Helligkeitswerth der Spectralfarben *Festschrift für H. v. Helmholtz*, Tafel VI.

Die Entwicklung der Lichtemission glühender fester Körper. *Sitzungsber. d. Akad. d. 7. 9. Juni.*



ratur „aschgrau“, endlich gelblichgrau, und zwar ist es das Gelbgrün des Spectrum, was so zuerst sichtbar wird. Platin sendet diese Strahlen schon bei etwa  $391^{\circ}$  C., Gold bei  $413^{\circ}$ , oxydirtes Eisen bei  $377^{\circ}$ , während deutliche Rothgluth erst bei  $525^{\circ}$  nach DRAPERS Messung erreicht wird. Dann reicht aber das Spectrum schon vom Roth der FRAUNHOFERSchen Linie *B*, bis zum Grün von *b*. Dafs das Gelbgrün zuerst sichtbar wird, ist wohl der gröfseren Empfindlichkeit des Auges für diese Strahlengattung zuzuschreiben, während das Blau des Spectrum bei diesen niederen Temperaturen noch zu geringe Intensität hat, um sich merklich zu machen.

Ähnliche Beobachtungen kann man an den sogenannten phosphorescirenden Wolken machen, die zuweilen bei sehr klarem Himmel in Hochsommer um Mitternacht im Norden sichtbar werden<sup>1</sup> und außerordentlich hoch liegende Wölkchen zu sein scheinen, die noch Dämmerungslicht von der unter dem Horizont stehenden Sonne haben. Sie erscheinen graugrün, ihr Licht wird durch ein rothes Glas ausgelöscht, während andere von fernem Gaslicht ebenso hell beleuchtete Objecte durch das rothe Glas sichtbar bleiben. Gaslicht enthält also mehr rothe Strahlen, als das der phosphorescirenden Wolken, obgleich auch das letztere wahrscheinlich Dämmerungslicht, der auch für sie noch unter dem Horizont stehenden Sonne ist.

Die Erklärung dieser Erscheinungen ergibt sich aus den zuletzt gegebenen Beziehungen der Spectralfarben zu den Urfarben. Jede Spectralfarbe erregt sämtliche drei Urfarben in mäßigen Stärken. Licht unterscheiden wir, wenn wir die gesammte vorhandene Lichtmasse von dunkel unterscheiden können, d. h. wenn die einzelnen Reize die Reizschwelle übertreten. Um Farben zu unterscheiden, müssen wir kleinere Mengen der Urfarben im einen Gemisch von gröfseren im anderen unterscheiden. So ist z. B. nach den Rechnungen von S. 461 enthalten:

	Im spectralen Roth	Im spectralen Violett	Im Weiße
Urroth	0,6093	0,3528	0,3333
Urgrün	0,1998	0,2498	0,3333
Urblau	0,1913	0,3973	0,3333

Aus den S. 405—408 und S. 415 gegebenen Werthen aus A. KÖNIGS Beobachtungen folgt, dafs die Helligkeiten, bei denen die gröfsere Helligkeit von 0,6 derselben unterschieden werden kann, 8 bis 20 mal so grofs sind als die Reizschwellen. Das erstgenannte Verhältnifs aber müfste von 1 unterschieden werden können, wenn spectrales Roth der betreffenden Lichtstärke von Weiße unterschieden werden sollte. Bei den anderen Farben sind die Verhältnisse noch näher an 1 und schwerer von 1 zu unterscheiden.

<sup>1</sup> In den letzten Jahren vermuthlich durch Reste des Krakatoastaubs begünstigt.

Ich habe in diesem Abschnitte die Voraussetzung festgehalten, daß NEWTONS Farbensetz streng richtig ist. Daß E. BRODHUN<sup>1</sup> Thatsachen entdeckt hat, die Änderungen in den Verhältnissen der Farbenwerthe der Spectralfarben bei wechselnder Lichtstärke anzeigen, habe ich auf S. 375 und 376 schon angeführt. Es schien noch zweifelhaft, ob man dies nicht als Besonderheit seines dichromatischen Auges ansehen müsse. Neuerdings hat aber auch Herr A. KÖNIG<sup>2</sup> an seinem normalen dichromatischen Auge solche Versuche bis zu sehr viel größeren Unterschieden der Lichtstärken ausgedehnt, und ähnliche ziemlich weit gehende Änderungen gefunden. Ich habe mich selbst von der Richtigkeit überzeugt. Daraus folgt wohl nun, daß auch NEWTONS Gesetz nur für mittlere Lichtstärken annähernd richtig ist, nicht für zu kleine.

Ältere Methoden der Photometrie. BOUGUER<sup>3</sup> liefs zwei weiße Flächen durch die zu vergleichenden Lichter beleuchten, stellte sich so, daß er sie beide perspectivisch neben einander sah und veränderte dann die Entfernung der einen weißen Fläche vom Licht so lange, bis die Erleuchtung gleich wurde. LAMBERT<sup>4</sup>, der in seinem berühmten Werke Photometria das erste vollständige System dieser Wissenschaft mit großem Scharfsinn entwickelte, wendete neben anderen für specielle Fälle bestimmten Methoden namentlich das Princip der zwei Schatten an, was oben schon erwähnt ist. Dasselbe Verfahren wendet auch RUMFORD<sup>5</sup> in dem nach ihm benannten Photometer an.

Um die Stellung des Beobachters bequemer zu machen, wendete POTTER<sup>6</sup> statt der zwei weißen undurchsichtigen Flächen von BOUGUERS Photometer zwei transparente an, und RITCHIE<sup>7</sup> fügte noch zwei unter 45° geneigte Spiegel hinzu, welche das Licht auf die weißen Flächen warfen und erlaubten die Lichtquellen nach entgegengesetzten Richtungen hin aufzustellen. J. HERSCHEL<sup>8</sup> hob hervor, daß die Bedingung inniger Berührung der zu vergleichenden Flächen in RITCHIES Photometer erfüllt sei, und dadurch die Genauigkeit zunehme. PERNOT<sup>9</sup> modificirte das Verfahren von POTTER dadurch, daß er die beiden transparent beleuchteten Flächen noch von der entgegengesetzten Seite durch ein drittes Licht beleuchtet, welches er allmählich näher bringt. Sind jene beiden gleich, so müssen sie gleichzeitig verschwinden. In BUNSENS oben erwähntem Photometer wird eine Papierfläche, die zum Theil mit Stearin getränkt ist, von vorn und von hinten beleuchtet. Ist das hintere Licht schwach, so erscheint der transparente Fleck dunkel, ist es zu stark, hell.

Die Absorption der Lichtstrahlen benutzte DE MAISTRE<sup>10</sup> zur Schwächung, indem er ein Prisma von blauem Glase mit einem gleichen von weißem Glase so zusammenlegte, daß die äußeren Begrenzungsflächen parallel wurden und das Licht ungebrochen durchging, aber an verschiedenen Stellen des Doppelprisma verschieden stark absorbirt wurde. Ähnlich benutzte QUETELET<sup>11</sup> zwei Prismen aus blauem Glase, die, verschieden gegen einander verschoben, eine planparallele Platte von veränderlicher Dicke bildeten. Durch die hierbei angewendeten blauen Glasplatten wird aber die Farbe des hindurchgehenden Lichtes verändert, und daß bei der Vergleichung verschiedenfarbigen Lichts keine genaue Messung möglich sei, ist schon erwähnt worden. Noch mislicher sind zwei andere Instrumente, bei welchen nicht zwei verschiedene Lichter verglichen, sondern absolute

<sup>1</sup> A. KÖNIG, Über NEWTONS Gesetz der Farbenmischung und darauf bezügliche Versuche des Hrn. EUGEN BRODHUN. Sitzungsber. der Akad. zu Berlin. 31. März 1887. S. 311.

<sup>2</sup> Nach mündlicher Mittheilung.

<sup>3</sup> BOUGUER, *Essai d'optique* 1729. 12°. *Traité d'optique sur la gradation de la lumière*. Paris 1760. Latein. Übersetzung. Wien 1762.

<sup>4</sup> LAMBERT, *Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrarum*. Augustae Vindelic. 1760.

<sup>5</sup> RUMFORD, *Philos. Transactions* LXXXIV. p. 67.

<sup>6</sup> POTTER, *Edinburgh Journal of Science*. New. Ser. III. 284.

<sup>7</sup> RITCHIE, *Annals of Philosophy*. Ser. III. Vol. I. 174.

<sup>8</sup> J. HERSCHEL, *On light*. p. 29.

<sup>9</sup> PERNOT, *Dinglers polyt. Journ.* CXIX. 155. *Moniteur industr.* 1850. Nr. 1509.

<sup>10</sup> DE MAISTRE, *Bibl. univ. de Genève*. II. 323. *Pogg. Ann.* XXIX. 187.

<sup>11</sup> QUETELET, *Bibl. univ. de Genève*. LII. 212. *Pogg. Ann.* XXIX. 187—189.



Lichtstärken dadurch bestimmt werden sollen, daß sie bei bestimmter GröÙe der Absorption ganz verschwinden. Das eine ist von LAMPADIUS<sup>1</sup> vorgeschlagen. Er sieht durch eine Anzahl dünner Hornblätter nach dem hellen Gegenstande und vermehrt so lange, bis das Objekt eben verschwindet. DE LIMENCEY und SEGRETAN<sup>2</sup> brauchten statt der Hornblätter Papierscheiben. Das andere ist das von einem Ungenannten<sup>3</sup> vorgeschlagene Lamprometer, um die Helligkeit des Tages zu messen. Es wird dabei bestimmt, wie starke Lackmustinctur man nehmen müsse, damit ein vom Tageslicht beleuchteter Platindrath, durch ein mit der Tinctur gefülltes Glas gesehen, verschwinde. Die Grenze der Empfindlichkeit des Auges für Licht ist doch zu unbestimmt, als daß bei solchen Messungen nicht Irrungen um das Dreifache oder mehr der gemessenen GröÙe eintreten sollten. Auf demselben Princip beruht ein Photometer von ALBERT<sup>4</sup> und eines von PITZER.<sup>5</sup>

330

Dagegen waren es zwei andere Wege, auf denen allmählich die vollendeteren Methoden, welche jetzt üblich sind, sich entwickelten. Der eine dieser Wege hat Bestimmung der Helligkeit der Sterne zum Ziel. J. HERSCHEL schwächte das Licht des helleren Sterns, indem er die Apertur des Fernrohrs, welches auf ihn gerichtet war, durch ein vorgeseßtes Diaphragma verkleinerte. Dasselbe Princip liegt auch A. v. HUMBOLDTS Astrometer zu Grunde. Dies ist ein Spiegelsextant von gewöhnlicher Einrichtung. Das Fernrohr des Instruments ist bekanntlich auf einen halb belegten, halb unbelegten Spiegel gerichtet und sieht den einen Stern durch den unbelegten Theil, den anderen durch den belegten und einen zweiten Spiegel. Indem man das Fernrohr senkrecht gegen die Trennungslinie des belegten und unbelegten Theils verschiebt, kann man mehr Strahlen von dem einen oder anderen bekommen und so die Bilder zweier Sterne, oder die beiden Bilder eines Sterns, nach Belieben gleich oder ungleich machen und ihre Lichtstärke vergleichen. Das Verfahren von HUMBOLDT hat den Vortheil, daß die beiden Sterne, welche verglichen werden sollen, dicht neben einander im Gesichtsfelde desselben Fernrohrs erscheinen. Die Vergleichung so intensiver kleiner Lichtpunkte ist aber schwerer, als die Vergleichung heller Flächen. Diesem Mangel wird durch das Objectiv-Photometer von STEINHEIL<sup>6</sup> abgeholfen. Es ist dies ein Teleskop, dessen Objectivglas halbiert ist. Vor jeder Hälfte des Objectivs befindet sich ein rechtwinkliges Glasprisma als Spiegel. Das Ganze wird so gestellt, daß die eine Hälfte des Objectivs dem Beobachter den einen, die andere den anderen der zu vergleichenden Sterne zeigt. Dann werden die beiden Hälften des Objectivs einzeln hinausgeschoben, so daß nicht mehr deutliche Bilder, sondern Zerstreuungsbilder der beiden Sterne entstehen, welche desto lichtschwächer werden, je größer man sie macht, d. h. je weiter man die entsprechende Hälfte des Objectivs hinauschiebt. Jede solche Hälfte ist mit einem rechteckigen Diaphragma versehen, welches mit anderen von anderer GröÙe vertauscht werden kann. Die beiden Bilder der Sterne erscheinen nach richtiger Einstellung als zwei dicht an einander grenzende nahe gleich große Rechtecke von gleicher Helligkeit, also unter den günstigsten Bedingungen, um kleine Unterschiede der Helligkeit zu erkennen. Durch dieses Instrument sind zuerst genaue Lichtmessungen an Fixsternen und Planeten möglich geworden. SCHWED<sup>7</sup> dagegen benutzte die Diffraction, welche durch enge kreisförmige Diaphragmen entsteht, um helle Flächen hervorzubringen.

Für die physikalischen Untersuchungen dagegen, wobei es sich darum handelt, zu bestimmen, wie viel Licht bei Refractionen, Reflexionen und anderen Vorgängen verloren gegangen ist, hat man mit Vortheil das stärkere Licht durch Brechung und Zurückwerfung

<sup>1</sup> LAMPADIUS, *Gehlers Wörterbuch*. 2. Auflage. VII. 482.

<sup>2</sup> DE LIMENCEY, und SEGRETAN, *Cosmos*. VIII. 174; *Polst. Centralblatt* 1856, 570; *Dinglers polyt. Journ.* CXLI. 78.

<sup>3</sup> *Pogg. Ann.* XXIX. 490.

<sup>4</sup> ALBERT, *Dinglers polyt. Journ.* C. 20 und Cl. 342.

<sup>5</sup> PITZER, *Mechanics Magazine*. XLVI. 291.

<sup>6</sup> STEINHEIL, *Pogg. Ann.* XXXIV. 646. — *Denkschriften der Münchner Akad. Math.-phys. Klasse*. Bd. II. 1836. — Ähnlich die Methode von JOHNSON. *Cosmos*. III. 301–305.

<sup>7</sup> SCHWED, Bericht über die Naturforscherversammlung 1858.

Glastafeln geschwächt. BREWSTER<sup>1</sup> und QUETELET<sup>2</sup> brauchten mehrfache Reflexionen, um starkes Licht mit schwachem vergleichbar zu machen: Reflexionen verlöschen z. B. das Sonnenlicht. DUWE<sup>3</sup> benutzte ebenso schwarzen Glastafeln, wie sie zu Polarisationsapparaten gebraucht werden. Er benutzte eine starke Reflexion bei wechselndem Einfallswinkel benutzte eine halbcylindrisch geformter weißer Schirm, dessen Gleichung man voraussetzen muß, die aber schwer zu erreichen sein wird. Ausführung hat dies Princip in dem Photometer von ARAGO erhalten zur Ausführung sehr genauer Messungen der Lichtstärke brauchbar. Lichtquelle dieses Photometers ist ein transparenter, ebener, senkrecht stehender Schirm, der am Fenster steht und in allen seinen Theilen gleichmäßig leuchtet, was sich übrigens durch das Instrument selbst controlliren läßt. Der Schirm und gegen den Horizont ist ferner aufgestellt eine planare, unter deren Mitte sich ein Zapfen befindet, um welchen als Axe ein horizontaler Schirm drehbar ist. Das Rohr ist horizontal gegen die Mitte des Schirms, und der Beobachter, welcher durch das Rohr sieht, erblickt theils einen Theil des Papierschirms, theils in ihr gespiegelt einen anderen Theil. Rechts und links von der Glasplatte, zwischen ihr und dem Schirm, sind in etwas verschiedener Höhe schwarze Stäbe angebracht, die theils durch die Platte, theils von ihr gespiegelt gesehen werden. Wo ein schwarzer Stab erscheint, sieht der Beobachter das durchgelassene Licht allein; wo der schwarze Stab im durchgelassenen Licht erscheint, ist das gespiegelte Licht des weißen Schirms. Die Röhre wird nun so gegen die Glasplatte gerichtet ist, wird durch eine passend angebrachte Markirung Man kann nun das einfallende oder das gespiegelte Licht allerlei anderen Winkeln werfen und wird dann im Allgemeinen einen anderen Winkel erblickt gesehen die beiden Bilder gleich hell erscheinen. Um aus diesem Winkel die Schwächung des Lichts berechnen zu können, muß vorher bestimmt sein, wie sich bei den verschiedenen Einfallswinkeln die durchgelassenen Lichtmengen verhalten, wofür ARAGO ein besonderes Ver- fahr- en hat, welches darauf beruht, daß die beiden Strahlenbündel, welche durch den Krystall giebt, gleich stark und jeder einzelne halb so stark sind. Ein Strahl. Indem er so eines der beiden Strahlenbündel durch Doppel- brechung viertheilt, kann er die Stellungen ermitteln, wo das durchgelassene Licht die Hälfte, das Doppelte, das Vierfache des zurückgeworfenen ist und durch Interpolation die betreffenden Verhältnisse auch für alle zwischenliegenden Winkel bestimmen. Man kann noch ein anderes Princip zur Schwächung des Lichts vorgeschlagen, die doppelte Brechung in doppeltbrechenden Krystallen zu benutzen. Läßt man voll- ständig Licht vor der Intensität  $I$  in einen solchen Krystall eintreten, und senkt man die Ebene des Lichts mit dem entsprechenden Hauptschnitte des Krystalls erhält man durch die doppelte Brechung zwei Bündel, deren Intensität  $I \sin^2 \varphi$  ist. Kann man den Winkel  $\varphi$  messen, so ist dadurch das Verhältniß der Lichtstärke der gebrochenen Bündel gegeben. Man kann die einen eliminiren das eine Bündel ganz und lassen nur das andere bestehen. Photometer von F. BERNARD.<sup>7</sup> Die beiden zu vergleichenden Strahlen

<sup>1</sup> Edinburgh Transactions. 1815.

<sup>2</sup> Ann. de Genève. LII. 212. — Pogg. Ann. XXIX. 187—189.

<sup>3</sup> Ann. XXIX. 190 Anm.

<sup>4</sup> Pogg. Journal of Science. New. Ser. IV. 50 und 320. — Pogg. Ann. XXIX. 457.

<sup>5</sup> ARAGO X. p. 184—224.

<sup>6</sup> Annales de Chimie. 3) XXXV. 353—438. — Comptes. II. 496—497 und 636—639. C. R.



werden parallel zu einander, jeder durch zwei drehbare NICOLSche Prismen, geleitet und dann durch totale Reflexion in einem rechtwinkligen Glasprisma parallel und dicht neben einander in das Auge des Beobachters gelenkt, der ihre Intensität gleich zu machen sucht dadurch, daß er die Hauptschnitte der beiden NICOLSchen Prismen, durch welche der stärkere Strahl geht, unter einem passenden Winkel gegen einander stellt. Stamm das zu vergleichende Licht aus derselben Lichtquelle her, so kann man die beiden ersten NICOLSchen Prismen weglassen, und an ihrer Stelle ein doppeltbrechendes Prisma gebrauchen, welches das Licht der Quelle in zwei gleiche, verschieden polarisirte Hälften spaltet. Sehr ähnlich im Princip ist das Photometer von BEER.<sup>1</sup> Die beiden Strahlenbündel kommen horizontal von rechts und links zum Instrumente, gehen jeder durch ein NICOLSches Prisma, werden durch einen stählernen Doppelspiegel, der zwei unter 45° gegen den Horizont geneigte spiegelnde Flächen hat, vertical gemacht und fallen durch einen dritten NICOL in das Auge des Beobachters. Dieser sieht vor sich ein kreisförmiges Feld, dessen rechte und linke Hälfte den beiden reflectirenden Flächen des Doppelspiegels entsprechen, und kann durch Drehung der NICOLS die beiden Felder gleich hell machen. Ähnlich ist auch das Photometer von ZÖLLNER.<sup>2</sup>

BABINET<sup>3</sup> hat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Strahlenbündel polarisirten Lichts ein Mittel benutzt, welches die Vergleichung ihrer Stärke ungemein erleichtert. Sein Photometer ist zunächst bestimmt, die Helligkeit von Gasflammen zu vergleichen. Eine Röhre läuft in zwei Schenkel aus, von denen der eine die Verlängerung der Röhre bildet, während der andere mit dieser einen Winkel von 70° einschließt. Beide sind durch mattgeschliffene Glastafeln geschlossen. Am Scheitel des Winkels wird die Röhre von einem Satz Glasplatten durchsetzt, welcher den Winkel halbt. Werden nun an die beiden Röhrenden Lichtquellen gesetzt, so tritt das Licht der einen Quelle in das gemeinsame Röhrenstück, nachdem es von dem Glassatz durchgelassen und senkrecht gegen die Einfallebene polarisirt ist, und das Licht der anderen Quelle, nachdem es reflectirt, und in der Einfallebene polarisirt ist. Das gemeinsame Röhrenstück ist durch ein SOLEILSches Polariskop geschlossen. So lange die beiden senkrecht gegen einander polarisirten Lichtmengen ungleiche Intensität haben, sieht man vier complementär gefärbte Halbkreise. Die Farben verschwinden, wenn man beide Lichtmengen dadurch gleich macht, daß man die Entfernung der Flammen verändert. In diesem Instrumente ist also die Vergleichung der Lichtstärke für das Auge zurückgeführt auf die Vergleichung der Farben benachbarter Flächen.

Im Princip ähnlich ist das auf einer Idee von NEUMANN beruhende Photometer von WILD,<sup>4</sup> aber durch die Abänderung des physiologischen Theils des Apparates ist in diesem Instrumente ein hoher Grad von Empfindlichkeit erreicht. Die beiden zu vergleichenden Strahlen fallen parallel mit einander auf das Instrument und werden schliesslich zur Deckung gebracht, indem der eine unter dem Polarisationswinkel erst von einer Glasplatte *A* und dann von einem ihr parallelen Satze von Glasplatten *B* reflectirt und vollständig polarisirt wird, während der andere Strahl durch den Glassatz *B* hindurchgeht. Ehe dieser zweite Strahl jedoch unter dem Polarisationswinkel auf den Glassatz *B* trifft, ist er schon durch einen eben solchen Glassatz *C* hindurchgegangen. Der Glassatz *C* ist um eine Axe drehbar, so daß der Strahl ihn unter verschiedenen genau meßbaren Winkeln passiren kann, wodurch die Menge des durchgelassenen Lichts und das Verhältniß seiner Polarisation geändert wird. Übrigens ist der Glassatz *C* so gestellt, daß die Polarisation, die der Strahl in ihm erhält, entgegengesetzt ist derjenigen, welche ihm der Glassatz *B* mittheilen würde. Lassen wir den zweiten Strahl senkrecht durch *C* gehen, so fällt er unpolarisirt auf *B* und wird hier entgegengesetzt dem ersten reflectirten Strahle polarisirt, mit dem er übrigens von da ab auf demselben Wege vereinigt weiter geht. Wird *C*

<sup>1</sup> BEER, *Pogg. Ann.* LXXXVI. 78–88.

<sup>2</sup> ZÖLLNER, *Photometrische Untersuchungen*. Dissertat. Basel 1859.

<sup>3</sup> BABINET, *C. R.* XXXVII. 774.

<sup>4</sup> WILD, *Pogg. Ann.* XCIX. 235.



und mehr geneigt, so nimmt die Menge polarisirten Lichts im zweiten Strahle mehr ab, und zwar in einem Verhältnisse, welches man nach Messung des Einfallswinkels berechnen kann. Mit dem vollständig polarisirten ersten Strahle wird also eine Menge theils entgegengesetzt polarisirten, theils natürlichen Lichts des zweiten gemischt. Dieses gemischte Licht geht nun schliesslich durch eine senkrecht zur Schnittebene Kalkspathplatte und einen Turmalin. Ist die Menge polarisirten Lichts in beiden Strahlen gleich gross, so sieht der Beobachter nichts von dem Kreuz mit Ringen. Ist die Menge polarisirten Lichts grösser, so sieht man das Kreuz mit Ringen. Ist die Menge polarisirten Lichts kleiner, so sieht man das Kreuz mit Ringen. Die Empfindlichkeit des Auges für die Polarisationsfigur des Krystals zeigte sich ausserordentlich gross, so dass bei wiederholten Einstellungen das Verhältniss der Intensitäten sich nur um ein  $\frac{1}{200}$  veränderte. Eine noch grössere Genauigkeit hat WILD<sup>1</sup> in seinem neueren Photometer gefunden, wo er statt der polarisirten Glasplatten doppeltbrechende Krystalle und als Vergleichsplatte zwei gekreuzte Bergkrystallplatten benutzte, welche unter  $45^\circ$  gegen die Axen der Krystalle stehen. Durch Linsen sind die Strahlen, die hindurchgehen, parallel gemacht. Die Vergleichsplatten zeigen ein geradliniges Fransensystem, von dem bei passender Einstellung des Apparates nur ein Querstreifen ausgelöscht wird, während zu beiden Seiten des Querstreifens complementäre Fransen entstehen. Der Beobachter kann sehr genau auf die Mitte der Fransen das Fadenkreuz einstellen. Nach WILDS Angaben beträgt der bei einmaliger Einstellung nur zwischen 0,001 und 0,002 der Lichtstärke. THOMSON<sup>2</sup> hat zur Schwächung des Lichts eine rotirende Scheibe mit schwarzen und weissen Segmenten angewendet, und dieses Mittel ist auch von BABINET und SECCHI<sup>3</sup> zur Messung der Sternhelligkeiten, später von AUBERT (s. § 22) angewendet worden. POUILLET<sup>4</sup> ist zur Erleichterung des physiologischen Theils der photometrischen Messungen vorgeschlagen worden, Lichtbilder zu gebrauchen, die nach DAGUERRES Verfahren auf Silberplatten ausgeführt sind. Um ein solches Bild positiv zu sehen, muss die Platte von der Seite beleuchtet sein, der Beobachter aber muss so stehen, dass er irgend einen dunklen Körper, aber nicht das einfallende Licht von der Platte gespiegelt erblickt. Wenn er im Gegentheil einen sehr hellen Körper von der Platte gespiegelt, so erscheint das Bild negativ, was hell sein sollte, dunkel, und umgekehrt. Dazwischen aber giebt es gewisse Helligkeit der gespiegelten Fläche, bei welcher das Bild ganz verschwindet, und es bei der geringsten Vermehrung oder Verminderung der Helligkeit positiv oder negativ auftaucht.

Die Methode von den bisherigen ganz abweichendes physiologisches Princip der Photometrie nach SCHAFHÄUTL<sup>5</sup> benutzt, für dessen Richtigkeit er aber bisher den Beweis noch schuldig ist. Er behauptet, das Zeitintervall, welches zwischen zwei gleichartigen Lichtreizen verfliesen kann, ohne dass das Auge die Unterbrechung bemerkt, sei proportional der Wurzel aus der Intensität des Lichts. Sein Apparat besteht aus einer Stahlplatte, die an ihrem unteren Ende so eingeklemmt ist, dass sie in ihrer Gleichgewichtslage horizontal steht. An ihrem oberen Ende trägt sie einen rechtwinkligen Schirm von geschwärzten Kupferblech, der in der Mitte von einer rechteckigen Öffnung durchbrochen ist. Durch eine horizontale, von zwei Dioptern geschlossene Röhre sieht der Beobachter auf den Schirm, welchen die Feder trägt; dahinter ist die Lichtquelle so angeordnet, dass ihr Licht nur dann in das Auge des Beobachters dringen kann, wenn der Schirm in der Axe der Diopterröhre sich befindet. Die Feder wird so gespannt, bis das Bild der Lichtquelle nicht mehr zitternd, sondern ruhig erscheint.

WILD, *Mittheil. der bernischen naturf. Ges.* 1859. No. 427—429.

TALBOT, *Pogg. Ann.* XXXV. 457. 464. *Phil. Magaz.* Nov. 1834. p. 327. Darüber PLATEAU in *Acad. de Bruxelles.* 1835. p. 52.

BABINET und SECCHI, *Arch. d. sc. phys. de Genève.* XX. 121—122. *Memorie dell' osservatorio di Roma.* I. 43.

POUILLET, C. R. XXXV. 373—379. *Pogg. Ann.* LXXXVII. 490—498. *Inst.* 1852. p. 301. *Cosmos.* 1852. p. 49.

SCHAFHÄUTL, *Abbildung und Beschreibung des Universal-Vibrations-Photometer.* *Münchener Ber.* VII. 465—497.

Die Lichtintensitäten sollen den Quadraten der Schwingungszeiten (umgekehrt?) proportional sein, oder den vierten Potenzen der Federlängen. Selbst wenn wir die erste Proportionalität zugeben wollten, würde die letztere bei einer schwingenden belasteten Feder nicht zutreffen.

Endlich ist hier noch die Methode zu erwähnen, welche FRAUNHOFER<sup>1</sup> gebraucht hat, um die Lichtstärke der verschiedenen Farben des Spectrum von Glasprismen untereinander zu vergleichen. Das Spectrum, wurde wie gewöhnlich, durch ein Fernrohr beobachtet, vor dessen Objectiv *A* (Fig. 178) ein Prisma *P* gesetzt ist. *B* ist die Ocularlinse. Innerhalb der Ocularröhre ist




Fig. 178.

45° gegen die Axe des Fernrohrs geneigt, ein kleiner Stahlspiegel *s* befestigt, dessen eine scharfe Kante in der Brechenebene des Oculars liegt und die Fernrohraxe schneidet. In der vom Spiegel nicht bedeckten Hälfte der Ocularblende erscheint ein Theil des prismatischen Spectrum. Der Spiegel dagegen reflectirt das Licht einer kleinen Ölf Flamme *L*, welche einem seitlich der Ocularröhre angeordnet, oben und unten aufgeschlitzte Rohre verschiebbar ist. Vor dieser Flamme ist eine kleine Blende *b* eingebracht, durch die die sichtbare leuchtende Fläche begrenzt ist. Dem Beobachter erscheint dieses Licht nur in einem breiten Zerstreuungskreise, dessen

334 Helligkeit dem Quadrate der Entfernung  $s b$  umgekehrt proportional ist. Man verschiebt nun die Lampe so lange, bis die Helligkeit der beiden in der Ocularblende erscheinenden Halbkreise gleich ist, d. h. bis die Grenze beider an unendlichsten erscheint. Die Versuche von FRAUNHOFER haben sehr wenig übereinstimmende Zahlen für die Helligkeit der verschiedenen Theile des Spectrum gegeben, wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil ihm der Einfluss der absoluten Intensität auf die relative Helligkeit der Farben unbekannt war.

Die ersten Messungen über die Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede hat BOUGUER ausgeführt und dabei gefunden, dass die wahrnehmbare Differenz ein nahezu constanter Bruchtheil der ganzen Intensität sei. Dasselbe Gesetz wurde später von STEINHEIL, MASSON, ARAGO, VOLKMANN bei photometrischen Messungen wiedergefunden und von FECHNER ausführlich behandelt.

Die Beobachtungen über die verschiedene relative Helligkeit der Farben sind zum Theil von PURKINJE, später vollständig von DOVE, an Spectralfarben von HELMHOLTZ ausgeführt.

Unter den Gegenständen dieses Paragraphen sind über die Irradiation die meisten Untersuchungen und Streitigkeiten geführt worden. Die Thatsache, dass helle Gegenstände unter Umständen vergrößert erscheinen, drängte sich natürlich schon früh der Beobachtung auf. PLATEAU citirt EPICURS Brief an PYTHOCLES, in dem erwähnt wird, dass eine Flamme bei Tage in der Ferne kleiner aussehe, als bei Nacht, und dass deshalb auch wohl die Sterne zu groß erscheinen könnten; dann den Anfang der dritten Satire des PERSIUS. — *Jam clarum mane fenestras Intrat et angustas extendit lumine rimas.*

Später waren es besonders die Astronomen, welche die Erscheinungen der Irradiation untersuchten, weil sie sich bei ihren Beobachtungen über die Größe der Himmelskörper störend bemerklich machte. KEPLER<sup>2</sup> schob sie hauptsächlich auf mangelnde Accommodation.

<sup>1</sup> FRAUNHOFER, *Gilberts Ann.* 1817. Bd. 56. S. 297.

<sup>2</sup> KEPLER, *Paralipomena.* p. 217, 220. 285.



damit allerdings das Wesentliche der meisten dazu gehörigen Erscheinungen. Ebenso stüdierte sie GALILEI<sup>1</sup> genauer; er spricht es aus, daß sie ist, je größer der Unterschied des hellen Objects und des dunklen le Objects stets vergrößert, dagegen dunkle Objecte auf hellem Grunde (nämlich vor der Sonne) verkleinert erscheinen, daß die Vergrößerung am bedeutendsten ist. Anfangs glaubte er, wie GASSENDI,<sup>2</sup> annehmen zu können, daß leuchtende Gegenstände die umgebende Luft entzündeten, später aber und richtiger in unregelmäßigen Brechungen im Auge. Auch GASSENDI<sup>3</sup> glaubte, daß die Sterne bei Nacht größer erschienen, weil die Pupille weiter sei. Auch wankte der Durchmesser des Mondes, je nach der Helligkeit des Grundes. Die Verkleinerung kleiner Gegenstände auf hellem Grunde erörtert DESCARTES<sup>4</sup>, der zugleich die Behauptung aufstellte, daß das Licht am Rande sich zum Theil in den Schattenraum hinein ausbreite, wie denn auch die Irradiation durch Diffraction zu erklären suchte. Dagegen suchte GALILEI<sup>5</sup> seinen Sinne zu vertheidigen, daß die Irradiation ihren Sitz im Auge habe, meinte, daß beim Anblick heller Gegenstände die Pupille sich verengere, nahe sehenden ähnlich werde, und dadurch die Beurtheilung der Entfernung solcher Objecte verändert werde, außerdem aber könne die Bewegung der Pupille, wenn sie sehr heftig werde, auf die benachbarten übertragen werden, so daß das empfundene Bild größer erscheine. Hierdurch ist DESCARTES<sup>6</sup> der Übertragung der Nervenirritation gegründeten Theorie der Irradiation. In späterer Zeit haben die Astronomen stark vergrößernde und gutgearbeitete Fernrohre anfangen, machte sich die Irradiation bei den größeren Gestirnen bemerkbar, und man fing an, sie zu bezweifeln und zu leugnen,<sup>7</sup> während man ihre Existenz anerkannte.<sup>8</sup> Bei den astronomischen Beobachtungen ist es die Regel die Wirkungen der chromatischen und sphärischen Aberration des Fernrohrs zu berücksichtigen, und es mußte hier nothwendig Fernrohre, welche Fernrohre gebrauchten, verschieden ausfallen, je nach der Qualität des Fernrohrs. Daß bei den besten Fernrohren die Irradiation gegenwärtig nicht mehr merklich macht, hat namentlich BESSEL 1832 beim Anblick der Sonne gezeigt.

Astronomen meistens nur die Frage verhandelten, ob Irradiation bei der Beobachtung der Sonne eine Frage über ihre Ursachen dagegen übergingen, fingen andere Naturforscher an, die letztere Frage zu behandeln. J. MÜLLER<sup>9</sup> betrachtete anfangs die Irradiation als oben gethan haben, als eine Ausbreitung objectiven Lichts, später wie die meisten anderen Physiologen jener Zeit, in welcher sich auch die Theorie der Empfindungen entwickelte, durch die sehr ausführliche Arbeit von BESSEL<sup>10</sup> Irradiation bewogen, sie von einer Übertragung der Reizung von einem Object auf das andere abzuleiten. Die Erscheinungen, welche PLATEAU<sup>11</sup> beobachtet, sind von der Art, wie sie ein schwach kurzsichtiges Auge an der Beobachtung ändern sehen muß, es sind also meist Erscheinungen unvollkommener

<sup>1</sup> *di Galilei*. T. II. p. 18: 255—257, 396: 467—469. *Systema cosmicum*. Lyon 1641

<sup>2</sup> *omnia*. Florenz 1727. T. III. p. 385, 567, 583—585. T. I. pag. 499—508.

<sup>3</sup> *responsi ad epistolam P. Grassi de Mercurio sub sole viso*. Tubingae 1632.

<sup>4</sup> *de l'Acad. d. Sc. de Paris*. 1784. p. 469. (Gelesen 1743.)

<sup>5</sup> *in sole viso*. Cap. XVI. Abgedruckt hinter HEVELIUS' *Mercurius in sole viso*.

<sup>6</sup> *mémoire d'Astronomie physique*, édit. 2me. pag. 534, 536. — DELAMBRE. *Astronomie*. I. chap. 26. § 197. T. III. chap. 29. § 12. — BESSEL. *Astronomie*. Nachrichten

<sup>7</sup> *Cours de physique* etc. 1810. p. 23. — J. HERSCHEL. *On light*. T. I. §. 697. —

<sup>8</sup> *Physique*. 1829. T. III. p. 81. — BRANDES in *Physikalisches Wörterbuch*. Neuhausen. Mem. of the Roy. Astron. Soc. of London. V. p. 1.

<sup>9</sup> *Vergleichende Physiologie des Gesichtsinnes*. 1826. S. 400.

<sup>10</sup> *de l'Acad. de Bruxelles*. T. XI. *Pogg. Ann.* Ergänzungsband. 1. S. 79, 193, 405.



Accommodation. Diese Deutung weist er aber zurück, weil er auch die geringe Irradiation, welche sehr helle Gegenstände in der Entfernung des deutlichen Sehens zeigen, beobachtet hatte, und die übrigen Ursachen der Lichtzerstreuung im Auge, welche in diesem Falle wirksam werden, noch nicht kannte. Er stützt sich ferner darauf, daß nach seinen Versuchen die Irradiation bei verschieden entfernten Objecten immer dieselbe Winkelgröße behalte; doch beziehen sich seine Messungen nur auf Entfernungen von mehr als 0,6 Meter, also auf Distanzen, innerhalb deren sich der Accommodationsfehler nicht merklich änderte. Auffallend ist, daß ihn seine Versuche mit Linsen, die die richtige Sehweite herstellten und damit die Irradiation aufhoben, nicht auf die richtige Erklärung geleitet haben. Ebenso möchte es schwer sein, seinen Satz, daß zwei benachbarte Irradiationen sich gegenseitig schwächen, mit irgend einer Voraussetzung, wie Manempfindungen erregt werden mögen, zu vereinigen. Denn wenn die Netzhauttheile, welche im Bilde des schwarzen Streifens liegen, von beiden Seiten her in Erregung versetzt werden, muß ihre Erregung nothwendig stärker werden, als wenn nur an einer Seite ein helles Feld anstößt. PLATEAU muß die genannte Behauptung aufstellen, um zu erklären, daß ein feiner schwarzer Strich auf einem hellen Felde überhaupt noch gesehen wird, wenn der Strich schmaler ist, als die Breite der Irradiationssäume; während sich Alles einfach erklärt, wenn man annimmt, die Irradiation rühre von Zerstreuungsbildern her.

Eine Kritik der Arbeit von PLATEAU hat FECHNER<sup>1</sup> und später ausführlicher H. WELCKER<sup>1</sup> gegeben und die Erklärung von KEPLER wiederhergestellt, welche in der That bei Weitem die meisten Fälle der Irradiation umfaßt. Hinzuzusetzen wäre der WELCKERSchen Arbeit eben nur noch, daß sehr kleine und sehr helle Gegenstände auch in der Entfernung des deutlichsten Sehens Irradiation zeigen wegen der übrigen Arten der Abweichung der Strahlen im Auge. An WELCKER schlossen sich Andere an, welche die verschiedenen Arten der Lichtzerstreuung im Auge für die Erklärung der Irradiation gebrauchten, namentlich lenkten FLIEDNER<sup>2</sup> und H. MEYER<sup>3</sup> (Leipzig), CRAMER die Aufmerksamkeit auf die monochromatischen Abweichungen des Auges, FICK auf die chromatische. Es fehlte aber den bisher gegebenen objectiven Erklärungen der Irradiation immer noch der Grund, warum nur die Erhöhung der Helligkeit auf dem dunklen Grunde, und nicht zugleich die Schwächung am Rande der hellen Fläche wahrgenommen wird. Diesen, meint der Verfasser, in der obigen Darstellung nachgewiesen zu haben.

## §. 22. Die Dauer der Lichtempfindung.

337 Wenn ein Muskelnerv durch einen kurzdauernden elektrischen Schlag erregt wird, so vergeht eine kurze Zeit (etwa  $\frac{1}{60}$  Sec.), ehe die Wirkung der Reizung durch Contraction des Muskels sichtbar wird, und es vergeht eine viel längere Zeit (etwa  $\frac{1}{6}$  Sec.), ehe die Wirkung der Reizung auf den Muskel wieder verschwindet. Die Veränderung, welche durch die Reizung in den organischen Theilen eintritt, verläuft also viel langsamer, als die elektrische Entladung, welche die Reizung bewirkte. Dasselbe findet im Auge statt. Wir können allerdings bis jetzt noch nicht nachweisen, daß die Empfindung später entsteht, als das Licht einzuwirken anfängt, aber wohl, daß sie noch andauert, wenn das Licht schon aufgehört hat, einzuwirken.

Die Dauer der Nachwirkung ist desto größer, je stärker das einwirkende Licht gewesen ist, und je weniger ermüdet das Auge. Wenn man einen Augenblick nach der Sonne oder in eine helle Lichtflamme geblickt hat und

<sup>1</sup> H. WELCKER, *Über Irradiation und einige andere Erscheinungen des Sehens*. Giessen 1852.

<sup>2</sup> FLIEDNER, *Pogg. Ann.* LXXXV. 348.

<sup>3</sup> H. MEYER, *Pogg. Ann.* LXXXIX. 540.

dann plötzlich die Augen schließt und mit der Hand bedeckt, oder in einen absolut dunklen Hintergrund blickt, so sieht man noch kurze Zeit auf dem dunklen Grunde eine helle Erscheinung von der Gestalt des vorher gesehenen hellen Körpers, welche allmählich erbläst und dabei auch ihre Farbe verändert. Die Nachbilder sehr heller Objecte sind am leichtesten zu sehen, weil sie am längsten dauern. Übrigens kann man auch von weniger hellen Objecten solche Nachbilder, wie sie hier beschrieben sind, erhalten, wenn nur das Auge vorher im Dunkeln gehörig ausgeruht ist, und man dann für einen Augenblick das Object betrachtet. Ein solches Nachbild eines hellen Körpers auf dunklem Grunde hat im ersten Augenblicke die Farbe des Objects und zeigt oft sehr genau noch die einzelnen Theile des Objects in richtiger Gestalt und Schattirung. Dreht man z. B. in einem übrigens unbeleuchteten Zimmer eine Lampe aus, indem man im letzten Augenblicke nach der Flamme hinblickt, so sieht man nachher noch im Dunkeln das helle Bild der Flamme, umgeben von dem etwas schwächeren der Glocke u. s. w. Ändert man die Richtung des Auges, so bewegt sich das Nachbild in gleichem Sinne, so daß es immer diejenige Stelle des Gesichtsfeldes einnimmt, welche der ursprünglich vom Lichte getroffenen Stelle der Netzhaut entspricht. Damit das Nachbild recht scharf gezeichnet sei, ist es nöthig am Object einen einzigen Punct scharf zu fixiren. Wenn das Auge gewankt hat, ist das Nachbild verwaschen, oder man sieht auch wohl zwei oder drei Bilder des Objects sich theilweise deckend. Ist das Bild recht scharf gezeichnet, so kann man unter günstigen Umständen an diesem Nachbilde Einzelheiten bemerken, auf die man während der Betrachtung des Objects selbst die Aufmerksamkeit nicht gewendet, und die man deshalb übersehen hatte.

Dergleichen Nachbilder heller Objecte, in denen die hellen Theile des Objects hell, die dunkeln dunkel erscheinen, und die deshalb positive Nachbilder genannt werden, vermischen sich übrigens gewöhnlich, während sie allmählich verschwinden, mit anderen Bildern, in denen das Helle des Objects dunkel, das Dunkle hell erscheint, mit negativen Nachbildern, welche hauptsächlich dadurch hervorgerufen zu sein scheinen, daß die Empfindlichkeit der Netzhaut für Licht ebenfalls durch die vorausgegangene Lichtwirkung verändert worden ist. Es lassen sich diese beiden Arten von Erscheinungen in der Beschreibung nicht streng von einander trennen. Ich werde deshalb die genauere Schilderung der positiven Nachbilder erst im nächsten Paragraphen mit der der negativen zusammen geben, und in diesem Paragraphen mich darauf beschränken die Wirkungen schnell wiederholter 238 Lichteindrücke zu beschreiben, bei denen die Nachdauer des Lichteindrucks rein zur Erscheinung kommt, ohne wesentlich durch die veränderte Reizempfindlichkeit des Auges gestört zu werden.

Die Hauptthatsache dieses Gebietes ist die, daß hinreichend schnell wiederholte Lichteindrücke ähnlicher Art dieselbe Wirkung auf das Auge ausüben, wie eine continuirliche Beleuchtung.



Die Wiederholung des Eindrucks muß zu dem Ende nur so schnell geschehen, daß die Nachwirkung eines jeden Eindrucks noch nicht merklich nachgelassen hat, wenn der nächste eintritt.

Am leichtesten zeigen dies die rotirenden Scheiben. Wenn sich auf einer schwarzen Scheibe ein heller weißer Punct befindet, und die Scheibe rotirt schnell genug, so erscheint an Stelle des rotirenden Punctes ein grauer Kreis, der in allen seinen Puncten ganz gleichmäÙig aussieht, und an welchem nichts mehr von Bewegung zu entdecken ist. Indem das Auge nämlich irgend eine Stelle des scheinbar ruhenden Kreises fixirt, werden die Stellen der Netzhaut, auf welchen der Kreis sich abbildet, in schneller Wiederholung von dem Bilde des weißen Punctes getroffen, der sich in dem Kreise bewegt. Sie empfangen also einen Lichteindruck, der wegen der Schnelligkeit der Wiederholung continuirlich erscheint und natürlich nicht so stark ist, als wenn fortdauernd weißes Licht auf die Netzhaut fiel; daher nicht weiß, sondern grau erscheint. Bewegt sich dagegen das Auge selbst, so daß sein Fixationspunct sich in derselben Richtung fortbewegt, wie der helle Punct, so kann letzterer sichtbar und die scheinbare Continuität des grauen Kreises dadurch unterbrochen werden. Es ist leicht ersichtlich, daß, wenn der Fixationspunct des Auges sich eine Zeit lang genau ebenso schnell und in derselben Richtung fortbewegte, wie der helle Punct, und immer auf diesen geheftet bliebe, sich das Bild des hellen Punctes dauernd auf dem gelben Flecke der Netzhaut befinden würde, und auf die übrigen Stellen des Augengrundes nur das Bild der dunklen Scheibe fallen würde. Unter diesen Umständen erkennt das Auge die Anwesenheit eines weißen Fleckes an Stelle des grauen Kreises; ebenso wenn die Bewegungen des Fixationspunctes und des hellen Flecks zwar nicht ganz congruent sind, aber die relative Bewegung beider gegen einander verhältnißmäÙig gering ist.<sup>1</sup>

339 Befindet sich auf der Scheibe noch ein zweiter heller Punct in derselben Entfernung vom Mittelpuncte wie der erste, so wird auch der zweite scheinbar zu einem hellen Kreise ausgebreitet, welcher mit dem hellen Kreise des ersten Punctes zusammenfällt. Die Eindrücke beider Puncte auf der Retina addiren sich. Ebenso wenn eine gröÙere Zahl heller Puncte auf demselben Kreise stehen. Wenn man sich daher auf einer solchen rotirenden Scheibe Kreislinien gezogen denkt, deren Mittelpunct in der Rotationsaxe der Scheibe liegt: so geben bei der Rotation alle Puncte einer solchen Kreislinie, einzeln genommen, das Bild einer gleichmäÙig beleuchteten Kreislinie, und alle diese kreisförmigen Bilder der einzelnen Puncte fallen auf dieselben Theile der Netzhaut und vereinigen sich hier zu einem Gesamtbilde. Für diese Erscheinung kann man nun folgendes Gesetz aufstellen: Jede Kreislinie der Scheibe, deren Mittelpunct in der Rotationsaxe liegt, erscheint so, als ob alles Licht, welches sämmtliche Puncte der Kreislinie

<sup>1</sup> Siehe DOVE in *Pogg Ann.* LXXI. 112. 1846. STEVELLY in *SILLIM J.* (2.) X. 401. 1850. — MONTIGNI. *Bull. de Bruxelles.* XVIII. 2. p. 4. Institut 1847. No. 928. p. 332.

n sich geben, gleichmäfsig über die ganze Länge der Kreis-  
ie verbreitet wäre, und zwar scheint dieses Gesetz ebenso gut für ein-  
biges wie für vielfarbiges Licht zu gelten. Beziehen wir dieses Gesetz  
die Thätigkeit der Netzhaut selbst, so können wir es so aussprechen:  
enn eine Stelle der Netzhaut von periodisch veränderlichem  
d regelmäfsig in derselben Weise wiederkehrendem Lichte  
troffen wird, und die Dauer der Periode hinreichend kurz ist,  
entsteht ein continuirlicher Eindruck, der dem gleich ist,  
lcher entstehen würde, wenn das während einer jeden Pe-  
de eintreffende Licht gleichmäfsig über die ganze Dauer der  
riode vertheilt würde.

Um die Richtigkeit dieses Gesetzes zu prüfen, construirt man sich  
che Scheiben, wie *Fig. 179*. Der innerste Ring zeigt die halbe Peripherie  
eifs, die andere Hälfte Schwarz; im mitt-  
en Ringe sind zwei Viertel, d. h. wieder  
halbe Peripherie, weifs, im äufseren ebenso  
r Achtel, der Rest schwarz. Läßt man eine  
che Scheibe rotiren, so erscheint sie in  
hrer ganzen Ausdehnung ganz gleichmäfsig  
au gefärbt. Nur muß man darauf achten,  
s die Scheibe schnell genug rotirt, um  
ch im innersten Ringe einen vollkommen  
tinuirlchen Eindruck zu geben. Ebenso  
n man auch das Weifs über andere be-  
ig lange Bogenstücke der Peripherie ver-  
ellen: vorausgesetzt nur, daß in allen  
ogen der Scheibe die Summe der Winkel, welche das Weifs einnimmt,  
ich groß ist, dann geben alle immer dasselbe Grau. Statt des Schwarz  
l Weifs kann man auch verschiedene Farben nehmen, und erhält in allen  
ogen dieselbe Mischfarbe, wenn die Summe der Winkel, welche jede  
r beiden Farben in den verschiedenen Ringen einnimmt, gleich groß ist.  
Auf diese Weise kann man leicht eine große Menge von Prüfungen  
Gesetzes ausführen, aber freilich immer nur intermittirendes Licht mit  
ermittirendem vergleichen, und zwar nur unter Umständen, wo die  
alität der beiden Eindrücke, welche abwechseln, in den verschiedenen  
glichen Fällen dieselbe ist.

Um nun die Richtigkeit des Gesetzes auch für solche Fälle zu verifi-  
en, wo intermittirendes Licht mit continuirlichem verglichen werden soll,  
be ich die in *Fig. 179* abgebildete Scheibe angewendet, auf welcher Weifs  
d Schwarz gleich große Winkel einnehmen. Bei der Rotation erscheint  
a Grau von der halben Lichtstärke des Weifs. Nun kann man andererseits  
solches Grau hervorbringen, wenn man auf eine schwarze Tafel einen 340  
eissen Streifen legt und diesen durch ein doppeltbrechendes Prisma an-  
ht. Dann erscheinen zwei Bilder des Streifens, jedes aber von der



*Fig. 179.*

halben Helligkeit. Eine grössere graue Fläche dieser Art erhält man, wenn man abwechselnd gleich breite weisse und schwarze Streifen auf der Tafel anbringt und sich mit dem doppeltbrechenden Prisma in eine solche Entfernung stellt, daß die Doppelbilder der weissen Streifen sich genau mit denen der schwarzen decken; dann erscheint die ganze Fläche grau mit der halben Helligkeit des weissen Streifens. Dieses Grau ist nun genau dasselbe, welches durch Umdrehung der Scheibe *Fig 179* entsteht. Natürlich muß man bei der Vergleichung zu letzterer dasselbe Schwarz und Weiss nehmen, aus dem man die parallelen Streifen gemacht hat, muß beide Flächen genau gleich beleuchten und auch die rotirende Scheibe durch das doppeltbrechende Prisma betrachten, aber so, daß sich ihre beiden Bilder nicht trennen, damit auch das Licht der Scheibe der Reflexion und Absorption im Prisma ebenso unterworfen wird, wie das der weissen Streifen. PLATEAU erwies dasselbe Gesetz auf folgendem Wege. Er brachte eine rotirende Scheibe mit weissen und schwarzen Sektoren und eine ganz weisse in verschiedener Entfernung von einem Lichte, bis ihre Helligkeit gleich groß erschien. Ist die Zahl der weissen Sektoren  $n$ , und die Breite jedes einzelnen in Winkelgraden gleich  $w$ , so ist die Breite aller zusammengekommen gleich  $nw$ . Hat nun das Weiss in der Entfernung 1 von der Lichtquelle die Helligkeit  $H$ , und denken wir das Licht, welches es aussendet, über die ganze Scheibe gleichmäfsig verbreitet, so wird die Helligkeit geschwächt in dem Verhältnisse, welches die Fläche der ganzen Scheibe zu der der weissen Sektoren hat. Die Helligkeit wird also  $\frac{nw}{360} H$ .

Wenn nun die rotirende Scheibe in der Entfernung  $r$  von der Lichtquelle gleich hell ist mit einer ganz weissen Scheibe in der Entfernung  $R$ , so muß sein

$$\frac{nw}{360} \frac{H}{r^2} = \frac{H}{R^2} \text{ oder } \frac{r^2}{R^2} = \frac{nw}{360}.$$

Die Messungen PLATEAUS stimmen mit diesem Gesetz auch genügend überein.

Ich selbst habe ausserdem auch noch folgenden Weg eingeschlagen. Wenn man eine mit schmalen schwarzen und weissen Sektoren bedeckte Scheibe hat, so kann man eine scheinbar gleichmäfsige Vertheilung des Lichtes der weissen Sektoren über die ganze Scheibe hervorbringen, indem man zwischen Auge und Scheibe eine convexe Glaslinse bringt, welche die Accommodation verhindert. Steht die Pupille im hinteren Brennpunkte der Linse, so daß das Bild, welches die letztere von der Scheibe entwirft, in die Fläche der Pupille fällt, und grösser ist als die Pupille, so erscheint das Licht der hellen Sektoren gleichmäfsig über das ganze durch die Linse gesehene Gesichtsfeld ausgegossen. Nähert man dagegen die Linse der Scheibe, so sieht das Auge mehr oder minder scharf die einzelnen weissen und schwarzen Sektoren, so lange die Scheibe stillsteht. Ist die Scheibe in

wegung, so bleibt die Helligkeit gleich groß, man mag die Linse dem Auge oder der Scheibe näher bringen, woraus unmittelbar folgt, daß das Licht von dem intermittirenden Licht gleich stark, wie von einer gleichen Intensität continuirlich ankommenden Lichts afficirt wird.

Für farbiges Licht geht die Richtigkeit des oben hingestellten Satzes aus den Versuchen von DOVE hervor über die Erscheinungen, welche rotirende Polarisationsapparate darbieten. Wenn zwischen zwei Nicol'sche Prismen zwei doppelbrechende Krystallplatten eingeschaltet sind, so entstehen bekanntlich in vielen Fällen bei gewissen Stellungen der genannten Prismen Farben, die gleichmäßig über das ganze Feld verbreitet sind, theils farbige Figuren bilden. Bei allen diesen Erscheinungen bekommt aber jeder Punkt der Scheibe, wie theoretisch in der Lehre von der Polarisation des Lichts nachzuweisen werden kann, genau die Complementärfarbe, wenn man das eine Nicol'sche Prisma um einen rechten Winkel dreht. Der Versuch bestätigt nun, daß bei schneller Rotation des einen Nicol das Auge weiß sieht. Hält man noch ein farbiges Glas ein, so erhält man bei zwei um  $90^\circ$  verschiedenen Stellungen des einen Nicol Farben, welche vereinigt die Complementärfarbe des Glases geben müssen und bei schneller Rotation auch wirklich geben.

Übrigens wird unser Gesetz für intermittirendes farbiges Licht auch bestätigt durch die Übereinstimmung, welche die Resultate der Farbenmischung auf der drehenden Scheibe mit denen haben, die man durch directe Zusammensetzung des farbigen Lichts gewinnt, was in § 20 bei der Lehre von der Farbenmischung schon erwähnt ist. Will man die ganze Scheibe gleichmäßig mit der Farbe überzogen sehen, so pflegt man die Scheibe in Sektoren abzutheilen und den einzelnen Sektoren verschiedene Färbung zu geben, die aber in der Ausdehnung jedes einzelnen Sektors ganz constant sein muß. Dann erscheint bei der Rotation die ganze Scheibe in der Mischfarbe. Die Lichtstärke der Mischfarbe ist aber dabei nach dem obigen Gesetz immer das Mittel aus der Lichtstärke der einzelnen gemischten Farben, und da alle Farbstoffe bei gleicher Beleuchtung dunkler als weiß erscheinen, indem sie nur gewisse Farben, die einen Theil des gesammten weißen Lichts bilden, reflectiren, so ist auch die Mischfarbe immer lichtschwächer, als Weiß, erscheint so, wenn sie wenig gesättigt ist, grau.

Führt man auf einer Farbenscheibe einen farbigen Stern auf andersfarbigem Grunde aus, wie Fig. 180, so sieht man bei der Rotation der Scheibe in der Mitte die Farbe des Sterns, am Rande die des Grundes, dazwischen alle continuirlichen Übergangsstufen der einen Farbe durch die Reihe der Mischfarben in die andere. überhaupt kann man auf den rotirenden Scheiben die Helligkeit oder die Farbenmischung von




Fig. 180.



halben Helligkeit. Eine grössere graue Fläche dieser Art erhält man, wenn man abwechselnd gleich breite weisse und schwarze Streifen auf der Tafel anbringt und sich mit dem doppeltbrechenden Prisma in eine solche Entfernung stellt, daß die Doppelbilder der weissen Streifen sich genau mit denen der schwarzen decken; dann erscheint die ganze Fläche grau mit der halben Helligkeit des weissen Streifens. Dieses Grau ist nun genau dasselbe, welches durch Umdrehung der Scheibe *Fig 179* entsteht. Natürlich muß man bei der Vergleichung zu letzterer dasselbe Schwarz und Weiss nehmen, aus dem man die parallelen Streifen gemacht hat, muß beide Flächen genau gleich beleuchten und auch die rotirende Scheibe durch das doppeltbrechende Prisma betrachten, aber so, daß sich ihre beiden Bilder nicht trennen, damit auch das Licht der Scheibe der Reflexion und Absorption im Prisma ebenso unterworfen wird, wie das der weissen Streifen. PLATEAU erwies dasselbe Gesetz auf folgendem Wege. Er brachte eine rotirende Scheibe mit weissen und schwarzen Sektoren und eine ganz weisse in verschiedener Entfernung von einem Lichte, bis ihre Helligkeit gleich groß erschien. Ist die Zahl der weissen Sektoren  $n$ , und die Breite jedes einzelnen in Winkelgraden gleich  $w$ , so ist die Breite aller zusammengekommen gleich  $nw$ . Hat nun das Weiss in der Entfernung 1 von der Lichtquelle die Helligkeit  $H$ , und denken wir das Licht, welches es aussendet, über die ganze Scheibe gleichmäfsig verbreitet, so wird die Helligkeit geschwächt in dem Verhältnisse, welches die Fläche der ganzen Scheibe zu der der weissen Sektoren hat. Die Helligkeit wird also  $\frac{nw}{360} H$ .

Wenn nun die rotirende Scheibe in der Entfernung  $r$  von der Lichtquelle gleich hell ist mit einer ganz weissen Scheibe in der Entfernung  $R$ , so muß sein

$$\frac{nw}{360} \frac{H}{r^2} = \frac{H}{R^2} \text{ oder } \frac{r^2}{R^2} = \frac{nw}{360}.$$

Die Messungen PLATEAUS stimmen mit diesem Gesetz auch genügend überein.

Ich selbst habe ausserdem auch noch folgenden Weg eingeschlagen. Wenn man eine mit schmalen schwarzen und weissen Sektoren bedeckte Scheibe hat, so kann man eine scheinbar gleichmäfsige Vertheilung des Lichtes der weissen Sektoren über die ganze Scheibe hervorbringen, wenn man zwischen Auge und Scheibe eine convexe Glaslinse bringt, die die Accommodation verhindert. Steht die Pupille im hinteren Brennpunkt der Linse, so daß das Bild, welches die letztere von der Scheibe bildet, die Fläche der Pupille fällt, und gröfser ist, als die Fläche der Pupille, so wird das Licht der hellen Sektoren gleichmäfsig über das gesehene Gesichtsfeld ausgegossen. Nähert man sich der Scheibe, so sieht das Auge mehr oder weniger der schwarzen und schwarzen Sektoren, so lange die Scheibe nicht ganz hell wird.

während derselben keine Verschiebung des bewegten Körpers barer Gröfse eintreten konnte, so erscheinen seine Umrisse begrenzt, wie es bei vollkommener Ruhe der Fall sein würde. h nun eine Reihe von elektrischen Funken in sehr kleinen folgt, so erscheinen ruhende Körper bei dieser Beleuchtung bei continuirlichem Lichte; bewegte Körper aber erscheinen der einzelne Funke zeigt nämlich den bewegten Körper in der dem betreffenden Augenblicke einnimmt, und da alle diese Augenblick dauern, so sind sie alle gleichzeitig vorhanden bewegten Körper als mehrfach vorhanden erscheinen. Je Bewegung des gesehenen Körpers ist, desto weiter rücken seine 343 der, weil der Weg, den er während jeder Intermission des gt, gröfser wird.

scheinen nun mehrfache Bilder, wenn nicht die Objecte, ige bewegt wird. Wenn sich im Gesichtsfelde ein continuir- Punct befindet, und wir das Auge bewegen, so rückt dabei hten Punctes auf eine andere Stelle der Netzhaut hinüber. ewegung trifft es nach einander alle continuirlich an einander te einer Linie, die den Ort seiner ersten und seiner letzten alle diese Punkte werden erregt, und es mufs dadurch für die Empfindung in der Netzhaut entstehen, welche bei eine lichte Linie hervorbringen würde. Gewöhnlich achten iese Empfindung, weil sie eben jede Bewegung des Auges art lichter Objecte im Gesichtsfelde begleiten mufs, wir be- ; wenn ungewöhnlicher Weise bei intermittirendem Lichte dieser Linie unterbrochen ist. Benutzen wir als lichtet des Inductionsapparates, wo die Funken überschlagen, so w egungen des Auges der helle Punct vervielfältigt. Denken auf der Netzhaut die Linie gezeichnet, welche das Bild ; beschreibt, so werden von den intermittirenden Funken llen dieser Linie erregt, denen entsprechend wir Bilder in projiciren.

ewegter Körper, den wir bei intermittirendem Lichte be- a sich zurücklaufende Bahn beschreibt und zur Zeit jedes u an derselben Stelle sich befindet, so erscheint er einfach

Zum Beispiel erscheint die schwingende Feder oder der der bekannten magnetelektrischen Inductionsapparate beim en Funken still zu stehen. Dasselbe geschieht, wenn irgend er von periodisch veränderlicher Gestalt durch intermitt- euchtet wird, und die Beleuchtung immer mit denselben ränderung zusammentrifft; z. B. wenn ein Wasserstrahl, der aflöst, so beleuchtet wird, dafs im Moment der Beleuchtung i immer wieder genau an derselben Stelle ist, so sieht der trahl in stillstehende Tropfen aufgelöst. Dies geschieht,

wenn die Periode der Beleuchtung genau gleich ist der Periode der Tropfenbildung oder einem Multiplum derselben. Fällt die Periode der Beleuchtung nicht genau zusammen mit der Periode der Tropfenbildung, oder einem Multiplum derselben, sondern ist jene ein Weniges länger, so tritt eine scheinbare langsame Bewegung der Tropfen ein, welche die wirkliche Bewegung nachahmt, aber mit sehr verringerter Geschwindigkeit. Es werden dann von den folgenden Funken nicht genau dieselben Phasen der Tropfenbildung beleuchtet, wie von dem ersten, sondern immer weiter fortgeschrittene Zustände der folgenden Perioden dieser veränderlichen Erscheinung. Ist die Periode der Beleuchtung dagegen etwas kürzer, als die Periode der Tropfenbildung oder ein Multiplum derselben, so sieht der Beobachter die Erscheinung rückwärts vor sich gehen. Die Tropfen steigen zum Strahle hinauf und gehen in diesen über. Durch diese Verhältnisse wird es möglich, diese und andere periodische Erscheinungen, welche so schnell vor sich gehen, 344 dafs der Beobachter sie mit dem Auge nicht unmittelbar erkennen kann, in ihren einzelnen Stadien sichtbar zu machen und zu analysiren. Einige künstlich hervorgebrachte Erscheinungen derselben Art werden unten bei Beschreibung der Apparate auseinandergesetzt werden.

Die Dauer des Lichteindrucks auf das Auge bestimmt man am leichtesten mit Hülfe von Farbenscheiben, die eine veränderliche und mefsbare Umlaufgeschwindigkeit haben. Mit Sicherheit läfst sich dabei nur die Umlaufgeschwindigkeit bestimmen, welche nöthig ist, um der Scheibe ein ganz gleichmäfsiges Ansehen zu geben. Es zeigt sich dabei, dafs sie desto gröfser gemacht werden mufs, je gröfser die Lichtstärke ist. Auch scheinen die verschiedenen Farben dabei Unterschiede zu zeigen. PLATEAU liefs bei gewöhnlichem Tageslichte eine mit 12 weissen oder farbigen und 12 gleich breiten schwarzen Sektoren versehene Scheibe rotiren. Die Dauer des Vorübergangs eines schwarzen Sectors war also der 24. Theil der Umlaufzeit der Scheibe. Diese Zeit war, wenn die Scheibe einen gleichmäfsigen Eindruck machte

	PLATEAU.	EMSMANN. <sup>1</sup>
Für Weiss	0,191 Secunden	0,25 Secunden
„ Gelb	0,199 „	0,27 „
„ Roth	0,232 „	0,24 „
„ Blau	0,295 „	0,22 bis 0,29.

Auf die Vergleichung der verschiedenen Farben wird hierbei kaum viel Werth gelegt werden können, da ein Mittel, ihre scheinbare Helligkeit genau gleich zu machen, fehlte, und die Helligkeit einen sehr grossen Einfluß auf die Dauer der Nachwirkung hat. Man erkennt dies leicht, wenn man, einige Fufs entfernt von einer Lampe, einen Farbenkreisel in Bewegung setzt, dessen Geschwindigkeit eben hinreicht, einen gleichmäfsigen Eindruck zu erzeugen, und dann die Lampe nähert, sogleich fängt die rotirende Fläche

<sup>1</sup> EMSMANN, *Pogg. Ann.* XCI. 611. 1854.

an zu flimmern. Bei directer Sonnenbeleuchtung muß man noch größere Umlaufgeschwindigkeiten anwenden. Übrigens sind PLATEAU'S Zahlen auffallend. Ich selbst finde, daß bei stärkstem Lampenlicht, welches eine Scheibe gleichmäßig breiten weißen und schwarzen Sektoren beleuchtet, der Vorübergehen des Schwarz nur etwa  $\frac{1}{48}$  Secunde und auch bei sehr schwacher Beleuchtung im Lichte des Vollmonds nur  $\frac{1}{20}$  Secunde zu dauern braucht, wenn man flimmern aufhören soll. Übrigens hat PLATEAU schon bemerkt, daß, wenn das Verhältniß zwischen der Breite der weißen und der der schwarzen Sektoren verändert, aber die Zahl der Sektoren constant läßt, die Umlaufgeschwindigkeit dieselbe ist, bei der der Eindruck gleichmäßig wird. Man kann

das sehr leicht nachweisen durch eine Scheibe, wie Fig. 181, an welcher die Sektoren nach der Mitte, die am Rande breiter sind. Das Flimmern hört bei steigender Umlaufgeschwindigkeit in allen Abtheilungen der Scheibe nahe gleichzeitig auf. Bei breiteren weißen Sektoren wird die Empfindung stärker und sinkt deshalb früher, sobald der Reiz fortfällt; daher die Zeit, d. h. die Breite des schwarzen Sector, sein muß, als bei schmalen weißen Sektoren. Es ist also wohl besser, bei den Versuchen nach der Größe einer ganzen



Fig. 181.

345

der Beleuchtungsänderung zu fragen, d. h. nach der Summe der Dauer des Übergangs eines weißen und schwarzen Sectors. Diese ist in meinen Versuchen bei stärkstem Lampenlicht also  $\frac{1}{24}$ , bei schwachem Licht  $\frac{1}{10}$  Secunden gewesen. LISSAJOUS, welcher den Weg eines sehr hellen Lichtpunctes verfolgte, der die Bewegungen schwingender Stimmgabeln mitmachte, fand die Umlaufzeit der Beleuchtung entsprechend eine noch kürzere Zeit, nämlich eine Secunde für die Zeit, während welcher die ganze Curve continuirlich sichtbar war. Nur darf man das Auge nicht bewegen; bei leisen Bewegungen der Scheibe tauchen sehr leicht wieder Flecken auf.

Man kann also eine rotirende Scheibe einen ganz gleichmäßigen Eindruck machen, so muß man sie 24 bis 30 Mal in der Secunde umlaufen lassen. Man kann dasselbe auch durch geringere Umlaufgeschwindigkeiten erreichen, wenn man die Zeichnung in gleichen Winkelabständen regelmäßig wiederholt. So wird z. B. auf der Scheibe Fig. 179 das Schwarz und Weiß der Sektoren des äußersten Ringes sich schon bei 6 Umläufen der Scheibe in einem gleichmäßigem Grau verbinden, das des mittleren Ringes erst bei 12, das des inneren erst bei 24 Umläufen. Schwerer ist es, die Zeit zu bestimmen, während welcher der Eindruck in abnehmender Stärke nachdauert, ehe er vollständig erlischt. Auch diese Zeit ist von der Lichtstärke abhängig, wie schon früher Gesagte erkennen läßt. Die Nachdauer des hellen Sonnenbildes kann selbst bis zu einigen Minuten dauern. Während also die Wirkung



hellen Lichts im Anfang am schnellsten abnimmt, hat sie doch im Ganzen die längste Dauer, ähnlich wie ein heißer Körper in kühler Umgebung um desto mehr Temperaturgrade in gleicher Zeit sich abkühlt, je heißer er ist, aber auch desto längere Zeit braucht, ehe er seine höhere Temperatur ganz verloren hat. PLATEAU hat an seinen Farbenscheiben auch in dieser Beziehung Messungen angestellt, welche die Zeit des Vorübergangs eines schwarzen Sectors ergeben, wenn die Farbe der hellen Sektoren sich über die schwarzen so ausgebreitet hatte, daß das Schwarz nirgends mehr rein erschien. Es ergab sich

für Weiß	0,35	Secunden
für Gelb	0,35	"
für Roth	0,34	"
für Blau	0,32	"

Eine verschiedene Dauer der Nachwirkung für die verschiedenen Farben zeigt sich auch noch in den Farbenveränderungen, welche das Nachbild eines weißen Lichts auf dunklem Grunde erleidet, ehe es ganz verschwindet. Da sich diese Erscheinungen aber mit denen, welche im folgenden Paragraphen beschrieben werden sollen, mannigfaltig vermischen, so möge erst dort ihre genauere Beschreibung folgen.

346 Aus den in diesem Paragraphen geschilderten Thatsachen geht hervor, daß Licht, welches die Netzhaut getroffen hatte, im Sehnervenapparate eine primäre Wirkung hinterläßt, die erst in den nächstfolgenden Augenblicken sich in Empfindung umsetzt. Die GröÙe der primären Veränderung, die ein momentaner Lichteindruck zurückläßt, hängt nur von der Quantität des Licht ab, die auf den betreffenden Theil der Netzhaut gefallen ist, wobei es einerlei ist, ob sehr intensives Licht eine kurze Zeit, oder schwächeres eine längere Zeit gewirkt hat, vorausgesetzt nur, daß die Zeit der Einwirkung überhaupt kleiner als  $\frac{1}{30}$  Secunde gewesen ist. Die primäre Gesamtwirkung sehr intensiven Lichts fällt also nicht verhältnißmäßig schwächer aus, als die mäßigen Lichts von entsprechend längerer Dauer, wie dies doch bei dauernder Empfindung des Lichts von verschiedener Stärke der Fall ist.

Es liegt hierin kein Widerspruch, wie es wohl scheinen könnte, denn den Mangel der Proportionalität fanden wir zwischen der objectiven Lichtintensität und der fertig ausgebildeten Empfindung, hier haben wir es dagegen nur zu thun mit der augenblicklichen primären Wirkung, die erst später in Empfindung übergehen wird, und es ist kein Hinderniß anzunehmen, daß die vermuthlich photochemische Wirkung in der Nervenmasse einem andern Gesetze der GröÙe folge, als die secundäre Wirkung, die Empfindung. Das ganze Verhältniß wird vielleicht am klarsten durch den Vergleich mit einem Magneten, der in einem galvanischen Multiplicator aufgehängt ist, und durch einen intermittirenden Strom von hinreichend schnellen Intermissionen abgelenkt wird. Auch in diesem Falle hängt die Ablenkung nur ab von der

gesamten Menge von Electricität, welche in der Zeiteinheit durch den Draht fließt, ohne doch dieser Menge nothwendig proportional zu sein. Auch hier existirt aber eine der Electricitätsmenge jedes einzelnen momentanen Stromes proportionale Wirkung, nämlich die kleine Geschwindigkeit, welche er dem Magneten im Sinne der Ablenkung mittheilt, und welche bis zum Eintritt des nächsten Stromes durch die Wirkung des Erdmagnetismus wieder aufgehoben sein muß, wenn die Ablenkung des Magneten constant bleiben soll. Der Magnet erscheint continuirlich ruhend abgelenkt, wenn die Schwankungen in seiner Lage, welche die einzelnen Stromstöße hervorbringen, zu klein sind, um wahrgenommen zu werden; so giebt auch ein intermittirendes Licht eine continuirliche Empfindung, wenn die Schwankungen in der Stärke der Empfindung kleiner sind, als die kleinsten wahrnehmbaren Stufen der Empfindung.

Was die Einrichtung der rotirenden Scheiben betrifft, welche **MUSCHENBROEK**<sup>1</sup> zuerst erwähnt, so sind die einfachsten die Kreisel. Ich pflege für die meisten Versuche einen einfachen aus Messing gedrehten Kreisel zu benutzen, dessen Querschnitt in *Fig. 182* in  $\frac{1}{8}$  GröÙe dargestellt ist. Er wird nur mit der Hand in Gang gebracht. Man kann ihn deshalb in jedem Augenblicke leicht und ohne Vorbereitung in Bewegung setzen, seine Geschwindigkeit nach Belieben verstärken oder mäßigen, aber allerdings entspricht das Maximum der Geschwindigkeit, was man ihm mit den Fingern mittheilen kann, nur ungefähr 6 Umdrehungen 347 in der Secunde, wonach er 3 bis 4 Minuten in Bewegung bleibt. Wegen der geringen Rotationsgeschwindigkeit bekommt man einen ganz gleichmäßigen Lichteindruck nur, wenn die Scheiben in 4 oder 6 Sektoren getheilt und in jedem die gleiche Vertheilung von Farben, Licht und Schatten angebracht ist. Ist die Zahl der gleichen Wiederholungen der Zeichnung eine geringere, so giebt es wenigstens bei starker Beleuchtung ein mehr oder weniger schillerndes Ansehen der Scheibe. Die Zeichnungen kann man selbst während des Ganges der Scheibe leicht darauf werfen und kann auch leicht Veränderungen hervorbringen, wenn man auf eine volle Scheibe eine mit ausgeschnittenen Sektoren wirft, deren Lage auf der unteren man durch Hinstreifen mit den Fingern oder durch Blasen mit dem Munde verändern kann; so lassen sich während des Ganges der Scheibe sehr mannigfaltige Variationen hervorbringen.




Fig. 182.

Giebt man der Scheibe z. B. gleich breite blaue und rothe Sektoren, und legt darauf eine Scheibe mit gleich breiten Sektoren, von denen man den ersten, dritten, fünften u. s. w. schwarz gemacht hat, während der zweite, vierte, sechste u. s. w. fortgeschnitten ist, so wird bei der Rotation die ganze Scheibe blau sein, wenn die schwarzen Sektoren der oberen Scheibe auf die rothen der unteren fallen und diese verdecken, dagegen wird die Scheibe roth erscheinen, wenn die schwarzen Sektoren der oberen Scheibe auf die blauen der unteren fallen; in den Zwischenlagen erhält man verschiedene Mischungen von Roth und Blau und kann daher während des Ganges der Scheibe die eine Farbe allmählich in die andere übergehen lassen, wenn man durch Überstreifen mit dem Finger oder durch Blasen die Lage der oberen Scheibe verändert. Begrenzt man die verschiedenen Sektoren nicht durch gerade, sondern durch krumme oder gebrochene Linien, so kann man leicht sehr mannigfache und bunte Wechsel von Ringsystemen erzeugen.

<sup>1</sup> **MUSCHENBROEK**, *Introductio*. § 1820. 1760.



Um den Kreiseln größere Geschwindigkeit zu geben, müssen sie durch ein um ihren Stiel geschlungenes Band, welches man abzieht, in Bewegung gesetzt werden. Die einfachste Einrichtung dazu ist die in *Fig. 183* abgebildete. Es dient dazu ein hölzernes



Fig. 183.

Hohlcyliner *c*, der an einem Stiele *d* sitzt, bei *b* und *e* zwei einander gegenüberstehende Durchbohrungen seiner Mantelfläche hat und von beiden, um einen rechten Winkel entfernt, einen Einschnitt. Man steckt den Stiel *b* des Kreisels durch die Öffnungen des Cylinders, führt das Ende eines starken Fadens durch eine Durchbohrung des Stiels und dreht mit dem Finger den Kreisel, bis der Faden aufgewickelt ist. Der Theil des Stiels, um den der Faden aufgewickelt ist, wird dadurch so dick, daß er nicht mehr aus der Hülse *c* hinausgleiten kann. Hält man nun den Kreisel mittelst der Hülse nahe über einem Tische, zieht den Faden kräftig ab, so kommt der Kreisel in schnelle Rotation und fällt, sobald der Faden abgewickelt ist, auf den Tisch herab, wo er lange weiter

348




Fig. 184.

gerichtet, daß man die Scheiben mittelst des Stiels fest klemmen kann, wie dies bei den Versuchen von MAXWELL zur Bestätigung des NEWTONSchen Gesetzes der Farbenmischung nöthig ist. Man braucht dazu eine Reihe kleinerer und größerer runder Scheiben aus steifem Papier mit einer centralen Öffnung und einem radialen Schlitz, wie *Fig. 185* zeigt. Jede Scheibe wird nur mit einer Farbe gleichmäßig überzogen; legt man zwei oder mehrere aufeinander und schiebt sie gegenseitig durch

blitze hindurch, so werden auf jeder Seite Sektoren der einzelnen n von beliebig veränderlicher Breite sichtbar, so daß das Mischungs- nifs der Farben continuirlich geändert werden kann. ie vollkommenste Construction für einen Kreisel, der nur bei sehr r Bewegung gebraucht werden soll, bietet der BUSOLD'sche Farben- dar (Fig. 186). Er besteht aus einer fünf Pfund schweren Scheibe, einer Legirung von Zink und Blei gegossen ist, ein Decimeter chmesser. Die Axe von Messing läuft unten auf einer fein ab- sten Spitze von nicht gehärtetem Stahl. Der cylindrische Theil der Axe ist rauh t, damit die Schnur fest darauf liegen kann. Will man den Kreisel in Bewegung




Fig. 185.

so wird seine Axe Umwicklung mit hnur in die Ein- der eisernen Arme gelegt, ein Teller stellt und mit der Hand die Schnur abgezogen, wäh- ie linke sich gegen bel e stützt. Der mufs vor dem Ab- möglichst nah am des Tellers stehen, nur einen halben kürzer sein, als gespannten Arme , und an ihrem it einer Handhabe




Fig. 186.

n sein. Wenn der Kreisel läuft, zieht man den Teller mit dem Kreisel unter men des Hebels e hervor. Dieser, welcher um eine Axe bei c drehbar ist, hebt abei nach oben. Bei kräftigem Abziehen der Schnur kann man bis 60 Um- gen in der Secunde hervorbringen, und die Bewegung hält 45 Minuten an. usser den Kreiseln hat man nun auch vielfältig Scheiben benutzt, deren Axe in apfenlagern läuft, und die entweder durch ein Uhrwerk, oder eine unendliche 349 , oder durch Abziehen einer Schnur wie die Kreisel in Bewegung gesetzt werden. ine für messende Versuche bestimmte wesentliche Verbesserung ist ein von k und ВРОПНХ neuerdings construirter Rotationsapparat, auf welchem zwei aus- ittene Scheiben laufen, deren Stellung zu einander während der Rotation allmählig rt werden kann. Die Beschreibung wird in den photometrischen Berichten der hen phys. techn. Reichsanstalt gegeben werden.

m Allgemeinen tritt bei diesen Apparaten die Unbequemlichkeit ein, daß man die en nicht wechseln kann, ohne den Apparat anzuhalten und die Scheibe aus ihren gern zu entfernen. Andererseits hat man den Vortheil, die Scheibe in verticaler g umlaufen lassen zu können, wobei ein großes Auditorium sie gleichzeitig sehen was bei den Kreiseln nicht so leicht zu erreichen ist. Mischung der Farben hat xxy auch durch ein rotirendes Prisma erreicht, dessen objectives Spectrum er über weissen Schirm laufen liefs.

as Thaumatrope ist ein rechteckiges Täfelchen, welches man um eine Axe, die die Mitte der längeren Seiten geht, rotiren läßt. Auf die eine Seite ist etwa ein gemalt, auf die andere der Käfig. Wenn man schnell rotiren läßt, scheint der im Käfig zu sitzen. Es ist jetzt als Kinder-spielzeug bekannt, erfunden von RIS.<sup>1</sup>

PARIS, *Edinb. Journal of Science*. VII. 87. *Pogg. Ann.* X. 48. 1827.

halben Helligkeit. Eine grössere graue Fläche dieser Art erhält man, wenn man abwechselnd gleich breite weisse und schwarze Streifen auf der Tafel anbringt und sich mit dem doppeltbrechenden Prisma in eine solche Entfernung stellt, daß die Doppelbilder der weissen Streifen sich genau mit denen der schwarzen decken; dann erscheint die ganze Fläche grau mit der halben Helligkeit des weissen Streifens. Dieses Grau ist nun genau dasselbe, welches durch Umdrehung der Scheibe *Fig 179* entsteht. Natürlich muß man bei der Vergleichung zu letzterer dasselbe Schwarz und Weiss nehmen, aus dem man die parallelen Streifen gemacht hat, muß beide Flächen genau gleich beleuchten und auch die rotirende Scheibe durch das doppeltbrechende Prisma betrachten, aber so, daß sich ihre beiden Bilder nicht trennen, damit auch das Licht der Scheibe der Reflexion und Absorption im Prisma ebenso unterworfen wird, wie das der weissen Streifen. PLATEAU erwies dasselbe Gesetz auf folgendem Wege. Er brachte eine rotirende Scheibe mit weissen und schwarzen Sektoren und eine ganz weisse in verschiedener Entfernung von einem Lichte, bis ihre Helligkeit gleich groß erschien. Ist die Zahl der weissen Sektoren  $n$ , und die Breite jedes einzelnen in Winkelgraden gleich  $w$ , so ist die Breite aller zusammengekommen gleich  $nw$ . Hat nun das Weiss in der Entfernung 1 von der Lichtquelle die Helligkeit  $H$ , und denken wir das Licht, welches es aussendet, über die ganze Scheibe gleichmäfsig verbreitet, so wird die Helligkeit geschwächt in dem Verhältnisse, welches die Fläche der ganzen Scheibe zu der der weissen Sektoren hat. Die Helligkeit wird also  $\frac{nw}{360} H$ .

Wenn nun die rotirende Scheibe in der Entfernung  $r$  von der Lichtquelle gleich hell ist mit einer ganz weissen Scheibe in der Entfernung  $R$ , so muß sein

$$\frac{nw}{360} \frac{H}{r^2} = \frac{H}{R^2} \text{ oder } \frac{r^2}{R^2} = \frac{nw}{360}.$$

Die Messungen PLATEAUS stimmen mit diesem Gesetz auch genügend überein.

Ich selbst habe ausserdem auch noch folgenden Weg eingeschlagen. Wenn man eine mit schmalen schwarzen und weissen Sektoren bedeckte Scheibe hat, so kann man eine scheinbar gleichmäfsige Vertheilung des Lichtes der weissen Sektoren über die ganze Scheibe hervorbringen, indem man zwischen Auge und Scheibe eine convexe Glaslinse bringt, welche die Accommodation verhindert. Steht die Pupille im hinteren Brennpunkte der Linse, so daß das Bild, welches die letztere von der Scheibe entwirft, in die Fläche der Pupille fällt, und grösser ist als die Pupille, so erscheint das Licht der hellen Sektoren gleichmäfsig über das ganze durch die Linse gesehene Gesichtsfeld ausgegossen. Nähert man dagegen die Linse der Scheibe, so sieht das Auge mehr oder minder scharf die einzelnen weissen und schwarzen Sektoren, so lange die Scheibe stillsteht. Ist die Scheibe in

ung, so bleibt die Helligkeit gleich groß, man mag die Linse dem  
oder der Scheibe näher bringen, woraus unmittelbar folgt, daß das 341  
von dem intermittirenden Licht gleich stark, wie von einer gleichen  
ität continuirlich ankommenden Lichts afficirt wird.

Für farbiges Licht geht die Richtigkeit des oben hingestellten Satzes  
en Versuchen von DOVE hervor über die Erscheinungen, welche rotirende  
sationsapparate darbieten. Wenn zwischen zwei NICOLsche Prismen  
ltbrechende Krystallplatten eingeschaltet sind, so entstehen bekanntlich  
len Fällen bei gewissen Stellungen der genannten Prismen Farben, die  
gleichmäÙig über das ganze Feld verbreitet sind, theils farbige Figuren  
. Bei allen diesen Erscheinungen bekommt aber jeder Punct der  
wie theoretisch in der Lehre von der Polarisation des Lichts nach-  
sen werden kann, genau die Complementärfarbe, wenn man das eine  
sche Prisma um einen rechten Winkel dreht. Der Versuch bestätigt  
n, daß bei schneller Rotation des einen NICOL das Auge weiß sieht.  
et man noch ein farbiges Glas ein, so erhält man bei zwei um  $90^\circ$   
iedenen Stellungen des einen NICOL Farben, welche vereinigt die  
des Glases geben müssen und bei schneller Rotation auch wirk-  
eben.

Übrigens wird unser Gesetz für intermittirendes farbiges Licht auch  
igt durch die Übereinstimmung, welche die Resultate der Farben-  
ung auf der drehenden Scheibe mit denen haben, die man durch directe  
imensetzung des farbigen Lichts gewinnt, was in § 20 bei der Lehre  
er Farbenmischung schon erwähnt ist. Will man die ganze Scheibe  
mäÙig mit der Farbe überzogen sehen, so pflegt man die Scheibe in  
en abzutheilen und den einzelnen Sektoren verschiedene Färbung zu  
die aber in der Ausdehnung jedes einzelnen Sectors ganz constant  
aufs. Dann erscheint bei der Rotation die ganze Scheibe in der Misch-

Die Lichtstärke der Mischfarbe ist aber dabei nach dem obigen Ge-  
immer das Mittel aus der Lichtstärke der einzelnen gemischten Farben,  
da alle Farbstoffe bei gleicher Beleuchtung dunkler als weiß erscheinen,  
sie nur gewisse Farben, die einen Theil des gesammten weißen  
bilden, reflectiren, so ist auch die Misch-  
immer lichtschwächer, als Weiß, erscheint  
wenn sie wenig gesättigt ist, grau.

Führt man auf einer Farbenscheibe einen  
en Stern auf andersfarbigem Grunde aus,  
Fig. 180, so sieht man bei der Rotation  
scheibe in der Mitte die Farbe des Sterns,  
ande die des Grundes, dazwischen alle  
uirlichen Übergangsstufen der einen Farbe  
die Reihe der Mischfarben in die andere.  
aupt kann man auf den rotirenden Scheiben  
Helligkeit oder die Farbenmischung von




Fig. 180.



der Mitte nach dem Rande hin nach jedem beliebig gewählten Gesetze sich ändern lassen, indem man die Curven, welche die Sektoren begrenzen, passend wählt, wie wir z. B. schon in *Fig. 159* S. 399 dies Mittel benutzt haben, um eine bestimmte Vertheilung des Halbschattens darzustellen.

342 Auf den rotirenden Scheiben beschreiben die einzelnen Punkte Kreislinien. Dieselbe Continuität des Eindrucks findet natürlich auch statt, wenn ein heller Punct sich in irgend einer anderen geschlossenen Curve bewegt. Überzieht man z. B. eine gespannte Metallsaite mit schwarzer Farbe, macht einen Punct der Saite wieder frei von dem dunklen Überzuge und beleuchtet ihn passend, so erscheint die Bahn dieses Punctes, wenn die Saite in Schwingungen gesetzt wird, als eine continuirliche, oft sehr verschlungene Lichtlinie. Beschreibt der Punct dabei einen Weg, der nicht genau in sich zurückkehrt, aber bei jedem folgenden Umlaufe doch der Bahn des früheren Umlaufs sehr nahe kommt, so erscheint dem Auge eine lichte Linie, die allmählich ihre Gestalt und Lage verändert. In derselben Weise hat WHEATSTONE<sup>1</sup> die Schwingungsformen rechteckig prismatischer Stahlstäbe, LISSAJOUS<sup>2</sup> die Schwebungen von Stimmgabeln beobachtet. Dasselbe Princip hat in der Physik noch eine große Zahl von anderen nützlichen Anwendungen erhalten.

Ist die Helligkeit des bewegten Punctes in seiner Bahn constant, aber die Geschwindigkeit verschieden, so erscheint die Lichtlinie an den Puncten am hellsten, wo die Geschwindigkeit am geringsten ist. An solchen Stellen nämlich verweilt der helle Punct verhältnißmäßig längere Zeit, und sein Licht wirkt deshalb auch längere Zeit auf die entsprechenden Stellen der Netzhaut als an Stellen größerer Geschwindigkeit. Beobachtet man z. B. eine beleuchtete schwingende Saite, so erscheint diese am hellsten da, wo sie am weitesten von der Gleichgewichtslage entfernt ist, und wo ihre Geschwindigkeit für einen Augenblick gleich Null wird.

Hierher gehören auch die eigenthümlichen Wirkungen intermittirender Beleuchtung, welche am schärfsten bei den regelmäsig wiederholten Funken der magnetelektrischen Inductionsapparate auftreten, sowohl bei denen mit rotirendem Anker, wie bei den NERFSCHEN Apparaten mit schwingender Feder. Jeder einzelne Funken dieser Apparate hat eine unbestimmbar kurze Dauer, welche im Vergleich mit der Dauer aller Bewegungen materieller Körper unendlich klein erscheint, doch ist das Licht dieser Funken stark genug, um in dieser außerordentlich kurzen Zeit einen wahrnehmbaren Eindruck auf die Netzhaut zu machen. Bei der Erleuchtung durch einen einzelnen elektrischen Funken erscheinen alle bewegten Körper stillstehend. Das Auge kann sie natürlich nur so wahrnehmen, wie sie sich in dem Momente verhielten, wo sie beleuchtet waren, von ihrer Stellung vor und nach diesem Momente erfährt es nichts. Ist nun die Dauer der Beleuchtung

<sup>1</sup> WHEATSTONE, Description of the Kaleidophone. *New. Quarterly Journal*. I. 1827.

<sup>2</sup> LISSAJOUS, Mémoire sur l'étude optique des mouvemens vibratoires. *Ann. chim. phys.* Sér. III. T. LI. 1857.

rz, daß während derselben keine Verschiebung des bewegten Körpers wahrnehmbarer GröÙe eintreten konnte, so erscheinen seine Umrisse so scharf begrenzt, wie es bei vollkommener Ruhe der Fall sein würde. Wenn sich nun eine Reihe von elektrischen Funken in sehr kleinen Zwischenzeiten folgt, so erscheinen ruhende Körper bei dieser Beleuchtung so, wie bei continuirlichem Lichte; bewegte Körper aber erscheinen nach. Jeder einzelne Funke zeigt nämlich den bewegten Körper in der Lage, die er in dem betreffenden Augenblicke einnimmt, und da alle diese Augenblicke einen Augenblick dauern, so sind sie alle gleichzeitig vorhanden und lassen den bewegten Körper als mehrfach vorhanden erscheinen. Je rascher die Bewegung des gesehenen Körpers ist, desto weiter rücken seine Bilder aus einander, weil der Weg, den er während jeder Intermission des Lichtes zurücklegt, größer wird.

Ebenso erscheinen nun mehrfache Bilder, wenn nicht die Objecte, sondern das Auge bewegt wird. Wenn sich im Gesichtsfelde ein continuirlich leuchtender Punct befindet, und wir das Auge bewegen, so rückt dabei das Bild des lichten Punctes auf eine andere Stelle der Netzhaut hinüber. Während der Bewegung trifft es nach einander alle continuirlich an einander liegenden Punkte einer Linie, die den Ort seiner ersten und seiner letzten Lage verbindet; alle diese Punkte werden erregt, und es muß dadurch für jeden Augenblick die Empfindung in der Netzhaut entstehen, welche bei ruhendem Auge eine lichte Linie hervorbringen würde. Gewöhnlich achten wir nicht auf diese Empfindung, weil sie eben jede Bewegung des Auges begleitet. Gegenwart lichter Objecte im Gesichtsfelde begleiten muß, wir bemerken es aber, wenn ungewöhnlicher Weise bei intermittirendem Lichte die Continuität dieser Linie unterbrochen ist. Benutzen wir als Lichtquelle die Stelle des Inductionsapparates, wo die Funken überschlagen, so sieht man bei Bewegungen des Auges der helle Punct vervielfältigt. Denken wir uns nämlich auf der Netzhaut die Linie gezeichnet, welche das Bild der Funkenstelle beschreibt, so werden von den intermittirenden Funken einzelne Stellen dieser Linie erregt, denen entsprechend wir Bilder in dem Gesichtsfelde projeciren.

Venn ein bewegter Körper, den wir bei intermittirendem Lichte beobachten, eine in sich zurücklaufende Bahn beschreibt und zur Zeit jedes Lichtblitzens genau an derselben Stelle sich befindet, so erscheint er einfach stillstehend. Zum Beispiel erscheint die schwingende Feder oder der ruhende Anker der bekannten magnetoelektrischen Inductionsapparate beim Durchschlagen der Funken still zu stehen. Dasselbe geschieht, wenn irgend welcher Körper von periodisch veränderlicher Gestalt durch intermittirendes Licht beleuchtet wird, und die Beleuchtung immer mit derselben Stelle seiner Veränderung zusammentrifft; z. B. wenn ein Wasserstrahl, der in Tropfen aufgelöst, so beleuchtet wird, daß im Moment der Beleuchtung neuer Tropfen immer wieder genau an derselben Stelle ist, so sieht der Betrachter den Strahl in stillstehende Tropfen aufgelöst. Dies geschieht,



stellt die Mischungen je zweier Farben dieser Scheibe dar, welche auf den entgegengesetzten Hälften desselben Durchmesser liegen. Wenn z. B.  $p = 1$ , also  $\frac{m}{n-m} = \frac{2}{3}$

so wird die Anfangsfarbe wiedererscheinen bei

352

0°		
240		
480	d. h.	120°
720	"	0
960	"	240

u. s. w.,

also immer wieder bei 0°, 120°, 240°. Die Farbe dagegen, welche auf der unteren Scheibe auf der anderen Hälfte desselben Durchmessers steht, wird in der Mitte dieses Bogen erscheinen, also bei

120°		
360	d. h. bei	0°
600	"	240

u. s. w.,

d. h. an denselben drei Stellen, wird sich also mit der ersten Farbe mischen.

Im Allgemeinen ergibt sich leicht, daß, wenn der Bruch  $\frac{m}{n-m}$  in kleinsten ganzen

Zahlen ausgedrückt, gleich  $\frac{q}{p}$  ist, und der Eindruck im Auge  $q$  Umdrehungen der oberen Scheibe überdauert, man  $p$  Wiederholungen einer Folge von Farben sieht, die entstehen, indem je  $q$  äquidistante Farben der unteren Scheibe gemischt werden. Daraus der Eindruck im Auge aber nicht so lange, so erscheinen die Farben hin- und her springend.

Wenn man die Form, Zahl und GröÙe der Öffnungen in der oberen Scheibe variirt, entstehen auf diese Weise natürlich sehr bunte kaleidoskopische Bilder. Diese Bilder werden bei dem Kreisel der Fig. 190 noch bunter und erhalten sehr feine Zeichnungen dadurch, daß eigenthümliche Oscillationen der oberen Scheibe eintreten. Man hört nämlich ein lautes Schnarren des Kreisels, sobald man die obere Scheibe aufgelegt hat, und wenn man als untere Scheibe eine rein weiÙe gewählt hat: so sieht man die Figur der oberen Scheibe nicht sich in ein System concentrischer Kreislinien verwandeln wie es sein müÙte, wenn die obere Scheibe mit gleichmäßiger Geschwindigkeit rotirte, sondern man sieht eine große Zahl von Wiederholungen der eingeschnittenen Figur. Dies läÙt schließen, daß die Rotationsbewegung der oberen Scheibe in regelmäßiger Abwechselung verzögert und beschleunigt ist. Diese Oscillationen müssen durch die Reibung der oberen Scheibe an der Axe hervorgebracht sein. Außerdem findet ein zweites System von Oscillationen statt, wobei der Mittelpunkt der oberen Scheibe horizontal hin- und hergeht, was man aus gewissen Eigenthümlichkeiten der Figur, wie sie über weißer Unterlage erscheint, erkennen kann.

Regelmäßiger zeigt das von PLATEAU construirte Anorthoskop diese Erscheinungen. Zwei kleine Rollen von verschiedenem Durchmesser, deren Axen in derselben geraden Linie unmittelbar hinter einander liegen, werden durch zwei unendliche Schnüre herumgetrieben, welche beide um die Peripherie derselben größeren Scheibe laufen; letztere wird mittels einer Kurbel bewegt. An der einen Rolle ist eine transparente Scheibe befestigt, auf der sich eine verzerrte Zeichnung befindet, an der anderen eine schwarze Scheibe mit einem oder mehreren Spalten. Wenn man die Scheiben rotiren läÙt, kommt die richtige Zeichnung zum Vorschein.

Wir haben gesehen, daß, wenn  $m$  die Zahl der Umläufe des Schirmes in der Secunde bezeichnet, und  $n$  die der Zeichnung, daß auf einem Bogen  $2\pi \frac{m}{n-m}$ , den ein Punkt der spaltförmigen Öffnung des Schirmes durchläuft, alle die Punkte der Zeichnung der Reib-

lie ebenso weit wie jener Punct vom Mittelpuncte entfernt sind. In Objects auf der transparenten Scheibe nehmen aber diese Puncte die in. Denkt man sich also in dem Original und seinem Zerrbilde die arccordinaten gegeben, nämlich durch ihre Entfernung vom Mittelpunct  $\rho$  und durch den Winkel  $\omega$ , den der Radius Vector mit einem festen nennen wir  $\rho_0$  und  $\omega_0$  die Werthe für die richtige Zeichnung,  $\rho_1$  und  $\omega_1$ , so ist.

$$\begin{aligned}\rho_0 &= \rho_1 \\ \omega_0 : \omega_1 &= m : (m-n).\end{aligned}$$

353

sichungen kann die verzerrte Zeichnung construiert werden, indem man em angegebenen Verhältnisse verändert. Damit bei jedem Umlauf lben Figuren wieder sichtbar werden, muß wie früher der Bogen r Theil der Peripherie sein, also  $\frac{m}{m-n}$  eine positive oder negative ganze

den beide gleichläufig, also  $m$  und  $n$  positiv,  $n > m$ , so haben  $\omega_0$  und  $\omega_1$  eichen, müssen also nach entgegengesetzter Richtung gelegt werden.

! —  $\frac{n}{m}$  eine negative ganze Zahl, wenn  $\frac{n}{m}$  eine ganze Zahl  $p$  ist, d. h. die e  $p$  ganze Umläufe macht, während die dunkle Scheibe einen macht. sich  $(p-1)$  Male auf dem Umfang der Scheibe. Man kann in diesem radiale Spalten in der schwarzen Scheibe anbringen.

en Scheiben in entgegengesetzter Richtung umlaufen, also  $m = -\mu$

$$\omega_0 : \omega_1 = \mu : (n + \mu).$$

sind also nach der gleichen Seite hin zu nehmen. Wenn  $\frac{n}{\mu} = p$  ahl, so wird die Zahl der Bilder gleich  $p + 1$ , und man kann wieder nklen Scheibe anbringen.

lie Rotationen gleichläufig sind,  $m$  und  $n$  also positiv, aber  $m > n$ , nd  $\omega_1$  wieder dasselbe Zeichen, aber während in den bisherigen er größer als  $\omega_0$  war, wird es nun kleiner. In den bisher be- onnte das Zerrbild die ganze Peripherie des Kreises einnehmen, ge Bild nahm dann nur einen aliquoten Theil der Peripherie ein. le aber ist der höchste Werth von  $\omega_0$  offenbar  $2\pi$ , und demgemäß

$1 - \frac{n}{m} > 2\pi$ . Es kann das Zerrbild deshalb auch auf der trans-

ehrmals wiederholt werden, ja es wird vortheilhaft sein, es zu hr Licht zu erhalten. Damit dann immer dieselbe Erscheinung er bezeichnete Maximalwerth von  $\omega_1$  ein aliquoter Theil der Peri-

$\frac{m}{n-n}$  muß eine ganze Zahl  $p$  sein, also

$$\frac{n}{m} = \frac{p-1}{p}.$$

der möglichen Wiederholungen des Zerrbildes  $p$ , das richtige Bild er Spalten kann gleich  $p - 1$  gemacht werden.

auch in diesem Falle die Spalte einfach lassen, und das Zerrbild ungen etwas verändern, so daß es verschiedene Momente einer lann erhält man ein richtiges Bild, was diese Bewegung auszuführen

Sollen die geforderten Verhältnisse der Umdrehungszahlen  $m$  und  $n$  genau eingehalten werden, so kann man dies nur erreichen, wenn man die Axen durch Zahnräder in Bewegung setzt. Bei den Rollen stimmen die Verhältnisse der Durchmesser und die Beschaffenheit der Fäden nie so genau überein, daß nicht allmählig kleine Abweichungen von dem geforderten Verhältnisse eintreten, und dann drehen sich die restaurirten Bilder auf der Scheibe allmählig um deren Mittelpunkt. Diese unvermeidliche Ungenauigkeit der Schnurläufe hat PLATEAU übrigens benutzt, um einen sehr allmählichen Farbenwandel hervorzubringen, indem er zwei Rollen aufsetzt, welche, so gut es geht, einander gleich gemacht sind. an der einen eine transparente Scheibe mit gleich breiten farbigen Sektoren befestigt, an der anderen eine schwarze Scheibe, in der ein oder zwei gleiche Sektoren ausgeschnitten sind. Wenn die Oeffnung anfangs gerade vor einem der farbigen Sektoren der hinteren Scheibe steht, wird bei der Rotation das ganze Feld in dieser 354 Farbe erscheinen, allmählig aber werden sich die Scheiben gegen einander verschieben, es wird von einem anderen Sector der farbigen Scheibe anfangs wenig, allmählig immer mehr frei werden, und dessen Farbe daher sich stärker und stärker einmischen, während die des ersten in demselben Verhältnisse verschwindet. So erhält man einen sehr leise und allmählig eintretenden Farbenwandel.

Es gehören hierher auch noch gewisse Curven, welche erscheinen, wenn zwei Reihen von geraden oder gekrümmten Stäben sich hinter einander bewegen. Das erste Beispiel davon, welches Aufsehen erregte, waren gewisse Figuren, welche an den Rädern eines Wagens erscheinen, wenn ein solcher hinter einem Gitter vorbeifährt.<sup>1</sup> Am einfachsten von den hierher gehörigen Fällen ist die von FARADAY beobachtete Erscheinung. Er ließ zwei gleiche Zahnräder hinter einander in entgegengesetzter Richtung schnell rotiren, so daß ihre Axen in einer geraden Linie lagen. Während nun von jedem einzeln gesehen, die Zähne wegen der Schnelligkeit der Bewegung verschwinden, sah er ein Rad mit doppelt so viel Zähnen stillstehen, wenn er sie so betrachtete, daß die eine Zahnreihe durch die andere hin erschien. Denken wir uns die Zähne bald auf dunklem Grunde, so wird durch die schnell umlaufenden hellen Zähne jedes einzelnen Rades eine gewisse Menge Licht über den Grund scheinbar gleichmäßig ausgebreitet, und durch beide Zahnreihen zusammen die doppelte Menge Licht an solchen Stellen des Grundes, wo hinter einander bald von der einen, bald von der anderen Reihe ein Zahn hinüberläuft. Wo aber ein Zahn der vorderen Reihe einen solchen der hinteren deckt, wird für den Augenblick das Licht des hinteren hinweggenommen, weil es nicht zum Auge des Beobachters kommen kann, und eine solche Stelle scheint dem Beobachter deswegen nur halb so stark beleuchtet, als die benachbarten, wo die beiden Zähne ungestört nach einander ihr Licht in das Auge senden. Somit erscheinen in dem hellen Scheine, den die Zahnreihen geben, diejenigen Stellen dunkler, wo bei der Bewegung der Räder je zwei Zähne zur Deckung kommen. Ist nun  $\omega$  der Winkelabstand der Zähne, und gehen wir von einer Stellung der Räder aus, wo die Zähne sich decken, so wird eine zweite Deckung zu Stande kommen, wenn das eine Rad sich um  $\frac{1}{2} \omega$  nach rechts, das andere um ebenso viel nach links gedreht hat. Die dunklen Streifen werden also nur den Winkelabstand  $\frac{1}{2} \omega$  haben, und ihre Anzahl wird daher doppelt so groß sein, als die der Zähne. Das eine Rad kann man auch weglassen, wie BILLET SÉLIS bemerkt, wenn man hinter das erste einen Hohlspiegel stellt, der ein mit dem Objecte zusammenfallendes, aber verkehrtes Bild dieses Rades entwirft. Sehr hübsch läßt sich auch diese Methode anwenden, um die Art, wie sich ein Wasserstrahl in Tropfen auflöst, sichtbar zu machen.

Eine ähnliche Erscheinung beobachtete EMMANN an dem bekannten Abplattungsmodell, welches aus zwei elastischen Messingringen besteht, die zwei gegen einander

<sup>1</sup> ROGET in *Phil. Transact.* 1823. I. 131. *Pogg. Ann.* V. 93. PLATEAU ebenda XX. 316. 1831. FARADAY ebenda XXII. 601. 1831. EMMANN ebenda LXIX. 326.

ankreisen der Erde entsprechen und um die der Erdaxe entsprechende  
ht werden, wobei sie durch die Centrifugalkraft eine elliptische Gestalt  
das Licht stark reflectiren, verbreiten sie bei schneller Rotation  
ber die Kugelfläche, die sie beschreiben, und darin erscheinen dunkle  
len, wo bei der Rotation ein vorderes Bogenstück ein hinteres bedeckt.  
icip dieser Erscheinungen hat PLATEAU ausgesprochen. Wenn zwei  
sich durch das Gesichtsfeld so schnell bewegen, daß sie eine schein-  
beleuchtung der Fläche zurücklassen, so erscheint eine dunkle Linie  
elde, welche die Punkte verbindet, in denen sich nach einander die  
haben, vorausgesetzt, daß das Licht der einen Curve die andere  
kaun.

ite: Die Dauer des Lichteindrucks wurde von NEWTON<sup>1</sup> gleich einer  
später genauer gemessen von SEGNER,<sup>2</sup> der 30 Tertien, D'ARCY,<sup>3</sup> der  
der 6 Tertien als längste Dauer des Eindrucks einer im Kreise ge- 355  
den Kohle fand. PARROT<sup>4</sup> fand, daß der Eindruck in einem hellen  
sit währe, als in einem dunkeln. Daran schloßen sich dann die  
von PLATEAU<sup>5</sup> über die verschiedene Dauer der Eindrücke verschie-  
EMSMANN.<sup>7</sup>

wähnt MUSSCHENBROEK,<sup>8</sup> ohne einen älteren Beobachter zu nennen.  
ind beschrieben durch E. G. FISCHER,<sup>9</sup> LUDICKE,<sup>10</sup> BUSOLT.<sup>11</sup>  
zeitige Erfindung der stroboskopischen Scheiben durch  
FER zu Ende des Jahres 1832 ist schon oben erwähnt. Die Con-  
oskops durch PLATEAU<sup>12</sup> fällt in den Januar 1836. Letzterer hat  
er hierher gehörigen Erscheinungen vielfältig und ausführlich be-

### 13. Die Veränderungen der Reizbarkeit.

sehen, daß nach der Einwirkung von Licht auf die Netz- 356  
von Reizung im Sehnervenapparate noch eine Zeit lang  
chdauer des Eindrucks nimmt man nach der Betrachtung  
am ungestörtesten wahr, wenn man das Auge auf ein  
chtsfeld richtet. Außerdem zeigt sich aber, daß nach  
Lichts auf irgend eine Stelle der Netzhaut diese nun auch  
fallendes Licht in einer anderen Weise empfindet, als es 357  
afficirten Theile der Netzhaut thun. Wir haben es also  
ner durch Einwirkung des Lichtes veränderten Empfäng-  
venapparates gegen neue äußere Reize zu thun.  
vorliegenden Paragraphen hauptsächlich aufsuchen, welche  
tehen, wenn die von vorausgegangenem hellen Lichte affi-

#### Quaestio XVI.

de luminis. Gott. 1740.

aria. 1765. p. 450.

hre, übers. von TROMMSDORF III. 132.

sur la Physique. Dorpat 1819—24. III. 235.

ann. XX. 304—324. 1829.

Ann. XCI. 611. 1854.

Introd. ad philos. natur. § 1820. 1762.

hrbuch der mechanischen Naturl. Berlin 1827. II. 267.

s Ann. V. 272. 1800. und XXXIV. 42. 1810.

in. XXXII. 656. 1833.

Brux. 1836. III. 7. Derselbe in Pogg. Ann. XX. 319—543. 1829. XXXII.

336. LXXXVII. 563 LXXIX. 269 1849. LXXX. 150. 287. 1849.



cirte Parthie der Netzhaut von anderem äusseren Lichte getroffen wird. Ich bemerke jedoch gleich, daß auch ein Theil der Erscheinungen hierhergezogen werden muß, welche im scheinbar dunkeln Gesichtsfelde erscheinen, weil es nämlich in Wirklichkeit kein absolut dunkles Gesichtsfeld giebt, vielmehr auch bei vollständigem Ausschluss alles äusseren Lichtes doch immer noch eine gewisse schwache Reizung der Netzhaut durch innere Einflüsse bestehend bleibt, welche das schon im § 17 erwähnte Lichtchaos oder Eigenlicht des dunkeln Gesichtsfeldes hervorbringt. Die Reizempfindlichkeit der Netzhaut erscheint nun gegen diese inneren Reize in derselben Weise abgeändert, wie gegen objectives Licht, und es gehören deshalb zu unserem gegenwärtigen Gegenstande auch Erscheinungen, die im dunkeln Gesichtsfelde eintreten, nachdem der Zustand der Reizung der Netzhaut ganz aufgehört hat. Ich bemerke hierbei noch, daß in hellen Räumen der Schluss der Augenlider allein nicht hinreicht, das Gesichtsfeld von allem objectiven Lichte frei zu machen, wie man leicht an der weiteren Verdunkelung merkt, welche eintritt, wenn man die Augen nun zukneift, oder die Hand davor legt. Ja in directer Sonnenbeleuchtung reicht es noch nicht einmal hin, nur die Hand vorzulegen, weil auch durch diese noch eine wahrnehmbare Quantität rothen Lichtes hindurchdringt. Wenn also im Folgenden von einem ganz dunkeln Gesichtsfelde die Rede ist, so ist darunter immer nur zu verstehen das Gesichtsfeld, wie es in einem absolut dunkeln, von allen Spuren objectiven Lichts geschützten Zimmer sich findet, oder wie es in einem hellen Zimmer entsteht, wenn man die Augen schließt, und jedes Auge dicht, aber ohne Druck mit einer Handfläche oder einem dunkeln undurchsichtigen Tuche bedeckt.

Ich werde ferner im Folgenden dasjenige Licht, welches zuerst auf die Netzhaut eingewirkt und deren Reizempfindlichkeit verändert hat, das primäre Licht nennen, das später auf die veränderte Netzhautstelle einwirkende dagegen das reagirende Licht, weil es für uns gleichsam ein Reagenz ist, durch welches wir die Reizbarkeit der Netzhaut prüfen.

Die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen dieses Gebietes ist nun sehr groß, und obgleich eine ziemliche Anzahl ausgezeichnete Beobachter daran gearbeitet hat, ist es noch in vielen Theilen unsicher und lückenhaft. Die Schwierigkeit liegt darin, daß zuerst jeder Beobachter, der sich daran macht, eine gewisse Zeit braucht um sich genügend zu üben, die hierher gehörigen Erscheinungen sicher aufzufassen und zu beurtheilen, und dabei meistens diese Versuche schnell die Augen so angreifen, daß bei einzelnen Beobachtern, die sie zu lange fortgesetzt haben, schwere und gefährliche Augen- und Nervenkrankheiten eingetreten sind. Es haben deshalb die meisten Beobachter bisher nur eine verhältnißmäßig geringe Menge von Thatsachen selbst bestätigen und neu entdecken können, und auch jedem künftigen Beobachter 358 welcher dergleichen Versuche machen will, ist anzurathen an jedem einzelnen Tage nur sehr wenige Versuche dieser Art zu machen, und die Versuchsreihen für längere Zeit abubrechen, sobald er bemerkt, daß nach den Ver-

erhaupt beim Ansehen hellen Lichtes oder lebhafter Farben merzen in den Augen oder im Kopfe einstellen, oder wenn anfangen, lebhafter und dauernder zu werden, als sie im gewöhnlichen Leben zu sein pflegen.

Man theilt die Nachbilder in positive und negative. Bei den Photographien von positiven und negativen Bildern sind die positiven Bilder solche, in denen die hellen Parthien des Objects die dunkeln dunkel sind, negative Bilder dagegen solche, in denen die dunklen Parthien des Objects dunkler, die hellen heller erscheinen.

Um den Gang der Erscheinungen nun zunächst beschreiben, indem man die Lichtstärke, nicht auf den Wechsel der Farben Rücksicht nehmend, den Wechsel der Helligkeit in den meisten Fällen begleitet, so hat man häufig wahrscheinlich darin findet, daß für die verschiedenen Stadien der Erscheinung verschieden ist. Um den Verlauf der Nachbilder ungestört zu beobachten, ist es am besten, die Netzhaut von den Nachbildern der früheren Lichtreize zu befreien, wozu es gewöhnlich nöthig ist und genügt, einige Minuten in bedeckten Augen zu sitzen, bis man im dunkeln Gesichtsfelde nur noch sich selbst sieht als das Lichtchaos, dessen eigenthümliche Muster (helle Gerinnsel durch baumartig und netzförmig vertheilte Linien getrennt) man bald kennen lernt. Wenn man keine Bruchstücke von Gegenständen mehr sieht, und auch beim schwachen Lichts durch die geschlossenen Augenlider keine Erscheinungen zu sehen werden, ist das Auge vorbereitet, um den Eindruck zu empfangen.

Man bringt nun die Augen eine kurze Zeit auf einen hellen Gegenstand, am besten so, daß man die Richtung der Augen verändert läßt und sie nur auf- und zudeckt, so bleibt unter dem positiven Bild des primären hellen Objects stehen, welches im vorigen Paragraphen besprochen ist. Dieses Bild ist am deutlichsten, je weniger die Richtung der Augen verändert wird. Seine Helligkeit finde ich am größten, wenn die Bestrahlung durch das primäre Licht etwa nur  $\frac{1}{3}$  Secunde gedauert hat. Wie man aus dem vorigen Paragraphen haben gelehrt, daß die Stärke der Reizung das Licht während der ersten Zeitmomente seiner Wirkung am stärksten ist; aber sie erreicht sehr schnell ihr Maximum. Dauert die Bestrahlung länger als  $\frac{1}{3}$  Secunde, so nimmt die Stärke des Nachbildes, die Intensität der zurückbleibenden Reizung der Sehnervensubstanz allmählich wieder ab, wovon wir den wahrscheinlichen Grund später besprechen werden. Je größer übrigens die Intensität des primären Lichtes ist, das das positive Nachbild, und desto länger dauert es. Dabei ist zu bemerken, daß im positiven Nachbilde oft auch Grade der Helligkeit zu sehen werden, welche beim directen Anblick wegen zu großer



359 Helligkeit nicht unterschieden wurden. Dreht man z. B. eine Lampe mit rundem Docht schnell aus, während man nach der erlöschenden Flamme hinblickt, so erkennt man im Nachbilde die grössere Helligkeit der Ränder im Vergleich zur Mitte der Flamme, welche man (siehe § 21) bei der directen Betrachtung schwer bemerkt. Dieselbe Bemerkung machte auch AUBERT bei den Nachbildern des elektrischen Funkens, welcher, direct gesehen, als ein verwaschener Lichtstreif, im Nachbilde als eine scharf gezeichnete Linie erschien. Man kann übrigens auch von sehr mässig erleuchteten Gegenständen, z. B. von weissem Papier, welches die zum Schreiben und Lesen bequeme Helligkeit hat, nach der beschriebenen Methode noch positive Nachbilder gewinnen, die eine erkennbare Dauer von etwa zwei Secunden haben, während im Gegentheil das helle Nachbild der Sonne oft mehrere Minuten lang stehen bleibt.

Um die positiven Nachbilder recht schön zu haben, beachte man noch folgende Regeln. Während ihrer Erzeugung und ihrer Dauer mufs man sorgfältig jede Bewegung des Auges und jede heftigere Bewegung des Körpers vermeiden, weil sie bei einer solchen stets für einige Zeit verschwinden. Nachdem man also genügende Zeit mit dicht bedeckten Augen gesessen hat, richte man unter den bedeckenden Händen die Augen nach der Richtung des Objects und bemühe sich, sie ganz unverrückt zu halten, während man die Hände schnell wegzieht und ebenso schnell wieder überdeckt. Diese Bewegung der Hände mufs aber leise und leicht, ohne starke Anstrengung und Erschütterung des Körpers ausgeführt werden. Wenn man dies Verfahren gut eingeübt hat, so gelingt es zuweilen das positive Nachbild unter den bedeckenden Händen so scharf und hell zu sehen, dafs es den Eindruck macht, als wären die Hände durchsichtig, und man sähe die wirklichen Objecte. Man hat Zeit genug, an diesen Nachbildern noch eine Menge einzelner Umstände zu bemerken, auf welche zu achten man während der wirklichen Betrachtung nicht Zeit hatte. Die lichtschwachen Flächen verschwinden am schnellsten, ohne ihre Farbe wesentlich zu verändern, die helleren bleiben längere Zeit stehen, wobei ihre Farbe durch bläuliche Töne in ein violettes Rosa, später Gelbroth übergeht. Zur Zeit, wo die helleren Stellen aus Blau in Violett übergehen, wird die Zeichnung des Nachbildes oft ziemlich undeutlich, weil, wie mir scheint, die hellen Theile dann verhältnismässig mehr an Licht verloren haben als die schwächer beleuchteten, und beide in ihrer Beleuchtung sich ziemlich nahe gekommen sind, und weil wir überhaupt, wie im folgenden Paragraphen noch näher zu besprechen ist, nur wechselnde Erregungszustände der Netzhaut gut von einander unterscheiden, für einen constanten Erregungszustand aber schnell das Unterscheidungsvermögen verlieren. Später werden in den positiven Nachbildern die weniger hellen Gegenstände ganz dunkel, und die helleren bleiben noch längere Zeit, jetzt rosa gefärbt, allein sichtbar. Sehr auffallend war es, wenn ich das Nachbild eines hellen Teppichs betrachtete, über welchen vom Fenster her ein Streifen Sonnenlicht fiel. Es trat eine Zeit ein, wo ich das

pichs vollständig sah, aber überall gleich hell, so daß der  
cht sich nicht mehr bemerklich machte. Nachher verschwand  
Teppichs, während die Figur des genannten helleren Streifen  
sarthem Lichte erschien und bis zuletzt stehen blieb. Es 360

wohl bei bestimmten Beleuchtungsgraden die Zeichnung  
oder theilweis sehr undeutlich werden, und nachher wieder  
scheinbar das Bild fast verschwinden und nachher sich wieder  
n man aber genau aufpaßt, wird man bemerken, daß der  
es zur Zeit der Verwirrung der Zeichnung merklich heller  
acher die hellsten Stellen auf ganz schwarzem Grunde ab-  
er erscheinen. Es ist deshalb in solchen Fällen nicht der  
rschwunden und wiedergekommen, sondern nur der Unter-  
hellen und helleren Stellen für einige Zeit kleiner geworden  
it ihn wahrzunehmen, verschwunden, bis neuer Wechsel in  
elligkeit des Nachbildes dieses wiederherstellen. Übrigens  
t Bildern, welche viele verschieden helle Objecte enthielten,  
e einzelnen Objecte desto später aus dem positiven Bilde  
nden, je heller sie waren. Bei schwachen Nachbildern, wie  
waren, welche ALBERT nach der Beleuchtung der Objecte  
schen Funken erhielt, hat dieser Beobachter jedoch gefunden,  
en Funken die positiven Nachbilder länger dauerten, als  
ken.

gegen beim Auf- und Zudecken des Auges dieses kräftig  
rückt, oder erschüttert, so sieht man im ersten Moment  
htchaos, aus dem sich dann erst allmähig das Nachbild  
so wird das schon entwickelte Nachbild durch Bewegung,  
uck, äußerer Licht zeitweise oder ganz aufgehoben.

sere Licht nur sehr kurze Zeit eingewirkt hatte, nicht blendend  
lichtsfeld ganz frei von allen Spuren äußerer Lichts gehalten

das positive Bild gewöhnlich, ohne in ein negatives überzu-  
n aber, während das positive Nachbild noch besteht, oder  
das Auge gegen gleichmäßig beleuchtete Flächen kehrt,  
geschlossenen Lidern sich nach einer hellen Umgebung  
ein negatives Nachbild. Je stärker das positive Nachbild  
muß auch das reagirende Licht gemacht werden, um es  
ild zu verwandeln. Es giebt immer eine gewisse Stärke  
chts, bei welcher das positive Bild einfach verschwindet,  
erden. Ist das reagirende Licht stärker, so entsteht ein  
es schwächer, so bleibt das Bild positiv und wird nur  
wachsender Stärke des reagirenden Lichts wächst übrigens  
eit des Nachbildes, bis jene Lichtstärke den Grad über-

Erkennung von Differenzen der Lichtstärke um kleine  
nstigsten ist, um dann wieder abzunehmen. Man kann  
ilder erhalten von schwächerem primitiven Lichte auf

stärkerem reagirenden, nur muß man auf sie gut aufpassen, weil sie sehr schnell vergehen. Auch nachdem das positive Bild geschwunden ist, bleibt auf hellen Flächen das negative Nachbild noch kurze Zeit sichtbar, indem es ebenfalls allmählig erblasst und verschwindet, ja es kann sogar im ganz dunkeln Gesichtsfelde sichtbar werden, indem es hier als eine Verminderung der Helligkeit des Eigenlichts der Netzhaut erscheint. In der Regel erscheint  
 361 dann dieses Eigenlicht selbst in der nächsten Umgebung des dunklen Nachbildes durch Contrast mit diesem etwas heller.

Größere Intensität des primären Lichts giebt dem negativen Nachbilde eine größere Deutlichkeit und Dauer. Auch unterscheiden sich im Nachbilde diejenigen Theile eines als primär beleuchtendes Object gebrauchten, blendend hellen Gegenstandes, welche eine objectiv verschiedene, für die Empfindung aber nicht verschiedene Lichtstärke haben. Ich habe oft gesehen, wenn ich nach der untergehenden Sonne geblickt hatte, daß Gegenstände, die einen Theil der Sonnenscheibe bedeckten, im negativen Nachbilde deutlich zu erkennen waren, von denen beim directen Anblick der Sonne wegen der Irradiation keine Spur zu erkennen war. Selbst kleine Gegenstände, Zweige und Blätter von Bäumen können auf diese Weise nachträglich sichtbar werden. Die Reizempfindlichkeit derjenigen Netzhauttheile, welche das Bild der Sonnenscheibe selbst aufgenommen haben, ist also nachher stärker verändert, als sie es in den Netzhautstellen ist, welche von den Zerstreuungskreisen und dem diffus verbreiteten Lichte getroffen waren, obgleich die ursprüngliche Empfindung beider sich nicht unterscheiden ließ. Eben deshalb sind Nachbilder der Sonne anfangs gewöhnlich größer, als die Sonnenscheibe, und werden später kleiner, indem sich anfangs noch ein Nachbild der Zerstreuungskreise am äußeren Rande der Sonne hinzugesellt, welches aber schneller negativ wird und endlich früher schwindet, als das der Mitte des Sonnenkörpers, wo die volle Helligkeit desselben eingewirkt hat.

Der Einfluß der Dauer der primären Bestrahlung ist für das negative Nachbild ein anderer, als für das positive. Nämlich die Stärke des negativen Nachbildes nimmt zu mit der Dauer der Bestrahlung, und scheint sich erst bei längerer Dauer asymptotisch einem gewissen Maximum zu nähern. Durch lange Dauer sehr starker Bestrahlung kann sogar eine bleibende Veränderung der betreffenden Netzhautstelle entstehen, wie dies RITTER<sup>1</sup> erfuhr, als er 10 bis 20 Minuten lang direct in die Sonne gesehen hatte. Zur Erzeugung deutlicher negativer Nachbilder ist es deshalb nützlich, die primäre Bestrahlung länger (bei mäßigem Licht etwa 5 bis 10 Sekunden) dauern zu lassen. Dann ist das positive Nachbild schwach und schwindet schnell, das negative dagegen stärker und dauert länger. So z. B. schwindet wenn man helle Wolken durch das Fenster etwa  $\frac{1}{3}$  Secunde lang betrachtet hat, das positive Nachbild nach etwa 12 Secunden, das negative auf

<sup>1</sup> RITTER, Beiträge zur näheren Kenntniss des Galvanismus. 1805. Bd. II. S. 175—181.

nach etwa 24 Secunden. Wenn ich dasselbe Object da-  
 3 Secunden betrachtete, schwand das negative Nachbild erst  
 1. Ich hielt das Gesichtsfeld dabei ganz dunkel und ließ  
 1 Zeit schwaches Licht durch die geschlossenen Lider ein-  
 rufen, ob das Nachbild noch da sei. Um das negative Nach-  
 bild gezeichnet zu erhalten, ist es nothwendig, während der  
 Erhellung scharf einen bestimmten Punkt des hellen Objects  
 dem negativen Nachbilde ist es noch besser als in dem flüch-  
 1 möglichst nachträglich Einzelheiten zu erkennen, die man  
 bei der Beschauung nicht bemerkt hatte. Hat man nach einander  
 1e Punkte des Objects fixirt, so erkennt man auch nachher 362  
 eis deckende Nachbilder. So kann man auch im Nachbilde,  
 tsfeld die Sonne steht, und man den Blick schnell über  
 weifen ließ, den ganzen Weg abgebildet erhalten, den das  
 auf der Netzhaut zurückgelegt hat. Hat man den Blick auf  
 1 des Feldes einen Augenblick festgehalten, so entsprechen  
 intensivere runde Nachbilder der Sonne, welche länger  
 und wenn sie negativ geworden sind, dunkler werden und  
 Diese sind verbunden durch schmalere verwaschene Streifen,  
 zwar auch hell sind, sich aber bald negativ dunkler zeigen,  
 cher gezeichnet sind, je größer die Geschwindigkeit der  
 für die betreffende Stelle gewesen war. Diese Streifen sind  
 Sonnenscheibe und am Rande verwaschen, weil über die  
 entsprechenden Netzhauttheile nur eine Sehne des runden  
 gegliedert ist, über die mittleren dagegen ein Durchmesser,  
 das Sonnenlicht länger gewirkt hat.

negative Nachbilder bewegen sich, wenn das Auge bewegt  
 nbare Lage im Gesichtsfeld entspricht immer dem Orte,  
 ch sich befinden müßte, dessen Bild auf die von dem primären  
 Netzhautstelle fallen sollte. Ist also der gelbe Fleck von  
 getroffen worden, so befindet sich das Nachbild, wo man  
 öge, immer im Fixationspunkte des Auges und hindert,  
 , feinere Gegenstände zu erkennen. Liegt ein kräftig ge-  
 lld dicht neben dem Fixationspunkte, so verleitet es den  
 es fixiren zu wollen, das Auge wendet sich nach dem  
 id dann fliegt dieses scheinbar immer vor dem Fixations-  
 dem Rande des Gesichtsfeldes hin, ähnlich den fliegenden  
 der Beschauer aber einen äußeren festen Punkt, so stehen  
 ler still. Ihre Bewegung hängt immer nur von Bewegung

um aus den bisher beschriebenen Erscheinungen Schlüsse  
 der Netzhautstelle und des zugehörigen Theils des Seh-  
 sehen wollen, welche von dem primären Lichte erregt worden  
 wir, daß in ihnen erstens nach Erlöschen des primären



Lichtes der Reizungszustand noch eine Zeit lang dauert, was durch die positiven Nachbilder angezeigt wird, und dafs zweitens die betreffende Nervensubstanz neu einfallendes, reagirendes Licht schwächer empfindet, als die früher von Licht nicht getroffenen übrigen Netzhautstellen. Nach der Einwirkung von Licht besteht also erstens Reizung fort, zweitens ist die Empfänglichkeit für neue Reize vermindert. Dafs Reizung einen Zustand verminderter Reizempfänglichkeit zurücklässt, findet auch bei den motorischen und bei anderen empfindenden Nerven statt. Wir nennen einen solchen Zustand Ermüdung.

Aus dem Umstande, dafs die negativen Nachbilder bei steigender Helligkeit des reagirenden Lichts so lange deutlicher werden, bis diese Helligkeit etwa den Grad erreicht hat, wo Verminderung der Lichtstärke um kleine Bruchtheile ihrer ganzen Gröfse am besten wahrgenommen wird, können wir schliessen, dafs die Ermüdung der Sehnervensubstanz die Empfindung neu einfallenden Lichtes ungefähr in dem Verhältnifs beeinträchtigt, als wäre die objective Intensität dieses Lichtes um einen bestimmten Bruchtheil ihrer Gröfse vermindert. Es soll, bei dem Mangel genügender Messungen, hierdurch nur der Gang im Allgemeinen bezeichnet werden, welchen die Intensität der Empfindung einer ermüdeten Netzhautstelle als Function der Intensität des reagirenden Lichtes einhält. So lange noch neben dem negativen Bilde das positive besteht, ist die Reizung der Netzhaut zusammengesetzt aus der noch fortbestehenden Reizung, welche das primäre Licht hervorgebracht hat, und der durch die Ermüdung verminderten Reizung durch das reagirende Licht, und in diesem Sinne können wir die Helligkeit des Nachbildes als die Summe der Helligkeit des positiven Bildes und der durch die Ermüdung verminderten Helligkeit des reagirenden Lichtes betrachten. Ist nun die Verminderung der Helligkeit des reagirenden Lichtes gröfser als die Helligkeit des positiven Bildes, so wird die ganze Helligkeit des Nachbildes geringer sein, als die Helligkeit des reagirenden Lichtes, wie sie den nicht ermüdeten Netzhautstellen der Umgebung erscheint, das Nachbild also negativ werden. Dies ist bei gröfserer Helligkeit des reagirenden Lichtes der Fall. Bei geringerem dagegen ist die Helligkeit des positiven Bildes mehr als hinreichend, den Verlust durch die Ermüdung zu decken; das Bild ist positiv.

Es sei  $H$  die scheinbare Helligkeit des reagirenden Lichts in den nicht ermüdeten Netzhautstellen,  $\alpha H$  in den ermüdeten, wo  $\alpha < 1$ , und  $I$  die scheinbare Helligkeit des positiven Bildes, so mufs nach dem oben Gesagten bei wechselnder Gröfse von  $H$  doch  $\alpha$  ziemlich constant sein. Nehmen wir dies an, so ist  $\alpha H + I$  die Helligkeit des Nachbildes,  $H$  die des Grundes, auf welchem es erscheint. Für

$$H = \frac{I}{1 - \alpha}$$

wird

$$I + \alpha H = H$$

hell, wie der Grund, es wird unsichtbar. Für

$$H > \frac{I}{1-\alpha}$$

$$I + \alpha H < H$$

negativ, umgekehrt für

$$H < \frac{I}{1-\alpha}$$

positiv. Ist  $I$  sehr klein, so kann schon die scheinbare Helligkeit der Netzhaut grösser sein als  $\frac{I}{1-\alpha}$ , dann wird auch im dunkelsten Gesichtsfelde erscheinen. Ist endlich  $I$  ganz geschwunden, so ist  $H$  die Helligkeit im Grunde der Netzhaut. Ist  $1 - \alpha$  bei schwindender Ermüdung sehr klein, so wird eine gewisse mittlere Stärke des reagirenden Lichtes nöthig, um den Unterschied erkennen zu lassen. Im dunkeln Gesichtsfelde wird es nicht zu sehen sein. Endlich wird  $1 - \alpha = 0$ , und das Bild wird ganz unsichtbar.

Was die positiven Bilder im ganz verdunkelten Gesichtsfelde betrifft, so scheint, dass sie durch Verringerung des Eigenlichtes der Netzhaut kommen. Dieses Eigenlicht also, welches wir aus der Reizung auf den Sehnervenapparat herleiten müssen, unterliegt bei der Ermüdung ebenso wie der Eindruck des äusseren Lichtes der Ermüdung des Auges durch Reizung seine Empfänglichkeit beeinträchtigt, lässt sich übrigens auch für elektrische Reize der Netzhaut nachweisen. Wenn man ein negatives Nachbild entwickelt hat, und lässt einen elektrischen Strom aufsteigen und Sehnerven gehen, wobei die helle bläuliche Erscheinung des Gesichtsfeldes eintritt, so wird das negative Nachbild dadurch in ein Bild gerade im Uebergang von positiv zu negativ übergehen. Durch einen aufsteigenden Strom negativ, durch einen absteigenden Strom positiv machen. Das für Licht ermüdete Auge empfindet also den Reiz schwächer. Hat man durch gleichmässige Anfarbenercheinungen im Auge entwickelt und lässt mit dem Reize so kann man die noch bestehenden Bilder im dunkeln Gesichtsfelde positiv machen, indem man Licht durch die geschlossenen Lider lässt, oder nach einer beleuchteten Fläche hinblickt. Ein starker Druckreiz macht also das Auge auch gegen Lichtreiz



In solchen Fällen, wo man ein schwindendes Nachbild durch reagirendes Licht für einen Augenblick sichtbar gemacht hat, sieht man zuweilen unmittelbar nachher im dunkeln Gesichtsfelde wieder ein schwaches positives Nachbild. Daraus ist zu schließen, daß in der ermüdeten Netzhautstelle die Reizung durch reagirendes Licht zwar schwächer ist, als in den nicht ermüdeten Theilen, aber länger nachdauert, welcher Umstand übrigens ebenfalls bei den motorischen Nerven seine Analogie findet, da die Zuckung eines ermüdeten Muskels zwar weniger kräftig ist, aber länger dauert, als die eines nicht ermüdeten. Dieser Wechsel zwischen positiven und negativen Bildern, welcher zuweilen bei wenig auffallenden Aenderungen der Beleuchtung durch Zukneifen der Augenlider, Bewegungen des Augapfels unter den geschlossenen Lidern, auch wohl nach subjectiven Lichterscheinungen durch plötzlichen Druck auf den Augapfel eintreten kann, hat einige Beobachter, namentlich PLATEAU, veranlaßt, einen spontanen Wechsel der Zustände des Nervenapparats während der Dauer der Nachwirkung anzunehmen. Ich selbst kann in dieser Beziehung nur FECHNER beistimmen, daß in den meisten Fällen Wechsel der Beleuchtung, Bewegungen des Auges oder des Körpers u. s. w. Veranlassung zu diesem Wechsel geben. Aber natürlich kann zu einer Zeit, wo sich zwei entgegengesetzte Einflüsse gerade im Gleichgewichte halten, der kleinste Nebenumstand nach der einen oder anderen Seite einen Ausschlag geben. Ich erinnere daran, daß selbst die Athembewegungen auf das Eigenlicht der Netzhaut einwirken. Zuweilen schwinden auch die Bilder nur, ohne sich in die entgegengesetzten zu verwandeln, und zwar, wie AUBERT es passend bezeichnet, so als wenn ein nasse Stelle auf einem erwärmten Bleche schwindet. Uebrigens verschwinden auch schwache objective Bilder zuweilen in ähnlicher Weise, wenn man starr einen Punkt fixirt, z. B. eine Landschaft in der Nacht betrachtet. Es macht mir den Eindruck, als ob die Vergleichung der Erregungsstärke verschiedener Netzhauttheile aufhörte möglich zu sein, wenn die Erregung nicht von Zeit zu Zeit wechselt. Bei objectiven Bildern ist dies jederzeit zu bewerkstelligen dadurch, daß man den Fixationspunkt wechselt, bei subjectiven aber nicht. Wir kommen in der Lehre vom Contraste darauf noch wieder zurück. Ich finde übrigens, daß, wenn man bei möglichst unverrückt gehaltenem Auge dergleichen Bilder aufmerksam festzuhalten sucht, das Gefühl der Anstrengung gerade dann am größten ist, wenn die Bilder zu verschwinden. Dann folgt nach einiger Zeit ein Nachlaß dieser Anstrengung, wobei die Bilder wiederkommen. Welche innere Veränderung dem entspricht, weiß ich nicht anzugeben.

Hierher gehören weiter folgende Erscheinungen, die sich aus den angegebenen Principien erklären.

Wenn man auf grauem Grunde einen hellen Gegenstand, z. B. ein weißes Stück Papier, betrachtet, und dieses plötzlich entfernt, während man die Richtung des Auges unverändert läßt, so erscheint ein dunkleres Nachbild des weißen Papiers, wie in den bisher beschriebenen Fällen. Betrachtet

grauen Grunde dagegen ein Stückchen schwarzen Papiers, und so erscheint ein helles Nachbild. Die von dem Bilde des getroffenen Stelle der Netzhaut ist mehr ermüdet, die von Bilde getroffene weniger ermüdet, als der Rest der Netzhaut, graue Grund sich abbildete. Indem nachher die ganze Netzhaut von dem Lichte des grauen Grundes getroffen wird, ist am stärksten auf den Theil der Netzhaut, der primär schwächer auf den, der vorher grau sah, am schwächsten aufhört. Der Versuch, bei dem wir das schwarze Papier benutzend wegziehen, ist nun deshalb wichtig, weil er zeigt, dass bei Betrachtung des grauen Grundes Ermüdung der von getroffenen Netzhaut eintritt, und dieses Licht deshalb stärker und schwächer empfunden wird. Wenn wir nämlich das schwarze Papier wegziehen, trifft das Licht des grauen Grundes auf die Stelle der Netzhaut, und macht auf diese eben denselben Eindruck wie am Anfang des Versuchs das Grau des Grundes gemacht hat, und es hat aber inzwischen die Theile der Netzhaut, die es vorher nicht und erscheint viel dunkler, wenn wir es mit dem frischen Eindruck von unermüdeten Netzhautstellen vergleichen. Es unterliegt dem Versuch von den früheren dadurch, dass das primäre Licht dasselbe ist, nämlich das Licht des grauen Grundes, und man kann daraus, dass äußeres Licht von constanter Intensität längere Zeit ununterbrochen auf die Netzhaut einfallen, dass immer schwächer und schwächer werdende Erregung hervorbringt. Ja die Erregungsstärke kann, namentlich bei schwachem Lichte, so abnehmen, dass sie überhaupt nicht mehr empfunden wird. Wenn man bei hereinsinkender Nacht irgend einen hellen Gegenstand anhaltend fixirt, ohne die Richtung des Blicks zu ändern, verschwindet derselbe bald vollständig, und erst nach Veränderung des Blicks verändert, pflegt das Object wieder im Auge zu erscheinen. Namentlich am Seehorizonte ist diese Erscheinung auffallend, wenn man bei beginnender Dunkelheit sich auf das Meer durchmustern, weil hier die Nachbilder jedes Theiles des Himmels in denselben Theilen congruent sind, und welchen Punkt des Horizonts sie treffen. So, das Nachbild des dunkleren Meeres auf Meer, des helleren Meeres auf Himmel fällt. Richtet man den Blick dann etwas höher, so trifft man auf den helleren Theile des Himmels ein hellerer Streif, der unten mit der jetzt wieder sichtbar werdende Grenze des Meeres, eine helle parallel fortlaufende Linie, die durch den neuen Horizont geht. Dieser Streif ist das negative Nachbild des Meeres, projectirt. Richtet man den Blick umgekehrt tiefer, so trifft man auf einen dunkleren Streif, das negative Nachbild des Himmels auf dem Meere, begrenzt durch den Horizont des Meeres, nach unten mit einer hellen parallelen Linie. So kann der Horizont im indirecten Sehen



sichtbar werden, aber er verschwindet immer wieder, wenn man ihn direct zu fixiren sucht.

Aehnliche Erscheinungen treten auch ein, wenn man ein weißes oder schwarzes Quadrat auf grauem Grunde fixirt und den Fixationspunkt ein wenig verändert. Dann deckt das Nachbild des Papiers nicht vollständig das Papier selbst, und die Ränder verändern ihre Helligkeit. Wo das Nachbild des weißen Papiers auf den grauen Grund zu liegen kommt, erscheint dieser dunkler; wo das Nachbild des grauen Grundes sich über das weiße Papier hinschiebt, erscheint dieses heller. Beim schwarzen Papier ist es umgekehrt. Hat man den Blick eine Zeit lang genau an einem bestimmten Punkte des Papiers festgehalten und richtet ihn plötzlich auf einen anderen benachbarten Punkt, so sind auch die Ränder des Nachbildes scharf gezeichnet, und der wahre Sachverhalt ist leicht zu erkennen. Wenn man dagegen fortdauernd mit dem Fixationspunkte geschwankt hat, so sind die Nachbilder schlecht begrenzt, und es erscheint dann der helle Grund in der Nähe des weißen Papiers nur verwaschen dunkler schattirt, und der Rand des weißen Papiers ebenso hell schattirt. Aehnliches geschieht, wenn man eine Zeit lang ein weißes Quadrat auf dunklem Grunde betrachtet hat und, ohne den Fixationspunkt zu verändern, das Auge plötzlich dem Object näher bringt, so daß die scheinbare GröÙe des letzteren wächst. Dann erscheint der Rand des Quadrats, soweit er jetzt nicht mehr von dem Nachbilde des früher gesehenen Bildes gedeckt wird, hell aufzublitzen. Entfernt man dagegen das Auge plötzlich, nachdem man das Quadrat längere Zeit fixirt hat, so erscheint es auf dem dunkeln Grunde von einem dunkleren Rahmen umgeben.

Die eben beschriebenen Versuche gehen nun in ganz ähnlicher Weise vor sich, wenn man statt vor dem grauen Grunde dieselbe weiÙe Scheibe vor ganz dunklem Grunde betrachtet. Es tritt hierbei das Eigenlicht der Netzhaut an Stelle des Grau. Nur gesellt sich dazu noch gewöhnlich eine eigenthümliche Erscheinung, die mir davon herzurühren scheint, daß, ehe man absichtlich die weiÙe Scheibe fest zu fixiren begann, der Blick nach der Regel im Gesichtsfelde gewandert ist, und dabei die verschiedenen Theile der Netzhaut nach einander verschieden hellen Beleuchtungen ausgesetzt waren und daher im Beginn des Versuchs, mäßig ermüdet sind. Dadurch wird auch die Empfindung ihres Eigenlichts herabgesetzt. Geht man nun zu fester Fixation eines bestimmten Punctes der weißen Scheibe über, so schwächt sich durch steigende Ermüdung das WeiÙe, während der Lichtnebel des dunklen Gesichtsfeldes zunimmt und allmählig deutlicher, namentlich in der Umgebung des weißen Feldes hervortritt, wo ein objectiver Maasstab, der in Wahrheit freilich irreführt, an der langsam sinkenden Helligkeit der weißen Scheibe gegeben zu sein scheint.

Viele Beobachter, wie früher PLATEAU, neuerdings E. HERING<sup>1</sup> deuten

<sup>1</sup> E. HERING, Ueber successive Lichtinduction und sogenannte negative Nachbilder, *Pflüger's Archiv*. Bd. 43. S. 264. 1888.

das weiße Feld durch Contrast in seiner Nachbarschaft eine Lichtempfindung hervorriefe, oder, wie sie es nennen, eine solche besondere Hypothese nicht nöthig. Wir noch in der Lehre vom Contrast auf diese Hypothese arüber gemachten Auseinandersetzungen wirkt auch vielmehr ein, daß das Eigenlicht der Netzhaut eine Empfindung kleiner Intensität sei, während man dasselbe, wie ich schon hervorgehoben habe, überhaupt nur durch die seiner Stärke kennt, die den Lichtstaub des dunklen, während seine mittlere Stärke nach der modificirten Hypothese berechnet, gar nicht so klein sein kann. Was Ansicht der Sache am Rande der Nachbilder von weißen würde als die wahre Stärke des Eigenlichts ausgeruht betrachten sein, nur besonders deutlich wahrnehmbar ist.

Verlauf eines durch constante Beleuchtung des Eindrucks. Die beschriebenen Erscheinungen lassen auf folgende Empfindungsstärke schließen, wenn von einem bestimmten einer ausgeruhten Netzhautstelle eine constante Beleuchtung Eindruck des ersten Moments hat eine Nachwirkung von dazu gesellt sich gleich darauf verstärkend der Eindruck während, und so fort jedes folgenden. Aber gleichzeitig erregte Thätigkeit des Nerven, die sich durch die Empfindung macht, auch einen gewissen Grad von Erschöpfung. Dem Einfluß des arteriellen Blutes nur langsam schwindet. Die neuen Lichteinwirkungen bringen, zusammenwirkend mit den Nachwirkungen der vorausgegangenen, also nicht mehr die Summe hervor, wie die ersten, welche mit einem Zustand der Ruhe des Auges zusammentrafen. Daraus folgt, daß eine Beleuchtung eine im Anfang schnell steigende Empfindung geben, ein Maximum erreicht, später wieder sinkt. Den Beweis für diese Behauptung hat uns der vorher beschriebene Versuch mit dem Gegenstande gegeben, die zuerst auf schwarzem Grunde gesehen wurde, wenn ihr ein gleich heller weißer Grund untergeschoben wurde. Das Nachbilde erschien, dunkler als der gleich beleuchtete Gegenstand.

Um zu bestimmen, welche Zeit verfließt, ehe das Maximum erreicht ist, haben wir die nach folgendem Plane angestellt wurden. HUNDT UND EXNER<sup>1</sup> ausgeführt worden sind. Man zeigt dem Betrachter erst ein begrenztes weißes Scheibchen (Halbkreis) auf schwarzem Grunde eine meßbare kleine Zeit später erscheint überall auf gleichem Grunde von gleicher Helligkeit, noch etwas später wird das

<sup>1</sup> über die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit. *Sitz.-Ber. d. Wiener Acad.* 61—632. 1863.



Ganze mit Schwarz verhüllt. Der Beobachter aber behält ein Nachbild im Auge, welches den Intensitäten der letzten Momente der Empfindung entspricht. Hat der erst entstandene Eindruck schon sein Maximum erreicht, der zweite noch nicht, so bleibt das ursprüngliche Bild in positiven Nachbilde stehen. Haben beide das Maximum überschritten, so ist der erste schon mehr gesunken, als der zweite; das Nachbild ist negativ. Dazwischen liegt ein Moment, wo die ursprüngliche Figur weder positiv noch negativ sichtbar bleibt, sondern ganz ausgelöscht wird. Dann muß der erste Eindruck das Maximum schon überschritten, der zweite es noch nicht erreicht haben.




Fig. 191.

Um die Bedingungen des Versuchs herzustellen, diente der in Fig 191 abgebildete Apparat. Der Beobachter blickte durch einen feststehenden Spalt 1 von der Breite seiner Pupille. Unmittelbar vor diesem Spalt rotirte eine Messingscheibe N, deren Rand den Spalt zudeckte. Nur ein Zwölftheil des Randes war ausgeschnitten. So lange dieser Ausschnitt vor dem Auge verweilte, sah der Beobachter hierdurch die Bilder eines nicht vergrößernden astronomischen Fernrohrs P, d. h. eines Systems zweier Convexlinsen m und n von gleicher Brennweite, die um die Summe ihrer Brennweiten von einander entfernt waren. Jenseits dieses Linsensystems rotirte eine zweite Scheibe D zwölfmal so schnell wie die erste, so daß sie in 10 Secunden einen ganzen Umlauf machte, während der erwähnte Ausschnitt der ersten Scheibe am Auge des Beobachters vorüberging. Diese Scheibe enthielt eingeklemmt zwischen zwei kleineren Messingscheiben, Sektoren theils von weißem und schwarzem steifen Papier, theils konnten Spalten zwischen diesen freigelassen werden, durch welche das Fernrohr einen Augenblick Bilder ferner Objecte zeigte. Die zweite Scheibe stand im hinteren Brennpunct des Linsensystems, das Auge des Beobachters im vorderen, so daß das optische Bild der zweiten Scheibe mit der Pupille des Beobachters zusammenfiel und für diesen sich, beim Vorrücken eines verdeckenden Randes der entfernteren Scheibe, das gesehene Bild gleichmäßig im

anzen Felde verdunkelte, wozu nur so viel Zeit nöthig war, als der genannte Rand brauchte, um die Breite der Pupille zu durchlaufen.


Bei den Versuchen erblickte der Beobachter zuerst durch das Fernrohr das begrenzte weisse Feld, dann trat ein weisser Sector der Scheibe vor, dann ein schwarzer, der den gröfseren Theil des Umfangs einnahm. Zwischen den einzelnen Beobachtungen blieben immer Pausen von zwei Minuten, bis der Ausschnitt der ersten Scheibe wieder den Blick frei liefs.

S. EXNER fand, dafs das Maximum desto früher eintrat, je stärker die Beleuchtung des weissen Feldes war; ich gebe hier die Ergebnisse zweier Versuchsserien:

Intensität	Zeit zur Erreichung des Maximum nöthig in Secunden	
	I. Reihe	II. Reihe
1	0,2873	0,2654
2	0,2460	0,2176
4	0,2000	0,1744
8	0,1508	0,1188

Man sieht daraus, dafs das Maximum desto schneller erreicht wird, je stärker das Licht, und zwar sind die Zeitdifferenzen, welche einer Verdoppelung der Beleuchtungsstärke entsprechen, nahehin gleich grofs.

Der genannte Beobachter hat auch durch Benutzung verschieden starker Beleuchtungen der beiden weissen Felder noch andere Punkte der Curve abmessen können, welche die Empfindungsstärke als Function der Zeit darstellt, und dadurch die Form einer solchen Curve (*Fig 192*) ziemlich vollständig hergestellt.



*Fig. 192.*



Mit demselben Apparat wurden noch Beobachtungen über die Zeit gemacht, in welcher die Wahrnehmung des Gesichtsbildes zu Stande kommt; davon später.

366 Für die Seitentheile der Netzhaut haben PURKINJE und AUBERT bemerkt, daß der Eindruck heller Objecte auf ihnen viel leichter schwindet, als im Centrum. Die Ermüdung scheint dort also viel schneller einzutreten. Für die negativen Nachbilder auf den Seitentheilen hat AUBERT gefunden, daß sie weniger intensiv sind, als die centralen, übrigens sich im Wesentlichen ähnlich verhalten. Außerdem, finde ich, werden sie viel leichter übersehen, als die centralen Nachbilder, selbst auf hellen Flächen, und nur beim Wechsel der Beleuchtungsstärke bemerkt man sie leicht.

Wir gehen jetzt über zu den Farbenerscheinungen der Nachbilder. Wenn man farbige Objecte betrachtet hat und die Nachbilder auf ganz dunklem oder weißem Grunde von verschiedener Helligkeit betrachtet, so  
367 entsteht je nach Umständen ein positives oder negatives Bild. Das positive Bild ist im Anfang in den Stadien seiner größten Helligkeit gleich gefärbt mit dem Object, und das negative Bild ist, wenigstens sobald es vollständig und kräftig entwickelt ist, complementär zu dem Objecte gefärbt. Der Uebergang von dem positiven zu dem negativen Bilde geschieht indessen gewöhnlich so, dass sich weißliche oder graue Farbtöne anderer Art dazwischenschieben, und zwar ist die Ordnung dieser Farben in der Regel dieselbe, gleichviel ob der Uebergang durch allmähliges Nachlassen der Reizung oder durch Steigerung der Helligkeit des Grundes geschieht.

Die positiven Bilder entwickelt man am besten durch momentane Wirkung des primären Lichtes. Hat man dabei verschieden gefärbte Objecte vor sich, so zeigt das zurückbleibende positive Nachbild im Anfange die Objecte genau in ihren natürlichen Farben. Ehe das Nachbild verschwindet, ergießt sich darüber meistens ein rosenrother Schein, in welchem die früheren Farbenunterschiede fast ganz verschwinden, dann folgen schwach gefärbte gelblich-graue Töne, in denen das der Helligkeit nach positive Bild schwindet oder in ein schwach gezeichnetes negatives Nachbild übergeht.

Die negativen Nachbilder erhält man besser nach längerer Fixation des Objectes. Um sie zu sehen, lege man farbige Papiere auf einen grauen Grund, fixire einen bestimmten Punkt des farbigen Papiers und ziehe es plötzlich weg. Dann erscheint auf dem grauen Grunde ein scharf gezeichnetes negatives Nachbild von complementärer Färbung. So ist z. B. das Nachbild von Roth blaugrün, von Gelb blau, von Grün rosaroth, und umgekehrt. Ueber die Dauer und Stärke dieser Nachbilder gilt im Allgemeinen dasselbe, was vorher über die Nachbilder weißer Objecte gesagt worden ist.

Das Auge also, welches z. B. Gelb gesehen hat, befindet sich nachher in einem Zustande, wo die blauen Theile des weißen Lichts es stärker afficiren, als die gelben Theile. Die Ermüdung der Netzhaut erstreckt ihre Wirkung demnach nicht gleichmäßig auf jede Art von Reizung, sondern hauptsächlich auf eine solche Reizung, welche der primären ähnlich ist. Sehr einfach wird dieser Umstand aus TH. YOUNG's Annahme dreier für die

arbeiten verschiedenen empfindlichen Nervenarten erklärt. Denn Licht diese drei Arten von Nerven nicht gleich stark erregt, verschiedenen Graden der Erregung auch verschiedene Grade nachfolgen. Hat das Auge Roth gesehen, so sind die roth-empfindenden stark gereizt und sehr ermüdet, die grünempfindenden schwach gereizt und wenig ermüdet. Fällt nachher das Auge, so werden die grün- und violett-empfindenden verhältnismäßig stärker afficirt werden, als die rothempfindenden. Es Blaugrün, der Complementärfarbe des Roth, wird deshalb ins Grün überwiegen.

Man verhält es sich, wenn man negative Nachbilder von farbigen Gegenständen auf einem farbigen Grunde betrachtet. Aus der Farbe des Grundes resultirt hauptsächlich diejenigen Bestandtheile, welche in der primären Farbe überwiegen. So läßt ein grünes Object auf gelbem Grunde ein gelbes Nachbild, auf blauem Grunde ein violettes. Denken wir uns Blau aus Roth und Grün, das Blau aus Grün und Violett zu-  
368  
sammensetzt, so kann das Grün in beiden durch Einfluß der Ermüdung vermindert werden. Es ist der Erfolg, daß das Nachbild im Gelb sich dem Violett nähern wird. Ueberhaupt liegt die Farbe des Nachbildes zwischen der des Grundes und der der Complementärfarbe. Man kann, soweit es nur den Farbenton, nicht die Helligkeit betrifft, die Mischung von beiden angesehen werden.

Ich habe unter Leitung von Herrn E. HERING Versuche über farbige Nachbilder,<sup>1</sup> deren Ergebnisse sich durchaus unter die oben aufgestellten Gesetze er aber glaubt zur Widerlegung der Theorie von TH. YOUNG anzuwenden. Seine Einwendungen wären richtig einer Farbentheorie der Grundfarben in einer oder einigen der Spectralfarben zu finden, wenn man das Eigenlicht der Netzhaut als verschwindend klein betrachtet.

Annahme habe ich mich schon in der ersten Ausgabe dieses Buches auf besondere Beziehung auf die Nachbilder. Nun wissen wir von Ermüdungserscheinungen im Auge bisher noch zu wenig, da wir in den meisten Fällen ohne Ausnahme mit Ermüdung aller drei Faserarten anstellen zu können, wie sie Herr HESS anstellt. Aber es geht sich hier nur darum, zu zeigen, daß eine Hypothese über den Verlauf der Netzhautermüdungen möglich ist, die mit den That- sachen in Übereinstimmung ist, welche hier übrigens nur dazu dienen die schätzungen von HESS eine in sich folgerichtige Reihe von Größen zu setzen, die übrigens natürlich keinen anderweitigen Einfluß auf die Richtigkeit macht.

Setze man die Componenten des primären Lichts gleich  $x, y, z$ , die des reagirenden Lichts  $\xi$ . Setze ferner, daß während der Einwirkung von  $x$  die gleiche Grundfarbe  $\xi$  mit steigender Zeit  $t$  abnehme, wie

<sup>1</sup> Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Netzhaut mit homochromie. Bd. 36. Abth. 1. S. 1–32. 1890.

$$\xi' = \xi \cdot e^{-k x t}.$$

Ebenso

$$\eta' = \eta \cdot e^{-k y t}$$

$$\zeta' = \zeta \cdot e^{-k z t}.$$

Diese Gleichungen drücken aus, daß diese Erregungen mit der Zeit um so schneller abnehmen, je stärker die Intensität der ermüdenden Farbe.

Daraus folgt

$$\frac{\xi'}{\eta'} = \frac{\xi}{\eta} \cdot e^{-k(x-y)t}.$$

Ist also im ermüdenden Licht  $x$  stärker vertreten als  $y$ , so wird  $\frac{\xi'}{\eta'}$  mit steigender Ermüdung kleiner als  $\frac{\xi}{\eta}$ . Ebenso ist, wenn  $y > z$  das  $\frac{\eta'}{\zeta'} < \frac{\eta}{\zeta}$ , d. h. der Farbenton des Nachbildes ändert sich so, daß das  $\xi$  am meisten zurücktritt,  $\eta$  weniger,  $\zeta$  am wenigsten. Zurücktreten der überwiegenden Farbe  $x$  nähert das Nachbild im Farbenton deren Complementärfarbe, wozu sich dann noch die complementäre Färbung des Eigenlichts der Netzhaut gesellt.

Gäbe es Spectralfarben, die nur einer oder zweien Grundfarben entsprächen, in denen also  $z = 0$  oder  $y = z = 0$  wäre, so würde für diese keine Ermüdung eintreten und deren Nachbild würde sich der Complementärfarbe dieser Farben nicht nähern können, und die letztere nun aus dem Eigenlicht herkommen können. Dann wäre der Einwurf von HESS berechtigt.

368 Von besonderem Interesse sind die Fälle, wo die Farbe des Objects der des Grundes gleich oder complementär ist. Um Beobachtungen über den ersteren Fall zu machen, thut man am besten, ein schwarzes Object auf einen farbigen Grund zu legen, und nachdem man einen Punkt seines Randes eine Weile fixirt hat, es plötzlich hinwegzuziehen. Unter diesen Umständen ist der neben dem Schwarz sichtbare Theil des Grundes als das primäre farbige Object zu betrachten, der ganze farbige Grund nach Entfernung des schwarzen Objects als das reagirende Licht. Man sieht alsdann ein helles Nachbild des schwarzen Objects, in welchem die Farbe des Grundes nicht bloß lichtstärker, sondern auch gesättigter ist, als im Rest des Grundes, so daß sie auf dem letzteren mit vielem Grau gemischt zu sein scheint. Bei einiger Aufmerksamkeit erkennt man das Dunkel- und Grauwerden des farbigen Grundes auch wohl, ehe man das schwarze Object wegnimmt. Recht auffallend wird es im letzteren Momente, weil nun an dieser Stelle die Farbe in der Weise sichtbar wird, wie sie im ersten Augenblicke des Beschauens dem unermüdeten Auge erscheint. Dieses Grauwerden des Grundes findet sich nicht bloß bei gemischten weißlichen Farben, bei welchen es so stark werden kann, daß der Farbenton des Grundes ganz verschwindet, sondern selbst bei den homogenen Farben des Spectrum und gewisser farbiger Gläser, nachdem man auf das Sorgfältigste alles fremde

geschlossen hat. Wenn man z. B. ein mit Kupferoxydul  
 as, welches nur rothe Strahlen hindurchläßt, vor die Augen  
 und die Ränder des Glases mit einem dunkeln Tuche um-  
 rothes Licht zu den Augen dringen kann, dann durch das  
 weißen Fläche sieht und vor diese ein schwarzes Object  
 an plötzlich entfernt, so sieht man den Gegensatz zwischen  
 Grunde und dem gesättigten Roth des Nachbildes ganz  
 Erklärung dieser Erscheinung liegt offenbar darin, daß  
 chauens der rothen Farbe des Grundes die betreffenden  
 haut für Roth ermüden und es deshalb schwächer  
 unermüdeten Theile, auf welche das Bild des schwarzen  
 war. Ist das Roth auch noch mit Weiß gemischt, so  
 indlichkeit für das Roth in einem stärkeren Verhält-  
 die übrigen Farben, die in dem beigemischten Weiß  
 nd die Farbe muß deshalb durch die Ermüdung der  
 üßmäßig weißlicher werden; da sie aber auch gleich-  
 er wird, erscheint sie grau. Dasselbe geschieht nun  
 mit weißlichem Roth, sondern auch mit ganz reinem  
 wird man die Erklärung theils von dem Lichtnebel des  
 eldes, theils von der gemischten Natur der Eindrücke  
 alfarben herleiten müssen.

näre Farbe complementär zu der reagirenden Farbe des 369  
 erscheint die letztere in der Ausdehnung des Nachbildes  
 den nicht ermüdeten oder durch die Farbe des Grundes  
 der Netzhaut. Wenn man auf einen rothen Grund ein  
 legt, und nachdem man es eine Weile fixirt hat, es weg-  
 ein gesättigt rothes Nachbild, ähnlich als hätte man ein  
 weggenommen. Man kann sich aber leicht überzeugen,  
 Nachbilde eines complementären Objects noch gesättigter  
 ilde eines schwarzen Körpers. Am einfachsten ist es,  
 verfertigen, von dem ein Theil schwarz, ein anderer  
 ün ist, dies auf einen complementären (rothen) Grund zu  
 unkt des Grundes dicht an der Grenze des Schwarz und  
 . Nimmt man das Object dann weg, so erscheint in dem  
 e Farbe des Grundes klarer als in dem vorher unbedeckten  
 . Das Nachbild des Blaugrün ist etwas dunkler als das  
 es ist nicht das Roth, welches dort lichtschwächer wäre,  
 das Roth im Nachbilde des Schwarz wie von einem weiß-  
 ssen, welcher im Nachbilde des Blaugrün das Roth frei-  
 ; also das Nachbild des Roth auf Roth grauroth, des  
 weißroth, des Blaugrün auf Roth gesättigt roth. Man  
 iede sehr gut, wenn man bei diesem Versuch alle drei  
 nder hat.

us, daß das Roth des Grundes noch Weiß enthält, so 370



erklärt sich der Erfolg leicht. Schwarz ermüdet das Auge gar nicht, es empfindet im Nachbilde unverändert das weißliche Roth des Grundes. Roth ermüdet das Auge für Roth, es empfindet im Nachbilde das Roth schwächer, die übrigen Bestandtheile des Weiß ziemlich ungeschwächt. Die Empfindung ist die von lichtschwachem weißlichen Roth (Grauroth). Das Blaugrün macht dagegen das Auge unempfindlicher für die dem Roth fremdartigen Theile in dem Lichte des Grundes, und läßt also das Roth im Nachbilde freier von fremden Beimengungen heraustreten.

Dieselben Versuche gelingen nun aber ebenso gut mit reinen Spectralfarben. Ich habe im Felde eines Fernrohrs mir einzelne Theile des Spectrum hergestellt mit allen Vorsichtsmafsregeln, welche nöthig sind, um die letzten Reste weißen Lichts zu entfernen. Der Grund war so tiefschwarz, dafs man die Blendung des Fernrohrs auf ihm nicht mehr erkennen konnte, vielmehr die wolkigen Figuren des inneren Lichtnebels auf ihm sah. Das Auge wurde von keinem anderen Lichte, als dem eines kleinen Theils des Spectrum getroffen. Auf dieses farbige Feld warf ich nun Nachbilder von complementären Spectralfarben. Zu dem Ende war vor das Ocular unter 45° ein kleines bewegliches Stahlspiegelchen gestellt, in welchem man gespiegelt einen passend abgeblendeten Theil eines anderen, sehr hellen Spectrum sah durch eine kreisförmige Blendung abgegrenzt. Für dieses zweite Spectrum ist ein so hoher Grad von Reinheit nicht erforderlich. Die Anordnungen waren so getroffen, dafs der ganze Kreis in der gleichen Farbe erschien. Sobald man das Spiegelchen vor dem Ocular fortzog, sah der Beobachter statt des bisher durch Reflexion gesehenen Kreises durch das Fernrohr auf das reine Spectrum. Auf diesem erschien das Nachbild des farbigen Kreises. Es traten hier genau dieselben Erfolge ein, wie bei den ähnlichen Versuchen mit Pigmentfarben. Namentlich erschien das Nachbild der Complementärfarben als eine gesättigtere Farbe im Vergleich mit der Farbe des Grundes. Der letztere schien wieder mit einem weißlichen Lichtnebel bedeckt zu sein, welcher an der Stelle des Nachbildes gleichsam fortgenommen war, und die Farbe des Grundes in ihrer grössten Reinheit hervortreten ließ. Aus diesen Versuchen geht unabhängig von den Gründen, die uns die Untersuchung der Farbenempfindlichkeit in § 21 geliefert hat, die wichtige Folgerung hervor, dafs die gesättigtesten objectiven Farben, welche existiren, die reinen Spectralfarben, im unermüdeten Auge noch nicht die gesättigteste Farbenempfindung hervorrufen, welche überhaupt möglich ist, sondern dafs wir diese erst erreichen, wenn wir das Auge gegen die Complementärfarbe unempfindlich machen.

Auch in diesem Falle könnte man glauben, dafs der weißliche Schein, welcher den Grund überzieht, der innere Lichtnebel sei, dessen störende Theile im Nachbilde entfernt seien. In der That sieht man, wenn man das Auge auf den dunkeln Grund neben dem Spectrum richtet, ein complementärgefärbtes Nachbild. Auch in diesem Falle halte ich diese Erklärung für ungenügend, weil die Erscheinung auf sehr hellen Spectralfarben zu sehen

e die scheinbare Helligkeit des Lichtnebels doch wohl zu Folgen wir dagegen der Annahme von TH. YOUNG, so die reinen Farbenempfindungen der einzelnen Nervenarten gegen welche die Spectralfarben immer noch weißlich er- 371 weil nach der nothwendigen Modification jener Annahme : homogenen Lichts nicht bloß eine einzige Art von Nerven- lich erregen kann.

Versuche über Nachbilder farbiger Objecte auf farbigem an nun auch so anstellen, daß man den Fixationspunkt s Object dem Auge nähert und wieder davon entfernt, wie reisse Objecte beschrieben ist. Hat man zum Beispiel eine f gelbem Grunde eine Weile so betrachtet, daß man einen fixirte, und wechselt nun den Fixationspunkt, so fällt das ien Scheibe zum Theil auf den Grund, zum Theil auf die das Nachbild des Grundes. Wo das Nachbild der Scheibe llt, erscheint das Gelb gesättigter, ebenso das Blau, wo ; Grundes auf die Scheibe fällt. Dagegen erscheint das it Grau gemischt, wo das Nachbild der Scheibe auf die Nachbild des Grundes auf den Grund fällt. Der Erfolg nderungen dieser Versuche läßt sich leicht übersehen. sich auch Contrasterscheinungen ein. Hat man ein weißes n auf rothem Grunde fixirt, und wirft dann das Nachbild das Nachbild des rothen Grundes blaugrün, das des kleinen th durch Contrast zu jenem Grün, wie sich im nächsten n wird. Am besten legt man zu dem Ende das farbige ifses Blatt, auf das farbige dann ein weißes Schnitzelchen, einer Pincette festhält, während man das farbige Blatt weg- rscheint eine solche Contrastfärbung auch um das Nachbild adrats auf weißem Grunde.

ur farbige, sondern auch weiße Objecte geben farbige ien die Farben gewöhnlich mannigfach wechseln. Man be- scheinungen gewöhnlich als das farbige Abklingen der Reihenfolge der Farben ist dabei verschieden, je nach der tensität des primären Eindrucks. Die Farbenfolge nach hauung finde ich übereinstimmend mit FECHNER<sup>1</sup> und rsprüngliche Weiß geht schnell durch grünliches Blau schönes Indigblau, später in Violett oder Rosenroth über.

hell und klar. Dann folgt ein schmutziges oder graues lessen sich das positive Nachbild meist schon in ein ne- , und im negativen Bilde wird dieses Orange oft noch ein rün. Nach sehr kurzer Einwirkung des primären Lichts uge die letzte Farbe, und das Bild schwindet, ehe es ne-

<sup>1</sup>Ann. L. 220. 1840.

<sup>2</sup>Le Chimie et de Physique. 3. Ser. XLII. 445—446. 1850.




gativ wird. Dieselbe Farbenfolge fand auch AUBERT nach der Betrachtung des etwas bläulich gefärbten Entladungsfunkens einer Leydener Flasche, nur war das Orange auf dunklem Grunde nicht deutlich erkennbar, auf weissen dagegen sowohl diese Farbe als das folgende Grün sehr deutlich. Umgeben ist das Bild von einem gelben Hofe, wohl dem negativen Nachbilde des durch unregelmässige Brechung im Auge zerstreuten bläulichen Lichts.

372 Die bisher beschriebenen Erscheinungen beziehen sich auf den Verlauf des Nachbildes im ganz dunkeln Felde. Wenn es dabei überhaupt zur Bildung negativer Nachbilder kommt, so erscheinen diese nur in das Eigenlicht des dunkeln Feldes dunkel eingezeichnet. Wenn man nun während des Bestehens eines solchen Nachbildes allmählig reagirendes Licht zulässt, indem man die Hände, oder ein dunkles Tuch, mit dem man die Augen bedeckt hat, langsam hinwegzieht, so beobachtet man im Allgemeinen, dass das Nachbild dabei in die späteren Stadien seiner Farbenentwicklung übergeht und wieder zurückschreitet, wenn man das reagirende Licht wieder schwächer macht. Lässt man z. B. Licht hinzutreten, während das Bild im absoluten Dunkel blau ist, so geht es durch Rosaroth in ein negatives gelbes Bild über. Deckt man schnell genug wieder zu, so findet man das Blau wieder. Ist das Bild im absoluten Dunkel rosaroth, so wird es durch schwaches Licht gelbroth u. s. w. Wenn das positive Nachbild im dunkeln Gesichtsfelde schliesslich ganz geschwunden ist, sieht man auf schwach erleuchtetem Grunde noch längere Zeit ein graues oder grüngraues negatives Nachbild, und der hellere Grund, der es umgiebt und der den nicht ermüdeten Stellen des Auges entspricht, erscheint dann rosaroth.

Zur Erklärung dieser Erscheinungen hat PLATEAU die Annahme gemacht, dass die Dauer der einzelnen Stadien der Nachbilder für die verschiedenen Farben verschieden sei, und er suchte dies durch die im vorigen Paragraphen erwähnten Versuche auch direct zu erweisen. Um eine vollständige Erklärung zu geben, müssten wir nicht blos den Verlauf der nachbleibenden Reizung, sondern auch den Verlauf der Ermüdung vollständig kennen. Indessen lässt sich doch einiges aus ihnen schliessen. Im ganz dunkeln Gesichtsfelde sind nämlich die ersten hellsten Stadien der Erscheinung ziemlich unabhängig von dem Grade der Ermüdung, weil diese erst in Betracht kommt, sobald die Helligkeit des positiven Nachbildes sich von der des inneren Lichtnebels nicht mehr sehr unterscheidet. Wir können deshalb als wahrscheinlich annehmen, dass die grünblaue, blaue und rosaroth Phase nur von der nachbleibenden Reizung bedingt sind, während bei der gelben und grünen, in denen sich das negative Nachbild ausbildet, auch die Ermüdung in Betracht kommt. Wir müssen daraus schliessen, dass die nachbleibende Reizung für die drei Farben Roth, Grün, Violett in der Weise abnimmt, wie die nebenstehende *Fig. 193* es darstellt. Darin bedeuten die horizontalen Abscissen die Zeit, die verticalen Ordinaten der Curven die Intensität der Reizung. Die ausgezogene Linie entspricht dem Grün, die punktirte dem Violett, die gestrichelte dem Roth. Die positive Nachwirkung

Farben continuirlich ab, aber so, daß die Abnahme der  
 die schnellste, nachher die langsamste ist, die des Grün  
 nste,



373

as Rothe zieht. Nun mischt sich in Wirklichkeit aber die  
 he in dem weißlichen inneren Lichtnebel ein grünliches Nach-  
 daß also die Ermüdung für Grün, dessen nachbleibende  
 allsten geschwunden ist, schließlich am geringsten zu sein  
 eine negative Bild, mit positivem Roth gemischt, wird  
 welches je nach der größeren Stärke des einen oder an-  
 dunkler, als der Grund erscheinen kann, und zuletzt in  
 enn auch das Roth erlischt. Bei PLATEAU's Versuchen  
 r Farbeindrücke stellte sich dasselbe Gesetz der Ab-  
 diejenigen Eindrücke, welche im Anfang am schnellsten  
 ich am längsten in schwachen Resten dauerten. Ganz  
 ich die Reihe der Farbenerscheinungen, wenn die Er-  
 worden ist, wie es nach längerer Einwirkung weißen

Einwirkung sehr intensiven Lichtes stattfindet. Bei  
 ; weißen Lichtes zeigt sich nach FECHNER's Beobachtungen  
 Ermüdung schon während der Betrachtung des Weiß da-  
 farbig wird. Nachdem er die Augen eine Zeit lang ge-  
 hatte, um die Nachwirkung früherer Eindrücke zu be-  
 : dieselben auf ein weißes im Sonnenschein auf schwarzem  
 eld. In den ersten Momenten liefs sich wegen einer Art  
 sicheres Urtheil über das Vorhandensein oder Nicht-  
 Farbe fällen; eine solche scheint sich in der That erst  
 u entwickeln. Bald nämlich färbt sich das Papier ent-  
 in blaugrau oder blau, ohne daß bei oftmaligen Ver-  
 ungsstufe durch Grün wahrzunehmen gewesen wäre, dann  
 roth. Die gelbe Phase ist die kürzeste; die blaue  
 1 lange, ehe sie in die folgende übergeht. Nach der  
 letten konnte er keine weitere wahrnehmen, obgleich er  
 u großer Anstrengung des Auges fortsetzte. Auch im  
 ichte nahm er die angegebene Folge der Färbungen oft  
 mal mit größerer Entschiedenheit als das andere Mal;  
 Färbungen erkannte er hier in der Regel leichter als die  
 VER stellt die Erscheinungen durch drei Curven, aber mit

anderen Grundflächen vor, ähnlich denen der *Fig 194*, wo wieder die horizontalen Abscissen der Zeit proportional sind, die verticalen der Erregungsstärke der Netzhaut bei dauernder Betrachtung einer weissen Fläche. Die ausgezogene Curve entspricht dem Grün, die gestrichelte dem Roth, die punktirte dem Violett.




Fig. 194.

In der Zeit von 0 bis würde die Farbe gelbgrün, zur Zeit 1 weiflich grün, bei 2 weiflich blau bei 3 violett, später rosaroth sein.

Nach längerer und stärkerer Einwirkung primären weissen Lichts zeigt das Nachbild auf ganz dunklem Grunde folgende Farbenreihe: Weifs, Blau, 374 Grün, Roth, Blau und auf weissem Grunde schliesslich noch blaugrün und gelb. Beim Roth wird das Bild negativ. SEGUIN schaltet in seine Beschreibung einige Zwischenstufen mehr ein. Die Farben der ersten Reihe sind ihm Weifs, Grün, Blau, die der zweiten (negativen) Gelb, Roth, Violett, Blau, Grün. Wenn die Einwirkung des weissen Lichts eine gewisse Zeit überdauert hat, ist diese Farbenreihe constant und wird durch längere Einwirkung nicht weiter geändert. Bei einer kürzeren, aber doch nicht bloss momentanen Dauer der primären Lichtwirkung, wo das primäre Weifs sich deutlich gelb gefärbt hatte, war die Farbenfolge Gelb, Blau, Rothgelb, dann wurde es negativ grün. BRÜCKE giebt an: Grün, Blau, Roth, dann negativ ohne deutliche Farbe. Die blaue Phase scheint also immer die erste Änderung des primären Lichteindrucks zu sein, dann folgt eine rosenrothe, rothgelbe bis grüne positive Phase, je nach der Dauer des primären Eindrucks.

Auch bei diesen farbigen Nachbildern bestätigt sich die Regel, dass Erhellung des Grundes durch weisses Licht die späteren Phasen des Nachbildes herbeiführt, während Verminderung des reagirenden Lichtes das Nachbild wieder auf frühere Phasen zurücktreten lässt. So oft ich Nachbilder beobachtet habe von gleichmässig erleuchteten Flächen, für deren Umrisse mein Auge gut accommodirt war, habe ich die Farbenveränderungen des Nachbildes entweder auf der ganzen Fläche gleichzeitig, oder auch wohl unregelmässig von dieser oder jener Seite vorschreitend gesehen. Dagegen ist es nach dem Anblicke der Sonne oder ähnlicher blendender Objecte gewöhnlich, dass die Farbenveränderungen des Bildes vom Rande nach der Mitte hin vorschreiten. Ausser den Unregelmässigkeiten der Brechung, welche für hellere Objecte immer grössere Mengen Licht in die Nachbarschaft des Bildes verbreiten, kommt hier auch wohl in Betracht, dass bei schmerzhafter Blendung des Auges es fast unmöglich wird, die Accommodation und Richtung des Auges festzuhalten. Die Folge davon ist, dass die der Mitte des Sonnenbildes entsprechende Stelle der Retina anhaltender und intensiver

unterworfen wird, als die dem Rande jenes Bildes näheren. Der selbst schließt sich ringsum der Widerschein des in und im Auge selbst diffus zerstreuten Lichts. Wenn man ausgeruhte Auge plötzlich für einen Augenblick nach der Seite wendet, so erkennt man in der blendenden Lichtfläche kaum die Gegenstände. So hat man denn in diesen Fällen immer nach der Peripherie hin allmählig abnehmende Lichtwirkung, und im Nachbilde ein verschiedener Verlauf der einzelnen Phasen der Wirkung, desto langsamer verlaufen im Ganzen je weiter man vom Rande des Nachbildes meist entfernt sieht, welche allmählig gegen das Centrum vorrücken. Die Reihenfolge der Farben in den peripherischen Theilen der Erscheinung meist etwas abweichend von der in der Sonne. Das Nachbild hat in seinen ersten Stadien dieser Erklärung entgegen einen größeren Umfang als die scheinbare Größe der Sonne erfüllt leicht in den Fehler, das ganze Nachbild für das eigentliche Bild allein zu halten, und zu glauben, daß die verschiedenen Phasen, die sich darin entwickeln, dieser selbst angehören, und die Eigenschaften ihrer Umgebung entsprechen. Um das Nachbild 375 regelmäßig zu entwickeln, nehme ich ein sehr dunkel gefärbtes Glas oder mehrere complementär gefärbte Gläser (z. B. ein rothes und ein grünes), lege sie übereinander, und sehe durch sie nach der Sonne hin, welche durch sie als eine schwach sichtbare Lichtscheibe erscheinen muß. Dann nehme ich das Glas für einen Moment weg, und schliesse sogleich die Augen. In diesem Augenblicke sind dieselben verhältnißmäßig wenig angegriffen, und haben keine Gelegenheit zu verändern, während doch das Nachbild sich entwickelt. Unter diesen Umständen finde ich auch im Nachbilde die Phasen, welche in seiner ganzen Ausbreitung eine gleiche Reihenfolge zeigen, und ziemlich die Größe der scheinbaren Sonnenscheibe einnehmen. Die Abweichungen, welche am Rande vorkommen, den ich im Auge zuschreiben kann.

Unter diesen Umständen in der Umgebung des Sonnenbildes verlaufen, welche weisse Gegenstände im Nachbilde sichtbar geben. Positives Blau, Rosaroth, welches durch Dunkelgrün übergeht, während das Bild der Sonne selbst in der ersten Phase als ein verwaschener, nicht regelmäßig runder Fleck erscheint, der ungefähr zu der Zeit, wo der Grund rosenroth wird, die zweite Phase tritt, und sich hellblau färbt. Die Erscheinung geht schnell in die dritte Phase über, indem das Blau zuerst in der Mitte grün wird, während am Rande ein rothliches, dunkler als die Umgebung ist, und an dessen Stelle dann auch wohl schon in dieser Phase ein noch dunkleres Grün abzeichnet. Richtet man die Augen während dieser Erscheinung auf ein weisses Feld, so verwandelt sich das positive Grün durch das negative Blau in die folgende Phase.

Die vierte Phase entsteht, indem das Roth des Saumes sich über die Mitte des Bildes verbreitet. Der blaugraue Saum wird dafür breiter und dunkler. Das ganze Nachbild ist jetzt dunkler als die Umgebung. Letzteres erscheint im Gegensatz dazu weißlich oder grünlich. Es ist dies das letzte negative Grün vom Bilde der Himmelsfläche. Die etwa vorhandenen Nachbilder der Fensterstäbe erscheinen darin hell. Blickt man in dieser Phase auf weißen Grund, so geht das Roth in Grünblau über.

In der fünften Phase endlich nimmt das ganze Nachbild die blaue Farbe des bisherigen Saumes an, und verschwindet im dunkeln Felde mehr in diesem Stadium des Blau, während es auf weißem Felde grünblau erscheint.

Diesen von FECHNER aufgestellten Phasen möchte ich noch eine sechste anschließen, wo man im dunkeln Felde vom Nachbilde nichts mehr erkennt, wohl aber auf weißem Felde noch einen gelben oder bräunlichen Schein sieht. Endlich nach ziemlich langer Zeit schwindet auch dieser. Hat man während dieser Zeit, und selbst noch später, wo der gelbe Schein geschwunden ist, auf Weiß gesehen, und schließt plötzlich die Augen, so tritt noch wieder ein schwaches positives bläuliches Nachbild auf, welches schnell wieder schwindet. Öffnet man dann die Augen, indem man sie auf Weiß richtet, so sieht man im ersten Augenblick noch wieder das gelbe Nachbild. Die 376 Erklärung dieser Erscheinung scheint mir in dem schon erwähnten Umstande zu suchen, daß in einem ermüdeten Nerven die neue Reizung langsamer verschwindet, als in den umgebenden unermüdeten Theilen der Netzhaut.

Es scheint übrigens der Verlauf dieser Nachbilder intensiven Lichts bei verschiedenen Personen nicht wesentlich verschieden zu sein, wenn sie unter denselben Umständen entwickelt werden; wenigstens stimmen in dieser Beziehung meine eigenen Beobachtungen, so weit sie reichen, mit FECHNER'S und SEGUN'S überein.

Bei dieser complicirteren Farbenfolge dürfen wir vermuthen, daß durch die stattfindende Ermüdung die Zeit, in der die Eindrücke der einzelnen Farben in der Netzhaut schwinden, so wie auch die Perception des inneren Lichtnebels geändert sei, und da wir weder diese Verhältnisse genau genug kennen, noch wissen, wie die Ermüdung selbst bei verschiedenen Graden derselben für die einzelnen Farbenempfindungen verschwindet, so ist eine vollständige Erklärung der einzelnen Stadien dieses farbigen Abklingens nicht möglich. Um sie zu geben, würde zuerst der Verlauf der Ermüdung und ihr Einfluß auf den Verlauf der Erregung für die einzelnen reineren Farbeindrücke bestimmt und verglichen werden müssen.

Wenn wir das Abklingen des Nachbildes nach Eindrücken gesättigter Farben genau beobachten, ist die Erscheinung allerdings sehr viel einfacher, aber es fehlen Farbenveränderungen doch nicht ganz. Die Hauptzüge der Erscheinung sind schon vorher angegeben worden. Es erscheint zuerst ein positives dem primären Lichte gleich gefärbtes, später ein negatives complementäres Bild. Der Übergang von positiv zu negativ geschieht

hafteren Lichteindrücken in der Regel nicht so, daß das erbläst, und dann das andere sichtbar würde, sondern in stadium verändert sich die Farbe durch weißliche Farben- at man nur eine primäre Farbe im Gesichtsfelde gehabt, Farben des abklingenden Bildes noch immer ziemlich ge- on mehreren Beobachtern als gesättigte Farben angegeben im dunkeln Gesichtsfelde an einem Vergleichungspunkte aber an dem nur momentan gesehenen primären Objecte n von ungefähr gleicher Helligkeit vor sich hatte, so sieht chbilder im Übergangsstadium von positiv zu negativ viel iverschiede zeigen, als die ursprünglichen Farben, indem nisch sind mit dem rosarothem oder gelblichen Weiße, Nachbilder momentan gesehener weißer Objecte zeigen. g ist namentlich das Nachbild eines momentan angeschauten trum interessant. Nachdem noch einige Secunden die n Nachbilde sichtbar gewesen sind, und die lichtschwachen sich ganz verdunkelt haben, verwandelt sich das ganze röthlich weißen Fleck von der Gestalt des Spectrum, in iverschiede kaum noch angedeutet sind, nur zieht das Orange etwas in das Bläuliche. woran sich an der Stelle dessen, schon negativ gewordenen grünblaues Nachbild icht über den Ort der früheren Farben im Nachbilde n, mußte ich auf dem weißen Schirm, auf den das 377 war, einen schwarzen Strich machen, der parallel den Spectrum schnitt, und im Nachbilde sichtbar blieb. So las röthlich weiße Nachbild der ganzen Ausdehnung des nge bis Indigo entspricht. Dasselbe Resultat gewinnt ige Papiere von nahe gleicher Helligkeit von der Sonne d durch momentanes Anschauen ein Nachbild entwickelt. s hervor, daß im positiven Nachbilde gefärbter Objecte Anblicke zuerst die vorherrschende Farbe schwindet, und dem eines weißen Objects ähnlich wird, wobei nament- rosenrothe Phase eines solchen hervortritt. Dann ent- die Complementärfarbe des negativen Nachbildes, aber bar werden, noch ehe das positive Bild negativ geworden ller erscheinen als der dunkle Grund. Ich glaube das mplementärfarbe darauf zurückführen zu können, daß das schwach und weiß gewordene positive Bild deckt Ermüdung des Auges in dem inneren Lichtnebel ent- und complementären Bilde. Es ist klar, daß durch z. B. nach Anblick von Roth positives Weiß und ne- ammen ein grünlich weißes positives Bild geben können. mementären Bilder sind von mehreren Beobachtern<sup>1</sup> er-

<sup>1</sup> *Physiologie der Sinne*. II. 110. 1825. — FECHNER, *Phys. Ans.* L. 213. 1840. — über subjective Farben, *Denkschr. der Akad. zu Wien*. Bd. III. S. 12. 1850.



wähnt. Hat man sie allein oder nur mit der primären Farbe zusammen in Gesichtsfelde, so erscheint die Complementärfarbe ziemlich gesättigt. Kann man sie aber mit Nachbildern anderer Farben vergleichen, so habe ich stets gefunden, daß die Complementärfarbe stark mit Weiß oder Grau gemischt erschien, so lange sie noch heller als der Grund war, erst im negativen Nachbilde entwickelt sie sich dann gesättigter.

Im Sinne von TH. YOUNG's Farbentheorie würden wir diese Erscheinungen so erklären, daß jede, auch die gesättigteste objective Farbe subjectiv mit Weiß gemischt ist, daß die starke Erregung, welche der vorherrschenden Farbe entspricht, verhältnißmäßig schneller abnimmt, als die schwachen Erregungen, welche den anderen im Weiß enthaltenen Farben entsprechen, so daß der gesammte Farbeindruck, indem er schwächer wird, auch sich dem Weiß nähert. Dann gewinnt in den lichtschwächeren Stadien des positiven Bildes endlich auch das durch Ermüdung bewirkte negative Bild mit seiner Färbung einen merklichen Einfluß.

Bei den einzelnen Farben geschieht das Abklingen nach momentanen Anblicke in etwas verschiedener Weise, je nach ihrer Verwandtschaft mit den Farbtönen des abklingenden Weiß. Beim Grün ist es meist am einfachsten, weil seine Complementärfarbe Rosaroth dem Rosaroth des abklingenden Weiß gleich ist. Dieser Farbenton entwickelt sich deshalb besonders hell und schön. Grünliches Blau geht durch Blau und Violett, Blau durch Violett in Rosaroth über, im letzteren Falle entwickelt sich die  
378 folgende Phase des Gelb reiner und kräftiger, weil sie mit der Complementärfarbe des Blau zusammenfällt. Die vor dem Rosaroth liegende grünblaue und blaue Phase des abklingenden Weiß kann sich bei den bisher genannten Farben wegen ihrer Ähnlichkeit mit diesen Farben selbst nicht wohl bemerklich machen, scheint es aber zu thun beim Gelb, welches durch grünliches Weiß in Violett übergeht, und beim Roth. Bei dem letzteren tritt statt des Rosaroth mehr eine violette, später graugrüne Farbe ein. Es schwindet übrigens verhältnißmäßig am schnellsten. Daß die grüne Stufe, wenn man keine anderen Farben zur Vergleichung im Gesichtsfelde hat, häufig gesättigt grün erscheint, ist schon vorher erwähnt. Es stimmen mit diesen Beobachtungen im Wesentlichen auch die Versuche von AUBERT, welche er bei Betrachtung des elektrischen Funken durch farbige Gläser erhielt, nur das sehr gemischte Gelb gab ihm noch die gelbe Stufe des abklingenden Weiß nach dem Violett, ehe es zum negativen Blau kam. Meist auch bildete sich ein Lichthof, der die Stadien schneller durchlief.

Nach längerer oder stärkerer Einwirkung primären farbigen Lichts machen sich ebenfalls während des Überganges von dem positiven gleichfarbigen zum negativen complementärgefärbten Bilde einige von den Phasen merklich, welche weißes Licht zu dieser Zeit zeigt. Namentlich tritt vielfach der rothe Saum, und um diesen der blaugraue Saum auf. FECHNER hat dergleichen Versuche angestellt, indem er durch Combinationen verschiedener farbiger Mittel, welche nur eine oder zwei Farben des Spectrum

urchliefsen, nach der Sonne sah; ich selbst kann einige Beobachtungen hinzufügen, welche ich mit prismatischen Farben angestellt habe, indem ich eine runde Öffnung betrachtete, durch welche Sonnenstrahlen, die ein Prisma assirt hatten, traten. Wenn das farbige Licht so intensiv ist, daß es weiß der gelb erscheint, so bleibt dies auch anfangs im Nachbilde, dann entwickelt sich über allmählig die eigentliche Farbe deutlich.

Homogenes rothes Licht brachte FECHNER hervor, indem er theils durch ein rothes Glas, theils durch eine dicke Schicht Lackmustinctur nach der Sonne sah. Bei directer Betrachtung erschien es wegen seiner hohen Intensität gelb. Auch das Nachbild war anfangs gelb, am Rande roth, und wurde später durch Verminderung seiner Intensität ganz roth, gleichzeitig wachte ein schwarzblaugrüner Saum auf. Im dunkeln Felde entwickelt sich bei diesem Versuche gewöhnlich kein deutliches negatives Bild. Auf weißem Grund dagegen wird die grünblaue Farbe des Saumes central. Ich habe dasselbe an prismatischem Roth gesehen. Der Übergang vom Roth zum grünblau geschah bei diesen Versuchen durch Violett. Nach etwas aneinander Betrachtung einer Flamme durch ein rothes Glas geschieht es dagegen meist durch ein positives Gelbgrün, dem das negative Grünblau folgt.

Homogenes Gelb erhielt FECHNER durch Combination zweier blaßgelben, eines grünen und eines blaßrothen Glases, wobei außer Gelb nur wenig Grün durchging. Das Nachbild erschien gelb mit rothem Rande, um letzteren bildete sich ein dunkel blaugrüner Ring. Bei einem einfachen gelben Glase, welches Roth, Gelb, Grün und eine Spur von Blau durchliefs, folgte sich Gelb, Grün, dann Blaugrau mit rothwarzem Umring. Bei einem prismatischen Gelb sah ich ebenfalls den Übergang in Grün und den rothschwarzen Umring. Das Grün und Roth kommen im Nachbilde des Weißen unter denselben Umständen vor. Dagegen sah PURKINJE,<sup>1</sup> nachdem er eine Kerzenflamme 12 bis 60 Secunden angeschaut hatte, die Farbenfolge: blendend weiß, gelb, roth, blau, mild weiß, schwarz.

Ziemlich reines Grün, mit Gelb gemischt, erhielt FECHNER durch ein grünes, ein hellblaues und zwei hellgelbe Gläser. Die Sonne erschien dadurch grünlichweiß; ebenso das Nachbild mit schwarzrothem Umringe. Grün, mit sehr wenig Blau und Gelb gemischt, erhielt er durch drei grüne und ein gelbes Glas. Die Sonne erschien fast weiß, das Nachbild ebenso etwas grünlich mit bläulichweißem Saum, später bläulichweiß mit schwarzrothem Umring, um den eine Zeit lang ein schwach lilafarbener Schein sichtbar war. Ich selbst erhielt von prismatischem Grün ein grünes Nachbild, blau gesäumt, und auf weißem Grunde dunkles Purpur, gelb gesäumt.

Blau, mit Grün gemischt, erhielt FECHNER durch eine Kupferlösung. Die Sonne erschien, dadurch gesehen, weiß. Das Nachbild anfangs ebenso weiß, dann blau. Es entwickelte sich dann ein positiv grüner, um diesen

<sup>1</sup> J. PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche*. I. 100. 1819.

V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik*. 2. Aufl.

ein negativ rother Rand. Prismatisches Blau erzeugte mir ebenfalls den purpurn Saum, während die Umgebung complementär Goldgelb gefärbt erschien.

Homogenes Violett erhielt FECHNER mittels einer dicken Schicht schwefelsaurer Kupferlösung, mit Ammoniak versetzt, und eines violett gefärbten Glases. Die Sonne erschien bläulichweiß. Ebenso anfangs das Nachbild; es bekam dann einen dunkelvioletten, um diesen einen schwarzrothen Umring, die Umgebung grünlich. Die Erscheinung verschwand, ehe der Umring central wurde.

In allen diesen Fällen zeigt sich, wo der Saum des Nachbildes anfangs negativ zu werden, der rothe Saum, der auch bei den Nachbildern des Weißen eintritt, als wäre die homogene Farbe mit Weiß gemischt, dessen Abklingungsphasen sich merklich machen zu der Zeit, wo die positive Nachwirkung der Hauptfarbe mit der complementären negativen sich im Gleichgewicht hält.

Wenn das primär gesehene weiße oder farbige Licht von geringer Stärke oder bei mäßiger Stärke von sehr geringer Dauer ist, so bleiben positive Bilder zurück, die durch sehr schwach gefärbte weißliche Töne anklängen, deren Farbenton schwer zu benennen ist und durch Contrasten der auffälligsten Weise abgeändert werden kann, wodurch denn die sonderbarsten scheinbaren Widersprüche in den Resultaten eintreten. Hat man viele verschieden gefärbte Objecte im Gesichtsfelde, so blassen die Farbenschiede im Nachbilde aus. Dieser Art scheinen auch die von ARBENZ bei Beleuchtung farbiger Objecte mit dem elektrischen Funken erhaltenen Nachbilder gewesen zu sein. So erscheinen ihm rothe Quadrate auf Weiß im Nachbilde roth, ein breiterer rother Streifen, aus demselben Papier geschnitten, mit weißen Quadraten auf weißem Grunde dagegen grün. Da Nachbild blauer und gelber Streifen mit schwarzen Quadraten auf schwarzem Grunde erschien ihm immer gelb, auf weißem Grunde lieferten beide Streifen blaue Nachbilder. Wovon diese Verschiedenheiten abhingen, bleibt noch zu ermitteln.

380     Andere Erscheinungen des farbigen Abklingens beobachtet man an rotirenden Scheiben, welche schwarze und weiße Sectoren haben, und nicht so schnell rotiren, daß ein ganz continuirlicher Eindruck im Auge entsteht. Wenn man eine solche Scheibe anfangs langsam, dann allmählig schneller rotiren läßt, und sie anhaltend betrachtet, aber so, daß man vermeiden will, der bewegten Figur mit dem Blicke zu folgen, bemerkt man, daß das Weiß sich färbt, und zwar an dem vorangehenden Rande röthlich, an dem hinterher folgenden bläulich. Bei schwächerem Licht zieht der röthliche Farbenton mehr in das Rothgelbe, der bläuliche in Violett, bei stärkerem der erste in Rosaroth, der letztere in Grünblau. Bei langsamer Rotation ist der bläuliche Ton anfangs über einen breiteren Theil des Weißen ausgedehnt als der röthliche. Bei schneller Rotation dagegen breitet sich das Roth als Rosaroth über das ganze Weiß aus, während das Grünblau auf die schwarzen Sectoren hinübereückt; im Ganzen erscheint dann auf der Scheibe das Violett zu über-

schnellerer Rotation kann man die verschiedenen Sektoren nander scheiden, man sieht dann das Feld fein gesprenkelt, ischen violetter Rosa und Grüngrau hin und her flimmern. weiterer Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit wird das er, die graue Mischfarbe des Weiß und Schwarz tritt r, und ist nur noch von veränderlichen gröfseren Flecken a überlaufen, welche wie die Flecken und Streifen in ge- eng geformt sind.

se verschiedenen Stadien der Erscheinung sehr gut neben n eine Scheibe in drei concentrische Ringe abtheilt, wie dem innersten 2 schwarze und 2 weisse Sektoren, dem

en je 4, dem äufseren je ie Scheibe mit gewisser hat man auf dem innersten end grünliche Färbung des i die rosaroth, im äufsern e Flimmern. Bei gröfserer igt das innere Feld die das mittlere das feinnern, das äufseren das mit Grau. Ich bemerke dabei e Streif, auf welchem das en entwickelt ist, immer s die benachbarten Streifen,



Fig. 195.

hsel langsamer oder schneller stattfindet. Die Ordnung v zuerst auf den weissen Streifen auftreten, ist an einer lten Scheibe erst nach einiger Übung zu erkennen, Scheibe (Fig. 196),

warzen und einer sen Spirallinie be- daraus hervor, dafs Retina in schneller weifsem Lichte ge- erdunkelt wird, so ch im Zustande ab- und sinkender Er- Zeit der Maxima it für alle Farben ugenblick fällt, ng für Roth und t als für Grün.



Fig. 196.

381

Farbenercheinungen

ersten Augenblicke des Hinsehens ein, sondern erst d werden dann allmählig immer glänzender. Es scheint

also ein gewisser Grad von Ermüdung des Auges durch das flimmernde Licht dafür nothwendig zu sein. Außerdem verbinden sich damit nun noch andere Erscheinungen, welche von einer verschiedenen Empfänglichkeit verschiedener Stellen der Netzhaut für diese Art von Reizung herzurühren scheinen. Es werden nämlich in dem flimmernden Licht gewisse Muster sichtbar, die zum Theil in Beziehung zu bestimmten Stellen der Netzhaut stehen.

PURKINJE'S<sup>1</sup> Lichtschattenfigur. Wenn nämlich die Geschwindigkeit der Scheibe so groß geworden ist, daß man die einzelnen Sektoren nicht mehr einzeln erkennt, so erscheint die Zahl der Sektoren vermehrt, und diese bilden gleichsam ein Gitter von verwaschen gezeichneten und gekrümmten Stäben, dessen Maschen in Richtung des Radius der Scheibe am längsten sind. Bei steigender Schnelligkeit der Bewegung wird die Zeichnung feiner, ähnlich der eines Stickmusters, und es erscheint an derjenigen Stelle des flimmernden Feldes, welche dem gelben Flecke entspricht, eine eigenthümliche in schärferen Gegensätzen von Licht und Dunkel gezeichnete rundliche oder querovale Figur, die man vergleichen etwa mit einer vierblättrigen Rose, deren Blätter aber sich einer sechseckigen Form nähern. In ihrem Centrum steht ein dunkler Punkt, von einem hellen Kreis umgeben. Dieselben Figuren kann man auch hervorbringen, indem man mit geschlossenen Augenlidern sich gegen ein helles Licht kehrt und die aus einander gespreizten Finger vor dem Auge hin und her bewegt, so daß das Auge in schnellem Wechsel beleuchtet und beschattet wird. Überhaupt kommt es nur darauf an, einen solchen schnellen Wechsel von Schatten und Licht hervorzubringen. PURKINJE unterscheidet bei diesen Figuren die primären und sekundären Gestalten. Die primären Gestalten sind in seinem rechten Auge größere und kleinere Vierecke, schachbrettartig dunkel und hell wechselnd, die den größten Theil des Gesichtsfeldes überziehen. Nur abwärts vom Mittelpunkt sieht er größere Sechsecke in einer Strecke ausgebreitet. Von der in meinen Augen ziemlich regelmäÙig ausgebildeten Rosette des gelben Flecks scheint er nur einzelne Züge gesehen zu haben, dagegen sind bei mir die Flecken auÙerhalb des Centrum weder regelmäÙig viereckig noch sechseckig, sondern unregelmäÙig, nach der Peripherie an GröÙe zunehmend.

382 Aehnlich sah sie auch PURKINJE mit seinem schwachsichtigen linken Auge. Als sekundäre Gestalten, die namentlich, wenn er die geschlossenen Augenlider gegen die Sonne kehrt, erscheinen, beschreibt PURKINJE achtstrahlige Sterne und eigenthümliche eckig gebrochene Spirallinien, welche sich aus den primären Mustern durch Verschiebung der hellen und dunkeln Vierecke entwickeln, übrigens sehr wandelbar sind. Die sekundären Gestalten erschienen ihm im linken, wie im rechten Auge nur symmetrisch umgestellt.

Beobachtet man diese Erscheinungen auf den rotirenden Scheiben, so verwischt sich bei größerer Geschwindigkeit die Erscheinung immer mehr und es bleiben nur noch die gewässerten Flecke als letzter Rest zurück, die schon vorher beschrieben sind. Zur Zeit, wo das Flimmern am heftigsten

<sup>1</sup> PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne*. Bd. I. Prag 1823. S. 10.

si recht starrem Hinblicken zuweilen die ganze Figur, und hinter ihr ein dunkelrother Grund sichtbar, in welchem in einander verschlungener Strömungen vorhanden zu sein einung, in der VIERORDT<sup>1</sup> den Blutlauf der Netzhautgefäße. In meinen eigenen Augen entspricht das Bild dieser verlorenen Strömungen, die fortdauernd ihr Bett wechseln er schieben. Man könnte allerdings daran denken, daß Beleuchtung die Bewegung der Blutkörperchen sichtbar man dadurch die Bewegungen und Formen der Tropfen Strahls sichtbar macht. Aber was ich selbst davon gesehen ht wagen für Blutbewegung zu erklären, eher glaube ich, en, welche im Blute sparsamer vorkommen als helle as Gesichtsfeld schiefen, dabei sichtbar werden.

den flimmernden Scheiben farbiges Licht mit Schwarz n entweder auf den Scheiben farbige Sektoren anbringt, fsen Scheiben durch farbige Gläser betrachtet, so zeigen Umständen selbst homogene Farben Spuren von farbigem an z. B. durch ein rothes Glas, welches keine andere urchläßt, so erscheint der vorausgehende Rand der hellen nachfolgende rosaroth, entsprechend dem gelb und blau

Der schwarze Grund überzieht sich gleichzeitig mit n. Noch deutlicher wird die Complementärfarbe,<sup>2</sup> wenn lbändern das eine farbig, das andere grau macht, die laufen läßt und dann plötzlich anhält, oder auch wenn iber mit abwechselnd farbigen und weissen oder grauen rfährt. SINSTEDEN<sup>3</sup> brauchte zu demselben Zwecke heibe mit ausgeschnittenen Sektoren, die über einer lief. Wenn er die obere anhielt, erschien die untere

einungen erhielt auch E. BRÜCKE, indem er eine kleine or einer farbigen Glastafel in schwingende Bewegung auffallend war dabei die Erscheinung vor einer grünen tellen, vor denen Hell und Dunkel wechselte, rosaroth bedeckten und ganz unbedeckten dagegen grün.

thes vielleicht hierher gehöriges Phänomen sind die <sup>383</sup> den Herzen. Auf farbigen Blättern aus steifem Papier ner anderen lebhaften Farbe angebracht; am besten blau zu wirken, die Farben müssen sehr lebhaft und 1 man die Blätter betrachtet und mit einer gewissen nd her bewegt, scheinen die Figuren selbst gegen das ieben und auf diesem hin und her zu schwanken. Der

*physiol. Hilkunde.* 1856. Heft II.

*Ann.* LXXV. 526. 1848.

LXXXIV. 45. 1850



Grund der Erscheinung scheint darin zu liegen, daß der Lichteindruck im Auge für die verschiedenen Farben nicht gleich schnell zu Stande kommt und vergeht, und deshalb das Blau in der von dem Blatte beschriebenen Bahn scheinbar etwas hinter dem Roth zurückbleibt. Etwas Aehnliches wird auch wahrgenommen, wenn man das Auge statt des Objects bewegt. So sahen WHEATSTONE,<sup>1</sup> BRÜCKE und E. DU BOIS-REYMOND<sup>2</sup> bei Gasbeleuchtung, wenn sie das Auge über rothe und grüne Tapeten hinstreifen ließen, daß das Muster sich scheinbar bewegte. Nach BREWSTER sieht man auch, wenn helles Tageslicht durch ein kleines Loch in ein sonst dunkles Zimmer fällt.

Ich habe in der bisher gegebenen Darstellung mich der namentlich von FECHNER durchgeführten Ansicht angeschlossen, wonach alle Erscheinungen der Nachbilder theils in einer noch fortbestehenden Reizung der Netzhaut, theils in einer verminderten Reizempfindlichkeit derselben ihren Grund finden. In der That, wenn man die bisherige Bedeutung des Begriffs Reizung und Reizempfindlichkeit festhält, müssen wir von fortbestehender Reizung sprechen, wenn ein Auge im absoluten Dunkel ein positives Nachbild sieht, und wir müssen die Reizempfindlichkeit als vermindert betrachten, wenn das Auge am Orte eines negativen Nachbildes äußeres Licht schwächer empfindet, als mit der nicht ermüdeten Netzhaut. Daß also Reizung fortbesteht und die Reizempfindlichkeit vermindert sei, ist keine Hypothese, sondern unmittelbarer Ausdruck der Thatsachen. Auch genügen diese beiden Umstände, um die bei weitem größte Zahl der augenfälligeren und constanten Erscheinungen dieses Gebiets zu erklären, namentlich die Erscheinungen der veränderten Lichtintensität, der positiven gleichfarbigen und negativen complementären Nachbilder. Ob wir es dabei nur mit einer Störung der Thätigkeit der Nervensubstanz zu thun haben, und wieviel dabei vielleicht die photochemischen Veränderungen der Pigmente der Retina mitspielen müssen wir vorläufig dahingestellt sein lassen. Die sehr zusammengesetzten Erscheinungen des farbigen Abklingens starker oder anhaltender Lichteindrücke vollständig auf ein einfaches Schema zurückzuführen, möchte freilich vor der Hand noch schwer sein und allerlei willkürliche Annahmen nothwendig machen. Indessen läßt sich einsehen, warum diese Erscheinungen so veränderlich sein müssen. Wir kennen eben weder das Gesetz, wonach eine mehr oder weniger vorgeschrittene Ermüdung des Auges für die einzelnen Farben verschwindet, noch die Abhängigkeit, in welcher die Stärke des nachbleibenden Lichteindrucks von der Ermüdung steht. Die negativen complementären Bilder im dunkeln Gesichtsfelde sind hierbei nach FECHNERS Ansicht als veränderte Empfindungsweisen der inneren Reize der Netzhaut anzusehen. Viele Physiker haben dagegen diese Bilder als Wirkungen einer neuen entgegengesetzten Thätigkeit der Netzhaut angesehen, und namentlich hat PLATEAU<sup>3</sup> diese Ansicht zu einer zusammenhängenden Theorie ausgebildet. Er wies nach, daß man dergleichen complementär gefärbte Bilder auch beim gänzlichen Mangel alles äußeren Lichtes sehen könne, und da er auf das Eigenlicht des Auges noch nicht aufmerksam geworden war, wußte er die Erscheinung eben nicht anders als durch

<sup>1</sup> WHEATSTONE, *Inst.* No. 582. p. 75. 1845.

<sup>2</sup> BRÜCKE und E. DU BOIS-REYMOND, *Die Fortschritte in der Physik im Jahre 1845*, redig. von KARSTEN I. 223.

<sup>3</sup> J. PLATEAU, *Ann. de Chim. et de Phys.* LIII. 386. 1838. *Pogg. Ann.* XXXII. 543. 1833.

gesetzte Thätigkeit der Netzhaut zu erklären. Da er weiter Wechsel des positiven und negativen Bildes bemerkte, so stellte er die Netzhaut nach jedem heftigen Lichteindruck erst durch Oscillationen zur Ruhe käme, wobei sie abwechselnd nach einander Zustände durchlaufen sollte. Diese entgegengesetzten Zustände sind die Auffindung complementärer Farben. Er brachte dies in Verbindungen mit Contrasterscheinungen, die im nächsten Paragraphen näher besprochen werden, und nahm auch für die räumliche Ausbreitung des Eindrucks Oscillationen an. Dagegen ist eben zu erinnern, daß die negativen Nachbilder nicht in einer activen Thätigkeit der Netzhaut gegenübertreten als Verminderungen der schon vorher bestehenden positiven Empfindung sichtbar werden; und daß ferner jene Wechsel zwischen positiven und negativen Bildern, wie man bei genauer Aufmerksamkeit fast immer beobachten kann, Umständen, namentlich von schwachen Änderungen in der Intensität des Grundes abhängen. Ich halte es für sehr mißlich, diese wechselnden Erscheinungen, wie es die Nachbilder zur Zeit ihres Maximums positiv und negativ im dunkeln Gesichtsfelde sind, bei der hochgradigen Dunkelheit des Organs, welches lange im Dunkeln verweilt hat, als Wahrnehmungen äußerer Einflüsse die Verwandlung des Bildes in einer Theorie zu benutzen. Wir dürfen uns aber nicht täuschen über diesen Umständen noch nicht immer den Grund der Erscheinungen zu bezeichnen wissen. Übrigens hat schon FECHNER auf die Wichtigkeit von PLATEAUS Theorie aufmerksam gemacht. Dieser hat bemerkt, daß bei den Nachbildern die complementären Farben als Gegenbilder der Netzhaut sich einander aufheben und Dunkelheit ein complementär gefärbtes Nachbild besteht, ist die Wahrnehmung der Farbe beeinträchtigt. Wenn man nach einander das Auge ermüdet hat, ist das Nachbild schwarz. Wie läßt sich aber erklären mit der Thatsache, daß die gleichzeitig von objectivem hervorgebrachten Empfindungen sich zu der von Weiß verhalten, wie sich jede der beiden Farben einzeln genommen?

Ich habe schon vorher darauf aufmerksam gemacht, daß die positiven Nachbilder in der That sehr weißlich sind und nur durch den Contrast mit der primären Farbe und den mangelnden Vergleich mit anderen Farben die primäre Farbe so grell hervortritt. Hat man gleichzeitig zwei Gegenbilder einander gesehen, so überzeugt man sich leicht davon, daß die letzten Augenblicke ihrer positiven Erscheinung nur einen complementären Farben zeigen, so daß ich glaube, diese Bilder zeigen die weißlichen Nachbilder und einem negativen complementären Gegenbilde und dadurch diese Erscheinung auch unter FECHNERS Bedingungen. Zu erwähnen ist noch eine räthselhafte Erscheinung, die bei den Nachbildern von Gegenständen, die durch den elektrischen Strom erzeugt waren. Hier sah er bei schwarzen und rothen Quadraten gleichzeitig mit dem überschlagenden Funken leuchtende Funken fehlten aber bei weißen Quadraten auf schwarzem Grunde, gegen das Urbild verschoben. Ihnen folgten erst die gleich-

farbigen positiven Bilder. Von farbigen Streifen auf weißem oder schwarzem Grunde sollen die Nachbilder immer complementär gefärbt und immer heller als der Grund gewesen sein.

- 385 Ich halte es überhaupt für gerathen, in diesem äußerst verwirrten Gebiete der mannigfaltigsten Erscheinungen eine theoretische Ansicht, die wie die FECHNER'sche bei weitem die größte Zahl der hierher gehörigen Erscheinungen leicht erklärt und namentlich alle diejenigen gut erklärt, welche sich durch ihre Energie, Deutlichkeit und Constanz auszeichnen, als leitenden Faden festzuhalten, selbst wenn sich auch einzelne flüchtigere Erscheinungen finden, für welche man gegenwärtig noch keine ganz genügende Erklärung geben kann, wie es die Farbenwandlungen sind, die in dem Augenblicke erfolgen, wo das Bild aus positiv in negativ übergeht und wo die entgegengesetzten Einflüsse der nachdauernden Reizung und der Ermüdung sich in einem leicht veränderlichen Gleichgewichte befinden. Für jetzt habe ich noch keine Erscheinung auffinden können, welche entschieden unvereinbar mit FECHNER's Erklärungsprincipien wäre.

Beschrieben werden die positiven und negativen Nachbilder der Fenster 1634 von PEIRESC.<sup>1</sup> Dann tritt der Versuch als eine Art Kunststück auf. BONACURSUS behauptet gegen den Jesuiten ATHAN. KIRCHER,<sup>2</sup> er könne bewirken, daß man im Finstern ebenso gut sehe, wie im Hellen, und behielt Recht, indem er KIRCHER im dunkeln Zimmer eine in einer Öffnung des Fensters befestigte Zeichnung starr betrachten liefs. Dann wurde das Zimmer ganz verdunkelt, und KIRCHER sah die Zeichnung deutlich wieder, indem er (was unnöthig war) nach einem in der Hand gehaltenen weißen Papier blickte. KIRCHER giebt die Erklärung dazu, daß das Auge das eingesogene Licht wieder ausstrahle und das vorgehaltene Papier beleuchte. MARIOTTE<sup>3</sup> wiederholte ähnliche Versuche. NEWTON kannte die Blendungsbilder, und soll sie für psychischer Natur erklärt haben,<sup>4</sup> weil er die Nachbilder, welche durch Blicken nach der Sonne erzeugt waren, noch längere Zeit dadurch wieder hervorrufen konnte, daß er die Aufmerksamkeit auf sie richtete. Er wurde zu diesen Versuchen veranlaßt durch eine Anfrage von LOCKE, der sie in ROSEBOYLES Buch über die Farben erwähnt gefunden hatte. Eine vollständigere Theorie der Erscheinungen gab dann JURIN<sup>5</sup> im Jahre 1738, und zwar gründete er sie theils auf die Fortdauer der Reizung, theils auf die Annahme, daß beim Aufhören einer stark angeregten Empfindung von selbst eine entgegengesetzte hervorgerufen würde. Ausführliche Beschreibungen der Erscheinungen gab BUFFON,<sup>6</sup> die dann später dem Pater SCHERFFER<sup>7</sup> das Material zur Begründung seiner Theorie gaben. Dieser stellte im Gegensatz zu JURIN die Ansicht auf, daß die Nachbilder — er kennt fast nur negative — durch die verminderte Empfindlichkeit der ermüdeten Netzhaut entstehen. Dasselbe Princip wendet er auch zur Erklärung der complementären Farbe an, indem er sich dabei auf NEWTONS Farbenmischungsregel stützt. Eine andere etwas willkürlich aufgeputzte Theorie dieser Erscheinungen, die aber schon an PLATEAUS Oscillationen erinnert, gab GODART.<sup>8</sup> Eine Menge von Beobachtungen kamen weiter hinzu durch DARWIN,<sup>9</sup> namentlich über die

<sup>1</sup> PEIRESC, Vita. p. 175, 296. 1684.

<sup>2</sup> ATHAN. KIRCHER, Ars magna. p. 162. 1646.

<sup>3</sup> MARIOTTE, Oeuvres. p. 318. 1668.

<sup>4</sup> D. BREWSTER, Newton's Leben übers. von GOLDBERG. Leipzig 1833. S. 263.

<sup>5</sup> JURIN, Essay on distinct and ind. vis. p. 170 in Smith's Optics. Cambridge 1738.

<sup>6</sup> BUFFON, Mém. de Paris. 1743. p. 215.

<sup>7</sup> SCHERFFER, Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765. — Lateinisch vom Jahre 1765 auch im Journal de Physique de ROZIER. XXVI. 175 und 273. (1785).\*

<sup>8</sup> GODART, Journal de Physique. 1776. VIII. 1 und 269.

<sup>9</sup> DARWIN, Philos. Transact. 1786. LXXVI. 313. — Zoonomie übers. von BRANDIS. HAMBURG 1795. II. 387.

durch AEPINUS<sup>1</sup> und DE LA HIRE<sup>2</sup> über das farbige Abklingen des GERGONNE,<sup>3</sup> BROCKEDON,<sup>4</sup> der sie zugleich zu einer Theorie der harmonie zu verwenden suchte, LEHOT,<sup>5</sup> der namentlich auf die Ermüdung machte, die bei plötzlicher Änderung der Entfernung eines stehen, GOETHE,<sup>6</sup> BEHR<sup>7</sup> über Verschwinden der Farben durch Hin- Staarkranken, HIMLY und TROXLER,<sup>8</sup> PURKINJE,<sup>9</sup> OSANN,<sup>10</sup> SPLITTER,<sup>12</sup> DOVE<sup>13</sup> über subjective Farben an bewegten Objecten, SINSTEDEN,<sup>14</sup> 386 über die Wiederbelebung von Nachbildern durch abwechselnde Erhellung des Gesichtsfeldes, SEGUIN<sup>17</sup> (viele und genaue Beobachtungen über an), BRÜCKE,<sup>18</sup> AUBERT<sup>19</sup> über Nachbilder durch den elektrischen

zur theoretischen Zusammenfassung und Erklärung der hierher gehören ist noch weiter zu erwähnen der Versuch von PRIEUR DE LA das Princip des Contrastes zurückzuführen, ferner die von BREWSTER<sup>1</sup> dafs die complementäre Farbe sich zugleich mit der gesehenen trübe. Es liefen die entgegenstehenden Ansichten zuletzt aus in umfassenden Arbeiten von PLATEAU<sup>22</sup> und FECHNER.<sup>23</sup> Der erstere n, welche entgegengesetzte Thätigkeiten der Netzhaut annehmen, Form, FECHNER dagegen, der mit einer außerordentlichen Selbst- gleichzeitig eine grofse Reihe genauer, selbst messender Versuche in führt hat, gab zuerst eine genügende Herleitung der negativen p der Ermüdung. Diese beiden Arbeiten bezeichnen im Wesent- wärtigen Stand der Wissenschaft. Der Begriff der Ermüdung des ie Farbe bedurfte aber noch einer näheren Definition. Die Farben- 3 gab eine solche. Um sie zu prüfen, habe ich die Versuche über ectralfarben ausgeführt,<sup>24</sup> wobei ich auf die grofse Deutlichkeit der ach momentaner Lichtwirkung aufmerksam wurde.

## § 24. Vom Contraste.

vorigen Paragraphen untersucht, wie nach einander ge- 388 gegenseitig verändern. Es bleibt uns jetzt noch übrig

*Phys.* XXVI. 291. 1776. — *Novi Comment. Petrop.* X. 286.

*ORTERFIELD on the eye.* I. 343.

*de Mathemat.* XXI. 291. 1830.

*Journal of Sc.* N. XIV. 399; *Wiener Zeitschr.* VIII. 471.

*Repertorium* 1832. p. 229.

*e.* I. 13, 20.

*r Versuch das edelste Geschenk des Schöpfers zu erhalten.* 8. 1—8

*Bibl.* Bd. I. Stück 2. 8. 1—20. Bd II. St. 2. 8. 40.

I. 72, 96. 1819.

XXXVII. 288. 1836.

*enda.* II. 587. 1840.

*enda.* LIII. 346. 1841.

XL. 112. LXXV. 524, 526. 1848.

LXXXIV. 45. 1850.

*Mog.* (4) VIII. 544. 1854.

III. 435—436. 1852.

*himie et de Phys.* Sér. 3. XI. 413—431. 1850. C. R. XXXIII. 612. XXXIV.

d. k. k. Akad. zu Wien III; *Pogg. Ann.* LXXXIV. 418. 1850.

*tt.* *Untersuchungen zur Naturl.* Bd. V. 279. 1858.

E D'OR, *Ann. de Chimie.* LIV. p. 1. 1804.

ig. II. 89. IV. 354. 1833. — *Pogg. Ann.* XXIX. LVI. 138.

*himie et de Phys.* 1833. LIII. 386; 1835. LVIII. 337; *Pogg. Ann.* XXXII. 543.

*d'une Théorie gener. comprenant l'Ensemble des apparences visuelles, qui succèdent à rés.* Bruxelles 1854.

n. XXXIV. 221, 513. 1838. XXXV. 227; L. 193, 427. 1838.

en in der Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heil- 858 und in der Naturforscherversammlung zu Karlsruhe September 1858.

zu untersuchen, welchen Einfluß verschiedene im Gesichtsfelde neben einander gleichzeitig erscheinende Helligkeiten und Farben auf einander ausüben.

Da der Erfolg einer solchen Nebeneinanderstellung meistens der ist, daß jeder Theil des Gesichtsfeldes neben einem helleren dunkler, neben einem dunkleren heller aussieht, und seine Farbe neben einer anderen Farbe gesehen sich mehr oder weniger der Complementärfarbe der letzteren annähert, so hat der hierin sich aussprechende Gegensatz zu dem Namen des Contrastes Veranlassung gegeben. Genauer unterscheidet CHEVREUL die hierher gehörigen Erscheinungen unter dem Namen des simultanen Contrastes von denjenigen, wo zwei Farben nach einander auf derselben Netzhautstelle erscheinen, welche er mit dem Namen des successiven Contrastes belegt.

Es kommen nun aber auch Fälle vor, wo die Farbe eines Theiles des Gesichtsfeldes durch Nebensetzung einer anderen Farbe so verändert wird, daß sie der letzteren selbst, nicht ihrer Complementärfarbe ähnlicher wird. Auf diese würde der Name des Contrastes nicht unmittelbar passen, wenn auch vielleicht in Wirklichkeit hier die eine Farbe durch einen Contrast gegen die Complementärfarbe der anderen verändert wird. Um nun solche Fälle durch die Bezeichnung nicht auszuschließen, bezeichnet BRÜCKE diejenige Farbe, welche durch die Wirkung einer im Gesichtsfelde daneben stehenden hervorgebracht wird, als die *inducirte* Farbe, und diejenige andere, welche die Veranlassung zur Erscheinung jener ersten giebt, als die *inducirende* Farbe. Dabei wollen wir, wenn das Feld, dessen Farbe verändert ist, selbst farbig ist, dessen Farbe wie früher die reagirende nennen. Indem die reagirende Farbe durch die inducirte verändert wird, entsteht die resultirende Farbe. Im Allgemeinen passen also unmittelbar unter den Begriff des Contrastes nur die gewöhnlichen Fälle, wo die inducirte Farbe der inducirenden complementär ist. Es kommen aber Fälle vor, wo die inducirte Farbe der inducirenden gleich ist.

Was zunächst die Erscheinungen des successiven Contrastes betrifft, so ergeben sich diese leicht aus dem, was im vorigen Paragraphen gesagt ist. Hat man ein Feld von der Farbe *A* und mittlerer Helligkeit angeschaut, und wendet das Auge auf ein anderes von der Farbe *B*, so ist die nachbleibende Reizung des Eindrucks *A* in der Regel nicht so groß, um auf einem zweiten Felde von mittlerer Helligkeit ein positives Nachbild zu Stande kommen zu lassen, man sieht also ein negatives Nachbild von *A* auf dem Felde *B*. Dadurch werden diejenigen Theile der Farbe *B* geschwächt, welche mit *A* gleichartig sind. Ist *B* von demselben Farbenton wie *A*, so wird es durch den Contrast weislicher oder grauer, ist es complementär, so wird es gesättigter. Liegt es auf einer oder der anderen Seite des Farbenkreises zwischen *A* und seiner Complementärfarbe, so geht es in einen benachbarten Farbenton über, der, weiter von *A* entfernt, näher an seiner Complementärfarbe liegt. Übrigens erscheint *B* desto mehr verdunkelt, je heller *A* gewesen ist. Dies wäre also das allgemeine Gesetz des successiven Contrastes. voraus-

lichkeiten beider Felder, daß eben nur negative Nachbilder 389  
n.

Man kann nun leicht davon überzeugen, daß der successive Contrast durch Nachbilder verursacht, auch dann eine große Rolle spielen farbige Felder, die neben einander im Gesichtsfelde stehen, nicht. Man hat in diesen Fällen meist nur simultanen Contrast glaubt, weil man bisher eine gewisse Eigenthümlichkeit des Contrastes in der Lehre vom Contrast wenig beachtet hat. Bei bequemem Gebrauche unserer Augen pflegen wir nämlich fortwährend langsam im Gesichtsfelde wandern zu lassen, einander über die verschiedenen Theile der betrachteten

Dieses Wandern des Blicks geschieht unwillkürlich, und wir sind gewöhnt, daß es eine außerordentliche Anstrengung und fordert, auch nur 10 bis 20 Secunden lang den Blick ganz bestimmten Punkt des Gesichtsfeldes zu fixiren. So wie es auch sogleich ungewöhnliche Erscheinungen ein. Es nämlich scharf gezeichnete negative Nachbilder der Objecte, wenn der Blick festgehalten wird, mit den Objecten zusammenfallen, schnell undeutlich werden lassen. Deshalb tritt denn auch bei längerer Fixation eine Blendung und Anstrengung des Auges ein, so lange wir an einem Gesichtspunkte beharren, der Trieb das Auge zu bewegen, und die kleinen Schwankungen seiner Fixation ungeachtet unserer Anstrengung eintreten, verrathen sich an den Rändern der Objecte bald rechts, bald links Theile der positiven Nachbilder aufblitzen. Auch ist diese Wanderung des Blicks auf sämtlichen Theilen der Netzhaut ein fortwährendes stärkerer und schwächerer Erregung und zwischen verschiedenen Farben unterhalten wird, offenbar von großer Bedeutung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Sehnervenapparats. Das Auge so an, als wenn man häufig negative Nachbilder an Orten, die nach selbst nur mäßig beleuchteten Flächen entstehen, negative Nachbilder sind ja immer Zeichen hoch gesteigerter Erregung der Netzhaut.

Man kann nun, was geschieht, wenn bei diesem Wandern des Blicks über verschieden helle Felder im Gesichtsfelde liegen. Wenn man ein einzelnes farbiges Feld mit genauer Fixation des Blicks auf dasselbe betrachten, entwickelt sich ein scharf begrenztes Nachbild, das eben leicht zu erkennen ist. Wenn wir hinter einander verschiedene Punkte des Objects eine Zeit lang fixirt haben, bilden sich verschiedene Nachbilder aus, die sich zum Theil decken, aber so leicht, ohne besondere Aufmerksamkeit als Abbilder erkannt werden. Ist aber der Blick langsam über den Gegenstand ohne irgendwo anzuhalten, so ist das Nachbild natürlich ein gleichmäßiger Fleck, und wird, obgleich es für den aufmerksamen



Beobachter wirklich da ist, schon nicht mehr so leicht erkannt. Geht nun der Blick auf ein anderes benachbartes Feld von anderer Farbe über, so  
 390 wird diese Farbe natürlich durch den Einfluss des Nachbildes verändert, gerade so als hätten wir nach einander in demselben Theile des Gesichtsfeldes diese verschiedenen Farben gehabt. Wir haben also in einem solchen Falle nicht simultanen Contrast, oder wenigstens diesen nicht allein, sondern wir haben auch hier successiven Contrast, und die Erscheinungen sind ganz oder größtentheils identisch mit den im vorigen Paragraphen beschriebenen. Um allein simultanen Contrast zu haben, müssen wir nothwendig besonders dafür sorgen, daß während des Versuchs der Blick ganz streng fixirt sei.

Wir werden die Erscheinungen des reinen simultanen Contrastes, welche bei strenger Fixation des Blicks bestehen bleiben, später genauer untersuchen. Zunächst will ich noch die Erscheinungen beschreiben, die zum Theil dem simultanen Contraste, größtentheils aber dem successiven angehören, wie sie bei dem gewöhnlichen unbefangenen Gebrauche des Auges sich zeigen. Die Farbenänderungen, welche dabei eintreten, sind genau dieselben, welche ich schon für den reinen successiven Contrast beschrieben habe. Sie sind im Allgemeinen viel deutlicher und auffallender als die des reinen simultanen Contrastes, und wo beide verschiedene Resultate herbeiführen könnten, überwiegen bei dem unbefangenen Gebrauche des Auges stets die des successiven Contrastes; wo beide die gleichen Wirkungen hervorbringen, werden die Farbenveränderungen stets viel bedeutender, wenn man von der Fixation des Blickes zur Wanderung desselben übergeht.

Im Allgemeinen ist es vortheilhaft für die Contrastwirkungen, wenn die inducirende Farbe lichtstärker ist, als die reagirende, weil dann die Nachbilder jener lebhafter und anhaltender sind. Legt man also z. B. auf einen farbigen Papierbogen einen kleinen Kreis von weißem Papier, so wird dies Weiß complementär gefärbt. Die Färbung ist aber auffallender, wenn man statt Weiß Grau nimmt, oder selbst Schwarz, da alles Schwarz bei diesen subjectiven Versuchen als ein dunkles Grau zu betrachten ist. Doch ist ein mittleres Grau in der Regel vortheilhafter für den Versuch als Schwarz. Die Contrastwirkung kann in solchen Fällen so weit gehen, daß eine ziemlich lebhafte Farbe in die complementäre umgekehrt wird. Legt man z. B. auf eine rothe Glasscheibe ein kleines Stück orangerotheres Papier (mit Mennige gefärbt) und hält dies gegen den hellen Himmel, so erscheint das röthliche Papier lebhaft grünblau, in der Complementärfarbe des rothen Glases, die nahehin auch seine eigene ist.

Ferner ist es vortheilhaft, wenn die inducirende Farbe einen großen Theil des Gesichtsfeldes bedeckt, weil dann die verschiedenen Netzhautstellen häufig und anhaltend von dieser Farbe getroffen und durch sie ermüdet werden. Die Contrastfarben sind deshalb besonders lebhaft, wenn die reagirende Farbe ein kleines Feld einnimmt, welches rings umgeben ist von einem ausgedehnten Grunde, der mit der inducirenden Farbe gefüllt ist. In diesem Falle wird hauptsächlich nur die Farbe des kleinen Feldes verändert, nicht

Aber die Contrastwirkungen fehlen auch nicht, wenn die eich groß sind, dann ist der Einfluss ein gegenseitiger, und jeden von beiden wird durch die Farbe des anderen geändert. die Contrastwirkung desto grösser, je näher das inducirende 391  
nden im Gesichtsfelde liegt, weil, wenn der Blick von dem en Felde hinübergleitet, das Nachbild desto stärker ent- teller er das andere Feld trifft. Dies zeigt sich sehr deut- ndung, welche CHEVREUL für seine Versuche gewählt hat. a jeder der beiden Farben z. B. Gelb und Roth zwei legt dann einen gelben und einen rothen Streifen dicht Diese wollen wir bezeichnen mit  $G_1$  und  $R_1$ . Dann legt en Streifen  $G_1$  in kurzem Abstände einen zweiten gelben neben den rothen  $R_1$  einen zweiten  $R_2$ . Die Contrast- ch dann nur an den beiden mittleren Streifen  $G_1$  und  $R_1$  elb von  $G_1$  wird grünlich, indem es sich dem zu  $R_1$  com- grün nähert, und  $R_1$  erscheint purpurn, indem sich etwas mplementärfarbe von  $G_1$ , zumischt. Dagegen erscheinen hen Streifen  $G_2$  und  $R_2$  in unveränderter Färbung, und gute Gelegenheit, die Contrastwirkung zu erkennen. Eben in auch ab, dafs, wenn etwas breitere Felder an einander astfärbung namentlich an den Rändern hervortritt. Jedes von dem einen Felde  $A$  auf das andere  $B$  hinübergleitet, eile der Netzhaut, welche eben das Feld  $A$  verlassen, am Farbe  $A$  ermüdet, auf diese fällt nun das Bild der Rand- iger ermüdet sind diejenigen Netzhauttheile, welche etwas haben, und schon weiter in das Feld  $B$  hineingerückt heint deshalb die inducirte Farbe schwächer. So folgt. der Blick zum Felde  $B$  übergeht, die Randtheile von  $B$  den Contrast verändert sind, die weiter vom Rande ent- Verhältniss ihrer Entfernung weniger. Stöfst also z. B. blaues Feld aneinander, so erscheint der Rand des Grün s die Mitte, der Rand des Blau etwas violetter als seine s dem Blau complementäre Gelb sich zumischt, hier das entäre Purpurroth. Man kann das Spiel der Nachbilder Flächen sehr gut beobachten, wenn man sich eine Reihe n bezeichnet, und den Blick nur springend bewegt, in- e kurze Zeit auf jedem Fixationspunkte festhält. Dann die wohlbegrenzten Nachbilder sich auf das andere Feld Die älteren, weiter vorgeschobenen sind blasser, die am Rande am nächsten bleiben, sind stärker. h nicht um Unterschiede der Farbe, sondern der Hellig- , dafs die Helligkeit des reagirenden Feldes neben einem n vermindert erscheint, neben einem dunkleren dagegen

Übrigens wird bei diesen Versuchen das Hervortreten der Complementarfarbe noch durch andere Umstände begünstigt, gegenüber den Methoden negative Nachbilder zu sehen, welche im vorigen Paragraphen beschrieben sind. Während nämlich im Allgemeinen nöthig ist, ein farbiges Object absichtlich mehrere Secunden zu fixiren, um ein deutliches Nachbild von einiger Dauer nachher auf einem gleichmäfsig gefärbten Grunde zu erhalten, so zeigt es sich bei den Versuchen über Contrast, dafs nur eine ziemlich flüchtige  
 392 Betrachtung der einen Farbe genügt, um die complementäre Farbe auf dem anderen Felde zu induciren, und dafs diese complementäre Farbe nachher viel dauernder ist, als es ein unter gleichen Umständen gewonnenes Nachbild sein würde. Um auf einem gleichmäfsig gefärbten Grunde ein Nachbild zu erkennen, mufs dieses gut entwickelt und gut begrenzt sein. Es bewegt sich mit dem Blicke hin und her, giebt sich dadurch gleich als eine subjective Erscheinung zu erkennen, und wir sind für gewöhnlich daran gewöhnt, unsere Aufmerksamkeit nur den objectiven Gesichterscheinungen zuzuwenden. Wenn dagegen ein verwaschenes Nachbild ein kleineres gefärbtes Feld bedeckt, welches seine objective Begrenzung hat, und immer unter dem Einflufs des Nachbildes erscheint, so kann dieser Einflufs nicht unmittelbar in der Anschauung von den übrigen objectiven Erscheinungen des Gesichtsfeldes getrennt werden, und wird deshalb viel leichter ein Gegenstand unserer Aufmerksamkeit. Im dritten Abschnitte werden wir die hier erwähnte Eigenthümlichkeit unserer Aufmerksamkeit näher zu besprechen haben.

Dazu kommt, dafs die Ermüdung der Netzhaut bei den hier betrachteten Contrasterscheinungen immer wieder erneuert wird, und die Wirkung deshalb anhaltend ist, während sie bei den meisten Methoden Nachbilder zu erzeugen ziemlich schnell vergeht.

Wir wenden uns nun zu den Erscheinungen des reinen simultanen Contrastes. Um diese als solche sicher erkennen zu können, mufs bei der Anordnung der Versuche dafür gesorgt werden, dafs keine Nachbilder entstehen können, dafs der Theil der Netzhaut, welcher die inducirte Farbe empfinden soll, vorher auch nicht vorübergehend von dem Bilde des inducirenden Feldes getroffen wird. Vollständig kann dies in der Regel nur erreicht werden, wenn man die inducirende Farbe erst sichtbar macht, nachdem sich das Auge auf einen bestimmten Punkt des inducirten Feldes festgeheftet hat. Diesen Punkt mufs es dann auch während der ganzen Dauer des Versuchs festhalten. Ist die inducirende Farbe nicht zu lichtstark oder zu gesättigt, so genügt es auch, die Augen, welche auf dunkeln wenig gefärbten Gegenständen herumgewandert sind, oder geschlossen waren, schnell auf das inducirte Feld zu richten, und dann einen Punkt von diesem festzuhalten, ohne vorher den Blick auf dem inducirenden verweilen zu lassen. Diese letztere Methode genügt namentlich deshalb in den meisten Fällen, weil die hierher gehörigen Contrasterscheinungen sich gerade bei schwachen Farbenunterschieden des inducirenden und inducirten Feldes am deutlichsten

umgekehrt die Erscheinungen des successiven Contrastes gegensätze der Farbe und Beleuchtung begünstigt werden.

Es ist zu bemerken, daß bei sehr dauernder starrer Fixirung <sup>n</sup> schwach gefärbten Feldern sich Nachbilder entwickeln, wie ich beschrieben habe, welche den Gegensatz der Farben gänzlich und damit auch den Contrast, übrigens bei gelegentlicher icks deutlich sichtbar werden, so daß man bei den Vertanen Contrast überhaupt nur kurze Beobachtungszeit an-

gehörigen Erscheinungen scheinen mir von ganz anderer <sup>392</sup> die bisher betrachteten. Sie lassen sich im Allgemeinen Fälle, in denen eine genaue Beurtheilung der reagirenden Gleichung mit anderen als der inducirenden nicht möglich Fällen sind wir geneigt, diejenigen Unterschiede, Anschauung deutlich und sicher wahrzunehmen <sup>er</sup> zu halten als solche, welche entweder in der r unsicher heraustreten, oder mit Hülfe der Erheilt werden müssen. Es ist dies wohl ein allgemeines unseren Wahrnehmungen. Ein Mensch mittlerer Gröfse <sup>393</sup> großen sieht klein aus, weil wir im Augenblick deutlich ößere Menschen giebt, aber nicht, daß es auch kleinere Derselbe Mensch mittlerer Gröfse, neben einen kleinen gesehen.


von den Wahrnehmungen werden wir noch vielen Fällen <sup>n</sup> eignen.

gen, welche erfüllt werden müssen, um eine sehr genaue Farbenunterschiede und Helligkeitsunterschiede zwischen an einander stoßenden Flächenstücken des Gesichtsfeldes § 16 bei den Methoden der Photometrie erörtert worden. wie wir gesehen haben, am sichersten, wenn beide im Gesicht an einander stoßen, und ihre Grenze durch nichts arbenunterschied bezeichnet ist. Selbst der feinste, eben mattenstrich zwischen ihnen macht die Vergleichung ungrößer wächst die Unsicherheit, wenn breitere Felder mit len der Beleuchtung sich zwischen die zu vergleichenden am aller unsichersten wird die Vergleichung, wenn ein ruck mit dem Gedächtnisbilde eines früheren verglichen <sup>leben</sup> die leicht beobachtbare und zweifellos constatirte besprochenen Bedingungen für die möglichst genaue Ausnetrischen Messung eingehalten werden müssen, zeigt doch wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, die Vergleichung

**einige meiner früheren Versuche durch diesen Umstand beeinflusst sein können, Versuche der früheren Auflage fort, die nicht in hinreichend kurzer Zeit aus-**

einer Farbe oder Helligkeit mit einer anderen, beziehlich mit dem, was wir als das Muster derselben betrachten, an das sich ihr Namen nach gewöhnlichem Sprachgebrauch heftet, nothwendig mit einem größeren oder geringeren Grade von Unsicherheit behaftet ist, und daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir in solchen Fällen Irrthümer in der Abschätzung des betreffenden Farbeneindrucks begehen, die sich als solche erkennen lassen, wenn man die Vergleichung unter besseren Bedingungen ausführt. Diese Unsicherheit aber empfinden wir nicht als solche, sondern jeder gegenwärtige Gesichtseindruck erscheint uns, so lange wir ihn vor uns haben, als ganz bestimmt. Daß wir also bei unsrer Abschätzung der Gleichheit oder Ungleichheit dieses Farbeindrucks mit irgend einem bestimmten Muster, was wir im Sinn haben, Irrthümer begehen, ist durchaus nicht verwunderlich. Was einer Erklärung bedarf, ist eigentlich nur der Umstand, daß diese Irrthümer in der Mehrzahl der Fälle in einem bestimmten Sinne ausfallen und nicht regellos hin- und herschwanken. Die Überschätzung der deutlichen Unterschiede scheint mir hier das meist entscheidende Motiv zu sein. Daneben scheinen aber auch gelegentlich andere Momente, welche aus den Erfahrungen über die Erscheinungsweisen von Körperfarben genommen sind, unsere Schätzung der gesehenen Farben zu beeinflussen.

411 Einer der Fälle, der von solchen anderen Einflüssen leicht frei gehalten werden kann, läßt sich auf Farbenkreiseln herstellen, wenn man in einer Scheibe wie *Fig. 197* schmale farbige Sektoren auf weißen Grund setzt, sie



*Fig. 197.*

aber in mittlerer Entfernung vom Mittelpunkte durch einen aus Schwarz und Weiß zusammengesetzten Streifen unterbricht, so daß beim Umdrehen eigentlich ein grauer ringförmiger Streifen auf schwach gefärbtem weißlichen Grunde entstehen sollte. In der That sieht dieser Ring aber nicht grau, sondern complementär gefärbt aus, und zwar am intensivsten, wenn er gleiche oder etwas geringere Helligkeit als der Grund hat. Ist die Breite der farbigen Sektoren groß, und dadurch die Farbe des Grundes zu intensiv, so ist die Complementärfarbe des Ringes schwächer, oder wenigstens zweifelhafter als bei schwacher Färbung des Grundes; ebenso wenn man den grauen Ring mit zwei schmalen schwarzen Kreislinien einfasst, die ihn scharf vom Grunde abgrenzen. Es fehlt in den letzteren Fällen die Contrastfärbung vielleicht nicht ganz, aber sie ist mit einer erheblichen Unsicherheit des Urtheils über die Farbe des inducirten Feldes verbunden, und durch Vergleichung mit einem neben dem Farbenkreisel befindlichen weißen Felde kann man leicht zu dem Resultate gelangen, daß das inducirte Feld wirklich weiß sei, während ohne


ie Kreislinien die complementäre Contrastfarbe sich mit zweifelloser Bestimmtheit der Wahrnehmung aufdrängt.

Deutlich zeigt sich der Contrast auch, wo die inducirte Fläche an entgegen- 412  
gesetzten Seiten mit zwei verschiedenen Farben in Berührung tritt. Dann  
sind jene an den entsprechenden Rändern complementär gefärbt, oder wenn  
die inducirte Fläche mit einem Rande an eine dunklere, mit dem anderen  
an eine hellere Fläche stößt, erscheint der erstere Rand heller, der letztere  
dunkler. Diese Contrasterscheinungen sind aber ebenfalls nur dann deutlich,  
wenn das inducirende vom inducirten Felde eben nur durch den Unterschied  
der Farbe oder der Helligkeit geschieden ist, und keine andere Begrenzung  
existirt.

Man kann solche Versuche leicht unter einer transparenten Papierdecke aus-  
führen. Man klebe ein Blatt grünen und rosenrothen Papiers zusammen, so  
daß man ein Blatt erhält, welches zur Hälfte grün, zur Hälfte rosenroth ist.  
Am Orte der Grenzlinie zwischen beiden Farben befestige man ein Streifchen  
rauen Papiers, und lege über das ganze ein ebenso großes Blatt dünnen  
Briefpapiers. Es wird nun der graue Streifen, wo er an das Grün stößt,  
rosenroth, und wo er an Roth stößt, grün erscheinen, in seiner Mitte gehen  
die beiden Farben in einander über durch einen unbestimmten Farbenton,  
der wohl eigentlich Grau ist, aber doch nicht bestimmt von uns als solches  
merkannt werden könnte. Die Erscheinung ist viel lebhafter, wenn die 413  
Längsrichtung des grauen Streifen quer zur Trennungslinie der Farben steht.  
Dann kann der Theil des Grau, welcher in das Grün hineinragt, ebenso leb-  
haft rosenroth erscheinen, wie der rosenrothe Grund der anderen Seite.  
Schwächer, aber doch deutlich erkennbar ist die Contrastfarbe, wenn die  
mittlere Längslinie des grauen Streifen gerade auf der Trennungslinie der  
Farben liegt. Dann erscheinen die Seitenränder des Grau mit einem schmalen  
nach der Mitte hin verwaschenen Saume der Complementärfarbe gefärbt.

Ähnliche Wirkungen erhält man, wenn man dünne Papierblätter treppen-  
förmig über einander legt, so daß an dem einen Rande der Papierschicht  
nur ein Blatt hervorsieht, daran ein Streifen  
stößt, wo sich zwei decken, dann drei u. s. w.  
Läßt man Licht durch eine solche Lage von  
Blättern scheinen, so ist natürlich inner-  
halb jeder Stufe die objective Helligkeit  
constant, doch erscheint jede Stufe dunkler  
an dem Rande, wo sie an die nächst hellere  
anstoßt, und heller, wo sie an die nächst  
dunklere stößt.

Viel schöner und feiner abgestuft lassen  
sich aber alle diese Erscheinungen auf dem  
Farbenkreisel hervorbringen. Man gebe den  
Sectoren des Farbenkreisels die neben-  
stehende Form der *Fig. 198*, und mache sie



*Fig. 198.*



weiß und schwarz, so erscheinen beim Umdrehen mehrere concentrische Ringe, von denen die äußeren immer heller sind, als die nächstliegenden inneren. Innerhalb eines jeden solchen Ringes ist die Winkelbreite der schwarzen Flächenstücke constant, also auch die Helligkeit bei schnellem Umdrehen; nur von einem zum anderen Ringe wechselt die Helligkeit. Und doch erscheint jeder Ring nach innen zu, wo sich der nächst dunklere anschließt, heller, nach außen zu, wo sich der nächst hellere anschließt, dunkler. Sind die Helligkeitsunterschiede der Ringe sehr klein, so sieht man zuweilen kaum, daß die inneren Ringe dunkler als die äußeren sind, es fällt vielmehr nur der periodische Wechsel von Hell zu Dunkel an den Rändern der Ringe in die Augen.

Nimmt man statt Weiß und Schwarz verschiedene Farben, so erscheint jeder Ring am äußeren und inneren Rande verschieden gefärbt, während doch objectiv die Farbe jedes einzelnen Ringes in seiner ganzen Breite dieselbe ist. Jede einzelne von den gemischten Farben tritt an demjenigen Rande jedes Ringes stärker hervor, wo ein anderer Ring anstößt, der weniger von dieser Farbe enthält. Hat man also z. B. Blau und Gelb gemischt, und überwiegt das Blau in den äußeren Ringen, Gelb in den inneren, so erscheint jeder Ring am äußeren Rande gelb, am inneren blau, und wenn die Farbenunterschiede der einzelnen Ringe überhaupt sehr gering sind, kann auch hier wieder die Täuschung eintreten, daß die wirklich vorhandenen Unterschiede der Farbe der verschiedenen Ringe verschwinden, und die abwechselnd blaue und gelbe Contrastfärbung der Ränder auf einen gleichmäßig gefärbten Grund aufgetragen zu sein scheint.

414 Sehr bezeichnend ist es auch, daß in diesen Fällen gewöhnlich die Mischfarbe nicht zur Anschauung kommt, man vielmehr die beiden gemischten Farben getrennt und neben oder durch einander zu sehen glaubt.

Diese so auffallenden Contrastwirkungen verschwinden aber, wenn man die Grenze zwischen je zwei Ringen durch feine schwarze Kreislinien bezeichnet. Dann erscheint jeder Ring, wie er wirklich ist, in seiner ganzen Breite gleich hell und gleich gefärbt. Auch hier ist es wieder von entscheidendem Einflusse, daß die verschiedenen Felder Theile einer, von der Färbung abgesehen, durchaus continuirlichen und gleichartigen Fläche seien. Auch hier haben wir es also nicht mit Veränderungen der Empfindung, sondern der Abschätzung zu thun. Die Beleuchtungsunterschiede der verschiedenen Theile dieser Fläche werden als die einzigen wahrnehmbaren Unterschiede wieder besonders hervorgehoben, und da diejenigen zweier unmittelbar benachbarter Flächenelemente deutlicher und sicherer wahrnehmbar sind, als die von entfernteren, so drängen sich namentlich die Unterschiede der Beleuchtung längs der Ränder je zweier Felder der Wahrnehmung auf, und erscheinen als die am sichersten und deutlichsten wahrnehmbaren größer als die unsicher wahrnehmbaren zwischen je zwei mittleren Theilen zweier Felder. Da in der Mitte jedes Feldes bei den beschriebenen Versuchen kein plötzlicher Sprung der Beleuchtung existirt, welcher wahrgenommen werden

er Schein entstehen, daß die Farbe des einen Randes durchs allmählich in die des anderen übergeht. Macht man aber inducirten Feldes einen schwarzen Strich, oder legt man dessen Hälften ungleich hell und durch eine scharfe Grenz-, zwischen zwei farbige, so gehen die complementären der Seite her bis an diese Grenzlinie vor, und scheiden sich die Farbenunterschiede des inducirten und der inducirofs, daß zwischen allen Punkten derselben der Farben-ns wahrnehmbar ist, so verschwindet die Contrastwirkung, s viel zweifelhafter. Findet noch irgend eine andere Ab-arten Feldes statt, so wird der Unterschied seiner Färbung enden viel unsicherer wahrgenommen, und der Contrast oder wird schwächer.

1 schlagend zeigt sich die Wirkung schwacher Unterschiede 398

on H. MEYER<sup>1</sup> angegebenen Verfahren. Man schneide n weißen Briefpapier und eines aus farbigem Papier, genau gleich groß, lege beide auf einander, so daß sie und schiebe ein Schnitzelchen grauen Papiers dazwischen, kel oder dunkler als das grüne ist. Weniger gut ist 'ses Papier. Durch das weiße Papier schimmert das Unterlage nur ganz schwach durch, und wo das letztere ein sehr deutliches und starkes Rosaroth. Giebt man andere Färbung, so erscheint das graue Schnitzelchen ementärfarbe durch das aufgelegte weiße scheinend. Es erhält nisse so zu treffen, daß die complementäre Con- hervortritt als die schwache Farbe des Grundes.

wächster Grenzlinien ist bei diesen Versuchen sehr auf „ ein durchscheinendes weißes Papierblatt, und lege es ges weißes. Oben auf lege man ein Schnitzelchen von as man durch einen leichten Anflug chinesischer Tusche so es, wenn es auf dem obersten dünnen weißen Papierblatt ungeklebt ist, ebenso dunkel erscheint, als ein dunkleres unter dem durchscheinenden Papier liegt. Alsdann idurchsichtige Weiß fort und lege dafür ein farbiges it man von oben die beiden grauen Schnitzel in nahehin s objectiven Grau. Der optische Unterschied besteht nur 1 liegende durch seine zarten Grenzlinien, die man vom Grunde getrennt ist, während die Grenzlinie des hr als ein verwaschener Fleck von etwas anderer Farbe leckenden Papiers erscheint. Unter diesen Umständen entäre Contrastfarbe auf dem letzteren, bedeckten 1 zum Vorschein, während sie auf dem oben liegenden

kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Diese Form des Versuchs ist besonders bequem, weil man schwache Färbungen durch Nachbilder nicht sehr ängstlich zu vermeiden braucht, da beide gleichfarbige Flecke durch solche, wenn sie sich entwickeln sollten, nahehin gleichmäßig verändert werden, während der Unterschied, der von der Deutlichkeit der Grenzen abhängt, bestehen bleibt.

Bringt man die beiden grauen Flecke einander sehr nahe, so wird die Contrastwirkung viel schwächer, dann stört offenbar die Gleichheit der beiden Grau, welche man um so sicherer erkennt, je näher sich die beiden Flächen liegen.

Auch kann man den Contrast sehr schwächen, wenn man zwei gleichgefärbte graue Schnitzel zwischen das farbige Papier und das dünne weiße Blatt legt und auf dem deckenden dünnen Papier einen feinen Strich mit Tinte macht, der der Umrisslinie des einen grauen Feldes folgt. Auch dann zeigt das nicht abgegrenzte graue Feld die Contrastfarbe viel deutlicher, als das abgegrenzte.

Besonders deutlich tritt die Contrastfarbe auch hervor, wenn man das Nachbild eines weißen oder grauen kleinen Feldes, was von farbigem Grunde umgeben ist, auf einen gleichmäßig weißen oder grauen Grund wirft. Das Nachbild des weißen Feldes würde bei Vermeidung allzu starken Lichtes kaum gefärbt sein, wenn der umgebende Grund vorher schwarz oder dunkelgrau gewesen wäre. War aber, wie bei dem beschriebenen Versuche, der Grund gefärbt, so erscheint das Nachbild des kleinen weißen Feldes jetzt gleichfarbig dem früher gesehenen Grunde, während die Umgebung die Farbe seines complementären Nachbildes zeigt. Diese ruft offenbar durch Contrast wieder ihre Complementärfarbe, d. h. die ursprüngliche Farbe des Grundes in dem weißen kleinen Felde hervor.

Die Bedingungen sind hier besonders günstig für eine ruhige Beobachtung des Contrastes; denn die Grenzen des kleinen grauen Nachbildes sind immer ein wenig verwaschen, ohne scharfe Umrisslinie, und außerdem stört das Schwanken der Gesichtslinie die Erscheinung gar nicht, weil das Nachbild durchaus fest auf der Netzhaut liegen bleibt.

Der Farbenunterschied zwischen den ursprünglich gesehenen beiden Feldern kann sehr schwach sein; die Erscheinung wird dadurch kaum weniger deutlich. Man erreicht dies z. B., indem man den stark gefärbten Grund mit durchscheinendem weißen Papier überdeckt und vor diesem das weiße Feld anbringt, welches das weiße Nachbild geben soll.

Contrast bei starken Farbenunterschieden. Ein kleines weißes Feld etwa ein mit einer Pincette gehaltenes Papierschnitzelchen, hinter welchem ein gleich hell beleuchteter Bogen weißen Papiers weggezogen wird, so daß an Stelle des letzteren ein ausgedehnter lebhaft gefärbter Grund erscheint, zeigt mir im ersten Moment die Complementärfarbe, aber nur undeutlich und sehr flüchtig. Gleich darauf tritt aber auch die dem Grunde gleichnamige Farbe in schwachen Andeutungen auf dem kleinen Felde auf, oft fleckweise

Stellen, die die Complementärfarbe zeigen. So ist es in meinem 70. Lebensjahre. Die von mir in der ersten Beschreibung dieser Erscheinung macht mich glauben, daß die Complementärfarbe deutlicher und sicherer gesehen habe. Es scheint sein lassen, ob meine Augenmedien vielleicht trüber sind, daß sie mir mehr objectives Licht von der Farbe des kleinen weißen Feld ausbreiten, und dadurch der Contrast

Weiß darf im Allgemeinen nicht zu hell genommen werden. Wenn man einen Versuch in einem Zimmer anstellt, wo von einer Lampe Licht zu großer Fensteröffnung her das Licht einfällt, kann man das weiße Papier leicht dadurch verändern, daß man es weniger senkrecht aufstellen läßt, und so die passende Helligkeit. Eine mittlere Helligkeit des Weiß, welche ungefähr die des farbigen Grundes ist, am vorteilhaftesten. Ist das Weiß zu hell, oder andererseits zu stark beschattet, so daß es sich nicht abhebt, so sind die Contrastfarben minder deutlich oder fehlen ganz. Eine farbige Fläche vom Gesichtsfelde einnimmt, desto heller wird der Contrast. Wenn man sich mit dem Auge von den Farben entfernt, und deren scheinbare Größe also kleiner wird, so wird der Contrast schwächer oder schwindet ganz. Ebenso schwindet sie, wenn man sich ihnen nähert, und verwandelt sich in die der inducierenden Farbe. Je leichter, je kleiner die scheinbare Größe des inducirten Feldes, desto stärker dieses beleuchtet ist, und je dunkler das inducirte Feld ist, desto heller letztere aus einem schwarzen Scheibchen bestehen, und desto deutlicher die farbige Glasplatte, welche in einer Oeffnung des Fensters ist, so daß man die lichte Himmelsfläche hindurchsieht, so groß an die schwarze Scheibe mit der Farbe des Glases ansetzt, daß man Nachbilder vermeidet. Ich finde hierbei bei den verschiedenen Farben als den, daß die kälteren Farben, wie das Violette, zu sein pflegen als die gelben, grünen und blauen, welche eine größere Lichtstärke, z. B. die von sonnenhellen Gegenständen, die gleiche Farbe von Anfang an zu erzeugen. Bei den kälteren Farben, welche auch bei ziemlich dunkler Färbung die Erwärmung wohl auch die Fluorescenz der Linse und Hornhaut das Licht über die dunkle Scheibe zu verbreiten. Nach dem Verlassen immer die gleiche Farbe ein, und nur am Rande des Gesichtsfeldes zeigt sich der von Schwankungen der Gesichtslinie herabhängende Saum.

Man muß von den Fällen absehen, wo die inducirte Farbe der inducierenden so nahe ist, so können wir das Hauptresultat der beschriebenen Erscheinung ausdrücken: „Wenn im Gesichtsfelde eine besondere Farbe verbreitet ist, so erscheint uns eine weißlichere Abstufung dieser Farbe als Weiß, und wirkliches Weiß als complementär ge-

397 färbt.“ Es wird also die Norm dessen, was wir Weifs nennen, dabei verändert. Nun ist die Empfindung des Weifs keine einfache Empfindung, sondern in einem bestimmten Verhältnisse zusammengesetzt aus den Empfindungen der drei Grundfarben. Um nun in einem bestimmten Falle eine gegebene Farbe als Weifs anzuerkennen, wenn uns die Möglichkeit fehlt, sie mit anderem Weifs zu vergleichen, welches als solches anerkannt ist, müssen wir das Intensitätsverhältniß der drei darin enthaltenen Grundfarben als verändert oder unverändert wieder erkennen. Die Vergleichung der Intensität verschiedener Farbenempfindungen ist aber, wie wir in § 21 gesehen haben, eine höchst unsichere und ungenaue. Es kann also auch die darauf beruhende Bestimmung des Weifs keine sehr genaue sein, sondern es werden ziemlich bedeutende Schwankungen in dem, was wir zu verschiedenen Zeiten für Weifs halten, möglich sein, wie wir es denn auch wirklich finden.

In dieser Erklärung liegt auch zugleich der Grund, warum die Schwankungen der Vorstellung des Weifs nicht so weit gehen, daß wir eine gesättigte Farbe, z. B. das Roth der mit Kupferoxydul gefärbten Gläser, welche nur Licht vom rothen Ende des Spectrum hindurchlassen, jemals für Weifs halten sollten, selbst wenn wir uns längere Zeit in einem Raume befinden, welcher sein Licht nur durch ein solches Glas empfängt. In der That sind wir nicht im Zweifel, wenn wir sehr lichtstarkes Roth mit lichtschwachem Blau vergleichen, welche Farbe die hellere sei. Über grofse Unterschiede entscheiden wir sicher auch aus der Erinnerung, nicht aber über kleine. Wenn also dem Auge homogenes Licht dargeboten wird, und die Empfindung der rothen Grundfarbe daher sehr intensiv ist, im Vergleich zu den Empfindungen der beiden anderen Grundfarben, so erkennen wir ohne Bedenken die Farbe als Roth an. Wir thun dies auch noch, wenn die Empfindung des Roth durch Ermüdung des Auges schon sehr bedeutend abgeschwächt ist. Wohl aber können wir unter solchen Umständen ein etwas weifsliches, aber noch immer ziemlich gesättigtes Roth für Weifs halten, wie in dem oben beschriebenen Versuche, wo ein mennigrothes Papier vor einem stark erleuchteten rothen Glase grünlich erscheint.

Noch auf einen anderen Umstand mufs ich aufmerksam machen, der in einem solchen Falle vor allzu grofsen Irrthümern schützt. Es ist dies das Eigenlicht der Netzhaut, welches nach einiger Zeit bei wanderndem Blicke complementär zur herrschenden Farbe erscheint, und sich auf allen ganz dunkeln Stellen des Gesichtsfeldes merklich macht. Wenn wir anhaltend durch ein rothes Glas sehen, erscheinen bald alle ganz dunkeln Objecte lebhaft grün. Neben dem Roth wird also seine Complementärfarbe sichtbar und wir werden dadurch gezwungen, das Roth als Roth anzuerkennen, wir können es nicht mit Weifs verwechseln. Bei herrschender weifser Beleuchtung erscheint der Nebel auf den dunkeln Stellen weifs, und wird eben deshalb nur bei genauer Aufmerksamkeit bemerkt. Selbst bei schwächer gefärbtem Licht, z. B. bei einer Lampe oder Kerze, macht sich das Eigenlicht der Netzhaut in dieser Weise bemerklich. Man braucht nur vor eine weisse

suchtete Papierfläche einen schmalen schwarzen, ganz un-  
stand zu halten, und den Blick über ihn und die Papier-  
lassen, so erkennt man bald den indigblauen Schein auf  
cher dem Rothgelb des Kerzenlichts complementär ist.

Kerzenbeleuchtung erscheint ebenso gut weifs, wie bei  
man aber durch eine innen geschwärzte Röhre, welche 398  
nung hat, nach dem Papier, und vergleicht das Aussehen  
der Papierfläche, den man noch sieht, mit dem dunkeln  
man bald, dafs jenes rothgelb ist, letzteres bläulich er-  
ei Tageslicht sich kaum ein solcher Unterschied zeigt.  
um die Farbe der herrschenden Beleuchtung zu erkennen,  
ein Tageslicht zur Vergleichung herbeischaffen kann.

Bestimmung des Weifs. bei verbreiteter farbiger Beleuch-  
Vergleichung mit dem Eigenlichte des Auges natürlich  
weil das letztere zu schwach und nicht rein weifs ist.

eine beschränkte Anzahl farbiger Objecte im Gesichts-  
wir viel besser im Stande, die relativen Unterschiede  
rben unter einander und von ihrem Mittel zu bestimmen,

dieses Mittel vom Weifs. Nun ist bei der normalen  
Tageslicht, und wenn wir eine grofse Mannigfaltigkeit von  
sichen können, das Weifs des Sonnenlichts die Mittel-  
vir die Abweichungen der übrigen Farben nach den ver-  
en der Farbentafel hin beurtheilen. Ist aber eine andere  
l, so dafs das Mittel aller gleichzeitig angeschauten  
be A nähert, so sind wir geneigt, dieses Mittel als den  
rer zeitweiligen Farbenbestimmungen zu benutzen, und  
ntificiren.

Im günstiger Fall für die Erscheinungen des simultanen „  
farbigen Schatten. Diese haben unter allen Contrast-  
und am meisten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

sie zu beobachten, ist die, dafs man ein Blatt Papier 393  
n Seiten her gleichzeitig mit abgeschwächtem Tageslicht  
beleuchtet. Das Tageslicht, d. h. weisses Licht, welches  
el, oder von einer von der Sonne beschienenen weissen  
im Monde kommt, lasse man durch eine nicht zu breite 394  
mit es deutliche Schatten werfen könne. Dann stelle  
irgend einen Körper (Finger, Bleistift), welcher Schatten  
Schatten erkennen. Ich nenne Schatten des Tages-  
elcher auch, wenn die Kerze fehlte, da sein würde, und  
zenlichts denjenigen, dessen Dasein von der Anwesen-  
ngt. Der Schatten des Tageslichts ist beleuchtet von  
ht, aber nicht von Tageslicht. Er erscheint in seiner  
ämlich rothgelb. Der Schatten des Kerzenlichts wird  
geslichte, nicht aber von dem rothgelben Kerzenlichte



beleuchtet. Er ist also objectiv weiß, erscheint aber blau, complementär zur Farbe des Grundes, welche ein weißliches Rothgelb ist, da die nicht beschatteten Theile des Papiers gleichzeitig von dem weißen Tageslichte und dem rothgelben Kerzenlichte beschienen sind. Die Färbungen sind am deutlichsten, wenn man die Stärke beider Lichtquellen so abgleicht, daß die Schatten beider gleich dunkel sind.

Das Blau im Schatten des Kerzenlichts wird lebhafter, wenn man den Blick häufig über den rothgelben Grund wandern läßt, aber es entsteht auch ganz ohne Vermittelung von Nachbildern. Man merke und bezeichne sich irgend einen Punkt *a*, der in dem blauen Schatten liegt, setze vor die Kerze einen undurchsichtigen Schirm, lasse eine Weile nur Tageslicht auf das Papier fallen, bis die Nachwirkung des rothgelben Lichts vollständig erloschen ist, und das Tageslicht wieder vollkommen weiß erscheint. Nun fixire man den Punkt *a* und ziehe den Schirm vor der Kerze weg. Sogleich färbt sich nun der Schatten des Kerzenlichts blau, und bleibt blau, wenn auch nicht die kleinste Schwankung des Blicks erfolgt ist. Ferner tritt auch die Contrastfarbe im Schatten sogleich auf, wenn man die Augen eine Weile schließt und bedeckt, und sie dann plötzlich öffnend nach den Schatten hinwendet.

Man nehme eine innen geschwärzte Röhre, und gebe ihr eine solche Stellung, daß, wenn man hindurchsieht, das Auge nur Stellen des Papiers erblickt, welche im Schatten des Kerzenlichts liegen. Läßt man nun zuerst nur Tageslicht einfallen, blickt dann durch die Röhre, und läßt alsdann auch das Kerzenlicht einfallen, so sieht der Beobachter nichts von den mit Kerzenlicht beleuchteten Stellen, er bemerkt dessen Anwesenheit gar nicht, und das Aussehen der Stelle des Papiers, welche er durch die Röhre sieht, bleibt unverändert. Es folgt daraus, was hier bemerkt werden mag, da es von OSANN bezweifelt wurde, daß objectiv die Farbe des Papiers im Schatten des Kerzenlichts nicht verändert wird.

395 Statt der rothgelben natürlichen Farbe des Kerzenlichts kann man nun auch andere Farben anwenden. Das Kerzenlicht kann man färben, indem man farbige Gläser vor die Kerze setzt, und so gefärbtes Kerzenlicht entweder mit Tageslicht oder mit ungefärbtem Kerzenlicht combinirt. Am glänzendsten werden die Erscheinungen aber, wenn man die Versuche in einem dunkeln Zimmer anstellt, und durch eine Öffnung des Ladens, die mit einem farbigen Glase gedeckt ist, gefärbtes Sonnenlicht eintreten läßt, durch eine andere kleine Öffnung weißes Tageslicht. In allen diesen Fällen erscheint das weiße Licht sowohl bei fixirtem, als auch, und zwar viel stärker, bei wanderndem Blick complementär zu dem farbigen gefärbt.

Die complementäre Farbe erscheint bei wanderndem Blicke sogar auch auf ganz schwarzen Flächen und auf Flächen, die schwach mit der herrschenden Farbe beleuchtet sind. Bei fixirtem Blicke erscheint eine dunkle Fläche bald complementär, bald gleichfarbig. Bei schwächerem Lichte gewöhnlich ersteres, bei stärkerem Lichte letzteres, jedenfalls wird sie aber nach einiger Dauer der Fixation gleichfarbig dem herrschenden Lichte, während nur an

den unvermeidlichen Schwankungen der Gesichtaxe hinplementärfarbe aufblitzt. So wie man den Blick wandern mplementärfarbe immer zu Stande, oder wird glänzender, schon vorher da war.

ntärfarbe kommt sogar dann zum Vorschein, wenn man ei Gläser von derselben Farbe gehen läßt, wovon aber gefärbt ist als das andere, oder wenn man zwei gleiche ber neben dem einen noch weisses Licht einfallen läßt. rd also der Farbenton des weiflicheren Schatten scheinbar stzten verwandelt.

lle von Contrast verlassen, bei denen die inducirte Farbe 400 des Gesichtsfeldes einnimmt, müssen wir noch den Grund inenden Färbung des reagirenden Feldes, welche der in-ig ist, erörtern. Es kommt dies unter zwei Bedingungen wenn das inducirende Feld eine sehr grofse Lichtstärke gem Fixiren desselben Punktes.

ircirende Feld eine sehr grofse Lichtstärke hat, halte ich leichnamigen Färbung im reagirenden Felde nicht für eine ng, sondern für eine Ausbreitung objectiven Lichts. Jede chsichtige Substanz, welche wir kennen, zerstreut kleine welches durch sie hindurchgeht, nach allen Seiten hin, b, wenn starkes Licht durch sie hingeht, selbst schwach s auch mit der Hornhaut und der Krystalllinse des Auges ir schon oben (§ 14, S. 142) erwähnt. Man denke ferner Objecte des Glaskörpers, welche nothwendig das durch- eis von seinem Wege ablenken müssen, man denke daran, leuchteten Stellen der Netzhaut nach den übrigen Theilen n reflectirt wird, so ergibt sich, daß wenn eine gröfsere Auge eindringt, immer merkliche Mengen davon über

kleineren Theil des Augengrundes ausgebreitet sein hsten zeigt sich diese Beleuchtung durch diffuses Licht 15 beschriebenen Methode, die Gefäße der Retina sicht- n man eine Kerzenflamme unterhalb des Auges hin und

Lichtnebel, welcher hierbei den Grund des Auges aus- schatten der Netzhautgefäße: die Beleuchtung ist also e, und nicht bloß eine Ausbreitung der Lichtempfindung

ich bei objectiven Versuchen mit Glaslinsen leicht über- s zerstreute Licht immer am stärksten in der Nähe des en Lichtbündels ist, und schwächer wird, je weiter man ernt. Läßt man Sonnenlicht durch die Öffnung eines if eine entfernte Linse fallen, und fängt das Bild der em weissen Schirme auf, so sieht man das helle Bildchen belschein umgeben, der auch sichtbar wird, wenn man

das Bild der hellen Öffnung selbst dicht am Rande des Schirms vorbeigehend läßt. Jener weiße Nebelschein ist also keine im Auge entstehende Irradiation, sondern eine objective Erscheinung. Noch besser sieht man es, wenn man in den Schirm eine kleine Öffnung macht, die man dem Bilde der hellen Öffnung nahe bringt, ohne sie aber damit zusammenfallen zu lassen. Blickt man durch die Öffnung des Schirmes nach der Linse, so erscheint diese desto heller erleuchtet, je näher man dem optischen Bilde der Lichtquelle kommt. Ein ganz entsprechendes Phänomen entsteht im Auge. Wenn man eine Lichtflamme vor einem sehr dunkeln Felde sieht, z. B. vor der geöffneten Thür eines ganz dunkeln Raumes, so erscheint die Flamme von einem weißlichen Nebel umgeben, der in ihrer unmittelbaren Nähe am hellsten ist. Man bemerkt diesen Lichtschein am besten, wenn man einen kleinen undurchsichtigen Körper zwischen das Auge und die Flamme bringt, so daß diese nicht mehr gesehen wird. Augenblicklich verschwindet auch der Lichtnebel vor dem Grunde, und man sieht diesen in seiner eigenthümlichen Schwärze. Ist das Licht farbig, so ist natürlich auch der zerstreute Lichtnebel von derselben Farbe. Ich glaube auch in diesem Falle nicht zweifeln zu dürfen, daß dieser Lichtnebel von der Zerstreuung objectiven Lichts herrührt, da die Vertheilung des Lichts ganz dieselbe ist, welche ein System Glaslinsen unter denselben Umständen geben würde. Aber allerdings fehlt hier der Nachweis mittels der Schatten der Netzhautgefäße, der in dem erst erwähnten Falle gegeben werden konnte. Beim blauen Lichte kommt endlich auch noch das durch Fluorescenz der Linse zerstreute weißbläuliche Licht hinzu, welches sich ebenfalls über den ganzen Grund des Auges ausbreitet. Wenn also eine große Menge farbigen Lichts in das Auge fällt, werden immer auch solche Theile der Netzhaut, welche Bilder dunkler Objecte empfangen, von dem herrschenden Lichte schwach beleuchtet werden, und zwar desto stärker, je näher sie den Bildern der hellen Flächen liegen. Außerdem besteht im Bereich des dunkeln Bildes die innere Reizung der Nervenmasse, das weißliche Eigenlicht der Netzhaut. Dieses allein genommen würde im Contrast zur herrschenden Farbe dieser complementär erscheinen. Kommt aber viel der inducirenden Farbe gleichnamiges zerstreutes Licht hinzu, so wird dies von Anfang an den überwiegenden Eindruck machen; daher denn, wie oben bemerkt, schwarze Scheibchen vor farbigen Gläsern bei geringerer Helligkeit complementär, bei größerer gleichfarbig erscheinen.

Der zweite Fall, wo die inducirte Farbe der inducirenden gleichartig ist, bei langer Fixation nämlich, erklärt sich aus dem, was im vorigen Paragraphen über das allmähliche Erlöschen der Bilder durch lange Fixation beigebracht worden ist. Es ist schon dort bemerkt worden, daß wenn eine Stelle der Netzhaut lange Zeit hindurch von demselben Lichteindrucke getroffen wird, die Empfindung der Helligkeit immer schwächer und die Farbe immer weniger gesättigt wird. Indessen bemerken wir diese Veränderung des Eindruckes nur, wenn wir Vergleichen mit dem Eindruck, den dasselbe Licht auf un

stellen macht, anstellen. Wir halten also dabei das Ur-  
e und Helligkeit fest, welches wir uns beim ersten An-  
t. In der That würden wir, selbst wenn wir den Wechsel  
einiger Aufmerksamkeit bemerken, ihn bald als subjective  
en lernen, da er ja in jedem einzelnen Falle immer und  
und würden ihn, wie andere ähnliche subjective Er-  
bersehen lernen.

e Fläche hellere und dunklere Theile hat, so verlöschen 402  
bei der Abschwächung des Eindrucks allmählich. Man  
einer solchen Fläche einen Punkt, der als Fixationspunkt  
es vortheilhaft, wenn die Grenzen zwischen hellen und  
waschen sind, um bei kleinen Schwankungen des Auges  
hnete Nachbilder zu geben. Fixirt man scharf und fest,  
bis 20 Secunden oft recht auffallende Lichtunterschiede,  
eise, dafs anfangs die helleren Theile dunkler werden,  
dunkleren heller. Auffallend ist dabei auch, dafs eine  
e sich häufig in einen verwaschenen dunkeln Fleck ver-  
helle Masse in einen verwaschenen hellen Fleck, als  
nit dünnflüssigen Farben gemalt, und diese verliefen in  
ist in dieser Weise der Versuch schwer auszuführen,  
arren Fixation, und sehr anstrengend. Jeder Lidschlag,  
ng des Auges stellt das Bild wieder her. Viel bequemer  
ingt er, wenn wir Objecte benutzen, die zur Netzhaut  
ge haben, nämlich die Netzhautgefäße. Ich habe im  
seinandergesetzt die Netzhautgefäße sichtbar zu machen.  
ser Methoden besteht darin, dafs man den Schatten der  
wöhnliche Richtung fallen läßt, oder den Kernschatten  
Dabei ist aber auch nöthig die Richtung des Schatten  
dauernd zu verändern, und man sieht nur diejenigen  
en den Ort wechselt. So wie man die Lichtquelle un-  
nden die Gefäße im Gesichtsfelde in wenigen  
so hell werden wie das übrige Gesichtsfeld. Sie schwin-  
ständiger, als es Bilder äußerer Gegenstände thun, bei  
it der Fixation besteht; sie schwinden um so schneller,  
suchtung ist. Am längsten halten sie sich, wenn man  
enlicht auf die äußere Seite der Sclerotika concentrirt,  
hellsten ist.

ungen zeigen übrigens leicht, dafs das Verschwinden  
nz dieselben Ursachen hat, wie das Verschwinden aller  
d dafs hierbei keineswegs irgend eine besondere Eigen-  
r den Gefäßen liegenden Netzhauttheile im Spiel ist.  
zunehmen, dafs diese Stellen etwa mit einer größeren  
ien, als der Rest der Netzhaut, und deshalb trotz der  
arke Empfindung hätten, wie die anderen. Denn wenn

wir den Schatten in ungewöhnlicher Richtung entwerfen, indem wir einen Theil der Sclera durch die Pupille oder von außen beleuchten, und zur Lichtquelle für den Augengrund machen, so verhalten sich die neu beschatteten Theile der Netzhaut genau ebenso, wie die gewöhnlich beschatteten. Auch auf jenen schwindet das Bild schnell, wenn es seinen Platz nicht wechselt, und die gewöhnlich beschatteten Theile geben sich keineswegs durch eine dauernd grössere Helligkeit zu erkennen. Vorübergehend blitzen allerdings helle Streifen neben dem Schatten auf, sobald der Schatten eine Zeit lang still gestanden hat, und dann wieder sich zu bewegen beginnt. Aber das  
 403 geschieht bei seitlicher Beleuchtung ebenso gut, wie bei der Beleuchtung von vorn. Es zeigt sich dabei also wohl, daß die beschatteten Theile der Netzhaut ausruhen, und wenn wieder Licht auf sie fällt, dieses lebhaft empfinden. Aber die Nachwirkung der Ruhe, das negative helle Nachbild des Schattens dauert eben nicht länger als das Nachbild dunkler äußerer Objecte. Ich glaube deshalb nicht zweifeln zu dürfen, daß wir in dem schnellen Verschwinden des Gefäßschattens eben nichts anderes sehen, als in dem Verschwinden jedes starr angeschauten objectiven Bildes mit mäßigen Helligkeitsunterschieden, nur daß in jenem Falle die Schwierigkeiten der Fixation wegfallen.

Wenn nun dauernd eine Stelle der Netzhaut *A* stärker beleuchtet wird als eine andere *B*, so wird allerdings, weil *A* mehr ermüdet wird als *B*, der anfängliche Unterschied der Erregung bis zu einem gewissen Grade vermindert werden, und wir sehen ihn dabei allmählich auch für unsere Empfindung ganz und gar verschwinden, sei es nun, daß er wirklich zu klein wird, um wahrgenommen zu werden, oder, was mir wahrscheinlicher dünkt, weil unser Unterscheidungsvermögen für anhaltende Nervenenerregungen viel unvollkommener ist, als für wechselnde Erregung. Da wir nun aber in diesen Fällen unsere Beurtheilung der Farbe nach dem ersten Eindruck festhalten, und über die allmähliche Veränderung desselben wegsehen, so scheinen uns bei diesem Versuch die Flächen *A* und *B* einander ähnlicher zu werden, während ihre mittlere Helligkeit ungefähr constant erscheint. Im Allgemeinen wird die hellere *A* dabei dunkler, die dunklere *B* aber heller. Eine silbergraue Tapete zum Beispiel mit dunkler grauen Blättern, an der Kupferstiche hängen, erscheint mir bei längerem Fixiren wie mit Milch übergossen.

Sind im Gesichtsfelde verschiedene Farben, so hat deren Eindruck ebenfalls nur im ersten Augenblicke volle Lebhaftigkeit. Bei anhaltendem Fixiren werden alle Farben immer dunkler und grauer, und daher einander ähnlicher. Daß sie ähnlicher werden, bemerken wir; die Veränderung der herrschenden Farbe aber bemerken wir nicht, oder nur ungenau, so lange uns die Vergleichung mit frischen Eindrücken fehlt, und so halten wir diese meist für unverändert.

Haben wir also ein weißes Feld auf rothem Grunde fixirt, und werden die beiden Farben einander immer ähnlicher, so urtheilen wir, daß das Weiß roth werde. Dazu kommt, daß bei jedem Schwanken des Blicks an der

ler auf dem Weifs ein grünes Nachbild, auf dem Roth  
 n Roth aufblitzt, und durch den Contrast die Wirkung

ben sich einander nähern, zeigt sich sehr deutlich, wenn  
 hes Feld auf breitem weifsen Grunde fixirt. Auch dann  
 bemerkt hat, das Weifs nach einiger Zeit röthlich, und  
 in seiner ganzen Ausdehnung. Ein zweites kleines  
 es weit seitlich liegt, hat keinen Einfluss auf den Gang  
 Vählt man aber den Fixationspunkt auf der Grenze zweier  
 arbigen Felder, die auf weifsem Grunde liegen, so über-  
 HNEB der Grund mit der Mischfarbe beider. Es zeigt  
 ie besondere Bevorzugung der Farbe, welche der gelbe  
 s wohl seinen Grund darin hat, dafs diese am schärfsten  
 rtheilt wird, während die Farbenempfindung auf den  
 etzhaut viel unvollkommener ist.

betrachteten Fällen, wo wir voraussetzten, dafs die in- 404

gröfsten Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, oder wenig-  
 rke und Lebhaftigkeit die anderen beherrscht, sind die  
 n ziemlich constant und deutlich, und scheinen weiter von  
 ngen abzuhängen. Anders ist es, wenn das Feld der  
 kleiner ist, so dafs daneben an der Grenze des Gesichts-  
 reichende Anzahl weifser und verschiedener Objecte er-  
 ann sind die Contrasterscheinungen durchaus nicht mehr  
 gen von manchen merkwürdigen Nebenbedingungen ab,  
 heorie dieser Erscheinungen sehr wichtig zu sein  
 erhalb des inducirenden und inducirten Feldes das  
 so stört dies nicht so sehr. Erst wenn das Dunkel  
 eil des Gesichtsfeldes einnimmt, wenn man z. B. durch  
 sieht, scheint das Eigenlicht der Netzhaut eine weifse  
 eten, und die Contrasterscheinungen werden unsicher.

orstellung von der körperlichen Lage der ge- n  
 Sehr wirksam zeigt folgendes Verfahren von RAGONA SCINA 405  
 h bei mäfsiger Ausdehnung des farbigen Feldes. Es seien

zwei weisse Papierflächen, die eine  
 e andere senkrecht, und  $ad$  eine  
 welche gegen die beiden Papier-  
 gt ist;  $e$  und  $f$  seien zwei schwarze  
 iter, welcher von oben bei  $B$  her  
 niedersieht, erblickt die Fläche  $ab$   
 Glas hindurch, und sieht  $ac$  ge-  
 ltbild der Fläche  $ac$  fällt scheinbar  
 sammen. und das Spiegelbild des  
 ge neben dem Flecke  $e$ , etwa in  $g$ .  
 lches farbige Gläser hindurchlassen.




Fig. 129.



gefärbt, das, was sie reflectiren, besteht theils aus rein weißem Licht, welches an der vorderen Fläche reflectirt ist, theils aus verhältnißmäfsig kleinen Antheilen farbigen Lichts, welches an der hinteren Fläche, oder mehrmals innerhalb der Platte reflectirt ist. Das reflectirte Licht ist also bei dunkel gefärbten Platten fast weiß, wenigstens viel schwächer gefärbt, als das durchgelassene Licht. Demnach erhält das Auge des Beobachters von dem Spiegelbild  $g$  des Fleckes  $f$  her nur durchgelassenes, also gefärbtes Licht, was von  $a b$  kommt, von dem hellen Grunde theils durchgelassenes farbiges, theils reflectirtes weißliches Licht, und von dem Flecke  $e$  her nur reflectirtes weißliches Licht. Obgleich nun dieses letztere Licht nicht ganz weiß ist, sondern immer noch Theile gefärbten Lichtes von der Farbe des Glases enthält, erscheint es doch im Contrast gegen die Farbe des Grundes complementär gefärbt, der Fleck  $g$  dagegen natürlich in der gesättigten Farbe des Glases. Ist also z. B. das Glas grün, so erscheint  $e$  rosaroth,  $g$  grün.

Auch hier muß man darauf sehen, daß der Unterschied zwischen der Helligkeit, in der  $e$  und der Grund erscheint, nicht zu groß wird, und deshalb bei farbigen Gläsern, die viel Licht durchlassen, die Fläche  $a b$  durch ein weißes Papier beschatten. Übrigens ist die Contrastfarbe von  $e$  deutlicher, wenn der dem Grunde gleichnamig erscheinende Fleck  $f$  da ist, als wenn er fehlt. Beide werden hier unter scheinbar gleichen Bedingungen gesehen, und die Vergleichung ihres Aussehens steigert den Gegensatz. Sucht sich nun der Beobachter ein graues Papier aus, welches genau dieselbe Farbe hat, wie ihm der Fleck  $e$  ohne Contrast erscheinen würde, und bringt er davon ein Schnitzelchen über die farbige Glasplatte, so daß es ihm den Fleck  $e$  halb verdeckt, so erscheint ein solches Schnitzelchen gar nicht oder nur zweifelhaft complementär gefärbt, und sobald man die Farbe des Flecks  $e$  mit ihm vergleicht, und sie als gleich anerkennt, schwindet auch die Complementärfarbe von  $e$  und verwandelt sich in einfaches Grau. Es ist dies ganz dieselbe Erscheinung wie bei der ersten Methode.

406 Ähnliche Erscheinungen, die freilich nur sehr kleine durch Contrast gefärbte Felder, aber doch eine lebhaft und deutliche Wirkung zeigen, sind folgende. Man nehme eine schwach gefärbte etwas dicke Glasplatte etwa von gewöhnlichem grünlichen Fensterglas, und betrachte in ihr das Spiegelbild einer hellen weißen Fläche. Dabei wirft die vordere Fläche der Platte rein weißes Licht zurück, die hintere grünliches, weil letzteres der absorbirenden Wirkung des Glases ausgesetzt gewesen ist. Nun bringe man zwischen die Platte und die helle Fläche ein schmales schwarzes Stäbchen, welches in zwei Spiegelbildern erscheint, deren eines von der vorderen, eines von der hinteren Fläche der Platte reflectirt wird. Wo das von der vorderen Fläche entworfene Spiegelbild gesehen wird, empfängt das Auge des Beobachters noch grünliches Licht von der hinteren Fläche, wo das Spiegelbild der hinteren Fläche liegt, noch weißes Licht von der vorderen Fläche. Der Grund erscheint daher weiß, kaum etwas grünlich, das erstere Spiegelbild

Durch Contrast sehr deutlich rosaroth. Noch deutlicher  
 g, wenn man die hintere Fläche eines solchen gefärbten  
 die belegt, und die Nachbilder unter so schiefer Incidenz  
 le gleich stark erscheinen.

ender Versuch. Man lege ein farbiges, z. B. grünes, auf  
 (besser ein graues von gleicher Helligkeit). Nahe dem  
 e und weisse Feld zusammenstoßen, mache man auf jedes  
 leinen schwarzen Fleck, und setze ein Rhomboeder von  
 ese Stelle. Durch den Krystall sieht man alle Punkte  
 lt. In der Mitte erscheint ein grünweisser Streifen, wo

Bild des Weifs mit dem außerordentlichen des Grün  
 e Anordnung so treffen, daß in diesem Streifen je eines  
 len schwarzen Flecke erscheint. In dem ordentlichen  
 Weifs befindlichen schwarzen Flecks fehlt Weifs, ist aber  
 r Fleck ist grün. In dem außerordentlichen Bilde des  
 lichen schwarzen Flecks fehlt Grün, ist aber Weifs vor-  
 ast erscheint er lebhaft rosenroth.

eschriebenen Versuchen hängt die Contrastwirkung nicht  
 einer bestimmten Vertheilung der Farben im Gesichts-  
 sehen, daß diese bei zwei verschiedenen leichten Ab-  
 i Versuchs genau gleich sein kann, und doch in dem  
 ntrastwirkung deutlich eintritt, im anderen nicht oder

Sobald das contrastirende Feld als ein selbständiger  
 rde, der über dem farbigen Grunde lag, oder auch nur  
 ade Bezeichnung seiner Grenzen als ein gesondertes  
 heilt war, fiel der Contrast fort. Da also das Urtheil

Lage, über die körperliche Selbständigkeit des be-  
 tscheidend für die Bestimmung der Farbe ist, so folgt,  
 hier nicht durch einen Act der Empfindung, sondern  
 s Urtheils oder der Abschätzung entsteht. Die Art  
 lurch welche wir zur Wahrnehmung von Objecten mit  
 often gelangen, wird in der dritten Abtheilung genauer

Da die bezeichneten Urtheilsacte überwiegend oft un-  
 rlich vollzogen werden, so ist es natürlich oft schwer, 407  
 her Verkettung von Eindrücken das endliche Resultat  
 n der Natur der Sache, daß sehr verschiedenartige Um-  
 ein können. Ich will versuchen hier dergleichen Um-  
 so weit ich bei der Neuheit des Gegenstandes sie auf-

iebenen Versuche haben etwas Gemeinsames, welches  
 astwirkung sehr zu unterstützen scheint, obgleich auch

Contrast zu Stande kommen kann. In allen diesen  
 eine farbige Beleuchtung oder eine farbige  
 e über das Feld ausgebreitet zu sein, und die An-

schauung ergibt nicht unmittelbar, daß sie auf der weißen Stelle fehlt, so daß hier nicht bloß einfach an Stelle des Weißs die Complementärfarbe des Grundes gesetzt wird, daß man vielmehr an die Stelle des Weißs zwei neue Farben setzt, die gemeinsame Farbe der Decke oder Beleuchtung und deren Complement. Am klarsten ist das Verhältniß bei der in *Fig. 199* dargestellten Anordnung, wo man durch das unter  $45^\circ$  geneigte grüne Glas sieht. Man urtheilt, daß der schwarze Fleck des unteren horizontalen Blattes rosenroth sei, aber man urtheilt auch, daß man diesen Fleck wie das ganze Blatt mit seiner rosenrothen Farbe durch das grüne Glas sehe, und daß die grüne Farbe, welche das Glas giebt, sich ununterbrochen über die ganze unterliegende Fläche erstreckt, auch über den dunkeln Fleck. Man glaubt also an dieser Stelle gleichzeitig zwei Farben zu sehen, nämlich das Grün, welches man der Glasplatte zuschreibt, und das Rosenroth, welches man dem dahinter liegenden Papier zuschreibt, und beide zusammen geben in der That die wahre Farbe dieser Stelle, nämlich Weißs. In der That müßte ein Object, welches, durch ein grünes Glas gesehen, weißes Licht in das Auge sendet, wie dieser Fleck, rosenroth sein. Bringen wir aber ein genau ebenso aussehendes weißes Object oberhalb der Glasplatte an, so fällt jeder Grund weg, die Farbe des Objects in zwei zu zerlegen, es erscheint uns weißs.

Ebenso wenn farbige Flächen mit durchscheinendem Papier bedeckt sind. Ist die Unterlage grün, so erscheint das Papier selbst grünlich gefärbt. Geht nun die Substanz des Papiers ohne sichtbare Unterbrechung über das untergelegte Grau hin, so glaubt man ein Object durch das grünliche Papier hindurchschimmern zu sehen, und ein solches Object muß wiederum rosenroth sein, um weißes Licht zu geben. Ist aber die weiße Stelle als selbständiges Object abgegrenzt, fehlt die Continuität mit dem grünlichen Theil der Fläche, so betrachtet man sie als ein weißes Object, welches auf dieser Fläche liegt. Ich habe schon oben im § 20 erwähnt, daß eine solche Trennung zweier Farben, die in demselben Theile des Gesichtsfeldes vorhanden sind, durch das Urtheil vorkomme. Wir lernten diesen Umstand dort als ein Hinderniß für das ungestörte Zustandekommen der Empfindung einer Mischfarbe kennen. Eine solche Trennung tritt sehr häufig ein, sobald die beiden Farben ungleichmäßig verbreitet sind. Man glaubt dann, wie VOLKMANN<sup>1</sup>, der diese Erscheinungen zuerst erwähnt hat, es beschreibt, die eine  
 408 Farbe durch die andere hin zu sehen. Die Fähigkeit, eine solche Trennung auszuführen, scheint mir auf folgendem Umstande zu beruhen. Ihre wichtigste Bedeutung haben die Farben für uns, insofern sie Eigenschaften der Körper sind, und als Erkennungszeichen der Körper benutzt werden können, Wir gehen deshalb bei unseren Beobachtungen mit dem Gesichtssinne stets darauf aus, uns ein Urtheil über die Körperfarben zu bilden, und dabei die Verschiedenheiten der Beleuchtung, unter der sich ein Körper uns darbietet,

<sup>1</sup> VOLKMANN, *Müllers Archiv für Anat. und Physiol.* 1838. S. 373.

habe in § 20 schon erwähnt, daß wir in diesem Sinne  
 len zwischen einem weißen Blatte in schwacher Be-  
 n grauen Blatte in starker Beleuchtung, daher wir eine  
 it finden, uns davon zu überzeugen, daß hell beleuch-  
 ei schwach beleuchtetem Weiß. Wir müssen künstlich  
 nau auf das graue Feld beschränken, so daß wir aus  
 nicht entnehmen können, das Grau sei stärker beleuchtet  
 Gesichtsfeldes. Erst dann erkennen wir seine Identität  
 wir nun gewöhnt und geübt sind, uns ein Urtheil über  
 den mit Elimination der verschiedenen Helligkeit der  
 ler wir sie sehen, so eliminiren wir auch die Farbe der  
 haben hinreichende Gelegenheit dieselben Körperfarben  
 vollem Sonnenschein, bei dem blauen Licht des klaren  
 schwachen weißen Licht des bedeckten Himmels, bei  
 t der sinkenden Sonne, und bei dem rothgelben Licht  
 kommen noch die farbigen Reflexe der umgebenden  
 Laubwalde ist die Beleuchtung überwiegend grün, in  
 n Wänden den Wänden gleichfarbig. Dieser letzteren  
 ichtung werden wir uns nicht einmal deutlich bewußt,  
 sie mittels der farbigen Schatten oft genug nachweisen.  
 hen farbigen Gegenstände unter diesen verschiedenen  
 , lernen wir uns trotz der Verschiedenheit der Be-  
 ge Vorstellung von den Körperfarben zu bilden, d. h. zu  
 solcher Körper in weißer Beleuchtung aussehen würde,  
 constant bleibende Körperfarbe interessirt, werden wir  
 pfindungen, auf denen unser Urtheil beruht, gar nicht

n auch nicht in Verlegenheit, wenn wir einen Körper  
 ecke hindurch sehen, zu scheiden, was der Farbe der  
 Körper angehört. Daß wir in den beschriebenen Ver-  
 , auch da, wo die Decke über dem Körper gar nicht  
 , oder befördert wenigstens die Täuschung, in die wir  
 e deren wir dem Körper eine falsche Farbe, die Com-  
 rbigen Theils der Decke zuschreiben.

er geübt sind in einer einfarbigen Beleuchtung die  
 zu erkennen, reicht unsere Übung doch nicht zu, das-  
 zwei verschiedenfarbige Beleuchtungen von zwei ver-  
 l von eng begrenzten und scharfe Schatten werfenden

Denn in den meisten der oben aufgezählten Fälle  
 sind die farbigen Flächen sehr breit, und das farbige  
 nlich gleichmäßig über alle Seiten der betrachteten  
 Vir gewöhnen uns deshalb, von allen farbigen Flächen 409  
 weit sie im Bereich der farbigen Beleuchtung sind,  
 itung abzuziehen, um die Körperfarbe zu finden. Das-

selbe thun wir nun bei den farbigen Schatten, wo zwei farbige Beleuchtungen sich verbinden. Kommen Kerzenlicht und Tageslicht zusammen, so ist die Beleuchtung des Grundes weißlich rothgelb. Dieses Rothgelb der Beleuchtung subtrahiren wir nun auch von der Farbe des Schattens, zu dem gar kein Kerzenlicht gelangt, und halten diesen für blau, während er weiß ist. Wie in der That sich die Anschauung bildet, daß die farbige Beleuchtung sich bei solchen farbigen Schatten und in der durchscheinenden Papierdecke auch über den objectiv weissen Fleck hinziehe, zeigt sich namentlich, wenn kleine Unregelmäßigkeiten des Papiers die Beleuchtung fleckig machen; dann glaubt der Beobachter diese Fleckchen in der farbigen Beleuchtung zu sehen, die hier gar nicht existirt.

Weitere Beispiele, die sehr geeignet sind, unsere Fähigkeit zu zeigen, zwei Farben hinter einander gelegener Objecte von einander zu trennen, lasse ich hier noch folgen. Das erste schließt sich an VOLKMANN's schon erwähnte Versuche an, der zwei farbige schmale Papierstreifen vor das Auge hielt, einen ganz nahe, den anderen in der Entfernung des deutlichen Sehens, und dabei bemerkte, daß er, statt die Mischfarbe zu sehen, die eine Farbe durch die andere hin sah. Man bringe einen grünen Schleier dicht vor die Augen, und lasse ihn hinreichend stark beleuchten, daß sich das ganze Gesichtsfeld mit einem grünen Scheine füllt, während das Muster und die Falten des Schleiers nur in einem sehr verwaschenen Zerstreuungsbilde erscheinen. Man wird ohne Schwierigkeit die Farben der dadurch gesehenen Gegenstände richtig erkennen, obgleich auf der Netzhaut sich zu allen Farben noch das grüne Licht des Schleiers mischt. Ja noch auffallender wird es, wenn nach einiger Zeit Ermüdung des Auges für das grüne Licht eintritt, dann färben sich nämlich die durch den Schleier gesehenen Gegenstände sogar rosenroth, trotz der Zumischung des grünen Lichts zu ihrem Netzhautbilde. Am besten zeigt sich dies, wenn wir nur mit dem rechten Auge durch den grünen Schleier sehen und das linke schließen. Nach kurzer Zeit sieht ein weißes Papier, durch den Schleier gesehen, nicht nur weiß, sondern sogar röthlich weiß aus. Wenn wir nun das rechte Auge schließen, das linke unbedeckte öffnen, so erscheint das Papier im Gegensatz dazu jetzt diesem Auge grün. Abwechselnd das rechte und linke Auge öffnend, sehen wir dann mit jenem, wo das Netzhautbild des Papieres grünlich-weiß ist, das Papier röthlich, mit diesem, wo das Netzhautbild weiß ist, umgekehrt das Papier grünlich.

Derselbe Erfolg tritt bei dem von SMITH<sup>1</sup> in Fochabers angegebenen und von BRÜCKE<sup>2</sup> veränderten und theoretisch erklärten Versuche ein. Wenn man nahe neben dem rechten Auge eine hell brennende Flamme anbringt, oder die Sonne von rechts her das Auge bescheinen läßt, aber so, daß kein Licht direct in die Pupille eindringt, während das linke Auge beschattet  
410 wird, so erscheinen dem rechten Auge weiße Gegenstände grünlich, dem

<sup>1</sup> SMITH, *Edinb. Journ. of Science*. V. 52. — *Pogg. Ann.* XXVII. 494. 1832.

<sup>2</sup> BRÜCKE, *Denkschrift der k. k. Akad. zu Wien*. III. Bd. *Pogg. Ann.* LXXXIV. 418. 1851.

irbt. Man sieht dies deutlich, wenn man hinter einander bald das linke Auge öffnet, oder wenn man vor beide Blatt Papier bringt und ein in der Mitte zwischen Augen ein schwarzes verticales Stäbchen fixirt, welches man dann dem rechten, das andere dem linken Auge angehörig, fixirt sieht. Auch dann ist das links erscheinende Bild, wo Papierfläche sieht, aber nicht das rechte, roth, das andere dagegen eine schwarze Tafel und hält in einiger Entfernungs Object, welches im Doppelbilde erscheint, so ist es, welches jetzt das vom linken Auge gesehene ist, das seitlich beleuchteten Auge also erscheint Weiss grünlicher beleuchteten Auge. Nun dringt unter diesen Umständen Licht durch die Augenlider in das beleuchtete Auge, und dieses wird wir aus früheren Versuchen<sup>1</sup> schon wissen. Läßt man Licht auf das Auge scheinen, so erkennt man auch die rothen Objecten. Betrachtet man z. B. eine Druckschrift, so erscheinen Buchstaben schön roth, das weisse Papier grün. Dieses dringende Licht zerstreut sich über den grössten Theil der Netzhautstellen des beleuchteten Auges, welche diesen Objects aufnehmen, werden also gleichzeitig von diesem Lichte beleuchtet, empfinden aber grünlich weiss. Die Ermüdung wird bei längerer Fortsetzung des Versuchs immer deutlicher der Ermüdung des Auges für Roth abhängt. Aber sie vermindert die rothen Beleuchtung der Netzhaut nur dadurch, dass die schon vorher bestehende und ausgebreitete Ermüdung getrennt wird von dem hinzukommenden Lichte der Ermüdung grünlich erscheint, weil das Auge für roth ermüdet ist, hierzu erscheint nun im unveränderten Auge das reine

ferner die Spiegelbilder der Tapeten und der Decke auf einer gut polirten Oberfläche einer Mahagony-Tischplatte. Das Auge für die gespiegelten Gegenstände, so erscheinen stählerner Farbe, oder auch oft etwas bläulich, complementär Platte. Accommodirt man das Auge dagegen für die Platte, dass die Summe des Lichtes, was von ihr herkommt, gelblich ist. Die complementäre Färbung der Spiegelbilder finde, namentlich dann ein, wenn das gespiegelte Object verhältnissmässig schwach gegen die Beleuchtung der Platte dagegen bei sehr schrägem Einfall die Stärke des gespiegelten zunimmt, die Holzmaserung dagegen verschwindet, so sind die Spiegelbilder oft im Gegentheil röthlich, indem man dann die Platte keine Veranlassung mehr hat. Bei diesen zuletzt n



beschriebenen Erscheinungen ist das hinzukommende Licht besonders gleichmäßig der Zeit und der Fläche nach über das ganze Bild, über seine hellen und dunklen Stellen ausgegossen, von den Bewegungen des Auges unabhängig, während die körperlichen Objecte mit ihren gewöhnlichen Farbenunterschieden erscheinen. Dies scheint die Deutung desselben als eines unabhängigen Theils der Farbeneindrücke zu begünstigen. Dasselbe ist auch bei den Papierdecken der Fall.

- 414 Von den früheren Beobachtern ist in den theoretischen Erklärungen der Contrasterscheinungen immer vorausgesetzt worden, daß die Reactionsweise der Nerven, die Empfindung, in den inducirten Theilen der Netzhaut verändert sei, daß die Contrasterscheinungen also in gewissem Sinne in das Gebiet der Mitempfindungen gehörten, zu welchen viele Forscher auch die Irradiation rechneten. In gewissem Sinne hatte man allerdings Recht von veränderter Empfindung zu sprechen, insofern man bei den Beobachtungen den successiven Contrast nicht genau von dem simultanen getrennt hatte, und also allerdings eine Änderung der Empfindung durch Nachbilder eintreten konnte. Ich habe hier, so viel ich weiß, die Trennung des successiven und simultanen Contrastes zuerst methodisch für alle Fälle durchzuführen gesucht und gefunden, daß in den Fällen, wo die inducirende Farbe nicht durch ihre Ausdehnung und Lichtstärke alle anderen überwiegt, das Auftreten der Contrastfarbe von Umständen abhängt, die nur durch die psychischen Thätigkeiten,
- 415 durch welche es zu Gesichtswahrnehmungen kommt, festgestellt werden. Wenn dem inducirten Felde körperliche Selbständigkeit zugeschrieben wird, kommt es unter der genannten Bedingung meist nicht zur Wahrnehmung der Contrastfarbe. Die Art der hierbei vorkommenden Täuschung des Urtheils habe ich schon oben bezeichnet. Es handelt sich immer um Fälle, wo eine gewisse Breite des Zweifels über die Art der inducirten Farbe besteht, weil ein genauer Vergleich derselben mit Weiß nicht ausführbar ist, und wo deshalb unser Wahrnehmungsvermögen durch Nebenumstände veranlaßt wird, die betreffende Farbe bald an die eine, bald an die andere Grenze des Intervalls zu verlegen, innerhalb dessen die Unsicherheit besteht. Denjenigen meiner Leser, welche den Einfluß der psychischen Thätigkeiten auf unsere Sinneswahrnehmungen noch wenig kennen, wird es vielleicht unglaublich vorkommen, daß durch psychische Thätigkeit eine Farbe im Gesichtsfelde erscheinen soll, wo keine ist; ich muß diese bitten, ihr Urtheil zu suspendiren, bis sie die Thatfachen des dritten Abschnittes dieses Werkes, der die Sinneswahrnehmungen behandeln wird, kennen gelernt haben, wo sie viele Beispiele ähnlicher Art finden werden. Es leitet uns der vorliegende Paragraph zur Lehre von den Gesichtswahrnehmungen schon hinüber. Ich habe ihn in der Lehre von den Empfindungen noch stehen lassen, weil der Contrast bisher immer dort seine Stelle fand, und die gewöhnlichsten Erscheinungen, die zu ihm gehören, gemischter Natur sind.

Da die meisten Contrasterscheinungen von der Breite der Unsicherheit in der Beurtheilung der Intensität und Qualität unserer Gesichtsempfindungen abhängig sind, so muß nothwendig Übung in der Beurtheilung der Farben einen beträchtlichen Einfluß auf das Eintreten des Contrastes haben. So wie ein in der Beurtheilung räumlicher Größen geübtes Auge sich vor manchen Täuschungen hüten wird, in die ein ungeübtes verfällt, wird es auch bei den Farbenbestimmungen geschehen, und ich glaube deshalb, daß geübte Augen den Contrast im Allgemeinen

weniger lebhaft sehen werden, als ungetübte. Meine Versuche wurden mir von Personen, die in optischen Beobachtungen erfahren waren, leicht bestätigt. Dagegen sind in manchen Büchern die Contrasterscheinungen so beschrieben, daß ich annehmen muß, sie seien manchen Beobachtern viel leichter sichtbar und viel häufiger als mir.

Während nun die Contrasterscheinungen bei begrenztem inducirendem Felde durch die Abhängigkeit der Färbung von anderen nur durch Beurtheilung festgestellten Umständen keinen Zweifel über ihre Deutung lassen, sind die Contraste bei unbegrenztem inducirendem Felde viel constanter, und würden deshalb eher die Deutung zulassen, daß sie durch Veränderungen der Empfindung selbst hervorgerufen seien. Indessen sind offenbar bei diesen letzteren die Bedingungen noch viel ungünstiger als bei den ersten, um die empfundene Farbe des inducirten Feldes sicher bestimmen zu können, weil eben die Vergleichung der Farbe dieses Feldes mit anderem Weiß ganz fehlt, oder wenigstens viel beschränkter ist. Außerdem zeigen die Contraste auf unbegrenztem inducirendem Felde, wenn sie auch constanter auftreten, doch in ihren Intensitätsverhältnissen eine vollständige Analogie mit denen des begrenzten Feldes. Es wird in allen diesen Fällen die Contrastfarbe in voller Intensität schon durch eine sehr kleine Intensität der inducirenden Farbe hervorgerufen, und durch Steigerung der letzteren nicht oder wenig verstärkt. Dagegen kann sie eine deutliche Verstärkung erleiden, sobald wirklich die Empfindung durch Nachbilder verändert wird. Sie wird endlich durch das Urtheil in voller Intensität festgehalten, sobald man alle anderen Farben aus dem Gesichtsfelde entfernt. Ich zweifle deshalb nicht, daß auch bei großem inducirendem Felde die Deutung der Erscheinungen die nämliche sein müsse, wie bei kleinem, daß auch hier die Contrastfarbe nur durch eine falsche Schätzung gesetzt sei, wenn ich auch in diesen 416 Fällen noch keinen so genügenden Beweis für diese Deutung liefern kann.

Die Contrasterscheinungen sind dem LEONARDO DA VINCI großentheils schon bekannt gewesen. Er sagt, daß unter allen Farben von gleicher Vollkommenheit jene die schönsten sind, welche neben den entgegengesetzten stehen, also Weiß neben Schwarz, Blau neben Gelb, Roth neben Grün.<sup>1</sup> Später waren es namentlich die farbigen Schatten, welche von allen anderen Contrasterscheinungen die Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. OTTO v. GUERICKE<sup>2</sup> kannte sie, und suchte sie zu benutzen, um den Aristotelischen Satz, daß Weiß und Schwarz gemischt Blau geben könnten, zu beweisen. Aber erst BURTON<sup>3</sup> lenkte die allgemeinere Aufmerksamkeit auf sie; er beobachtete sie indessen nur immer zufällig bei Sonnenaufgang oder Untergang, wo sie bald blau, bald grün waren. Abbé MAZEAS<sup>4</sup> erzeugte sie durch das Licht des Mondes und einer Kerze. Auch er glaubte die Farben aus einer Verminderung des Lichtes erklären zu können. Dagegen suchten MELVILLE<sup>5</sup> und BOUGUER<sup>6</sup> die Erscheinungen aus NEWTON's Farbentheorie zu erklären. Man hielt die Farben für objectiv, weil in der That die blauen Schatten, wenn sie von dem Lichte des blauen Himmels erleuchtet werden, objectiv blau gefärbt sind. Daß wirklich das blaue Licht des Himmels in vielen Fällen Grund der blauen Schatten ist, zeigte namentlich BEGUELIN.<sup>7</sup> RUMFORD<sup>8</sup> scheint zuerst die subjective Natur der Farbe

<sup>1</sup> LEONARDO DA VINCI, *Trattato della pittura*. 1651. Cap. CC. — Farbige Schatten in Cap. CLVI. und CCCXXVIII.

<sup>2</sup> GUERICKE, *Exper. Magdeb.* p. 142. 1672.

<sup>3</sup> BUFFON, *Mém. de l'Acad. de Paris*. 1748. p. 217.

<sup>4</sup> MAZEAS, *Abb. der Akad. zu Berlin*. 1752.

<sup>5</sup> MELVILLE, *Edinb. Essays*. Vol. II. p. 75. 1760.

<sup>6</sup> BOUGUER, *Traité d'Optique*. p. 368. 1760.

<sup>7</sup> BEGUELIN, *Mém. de l'Acad. de Berlin*. 1767. p. 27.

<sup>8</sup> RUMFORD, *Philos. Transact.* LXXXIV. 107; *Gren's neues Journal der Physik*. II. 68.

des einen Schattens entdeckt zu haben, indem er ihn durch ein enges Rohr betrachtete; derselben Ansicht schlossen sich GOETHE,<sup>1</sup> GROTHUSS,<sup>2</sup> BRANDES,<sup>3</sup> TOURTUAL<sup>4</sup> an. Dagegen stritten noch längere Zeit andere Beobachter für die objective Natur beider Schattenfarben, so v. PAULA SCHRANK,<sup>5</sup> der die Farbe des blauen Schattens der Diffraction zuschrieb, ZSCHOKKE,<sup>6</sup> OSANN<sup>7</sup> und POHLMANN,<sup>8</sup> welcher sich BEGUELIN's Ansicht wieder anschloß. Dagegen führte namentlich FECHNER<sup>9</sup> den Beweis von der subjectiven Natur dieser Erscheinungen, er wies unter anderem auch nach, wie durch eine Thätigkeit des Urtheils die einmal hervorgetretene Contrastfarbe festgehalten werden könne, und bereicherte die Zahl der Beobachtungen, doch wagte er noch keine Theorie dieser Erscheinungen aufzustellen. PLATEAU<sup>10</sup> zog die Contrasterscheinungen mit in seine Theorie der Nachbilder hinein; wie die Netzhaut der Zeit nach in entgegengesetzte Gegenstände überginge, sollte sie es auch der Fläche nach thun, so daß zunächst um die erregte Stelle die gleiche Phase stattfinde, welche sich in den Irradiationserscheinungen kund gebe, und in weiterer Entfernung die entgegengesetzte, welche den Contrast hervorrufe.

Die Ansicht, daß die Contrasterscheinungen sich durch Nachbilder erklärten, wurde schon von JURIN<sup>11</sup> vorgetragen, später von BRANDES. Sie war für einen Theil der Erscheinungen richtig, aber nicht für alle, und FECHNER namentlich zeigte, daß auch ohne vorhergehende Ermüdung der betreffenden Netzhautstelle Contrastfarben entstehen könnten.

### § 25. Verschiedene subjective Erscheinungen.

418 Es bleiben noch einige subjective Gesichterscheinungen zu beschreiben übrig, deren Erklärung für jetzt unmöglich oder wenigstens ziemlich zweifelhaft ist, und welche deshalb in die vorausgegangenen Paragraphen nicht eingereiht werden konnten.

1. Erscheinungen des gelben Flecks. Der gelbe Fleck bildet eine in vielen Beziehungen ausgezeichnete Stelle der Netzhaut. Die Eigenthümlichkeiten seiner anatomischen Structur sind auf S. 34—36 beschrieben. Ferner zeichnet er sich physiologisch aus durch die Schärfe in der Wahrnehmung kleiner Bilder, worin sein Centrum, die Netzhautgrube, alle anderen Stellen der Netzhaut bei weitem übertrifft. Dadurch erhält er auch seine Bedeutung als Fixationspunkt. Wie er im entoptischen Bilde sichtbar gemacht werden kann, ist schon im § 15 (S. 192—196) auseinandergesetzt; er zeichnet sich bei dieser Beobachtungsweise dadurch aus, daß die Gefäße in seinem Centrum fehlen, und außerdem durch den Schatten, den die seitlichen Abhänge der Netzhautgrube bei schiefer Beleuchtung werfen. Betreffs der Empfindungen dieser Netzhautstelle haben wir schon erwähnt, daß sie bei der elektrischen Durchströmung des Auges je nach der Strömungsrichtung bald dunkel auf hellem Grunde, bald hell auf dunklem Grunde sich

<sup>1</sup> GOETHE, *Farbenlehre*. S. 27.

<sup>2</sup> GROTHUSS, *Schweigger's Beiträge zur Chemie und Physik*. III. 14. 1811.

<sup>3</sup> BRANDES, *Gehler's neues Wörterbuch*. Art. Farbe. 1827.

<sup>4</sup> TOURTUAL, *Die Erscheinungen des Schattens*. Berlin 1880.

<sup>5</sup> v. PAULA SCHRANK, *Münchener Denkschr.* 1811 und 12. S. 293, und 1813. S. 5.

<sup>6</sup> ZSCHOKKE, *Unterhaltungsblätter für Natur- und Menschenkunde* 1826. S. 49.

<sup>7</sup> OSANN, *Pogg. Ann.* XXVII. 694. 1832; XXXVII. 287. 1836; XLII. 72.

<sup>8</sup> POHLMANN, *Ebenda*. XXXVII. 1836. 319—341.

<sup>9</sup> FECHNER, *Ebenda*. XLIV. 221. 1838. L. 483. 1840.

<sup>10</sup> PLATEAU, *Ann. de chim. et de phys.* LVIII. 389. 1834. *Pogg. Ann.* XXXII. 543; XXXVIII. 626. 1836.

<sup>11</sup> JURIN, *Essay on distinct and indistinct vision*. p. 170. 1738.

aß sie bei mäßig schnell intermittirendem Lichte sich  
gelbliche sternförmige Zeichnung in den schillernden  
Netzhaut hervorhebt.

Ich zu erwähnen, daß sie auch bei gleichmäßig aus-  
gleich blauer Beleuchtung sich eigenthümlich abzeichnet.  
In verschiedene Theile des gelben Flecks, nicht immer  
in verschiedenen Bedingungen verschieden deutlich. Das  
Flecks ist die Netzhautgrube, in deren Grunde die  
durchsichtig und ungefärbt ist. Ihr Durchmesser ist  
0,10 bis 0,225 mm. Ihr Abstand vom hinteren Knoten-  
15 mm, also im Mittel 75 mal so groß als ihr Durch-  
messbare Größe im Gesichtsfelde ist also ein Kreis, dessen  
10 Minuten beträgt. Sie erscheint, wenn sie sichtbar wird,  
als unbegrenzter regelmäßiger Kreis. Die Netzhautgrube  
ist ein dunkler Hof, dessen Größe ungefähr der gefäße- 419  
nen Flecks entspricht, wie sie erscheint, wenn man die  
sichtbar macht. Die äußere Begrenzung dieses Hofes,  
wenn man nennen wollen, ist verwaschen, sein Durchmesser  
größer als der der Netzhautgrube, beträgt also etwas über  
erscheint seine Grenze ziemlich kreisförmig, namentlich  
als ein Rhombus ähnlicher, dessen längere  
liegt. In letzterer Weise erscheint sie mir selbst  
im Licht. Es entspricht diese Stelle anatomisch dem  
gefärbten Theile des gelben Flecks, dessen horizon-  
tal H. MÜLLER in zwei Augen gleich 0,88 und 1,5 mm,  
1,53 und 0,8 gefunden wurde. Übrigens breitet sich  
hier viel weiter aus, ist aber schwach und verwaschen.  
Nur bei stärkerem Licht den dunklen gefäßlosen Hof  
mit dem hellen Hofe, dessen äußere Begrenzung sehr  
deutlich ist, und die mir selbst ebenfalls mehr rhombisch, als  
Ihre beiden Durchmesser sind etwa dreimal so groß,  
gefäßlosen Hofes. Ein anatomisch wohlbegrenztes  
läßt sich nicht bezeichnen. Die gelbliche verwaschene  
Theile des gelben Flecks fällt mit diesem hellen  
zusammen. Doch läßt sich über die Congruenz ihrer  
mit der Ausdehnung der schwachen gelben Färbung zu  
Zeichnungen zuläßt. Vielleicht verdankt dieser äußerste  
Ring auch nur einer Contrastwirkung, wir können ihn  
nicht, dem er kreisförmig erschien, den LOEWESCHEN

diesen Ring, indem er durch eine klare seladongrüne  
Ring nach einer hellen Fläche sah. Der Ring erschien

im Vergleich zu dem grünlichen Grunde violett, den mittleren dunkleren Hof umgebend, so daß ihn HAIDINGER mit einem Abbilde der Iris vergleicht, die die dunkle Pupille umgiebt. HAIDINGER zeigte, daß dichromatische Mittel zur Herstellung der Ringe nicht nöthig seien, daß sie im homogenen Blau des prismatischen Spectrum erscheinen, und auch in gemischtem Licht, welches genügend Blau enthält. In letzterem zeigen sie verschiedene Farbenunterschiede von dem übrigen Grunde, je nach der Beschaffenheit der dem Blau zugemischten Farben. Verschiedenen Augen scheint dieser Ring mit verschiedener Deutlichkeit zu erscheinen, so daß viele ihn überhaupt nicht sehen können. Ich selbst sehe ihn nur bei einer gewissen mittleren Helligkeit, derjenigen etwa, die mir zum Schreiben und Lesen bequem ist. Wenn ich vor die Augen ein blaues Glas halte, sie durch Verschluss der Lider eine Weile ausruhe und dann durch das Glas nach einer weißen Papierfläche sehe, erblicke ich deutlich den gefäßlosen Hof als einen rhombischen schattigen Fleck, umgeben von einem rhombischen, heller blauen Streifen, den LOEWESCHEN Ring. Bei etwas größerer und etwas kleinerer Helligkeit 420 erscheint mir der LOEWESCHE Ring schmaler, bei noch größeren Abweichungen der Helligkeit sehe ich nur den dunklen gefäßlosen Hof ohne helle Umsäumung.

Der dunkle gefäßlose Hof ist der constanteste Theil der Erscheinung. Sein Verhalten ist zuerst von MAXWELL<sup>1</sup> genauer untersucht worden. Wenn man homogenes Licht anwendet, erscheint er nach ihm nur im Blau, nicht in anderen Farben. Übrigens erscheint er auch in gemischten Farben, wenn sie Blau reichlich enthalten, namentlich auch, freilich schwach, im Weiße. Wenn man das ausgeruhte Auge nach einer blauen Fläche hinwendet, erscheint er und schwindet bald wieder, bei heller Beleuchtung schneller, als bei schwacher. MAXWELL empfiehlt, abwechselnd vor das Auge blaue und gelbe Gläser oder blaue und gelbe Papiere zu bringen. Im Blau erscheint der Fleck, im Gelb verschwindet er. Ich selbst sehe ihn am schönsten am Abendhimmel, wenn die ersten Sterne zu erscheinen anfangen, und man sich schon längere Zeit im Freien befindet, so daß die Augen hinreichend ausgeruht sind. Wenn man sie einige Augenblicke schließt und dann nach dem Himmel hin öffnet, sieht man den gefäßlosen Hof einige Zeit lang sehr deutlich, die Netzhautgrube in seinem Innern auch häufig, und zwar als einen etwas helleren Fleck von reinerem Blau, ziemlich scharf begrenzt. Dabei ist es eigenthümlich, daß, wie schon MAXWELL bemerkt hat, der Lichteindruck in den centralen Stellen der Netzhaut einen Moment später zur Empfindung kommt, als in den peripherischen Theilen. MAXWELL ließ zu dem Ende eine Reihe dunkler Streifen vor einem blauen Felde mit gewisser Geschwindigkeit vorbeigehen. Man sieht es aber auch beim einfachen Aufschlagen der Augen. Das Dunkel der geschlossenen Augen

<sup>1</sup> *Athenæum*. 1856. p. 1093. *Edinb. Journ.* (2) IV. 337. *Iast.* 1856. p. 424. *Rep. of British Association*. 1856. II. 12.

von der Peripherie des Gesichtsfeldes nach dem Centrum Rest desselben bleibt als der MAXWELLSche Fleck bei den Helligkeitsgraden, namentlich dem oben bezeichneten die ersten Sterne sichtbar werden, ist die Erscheinung der Augen noch complicirter. Während nämlich in der das Dunkel von der Peripherie nach dem Centrum auch noch entweder die Netzhautgrube allein, oder den Fleck hell aufblitzen. Vielleicht geht das helle den Erscheinung etwas voraus, aber die Zeit ist so kurz, r gleichzeitig eintritt, wie auch AUBERT an Nachbildern durch den elektrischen Funken ähnliches bemerkt hat. die Netzhautgrube recht deutlich erscheint, sehe ich in fe noch schwache Linienzeichnungen, ähnlich den Umtrigen Blume (z. B. einer Georgine, Dahlia). Es sind en derselben Zeichnung, welche deutlicher bei interzum Vorschein kommt.

aber regelmässiger und bestimmtere Art von Zeichnung " größeren Theil des Gesichtsfeldes einnahm, beschreibt hat sie mehrfach beim Aufwachen in einem halbdunklen or dem ersten Öffnen der Lider. Er sah dann das regelmässigen Sechsecken ausgefüllt, die durch breite einander abgegrenzt waren. Der Grund der Zeichnung und die von rechts oben nach links unten gerichteten ziemlich breiten gelben Saum. Jedes Sechseck enthielt erhalb seines Centrum stehendes schwarzes Pünktchen. von dem Fixationspunkt wurde die Zeichnung undeutlich. hmesser jedes Sechsecks wurde auf etwa 1° geschätzt. nentepithels der Netzhaut würden etwa nur unter 5' inen können. Ein Stück des mittleren, deutlichsten einung ist in *Fig. 3* auf *Taf. II* abgebildet.

ich noch bemerken, daß ich den MAXWELLSchen Fleck oft 420 nach dem Aufstehen, wenn ich das Auge zuerst auf ein iter lichter Fläche geheftet hatte, und es dann nach einem e, hell auf dunklem Grunde gesehen habe. Absichtlich 421 orzurufen, ist mir bis jetzt nicht gelungen. Es erscheint heller Kreis von der Gröfse des gefäfslosen Hofes, nach hattirt und mit Andeutungen der strahligen Zeichnung. inung läßt schliessen, daß, wenn das Auge recht erholt Lichteindruck im gelben Fleck länger anhält, als in den Netzhaut, während andererseits der Lichteindruck an h später zu beginnen scheint, wie die beschriebenen Öffnen des Auges zeigen. Daß der stark gefärbte

ine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. *Graefes*



Theil des gelben Flecks auf einem blauen Felde dunkel erscheint, scheint der Absorption des blauen Lichts durch das gelbe Pigment zugeschrieben werden zu dürfen. Gelb gefärbt sind hier gerade die Theile, welche vor den eigentlich lichtempfindlichen Theilen, den Zapfen, liegen. Dafs der Fleck übrigens subjectiv nur schwach gezeichnet und schnell vorübergehend erscheint, erklärt sich in derselben Weise, wie das flüchtige Erscheinen der Gefäfsfigur. Das zuweilen vorkommende helle Aufblitzen des gelben Flecks dagegen beim Öffnen des Auges läfst sich noch nicht erklären.

Wie bisher beschrieben, verhalten sich die Erscheinungen im nicht polarisirten Lichte. Wenn man dagegen das Auge auf ein Feld richtet, von wo polarisirtes Licht kommt, so erscheinen HAIDINGERS Polarisationsbüschel im Fixationspunkte. Man sieht diese z. B., wenn man durch ein NICOLSches Prisma nach einem gut beleuchteten weissen Papierblatte oder nach einer hellen Wolkenfläche blickt. Die Büschel sind auf *Taf. II, Fig. 4* abgebildet, wie sie liegen, wenn die Polarisationsebene des Lichtes vertical ist. Die helleren durch zwei zusammengehörige Hyperbeln begrenzten Flecke erscheinen auf weissem Felde bläulich, der dunkle Büschel, der sie trennt und, im Centrum am schmalsten, nach seinen Enden hin breiter ist, ist dagegen gelblich gefärbt. Wenn man das NICOLSche Prisma dreht, dreht sich die Polarisationsfigur um den gleichen Winkel. Nach einer Bemerkung von BREWSTER, die ich für mein Auge bestätigen kann, ist der dunkle Büschel in seiner Mitte viel schmaler, wenn er horizontal (d. h. der Verbindungslinie beider Augen parallel) gerichtet ist, als wenn er senkrecht steht, wie in der Abbildung. Die Fläche, welche von der Polarisationsfigur bedeckt wird, erscheint MAXWELLS und meinem Auge an Gröfse dem gefäfslosen Hofe des gelben Flecks gleich. Der Rand der Netzhautgrube geht ungefähr durch die hellsten Stellen der blauen Flächen hindurch. BREWSTER giebt den Durchmesser der Polarisationsbüschel etwas gröfser an, nämlich  $4^\circ$ , und SILBERMANN  $5^\circ$ , was vielleicht damit zusammenhängt, dafs sie in verschiedenen Augen sehr verschiedene Deutlichkeit zu haben scheinen, und deshalb die schwächsten Teile der Figur am äufsersten Rande von einigen wahrgenommen werden, von anderen nicht. Ich selbst habe unmittelbar nach HAIDINGERS Entdeckung mit der gröfsten Mühe nichts von den Büscheln wahrnehmen können, und 12 Jahre später, als ich es wieder versuchte, sah ich sie beim ersten Blick durch ein NICOLSches Prisma. Auch ist in meinem linken Auge die Mitte des dunklen Büschels viel dunkler, als im rechten. Daran ist vielleicht die veränderliche Färbung des gelben Flecks 422 Schuld. Wenn man sie übrigens sieht, so schwinden sie doch immer bald wieder, wie jede subjective Erscheinung, die an eine Structur der Netzhaut gebunden ist. Sie treten dann neu hervor, wenn man den Polarisator um  $90^\circ$  dreht.

Individuen, welche die Büschel recht deutlich wahrnehmen, sehen sie auch in solchem Lichte, welches nur theilweise polarisirt ist, auf glänzenden Flächen, am Himmel u. s. w., und sind dadurch im Stande, überall gleich die

ionsebene zu erkennen. Von den verschiedenen Farben  
gt aber, wie STOKES gefunden hat, nur das Blau die  
In den weniger brechbaren Theilen des Spectrum  
Erscheinung. In einem blauen Felde erscheinen die  
ichen hell, der gelbe Büschel dazwischen dagegen  
man durch ein stark gefärbtes blaues Glas und den  
weißen Fläche blickt. Ich selbst sehe die Büschel  
mogenem Grün, Gelb, Roth, sondern auch nicht einmal  
er ziemlich gesättigten Abstufungen dieser Farbtöne,  
geben. Es folgt daraus, daß auch im weißen Licht  
en Veränderungen des Blau herrührt. Am Orte der  
as Blau, und diese erscheinen eben deshalb gelb und

1 Refraction, Reflexion oder Doppelbrechung polarisirt  
omtliche Farben nahehin gleichmäßig von der Polari-  
bei der Absorption farbigen Lichts in doppeltbrechenden  
ommen, daß das Licht gewisser Farben polarisirt wird,  
den dagegen nicht. Das bekannteste Beispiel solcher  
nalin, welcher so häufig als Mittel, Licht zu polarisiren,  
st diese Eigenschaft übrigens unter den doppelt-  
körpern sehr verbreitet, man kann sie durch Färbung  
zeugen, und sie beruht darauf, daß bald wie im  
ie, bald wie im Rutil und Zinnstein der außerordent-  
sorbirt wird. Nun sind aber die meisten organischen  
n schwach doppeltbrechend, und zwar verhalten sich  
ge Krystalle, deren Axe in den Fasern parallel ihrer  
en senkrecht zu ihrer Fläche steht. Die Erscheinung  
ist nun zu erklären, wenn man annimmt, daß die  
des gelben Flecks schwach doppeltbrechend sind, und  
he Strahl von blauer Farbe in ihnen stärker absorbirt  
he Strahl.

von beliebiger Polarisation durch eine Fasermasse  
in Richtung der Fasern, so wird es stark absorbirt;  
cht gegen die Richtung der Fasern hindurch, so wird  
n, wenn es parallel den Fasern polarisirt ist, schwach  
olarisationsrichtung ebenfalls senkrecht zur Richtung  
erlaufen im gelben Fleck die sogenannten radiären  
welche an anderen Stellen der Netzhaut senkrecht  
en, schräg, indem ihr hinteres Ende sich der Netz-  
der Centralgrube fehlen die Körnerschichten und die 423  
ntweder ganz, oder sind wenigstens sehr dünn, da-

gegen ist die innere Körnerschicht und die Zwischenkörnerschicht in der Umgebung der Netzhautgrube dicker als an anderen Stellen; ähnlich verhält sich die Schicht der Ganglienzellen, obgleich diese auch in der Centralgrube doch noch 3 Reihen Zellen hinter einander enthält, so daß es scheint, als ob die zu den Zapfen der Centralgrube gehörigen anderen Elemente in der Umgebung dieser Grube angehäuften und deshalb die Verbindungsfasern sowohl nervöser als bindegewebiger Natur schräg verlaufen müssen. An dem Rande der Netzhautgrube nun, wo die Fasern überwiegend eine schräg gegen ihr Centrum verlaufende Richtung haben, würde nach der gemachten Annahme das Licht stärker dort absorbirt werden, wo die Fasern der Polarisationsebene parallel laufen. Ist letztere vertical, so werden also über und unter der Netzhautgrube sich dunklere Stellen bilden, rechts und links hellere. Ebenso würden die Stellen dunkler werden müssen, wo die Fasern nicht mehr schräg gegen die Fläche der Netzhaut liegen, also im Centrum der Grube selbst, und nach dem äußeren Rande des gelben Flecks hin. In der That entspricht die Erscheinung der Polarisationsbüschel diesen Folgerungen.

Man hat noch andere Ansichten über die Entstehung der Polarisationsbüschel aufgestellt. Unter diesen ist namentlich die von ERLACH angedeutete, von JAMIN specieller ausgeführte, ziemlich günstig aufgenommen worden. Beide meinten, die Büschel herleiten zu können von den vielfachen Refractionen, die das Licht an den brechenden Flächen des Auges erleidet. In der That würde senkrecht polarisirtes Licht, welches von oben oder unten her in das Auge dringt, stärker reflectirt und weniger eingelassen werden, als solches, welches von rechts oder links her kommt, und demnach müßte der obere und untere Quadrant des Gesichtsfeldes etwas dunkler erscheinen, als der rechte und linke. Aber wenn Polarisation durch Refraction der Grund wäre, müßten erstens die Büschel in allen homogenen Farben nahehin gleich deutlich erscheinen, während sie dies nur im Blau thun. Zweitens müßten sie nach den Rändern des Gesichtsfeldes hin continuirlich an Stärke zunehmen. Im Gegentheil sind sie auf einen sehr kleinen centralen Theil beschränkt. Drittens müßte ihr Centrum im Axenpunkte des Auges liegen, nicht im Fixationspunkte, der von jenem, wie es scheint, in allen Augen verschieden ist. Es haben auch schon STOKES, BREWSTER und MAXWELL auf das Ungenügende dieser Erklärung aufmerksam gemacht, und die beiden letzteren haben bemerkt, daß die Ausdehnung der Büschel mit der des gelben Flecks übereinkomme. Allerlei andere, aber nicht klar durchgeführte Erklärungen sind auch von HAIDINGER und SILBERMANN gegeben.

HAIDINGER beschreibt im blauen Felde, wo man die LOEWESchen Ringe sieht, auch noch helle Andreaskreuzlinien, über die noch keine Beobachtungen von anderen Augen vorliegen. Ich selbst kann sie nicht sehen.

- 424 2. Helle bewegliche Punkte erscheinen im Gesichtsfelde, wenn man, namentlich während angestregten Gehens oder anderer Leibesbewegung, eine große gleichmäßig erleuchtete Fläche, z. B. den Himmel oder Schneefelder, starr ansieht. Die Pünktchen springen an verschiedenen Orten des Gesichtsfeldes auf und laufen in sehr verschiedenen, meist nicht ganz geraden Bahnen ziemlich schnell fort. Dabei erscheinen auf dem Wege, den eines eingeschlagen hat, nach kurzen Zwischenzeiten neue, die auf demselben Wege

bemerkt, daß, wenn man nach einer begrenzten lichten in Fenster, schaut, jeder Punkt auf der von der Mitte brten Seite ein kleines Schattenbild nach sich zieht. zuhalten scheinen, sind sie von manchen Beobachtern Erscheinung des Blutlaufs gehalten worden. Sie sind einem Auge, viel zu vereinzelt, als daß man sie für könnte, ihre Bahnen ebenfalls viel zu weit von ihre Bewegung zu schnell, als daß ihre Wege einem n könnten. Wenn ihre Erscheinung wirklich mit dem gt, könnte man höchstens daran denken, daß einzelneymphkörperchen, die durch größere Gefäßstämmchen nder Art zeigen. Diese Erscheinung scheint übrigens chen leicht gesehen zu werden.

n sind übrigens eben noch groß genug, um, wenn sie befinden und auf diese einen Eindruck machen, noch r Durchmesser beträgt im Mittel 0,0072 mm, und die rkennbaren Distanzen ist 0,005 mm (siehe S. 256). Verhaben denn auch Reihen von fortlaufenden Kügelchen 425 ullende und fließende Bewegungen bei verschiedenen n. Die eigenthümliche Erscheinung in einander vern, welche bei intermittirendem Lichte eintritt und von lutlauf der Aderhaut bezogen wird, ist schon oben eht man übrigens auch zuweilen ohne intermittirendes ne helle Fläche hineinstarrt, besonders nachdem man nach dem Kopf getrieben hat. Sobald durch den Lichtso weit ermüdet ist, daß die Fläche dunkel wird, nter der hellen Fläche, welche verschwindet, eine iche, deren Flecken bald bewegt, bald ruhig sind. ügelchen haben STEINBUCH und PURKINJE,<sup>1</sup> namentlich auf das Auge, gesehn. Letzterer sah sie zuerst bei len Accommodationsfigur, welche bei ihm aus einem se, umgeben von einem bräunlichen, unbestimmt bel. Rechts und links neben dem weißen Kreise sah chte Linien, in denen sich Reihen von Kügelchen rts, links aufwärts. Ich habe bis jetzt nichts ÄhnJOHANNES MÜLLER<sup>2</sup> sah bei Congestionen nach dem ich gebückt hatte und sich plötzlich aufrichtete, ein rie von dunklen geschwänzten Körpern in den mannigund vergleicht diese Erscheinung mit dem Ameisenrven. von kleinen bewegten Körpern sehe ich auch zuweilen

<sup>1</sup> und Versuche. I. 127.  
<sup>2</sup> ologie. II. 390.

vor einer mit grobem Kalk beworfenen und sehr schief durch ein kleines Fenster beleuchteten Wand, die daher mit einer Menge kleiner schwarzer unregelmäßiger Punkte übersät erscheint. Aber hier könnten es vielleicht Nachbilder der Pünktchen sein, welche durch unvermeidliche kleine Schwankungen des Auges aufblitzen.

PURKINJE beschreibt noch andere Erscheinungen; die bei Aufregung des Gefäßsystems oder Anstrengung der Augen eintreten. Seine Beschreibung lautet:<sup>1</sup> „Wenn ich bei hellem Tage eine viertel bis halbe Stunde im Freien stark gegangen bin, und ich trete plötzlich in einen finsternen oder wenigstens stark verdunkelten Raum, so wallt und flackert im Gesichtsfelde ein mattes Licht, gleich der auf einer horizontalen Fläche verlöschenden Flamme von ausgegossenem Weingeiste, oder gleich einer im Finstern schwach flimmernden, mit Phosphor bestrichenen Stelle. Bei schärferer Betrachtung bemerke ich, daß der flackernde Nebel aus unzählbaren, äußerst kleinen, unregelmäßig lichten Pünktchen besteht, die sich in verschiedenen Linien unter einander bewegen, sich bald da, bald dort anhäufen, unbestimmt begrenzte Flecke bilden, die sich wieder zertheilen, um sich anderwärts zu versammeln. Jeder Punkt läßt eine lichte Spur seiner Bewegung hinter sich, welche Spuren, sich mannigfaltig durchschneidend, Netze und Sternchen bilden; 426 so wimmelt es eine große Strecke im Innern des Gesichtsfeldes und hindert das deutliche Sehen. Am ähnlichsten dieser Erscheinung ist das Gewimmel der sogenannten Sonnenstäubchen.“

Er sieht dasselbe bei bedecktem rechten Auge, wenn er mit dem schwach- und fersichtigen linken eine helle Fläche fixirt, ferner bei allmähig verstärktem Druck auf das linke Auge. Die Pünktchen erscheinen lebhafter bei offenem als bei geschlossenem Auge, besonders wenn dasselbe nach einer nicht gänzlich verdunkelten entfernten Stelle hinsieht. Das äußere Licht ist also der Erscheinung förderlich.

Pulsirende Kugeln, zwei an der rechten Seite des Gesichtsfeldes, eine Reihe an der unteren, drei an der linken Seite, erscheinen ihm auf der hellen Himmelsfläche, wenn er gelaufen ist, bei Druck auf das Auge oder bei angestrengtem Husten. Auch pulsirt der Fixationspunkt, und es erscheinen noch graue Streifen, theils kreisförmig den Fixationspunkt umgebend, theils radiale Gefäßstreifen.<sup>2</sup>

3. Figuren, die beigleichmäßig erleuchteter Netzhaut sichtbar werden. PURKINJE<sup>3</sup> bemerkt, daß, wenn er nach einer großen etwas blendenden Fläche starr hinsieht (z. B. auf den gleichmäßig mit Wolken überzogenen Himmel oder in eine ganz nahestehende Kerzenflamme), in einigen Secunden wiederholt in der Mitte des Gesichtsfeldes lichte Punkte aufspringen, die, ohne ihre Stelle geändert zu haben, schnell wieder verschwinden und schwarze Punkte zurücklassen, die ebenso schnell wieder vergehen. Wendete

<sup>1</sup> PURKINJE, *Beobachtungen und Versuche*. I. 63.

<sup>2</sup> Ebenda I. 134.

<sup>3</sup> Ebenda I. 67.

htpunkte hervorspringen, das Auge gegen eine stark ver-  
er schloß er es, so setzte sich die Erscheinung auf  
nur in einem gemilderten Lichte, als würden durch das  
Punkte nur entzündet und glimmten dann für sich allein  
e ebenfalls häufig solche vereinzelte lichte Punkte, die  
n konnten, weil entsprechende kleine helle Gegenstände  
lten, die dunkle Nachbilder hätten zurücklassen können,  
er meist nur einen auf ein Mal, und im Ganzen selten

erner PURKINJES Kreuzspinnengewebefigur,<sup>1</sup> aus lichten röth-  
em Grunde gebildet, die das Gewebe einer Kreuzspinne bald  
icirter nachbildete. Um die Figur gut zu sehen, hatte  
agert, daß die Strahlen der aufgehenden Sonne seine Augen-  
Beim Erwachen sah er hinter den geschlossenen Lidern

Werk von PURKINJE außerordentlich reich an subjectiven  
er Art und wird noch lange eine Hauptfundgrube für ähn-  
leiben. Aber viele von den Erscheinungen, die er beschreibt,  
gen noch nicht wieder aufgefunden worden, und für diese  
fraglich, ob sie nicht auf individuellen Eigenthümlichkeiten  
l.<sup>2</sup>

gen und Versuche II. 87.

scheinungen in No. XXII des ersten, in No. IV, V, XV des zweiten  
und Versuche.



## **Dritter Abschnitt.**

### **Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen.**

#### **§ 26. Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen.**

427 Wir benutzen die Empfindungen, welche Licht in unserem Sehnerven-apparate erregt, um uns aus ihnen Vorstellungen über die Existenz, die Form und die Lage äußerer Objecte zu bilden. Dergleichen Vorstellungen nennen wir Gesichtswahrnehmungen. Wir haben in diesem dritten Abschnitte der physiologischen Optik auseinanderzusetzen, was sich bisher über die Bedingungen, unter denen Gesichtswahrnehmungen zu Stande kommen, auf naturwissenschaftlichem Wege ermitteln liefs.

" Diese Untersuchung tritt nothwendig zum Theil in das Gebiet der Psychologie ein, eben weil sie sich mit der Entstehung und dem Bewustwerden von Vorstellungen zu beschäftigen hat. Wie schwierig auch nur eine klare Fragestellung, geschweige denn eine Entscheidung in diesem Gebiete ist, wo wir hauptsächlich auf Selbstbeobachtung unserer Seelenvorgänge angewiesen sind, ist allgemein bekannt. Doch bleibt der physikalisch-physiologischen Untersuchung auch hier ein weites Feld der Arbeit, insofern nämlich festgestellt werden muß und auf naturwissenschaftlichem Wege auch festgestellt werden kann, welche besonderen Eigenthümlichkeiten der physikalischen Erregungsmittel und der physiologischen Erregung Veranlassung geben zur Ausbildung dieser oder jener besonderen Vorstellung über die Art der wahrgenommenen äußeren Objecte. Wir werden also in dem vorliegenden Abschnitte zu untersuchen haben, an welche besonderen Eigenthümlichkeiten der Netzhautbilder, der Muskelgefühle u. s. w. sich die Wahrnehmung einer bestimmten Lage des gesehenen Objects in Bezug auf Richtung und Entfernung anknüpft, von welchen Besonderheiten der Bilder die Wahrnehmung einer nach drei Richtungen ausgedehnten körperlichen Form des Objects abhängt, unter welchen Umständen es, mit beiden Augen gesehen, einfach oder doppelt erscheint u. s. w. Unser Zweck ist also hierbei wesentlich nur das Empfindungsmaterial, welches zur Bildung von Vorstellungen Veranlassung giebt, in denjenigen Beziehungen zu untersuchen, welche für die daraus hergeleiteten Wahrnehmungen wichtig sind. Dieses Geschäft kann ganz nach naturwissenschaftlichen Methoden ausgeführt werden. Wir

vermeiden können, auch von psychischen Thätigkeiten und den, so weit sie bei der sinnlichen Wahrnehmung in Betracht kommen, aber wir werden die Ermittlung und Beschreibung dieser Thätigkeiten nicht als einen wesentlichen Theil unserer Wissenschaft betrachten, weil wir dabei den Boden sicherer Thatfachen allgemein anerkannte und klare Principien gegründeten Festhalten können. So glaube ich wenigstens vor der Abgrenzung des psychologischen Theils der Physiologie der Psychologie abgrenzen zu müssen, deren wesentliches die Gesetze und Natur der Seelenthätigkeiten, so weit sie festzustellen.

Der Charakter dieser Schwierigkeiten, mit denen die Psychologie konfrontirt ist, scheint mir zunächst darin zu liegen, daß die Art und Weise der Vorgänge in unserem Seelenleben wahrnehmen, gänzlich verschieden von allen Wahrnehmungen, die sich auf äußere Objecte beziehen, ist. Die Qualitäten der darauf bezüglichen Empfindungen gar keine Analogie mit den der äußeren Sinne haben, mit diesen also gar keine Vergleichung, keine Beziehung der Ähnlichkeit zulassen. Dadurch wird die Analogie zwischen beiderlei Klassen von Wahrnehmungen außer Verhältnis ist durchaus treffend bezeichnet worden, indem man die Zustände der Seelenzustände, darunter auch die der Thätigkeit des Vorstellens, einem besonderen Sinne zuschrieb, dem des inneren Anschauung KANTS. Wie die Qualitäten des Auges, Ohres, Tastgefühles unter einander so gänzlich verschieden sind, als man zwischen denen verschiedener Sinne gar keine Vergleichung auf Qualität oder Intensität anstellen kann, so verhält man sich zu Wahrnehmungen von Seelenzuständen mit solchen nicht vergleichen wollte.

Es ist noch der weitere Unterschied, daß die Wahrnehmungen des inneren Sinnes sich wenigstens zum großen Theil auf gemeinbare beziehen, die in bestimmter räumlicher Ordnung neben einander da sind, daß wir jedenfalls schließlich durch Erfahrung lernen, was von der Möglichkeit angeborenen Verständnisses solcher gleichartigen Raumverhältnisse im einen oder anderen Sinne. Die Wahrnehmungen des inneren Sinnes lehren uns die Wahrnehmungen des inneren Sinnes einer lokalen Verschiedenheit oder einem Ortswechsel zu erkennen. Höchstens lassen physiologische Versuche Erfahrungen und gelegentliche Steigerungen der Gehirnthaten Erregungen und Ermüdungen dieses Organs uns Seelenthätigkeiten an die normale Leistungsfähigkeit des inneren Sinnes denken, und daß dieselben also auch örtlich diesem Organe entsprechen, daß wir den Objecten, die wir durch die äußeren Sinne wahrnehmen, im äußeren, unseren Kopf umgebenden Raume sind.

Jedenfalls erscheinen uns niemals gleichzeitig vorhandene Acte des Bewußtseins, so weit solche etwa sollten vorkommen können, als neben einander an verschiedene Orte gebunden, sondern immer nur als gleichzeitig bestehend oder höchstens als schnell mit einander wechselnd. Diese Unabhängigkeit von allen örtlichen Unterschieden, wenigstens so weit solche wahrgenommen werden können, bildet einen tiefgreifenden Unterschied gegen alle Erscheinungen der Körperwelt.

Dagegen ordnen sich in der That auch die Wahrnehmungen des innern Sinnes, ebenso wie die der äußeren Sinne, jede in einen bestimmten Augenblick der Zeitreihe ein. Es geschieht dies durch eine fortdauernde Thätigkeit des Gedächtnisses. Wir haben in jedem Augenblick unseres wachen Lebens außer dem Bewußtsein unseres gegenwärtigen Seelenzustandes noch Erinnerungen an die nächst vorausgegangenen im Bewußtsein und sind uns auch deutlich der Verschiedenheit dieser beiden Arten von Zuständen, der gegenwärtigen Wahrnehmung und der Erinnerung, bewußt, so daß wir sie sicher unterscheiden. So lange sie uns überhaupt im Gedächtniß stehen bleiben, bleibt auch die Erinnerung an ihre Zeitfolge. Auf diese Weise erhält durch die beschriebene Thätigkeit unseres Gedächtnisses jeder neu eintretende Act unseres Bewußtseins nothwendig von vorn herein seine Stelle in der Zeitreihe nach dem schon Erlebten, vor dem erst noch zu Erlebenden angewiesen.

Durch diese Einordnung in die Zeitreihe wird nun auch die Möglichkeit gegeben, regelmäßige Wiederholungen solcher Zeitfolgen von gleichartigen Wahrnehmungen als solche zu beobachten und wiederzuerkennen. Im Allgemeinen werden die Fälle selten sein, wo die Wiederholung der ursprünglichen Wahrnehmung ganz in derselben Weise ein zweites oder drittes Mal wieder vor sich geht, wie sie das erste Mal erfolgt ist, weil unsere Perceptionen, wie wir bald erfahren, durch willkürliche Bewegungen unserer Glieder und Änderung der Beobachtungsweise ebenfalls geändert werden, selbst wenn der Zustand der Außenwelt ungeändert geblieben ist. Ob letzteres der Fall ist, davon können wir uns in jedem beliebigen Augenblick durch Rückkehr in die frühere Innervation unserer Muskeln überzeugen. Dadurch wird allerdings die Auffindung der Gesetzmäßigkeit in der Zeitfolge der von uns beobachteten Ereignisse außerordentlich viel verwickelter gemacht.

Erst nachdem wir die Änderungen in der Erscheinungsweise der uns umgebenden Objecte, die durch unsere willkürlichen Handlungen und Bewegungen hervorgerufen werden, und ihre Abhängigkeit von unseren verschiedenen Willensimpulsen vollständig kennen gelernt haben, können wir hoffen, sicher zu erkennen, daß die genügenden Vorbedingungen für den Eintritt einer bestimmten zu erwartenden Folge gegeben sind, und andererseits den Eintritt oder das Ausbleiben dieser Folge selbst durch die entsprechenden Sinneseindrücke festzustellen.

Die Schwierigkeiten und Verwickelungen dieser Aufgaben kennen wir sehr wohl aus allen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, wo wir

ist Bestehende, herauszulösen haben aus seinen ver-  
 ingensweisen. Das wichtigste Mittel, diese Aufgabe zu  
 en in der Willkürlichkeit unserer Bewegungen, mittels  
 uns beliebigen Augenblick bei der Rückkehr in die  
 weise constatiren können, ob der frühere Eindruck voll-  
 oder ob er geändert ist. Wenn diese Rückkehr in  
 gen Augenblick unverändert stattfindet, schliessen wir  
 hen eines unveränderten Objects und betrachten die  
 timmte Willensimpulse eingetretenen Veränderungen als  
 reinungsweise, deren Abhängigkeit von den wechselnden  
 bei kennen zu lernen Gelegenheit haben.

sprochenen Regelmäßigkeiten in der Zeitfolge von ver-  
 1 unseres Bewusstseins können bei hinreichend häufiger  
 Wiederholung gleichartiger Beobachtungen der Ver-  
 Induction unterliegen und so die Bedeutung allgemeiner  
 ls Grundlage weiterer Schlüsse benutzt werden können.  
 rzeugung von der Allgemeingültigkeit solcher inductiv  
 ungen zu können, wird verlangt werden müssen, daß  
 agen der betreffenden Vorgänge fein und mannigfaltig  
 ihnen alle diejenigen Unterschiede des objectiven Be-  
 en zu können, welche ihren Einfluß durch Abänderung  
 tend zu machen im Stande sind. Wo die Feinheit der  
 ausreicht, würden wir natürlich nicht begreifen können,  
 1, die uns anscheinend vollkommen gleich erscheinen,  
 2 Folgen entwickeln. An solchen Fällen würde unser  
 Gesetz zurückzuführen oder sie zu begreifen, scheitern

hat die beiden Grenzen, an denen die Wahrnehmungen  
 sich an Erregungen des Nervensystems anschließen,  
 heit und Reichthum ihres Empfindungsumfanges aus-  
 inen Seite haben wir die ungeheuere Mannigfaltigkeit  
 2 nicht nur in den fünf verschiedenen Sinnen einen  
 ichthum von Qualitätsunterschieden entwickeln, sondern  
 ie ebenso unabsehbaren Mannigfaltigkeiten der räum-  
 Farben und Helligkeiten im Gesichtsfelde und der  
 musikalischer Töne. Indem diese Eindrücke in das  
 en, d. h. percipirt werden, bleibt ihre ganze Mannig-  
 bestehen, jedes Bild im Sehfelde bleibt unterscheidbar  
 ede Stelle darin kann unabhängig von jeder anderen  
 it werden und mit ihrem früheren Aussehen verglichen  
 st auch das Bestreben der physiologischen Optik, die  
 h denen die Gesichtswahrnehmungen von den Nerven-  
 ein verhältnißmäßsig sehr erfolgreiches und frucht-

Ebenso reich und sicher ist andererseits bei einem erwachsenen gesunden Menschen die Kenntniss der Innervationen, die er seinen motorischen Nerven geben muß, um irgend eine beabsichtigte Stellung seiner Glieder oder Richtung seines Blicks hervorzubringen. Wir werden später sehen, daß als Absicht einem solchen Willensimpulse der Regel nach die lebhafte Vorstellung von derjenigen unmittelbar wahrnehmbaren Veränderung seiner Glieder oder Organe zu Grunde liegt, welche er hervorrufen will. Es ist dies durchaus nicht immer die Kenntniss der Mittel, die er zu diesem Zwecke in Anwendung setzen muß, nicht einmal immer eine deutliche Vorstellung der Bewegungen und Stellungen der Körperteile, welche er brauchen muß. So z. B. beim Kehlkopf, wenn wir singen oder sprechen wollen, beim Auge, wenn wir ein Object betrachten, dafür accommodiren wollen, weiß der ununterrichtete Mensch nichts von der Stellung seiner Organe.

Ganz anders verhält es sich mit den zwischen diesen beiden äußersten Grenzen des Gebiets liegenden rein seelischen Veränderungen, den Vorgängen, die wir als Wünsche, Begehren, Absichten, Willensacte bezeichnen, so wie mit dem Auftauchen und Verschwinden der Vorstellungen, Phantasien und Erinnerungen in unserem Gedächtniss. So weit sie sich auf ein bestimmtes vorstellbares Ziel richten, lassen sie sich individuell bezeichnen. Aber meist sind sie schwankend, veränderlich, unbestimmt und bringen kein Maß für ihre Intensität mit sich, so daß die Kraft, mit der sie sich gegenseitig begünstigen oder hindern, nicht zu bestimmen oder abzuwägen ist. Daher kann auch kaum von einem Verständniss einer Gesetzmäßigkeit in ihrem Wechsel und der Richtung ihrer Entwicklung die Rede sein.

Nur ein Thema, was hierher gehört, wird uns noch beschäftigen, nämlich die Thätigkeit des Gedächtnisses; diese ist aber größtentheils unbewußt.

Ich habe vorher erwähnt, welches Gewicht die inductive Verallgemeinerung unserer Erfahrungen über die willkürlichen Veränderungen unserer Beobachtungsweise von Objecten der Außenwelt dadurch gewinnt, daß diese Beobachtungen in jedem uns beliebigen Moment erfolgen können. In der That erscheint uns der Moment beliebig und nur durch unseren Willensentschluß bestimmt. Welche verborgenen Gründe aber in diesem Moment den Entschluß hervorgerufen haben, wissen wir selbst nicht. Darauf kommt es in diesem Falle auch nicht an. Denn selbst, wenn solche existirt und den Entschluß beeinflusst hätten, so wäre der entscheidende Anstoß doch immer nur durch Vorgänge unseres Bewußtseins gegeben worden, so daß also die Kette der Ursachen durch dieses hindurchgelaufen ist und ein unmittelbar durch innere Anschauung beobachtetes Glied in derselben besteht und sie zusammenhält.

Wir kennen in diesem Fall schon den angewandten Willensimpuls als ein Ereigniß, welches bestimmte Folgen in der Außenwelt erfahrungsgemäß nach sich zieht, und wissen andererseits ebenso erfahrungsgemäß, daß, wenn wir den Willensimpuls nicht geben, sondern ihn im Stadium des Wunsches

1 Absicht beharren lassen, auch die entsprechenden  
velt ausbleiben.

ch zu reden von der Art, wie unsere Vorstellungen und 447  
inductive Schlüsse gebildet werden. Das Wesen unserer  
esten auseinandergesetzt in der Logik von STUART MILL.  
des Schlusses nicht ein Gebot ist, welches durch fremde  
ndeln oder Glauben aufgestellt ist, sondern ein Satz, der  
it bezieht und also nur das Resultat der Erfahrung sein  
Schluß in der That nichts Neues, was wir nicht schon  
ihn machten. Also z. B.

Menschen sind sterblich.

s ist ein Mensch.

Cajus ist sterblich.

e Menschen sterblich sind, welches ein Erfahrungssatz ist,  
it aufstellen, ehe wir nicht wissen, ob die Conclusio richtig  
ein Mensch ist, gestorben sei oder sterben werde. Wir  
tzes sicher sein, ehe wir noch den Major, durch welchen  
aufstellen können. Das scheint freilich ein Herumgehen  
ihre Verhältniß ist offenbar das: Wir und andere Menschen  
s beobachtet, daß kein Mensch über ein gewisses Alter  
Beobachtenden haben diese Erfahrungen, daß Lucius,  
zeln Menschen sonst hießen, von denen sie es wissen,  
allgemeinen Satz zusammengefaßt, daß alle Menschen  
berechtigt gefühlt, weil dieses Ende in allen den Fällen  
e beobachtet worden sind, diesen allgemeinen Satz auch  
alle diejenigen Fälle, welche noch später zur Beobachtung  
bewahren wir uns den Schatz von Erfahrungen, den  
er in diesem Punkte bisher gemacht haben, in Form des  
lächtnisse auf, der den Major des obigen Schlusses bildet.  
afs wir zu der Überzeugung, Cajus werde sterben, auch 448  
rem Bewußtsein den allgemeinen Satz zu bilden, hätten  
wir seinen Fall mit allen uns bekannten früheren ver-  
t sogar die gewöhnlichere und ursprünglichere Art, durch  
Dafs dergleichen Schlüsse ohne bewußte Reflexion ent-  
Gedächtnisse das Gleichartige der früher beobachteten  
t und sich gegenseitig verstärkt, zeigt sich namentlich in  
uctivem Schließen, wo es uns nicht gelingt, eine aus-  
it genau bestimmten Grenzen ihrer Gültigkeit aus den  
bstrahiren, wie das der Fall ist bei allen verwickelten Vor-  
z. B. aus der Analogie früherer ähnlicher Fälle zuweilen  
voraussagen, was einer unserer Bekannten thun wird,  
mständen sich zum Handeln entscheiden wird, weil wir  
. B. als ehrgeizig oder als feig, ohne daß wir doch genau  
vir den Grad des Ehrgeizes oder der Feigheit zu messen  
andene Grad von Ehrgeiz oder Feigheit ausreichen wird,  
so zu bestimmen, wie es unserer Erwartung nach aus-

ogenannten und mit Bewußtsein vollzogenen Schlüssen,



wenn sie sich nicht auf Gebote, sondern auf Erfahrungssätze stützen, thun wir also in der That nichts anderes, als dafs wir mit Überlegung und sorgfältiger Prüfung diejenigen Schritte der inductiven Verallgemeinerung unserer Erfahrungen wiederholen, welche schon vorher in schnellerer Weise ohne bewusste Reflexion ausgeführt waren, entweder von uns selbst, oder von anderen Beobachtern, denen wir vertrauen. Wenn aber auch durch die Formulirung eines allgemeinen Satzes aus unseren bisherigen Erfahrungen nichts wesentlich Neues unserem bisherigen Wissen hinzugefügt wird, so ist dieselbe doch in vieler Beziehung nützlich. Einen bestimmt ausgesprochenen allgemeinen Satz können wir viel leichter im Gedächtnisse aufbewahren und anderen Menschen mittheilen, als wenn dies mit allen einzelnen Fällen geschehen müßte. Wir werden durch seine Aufstellung veranlaßt, jeden neu eintretenden Fall gerade in Bezug auf die Richtigkeit jener Verallgemeinerung genau zu prüfen, wobei jede Ausnahme uns doppelt stark auffallen wird; wir werden uns eher an die Beschränkungen der Gültigkeit erinnern, wenn wir den Satz in allgemeiner Form vor uns haben, als wenn wir alle einzelnen Fälle durchlaufen müssen. Es wird also durch eine solche bewusste Formulirung des Inductionsschlusses mancherlei gewonnen für die Bequemlichkeit und Sicherheit des Verfahrens, aber es wird im Wesentlichen nichts Neues hinzugefügt, was nicht schon in den ohne Reflexion ausgeführten Analogieschlüssen bestände, mittelst deren wir z. B. den Charakter eines Menschen aus seinen Gesichtszügen und seinen Bewegungen beurtheilen, oder nach der Kenntnifs seines Charakters voraussagen, was er in einem gegebenen Falle thun wird.

Wir haben nun genau denselben Fall bei unseren Sinneswahrnehmungen. Wenn wir Erregung in denjenigen Nervenapparaten gefühlt haben, deren peripherische Enden an der rechten Seite beider Netzhäute liegen, so haben wir in millionenfach wiederholten Erfahrungen unseres ganzen Lebens gefunden, dafs ein leuchtender Gegenstand nach unserer linken Seite hin vor uns lag. Wir mußten die Hand nach links hin erheben, um das Licht zu verdecken, oder das leuchtende Object zu ergreifen, oder uns nach links hin bewegen, um uns ihm zu nähern. Wenn also in diesen Fällen kein eigentlicher bewusster Schluß vorliegt, so ist doch die 449 wesentliche und ursprüngliche Arbeit eines solchen vollzogen und das Resultat desselben erreicht, aber freilich nur durch die unbewussten Vorgänge der Association von Vorstellungen, die im dunklen Hintergrunde unseres Gedächtnisses vor sich geht und deren Resultate sich daher auch unserem Bewusstsein aufdrängen, als gewonnen durch eine uns zwingende, gleichsam äußere Macht, über die unser Wille keine Gewalt hat.

Es fehlt an diesen Inductionsschlüssen, die zur Bildung unserer Sinneswahrnehmungen führen, allerdings die reinigende und prüfende Arbeit des bewussten Denkens; dessen ungeachtet glaube ich, sie doch ihrem eigentlichen Wesen nach als Schlüsse, unbewußt vollführte Inductionsschlüsse, bezeichnen zu dürfen.

Ihrer Aufnahme in das bewusste Denken und ihrer Formulirung in der Normalform logischer Schlüsse widersteht sehr oft noch ein ihnen ganz eigenthümlicher Umstand, nämlich der, dafs wir gar nicht näher bezeichnen können, was in uns vorgegangen ist, wenn wir eine Empfindung in einer bestimmten Nervenfasern hatten, und wodurch diese zu unterscheiden ist von entsprechenden Empfindungen in anderen Nervenfasern. Haben wir z. B. eine Lichtempfindung in gewissen Fasern des Sehnervenapparates gehabt, so wissen wir nur, dafs wir eben eine Empfindung eigenthümlicher Art gehabt haben, die sich von allen anderen Sinnesempfindungen

ren Gesichtsempfindungen unterschieden hat, und bei welcher wir act nach links hin zu finden pflegten. Wir können im natürlichen wir Physiologie studirt haben, von der Empfindung nicht die Empfindung selbst für unser eigenes Vorstellen nicht anders enthalten, als indem wir sie bezeichnen durch die Bedingungen, unter der gekommen ist. Ich muß sagen: „ich sehe etwas Helles ist der einzige Ausdruck, den ich der Empfindung geben kann. Da, daß diese Nerven erregt worden sind, und zwar Nerven, die auf der äußeren Haut endigen, lernen wir erst spät durch wissenschaftliches Nachdenken bekommen wir erst die Mittel, diese Art der Empfindung zu bezeichnen von der Art, wie sie gewöhnlich hervorgerufen wird.

Wie es sich bei den meisten Sinnesempfindungen. Die Geschmacksempfindungen wissen wir meistentheils selbst ihrer Qualität nach nicht anders als durch die Benennung derjenigen Körper, welche geschmeckt werden, einige wenige, ziemlich unbestimmte, allgemeinere Begriffe, wie „süß“, „sauer“, „bitter“, „scharf“.

Wie es, daß die Farbensamen ursprünglich ähnlich entstanden erhielt ich von verschiedenen Collegen, die sich mit der Beschäftigung, die Auskunft, daß die Namen für Roth meist aus dem Brennen, die Brennen und Flamme bezeichnen, wie rubeus, Die Namen für Grün weisen meist auf wachsende Pflanzen, was auf virescere, vis zurückdeutet, englisch: grow,

Die Namen für Blau weisen auf Himmel und Luft hin, englische blue, wie das deutsche blau auf blow, i. e. blasen. *βάλλω* vom Meere entnommen.

Nach welcher wir von unseren Sinnesempfindungen auf die 449 Ursache derselben hinübergehen, können wir also auf dem Wege unseres Bewußtseins gar nicht einmal in die Form bewußter Urtheile, daß links von mir ein helles Object sei, weil die auf endenden Nervenfasern sich in Erregungszustand befinden, der inneren Beschaffenheit des Auges nichts weiß, nur so viel: „etwas Helles, weil ich es dort sehe“. Und demgemäß ist die Meinung, daß, wenn ich das Auge rechts drücke, die dort erregt werden, vom Standpunkte der täglichen Erfahrung gar nicht anders werden, als so: „Wenn ich das Auge rechts drücke, sehe ich einen Schein“. Es fehlt jedes Mittel, die Empfindung anders als durch die andern früher gehabt Empfindungen zu identificiren, als durch den Ort des scheinbar entsprechenden äußeren Objects bezeichnen.

Also diese Fälle der Erfahrung das Eigenthümliche, daß die Empfindung auf ein äußeres Object gar nicht einmal auszusprechen in der Bezeichnung der Empfindung vorauszuschicken, vorauszusetzen, von dem man erst noch reden will.

Nunmehr zu der viel bestrittenen Frage, welche Art der Unterschied zwischen der Vorstellung und ihrem Object ist, welche Art von Wahrheit wir unseren Vorstellungen beilegen dürfen?

In des neuen Jahrhunderts hatte KANT die Lehre von den

vor aller Erfahrung gegebenen, oder wie er sie deshalb nannte, „transcendentalen“ Formen des Anschauens und Denkens ausgebildet, in welche aller Inhalt unseres Vorstellens nothwendig aufgenommen werden muß, wenn er zur Vorstellung werden soll. Für die Qualitäten der Empfindung hatte schon LOCKE den Antheil geltend gemacht, den unsere körperliche und geistige Organisation an der Art hat, wie die Dinge uns erscheinen. In dieser Richtung nun haben die Untersuchungen über die Physiologie der Sinne, welche namentlich JOHANNES MÜLLER vervollständigte, kritisch sichtet und dann in das Gesetz von den specifischen Energien der Sinnesnerven zusammenfaßte, die vollste Bestätigung, man kann fast sagen, in einem unerwarteten Grade, gegeben und dadurch zugleich das Wesen und die Bedeutung einer solchen von vorn herein gegebenen, subjectiven Form des Empfindens in sehr entscheidender und greifbarer Weise zur Anschauung gebracht. Dieses Thema ist schon oft besprochen worden; ich kann mich deshalb hier darüber kurz fassen.

Zwischen den Sinnesempfindungen verschiedener Art kommen zwei verschiedene Grade des Unterschieds vor, erstens ein tiefer eingreifender zwischen Empfindungen, die verschiedenen Sinnen angehören, wie zwischen blau, süß, warm, hochtönend; ich habe mir erlaubt, diesen als Unterschied in der Modalität der Empfindung zu bezeichnen. Er ist so eingreifend, daß er jeden Übergang von einem zum anderen, jedes Verhältniß größerer oder geringerer Ähnlichkeit ausschließt. Ob z. B. süß dem Blau oder Roth ähnlicher sei, kann man gar nicht fragen. Die zweite Art des Unterschieds dagegen, die minder eingreifende, ist die zwischen verschiedenen Empfindungen desselben Sinnes; ich beschränke auf ihn die Bezeichnung eines Unterschiedes der Qualität. J. G. FICHTE faßt diese Qualitäten je eines Sinnes zusammen als Qualitätenkreis und bezeichnet, was ich eben Unterschied der Modalität nannte, als Unterschied der Qualitätenkreise. Innerhalb jedes solchen Kreises ist Übergang und Vergleichung möglich. Von Blau können wir durch Violett und Karminroth in Scharlachroth übergehen und z. B. aussagen, daß Gelb dem Orangeroth ähnlicher sei, als dem Blau. Die physiologischen Untersuchungen lehren nun, daß jener tief eingreifende Unterschied ganz und gar nicht abhängt von der Art des äußeren Eindrucks, durch den die Empfindung erregt ist, sondern ganz allein und ausschließlich bestimmt wird durch den Sinnesnerv, der von dem Eindrucke getroffen worden ist. Erregung des Sehnerven erzeugt nur Lichtempfindungen, ob er nun von objectivem Licht, d. h. von Ätherschwingungen, erregt werde oder von elektrischen Strömen, die man durch das Auge leitet, oder durch Druck auf den Augapfel, oder durch Zerrung des Nervenstammes bei schneller Bewegung des Blicks. Die Empfindung, die bei den letzteren Einwirkungen entsteht, ist der des objectiven Lichts so ähnlich, daß man lange Zeit an eine Lichtentwicklung im Auge geglaubt hatte. J. MÜLLER zeigte, daß eine solche durchaus nicht stattfindet, daß eben nur die Empfindung des Lichts da sei, weil der Sehnerv erregt werde.

Wie nun einerseits jeder Sinnesnerv, durch die mannigfachsten Einwirkungen erregt, immer nur Empfindungen aus dem ihm eigenthümlichen Qualitätenkreise giebt: so erzeugen andererseits dieselben äußeren Einwirkungen, wenn sie verschiedene Sinnesnerven treffen, die verschiedenartigsten Empfindungen, diese immer entnommen aus dem Qualitätenkreise des betreffenden Nerven. Dieselben Ätherschwingungen, welche das Auge als Licht fühlt, fühlt die Haut als Wärme. Dieselben Luftschwingungen, welche die Haut als Schwirren fühlt, fühlt das Ohr als

a die Verschiedenartigkeit des Eindrucks so groß, daß die Vorstellung, Agentien, die so verschieden erschienen, wie Licht seien gleichartig und zum Theil identisch, erst beruhigten, b Experimentaluntersuchungen nach allen Richtungen hin die physikalischen Verhaltens festgestellt war.

b des Qualitätskreises jedes einzelnen Sinnes, wo die Art der Qualität der erzeugten Empfindung wenigstens mit der unerwartetsten Incongruenzen vor. Lehrreich ist in der Gleichung von Auge und Ohr, da die Objecte beider, Licht und Bewegungen sind, die je nach der Schnelligkeit ihrer Empfindungen erregen, im Auge verschiedener Farben, Tonhöhen. Wenn wir uns zur größeren Übersichtlichkeit der Verhältnisse des Lichts mit den Namen der durch entgegen gebildeten musikalischen Intervalle zu bezeichnen, so das Ohr empfindet etwa 10 Octaven verschiedener Töne, obgleich die jenseits dieser Grenzen liegenden Schwingungen beim Lichte vorkommen und physikalisch nachgewiesen. Auge hat nur drei von einander verschiedene Grundkurzen Scala, aus denen sich alle seine Qualitäten durch, nämlich Roth, Grün, Blauviolett. Diese mischen sich in sich zu stören. Das Ohr dagegen unterscheidet eine unverschiedener Höhe. Kein Accord klingt gleich einem anderen Tönen zusammengesetzt ist, während doch beim gleichen Fall ist. Denn gleich aussehendes Weiß kann durch Roth und Grünblau des Spectrums, durch Gelb und Violett, Grün, Roth und Violett, oder durch je zwei, Schwingungen zusammen. Wären im Ohre die Verhältnisse die gleichtönend Zusammenklänge, wie: *C* und *F*, *D* und *G*, *E*, *F*, *G*, *A* u. s. w. Und, was in Bezug auf die objectiv merkwürdiger ist, es hat noch keine einzige physikalische Ordnung können, in der gleich aussehendes Licht regelmäßig ein die Wirkung auf das Auge. Endlich hängt die ganze Wirkung von Consonanz und Dissonanz von dem eigenen Schwebungen ab. Diese beruhen auf einem schnellen Tönen, welcher dadurch entsteht, daß zwei nahe liegend mit gleichen und entgegengesetzten Phasen zusammen bald starke, bald schwache Schwingungen der mitgehen. Das physikalische Phänomen würde beim Zusammenklänge ganz ebenso vorkommen können, wie beim Zusammenklänge. Aber der Nerv muß erstens fähig sein, von beiden Tönen, und zweitens muß er dem Wechsel von starker und schwacher folgen können. In letzterer Beziehung ist der menschliche Gehör erheblich überlegen. Gleichzeitig ist jede Faser des Gehörs aus einem engen Intervall der Scala empfindlich, so daß keine Töne in ihr überhaupt zusammen wirken können, weit entfernt, oder nicht unmittelbar. Wenn sie es thun, so rührt es von Combinationstönen her. Daher tritt beim Zusammenklänge der schwebenden und nicht schwebenden Intervalle, d. h.

von Consonanz und Dissonanz ein. Jede Sehnervenfaser dagegen empfindet durch das ganze Spectrum, wenn auch verschieden stark in verschiedenen Theilen. Könnte der Sehnerv überhaupt den ungeheuer schnellen Schwebungen der Lichtoscillationen in der Empfindung folgen, so würde jede Mischfarbe als Dissonanz wirken.

Wir sehen, wie alle diese Unterschiede in der Wirkungsweise von Licht und Ton durch die Art, wie der Nervenapparat gegen sie reagirt, bedingt sind.

Unsere Empfindungen sind eben Wirkungen, welche durch äussere Ursachen in unseren Organen hervorgebracht werden, und wie eine solche Wirkung sich äussert, hängt natürlich ganz wesentlich von der Art des Apparats ab, auf den gewirkt wird. Insofern die Qualität unserer Empfindung uns von der Eigenthümlichkeit der äusseren Einwirkung, durch welche sie erregt ist, eine Nachricht giebt, kann sie als ein Zeichen derselben gelten, aber nicht als ein Abbild. Denn vom Bilde verlangt man irgend eine Art der Gleichheit mit dem abgebildeten Gegenstande, von einer Statue Gleichheit der Form, von einer Zeichnung Gleichheit der perspectivischen Projection im Gesichtsfelde, von einem Gemälde auch noch Gleichheit der Farben. Ein Zeichen aber braucht gar keine Art der Ähnlichkeit mit dem zu haben, dessen Zeichen es ist. Die Beziehung zwischen beiden beschränkt sich darauf, daß das gleiche Object, unter gleichen Umständen zur Einwirkung kommend, das gleiche Zeichen hervorruft, und daß also ungleiche Zeichen immer ungleicher Einwirkung entsprechen.

Der populären Meinung gegenüber, welche auf Treue und Glauben die volle Wahrheit der Bilder annimmt, die uns unsere Sinne von den Dingen liefern, mag dieser Rest von Ähnlichkeit, den wir anerkennen, sehr geringfügig erscheinen. In Wahrheit ist er es nicht; denn damit kann noch eine Sache von der allergrößten Tragweite geleistet werden, nämlich die Abbildung der Gesetzmäßigkeit in den Vorgängen der wirklichen Welt. Jedes Naturgesetz sagt aus, daß auf Vorbedingungen, die in gewisser Beziehung gleich sind, immer Folgen eintreten, die in gewisser anderer Beziehung gleich sind. Da Gleiches in unserer Empfindungswelt durch gleiche Zeichen angezeigt wird, so wird der naturgesetzlichen Folge gleicher Wirkungen auf gleiche Ursachen auch eine ebenso regelmäßige Folge im Gebiete unserer Empfindungen entsprechen.

Wenn also unsere Sinnesempfindungen in ihrer Qualität auch nur Zeichen sind, deren besondere Art ganz von unserer Organisation abhängt, so sind sie doch nicht als leerer Schein zu verwerfen, sondern sie sind eben Zeichen von Etwas, sei es von etwas Bestehendem oder Geschehendem, und was das Wichtigste ist, das Gesetz dieses Geschehens können sie uns abbilden.

Die Qualitäten der Empfindung also erkennt auch die Physiologie als bloße Form der Anschauung an. KANT aber ging weiter. Nicht nur die Qualitäten der Sinnesempfindungen sprach er als gegeben durch die Eigenthümlichkeiten unseres Anschauungsvermögens an, sondern auch Zeit und Raum, da wir nichts in der Außenwelt wahrnehmen können, ohne daß es

Zeit geschieht und an einen bestimmten Ort gesetzt  
 nung kommt sogar auch jeder innerlichen Wahrnehmung  
 deshalb die Zeit als die gegebene und nothwendige,  
 'orm der inneren, den Raum als die entsprechende  
 schauung. Auch die räumlichen Bestimmungen also  
 ebensowenig der Welt des Wirklichen, oder „dem Dinge  
 wie die Farben, die wir sehen, den Körpern an sich  
 durch unser Auge in sie hineingetragen sind. Selbst  
 rwissenschaftliche Betrachtung bis zu einer gewissen  
 men. Wenn wir nämlich fragen, ob es ein gemeinsames

Empfindung wahrnehmbares Kennzeichen giebt, durch  
 is jede auf Gegenstände im Raum bezügliche Wahr-  
 irt: so finden wir in der That ein solches in dem  
 egung unseres Körpers uns in andere räumliche Be-  
 ahrgenommenen Objecten setzt und dadurch auch den  
 uf uns machen, verändert. Der Impuls zur Bewegung  
 Innervation unserer motorischen Nerven geben, ist etwas  
 mbares. Dafs wir etwas thun, indem wir einen solchen  
 a wir. Was wir thun, wissen wir nicht unmittelbar.  
 chen Nerven in Erregungszustand versetzen oder in-  
 i Reizung auf die Muskeln übergeleitet wird, diese sich in  
 enziehen und die Glieder bewegen, lehrt uns erst die  
 m aber wissen wir auch ohne wissenschaftliches Studium,

Wirkung jeder verschiedenen Innervation folgt, die wir  
 e sind. Dafs wir dies durch häufig wiederholte Ver-  
 ingen lernen, ist in einer grofsen Reihe von Fällen

Wir können noch im erwachsenen Alter lernen, die  
 en, die zum Aussprechen der Buchstaben einer fremden  
 e besondere Art der Stimmbildung beim Singen nöthig  
 ervationen lernen, um die Ohren zu bewegen, um mit  
 ind auswärts zu schießen u. s. w. Die Schwierigkeit in  
 t nur die, die Innervationen zu finden, die zu solchen  
 rten Bewegungen nöthig sind. Wir fühlen also, dafs  
 se geben, wir unterscheiden gleiche und ungleiche  
 is Erfahrung die wahrnehmbare Wirkung kennen, welche  
 denen hervorbringen, aber ohne von den vermittelnden  
 is zu wissen.

Impulse solcher Art geben (den Blick wenden, die  
 ind hergehen), so finden wir, dafs dadurch die gewissen  
 ehörigen Empfindungen (nämlich die auf räumliche  
 geändert werden können; andere psychische Zustände,  
 sind, Erinnerungen, Absichten, Wünsche, Stimmungen  
 urch ist in unmittelbarer Wahrnehmung ein durch-  
 l zwischen den ersteren und letzteren gesetzt. Wenn



wir also dasjenige Verhältniß, welches wir durch unsere Willensimpulse unmittelbar ändern, dessen Art uns übrigens noch ganz unbekannt sein könnte, ein räumliches nennen wollen, so treten die Wahrnehmungen psychischer Thätigkeiten gar nicht in ein solches ein; wohl aber müssen alle Empfindungen der äußeren Sinne unter irgend welcher Art der Innervation vor sich gehen, d. h. räumlich bestimmt sein. Demnach wird uns der Raum auch sinnlich erscheinen, behaftet mit den Qualitäten unserer Bewegungsempfindungen, als das, durch welches hin wir uns bewegen, durch welches hin wir blicken können. Die Raumanschauung würde also in diesem Sinne eine subjective Anschauungsform sein, wie die Empfindungsqualitäten Roth, Süß, Kalt. Natürlich würde dies für jene ebenso wenig wie für diese den Sinn haben, daß die Ortsbestimmung eines bestimmten einzelnen Gegenstandes ein bloßer Schein sei.

Als die nothwendige Form der äußeren Anschauung aber würde der Raum von diesem Standpunkte aus erscheinen, weil wir eben das, was wir als räumlich bestimmt wahrnehmen, als Außenwelt zusammenfassen. Dasjenige, an dem keine Raumbeziehung wahrzunehmen ist, begreifen wir als die Welt der inneren Anschauung, als die Welt des Selbstbewußtseins.

Und eine gegebene, vor aller Erfahrung mitgebrachte Form der Anschauung würde der Raum sein, insofern seine Wahrnehmung an die Möglichkeit motorischer Willensimpulse geknüpft wäre, für die uns die geistige und körperliche Fähigkeit durch unsere Organisation gegeben sein muß, ehe wir Raumanschauung haben können.

- 444 Was zunächst die Eigenschaften der Objecte der Außenwelt betrifft, so zeigt eine leichte Überlegung, daß alle Eigenschaften, die wir ihnen zuschreiben können, nur Wirkungen bezeichnen, welche sie entweder auf unsere Sinne oder auf andere Naturobjecte ausüben. Farbe, Klang, Geschmack, Geruch, Temperatur, Glätte, Festigkeit gehören der ersteren Klasse an, sie bezeichnen Wirkungen auf unsere Sinnesorgane. Glätte und Festigkeit bezeichnen den Grad des Widerstandes, den die berührten Körper entweder der gleitenden Berührung oder dem Drucke der Hand darbieten. Statt der Hand können aber auch andere Naturkörper eintreten, ebenso für die Prüfung anderer mechanischer Eigenschaften, der Elasticität und Schwere. Die chemischen Eigenschaften beziehen sich ebenfalls auf Reactionen, d. h. Wirkungen, welche der betrachtete Naturkörper auf andere ausübt. Ebenso ist es mit den anderen physikalischen Eigenschaften der Körper, den optischen, elektrischen, magnetischen. Überall haben wir es mit Wechselbeziehungen verschiedener Körper auf einander zu thun, mit Wirkungen auf einander, welche von den Kräften abhängen, die verschiedene Körper auf einander ausüben. Denn alle Naturkräfte sind Kräfte, welche ein Körper auf den anderen ausübt. Wenn wir uns die bloße Materie ohne Kräfte denken, so ist sie auch ohne Eigenschaften, abgesehen von ihrer verschiedenen Vertheilung im Raume und ihrer Bewegung. Alle Eigenschaften der Naturkörper kommen deshalb auch erst zu Tage, wenn wir sie in die entsprechende Wechselwirkung mit anderen Naturkörpern oder mit unseren Sinnesorganen setzen. Da aber solche Wechselwirkung in jedem Augenblicke eintreten kann, beziehlich auch durch unseren Willen in einem beliebigen Augenblicke herbeigeführt werden kann, und wir dann immer die eigenthümliche Art der Wechsel-

m, so schreiben wir den Objecten eine dauernde und stets zur Fähigkeit zu solchen Wirkungen zu. Diese dauernde Fähigkeit haft.

hervor, daß in Wahrheit die Eigenschaften der Natur-  
amens gar nichts dem einzelnen Objecte an und für sich  
ndern immer eine Beziehung zu einem zweiten Objecte (ein-  
nesorgane) bezeichnen. Die Art der Wirkung muß natürlich  
nthümlichkeiten sowohl des wirkenden Körpers abhängen,  
örpers, auf welchen gewirkt wird. Darüber sind wir auch  
weifel, wenn wir von solchen Eigenschaften der Körper reden,  
venn der eine auf einen anderen, ebenfalls der Außenwelt  
irkt, z. B. bei den chemischen Reactionen. Bei den Eigen-  
the auf Wechselbeziehungen der Dinge zu unseren Sinnes-  
die Menschen von jeher geneigt gewesen, es zu vergessen,  
mit der Reaction gegen ein besonderes Reagens, nämlich  
zu thun haben, und daß auch Farbe, Geruch und Geschmack,  
Kälte Wirkungen sind, die ganz wesentlich von der Art des  
ewirkt wird, abhängen. Allerdings sind die Reactionen der  
re Sinne die am häufigsten und am allgemeinsten wahr-  
für unser Wohlfühlen und für unsere Behaglichkeit die über-  
; das Reagens, an welchem wir sie zu erproben haben, ist  
ben, aber dadurch wird das Verhältniß nicht anders.

len, ob der Zinnober wirklich roth sei, wie wir ihn sehen, 445  
sinnliche Täuschung sei, ist deshalb sinnlos. Die Empfindung  
le Reaction normal gebildeter Augen für das von Zinnober  
Rothblinder wird den Zinnober schwarz oder dunkel-  
dies ist die richtige Reaction für sein besonders geartetes  
sen, daß sein Auge eben anders geartet ist, als das anderer  
st die eine Empfindung nicht richtiger und nicht falscher  
uch die Rothsehenden eine große Majorität für sich haben.  
; rothe Farbe des Zinnobers nur, insofern es Augen  
Majorität der Menschen ähnlich beschaffen sind. Genau mit  
; eine Eigenschaft des Zinnobers, schwarz zu sein, nämlich  
Überhaupt ist das vom Zinnober zurückgeworfene Licht an  
th zu nennen, es ist nur für bestimmte Arten von Augen  
Eigenschaften der Körper sprechen, die sie in Bezug auf  
enwelt haben, vergessen wir nicht in der Sprache auch den  
in Bezug auf welchen die Eigenschaft vorhanden ist. Wir  
; in Salpetersäure, es ist nicht löslich in Schwefelsäure“.  
ollten: „Blei ist löslich“, so würden wir sogleich bemerken,  
idige Behauptung ist, und würden sogleich fragen müssen,  
Venn wir aber sagen, „Zinnober ist roth“, so versteht es  
st, daß er für unsere Augen roth ist, und für die Augen  
the wir als gleich beschaffen voraussetzen. Wir glauben,  
brauchen, und deshalb vergessen wir es auch wohl und  
zu glauben, die Röthe sei eine dem Zinnober oder dem  
ite, ganz unabhängig von unseren Sinnesorganen zukommende  
eres ist es, wenn wir behaupten, daß die Wellenlängen des

vom Zinnober zurückgeworfenen Lichtes eine gewisse Länge haben. Das ist eine Aussage, die wir unabhängig von der besonderen Natur unseres Auges machen können, bei der es sich dann aber auch nur um Beziehungen zwischen der Substanz und den verschiedenen Ätherwellensystemen handelt.

„ Übrigens halte ich die Meinung vieler modernen Kantianer, daß eben deshalb das „Ding an sich“ nur ein transcendentaler Schein sei, für eine KANT nur untergeschobene Meinung. Darüber kann nach seinen Sätzen ja kein Zweifel bleiben, daß wir die Außenwelt nur durch eine Zeichensprache kennen, und daß unsere Bilder von den Dingen in unserer Vorstellung nicht ihren Objecten gleich sind. Aber das Verhältniß, wie eine transcendente Form die Anschauung der Gegenstände verändern kann, ist an dem Beispiel der Qualitäten unserer Sinnesempfindungen sehr gut zu erläutern. Das Auge kann Alles, was es wahrnimmt, nur in der Form von Licht- und Farbenempfindungen wahrnehmen. Daß es Alles nur in dieser Weise sieht, beruht in seiner ihm von Anfang an gegebenen Structur und ist ganz unabhängig von den Objecten, die es sieht. Aber daß es an einer Stelle des Sehfeldes Dunkel sieht, an einer zweiten Hell, hier Roth, dort Gelb, und daß diese Eindrücke mit der Zeit wechseln, das hängt sicherlich nicht bloß von seiner angeborenen Anschauungsform ab, sondern von unabhängigen Ursachen, die auf das Organ einwirken, und von denen wir Näheres nur erfahren können, indem wir die Gesetze ihrer Einwirkung studiren.

Aber genau dieselbe Betrachtung läßt sich auch auf die Denkform der Causalität anwenden. Was wir zu begreifen streben, können wir nur nach dieser Form begreifen, indem wir Gesetze der Veränderungen suchen. Das Auge kann nichts sehen, was ihm nicht als Licht und Farbe erscheint; ebenso kann der Geist nichts begreifen, in dem er kein Gesetz findet. Daraus folgt aber offenbar nicht, daß es ein leerer und trügerischer Schein sei, wenn für bestimmte Vorgänge unter bestimmten Bedingungen sich das entsprechende Gesetz finden läßt.

Wir nennen unsere Vorstellungen von der Außenwelt wahr, wenn sie uns genügende Anweisung über die Folgen unserer Handlungen der Außenwelt gegenüber geben und uns richtige Schlüsse über die zu erwartenden Veränderungen derselben ziehen lassen. Diese Art der Wahrheit kommt den richtig gebildeten Vorstellungen eines erwachsenen gesunden Menschen bis auf seltene Ausnahmefälle jedenfalls zu. Nur solche synthetische Urtheile, die durch mögliche Beobachtung jetzt oder künftig bestätigt werden können, sei es in innerer oder äußerer Anschauung, haben auf diese Bezeichnung Anspruch. Rein analytische Urtheile, die nur die in der Definition des Objectes enthaltenen Merkmale diesem beilegen, würde ich nur als richtig, nicht als wahr bezeichnen. Sie sagen nichts über die Wirklichkeit aus.

Diese Art der Wahrheit, welche durch zweckmäßig ausgeführte Handlungen und die dabei gemachten Beobachtungen bestätigt werden kann, kommt der überwiegenden Mehrzahl der menschlichen Wahrnehmungen offenbar zu. Von einer anderen wissen wir jedenfalls nichts, und nach einer anderen

es Erachtens ein Streben ohne Sinn, nach einem Zweck  
 ruff sich selbst widerspricht.

inigen Arten von Wahrnehmungen durch den inneren  
 e aufgeworfen worden, ob das Bild des Objects nicht  
 könne, z. B. die Erinnerung an eine bei besonderer  
 aufgetauchte Erinnerung würde meistens gleichzeitig  
 er Erinnerung sein und als gleichartig ihrem Object  
 nen. Dagegen schon die Erinnerung an einen früher  
 e Absicht oder an einen einst gefassten Entschluß ist  
 zeitig eine Erneuerung des Wunsches, der Absicht, des  
 Erinnerungen sind also auch nicht nothwendig genaue  
 le, wenn sie auch in unserem Bewußtsein als solche  
 gilt dies für die Wahrnehmungen durch die äußeren  
 gegenüber beruht die Sicherheit, mit der wir die Wirklichkeit  
 sentlich darauf, daß in solchem Falle unsere Vorstellung  
 len sinnlichen Empfindungseindrücken begleitet sein  
 merung derselben nothwendig fehlen, und in der Be-  
 i unserem Bewußtsein fast immer eine feste Ent-  
 eden einzelnen Theil des Bildes, wenn es uns nur  
 mkeit auf ihn zu richten.

die Entstehung der Gesichtswahrnehmungen zu be-  
 h also zunächst darauf, zu begreifen, wie die Über-  
 unseren Wahrnehmungen und der richtigen Voraussicht  
 ulse herzustellenden Veränderungen zu gewinnen sei.  
 eutig und als Thatsache ohne hypothetische Unter-  
 n, ist das Gesetzliche in der Erscheinung. Von dem  
 wir vor uns weilende Objecte im Raume vertheilt  
 Wahrnehmung das Anerkennen einer gesetzlichen Ver-  
 seren Bewegungen und den dabei auftretenden  
 diese ersten elementaren Vorstellungen enthalten in  
 hen nach den Gesetzen des Denkens vor sich. Alles,  
 ; zu dem rohen Materiale der Empfindungen hinzu-  
 n aufgelöst werden.

fen“ heist: Begriffe bilden, und wir im Begriff einer  
 usammensuchen und zusammenfassen, was sie von  
 sich tragen: so ergiebt sich ganz analog, daß der  
 wechselnden Reihe von Erscheinungen das zusammen-  
 was in allen ihren Stadien gleich bleibt. Wir nennen,  
 t von Anderem gleich bleibt in allem Wechsel der  
 wir nennen das gleichbleibende Verhältniß zwischen  
 das sie verbindende Gesetz. Was wir direct wahr-  
 etztere. Der Begriff der Substanz kann nur durch  
 gewonnen werden und bleibt immer problematisch.  
 g vorbehalten wird. Früher galten Licht und Wärme

als Substanzen, bis sich später herausstellte, daß sie vergängliche Bewegungsformen seien, und wir müssen immer noch auf neue Zerlegungen der jetzt bekannten chemischen Elemente gefaßt sein. Das erste Product des denkenden Begreifens der Erscheinung ist das Gesetzliche. Haben wir es so weit rein ausgeschieden, seine Bedingungen so vollständig und sicher abgegrenzt und zugleich so allgemein gefaßt, daß für alle möglicher Weise eintretenden Fälle der Erfolg eindeutig bestimmt ist, und wir gleichzeitig die Überzeugung gewinnen, es habe sich bewährt und werde sich bewähren in aller Zeit und in allen Fällen: dann erkennen wir es als ein unabhängig von unserem Vorstellen Bestehendes an und nennen es die Ursache, d. h. das hinter dem Wechsel ursprünglich Bleibende und Bestehende; nur in diesem Sinne ist meiner Meinung nach die Anwendung des Worts gerechtfertigt, wenn auch der gemeine Sprachgebrauch es in sehr verwaschener Weise überhaupt für Antecedens oder Veranlassung anwendet. Insofern wir dann das Gesetz als ein unsere Wahrnehmung und den Ablauf der Naturprocesse Zwingendes, als eine unserem Willen gleichwerthige Macht anerkennen, nennen wir es „Kraft“. Dieser Begriff der uns entgegnetretenden Macht ist unmittelbar durch die Art und Weise bedingt, wie unsere einfachsten Wahrnehmungen zu Stande kommen. Von Anfang an scheiden sich die Änderungen, die wir selbst durch unsere Willensacte machen, von solchen, die durch unseren Willen nicht gemacht, durch unseren Willen nicht zu beseitigen sind. Er ist namentlich der Schmerz, der uns von der Macht der Wirklichkeit die eindringlichste Lehre giebt. Der Nachdruck fällt hierbei auf die Beobachtungsthatsache, daß der Kreis der uns zur Zeit wahrnehmbaren Gegenstände nicht durch einen bewußten Act unseres Vorstellens oder Willens gesetzt ist. FICHTE'S „Nicht-Ich“ ist hier der genau zutreffende negative Ausdruck. Auch dem Träumer erscheint, was er zu sehen und zu fühlen glaubt, nicht durch seinen Willen oder durch die bewußte Verkettung seiner Vorstellungen hervorgerufen zu sein, wenn auch unbewußt das letztere in Wirklichkeit oft genug der Fall sein möchte; auch ihm ist es ein Nicht-Ich. Ebenso dem Idealisten, der es als die Vorstellungswelt des Weltgeistes ansieht.

Wir haben in unserer Sprache eine sehr glückliche Bezeichnung für dieses, was hinter dem Wechsel der Erscheinungen stehend auf uns einwirkt, nämlich „das Wirkliche“. Hierin ist nur das Wirken ausgesagt; es fehlt die Nebenbeziehung auf das Bestehen als Substanz, welche der Begriff des Reellen, d. h. des Sachlichen einschließt. In den Begriff des Objectiven andererseits schiebt sich meist der Begriff des fertigen Bildes eines Gegenstandes ein, welcher nicht auf die ursprünglichsten Wahrnehmungen paßt. Auch bei dem folgerichtig Träumenden müßten wir diejenigen seelischen Zustände oder Motive, welche ihm die dem gegenwärtigen Stande seiner erträumten Welt gesetzmäßig entsprechenden Empfindungen zur Zeit unter-schieben, als wirksam und wirklich bezeichnen. Andererseits ist klar, daß eine Scheidung von Gedachtem und Wirklichem erst möglich wird, wenn wir

, was das Ich ändern und nicht ändern kann, zu voll-  
 3 wird aber erst möglich, wenn wir erkennen, welche  
 1 die Willensimpulse zur Zeit haben. Das Gesetzmäßige  
 liche Voraussetzung für den Charakter des Wirklichen.  
 ntradictio in adjecto sei, das Reelle oder KANTS „Ding

Bestimmungen vorstellen zu wollen, ohne es doch in  
 orstellens aufzunehmen, brauche ich wohl nicht aus-  
 das ist oft besprochen. Was wir aber erreichen  
 ntnis der gesetzlichen Ordnung im Reiche des Wirk-  
 nur dargestellt in dem Zeichensystem unserer Sinnes-

ken und Wahrnehmen in Bezug auf Erkenntnis des  
 dieses Ziel erreiche, muß ich verneinen. Aber, wie  
 1be, schliesse ich auch die Vorgänge, von denen uns  
 uung berichtet, unter den Begriff der wirklichen Vor-

art der ursächlichen Verbindung freilich, die wir zur  
 en aufgefundenen Fälle von Gesetzmäßigkeit in der  
 mungen anzunehmen haben, wird immer nur in hypo-  
 den werden können.

dete Hypothese stellt ihrem thatsächlichen Sinne nach  
 tzt der Erscheinungen hin, als wir bisher unmittelbar  
 3 ist ein Versuch, zu immer allgemeinerer und um-  
 keit aufzuteigen. Was sie an Thatsachen Neues  
 h Beobachtung und Versuch geprüft und bestätigt  
 die einen solchen thatsächlichen Sinn nicht haben,  
 sichere und eindeutige Bestimmungen für die unter  
 1 geben, sind nur als werthlose Phrasen zu betrachten-  
 g der Erscheinungen auf die zu Grunde liegenden  
 behauptet etwas Unveränderliches und Abschließendes  
 u einer unbedingten Behauptung dieser Art sind wir  
 ubt weder die Lückenhaftigkeit unseres Wissens, noch  
 sschlüsse, auf denen all unsere Wahrnehmung des  
 Schritte an beruht.

hlufs stützt sich auf das Vertrauen, daß ein bisher  
 s Verhalten sich auch in allen noch nicht zur Beob-  
 illen bewähren werde. Es ist dies ein Vertrauen auf  
 les Geschehens. Die Gesetzmäßigkeit aber ist die  
 arkeit. Vertrauen in die Gesetzmäßigkeit ist also  
 die Begreifbarkeit der Naturerscheinungen. Setzen  
 das Begreifen zu vollenden sein wird, daß wir ein  
 s als Ursache der beobachteten Veränderungen  
 en, so nennen wir das regulative Princip unseres  
 treibt, das Causalgesetz. Wir können sagen, es



spricht das Vertrauen auf die vollkommene Begreifbarkeit der Welt aus. Das Begreifen, in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, ist die Methode, mittels deren unser Denken die Welt sich unterwirft, die That-sachen ordnet, die Zukunft voraus bestimmt. Es ist sein Recht und seine Pflicht, die Anwendung dieser Methode auf alles Vorkommende auszudehnen, und wirklich hat es auf diesem Wege schon große Ergebnisse geerntet. Für die Anwendbarkeit des Causalgesetzes haben wir aber keine weitere Bürgschaft, als seinen Erfolg. Wir könnten in einer Welt leben, in der jedes Atom von jedem anderen verschieden wäre, und wo es nichts Ruhendes gäbe. Da würde keinerlei Regelmäßigkeit zu finden sein, und unsere Denktätigkeit müßte ruhen.

Das Causalgesetz ist wirklich ein a priori gegebenes, ein transcendentales Gesetz. Ein Beweis desselben aus der Erfahrung ist nicht möglich; denn die ersten Schritte der Erfahrung sind nicht möglich, wie wir gesehen haben, ohne die Anwendung von Inductionsschlüssen, d. h. ohne das Causalgesetz; und aus der vollendeten Erfahrung, wenn sie auch lehrte, daß alles bisher Beobachtete gesetzmäßig verlaufen ist, — was zu versichern wir doch lange noch nicht berechtigt sind, — würde immer nur erst durch einen Inductionsschluss, d. h. unter Voraussetzung des Causalgesetzes, folgen können, daß nun auch in Zukunft das Causalgesetz giltig sein werde. Hier gilt nur der eine Rath: Vertraue und handle!

Das Unzulängliche  
Dann wird's Ereignis.

Ja ich kann nicht umhin, selbst den extremsten subjectiven Idealismus als eine mögliche und in sich consequente Form einer solchen Hypothese anzuerkennen, zu deren Widerlegung ich keinen entscheidenden Grund sehe, so unwahrscheinlich sie auch sein mag. Ich habe oben bemerkt, wie wichtig es erscheint, daß wir nach Aussage unseres Bewußtseins wenigstens ein Glied von der Kette der Ursachen, die zur Wahrnehmung führen, unseren Willensimpuls, aus innerer Anschauung kennen und wissen, durch welche Motive er zu Stande gekommen ist. Von ihm aus beginnt dann, als von einem uns bekannten Anfangsglied und zu einem bekannten Zeitpunkt, die Kette der physischen Ursachen zu wirken, die in den Erfolg des Versuches ausläuft. Aber eine wesentliche Voraussetzung für die zu gewinnende Überzeugung ist die, daß unser Willensimpuls weder selbst schon durch physische Ursachen, die gleichzeitig auch den physischen Proceß bestimmten, mit beeinflusst worden sei, noch seinerseits die darauf folgenden Wahrnehmungen beeinflusst habe.

Der letzte Zweifel kann namentlich bei unserem Thema in Betracht kommen. Der Willensimpuls für eine bestimmte Bewegung ist ein psychischer Act, die darauf wahrgenommene Änderung der Empfindung gleichfalls. Kann nun nicht der erste Act den zweiten durch rein psychische Vermittelungen zu Stande bringen? Unmöglich ist es nicht. Wenn wir träumen, geschieht so etwas. Wir glauben träumend eine Bewegung zu vollführen, und wir träumen dann weiter, daß dasjenige geschieht, was davon die natürliche Folge sein sollte. Wir träumen, in einen Kahn zu steigen, ihn vom Land abzustoßen, auf das Wasser hinaus zu gleiten, die umringenden Gegenstände sich verschieben zu sehen u. s. w. Hierbei scheint die Erwartung des Träumenden, daß er die Folgen seiner Handlungen eintreten sehen

ahrnehmung auf rein psychischem Wege herbeizuführen. Wer  
ig und fein ausgesponnen, wie folgerichtig durchgeführt ein  
könnte. Wenn alles darin im höchsten Grade gesetzmäßig  
id geschähe, so würde kein anderer Unterschied vom Wachen  
hkeit des Erwachens, das Abreißen dieser geträumten Reihe

man ein System selbst des extremsten subjectiven Idealismus  
des das Leben als Traum betrachten wollte. Man könnte  
ich, so unbefriedigend wie möglich erklären — ich würde  
härtesten Ausdrücken der Verwerfung zustimmen — aber  
wäre es; und es scheint mir sehr wichtig, dies im Auge

an, daß sich das Ich das Nicht-Ich, d. h. die erscheinende  
l es ihrer zur Entwicklung seiner Denkhätigkeit bedarf.  
leidet sich aber doch von dem eben bezeichneten dadurch,  
schlichen Individuen nicht als Traumbilder, sondern auf die  
es hin als dem eigenen Ich gleiche Wesen faßt. Da aber  
ie das Nicht-Ich vorstellen, wieder alle zusammen stimmen  
e individuellen Ichs alle als Theile oder Ausflüsse des  
r die Welt, in der jene sich fanden, die Vorstellungswelt,  
h setzte, und konnte wieder den Begriff der Realität an-  
BEL geschah.

Hypothese dagegen traut der Aussage der gewöhnlichen  
h die einer Handlung folgenden Veränderungen der Wahr-  
schischen Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Willens-  
als unabhängig von unserem Vorstellen bestehend an, was  
nung so zu bewähren scheint, die materielle Welt außer  
lie realistische Hypothese die einfachste, die wir bilden  
stätigt in außerordentlich weiten Kreisen der Anwendung,  
Einzelbestimmungen und deshalb außerordentlich brauchbar  
age für das Handeln. Das Gesetzliche in unseren Empfin-  
r in idealistischer Anschauungsweise kaum anders aus-  
lem wir sagen: „Die mit dem Charakter der Wahrnehmung  
cte verlaufen so, als ob die von der realistischen Hypo-  
der stofflichen Dinge wirklich bestände“. Aber über  
wir nicht hinweg; für mehr als eine ausgezeichnet brauch-  
Hypothese können wir die realistische Meinung nicht  
Wahrheit dürfen wir ihr nicht zuschreiben, da neben ihr  
re idealistische Hypothesen möglich sind.

er vor Augen zu halten, um nicht mehr aus den That-  
als in der That daraus zu folgern ist. Die verschiedenen  
schen und realistischen Meinungen sind metaphysische  
ange sie als solche anerkannt werden, ihre vollkommene  
ung haben, so schädlich sie auch werden mögen, so bald  
als angebliche Denknöthwendigkeiten hinstellen will. Die  
ässigen Hypothesen erörtern, um eine vollständige Über-  
Erklärungsversuche zu behalten. Noch nöthwendiger sind  
eln, weil man nicht immer zuwarten kann, bis eine gesicherte

wissenschaftliche Entscheidung erreicht ist, sondern sich, sei es nach der Wahrscheinlichkeit, sei es nach dem ästhetischen oder moralischen Gefühl, entscheiden muß. In diesem Sinne wäre auch gegen die metaphysischen Hypothesen nichts einzuwenden. Unwürdig eines wissenschaftlich sein wollenden Denkers aber ist es, wenn er den hypothetischen Ursprung seiner Sätze vergißt. Der Hochmuth und die Leidenschaftlichkeit, mit der solche versteckte Hypothesen vertheidigt werden, sind die gewöhnlichen Folgen des unbefriedigenden Gefühls, welches ihr Vertheidiger in den verborgenen Tiefen seines Gewissens über die Berechtigung seiner Sache hegt.

Continuität der Empfindungsqualitäten. Nur in einer Beziehung hat sich durch die Erfahrung doch eine gewisse Art der Übereinstimmung zwischen den Abstufungen der Qualitäten der Empfindung und denen der Eigenschaften ihrer Objecte herausgestellt. Wenn sich nämlich die eine continuirlich ändert, thut es in allen bekannten Fällen die andere auch. Daher bieten allgemein die Empfindungen, die durch Reizmittel von verschwindend kleinen Intensitäts- oder Qualitätsunterschieden hervorgerufen werden, verschwindend kleine Unterschiede dar, die bis zur Unwahrnehmbarkeit herabgehen können. Dasselbe gilt für Auge und Haut auch betreffs der örtlichen Unterschiede der gereizten Stelle. Dieses Gesetz ist für die Farbenempfindungen des Lichtes von verschiedener Wellenlänge zuerst von GRASSMANN<sup>1</sup> ausgesprochen worden, und bisher durch die Untersuchung der kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede in qualitativer, wie in localer Hinsicht bestätigt worden. In den Untersuchungen über die Wahrnehmungen der kleinsten Helligkeitsunterschiede, der kleinsten Farbenunterschiede, sowie in denen über die Erkennbarkeit kleinster Distanzen im Sehfelde in den §§ 18 und 21 finden sich die entsprechenden Thatsachen dargelegt, soweit sie der Lehre vom Sehen angehören.

Hypothesen über den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinneseindrücke. Die älteren Philosophen und Psychologen waren durchaus geneigt, alles, was in unseren sinnlichen Wahrnehmungsbildern ohne Nachdenken, ohne Besinnen augenblicklich und bei allen Individuen in gleicher Weise zu Stande kommt, unter den Begriff der Perception einzureihen und es als ein unmittelbares Product der organischen Einrichtungen des Nervensystems aufzufassen, dagegen die mögliche Mitwirkung auch sogenannter niedrigerer psychischer Processe, wie z. B. des Gedächtnisses und des Erinnerungsvermögens, dabei gänzlich zu vernachlässigen.

Dafs aber in der That die Vorstellung von der normalen Bedeutung oft wiederholter Perceptionen mit unabänderlicher Sicherheit blitzschnell und ohne das geringste Besinnen zu Stande kommen kann, dafür bietet das Verständniß der Muttersprache ein lehrreiches Beispiel. Angeboren ist uns diese Kenntniß nicht; wir haben auch unsere Muttersprache zweifellos gelernt, und zwar durch den Gebrauch, also durch häufig wiederholte Erfahrung. Kinder unserer Nation, die jenseits der Grenze unseres Vaterlandes geboren worden und unter fremdsprachigen Menschen aufgewachsen wären, würden eine andere Sprache erlernt haben und darin ebenso sicher geworden sein, wie wir in der unserigen. Dabei ist eine ausgebildete Sprache einer civilisirten Nation ein so reich entwickeltes Ausdrucksmittel der vielfältigsten und feinsten Schattirungen des Gedankens, dafs sie in dieser Beziehung sehr wohl mit dem Reichthum der körperlichen Formen der uns umgebenden Naturgebilde verglichen werden kann.

Das Beispiel der Sprache ist auch in anderer Beziehung lehrreich, weil es uns Aufschluß giebt über die Frage, wie solch sicheres und übereinstimmendes

<sup>1</sup> Siehe § 20, S. 335.

uns von Zeichen zu gewinnen ist, welches dem individuellen nur wie ein ganz willkürlich gewähltes wirken kann, wenn der Philolog Spuren des Zusammenhanges einzelner Wurzeln findet. Die Muttersprache wird nur an dem Gebrauch der Worte nicht immer wieder den normalen Namen eines Gegenstandes dieser gezeigt oder gereicht wird, und hört immer wieder der ihm sichtbaren Außenwelt mit dem gleichen Wort anhaftet sich in seinem Gedächtniß das Wort an die Sache, desto, je häufiger beide sich wiederholen. Die Wiederholung ist in allen Einzelheiten gleich zu sein, sondern der gleiche an eine Klasse unter einander ähnlicher Gegenstände heften ähnlicher Vorgänge. Dadurch entwickeln sich dann Namen aus der Masse von Anschauungsbildern, wobei der Umfang, in welchem dieselben Modificationen derselben gebraucht zu werden pflegt, den Gebrauch der Sprache feststellt und nur ausnahmsweise Definition unterstützt wird.

Wir, den wir aus alltäglicher Erfahrung kennen und der sich uns als des Wortschatzes jeder fremden Sprache, die wir später zunächst bekannt, daß die Bedeutung jedes Wortes sich öfter wiederholt, wir es anwenden oder anwenden hören; zwar noch die einzelnen Fälle, wo wir es haben anwenden erhalten. Später dagegen, wenn die Zahl dieser Fälle zu groß ist, daß wir sie alle einzeln mit den Nebenumständen und in denen sie eingetreten sind, aus unserer Erinnerung uns nicht nur das Gesamtergebniß unserer bisherigen Erfahrungen als bestimmte Wort diese bestimmte Reihe einander ähnlicher Vorgänge zu bedeuten pflegt; aber anzugeben, bei welchen einzelnen Gelegenheiten wir zu thun sind, auch nicht, warum wir es für die eine Modification bei einer anderen aber Anstand nehmen, dies zu thun.

Wir sehen Beobachtungen, daß wir durch häufige Wiederholung dazu gelangen können, eine regelmäßig immer wieder erscheinenden zwei verschiedenen Perceptionen, beziehlich Vorurtheil dem Klang eines Wortes und sichtbaren oder fühlbaren vorstellen und immer fester zu machen, die ursprünglich gar keinen Zusammenhang zu haben brauchen, und daß, wenn dies geschehen ist, Einzelnen anzugeben wissen, wie wir zu dieser Kenntniß welche einzelne Beobachtungen sie sich stützt.

Wir erfahren, daß wir nicht nur für unsere Muttersprache, sondern auch für fremde Sprachen einen Grad des Verständnisses erreichen können. Wir hören Nachsinnen und Überlegung im Augenblick den Sinn mit uns Sprechende uns mittheilen will, und daß wir im Stande sind, die mannigfaltigsten Modificationen seines Gedankens und Gefühls zu folgen. Wenn wir aber sagen sollen, wie wir zu dieser Kenntniß kommen, so können wir dies nur in der Form des allgemeinen Gesetzes angeben, wie wir immer gefunden haben, daß diese Worte in diesem

als eine allgemeine Regel der Wirkungsweise unseres

Gedächtnisses, daß sehr oft in gleicher Weise wiederholte und immer in derselben Art der Verbindung zusammengeschlossene Eindrücke unter übrigens gleichen Bedingungen eine viel dauerndere Spur ihrer selbst und ihrer Verbindung in uns hinterlassen und viel sicherer und schneller in dieser Verbindung wieder in das Bewußtsein treten, als solche, welche uns nur in zufälligen und wechselnden Verbindungen vorgekommen sind.

Dieselbe Regel bestätigt sich auch in einer außerordentlich großen Zahl anderer Fälle. Am ausnahmslosesten wird eine Verbindung zweier Beobachtungstatsachen sich immer wiederholen, wenn dieselbe durch ein Naturgesetz gefordert wird, welches entweder die Gleichzeitigkeit oder die regelmäßige Aufeinanderfolge derselben in bestimmter Frist verlangt. Durch einen gesetzlosen Zufall dagegen herbeigeführte Fälle von Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge werden sich zwar auch gelegentlich wiederholen können, aber nicht ausnahmslos; dazwischen werden sich Fälle mit anderem, und selbst solche mit entgegengesetztem Erfolge einmischen, welche dann dem ausschließlichen Übergewicht der einen Verbindung entgegenwirken und verhindern, daß die wechselnden Zufälligkeiten derselben oder überhaupt, was in der wechselnden Erscheinungsweise des Vorganges nicht Ausdruck einer bestimmten Gesetzmäßigkeit ist, sich ebenso sicher und unabänderlich festsetzen könne, wie das Gesetzmäßige.

Wenn wir eine Sprache lernen, so ist das, was uns darin als gesetzmäßig entgegentritt, nur eine von Menschen gewählte und eingehaltene Regel, der wir nicht einmal die Festigkeit und Unabänderlichkeit eines Naturgesetzes zuerkennen können. Dazu kommt, daß die Zeichen für sehr ähnliche Objecte durchaus nicht nothwendig selbst einander ähnlich zu sein brauchen. Im Gegentheil zeigen sie meist ganz unregelmäßige, sprungweise auftretende Verschiedenheiten. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn wir unter der Einwirkung außerordentlich viel zahlreicherer und unter sich ausnahmslos übereinstimmender Beobachtungen über das Verhalten der Naturkörper gegen einander und gegen unsere Sinnes- und Bewegungsorgane zu einer viel vollständigeren Kenntniß des normalen Verhaltens dieser Körper und ihrer Erscheinungsweise in verschiedenen Lagen und bei verschiedenen Bewegungen kommen, als sie durch die Sprache wiedergegeben werden kann. Für eine genaue Beschreibung der mannigfaltigen Sinneseindrücke, welche ein einziger Naturkörper, namentlich bei etwas unregelmäßiger oder verwickelter Gestalt, dem Auge und der Hand darbietet, ist die Sprache viel zu arm; und eine Beschreibung eines solchen Eindruckes in Worten würde eine ungeheuer weitläufige und zeitraubende Arbeit sein, die wir offenbar nicht auszuführen pflegen, wenn wir das Anschauungsbild eines solchen Objectes uns einprägen wollen. In diesen Fällen oder auch in solchen, wo gar keine Wortbeschreibung möglich ist, genügt uns der sinnliche Eindruck ohne Wortfassung, und wir wissen mit dessen Hülfe sogar die feinsten Eindrücke, wie die von menschlichen Gesichtszügen, wieder zu erkennen, gelegentlich nach sehr kurzer Betrachtung und nach langer Zwischenzeit.

In solchen Fällen wird kein Zweifel darüber sein können, daß wir den sinnlichen Eindruck, den uns das Object gemacht hat, mit hinreichend viel Einzelheiten im Gedächtniß behalten, um noch längere Zeit später eine bestimmte individuelle Physiognomie von der aller anderen Menschen sicher zu unterscheiden.

Wenn wir ein solches, nur durch sinnliche Eindrücke gegebenes Anschauungsbild eines bestimmten Objectes in uns tragen, pflegen wir dies als Kenntniß des Objectes im Gegensatz zu dem in Worte zu fassenden Wissen zu bezeichnen. Eine solche Kenntniß braucht sich nicht auf einzelne perspectivische Bilder des Objectes

kann auch die Gesammtheit der perspectivischen Bilder umfassen nach einander durch Betrachtung von verschiedenen Gesichtswerten können. In der That finden wir, daß wir von einem Bild eine Vorstellung ihrer körperlichen Form in uns aufnehmen, indem wir die Gesammtheit aller der einzelnen perspectivischen Bilder, die wir von einem Objecte aus verschiedenen Standpunkten aus dahin blickend gewinnen können, vertritt. Es ist die Gesammtheit der körperlichen Form des Objectes ausgerüstet mit einer Gesammtheit von perspectivischen Bildern, die wir bei der Ansicht von diesem Objecte haben, deutlich vorstellen, und in der That nehmen wir ein solches Bild unserer Erwartung nicht entspricht, wie wir erwarten, wenn durch die Änderung der Lage des Gegenstandes eine neue Körperform eintritt. Man denke nur daran, wie außerordentlich aufmerksam Beobachter gegen Zeichenfehler in Darstellungen von Pferden sich erweisen kann, oder gegen kleine Fehler in Zeichnungen, welche regelmäßige architektonische Gebilde darstellen. Man findet häufig genug Fälle vor, wo man eher einen kleinen Fehler in einer perspectivischen Zeichnung bemerkt, als einen gleich großen in dem Ganzen, welches die Theile der Zeichnung bilden, wenn eines derselben verändert wird.

Die körperliche Form eines festen Objectes eine Größe, die in ständigen Beziehungen zwischen ihren verschiedenen Theilen steht, als jedes einzelne perspectivische Bild derselben, ist daher bei bekannter Lagenänderung die Änderung der Ansicht sicher herzuleiten, weil dies unter dem Eindruck des räumlichen Vorstellungsbildes geschehen kann, welches die Gesammtheit aller einzelnen Flächenansichten zusammenfaßt, während eine einzelne Ansicht nicht die nöthigen Daten liefert, um eine ganz richtige Vorstellung von der Form des Ganzen und seiner verschiedenen Seiten her zu gewinnen. Die auf die festere Sicherheit gestützte Vorstellung erweist sich hier also auch als eine genauere Anschauung giebt.

Bei der Beschreibung der stereoskopischen Bilder noch eigen- zu erwähnen haben, welche dieses Verhältniß sehr augen- zeichnen, nämlich ein Paar stereoskopische Bilder mit etwas ver- schobenen Grenzlinien, z. B. eines regelmäßigen Polyeders oder eines anderen Körpers, hat, mißlingen die Versuche, das körperliche Bild aus den beiden zur Vereinigung zu bringen, oft im Anfang dadurch, daß die beiden Augen leicht auf nicht einander entsprechenden Stellen der Bilder wieder trennen, bis man die richtige körperliche Vorstellung des Objectes gewonnen hat. So wie diese gefunden ist, kann man die Bilder mit der größten Sicherheit und Schnelligkeit übereinander bringen. Hier bewährt sich also in der That die Gesammtheit der Bilder gleich als die Regel für die Vorstellung, nach welcher man zu führen hat, um fortdauernd auf correspondirenden Stellen der Bilder zu bleiben.

Die Kenntnisse der Bedeutung der Gesichtsbilder von einem Objecte zu gewinnen, indem zuerst gesammelt werden, ergiebt sich leicht, wenn man während sie mit den ihnen als Spielzeug dargebotenen, wie sie dieselben betasten, stundenlang von allen Seiten



betrachten, herumwenden, sie in den Mund stecken u. s. w., endlich sie herunterwerfen oder zu zerschlagen suchen und dies jeden Tag wiederholen. Man wird nicht daran zweifeln können, daß dies die Schule ist, in der sie das natürliche Verhalten der sie umgebenden Gegenstände kennen lernen, dabei auch die perspectivischen Bilder verstehen, ihre Hände gebrauchen lernen. Ebenso lehrt die Beobachtung jüngerer Kinder, daß sie in den ersten Wochen ihres Lebens diese Kenntnisse noch nicht haben. Wenn ihnen irgend eine instinktmäßige Kenntniß angeboren wäre, so sollte man erwarten, daß es in erster Linie die Kenntniß des Bildes der Mutterbrust sein müßte und die Kenntniß derjenigen Bewegungen, durch welche sie sich diesem Gesichtsbilde zuwenden könnten. Aber eine solche Kenntniß fehlt ganz offenbar. Man sieht, daß das Kind lebhaft wird, wenn es in die Stellung für das Säugen gebracht wird, und unruhig suchend den Kopf hin und her wendet, um die Brust zu finden, aber es wendet sich in den ersten Tagen ebenso oft von der Brust ab, wie ihr zu, obgleich es diese frei erblicken kann. Offenbar weiß es in diesem frühen Alter weder das Gesichtsbild, noch die Richtung seiner Bewegungen zu deuten.

Ebenso oft sieht man, daß ein Kind von ein oder zwei Wochen, dem man eine Kerzenflamme vorhält, unruhig wird und die Augen hin und her wendet, offenbar mit der Absicht, die helle Flamme anzustarren. Sobald es die richtige Stellung der Augen gefunden hat, folgt es langsameren Bewegungen der Flamme mit dem Blicke. Aber das Kind weiß im Anfange nicht, sicher mit dem Blick eine etwas seitlich im Gesichtsfelde befindliche Flamme zu erreichen. Nach zwei oder drei Wochen aber gelingt ihm dies verhältnißmäßig schnell; erst viel später gelingt das Greifen mit der Hand nach einem gesehenen Gegenstande.

Ich folgere daraus, daß die Deutung auch einiger der einfachsten und für das menschliche Kind wichtigsten Gesichtsbilder von ihm erlernt werden muß und nicht durch angeborene Organisation von vornherein ohne vorausgehende Erfahrung gegeben ist. Wie weit ein ähnlicher Schluß auf neugeborene Thiere ausgedehnt werden darf, brauchen wir hier nicht zu entscheiden. Die Seelenthätigkeiten der Thiere sind vielleicht durch ihre Instincte auf engere Wege beschränkt, die das Thier auf engerem Gebiete sicherer sich bewegen lassen, als es dem freier wählenden Menschen für seine spätere Entwicklung dienlich wäre.

Ich würde diese bisher angeführten Verhältnisse nicht so ausführlich, wie ich gethan, besprochen haben, wenn mir nicht hierbei ein hartnäckiges und sehr verbreitetes Vorurtheil entgegengetreten wäre, welches, wie mir scheint, seinen Ursprung von einer abweichenden Auffassung der Begriffe: Anschauen und Denken herleitet.

Wie ich schon oben hervorgehoben habe, wird der Terminus „Denken“ vorzugsweise auf diejenigen Vorstellungsverbindungen angewendet, bei denen der Vorstellende in bewußter Weise die einzelnen Sätze, aus denen der Schluß gezogen werden kann, sich vergegenwärtigt, auf ihre Zuverlässigkeit prüft und dann zum Schluß verbindet. Dagegen pflegt man als Anschauung eine solche Entstehung von Vorstellungen zu bezeichnen, bei denen in bewußter Weise nur der sinnliche Eindruck percipirt wird und danach die Vorstellung von der Gegenwart des Objects in das Bewußtsein springt, ohne daß weitere Zwischenglieder des Vorstellungskreises zum Bewußtsein kommen. In der That kommt es wesentlich auf diesen Unterschied in dem klaren Bewußtwerden der Zwischensätze an, wenn es sich darum handelt, die Logik im engeren Sinne aufzubauen, d. h. zu untersuchen, wie die Vordersätze beschaffen sein müssen, damit sie die Berechtigung zu einem bindenden Schlusse

gabe handelt es sich in der That darum, daß alle Vorder-vollständig klarer Weise in das Bewußtsein erhoben und und solche Glieder der Vorstellungskette, die einer der-g nicht mehr zugänglich sind, kommen für die logische t, oder höchstens als axiomatische Vordersätze, die man us dem Vorrath des Gedächtnisses annimmt.

ar falsch, behaupten zu wollen, daß in unserem Bewußt-räumen außer denen, die aus sinnlichen Perceptionen auf

Denkens entstanden wären. Die oben erwähnten Beispiele hen, von Fertigkeiten, vom wachsenden Verständniß der ier That, daß solche Kenntnisse ohne absichtliches Nach-können, und daß dieselben jeden Grad der Sicherheit innen, ohne daß die Möglichkeit übrig bleibt, nachträglich hen Induction durch die Erinnerung an die einzelnen Fälle welchen Zeiten man entsprechende Beobachtungen gemacht außerdem zum großen Theil gar keine hinreichend specielle zulassen, sondern in voller Genauigkeit nur durch die en sinnlichen Eindruck wiedergegeben werden können.

h, daß auch Gedächtnisbilder reiner sinnlicher Eindrücke nverbindungen benutzt werden können, ohne daß es noth-iglich ist, dieselben in Worten zu beschreiben und sie fassen. Offenbar kommt ein großer Theil der empirischen Verhaltens der uns umgebenden Objecte in dieser Weise ränge einer solchen, dem inneren Wesen eines Schlusses g sinnlicher Anschauungen scheint mir die vorher be-der vielen perspektivischen Ansichten eines Objects in die form in drei Dimensionen ein besonders anschauliches

That vertritt die lebhafteste Vorstellung der körperlichen perspektivischen Ansichten. Die letzteren lassen sich bei metrischer Einbildungskraft aus ihr wieder herleiten. Ja ahrgenommene Ansichten, wie sie bei der Anlegung von n Richtungen gewonnen werden könnten, sind als Folge-laraus ableitbar. Und andererseits, wenn wir nach dem ung eines nach drei Dimensionen ausgedehnten Körpers zu finden außer den Vorstellungen von der Reihe der Gesichtsbilder, mit eventueller Vorstellung solcher, die en könnten.

en wir behaupten, die Vorstellung der stereometrischen jects spielt ganz die Rolle eines aus einer großen Reihe r zusammengefaßten Begriffs, der aber selbst nicht noth-ausdrückbare Definitionen, wie sie der Geometer sich i nur durch die lebendige Vorstellung des Gesetzes, nach Bilder einander folgen, zusammengehalten wird.

helohe Anschauung der normalen Folge von gesetzlich n durch hinreichend reiche Erfahrung gewonnen werden i gesucht.

eser Proceß, der in seinen wesentlichen Theilen, soweit r durch unwillkürliche und unbewußte Action unseres d, dennoch im Stande ist, Vorstellungsverbindungen in

uns hervorzubringen, deren Ergebnisse in allen wesentlichen Zügen mit denen des bewußten Denkens übereinstimmen. Wie oben schon erwähnt, stärken sich gegenseitig die häufig in gleichartiger Weise wiederholten und sich in gleicher Weise folgenden Eindrücke, die wir durch unsere Sinne empfangen haben. Daneben müssen die zufällig wechselnden zurücktreten und schließlich der Regel nach verlöschen, wenn ihr Eindruck nicht durch besondere Affecte, die sich mit ihnen verbunden hatten, hervorgehoben und vertieft worden ist.

Wie schon oben betont worden ist, werden mit der Zeit dadurch alle Theile der wahrgenommenen Erscheinungen verstärkt werden müssen, die der Einwirkung eines Naturgesetzes bei dem beobachteten Vorgange entsprechen. Die Vorstellung, daß die in ihren Anfängen beobachtete Erscheinung nun auch in derselben Weise weiter verlaufen wird, wie wir es bisher immer percipirt haben, wird um so sicherer eintreten, je häufiger und ausnahmsloser wir gleichen Verlauf derselben schon früher wahrgenommen haben.

Eine solche Erwartung entspricht dem Resultat eines Inductionsschlusses. Ein solcher kann täuschen, wenn er auf eine ungenügende Zahl von beobachteten Fällen gestützt ist. Daß auch Thiere dergleichen Inductionsschlüsse ziehen, und zwar viel öfter falsche, als es bei den Menschen vorkommt, erkennt man an ihrem Verhalten oft genug, z. B. wenn sie zurückschrecken vor irgend einem Gegenstande, der ähnlich aussieht, wie ein anderer, an dem sie sich bei einer früheren Gelegenheit verbrannt haben.

Ich habe in der früheren Auflage dieses Buches diese Art von Inductionsschlüssen, welche auf die Kenntniß des regelmäßigen Verhaltens der uns umgebenden Naturobjecte gebaut sind, als unbewußte Schlüsse bezeichnet, und finde den Namen auch jetzt noch bis zu einer gewissen Grenze zulässig und bezeichnend, da diese Associationen von Wahrnehmungen im Gedächtniß in der That meistens so vor sich gehen, daß man zur Zeit, wo sie entstehen, nicht auf ihr Entstehen aufmerkt, höchstens in der Weise, daß man sich erinnert, denselben Vorgang schon öfter beobachtet zu haben, ihn also als einen schon bekannten anerkennt. Höchstens bei den ersten Wiederholungen seltenerer Beobachtungen dieser Art wird die Erinnerung an die früheren Fälle mit ihren Nebenumständen deutlicher hervortreten können, so daß der psychische Proceß hierbei eine größere Analogie mit bewußtem Denken gewinnen würde.

Inductionsschlüsse sind niemals so zuverlässig, wie wohl geprüfte Schlüsse des bewußten Denkens. Bewußtes wissenschaftliches Denken unterscheidet sich von der durch gehäufte Erfahrung gesammelten Kenntniß gewisser Gegenstände oder Vorgänge dadurch, daß bei jenem zunächst eine möglichst vollständige Übersicht aller bei dem Urtheil in Betracht kommenden Fälle herbeizuschaffen versucht wird, sei es durch Sammlung schriftlicher Nachrichten oder durch Sammlung neuer Beobachtungen, eventuell absichtlich herbeigeführter Beobachtungen, d. h. Versuche. Bei letzteren ist es rathsam, vorzugsweise solche Fälle aufzusuchen, die sich in den Vorbedingungen von allen bisher beobachteten anderen unterscheiden. Die dadurch erreichbare Vollständigkeit in der Kenntniß der mannigfaltigen Beispiele und der Bedingungen, unter denen sie so oder anders verlaufen, wird in der Regel durch die ungeordnete Zufälligkeit der alltäglichen Erfahrungen nicht erreicht werden, oder höchstens bei solchen Fällen, die sich in ungeheurer Zahl von Wiederholungen und mit verhältnißmäßig wenigen Abänderungen und Verwickelungen darbieten.

Falsche Inductionen bei der Deutung unserer Perceptionen pflegen wir als Sinnestäuschungen zu bezeichnen. Sie sind meist verursacht durch

duction, deren häufigste Veranlassung darin zu suchen ist, daß gewisse Arten des Gebrauches unserer Sinnesorgane nämlich, wobei wir erkennen, daß wir durch sie das sicherste Urtheil, beziehlich Schätzung über die beobachteten Objecte, Verhältnisse und Beschaffenheit uns bilden können. So pflegen wir die Objecte, welche unsere Aufmerksamkeit erregen, auf den besten Sehsinn in beiden Augen abzubilden, dabei aber die Punkte und Linien, die das Object darbietet, mit dem durch wir sowohl die Reihe aller Einzelheiten kennen lernen als die Ausbildung störender Nachbilder schützen. Wir werden die Reihe solcher Regelmäßigkeiten in den Bewegungen des Auges, welche nicht auf einem zwingenden Mechanismus der Muskeln beruhen, sondern von jedem Beobachter, wenn er die entsprechenden Innervationen zu geben gelernt hat, willkürlich geändert werden läßt sich erweisen, daß die Einhaltung der normalen Bewegungen nur ein Ergebniss der Gewöhnung ist und nicht etwa ein unseres Körpers vorgebildeter Zwang. Allerdings sind solche Bewegungen gewurzelt und nicht ganz leicht zu überwinden. Die von der Bewegung erfordern entschieden mehr Anstrengung und ist aber eine gemeinsame Eigenthümlichkeit aller ungewohnten Muskeln, weil dieselben meist durch unzweckmäßige, einander eher anstrengendere Innervationen hervorgebracht zu werden pflegen und wohl eingeübten Bewegungen thun.

Störungen und Bewegungen unserer Sinnesorgane kommen nun gewöhnliche Perceptionen zu Stande, für welche wir keine Bedeutung haben. Dann entstehen also falsche Deutungen, wenn man im Allgemeinen die Regel aufstellen, daß bei Bewegung der Sinnesorgane Anschauungen entstehen von der Art, wie sie vorhanden sein müßten, um bei derselben Blick-Beobachtungsweise dieselben Perceptionen hervorzubringen. Man kann auch die Anschauungen, welche sich bilden, wenn die das Auge fallen, von ihrem geradlinigen Wege abgelenkt werden durch Ablenkung und Brechung geschehen kann, nur daß wir in der Regel eher als solche erkennen; aber das Bild, was sich uns als eines Gegenstandes oder einer scheinbaren Ausbreitung von Licht vorwiegen, wie sie vorhanden sein müßte, um uns bei ungestörtem objectiven Lichtes in das Auge dieselben Gesichtsbilder

dieser Art werden sich im weiteren Verfolg dieser Untersuchungen. Ihre Erklärungen werden sich besser bei den einzelnen Fällen unter genauer Beschreibung der Bedingungen, unter welchen eintreten. Physiologisch sind diese Erscheinungen, wenn man die normalen Beobachtungsmethoden des Auges kennen lernen, meistens nachweisen läßt, daß sie auch als diejenigen sind, welche die genauesten Schätzungen der Dimensionen, die genauesten Vergleichen der Farben und Helligkeiten, die genaue und sichere Beurtheilung der interessirenden Gegenstände.

Die Täuschung bei solchen Gelegenheiten betrifft, so kann

derselbe sehr verschieden sein. Man denke z. B. an die Bilder, welche ein guter ebener Planspiegel zurückwirft, der an der Wand hängt, so daß man nicht dahinter sehen kann. Ein solcher giebt eine der vollkommensten optischen Täuschungen, die man sich denken kann, und doch werden selbst Thiere selten durch ein Spiegelbild zu einem Irrthum verleitet; Kinder blicken, wenn sie können, wohl einen Augenblick nach der Hinterseite des Spiegels und amüsiren sich an dem Bilde und seinen Bewegungen, aber begreifen verhältnißmäßig schnell, daß es eine Täuschung sei, die nicht der Wirklichkeit entspricht, und lernen das Spiegelbild bald als ihr eigenes Abbild auffassen.

Um die Täuschung kurze Zeit zu unterhalten, muß man schon die Ränder des Spiegels gut verstecken und verhindern, daß der Beobachter sich selbst gespiegelt sehe.

Die meisten anderen Sinnestäuschungen werden gewöhnlich schnell als solche entdeckt, weil der Beobachter sich bewußt ist, eine ungewöhnliche Art der Beobachtung anzuwenden, von der aus er geneigt ist, in die normale, ihm geläufigere überzugehen, in der die Täuschung schwindet und als solche erkannt wird. Nur wenn dazu keine Zeit ist, tritt wohl ein wirklicher Irrthum ein, der einen Augenblick dauert, z. B. bei den Lichtblitzen, die ein Stoß gegen das Auge erregt.

Deshalb erscheinen die meisten Sinnestäuschungen nur in der Weise, daß man bemerkt, man habe ein der Wirklichkeit nicht ganz entsprechendes Bild vor sich, und daß man nun dieses Bild vergleicht mit demjenigen, welches abgeänderte Objecte bei richtigem Sehen geben würden. Die besondere Art dieses Bildes aber kann man nur beschreiben oder im eigenen Gedächtniß festhalten, indem man sich oder Anderen die Objecte beschreibt, welche da sein müßten, um dem normalen Auge ein ähnliches Bild zu geben. Dann ist sogar die Form der Beschreibung: „Ich sehe das durch die Täuschung veränderte Object“ eine ganz richtige Beschreibung der Empfindung, die der Beobachter hat, und meistens wird er sich selbst bei geringer Erfahrung dabei ganz klar über die Täuschung sein, die sich ihm darbietet.

Für alle subjectiven Erscheinungen, deren Ursache an einem bestimmten Ort im Augapfel haftet, ist die Bewegung des Phänomens mit dem Blick bei Bewegung des Auges ein Kennzeichen, welches sehr schnell aufgefaßt wird und die subjective Natur aufdeckt. Da nun unser Interesse überwiegend der Erkenntniß der umgebenden Außenwelt zugewendet ist, so wenden wir unsere Aufmerksamkeit gewohnheitsmäßig von solchen subjectiven Erscheinungen ab, die sich gleich als subjectiv verrathen, und es tritt sogar eine gewisse Schwierigkeit ein, dieselben zu beobachten und die ihnen entsprechende Intention der Aufmerksamkeit zu finden. Verstärkt wird diese Schwierigkeit allerdings in hohem Maße durch die Steigerung der Reizbarkeit, welche in dauernd beschatteten Stellen der Netzhaut, beziehlich die Verminderung derselben, die in dauernd beleuchteten Stellen der Netzhaut eintritt. Hauptsächlich dieser Vorgang ist es, auf welchen das allmälige Verlöschen der im Auge streng fest liegenden Bilder zurückzuführen zu sein scheint.

Ich habe schon in § 15 hervorgehoben, wie sehr es dabei darauf ankomme, die Beschattung zwischen verschiedenen Netzhautstellen wechseln zu lassen. Von den Phänomenen des Sehnerveneintritts und der Schwierigkeit, ihn zu sehen, werden wir in § 20 zu handeln haben.

Eine eigenthümliche Rolle spielt hierbei noch die Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Theil der vorliegenden Perceptionen zu concentriren. Einen gewissen Einfluß hat dabei eine Art willkürlicher Anstrengung. Ich ver-

weise hierbei auf die unten in § 28 besprochenen Versuche mit momentaner Beleuchtung eines vorher vollständig verdunkelten Feldes, auf welchem ein Blatt mit großen gedruckten Buchstaben ausgebreitet war. Vor der elektrischen Entladung erblickte der Beobachter nichts als einen mäßig erhellten Nadelstich, der das Papier durchbohrte. Dieser wurde fest fixirt und diente zur ungefähren Orientirung über die Richtungen in dem dunklen Felde. Die elektrische Entladung erleuchtete das bedruckte Blatt für einen untheilbaren Augenblick, in welchem das Bild desselben sichtbar wurde und eine sehr kurze Zeit als positives Nachbild stehen blieb. Die Dauer der Wahrnehmbarkeit des Bildes war also auf die Dauer des Nachbildes beschränkt. Augenbewegungen von meßbarer Gröfse konnten während der Dauer des Funkens nicht ausgeführt werden, und auch solche während der kurzen Dauer des Nachbildes konnten dessen Lage auf der Netzhaut nicht mehr ändern. Dessenungeachtet fand ich es möglich, mir vorher vorzunehmen, welchen Theil des dunklen Feldes seitlich von dem fortdauernd fest fixirten hellen Nadelstich ich im indirecten Sehen wahrnehmen wollte, und erkannte bei der elektrischen Beleuchtung dann wirklich einige Buchstabengruppen jener Gegend des Feldes, meist aber mit dazwischenbleibenden Lücken, die leer blieben. Nach starken Blitzen hatte ich in der Regel mehr Buchstaben gelesen, als nach schwächeren. Die Buchstaben des bei Weitem größten Theile des Feldes waren dagegen nicht zur Wahrnehmung gekommen, auch nicht immer die in der Nähe des Fixationspunktes. Bei einer folgenden elektrischen Entladung konnte ich, immer den Nadelstich fixirend, meine Wahrnehmung auf eine andere Gegend des Feldes richten und dann dort eine Gruppe von Buchstaben lesen.

Diese Beobachtungen erweisen, wie mir scheint, dafs man durch eine willkürliche Art von Intention, auch ohne Augenbewegungen, ohne Änderungen der Accommodation die Aufmerksamkeit auf die Empfindungen eines bestimmten Theils unseres peripherischen Nervensystems concentriren, und sie gleichzeitig von allen anderen Theilen desselben ausschließen kann.

Bei der gewöhnlichen Art des Beobachtens richten wir allerdings auch die Aufmerksamkeit willkürlich besonderen Theilen des Gesichtsfeldes oder des Gebietes der Perceptionen überhaupt zu. Dabei folgt aber Richtung des Blicks und Accommodation der Intention der Aufmerksamkeit, und es könnte also diese Erfahrung so ausgelegt werden, dafs die Aufmerksamkeit eben stets an die Netzhautgrube geknüpft sei, und das die Willkürlichkeit ihrer Richtung nur durch die Willkürlichkeit der Augenbewegungen bedingt sei. In der That ist es recht schwer und erfordert vielfache Übung, wenn man lernen, will die Aufmerksamkeit den Bildern der seitlichen oder peripherischen Theile der Netzhaut zuzuwenden, wie dies mehr oder weniger fast alle die bisher beschriebenen Phänomene der genannten Art erkennen lassen. Als solche Bedingungen, unter denen dieselben leichter die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind folgende zu bemerken:

1. Höhere Intensitäten der Phänomene, namentlich wenn dieselben die Sichtbarkeit der reellen Objecte beeinträchtigen.

2. Schneller Wechsel des Helligkeitsunterschiedes zwischen nahe benachbarten Theilen des Feldes, daher auch Bewegung begrenzter Flächenstücke im Felde, oder auch Bewegung von Schatten durch Wechsel der Beleuchtungsrichtung, wie bei den entoptischen Objecten. Wechsel der Helligkeit bringt, wie schon bemerkt, wegen der abschwächenden Wirkung der negativen Nachbilder stets einen intensiveren Eindruck hervor, als constante Intensität der Beleuchtung. Das könnte einen Theil der dadurch erfolgenden Vermehrung der Aufmerksamkeit erklären. Der unmittelbare Eindruck



im Bewußtsein ist aber mehr, daß jeder schnelle Wechsel im Seitentheile des Gesichtsfeldes die Frage nach dem Grunde der bemerkten Änderung anregt und daher gewöhnlich der Blick schnell nach der Stelle gerichtet wird, wo man die Veränderung bemerkt hat.

3. Das objective Interesse hat überhaupt einen mächtigen Einfluß auf die Lenkung der Aufmerksamkeit und kann sie fast vollständig beherrschen. Man denke an das Verhalten beim Lesen, wo Blick, Accommodation und Aufmerksamkeit gleichzeitig den Worten der begonnenen Zeile folgen und von Zeile zu Zeile weitergehen ohne Unterbrechung und Störung, wenigstens wenn das Gelesene interessant ist.

Dieser Einfluß des objectiven Interesses fällt aber größtentheils mit dem Einfluß des Willens zusammen, da sich Willensintentionen am leichtesten und häufigsten an Wünsche, d. h. Interessen, anzuknüpfen pflegen.

Daß übrigens die willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit eine ermüdende Leistung des Gehirns ist, lehrt die alltägliche Erfahrung, auch wenn keinerlei Muskelarbeit damit verbunden ist.

433 Dieselbe Schwierigkeit, welche wir finden, Empfindungen subjectiver Art zu beobachten, d. h. solche, welche durch innere Ursachen hervorgerufen sind, dieselbe tritt auch ein, wenn zusammengesetzte Empfindungen, welche stets in derselben Verbindung durch irgend ein einfaches Object erregt zu werden pflegen, in ihre einzelnen Bestandtheile aufgelöst werden sollen. In solchen Fällen lehrt uns die Erfahrung ein zusammengesetztes Aggregat von Empfindungen als das Zeichen für ein einfaches Object kennen und, gewöhnt, den Empfindungscomplex als ein zusammengehöriges Ganze zu betrachten, vermögen wir in der Regel nicht ohne äußere Hilfe und Unterstützung uns der einfachen Bestandtheile eines solchen bewußt zu werden. Beispiele dieser Art werden wir im Folgenden viele kennen lernen. Die Wahrnehmung der Richtung zum Beispiel, in welcher sich ein Object vom Auge befindet, beruht auf der Combination derjenigen Empfindungen, nach denen wir die Stellung des Auges beurtheilen, und der Unterscheidung derjenigen Netzhauttheile, welche vom Licht getroffen sind, von den nicht getroffenen. Die Wahrnehmung der körperlichen Form eines nach drei Dimensionen ausgedehnten Objects beruht auf der Combination zweier verschiedener perspectivischer Ansichten von beiden Augen. Die scheinbar einfache Qualität des Glanzes einer Fläche beruht auf verschiedener Färbung oder Helligkeit ihres Bildes in beiden Augen. Es sind diese Sätze theoretisch gefunden und können durch passende Versuche erwiesen werden, aber es ist meist sehr schwer, oft unmöglich, durch directe Beobachtung und Analyse der Empfindungen allein dies zu finden. Selbst bei viel zusammengesetzteren Empfindungen, die nur häufig wiederkehrenden zusammengesetzten Objecten entsprechen, wird die Analyse der Empfindung durch bloße Beobachtung desto schwerer, je häufiger dieselbe Zusammensetzung wiedergekehrt ist und je mehr wir uns gewöhnt haben, sie als das normale Zeichen der wirklichen Beschaffenheit des Objects zu betrachten. Als Beispiel dazu möge die bekannte Erfahrung dienen, daß die Farben einer Landschaft viel glänzender und bestimmter heraustreten, wenn man sie bei schiefer und umgekehrter Lage

als bei der gewöhnlichen aufrechten Haltung. Bei der Beobachtung suchen wir nur die Objecte als solche

Wir wissen, daß grüne Flächen aus einer gewissen veränderten Farbenton erscheinen; wir gewöhnen uns abgesehen und lernen das veränderte Grün ferner noch mit der entsprechenden Farbe naher Objecte zu fernen Objecten, fernen Bergreihen bleibt von der erkennen, sie wird meist durch die Farbe der leckt. Diese unbestimmt blaugraue Farbe, an welche die Feld des Himmels oder das rothgelbe der Abend- das lebhaftes Grün der Wiesen und Wälder grenzt, 434 durch den Contrast sehr ausgesetzt. Es ist für uns die selbde Farbe der Ferne, deren Unterschied zu ver-

bei verschiedenen Beleuchtungen wir wohl genauer ihre wahre Beschaffenheit nicht bestimmen, da wir es Object zu übertragen haben und wir eben ihre eist kennen. So wie wir uns aber in ungewöhnliche B. unter dem Arme oder zwischen den Beinen durch- die Landschaft als ein plattes Bild, theils wegen der ihres Bildes im Auge, theils weil die binoculare Be- ung, wie wir unten sehen werden, ungenauer wird. , daß bei umgekehrtem Kopfe die Wolken richtige während die Objecte der Erde als ein Gemälde auf cheinen, wie sonst die Wolken am Himmel. Damit ben ihre Beziehung zu nahen oder fernen Objecten n in ihren eigenthümlichen Unterschieden entgegen.<sup>1</sup> , ohne Mühe, daß das unbestimmte Blaugrau der ich gesättigtes Violett ist, daß das Grün der Vege- i Blaugrün und Blau in jenes Violett übergeht u. s. w. ed scheint mir nur darauf zu beruhen, daß wir die eichen für die Beschaffenheit von Objecten betrachten, erschiedene Empfindungen und wir deshalb ihre eigen- , unbeirrt durch andere Rücksichten, genauer auffassen. rch die Beziehung der Empfindungen auf äußere ion der einfachsten Verhältnisse der Empfindungen ird sich namentlich auch in der Schwierigkeit zeigen, laren Doppelbilder wahrnehmen, wenn dieselben als n äußeren Objects aufgefaßt werden können.

brungen können wir im Gebiete anderer Sinnes- er Weise machen. Die Empfindung der Klangfarbe ch anderwärts<sup>2</sup> gezeigt habe, zusammengesetzt aus ndungen seiner einzelnen Partialtöne (Grundton und

O. N. ROOD, in *Silliman Journal* (2) XXXII, p. 184—185, 1861.  
n den *Tonempfindungen*. Braunschweig, 1. Aufl. 1862. 4. Aufl. 1877.

harmonische Obertöne), aber es ist außerordentlich schwer, die zusammengesetzte Empfindung des Klanges in diese ihre Bestandtheile aufzulösen. Die Tastempfindung des Nassen ist zusammengesetzt aus der der Kälte und des leichten Gleitens über die Oberfläche. Wenn wir deshalb unvermuthet ein kaltes glattes Metallstück berühren, glauben wir oft, etwas Nasses berührt zu haben. Beispiele dieser Art würden sich noch viele häufen lassen. Sie alle zeigen, daß wir außerordentlich gut eingeübt sind, aus unseren Sinnesempfindungen die objectiven Beschaffenheiten der Objecte der Außenwelt zu ermitteln, in der Beobachtung isolirter Empfindungen aber viel weniger sicher sind, und daß uns die eingeübte Beziehung auf die Außenwelt sogar hindert, die reinen Empfindungen uns deutlich zum Bewußtsein zu bringen.

435. Auch ist dies nicht bloß für die qualitativen Unterschiede der Empfindung geltend, es gilt ebenso für die Wahrnehmung räumlicher Verhältnisse. Die Bewegung eines gehenden Menschen zum Beispiel ist uns ein vertrauter und gewohnter Anblick. Wir betrachten sie als zusammenhängendes Ganze und werden uns höchstens ihrer auffallendsten Einzelheiten bewußt. Es gehört große Aufmerksamkeit dazu und eine besondere Wahl des Gesichtspunkts, um die senkrechten und seitlichen Schwankungen des Körpers eines Gehenden zu erkennen. Wir müssen passend gelegene Punkte oder Linien des Hintergrunds wählen, mit dem wir die Lage seines Kopfes vergleichen. Man betrachte aber einmal ferne gehende Menschen durch ein astronomisches Fernrohr, welches umgekehrte Bilder zeigt, welch ein seltsames Hüpfen und Wiegen des Körpers die Gehenden hervorbringen. Dabei hat man gar keine Schwierigkeiten mehr, die einzelnen Schwankungen des Körpers und manche andere Einzelheiten des Ganges, namentlich auch die individuellen Verschiedenheiten und deren Grund zu erkennen, nur weil dieser Anblick nicht mehr der alltäglich gewohnte ist. Dagegen tritt im umgekehrten Bilde der Charakter des Ganges, ob er leicht oder schwerfällig, würdevoll oder anmuthig ist, nicht mehr so gut hervor, wie im aufrechten.

Es kann unter diesen Umständen oft recht schwer werden, zu beurtheilen, was in unseren durch den Gesichtssinn gewonnenen Anschauungen unmittelbar durch die Empfindung, und was im Gegentheile durch Erfahrung und Einübung bedingt ist. An diese Schwierigkeit knüpft sich auch der hauptsächlichste principielle Gegensatz, welcher zwischen verschiedenen Forschern in diesem Gebiete besteht. Die einen sind geneigt, dem Einfluß der Erfahrung einen möglichst breiten Spielraum einzuräumen, namentlich alle Raumanschauung daraus herzuleiten; wir können diese Ansicht als die empiristische Theorie bezeichnen. Die andern müssen allerdings den Einfluß der Erfahrung für eine gewisse Reihe von Wahrnehmungen zugeben, glauben aber für gewisse, bei allen Beobachtern gleichförmig eintretende elementare Anschauungen ein System von angeborenen und nicht auf Erfahrung begründeten Anschauungen, namentlich der Raumverhältnisse, voraussetzen zu müssen. Wir dürfen diese letztere Ansicht im Gegensatz zur

nativistische Theorie der Sinneswahrnehmungen

es sind, wie ich glaube, folgende Grundsätze festzu-

nen der Vorstellung beschränken auf das Erinnerungs-  
 cten, welches von keinen gegenwärtigen sinnlichen  
 : ist, den der Anschauung auf die von den bezüg-  
 dungen begleitete Wahrnehmung, den der Perception  
 auung, in der nichts enthalten ist, was nicht aus den  
 igen sinnlichen Empfindungen hervorgeht, also eine  
 auch ohne alle Erinnerung an früher Erfahrenes sich  
 unächst klar, daß ein und dieselbe Anschauung in sehr  
 von den entsprechenden sinnlichen Empfindungen  
 also Vorstellung und Perception in den verschiedensten  
 Anschauung verbinden können.

einem bekannten Zimmer befinde bei hellem Sonnen- 436  
 ine von sehr energischen Empfindungen reichlich be-  
 demselben Raum werde ich Abends in der Dämmerung  
 e erkennen können, namentlich die Fenster, aber was  
 me, schmilzt mit meinen Gedächtnisbildern, die das  
 sammen, daß ich immer noch im Stande sein werde,  
 er umher zu bewegen und Gegenstände, die ich suche,  
 ich von ihnen nur ein schattenhaftes Bild erhaschen  
 vorgängige Kenntnifs durchaus ungenügend wäre, sie  
 kann ich mich in demselben Raume in absolutem  
 ich doch, vermöge der Erinnerung an die früher von  
 bilder in ihm zurechtfinden, so daß das Anschauungs-  
 re Beschränkung des sinnlichen Materials endlich auf  
 ild zurückgeführt werden und in dieses allmählig  
 e Bewegungen werden allerdings um so unsicherer,  
 o ungenauer werden, je mehr das sinnliche Material  
 wird kein eigentlicher Sprung stattfinden, sondern  
 ung werden sich fortdauernd ergänzen, nur in ver-

vir ein solches Zimmer bei vollem Sonnenschein be-  
 ichte Ueberlegung, daß auch dann ein großer Theil  
 es auf Momenten der Erinnerung und Erfahrung  
 gewöhnung an die perspectivischen Verziehungen der  
 er Körper und an die Form der Schlagschatten ist  
 hrer Form und ihrer Größe von beträchtlichem  
 r sehen werden. Schließen wir, während wir das  
 uge, so glauben wir es nicht weniger deutlich und  
 en, als mit zwei Augen, und doch würde uns nun  
 ild gegeben werden, wenn alle Punkte des Zimmers

so verschoben würden, daß sie ihre Entfernung vom Auge beliebig änderten, aber auf denselben Visirlinien blieben.

Während wir also in Wahrheit in einem solchen Falle eine äußerst vieldeutige sinnliche Erscheinung vor uns haben, geben wir ihr doch eine ganz bestimmte Auslegung, und es ist gar nicht leicht, sich dessen bewußt zu werden, daß das einäugige Bild eines solchen wohlbekannten Gegenstandes eine viel mangelhaftere Wahrnehmung bedingt, als das der beiden Augen. So ist es auch, wenn ungeübte Beobachter stereoskopische Photographien betrachten, oft genug schwer herauszubringen, ob sie die eigenthümliche Täuschung, die das Instrument giebt, erkennen oder nicht.

Wir sehen also, wie hierbei die Erinnerungsbilder aus früheren Erfahrungen zusammenwirken mit gegenwärtigen Sinnesempfindungen, um ein Anschauungsbild hervorzubringen, welches sich unserem Wahrnehmungsvermögen mit zwingender Macht aufdrängt, ohne daß darin für das Bewußtsein sich deutlich trennt, was durch Erinnerung, was durch gegenwärtige Wahrnehmung gegeben ist.

Noch schlagender ist der Einfluß des Verständnisses der Sinnesempfindungen, wenn in einzelnen Fällen, namentlich bei unvollkommener Beleuchtung ein Gesichtsbild im Anfange unverständlich ist, weil wir ihm nicht die richtigen Tiefendimensionen zu geben wissen, wenn wir z. B. irgend ein fernes Licht für nah, oder ein nahes für fern halten. Plötzlich fällt uns ein, was es ist, sogleich entwickelt sich unter dem Einflusse des richtigen Verständnisses auch das richtige Anschauungsbild in seiner vollen Energie, und wir sind nicht im Stande, von diesem zu der früheren unvollkommenen Anschauung zurückzukehren.

Sehr häufig kommt dies namentlich bei complicirten stereoskopischen Zeichnungen\* von Krystallformen und anderen vor, die in vollkommener sinnlicher Klarheit zur Anschauung kommen, sobald es gelungen ist, das richtige Verständniß erst einmal zu gewinnen.

Dergleichen Erfahrungen, die jeder Leser gelegentlich gemacht haben wird, beweisen, daß die aus der Erfahrung hergeleiteten Momente in den Sinneswahrnehmungen sich mit eben solcher zwingenden Kraft geltend machen können, wie die aus gegenwärtigen Empfindungen hergeleiteten, und es ist dies auch von allen den Beobachtern, die sich eingehend mit der Theorie der Sinneswahrnehmungen beschäftigt haben, immer zugegeben worden, selbst von denen, welche geneigt sind, der Erfahrung so wenig Spielraum als möglich, einzuräumen.

Daher muß jedenfalls die Möglichkeit zugegeben werden, daß auch in dem, was dem Erwachsenen als unmittelbare sinnliche Anschauung erscheint, noch eine Menge von einzelnen Momenten stecken, die in der That Product der Erfahrung sind, obgleich es vorläufig schwer ist, hier die Grenze zu ziehen.

Ich glaube nun, daß unsere bisherigen Erfahrungen uns berechtigen, den Satz aufzustellen, daß keine unzweifelhaft gegenwärtige

einen Act des Verständnisses beseitigt und kann, sondern wenn wir auch noch so gut erkennen, in einer anomalen Weise zu Stande gekommen sei, so schwindet es nicht durch das Verständniß des Vorganges. Wir neigen zu Empfindungen ablenken, namentlich, wenn andere Empfindungen sind, aber so wie wir auf die äußere Außenwelt merken, die mit diesen Empfindungen werden wir gezwungen sein, dieselben zu bemerken. Temperaturempfindung unserer Haut, wenn sie nicht die Berührungsempfindungen, welche unsere Kleider so lange wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, ob es warm oder kalt ist, wir nicht im Stande sein, das Gefühl von Wärme in andere zu ändern, etwa, weil wir wissen, daß es herrührt von der Sonne und nicht von der Temperatur der uns umgebenden Luft. Es schwindet der Lichtschein beim Druck auf das Auge nicht in das Wesen des Processes, vorausgesetzt, daß wir nicht dem Gesichtsfelde zugewendet haben, und nicht etwa anders.

Wenn wir auch vielleicht nicht im Stande sein, einen Eindruck zu isoliren, weil er eingeht in das zusammengesetzte Ganze der äußeren Objects. Dann zeigt aber die richtige Aufmerksamkeit die betreffende Empfindung percipirt und vom Vorurtheile befreit.

Daß nichts in unseren Sinneswahrnehmungen verloren werden kann, was durch Momente, die die Erfahrung gegeben hat, im Anschauungsbilde ein Gegentheil verkehrt werden kann. Erfahrungsmomente überwunden werden kann, werden wir durch die Erfahrung und Einübung zu betrachten haben. Wenn wir dieser Regel folgen, nur die Qualitäten der Anschauung zu betrachten sind, bei den Anschauungen aber als Product der Erfahrung und

daß, daß Anschauungen, die gegen unsere bessere Erfahrung alten und uns als Sinnestäuschungen stehen bleiben, durch die Einübung beruhen könnten. Unsere Kenntniß, welche die Trübung der Luft an fernen Gegenständen, perspectivischen Verzeichnungen und der Form der Schlaghaft auf Erfahrung, und doch werden wir vor einem vollkommenen sinnlichen Eindruck der Ferne und darauf befindlicher Gebäude haben, trotzdem wir auf der Leinwand gezeichnet ist.

Kenntniß des zusammengesetzten Klangs der Vocale



jedenfalls aus der Erfahrung entnommen, und doch bekommen wir den sinnlichen Eindruck des Vocalklangs durch Zusammensetzung von einzelnen Stimmgabeltönen, wie ich dies gezeigt habe, und fassen den Klang als ein Ganzes, obgleich wir wissen, daß er in diesem Falle wirklich zusammengesetzt ist.

455 Die ältere Geschichte der Lehre von den Sinneswahrnehmungen im Allgemeinen fällt zusammen mit der Geschichte der Philosophie, wie schon am Schlusse des siebenzehnten Paragraphen auseinandergesetzt ist. Die Physiologen des 17. und 18. Jahrhunderts kamen mit ihrer Untersuchung meist nur bis zum Netzhautbilde, und glaubten, daß mit dessen Bildung alles abgemacht sei, daher sie denn auch durch die Fragen, warum wir die Gegenstände aufrecht sehen und warum wir sie einfach sehen trotz der Existenz zweier verkehrten Nethautbilder, nicht wenig in Verlegenheit gesetzt wurden.

Unter den Philosophen hat zuerst CARTESIUS sich eingehender mit den Gesichtswahrnehmungen beschäftigt mit Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse seiner Zeit. Er erkennt die Qualitäten der Empfindung als wesentlich subjectiv an, hält aber die Anschauungen der quantitativen Verhältnisse der Größe, Gestalt, Bewegung, Lage, Dauer, Zahl der Gegenstände für objectiv richtig anschaulich. Zur Erklärung der Richtigkeit dieser Vorstellungen nimmt er aber wie die ihm nachfolgenden idealistischen Philosophen ein System angeborener Ideen an, die mit den Dingen übereinstimmen. Diese Theorie wurde dann später am consequentesten und reinsten von LEIBNITZ entwickelt.

BERKELEY untersuchte eingehend den Einfluß des Gedächtnisses auf die Gesichtswahrnehmungen und die inductiven Schlüsse, die dabei vorkommen, von denen er sagt, daß sie so schnell geschehen, daß wir sie nicht bemerken, wenn wir nicht absichtlich darauf achten. Diese empirische Basis führte ihn dann freilich zu der Behauptung, daß nicht bloß die Qualitäten der Empfindung, sondern auch die Wahrnehmungen überhaupt nur innere Prozesse seien, denen nichts Äußeres entspreche. Er wird zu dieser Schlussfolgerung verleitet durch den falschen Satz, die Ursache (das wahrgenommene Object) müsse ihrer Wirkung (der Vorstellung) gleichartig, also auch ein geistiges Wesen, nicht ein reales Object sein.

Die Erkenntnistheorie von LOCKE leugnete die angeborenen Ideen und suchte alle Erkenntniss auf Empirie zu gründen; das Streben endete aber bei HUME in der Leugnung aller Möglichkeit von objectiver Erkenntniss.

456 Der wesentlichste Schritt, um die Frage auf den richtigen Standpunkt zu stellen, wurde von KANT in seiner Kritik der reinen Vernunft gethan, in der er allen realen Inhalt des Wissens aus der Erfahrung ableitete, von diesem aber unterschied, was in der Form unserer Anschauungen und Vorstellungen durch die eigenthümlichen Fähigkeiten unseres Geistes bedingt ist. Das reine Denken *a priori* kann nur formal richtige Sätze ergeben, die als nothwendige Gesetze des Denkens und Vorstellens allerdings absolut zwingend erscheinen, aber keine reale Bedeutung für die Wirklichkeit haben, also auch niemals irgend eine Folgerung über Thatsachen einer möglichen Erfahrung zulassen können.

In dieser Auffassung ist die Wahrnehmung anerkannt als eine Wirkung, welche das wahrgenommene Object auf unsere Sinnlichkeit hat, welche Wirkung in ihren näheren Bestimmungen ebenso gut abhängt von dem Wirkenden wie von der Natur dessen, auf welches gewirkt wird. Auf die empirischen Verhältnisse wurde dieser Standpunkt namentlich von JOH. MÜLLER übertragen in seiner Lehre von den specifischen Energien der Sinne.

Die nachfolgenden idealistischen Systeme der Philosophie von J. G. FICHTE, SCHELLING, HEGEL haben allen Nachdruck wieder darauf gelegt, daß die Vorstellung wesentlich abhängig sei von der Natur des Geistes, und den Einfluß, den das Wirkende auf die Wirkung hat, vernachlässigt. Sie sind deshalb auch für die Theorie der Sinneswahrnehmung von geringem Einflusse gewesen.

und Zeit kurzweg als gegebene Formen aller Anschauung hin-  
untersuchen, wie viel in der näheren Ausbildung der einzelnen  
n Anschauungen aus der Erfahrung hergeleitet sein könnte.  
uch außerhalb seines Weges. So betrachtete er namentlich die  
ch als ursprünglich in der Raumanschauung gegebene Sätze,  
widerlegen gesucht habe.<sup>1</sup> Seinem Vorgange schlossen sich  
ihe von Physiologen an, welche die nativistische Theorie  
bilden suchten. JOH. MÜLLER selbst nahm an, daß die Netzhaut  
ohnung sich selbst empfinde vermöge einer angeborenen Fähig-  
mpfindungen beider Netzhäute hierbei verschmelzen. Als der-  
Zeit am consequentesten diese Ansicht durchzuführen und den  
zupassen gesucht hat, ist E. HERING zu nennen.

te STEINBUCH eine Herleitung der räumlichen Einzelanschauungen  
der Augen und des Körpers versucht. Von philosophischer Seite  
WAITZ und CORNELIUS dieselbe Aufgabe in Angriff. Von  
später namentlich WHEATSTONE, welcher durch die Erfindung  
htigen Anstofs zur Untersuchung des Einflusses der Erfahrung  
ungen gab. Außer kleineren Beiträgen, die ich selbst in ver-  
ösung dieser Aufgabe gegeben habe, sind hier als Versuche,  
sicht durchzuführen, zu nennen: die Schriften von NAGEL,  
here über diese Untersuchungen und Streitpunkte ist in den  
erörtern.

## 27. Die Augenbewegungen.

457

n der Augen eine wesentliche Rolle bei der Bildung  
durch den Gesichtssinn spielen, so müssen wir zunächst  
it werden.

zwar keine aus Knochen fest geformte regelmäßige  
sie in den Gelenken der Extremitäten finden; die  
liegt, ist vielmehr, wie *Fig. 30*, S. 42, zeigt, im  
von der Gestalt einer vierkantigen Pyramide, deren  
ht, und welche sich in keiner Weise dem naehin  
fel anschließen kann. Die Lücken, welche zwischen  
knöchernen Wänden der Höhle bleiben, werden durch  
Bindegewebe ausgefüllt, in welchem die Muskeln,  
ges, die Thränendrüse u. s. w. liegen. Verhältniſs-  
diese Lücken längs des vorderen Randes der Augen-  
mentlich nach oben, innen und auſen nur ein ziemlich  
dem Augapfel und dem Knochen übrig, wie man  
man die Fingerspitze dazwischenzuschieben sucht.  
ne sogleich Druckbilder hervorzubringen; nur nach  
n das Jochbein hin ist die Lücke etwas größer.  
siche Masse von Fett, Muskeln, Nerven, Gefäſſen  
r dem Augapfel liegt, in eine Höhlung eingeschlossen,  
von festen Wänden umgeben ist, und nur wenige

und schmale Spalten von nachgiebigerer Substanz darbietet. Diese Höhlung wird nach hinten und nach den Seiten von den knöchernen Wänden der Augenhöhle, nach vorn durch den Augapfel selbst gebildet. Da nun die genannten organischen Massen, Fett, Muskeln, Nerven u. s. w. fast ganz incompressibel sind, wie das Wasser, welches den grössten Theil ihres Gewichts ausmacht, und weder merklich ausweichen, noch an Volum zunehmen können, so sind zunächst alle Bewegungen des Augapfels an die Bedingung gebunden, daß durch sie das Volumen der hinter dem Augapfel gelegenen Theile nicht verändert werden kann.

Der Augapfel kann also unter normalen Verhältnissen nicht in die Augenhöhle hineindringen oder aus ihr heraustreten, wenigstens nicht bei den schnell wechselnden Zusammenziehungen seiner Muskeln. Wenn Blut stärker in die Gefäße der Augenhöhle eindringt oder aus ihnen sich entleert, wie es z. B. nach erschöpfenden Krankheiten und im Tode geschieht, so  
458 wird dadurch allerdings das Volumen der weichen hinter dem Augapfel liegenden Theile verändert, und dieser dringt vor oder zieht sich zurück. Dergleichen Veränderungen können aber bei den willkürlichen Bewegungen des Auges nicht eintreten. Wenn man versucht, den Augapfel mit den aufgelegten Fingern in die Augenhöhle zurückzudrängen, so fühlt man gleich einen erheblichen Widerstand, noch ehe eine merkliche Verschiebung des Auges eingetreten ist, und man bemerkt die subjectiven Erscheinungen, welche der Druck im Auge hervorruft. Dabei sieht man die Weichtheile neben dem Augapfel, namentlich unten hervordrängen; so wie man mit dem Drucke nachläßt, ziehen diese sich aber auch vermöge ihrer elastischen Spannung wieder zurück.

Ebenso wenig kann sich der Augapfel als Ganzes nach rechts und links, oder nach oben und unten verschieben, weil ihm hier überall die benachbarten Theile des vorderen knöchernen Randes der Augenhöhle in den Weg treten.

Dadurch sind also alle Verschiebungen des Augapfels als Ganzes, das heisst, alle Verschiebungen, bei welchen sämtliche Punkte des Augapfels sich in gleicher Richtung bewegen, unmöglich gemacht, und es bleiben als ausführbar nur Drehungen übrig, das heisst Bewegungen, bei welchen eine Seite des Augapfels in die Augenhöhle hineintritt, während eine andere heraustritt. Im Ganzen hat also die Art, wie der Augapfel eingebettet ist, für die Bewegungen desselben dasselbe mechanische Resultat, als wäre er ein kugeliges Gelenkkopf, in einer kugeligen Pfanne befestigt, wie der Kopf des Oberschenkelbeins.

Wenn der Augapfel also nur drehende Bewegungen ausführen kann, so ist die erste Frage die nach dem Mittelpunkt dieser Drehungen.

Professor JUNGE aus Petersburg hat in meinem Laboratorium den Drehpunkt des Auges zu bestimmen gesucht, indem er beobachtete, um wie viel sich die Lichtreflexe beider Hornhäute einander näherten, wenn die Gesichtslinien aus paralleler Stellung in einen bestimmten Convergenzwinkel über-

ich indessen, daß die Ellipticität der Hornhäute einen auf die Berechnung der Resultate hatte, und da es sehr Ellipticität für viele Augen zu bestimmen, so war die ausgedehnter Anwendung fähig, obgleich sie übrigens gab.

OLVER<sup>1</sup> haben deshalb eine einfachere Methode angewandt, als zureichend genau bewährte. Es wurde zuerst der Abstand der Hornhaut mit dem Ophthalmometer gemessen, die Sehachse gegen die Hornhautaxe bestimmt. Dann wurde ein Faden unmittelbar vor dem Auge ausgespannt, und das Auge nach rechts und links blicken mußte, bis bald der andere Rand der Hornhaut hinter den Faden kam, und der bekannten Breite der Drehungen ließ sich der Drehpunkt berechnen. Das Nähere darüber unten. Ich finde, daß bei 19 normalsichtigen Augen der Drehpunkt 1,77 Mm. hinter der durch den Rand der Hornhaut gezogenen Mittel 10,957; oder 13,557 hinter dem Scheitel der Hornhaut 10 Mm. vor der hinteren Fläche der Sclerotica, der 459 näher als der Basis der Hornhaut. Die Lage des Drehpunktes hängt hauptsächlich ab von der Form der hinteren Hälfte der Hornhaut, die in Berührung kommt mit dem widerstehenden Grunde des Augens. Diese hintere Fläche füllt die hintere Hälfte der Augenhöhle aus. Diese hintere Fläche scheint bei normalen Augen einem stärker abgeplatteten Kegel als die vordere; der Drehpunkt muß etwa mit dem Scheitel des Kegels zusammenfallen.

Die Hornhäute sind nach hinten verlängert; bei ihnen liegt deshalb der Drehpunkt weiter nach hinten als bei normalsichtigen. DONDEVS fand ihn zu 13,26 Mm. hinter der Basis der Hornhaut oder dem Scheitel liegend. Hyperopische Augen dagegen sind so, daß auch der Drehpunkt ein wenig mehr nach vorn liegt. Die Entfernung von der Basis der Hornhaut betrug bei ihnen unter dem Scheitel der Hornhaut.

Für jede Richtung und Größe der Drehung ganz neu noch nicht untersucht.

Aus diesen Versuchen ferner heraus, daß die normalen Augen Ausnahme die für diese Versuche nöthigen Winkel, welche 28° nach beiden Seiten hin betrugen, ohne Schwierigkeit ausführen konnten, die kurzsichtigen Augen aber hatten oft eine beschränkte Beweglichkeit; unter den Hyperopen fand sich ebenfalls eine beschränkte Beweglichkeit. Doch können die Hyperopen noch stärkere Drehungen ausführen. Ich erreichte bei ihnen in horizontaler Richtung etwa 50° nach beiden

Seiten, und etwa  $45^\circ$  nach oben und nach unten, so daß ich von oben nach unten das Auge etwa um einen rechten Winkel, von rechts nach links um etwas mehr drehen kann. Die äußersten Drehungen sind aber schon sehr gezwängt und nicht lange zu ertragen.

Wir gehen jetzt dazu über zu untersuchen, welche Drehungen vom Augapfel ausgeführt werden. In der Art der Befestigung des Augapfels liegt kein Hinderniß für eine jede Art von Drehung von mässiger Amplitude; die Muskeln sind ebenfalls vorhanden, welche Drehung um jede beliebige Axe würden ausführen können; die genauere Untersuchung der Bewegungen der menschlichen Augen hat aber ergeben, daß unter den gewöhnlichen Umständen des normalen Sehens durchaus nicht alle Bewegungen wirklich ausgeführt werden, zu deren Ausführung die mechanischen Mittel vorhanden sind. Wir werden also zunächst die Frage zu untersuchen haben, welche Bewegungen werden vom menschlichen Auge wirklich ausgeführt?

Bei den Bestimmungen der Lage der Augen und der gesehenen Objecte handelt es sich in der Regel darum, ihre Lage im Verhältniß zu der des Kopfes zu bestimmen, dessen Lage und Richtung im Raume selbst als bekannt angenommen werden muß. Zu diesen Bestimmungen verwenden wir zunächst am passendsten folgende von HENLE für die anatomischen Beschreibungen eingeführte Nomenclatur.

Der menschliche Kopf besteht aus zwei symmetrischen Hälften, seine  
460 Mittelebene der Symmetrie nennen wir die Medianebene. Diejenigen Linien, welche entsprechende Punkte der rechten und linken Kopfhälfte verbinden, nennen wir transversale oder quere Linien. Sie sind senkrecht zur Medianebene. Ebenen, welche der Medianebene parallel laufen, heißen Sagittalschnitte.

Als natürliche Stellung des Kopfes kann diejenige betrachtet werden, welche bei aufrechter Haltung des Körpers angenommen wird, wenn die Blicke nach dem Horizont gerichtet sind. Bei dieser Haltung liegt für mich die *Glabella* des Stirnbeins (der Theil dicht über der Nasenwurzel) senkrecht über den Oberzähnen. Diese Stellung ist dadurch allerdings nicht ganz genau, sondern nur annähernd bezeichnet; wie für die Augenbewegungen eine genauere Bestimmung gewonnen werden kann, wird sich später zeigen. Die in dieser Haltung durch den Kopf gelegten horizontalen Ebenen heißen Horizontalschnitte oder Querschnitte, die senkrecht zur Medianebene gelegten verticalen Schnitte dagegen Frontalschnitte. Die Frontalschnitte und Querschnitte schneiden sich in transversalen Linien. Die Linien, in denen sich die Medianebene und die ihr parallelen Sagittalschnitte mit den Querschnitten (Horizontalschnitten) schneiden, heißen sagittale (pfeilrechte) Linien, und diejenigen, in denen sich die Medianebene und die Sagittalschnitte mit den Frontalschnitten schneiden, verticale (senkrechte) Linien. Die transversalen Linien also verlaufen von rechts nach links, die sagittalen von vorn nach hinten, die verticalen von oben nach unten.

einzeliges Coordinatensystem gegeben, welches im Kopfe ihm beweglich angesehen wird. Die beiden Seiten als rechts und links zu bezeichnen, die einer nach außen und aufsen, oder wo dies eine Verwechselung in der Folge von hohlen Organen zulassen würde, nach HENLE's (nach der äußeren Seite sehend) und als mediale (nach der inneren Seite sehend) zu bezeichnen. Die beiden Seiten der transverse Ebene als oben und unten bezeichnet werden können, wenn die Haltung des Kopfes zweideutig sein könnte, als stirnwärts gekehrt. Die beiden Seiten der Frontalebene als vorn und hinten zu bezeichnen. Der Drehpunkt des Auges bildet der Drehpunkt den festen Punkt, an dem sind beide Augen immer so gestellt, daß sie ein gemeinsames Fixationspunkt fixiren, welcher Punkt, da das Sehen mit Bezug auf diesen Punkt genannt wird, der Blickpunkt heißen mag (sonst Fixationspunkt genannt). Eine gerade Linie, welche vom Blickpunkte des Auges gezogen ist, nennen wir Blicklinie, identisch mit der Gesichtslinie, die dem Auge entspricht, sondern muß etwas auf deren innerer Seite liegen, da der Drehpunkt vermuthlich in der Augenaxe, und der Gesichtslinie liegt. Doch wird die Abweichung zwischen der Blicklinie und der Gesichtslinie in den meisten Fällen zu vernachlässigen sein. Die Blicklinie folgt, muß wie alle vom Blickpunkte ausgehende Linie durch das Centrum des gelben Flecks gehen, 461 in der Verlängerung der Blicklinie bleiben können. Die Ebene, durch die beiden Blicklinien gelegt ist, werde Blickebene der Visirebene, der hierfür auch gebraucht wird für die Ebene, in der die Visirlinien liegen, auf der der Unterschied zwischen Blickebene und Visirebene vernachlässigt sein). Die Verbindungslinie der Drehpunkte, der Blicklinien ein Dreieck einschließt, ist als Basis dieses Dreiecks und dem entsprechend Grundlinie (Basallinie) der Medianebene des Kopfes schneidet die Grundlinie in der Mitte die Blickebene in der Medianlinie der Blick-

in gehoben und gesenkt, das heißt stirnwärts oder nach unten. Das Feld, welches er durchlaufen kann, nennen wir das Blickfeld, eine Ausdehnung ist geringer als die des Gesichtsfeldes, das Blickfeld als Theil einer Kugeloberfläche, deren Centrum der Drehpunkt liegt. Nehmen wir eine bestimmte Lage der Blicklinie willkürlich gewählt, später näher bestimmt werden wird, so ist jede neue Lage der Blickebene zu der ersten ein Winkel, den sie mit der Anfangslage bildet, und diesen Winkel des Blicks nennen wollen. Derselbe ist



positiv zu rechnen, wenn die Blickebene stirnwärts, negativ, wenn sie kinnwärts verschoben ist.

In der Blickebene kann sich nun die Blicklinie jedes Auges lateralwärts oder medianwärts wenden; wir bezeichnen dies als Seitenwendungen des Blicks, und messen ihre Gröfse durch den Seitenwendungswinkel, das heifst durch den Winkel, den die Richtung der Blicklinie mit der Medianlinie der Blickebene bildet. Wendungen nach rechts mögen einen positiven Werth des Seitenwendungswinkels haben, Wendungen nach links einen negativen Werth.

Durch den Erhebungswinkel und den Seitenwendungswinkel ist die Richtung der Blicklinie gegeben. FICK, MEISSNER, WUNDT haben dazu zwei andere Winkel benutzt. In den von mir gebrauchten Bestimmungen wird die Blicklinie erst mit der Blickebene gehoben, und dann in der Blickebene seitwärts gewendet. FICK setzt die Blickebene zuerst als horizontal voraus, und die Blicklinie in ihr horizontal verschoben um einen Winkel, den er die *Longitudo* nennt, indem er die Verticalaxe des Auges mit der Polaraxe eines Erdglobus vergleicht. Dann läfst er die Blicklinie erst heben um einen Winkel, den er die *Latitudo* nennt. Bei dieser Messung sind aber sowohl die *Longitudo* als *Latitudo* in ihrem Werthe abhängig von der gewählten Anfangslage der Blickebene, für welche man von vorn herein keine genügend feste Bestimmungsweise hat, und jede Aenderung dieser Anfangslage macht trigonometrische Berechnungen für die beiden andern Winkel nöthig. Dagegen ist der von mir gewählte Seitenwendungswinkel ganz unabhängig von der Wahl der Anfangslage der Blickebene, und der Erhebungswinkel ist einfach durch Addition oder Subtraction zu corrigiren, wenn man zu einer anderen Wahl seines Nullpunkts übergeht.

462 Durch die genannten Winkel ist nun die Lage der Blicklinie vollständig gegeben, aber noch nicht die Stellung des Auges. Der Augapfel würde vielmehr noch beliebige Drehungen um die Blicklinie als Axe machen können, ohne dafs diese ihre Lage dabei ändert. Solche Drehungen des Augapfels um die Blicklinie als Axe pflegt man Raddrehungen zu nennen, weil die Iris sich dabei dreht, wie ein Rad. Um die Gröfse der Raddrehung zu messen, mufs der Winkel bestimmt werden, den eine im Auge feste Ebene mit der Blickebene macht. Als solche habe ich die Ebene gewählt, welche mit der Blickebene zusammenfällt, wenn der Blick beider Augen der Medianebene parallel in aufrechter Kopfhaltung nach dem unendlich entfernten Horizonte gerichtet ist, und habe diese im Auge feste Ebene den Netzhauthorizont genannt. Ich fand diese Bestimmung unzweideutig bei meinen eignen und bei denjenigen normalsichtigen Augen, die ich untersuchte. Sie ist es aber nicht, wie sich später herausgestellt hat, bei kurzsichtigen Augen, und mufs also bei solchen entweder eine genau bestimmte Anfangslage der Blickebene festgesetzt werden, oder würde es für die später zu machenden Anwendungen vielleicht vortheilhaft sein, für solche Augen diejenige Lage der Blickebene zu benutzen, bei welcher die in der Blickebene liegenden

ff correspondirenden Stellen beider Netzhäute abbilden, stigen in der oben genannten der Medianebene paral- cks Regel zu sein scheint. Den Winkel zwischen dem und der Blickebene nennen wir den Raddrehungs- nd nehmen ihn positiv, wenn das obere Ende des r Netzhaut nach rechts abgewichen ist. Dabei dreht

Zeiger einer von ihm betrachteten Uhr.

chst die Gesetze für diejenigen Bewegungen beider i denen beide Blicklinien fortdauernd parallel gerichtet ührt werden, wenn man eine Reihe weit entfernter t. Bei Convergenz der Augen treten kleine Ab- Gesetze ein, welches für parallele Gesichtslinien gilt. NDERS aufgestellte und durch alle späteren Unter- esetz ist, daß, wenn die Lage der Blicklinie in pfe gegeben ist, dazu auch ein bestimmter her Werth der Raddrehung gehört, welcher lkür des Beobachters und unabhängig von dem Wege icklinie in die betreffende Stellung gebracht ist. Aus- s gewählten Bezeichnungsweise, heißt dieses Gesetz: gswinkel jedes Auges ist bei parallelen Blick- n nur von dem Erhebungswinkel und dem nkel.

entlich entgegen der von HUECK früher aufgestellten der Werth der Raddrehung nicht wechselt bei ge- kopfes, wenn dabei die Stellung der Blicklinie zum t. Er hatte die Stellung jedes einzelnen Auges auch Stellung des andern Auges gehalten. Dagegen hat 463 zinen, wenn auch geringen Einfluß der Convergenz ige Augen nachgewiesen, den wir nachher besprechen gesehen davon hat Ermüdung der Augenmuskeln durch nvergenzstellungen einigen Einfluß, und außerdem ebenfalls nachher zu besprechenden Umständen das ifach zu sehen, unter Bedingungen, wo man dies nur drehungen erreichen kann, wenn auch nicht sogleich, en Einfluß auf die Stellung des Auges ausüben. Kleine ch von einem zum anderen Tage ein. Aber alle diese ing und beeinträchtigen der Hauptsache nach nicht rs'schen Gesetzes.

Gesetzes der Augendrehungen, welche allen Augen sich unter folgende Gesichtspunkte zusammenfassen. rschiedenen Augenstellungen eine herauszufinden von n ihr aus der Blick gerade nach oben oder gerade i rechts oder nach links gewendet wird, keine Rad- gt. Diese Stellung nennen wir die Primärstellung

der Blicklinie. Wenn man also von der Primärstellung ausgeht, so bringt reine Erhebung oder Senkung des Auges ohne Seitenabweichung, oder reine Seitenabweichung ohne Erhebung und ohne Senkung keine Raddrehung hervor.

Die Lage der Blickebene, welche durch die Primärstellungen beider Blicklinien geht, nennen wir die Primärstellung der Blickebene.

In erhobener Stellung der Blickebene geben Seitenwendungen nach rechts Drehungen des Auges nach links und Seitenwendungen nach links Drehungen nach rechts.

In gesenkter Stellung der Blickebene dagegen geben Seitenwendungen nach rechts auch Drehungen nach rechts und Seitenwendungen nach links Drehungen nach links.

Oder: Wenn der Erhebungs- und Seitenwendungswinkel dasselbe Vorzeichen haben, ist die Drehung negativ, wenn jene ungleiches Vorzeichen haben, ist die Drehung positiv.

Bei gleicher Erhebung oder Senkung ist die Rotation um so stärker, je größer die seitliche Abweichung, und bei gleicher Seitenwendung um so stärker, je größer die Erhebung oder Senkung ist.

Um sich von den angegebenen Thatsachen zu überzeugen, benutzt man nach dem von RUETE zuerst gemachten Vorschlage am besten Nachbilder. Zu dem Ende stelle man sich der Wand eines Zimmers gegenüber auf, welche mit einer Tapete überzogen ist, die horizontale und verticale Linien erkennen läßt, ohne daß aber das Muster so scharf gezeichnet ist, daß man Schwierigkeit fände, Nachbilder auf ihm zu erkennen; am besten ist eine matte blaßgraue Grundfarbe. Dem Auge des Beobachters gerade gegenüber und in gleicher Höhe mit ihm spanne man ein horizontales schwarzes oder farbiges Band auf, zwei bis drei Fuß lang, welches stark 464 gegen die Farbe der Tapete absticht. Um die Lage des Kopfes zu sichern, ist es vortheilhaft, den Hinterkopf fest anzulehnen, wobei man darauf zu achten hat, daß derselbe weder nach rechts noch nach links geneigt oder gedreht sei. Es muß vielmehr die Mittelebene des Kopfes vertical gehalten werden und senkrecht zur betrachteten Wand stehen. Ob die Mittelebene des Kopfes vertical sei, erkennt man leicht, wenn man die Augen so convergiren läßt, daß Doppelbilder des schwarzen Bandes entstehen; diese müssen in eine gerade Linie zusammenfallen. Man fixire nun eine kurze Zeit lang ganz fest die Mitte des Bandes, und wende dann, ohne den Kopf zu verrücken, plötzlich die Augen nach einer anderen Stelle der Wand hin. Man wird dort ein Nachbild des Bandes sehen, und durch Vergleichung dieses Bildes mit den horizontalen Linien der Tapete erkennen können, ob das Nachbild horizontal erscheint, oder nicht. Das Nachbild selbst ist entwickelt auf denjenigen Punkten der Netzhaut, die dem Netzhauthorizont angehören, und bezeichnet bei den Bewegungen des Auges diejenigen Theile des Gesichtsfeldes, auf welche der Netzhauthorizont sich projicirt. Die Schnittlinie der

gegenüberliegenden Wand dagegen muß immer horizontal des Beobachters die verlangte Stellung hat, so daß der Drehpunkte beider Augen selbst horizontal und parallel ist. Die horizontalen Linien der Tapete geben Blickenebene auf die Tapete, und wie das Nachbild inien gedreht ist, so ist der Netzhauthorizont gegen

Wenn man bei richtig gewählter Stellung des Kopfes unten, oder gerade nach rechts und links sieht, das len Bandes mit den horizontalen Linien der Tapete man aber nach rechts und oben oder nach links o ist es nach links gedreht, d. h. sein linkes Ende hte, immer im Vergleich zu den Horizontallinien der nach links oben oder rechts unten blickt, ist t etwas nach rechts gedreht, sein rechtes Ende steht

rehungen ist genau derselbe für das rechte wie für man sich am leichtesten und vollkommensten über-Augen gleichzeitig öffnet, während man das Nachbild Richtung des Blicks ändert, und während man das mell hinter einander bald das rechte, bald das linke deckt. Welches man auch verdecken möge, so behält n mir untersuchten normalsichtigen Augen vollkommen

rd vertical ausspannt, und in derselben Weise das Bandes mit den Verticallinien der Tapete vergleicht, r entgegengesetzte Drehungen. Wenn man nämlich sieht, erscheint das Nachbild gegen die Verticallinien nks, sondern umgekehrt nach rechts gedreht. Daraus auf eine Drehung des Auges nach rechts schließen, e verticalen Linien der Tapete nicht mit der Projection errichteten Normalen zusammenfallen, diese letztere 465 sinne, wie das Nachbild, nur noch stärker gedreht

er Erscheinung nach dem für normalsichtige Augen Fig. 200 dargestellt worden. Es wird vorausgesetzt, er Normale über  $a$  befinde in einer Entfernung gleich achbilder einer durch  $a$  gehenden horizontalen Linie, dern Theil des Feldes projicirt werden, mit der  $a_1$ ,  $b_2b_2$  etc. zusammen; die einer senkrechten durch en mit der Richtung der Curven  $cc$ ,  $c_1c_1$ ,  $c_2c_2$  etc. male Augenbewegungen Hyperbeln.

von der Primärstellung ausgeht und den Blick schief wendet, die Nachbilder verticaler Linien, verglichen

mit den Verticallinien der Wand, scheinbar die entgegengesetzte Drehung erleiden als die horizontalen Nachbilder im Vergleich mit horizontalen




Fig. 200.




Fig. 201.

Linien der Wand, so darf man sogleich vermuthen, daß zwischen horizontalen und verticalen Linien mitten inne für jede Augenbewegung eine Richtung des Nachbilds existiren wird, wobei es der Richtung seines Objects parallel bleibt; und in der That ist das auch der Fall. Man findet nämlich, daß die Nachbilder schräger Linien, die man in der Primärlage fixirt hat, ihrem Object parallel bleiben, wenn man den Blick entweder in der Verlängerung der Objectlinie, oder von der

Primärlage ausgehend senkrecht zu dieser wandern läßt.

Es sei also in Fig. 201 o der Punkt, wo die Blicklinie in der Primärstellung die Ebene der Zeichnung senkrecht schneidet; aa sei eine verticale, bb eine horizontale durch o gezogene Linie. Wird der Blick nach p gewendet, so erhalten ihre Nachbilder die Lagen  $\alpha\alpha$  und  $\beta\beta$ , welche beide den Linien aa, beziehlich bb nicht parallel sind. Zieht man aber durch o die Linien cc und

466 dd, von denen die erstere die Richtung der Verbindungslinie op hat, die zweite senkrecht darauf ist, so geben diese in p die Nachbilder  $\gamma\gamma$  und  $\delta\delta$ , welche ihren Objectlinien parallel sind.

untersuchten Augen schien dieses Gesetz mit desto mehr zu sein, je weniger kurzsichtig sie waren.

Die angedeuteten Versuche ergibt also die Beobachtung, daß wenn der Blick nach  $p$  gewendet ist, auf  $pp$  abbilden, auf denen sich  $dd$  und  $cc$  abbilden, wenn der Blick nach  $p$  gewendet ist. Fragt man nun, um was für eine Ebene gedreht werden müsse, um aus der ersten Lage in die zweite zu kommen, so ergibt sich leicht, daß die Axe parallel der Ebene  $pp$  müsse, und daher senkrecht zu der durch  $op$  und  $pp$  bestimmten Ebene. Denkt man sich diese letztere Ebene in eine Ebene  $dd$  überführt, so wird ihre Lage nicht geändert, wenn sie mit der Ebene  $pp$  zusammenfällt, zu ihr normal gerichtete Axe gedreht wird. Ihre Lage in der Zeichnung  $op$  bleibt deshalb bei solcher Drehung unverändert, und diese Schnittlinie, zu deren Theilen  $pp$  gehört, bildet sich dabei immer auf den gleichen Netzhautergebnissen des Versuchs erfordern. Denkt man aber die Ebene  $dd$  eine Ebene gelegt, und diese Ebene nach der Drehung die Schnittlinie  $dd$  eine Ebene der Zeichnung parallel der Axe und also auch parallel der Ebene  $pp$  müssen. Denn wenn eine Ebene durch eine Ebene geht, welche einer andern Ebene (der Ebene der Zeichnung) parallel ist, so ist auch die Schnittlinie beider Ebenen der Ebene  $pp$  parallel.

Das Bewegungsgesetz parallel gerichteter normaler Augenbewegungen aussprechen: Wenn die Blicklinie aus der ersten Lage in eine andere Lage übergeführt wird in irgend eine andere Raddrehung des Augapfels in dieser zweiten Lage, so ist die Raddrehung, als wäre er um eine feste Axe gedreht worden, die gleiche, wie die Raddrehung in der ersten und zweiten Richtung der Blicklinie.

Die Augenbewegungen ist in dieser Weise zuerst von Donders und wird deshalb nach ihm benannt.

Es ist nöthig, daß die Bewegung des Blicks aus der ersten Lage wirklich längs einer geraden Linie vor sich geht, wirklich um eine constant bleibende Rotationsaxe. Die Ueberführung aus der ersten in die zweite Stellung der Augenbewegung geschieht; nach dem Gesetze von DONDERS wird es immer die gleiche sein, und die Richtigkeit von DONDERS' Satze läßt sich wiederum in der Art erweisen, daß der Blick absichtlich auf verschiedenen Wegen vor sich geht. Die Congruenz des Nachbildes  $pp$  mit der Linie  $op$  wird schließlich eingetretenen Raddrehung des Auges

beachten zu bemerken, daß im ersten Augenblicke, wo die Augenbewegungen an dem neu gewählten Fixations-



punkte angekommen ist, zuweilen noch eine etwas abweichende Stellung des Nachbildes zu bemerken ist, die aber schon nach einer oder zwei Secunden in die normale übergeht.

Wenn man nach dem durch solche Versuche bestätigten Gesetze von LISTING die Größe des Rotationswinkels  $\gamma$  berechnet, ausgedrückt durch den Erhebungswinkel  $\alpha$ , und die Seitenwendung  $\beta$ , so findet man folgende Gleichung:

$$-\text{tang. } \gamma = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta}$$

oder für logarithmische Rechnung geeigneter

$$-\text{tang. } \left( \frac{\gamma}{2} \right) = \text{tang. } \left( \frac{\alpha}{2} \right) \text{tang. } \left( \frac{\beta}{2} \right).$$

In der folgenden Tabelle sind die Werthe des Drehungswinkels von 5 zu 5 Graden der beiden andern Winkel berechnet.

Seiten- wendung	Erhebungswinkel							
	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
5°	0° 13'	0° 26'	0° 40'	0° 53'	1° 7'	1° 20'	1° 35'	1° 49'
10°	0° 26'	0° 53'	1° 19'	1° 46'	2° 13'	2° 41'	3° 10'	3° 39'
15°	0° 40'	1° 19'	1° 59'	2° 40'	3° 21'	4° 2'	4° 45'	5° 29'
20°	0° 53'	1° 46'	2° 40'	3° 34'	4° 29'	5° 25'	6° 22'	7° 21'
25°	1° 7'	2° 13'	3° 21'	4° 29'	5° 38'	6° 48'	8° 0'	9° 14'
30°	1° 21'	2° 41'	4° 2'	5° 25'	6° 48'	8° 13'	9° 39'	11° 8'
35°	1° 35'	3° 10'	4° 45'	6° 22'	8° 0'	9° 39'	11° 21'	13° 6'
40°	1° 49'	3° 39'	5° 29'	7° 21'	9° 14'	11° 8'	13° 6'	15° 5'

Für diejenigen Bewegungen des Blicks also, welche von der Primärlage anfangen, und in irgend eine andere Lage überführen, ist nach dem LISTING'schen Gesetze die Drehungsaxe immer gelegen in einer Ebene, die zur Blicklinie senkrecht ist. Es gehe diese Ebene der Drehungsaxen durch




Fig. 202.

*AA*, Fig. 202 normal zu *OB*, der Blicklinie. Eine zweite Ebene, *A'*, welche in der Primärstellung der Auges mit der Ebene *AA* zusammenfällt, denke man sich durch den Augapfel gelegt und mit diesem fest verbunden. Wenn nun die Blicklinie *OB* in eine Sekundärstellung *OF* gebracht ist, hat *A'* eine andere Lage als *AA*, nämlich *CC*. Um von dieser ersten Sekundärstellung in irgend welche andere Stellungen überzugehen, kann man das Auge nun wieder um feste Axen drehen, die auch alle in einer und derselben Ebene liegen, und zwar in derjenigen

Winkel der Ebenen  $AA$  und  $CC$  halbt, die Zeichnung rechtwinklig in der Linie  $HH$  schneidet. Es sind die Drehungsaxen für die betreffende Secundärstellung

irgend einer Stellung  $a$  des Augapfels in eine andere, zu construiren man die Ebenen der Drehungsaxen für  $a$  und  $b$ . Die Schnittlinie beider Ebenen ist die Axe, um die drehen hat, um es von  $a$  nach  $b$  überzuführen. Da diese Axe beiden Ebenen angehören muß, da man auch von  $b$  nach  $a$  machen kann, und die betreffenden Bedingungen der von  $a$  als der von  $b$  ausgehenden gleich sein muß, d. h. in den beiden Blickpunkten zugehörigen Stellen liegen muß.

Wir prüften normalsichtigen oder schwach kurzsichtigen die Richtigkeit des LISTING'schen Gesetzes mit grobser parallelen Stellungen beider Blicklinien. Die Methode bei guter Ausführung die Stellung des Augapfels bis Einzelgrad genau zu bestimmen. Eine andere Methode, die Umdrehung der Bilder beider Augen beruht, und die zuerst Listing und später von VOLKMANN weiter ausgebildet ist, bestimmt die Stellung bis auf etwa  $\frac{1}{10}$  Grad herab zwar nicht in einzelnen Augapfels, aber doch für die Differenzen der

Versuche nach dieser Methode, deren Ausführung wir anwenden wird, zeigen für meine eigenen Augen in den verschiedenen Stellungen nach oben und unten Abweichungen vom Listing'schen Gesetz für jedes einzelne Auge nur neun Winkelminuten und für seine etwas kurzsichtigeren Augen Maximalabweichung schräg nach unten rechts und links bis zu 54 Minuten ausmacht, was auf jedes einzelne etwa 27 Minuten ausmacht. Wir sahen, wie die von Hrn. Dr. BERTHOLD zeigten aber hauptsächlich in den peripherischen Stellungen nach oben und unten ähnlich mit mechanischen Hindernissen in der Bewegung der kurzsichtigen Augapfels zusammenhängen werden. Wir haben aber auch gesehen, wie die Abweichungen sich auf parallele Stellungen beider Augen beziehen, bei verschiedenen Individuen von Listing und Listing haben wir nun nach der Entdeckung von VOLKMANN ein, Listing'sches Gesetz festgestellt werden zur Betrachtung eines nahen Gegenstandes Listing's eigenen Augen bringt Convergence auf die Ebene vor den Augen liegenden Ebene eine gleich-Listing'sche Divergenz der scheinbar verticalen Meridiane beider Augen hervor, wenn man sie vergleicht mit der Divergenz, Listing'schen Meridiane nach dem LISTING'schen Gesetze hätten Listing'sche Divergenz und derselben Primären Augenstellungen gefunden waren. So weit also

der Einfluß der Convergenz sichtbar wird in der veränderten Differenz der Stellung beider Augen, könnte man für VOLKMANN's Augen sich vorstellen, daß dieselben in Convergenz eine tiefere Primärstellung haben, oder daß die Drehung des Auges in der Primärstellung, welche wir als Nullpunkt der Raddrehungen betrachten, verändert ist. Diese Veränderung nimmt zu mit steigender Convergenz.

Für meine eigenen Augen ist diese Drehung durch Convergenz in den mittleren Theilen des Gesichtsfeldes viel geringer als bei VOLKMANN, nämlich nur  $\frac{1}{2}$  der GröÙe, die sie bei jenem hat, so daß sie mir bei den Nachbildversuchen verborgen blieb; sie geschieht übrigens in demselben Sinne. Dagegen fand ich bei Nachbildversuchen, daß in den peripherischen seitlichen Richtungen des Blicks durch Convergenz Abweichungen des Nachbildes von  $2^\circ$  bis  $2\frac{1}{2}^\circ$  eintreten auch in dem Sinne, als wäre die Primärstellung meiner Augen für die Convergenzstellungen ein wenig tiefer zu nehmen, als für die Parallelstellungen. In Fig. 203 bezeichnen die kurzen dicken Striche die




Fig. 203.

Lage der Nachbilder für convergente Augenstellungen, aber mit übertriebener GröÙe der Abweichung. Die Objecte jener Nachbilder hatten im Centrum gelegen und waren den ausgezogenen Radien des Gesichtsfeldes parallel gewesen, so daß ihre Nachbilder bei parallelen Gesichtslinien auch in den genannten Radien liegen geblieben wären. Bei *cd* sind die Abweichungen am deutlichsten, bei *fg* klein und unsicher.

Herr DASTICH, dem die übrigen entsprechenden Beobachtungen sehr gut gelangen, konnte gar keinen Einfluß der Convergenz bei seinen Augen finden. Ueber die GröÙe dieses Einflusses bei verschiedenen Individuen sind also noch weitere Untersuchungen nöthig.

Ueberhaupt muß ich bemerken, daß für meine Augen sich eine gewisse Veränderlichkeit der Drehungen herausstellt. Die Primärstellung liegt an einem Tage ein wenig höher, am andern tiefer, und verändert sich sogar, während ich eine Reihe von Versuchen ausführe. Namentlich für die peripherischen Richtungen des Blicks, die mit einiger Anstrengung verbunden sind, finde ich zuweilen merklich verschiedene Stellungen in unmittelbar auf einander folgenden Versuchen und trotz möglichster Gleichartigkeit ihrer Ausführung. Man muß also von dem Auge nicht ganz dieselbe Präcision der Bewegung erwarten, wie von einem physikalischen Apparate, wenn auch normale Augen unter gewöhnlichen Bedingungen ziemlich genau dem DONDERSEN und LISTING'schen Gesetze folgen.

470 Endlich ist noch der Antheil zu bestimmen, den die einzelnen Augenmuskeln an den einzelnen normalen Bewegungen des Auges zu nehmen

3) schon bemerkt ist, drehen der innere und äußere gerade Muskel, indem sie wirken, das Auge um eine verticale Axe; die durch den unteren und oberen geraden Muskel liegt. Von RUEDE horizontal, mit dem inneren Ende nach unten, unter einem Winkel von etwa  $70^\circ$  mit der Blicklinie; die äußere schiefen Muskel liegt ebenfalls horizontal, das innere Ende nach oben, unter einem Winkel von etwa  $35^\circ$  mit der vertikalen Axe des inneren und äußeren geraden Muskels. Nach dem Gesetze von LISTING, diese Muskeln können also die Drehungen des Auges bewirken. Dagegen würden Drehungen um die beiden anderen Axen nach Listing'schen Gesetze nicht entsprechen. Um für eine Drehung des Auges eine horizontal von rechts nach links gerichtete Drehung zu bewirken, muß man eine Drehung durch den *Rectus superior* und den *Obliquus inferior* verbinden; für eine Drehung des Auges nach unten mit dem *Obliquus superior*. Es ist ein bekanntes Gesetz, daß man für kleine Drehungen die Resultate nach dem Gesetz des Parallelogramms der Kräfte zu addiren kann. Die GröÙe der Drehung die Intensität der Kraft der Drehungen, die vom Mittelpunkt aus gesehen nach der Richtung einer Uhr vor sich gehen, also positiv, die nach gegen eine Uhr rückwärts gerechnet werden. In Fig. 204 ist ein horizontales Auge gezeichnet mit

der positiv zu rechnen mit den Anfangspunkten der Muskeln, *Obliquus superior* und *Rectus superior*.

Außerdem ist die Listing'sche Gesetze geforderte Drehungen nach dem Gesetze von Listing; der Buchstabe *O* bezeichnet die Axe für die Drehung nach unten. *U* für die nach unten. *R* für die nach rechts. *L* für die nach links. *H* für die nach unten. *V* für die nach oben. *O* für die nach unten. *U* für die nach unten. *R* für die nach rechts. *L* für die nach links. *H* für die nach unten. *V* für die nach oben.




Fig. 204.

stück *cb* der GröÙe der Drehung durch den *Rectus superior*, *ca* der durch den *Obliquus inferior*, so bezeichnet das Parallelogramm *cbOa* die Drehung der gemeinsamen Resultate dieser Drehung proportional. Es erhellt aus derjenigen Lage, welche die Axen bei geradeaus gerichteter Blicklinie einnehmen, daß die resultierende Drehungsaxe *UO* der Axe der inneren Augenmuskeln näher liegt, als derjenigen der äußeren, denn die Seite *bc* des Parallelogramms der Drehungen der betreffenden geraden Muskel muß eine stärkere

Anstrengung machen, als der mitwirkende schiefe Muskel. Wenn sich der  
 471 Augapfel aber nach innen dreht, nähert sich die der veränderten Sehstellung  
 zugehörige Drehungsaxe  $UO$  mehr der Axe der schiefen Muskeln, so daß  
 bei Convergenz der Augen die letzteren verhältnißmäßig mehr in Anspruch  
 genommen werden müssen als bei Parallelismus der Blicklinien.

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Augenmuskeln alle einen ziemlich  
 breiten Ansatz am Augapfel haben, wobei ihre Fasern sich sogar etwas  
 fächerförmig ausbreiten. Dies hat zur Folge, daß selbst wenn der Augapfel  
 sich ziemlich bedeutend aus seiner Primärstellung gedreht hat, doch die  
 Drehungsaxen für die einzelnen Muskeln ihre Lage im Raume nicht erheblich  
 verändern. Nehmen wir als Beispiel den *Rectus superior* und *inferior*, welche  
 sich oberhalb der Hornhaut, etwa 7 Millimeter von deren Rande entfernt,  
 inseriren (*Fig. 1* bei  $m$  und  $n$  S. 5), so spannen sich, wenn das Auge nach  
 innen gedreht ist, bei der Verkürzung des Muskels vorwiegend die Fasern  
 der Sehne, welche nach dem äußeren Rande der Hornhaut hin gerichtet  
 sind, weil diese am meisten verlängert sind. Man kann sich davon an  
 Präparaten des Augapfels mit seinen Muskeln leicht überzeugen. Wenn sich  
 das Auge nach außen dreht, wirken dagegen hauptsächlich die inneren  
 Stränge beider Sehnen. So bleibt die Richtung des Muskelzuges dieselbe  
 trotz der veränderten Stellung des Auges.

Diese aus der Anordnung der Muskeln gezogenen Schlüsse werden  
 bestätigt durch die Erfahrungen, welche bei krankhafter Lähmung einzelner  
 Muskeln beobachtet worden sind. Wenn zum Beispiel der obere schiefe  
 Muskel gelähmt ist, so kann der innere gerade Muskel, allein wirkend, das  
 Auge noch nach unten wenden. Aber Drehung um die Axe  $RI$  giebt nicht  
 bloß eine resultirende Drehung nach der Axe  $CU$ , entsprechend der Länge  
 $cg$  in *Fig. 204*, wie sie verlangt wird, sondern auch eine kleinere, entsprechend  
 der Länge  $cf$ , nach der Axe  $CH$ , welche also einer negativen Drehung,  
 einer Drehung nach links herum um die Blicklinie, entspricht. Dabei erleiden  
 dann die Objecte im Gesichtsfelde eine Scheindrehung nach rechts herum,  
 wie der Zeiger einer Uhr.

Für die Bewegungen aus der Primärstellung in schräger Richtung auf-  
 oder abwärts muß eine Componente nach der Axe  $UO$  mit einer verticalen  
 Componente verbunden werden. Um nach innen und oben zu drehen,  
 brauchen wir also den *R. internus*, der nach innen dreht um die verticale  
 Axe, zugleich mit dem *R. superior* und *Obl. inferior*, die vereinigt nach oben  
 drehen um die Axe  $UO$ .

Mittelst des Schemas in der *Fig. 204* lassen sich diese Combinationen  
 leicht übersehen, sonst sind für die bequemere Uebersicht derselben dreh-  
 bare Modelle des Auges construirt, Ophthalmotrope, deren Beschreibung  
 unten folgen wird.

Abgesehen von den bisher besprochenen Beschränkungen der Bewegung  
 jedes einzelnen Auges, sind nun auch die Bewegungen unserer beiden Augen  
 in gewisser Weise sowohl von einander abhängig, als auch die Accommodation

abhängig ist. Unter den gewöhnlichen Verhältnissen richten wir immer beide Blicklinien auf einen im reellen Punct, welcher nah oder weit entfernt sein mag, dem Blickpunkte, schneiden sich beide Blicklinien im Auge einen ganz selbständigen Muskelmechanismus besitzt, jede Art der Bewegung ganz unabhängig 472 im Auge auszuführen, so haben wir doch nur gelernt, wirklich auszuführen, welche nöthig sind, um einen Gegenstand einfach mit beiden Augen zu sehen. So können die Augen gleichzeitig gehoben werden, um einen hoch gelegenen Gegenstand zu sehen, sie können auch beide gleichzeitig gesenkt werden, um einen niedrigen Gegenstand anzublicken. Wir sind aber ohne weiteres in der Lage, willkürlich das eine nach oben, das andere nach unten zu bewegen, während das eine sich in einem reellen Blickpunkte

beide Blicklinien nach rechts oder beide nach links auf einen rechts oder links gelegenen Gegenstand zu richten, und sie auch convergent machen, indem wir die rechte Blicklinie nach rechts wenden, wenn wir einen nahen Fixationspunkt haben, der sich nicht schon besonders darauf eingeübt hat, nicht divergent machen, indem er die rechte Blicklinie nach links wendet.

Bei normalen Augen die Accommodation immer der Entfernung des Gegenstandes, auf welchen die Blicklinien convergiren.

Die Augen sind für unendliche Ferne eingerichtet, für die Nähe, und sind desto stärker accommodirt, je näher der Gegenstand ist. Kurzsichtige Augen sind dagegen für ihren nahen Fixationspunkt eingerichtet, so lange die Blicklinien auf ihn oder auf einen nahen Gegenstand convergiren. Für nähere Blickpunkte folgt die Accommodation. Sehr kurzsichtige Augen können aber ohne Accommodation binocular fixiren und accommodiren.

Die Augenbewegung, beide Augen übereinstimmend zu bewegen, ist die Accommodation, damit in Uebereinstimmung zu bringen, beim Sehen. Es scheint, daß ältere Physiologen diese Bewegung der unwillkürlich eintretenden Mitbewegungen zugeschrieben haben, daß die Gesetzmäßigkeit dieser Verbindung beruht. Man muß dabei im Allgemeinen die Accommodation unseres Willens bei allen willkürlichen Bewegungen auf die Erreichung eines direct und deutlich bestimmten Erfolges bezieht. Bei den Bewegungen unserer Augen ist allerdings durch den Gesichtssinn die Stellung des Auges als Glied durch eine gewisse Willensaction versetzt.



wird, und deshalb ist für sie und für alle durch das Gesicht und Getast wahrnehmbaren Theile des Körpers die Stellung des zu bewegenden Theils der nächste bewusste Zweck der darauf gerichteten Willensactionen. Bei allen nicht sichtbaren und nicht fühlbaren Theilen des Körpers ist es aber nicht die Stellung und Bewegung, sondern erst der durch diese zu erreichende Erfolg, den wir durch eine willkürliche Action zu erreichen wissen. So gebrauchen wir unseren Kehlkopf und die Theile unseres Mundes mit einer bewundernswürdigen Sicherheit und Geschicklichkeit, um die zartesten Veränderungen der Tonhöhe und Klangfarbe unserer Gesangs- und Sprachlaute hervorzubringen, und doch weiß der Laie gar nicht, und der Physiologe unvoll-  
 473 kommen genug, was für Bewegungen wir eigentlich dabei ausführen. Hier bezieht sich also die Willensintention nur auf den hervorzubringenden Ton, nicht auf die Bewegung der einzelnen Theile des Kehlkopfs, und wir haben gelernt, alle diejenigen Bewegungen des Kehlkopfs auszuführen, die für einen solchen Zweck nöthig sind, aber keine anderen.

Aehnlich ist es mit den Augen; wir können ihre Bewegungen nicht selbst sehen, außer wenn wir vor einem Spiegel stehen; wir können sie auch nur sehr unvollkommen fühlen. Aber wir nehmen sehr deutlich wahr die Verschiebung der optischen Bilder auf der Netzhaut, oder vielmehr das entsprechende Wandern des Blickpunktes im Gesichtsfelde, wenn wir Bewegungen mit den Augen machen. Dies ist also auch die Wirkung, auf die unsere Willensintention gerichtet ist, und welche wir willkürlich zu erreichen wissen. Wenn wir wünschen, daß Jemand, der noch nicht über seine Augenbewegungen zu reflectiren gelernt hat, die Augen nach rechts wenden soll, so müssen wir ihm nicht sagen: „Wende dein Auge nach rechts“, sondern „Sieh jenen rechts gelegenen Gegenstand an“. Und selbst der Geübte beherrscht seine Augenbewegungen sicherer, wenn er entsprechende Gegenstände zur Fixation wählt, als wenn er eine bestimmte Stellung der Augen ohne solche Fixation einhalten will. Ich kenne einen ausgezeichneten und in der Optik höchst erfahrenen und geübten Physiker, dem es unmöglich ist, seine Gesichtslinien parallel zu stellen, wenn er nicht sehr ferne Objecte vor sich hat, oder Doppelbilder aus einander zu treiben, wenn er nicht ein passendes Fixationsobject dazu hat, und auch dann sie schwer auseinanderhält, sobald er auf sie zu achten anfängt. Ich führe dies Beispiel an, weil es zeigt, welches der Zustand des natürlichen Auges ist, mit dem noch keine physiologischen Experimente angestellt sind, und welches noch nicht gelernt hat, über seine Stellungen zu reflectiren, trotzdem daneben vollständige Einsicht in die Theorie des Sehens vorhanden ist.

Unsere Willensintention beim Gebrauche der Augen ist also darauf gerichtet, nach einander einzelne Punkte des Gesichtsfeldes möglichst deutlich mit beiden Augen zu sehen; dies wird erreicht, wenn wir das betreffende Object in beiden Augen auf dem Centrum der Netzhautgrube abbilden, und wir haben dem entsprechend gelernt, unsere beiden Augen so zu stellen und so zu accommodiren, daß dies geschieht. Andere Bewegungen mit den

welchen kein solcher Zweck des möglichst deutlichen ist, auf den unser Willen sich richten könnte, haben

mit zusammenzuhängen, daß wir leichter parallele, ja ungen der Blicklinien hervorbringen beim Sehen nach izont und der Himmel darzubieten pflegt, convergente ch unten, wo der Fußboden und die Objecte, welche ilt, zu betrachten sind.

in die Art der Willensanstrengung kennen lernt, welche schiedenen Augenstellungen als solcher dient, kann siologisch-optische Versuche anstellt, allmählig auch normale Augenstellungen hervorzubringen, für welche object vorhanden ist, indem man gleichsam nach einem 474 ecte blickt. Wenn man sich also zum Beispiel nahe in solches Object vorstellt, oder gleichsam nachsucht, en sei, kann man so starke Convergenz hervorbringen, eines Schielenden aussehen. Und umgekehrt kann mit parallelen Gesichtslinien betrachten, wenn man rne zu sehen sucht, oder wenn man, wie das Volk endet „in das Blaue stiert“, das heißt die Art von einzutreten pflegt, wenn man in Gedanken versunken stände achtet, die man vor sich hat, wobei denn die ung nachläßt, ebenso die entsprechende Convergenz- ihre Fernstellung annehmen.

vergenzstellungen zur parallelen Stellung der Blick- stimmtes einzelnes Object zu fixiren, und übertreibt ergange nöthige Anstrengung, so bringt man auch ungen heraus.

r Zeit und ohne entsprechendes Object Convergenz- tellungen der Blicklinien hervorbringen zu können, mit physiologisch-optischen Untersuchungen beschäf- Vichtigkeit, und muß geübt werden.

in nun auch, freilich zunächst nur in geringerem nationen von Augenstellungen hervorbringen, welche i nicht vorkommen. Um es zu thun, braucht man che Bedingungen zu versetzen, daß nur durch Ab- len Stellungen einfache und deutliche Bilder herzu-

erbindung zwischen Convergenz und Accommodation gleich verändert, wenn man eine Brille aufsetzt. n Beispiel, welche eine Brille mit schwachen Concav- gezwungen, um entfernte Gegenstände deutlich zu eten Blicklinien doch für die Nähe zu accommodiren. ark, so ist es auch sogleich möglich, die Augen

dieser neuen Aufgabe anzupassen, obgleich die Augen dabei das Gefühl ungewöhnlicher Anstrengung haben und bald ermüden. Daher denn überhaupt der Gebrauch einer Brille in der ersten Zeit, wo man sie zu tragen beginnt, immer mit einer merklichen Anstrengung verbunden ist, und umgekehrt Leute, die lange Zeit eine Brille getragen haben, wenn sie sie abnehmen, einen angestregten und gleichsam scheuen Blick zeigen, selbst für solche Gegenstände, für welche sie accommodiren können. Es ist dies eine allgemeine Erfahrung, daß wir gut eingeübte Gruppenbewegungen mit viel geringerer Anstrengung ausführen, als ungeübte. Man denke daran, welche Anstrengung ein ungeübter Schwimmer oder ein ungeübter Schlittschuhläufer aufwenden, um fort zu kommen, und wie leicht dasselbe nachher geht, wenn sie sich geübt haben. Gerade dasselbe geschieht bei den Augen, wenn wir ihre Bewegungen in ungewöhnlicher Weise combiniren sollen.

Eine veränderte Verbindung von Convergenz und Accommodation kann  
 475 man auch erreichen, wenn man stereoskopische Bilder betrachtet und deren Entfernung von einander willkürlich verändert. Davon werden wir unten ausführlicher handeln.

Divergenz der Augen läßt sich ebenfalls bei der Betrachtung stereoskopischer Bilder erzielen, wenn man sie immer weiter von einander entfernt und dabei ihre Vereinigung zu einem Bilde zu erhalten sucht. Ich kann auf diese Weise eine Divergenz meiner Blicklinien bis zu 8 Grad hervorbringen. Dasselbe läßt sich auch erreichen, wenn man zwei gleiche schwach brechende Glasprismen von 6 bis 8 Grad brechendem Winkel so vor beide Augen nimmt, daß die brechenden Winkel (die dünnsten Stellen der Prismen) nach unten sehen, und durch sie nach entfernten Gegenständen blickt. Dazu braucht man bei der angegebenen Haltung der Prismen parallele Gesichtslinien, die aber etwas mehr nach unten gerichtet sind, als ohne die Prismen. Wenn man nun die Prismen langsam dreht, so daß ihre brechenden Winkel sich beide nach außen zu wenden anfangen, so kann man doch noch die vorher gesehenen Gegenstände fortfahren zu fixiren und einfach zu sehen. Man muß dazu aber jetzt die Augen divergent stellen. Man kann dasselbe auch mit einem Prisma erreichen, wenn man dasselbe mit dem brechenden Winkel nach außen vor ein Auge hält, und zuerst nahe Gegenstände betrachtet, welche unter diesen Umständen noch convergente oder parallele Blicklinien erfordern, und dann allmählig zu entfernteren Objecten übergeht, welche Divergenz verlangen.

Endlich haben sowohl DONDERS als ich selbst beobachtet, daß man verschiedene Erhebung beider Augen erzielen kann, wenn man ein schwach brechendes Prisma vor ein Auge nimmt, und den brechenden Winkel zuerst nach innen richtet. Blickt man so nach entfernten Gegenständen, so muß man die Gesichtslinien etwas convergent stellen, was ohne Schwierigkeit zu erreichen ist. Jetzt drehe man das Prisma ganz langsam so, daß der brechende Winkel allmählig immer weiter nach unten rückt, und suche die Fixation des Objects zu erhalten. Es gelingt dies nach einiger Uebung. In

freie Auge den Gegenstand direct mit gerade auf ihn  
 3; das vom Prisma bedeckte Auge dagegen muß sich  
 enden, um den Gegenstand zu fixiren. Hat man eine  
 en erreicht, so nehme man das Prisma plötzlich fort,  
 irte Object in unter einander stehenden Doppelbildern  
 e beiden Blicklinien nicht gleich hoch gerichtet sind.  
 von oben nach unten bringe ich Abweichungen von  
 zu Stande.

chen geht zweifellos hervor, daß die Verbindung,  
 n Bewegungen beider Augen besteht, nicht  
 mischen Mechanismus erzwungen, sondern  
 ofsen Einfluß unseres Willens veränderlich ist, und  
 Bildung unserer Willensintentionen beschränkt sind,  
 dem Zweck, einfach und deutlich zu sehen, von uns

über auf andere Erfahrungen aufmerksam gemacht,  
 und mir auch von andern Beobachtern bestätigt  
 die Augenbewegungen mittels eines anatomisch vor-  
 coordinirt, so wäre zu erwarten, daß dieser desto 476  
 würde im Zustande der Schläfrigkeit, wo die Energie  
 ist. Ich beobachte indessen regelmäsig, daß wenn  
 schläfrig werde, oder nach einem langen Diner aus  
 sellenschaft meine Augen offen zu halten strebe, ich  
 ir liegenden Objecte sehe, welche bald nur zu große  
 edene Höhe, bald abnorme Raddrehungen der Augen  
 durch dergleichen ungewöhnliche Doppelbilder auf-  
 ermuntere, gehen die Doppelbilder meist schnell  
 wenn ich sie dann willkürlich auseinander zu treiben  
 gewöhnlichen neben einander stehenden Doppelbilder  
 größer oder zu geringer Convergenz für das Object

Zwang nun, welche die Bewegungen beider Augen  
 ler beiderseitigen Accommodation verbindet, besteht  
 ehung, die zu einer bestimmten Lage des Gesichts-  
 war von vorn herein zu vermuthen, daß auch die  
 unserm Willen entzogen sei, weil wir durch eine  
 rselben keinen bestimmten praktischen und wahr-  
 n können. Es ist mir jetzt gelungen, die Richtigkeit  
 t erweisen. Man kann nämlich auch die Raddrehung

einen Beiträgen zur Physiologie. 4. Heft, S. 274, die Richtigkeit dieser  
 t offenbar die Erscheinung, auf die es ankommt, nicht gesehen. Die  
 ung beweist, daß ich nicht in den Irrthum verfallen bin, den er mir  
 m, welcher auch nur ein wenig Uebung in der Beobachtung von Doppel-  
 n werden kann, daß ich nämlich wegen schiefer Kopfhaltung neben  
 einander stehend gehalten hätte.

der Augen ganz erheblich verändern, wenn man dieselben unter Umstände bringt, wo sie nur bei veränderter Raddrehung einfach sehen können.

Zu dem Ende benutze ich zwei gleichschenkelige und rechtwinkelige Glasprismen. Wenn man durch ein solches Prisma parallel der Hypotenusenfläche hindurchsieht, wie *Fig. 205* anzeigt, so wird der Lichtstrahl  $ab$ , wo er durch die Cathetenfläche des Prisma in dieses eintritt, gebrochen und gegen die Hypotenusenfläche hin abgelenkt, von dieser bei  $c$  unter gleichem Winkel reflectirt, und tritt dann bei  $d$  wieder aus dem Prisma aus. Wenn  $b$  und  $d$  gleich weit von der Hypotenusenfläche entfernt sind, so geht der Strahl  $ab$  nach dem Austritt aus dem Prisma in derselben Richtung fort, in der er eingetreten ist. Strahlen dagegen, welche wie  $ab'$  und  $ab''$  nicht parallel der Hypotenusenfläche auffallen, und nach der Brechung von dieser (bei  $c'$  und  $c''$ ) reflectirt werden, treten nachher aus dem Prisma so aus, daß der eintretende und austretende Strahl  $ab'$  und  $d'e'$ , oder  $ab''$  und  $d''e''$  gleiche Winkel mit der Hypotenusenfläche bilden. Ein solches Prisma wirkt also unter diesen Umständen wie ein Spiegel, aber mit dem Vortheile, daß die Richtung, in der der mittlere Theil des Spiegelbildes erscheint, unverändert bleibt. Indem der Beobachter in der Richtung  $ab$  durch das Prisma hindurchsieht, erblickt er die jenseits liegenden Gegenstände, aber so, daß Rechts in Links verkehrt ist, wenn die




Fig. 205.

Hypotenusenfläche des Prisma senkrecht steht, oder Oben in Unten, wenn sie horizontal liegt.

Wenn man nun den vom ersten Prisma reflectirten Strahl  $de$  in derselben Weise durch ein zweites Prisma gehen läßt, und die Hypotenusenflächen beider parallel liegen, so wird die Umkehrung der Bilder, welche das erste Prisma erzeugt hatte, durch das zweite, was noch ein Mal in derselben Weise umkehrt, wieder aufgehoben. Alle Gegenstände erscheinen durch zwei solche Prismen gesehen in ganz unveränderter Lage und Stellung. Macht man aber die Hypotenusenflächen der beiden Prismen nicht ganz parallel, sondern dreht das eine Prisma ein wenig um eine dem Strahl  $ae$  parallele Axe, wie in nebenstehender *Fig. 206*, so wird die Umkehrung,



Fig. 206.

welche das erste Prisma hervorbrachte, durch das zweite nicht vollständig wieder aufgehoben, sondern es bleibt eine kleine Drehung der gesehenen Gegenstände um den ungebrochenen Strahl  $ae$  als Axe zurück, welche doppelt so groß

erscheint, als die wirkliche Drehung des einen Prisma gegen das andere ist. Uebrigens können beide Prismen zusammen genommen, wenn sie nur gegen einander festgestellt sind, beliebig um ihren gemeinsamen Axenstrahl

laß die scheinbare Lage der dadurch gesehenen Gegen-  
 stände erlitte.

Ich stellte eine solche Combination zweier Prismen, welche eine  
 der Objecte um die Gesichtslinie von etwa 5 Grad  
 Neigung nimmt und mit beiden Augen gleichzeitig ent-  
 deckt, die eine große Mannigfaltigkeit verschiedener  
 Bilder zeigen, so sieht man anfangs, wie zu erwarten  
 ist, die sehr auffallend und leicht zu  
 man aber fortfährt, die Objecte zu betrachten, und  
 über die einzelnen ausgezeichneten Punkte derselben  
 welche man alle nach einander einfach sehen kann, so  
 der endlich, und man sieht vollständig einfache Bilder  
 in gewöhnlichen Sehen. Wenn man nun einige Minuten  
 einfach gesehen hat, dann das Prismensystem fortnimmt  
 dieselbe Objecte betrachtet, so erblickt man jetzt im-  
 mer Doppelbilder, die sich aber schnell wieder vereinigen.  
 Bei diesem Versuche die Doppelbilder nicht vereinigt,  
 werden, kann man erstlich dadurch beseitigen, daß  
 man vor die betrachteten Objecte ein senkrechtes  
 in Doppelbildern erscheint. Diese haben dann nur die  
 Neigung zu einander, die Neigung der scheinbar 478  
 Daraus folgt also, daß die horizontalen Netzhaut-  
 risen so eingestellt werden, daß sie entsprechende  
 n.

Ich zur Controlle, während ich durch die Prismen sah,  
 einen horizontalen Streifen in beiden Augen entwickelt, und diese,  
 wenn ich entfernt hatte, auf eine weiße Fläche geworfen.  
 erschienen dann die Nachbilder beider Augen ver-  
 ein und dieselbe objective Linie des Gesichtsfeldes.  
 in ihre natürliche Stellung zurückgegangen waren,  
 die Bilder in gleicher Lage im Gesichtsfelde. War die  
 die Nachbilder genommen wurden, horizontal, und  
 einem Doppelprisma bewaffnet, welches 5° nach links  
 die Nachbilder beider Augen, nachdem die Prismen  
 in ihre normale Stellung übergegangen waren,  
 woraus folgte, daß beim Sehen durch das Prisma  
 es rechts gedreht gewesen war, während das rechte  
 die Drehung des Gesichtsfelds folgend, nach links gedreht  
 die Augen aber zeigten sich hierbei auf correspon-  
 dant, und daraus folgt, daß auch correspondirende  
 die das Urbild aufgenommen hatten. Aus diesen

gekreuzten Doppelbildern solche, die eine Raddrehung gegen einander



Versuchen folgt also, daß auch die Raddrehungen des Auges unter besonderen Umständen verändert werden können, wenn nämlich abnorme Drehungen dieser Art gebraucht werden, um die Objecte eines ausgedehnten und an Einzelheiten reichen Gesichtsfeldes in ungekreuzten Doppelbildern zu sehen. Die äußerste Drehung des Gesichtsfeldes, welcher ich bei diesen Versuchen mit den Augen folgen konnte, betrug 7 Grad. Dabei sind nun wahrscheinlich beide Augen um gleich viel, aber in entgegengesetztem Sinne gedreht worden, jedes also etwa um  $3\frac{1}{2}$  Grad. Die abweichende Stellung der Augen wird dabei nicht unmittelbar durch den bloßen Anblick der Divergenz der Doppelbilder hervorgebracht, sondern erst durch eine Reihe correspondirender Bewegungen beider Augen, indem diese das Gesichtsfeld nach allen Richtungen durchlaufen, so daß sie fortdauernd die Einheit des Fixationspunktes erhalten.

Diese Erfahrungen an den Augenmuskeln sind von großer Wichtigkeit für die Lehre von der Willkürlichkeit der Bewegungen überhaupt. Gewöhnlich stellt man sich vor, daß die Fähigkeit, eine bestimmte willkürliche Bewegung auszuführen, gleich von vorn herein durch die Natur gegeben sei, und nicht weiter gelernt zu werden brauche, außer etwa in den Fällen, wo wie beim Gehen, Stelzenlaufen, Schlittschuhlaufen, Schwimmen ein gewisses künstliches Gleichgewicht bei der Bewegung zu erhalten oder die Wirkung anderer Naturkräfte dabei mit zu beachten sei. Es müssen aber auch für andere Bewegungen die dazu nöthigen Willensintentionen erst gelernt werden. Selbst unter den Bewegungen der am freiesten gebrauchten Glieder unseres Körpers, wie zum Beispiel der oberen Extremitäten, findet man leicht Fälle der Art, welche erst eine besondere Einübung erfordern, ehe man sie ausführen kann.

479 So kann man zum Beispiel den horizontal ausgestreckten Arm im Schultergelenk um seine Längsaxe rollen, ebenso Radius und Hand um die Ulna. Beide Rollungen werden durch Muskelgruppen ausgeführt, die ganz unabhängig von einander sind. Wir sind aber nur geübt, beide Rollungen in gleichem Sinne auszuführen, weil unsere Absicht unter gewöhnlichen Umständen nur dahin geht, die Hand in die eine oder andere Rotationsstellung zu bringen. Nun kann man die Aufgabe stellen, beide Rollungen in entgegengesetztem Sinne zu machen, so daß der Ellbogen sich dreht, die Hand aber stehen bleibt. Es ist dies eine Art der Bewegung, die keinerlei praktischen Zweck hat, und deshalb gewöhnlich niemals ausgeführt wird. Auch habe ich bisher noch Niemand gefunden, der dies auf die erste Aufforderung hätte thun können. Und doch ist diese Bewegung ebenso gut zu lernen, wie die abnormen Augenbewegungen. Man braucht nur mit der Hand einen festen Gegenstand zu fassen, und den Ellenbogen zu drehen, dann den Griff der Hand allmählig zu lockern, und dieselbe Bewegung zu machen, bis man die Hand ganz frei lassen kann. Bei diesem Beispiele finden wir also eine ganz ähnliche Beschränkung der Willkürlichkeit in der Combination der Bewegungen, welche anfangs unüberwindlich scheint, und doch durch zweckmäßig geleitete Einübung überwunden werden kann.

Wir haben jetzt zu untersuchen, welche Ursachen bei der Einübung der

auf hinwirken können, daß nur gewisse bestimmte verschiedenen Richtungen beider Gesichtslinien ver-

setzung von DONDERS betrifft, wonach der Raddrehungs-  
 n der zeitweiligen Richtung beider Gesichtslinien, so  
 laß die Einhaltung dieses Gesetzes eine wesentliche  
 erung für die Lösung der Aufgabe gewähren muß,  
 igen und trotz der Verschiebungen der Netzhautbilder,  
 nde Objecte als ruhend anzuerkennen. Wir lassen  
 nd im Gesichtsfelde wandern, weil wir nur so nach  
 Theile des Gesichtsfeldes möglichst deutlich sehen  
 mit beiden Augen möglichst deutlich sehen, wird  
 cht, daß wir beide Gesichtslinien auf den zeitweilig  
 ichten und die Augen für ihn accommodiren. Dabei  
 gen noch in beliebiger Weise um die Blicklinie als  
 ne daß wir aufhören würden, mit beiden Augen den  
 fixiren. Wenn wir nun in dieser Weise ein mit  
 gefülltes Gesichtsfeld vor uns haben, so wechseln mit  
 s auch fortdauernd die Empfindungen in den einzelnen  
 aut. Wenn wir zur Betrachtung eines schon früher  
 rückkehren, und nun eine andere Raddrehung der  
 , als das erste Mal, so würde zwar der Eindruck  
 die beiden Netzhautgruben derselbe sein wie früher,  
 der Nachbarschaft würden eine andere Lage auf der  
 ngs um die Netzhautgrube liegenden Nervenfasern  
 hteindrücke erhalten, als das erste Mal; und um zu  
 ct trotz dieses veränderten Systems von Empfindungen  
 ist, müßten wir das Auge ganz in die alte Stellung 480  
 addrehung zurückführen, um zu prüfen, ob dann bei  
 n Stellung auch der alte Eindruck wieder erhalten

kennen der Objecte in der Regel beim natürlichen  
 gewonnen wird, daß wir sie mit veränderten Rad-  
 . nur die Rückkehr in eine unverändert bleibende  
 ig ist, um das ruhende Object als ruhend wieder-  
 ir von Anfang an uns gewöhnen müssen, für bestimmte  
 inien auch immer wieder bestimmte Grade der Rad-

Einübung auf die Kenntniß der Veränderungen, welche  
 Netzhaut bei Drehung des Auges um die Blicklinie  
 elohne auch möglich werden, die unveränderte Lage  
 veränderten Netzhautbildes richtig zu beurtheilen.  
 ne neue und große Complication in der Einübung  
 Gesichtswahrnehmungen sein, welche gar keinen

Vorthail bringen würde, und der wir deshalb von vornherein aus dem Wege gehen.<sup>1</sup>

Durch dieses Princip, welches ich das Princip der leichtesten Orientirung für die Ruhestellungen des Auges genannt habe, wird zunächst verlangt, daß jeder bestimmten Richtung beider Gesichtslinien bestimmte Werthe der Raddrehung beider Augen zugehören, aber es wird noch nicht bestimmt, welche Werthe zu nehmen seien.

Bisher haben wir nur den Fall untersucht, wo dasselbe Object zwei Mal nach einander direct angeblickt wurde; nun ist noch zu fordern, daß ein ruhendes Object als ruhend erkannt werde, wenn es einmal direct und dann indirect betrachtet wird.

Wir wollen die Untersuchung zunächst für ein einziges, isolirt gedachtes, Auge führen, und später zusehen, welche Veränderungen bei der Verbindung mit einem zweiten Auge einzutreten haben. Wir beschränken uns ferner auf die Annahme unendlich kleiner Verschiebungen des Auges; denn wenn die Anerkennung der Ruhe des Objects erhalten bleibt während der unendlich kleinen Verschiebungen, die während der unendlich kleinen Zeittheilchen einer ausgedehnteren Bewegung stattfinden, so ist diese Anerkennung auch am Ende der Bewegung erhalten.

Wir wollen eine Anzahl von Netzhautpunkten mit  $a, b, c, d$  u. s. w. bezeichnen, und es möge  $a$  das Centrum der Netzhautgrube sein. Die Punkte des Bildes, welche auf diese Netzhautpunkte fallen, bezeichnen wir mit  $A, B, C, D$ . Der Punkt  $A$  des Bildes ist also fixirt; der Punkt  $B$  sei von  $A$ , also auch  $b$  von  $a$  nur um eine verschwindend kleine Größe entfernt. Jetzt  
481 gehe der Blick vom Punkte  $A$  des Bildes über auf den Punkt  $B$ , so daß jetzt  $B$  auf dem Centrum  $a$  der Netzhaut abgebildet sei. Dabei werden die Punkte  $A, C, D$  u. s. w. des Bildes auf andere Netzhautpunkte fallen, die wir mit  $\alpha, \gamma, \delta$  u. s. w. bezeichnen wollen. Während also die frühere Empfindung des Punktes  $b$  übergeht auf  $a$ , geht die Empfindung, welche  $a$  hatte, über auf  $\alpha$ , die von  $c$  auf  $\gamma$ , die von  $d$  auf  $\delta$  u. s. w. Wenn nun dasselbe System von Empfindungsänderungen immer wieder eintritt, so oft wir die Empfindung, welche  $b$  hatte, durch einen Willensimpuls, der Bewegung zur Folge hat, übergehen lassen auf  $a$ , so werden wir lernen, diesen Inbegriff von Aenderungen als sinnlichen Ausdruck einer Augenbewegung zu betrachten, dem keine Aenderung in den Objecten entspricht. Die Probe dafür wird sein, daß wir wiederum in jedem beliebigen Zeitmomente  $A$  fixiren können, und dann das erste System von Empfindungen unverändert wiederfinden. Es kommt aber eben darauf an, daß wir, auch ohne diese Probe anzustellen,

<sup>1</sup> Ich habe früher (Archiv für Ophthalmologie, IX, 2, 156—157) noch hinzugefügt, daß auch die Lage der Objecte im Raume richtig beurtheilt werden sollte. Dagegen hat Herr E. HERRING den Einwand gemacht, daß die Beurtheilung der Lage durch die Raddrehungen der Augen überhaupt gestört werde. In gewissen, aber freilich viel beschränkteren Fällen, als Herr HERRING meint, ist das richtig, wie der nächste Abschnitt lehren wird, und deshalb habe ich die Orientirung über die wirkliche Lage der Objecte in der oben gegebenen Ableitung aus dem Spiele gelassen, und mich auf das Wesentliche beschränkt, daß ruhende Objecte als ruhend anerkannt werden.

, lernen, daß die beobachtete Aenderung keine ist.

ul, wenn die Fixation übergeht auf den dem Netzhaut-  
irenden Punkt des Gesichtsfeldes, auch gleichzeitig  
a,  $\gamma$  das von c,  $\delta$  das von d u. s. w. empfangen,  
uge diese Bewegung immer durch Drehung um eine  
ng zum Augapfel festgelegene Axe ausführe, welche  
ollen.

der dem Punkte a benachbarten Netzhautpunkte;  
von a unendlich wenig entfernter und in anderer  
Punkt sein, so wird eine zweite im Augapfel fest-  
existiren müssen, um den Blick in der Richtung  
diese Verschiebung immer mit der gleichen Ver-  
lides auf der Netzhaut, also mit demselben Systeme  
gen begleitet sein soll.

t F' des Gesichtsfeldes in der Nähe des Fixations-  
it dem Blicke alsdann erreichen können durch eine  
r kleiner Größe um die Axe B und durch eine zweite  
hr kleiner Größe um die Axe C. Da man nun  
n kleinen Drehungen die Drehungsaxen nach dem  
logramms zusammensetzen kann, und die Diagonale  
er in der durch B und C gelegten Ebene liegen  
Auge sich beim Blicke nach F' in dieselbe Stellung  
nfachen Drehung um eine einzige in der Ebene BC  
ie bei der Drehung erst um B, dann um C. Und  
les Blickes nach F' nach dem Gesetze von DONDER'S,  
ründen versucht haben, immer dieselbe Richtung  
Wege es auch dahin geführt sein mag, so folgt,  
Blickes von A nach F' oder irgend einem andern  
entfernten Punkte auszuführen ist durch Drehung  
Drehungsaxe, die immer in ein und derselben,  
liegenden Ebene BC gelegen ist. Dies würde  
daß jede unendlich kleine Verschiebung des Blicks  
eintritt, immer von einem constanten Systeme von 482  
lung in den Sehnervenfasern begleitet ist, welches  
he Ausdruck der zu jener Verschiebung des Blicks  
kennen gelernt wird.<sup>1</sup>

274--283) seiner Beiträge zur Physiologie diese Ableitung als unhaltbar  
ständniß des ersten Princip, welches oben erwähnt wurde, wobei er  
emacht hat, wirkt hier weiter. Er erklärt das zweite Princip für  
s ist es nicht. Denn das erste Princip bezweckt nur, daß ruhende  
en, so oft die Blicklinie in dieselbe Richtung zurückkehrt, das  
ie dener Richtung der Blicklinie als ruhend erkannt werden. Herr  
an das zweite Princip ohne das erste gebraucht, man Unsinn daraus  
as zweite Princip nie anders, denn als Ergänzung des ersten ange-  
ich, daß dies nicht geht. Ich hoffe in der oben gegebenen Darstellung  
und das genannte Mißverständniß beseitigt zu haben.

Dafs die Drehungsaxen für irgend welche sehr kleine Verschiebungen des Auges, die von einer bestimmten festen Stellung ausgehen, alle in einer und derselben Ebene liegen müssen, folgt aus der eben gegebenen Betrachtung für alle Theile des Blickfeldes, wenn die Raddrehung eine continuirliche, nicht sprungweise sich ändernde Function der Richtung der Blicklinie sein soll. Das Princip der leichtesten Orientirung würde fordern, dafs diese Ebene, wo möglich, relativ zum Augapfel fest wäre.

Es wird natürlich am leichtesten sein, die Veränderungen der Empfindung bei der Bewegung des Augapfels als Ausdruck einer solchen Bewegung und nicht einer Bewegung der Objecte zu erkennen, wenn der Uebergang des Blicks auf den dem Netzhautpunkte *b* entsprechenden Punkt des Gesichtsfeldes immer mit derselben Verrückung des Netzhautbildes auf der Netzhaut begleitet wäre, unabhängig davon, welche Anfangslage der Augapfel hat. Es würde eine viel complicirtere Einübung in dem Gebrauche des Auges verlangen, wenn die Objecte immer als ruhend erkannt werden sollten, trotzdem die genannte Verschiebung des Netzhautbildes beim Ausgange von verschiedenen Ausgangspunkten sich als verschieden erweisen sollte. Für unmöglich freilich würden wir eine Einübung der Art nicht von vorn herein erklären können. Die Erfahrung lehrt aber, wie wir sehen werden, dafs sie nicht besteht.

Die hier aufgestellte Bedingung für die leichteste Orientirung beim indirecten Sehen ist nämlich vom menschlichen Auge nicht vollständig erfüllt und kann auch, wie die analytische Behandlung des Problems zeigt, welche ich in der ersten Auflage dieses Buches gegeben habe,<sup>1</sup> nicht vollständig erfüllt werden, ausgenommen für ein Feld, dessen Ausdehnungen gegen den Radius der Kugel verschwindend klein sind. Es ist schon oben angeführt worden, dafs nach dem LISTING'schen Gesetze die Ebenen der Drehungsaxen bei verschiedenen Stellungen der Blicklinie auch verschiedene Lagen im Auge haben. Davon hängen nun gewisse Gesichtstäuschungen ab, die am deutlichsten zu beobachten sind an sehr entfernten Objecten, von deren wirklicher Lage man keine Erfahrungen hat, namentlich an den Gestirnen.<sup>2</sup>

Man suche sich am gestirnten Himmel drei hinreichend helle und weit von einander entfernte Sterne, die nahehin in einer geraden horizontalen Linie stehen. Wir wollen voraussetzen, sie schienen in einer geraden Linie  
483 zu stehen, wenn man das Gesicht so weit erhebt, dafs die Primärstellung der Gesichtslinien auf den mittleren Stern gerichtet ist. Dann werden dieselben Sterne eine nach unten concave Linie zu bilden scheinen, wenn man ihre Reihe mit dem Blicke durchläuft, während das Gesicht weniger gehoben wird, als vorher, die Augen im Kopfe also mehr; und sie werden wie eine

<sup>1</sup> H. v. HELMHOLTZ, *Handbuch der Physiol. Optik*, 1. Aufl. S. 497–516. — Ferner: H. v. HELMHOLTZ, Über die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. *Gräfes Arch.* 9 (2), S. 153. — In etwas erweiterter Ausführung abgedruckt in meinen *Wissenschaftlichen Abhandlungen* Bd. 2, S. 396.

<sup>2</sup> Bei dem früher von mir beschriebenen entsprechenden Versuche hat die Convergenz der Augen einen eigenthümlichen Einfluß, der im nächsten Abschnitte zu besprechen ist.

ie erscheinen, wenn das Gesicht mehr erhoben wird  
n im Kopfe also gesenkt werden müssen, um nach  
ehen. Der Grund dieser Täuschungen ist in den  
s zu suchen. Blickt man nach dem rechten Ende  
bei gehobenem Blicke die Netzhauthorizonte gegen  
, daß ihre rechte Seite gehoben ist. Das rechte  
scheint dann gesenkt; eben so das linke, wenn man  
en Sterne blickt, die ganze Linie also als concav  
bei kinnwärts gewendetem Blick.

e die Neigung, welche eine Reihe von Sternen, wie  
Sterne im Schwanz des großen Bären, gegen den  
einen, indem man das Gesicht so wendet, dass die  
chts oben, bald mit nach links oben gehobenen Augen  
t wird finden, daß bei ersterer Stellung das obere  
ich scheinbar mehr nach links, im zweiten Falle  
nmer gegen die Medianebene des Kopfes hin, neigt.  
diesen Beispielen nicht um Bestimmung einer abso-  
reihen im Raume, als senkrecht oder horizontal, da  
estimmten Form des imaginären Himmelsgewölbes  
imte sein kann. Es handelt sich nur darum die Ueber-  
ereinstimmung in der Richtung des angeschauten  
Blickrichtung zu constatiren, und es zeigt sich bei  
ir bei stark peripherischen Stellungen der Augen  
er die Lage der Gesichtsobjecte im Gesichtsfelde  
des Gesichtsfeldes fallen. Da nun, wie gesagt, in  
solche Raddrehungen der Augen, die dergleichen  
n, nicht ganz vermieden werden können, so kann  
s die Raddrehungen des Auges bei verschiedenen  
ie so gewählt werden, daß die Summe aller Fehler  
aus den Raddrehungen des Auges herfließen,

üllung des zweiten Principis würde fordern, daß  
Blicklinie die Ebene der Drehungsachsen immer  
! hätte. Es würde dann nie eine Componente der  
n Axe die Normale zu jener Ebene der Drehungs-  
e ich die atrope Linie des Auges zu nennen  
e Drehung um diese atrope Linie, deren Lage im-  
stimmt bleibt, würde als ein Fehler zu betrachten  
zweiten Principis würde also so formulirt werden  
ne dieser Fehlerquadrate für alle vor-  
h kleinen Bewegungen des Auges ein  
Quadrate der Fehler müssen hier aus denselben  
lerausgleichungen nach der Methode der kleinsten  
n.



Dafs die Drehungsaxen für irgend welche sehr kleine Verschiebungen des Auges, die von einer bestimmten festen Stellung ausgehen, alle in einer und derselben Ebene liegen müssen, folgt aus der eben gegebenen Betrachtung für alle Theile des Blickfeldes, wenn die Raddrehung eine continuirliche, nicht sprungweise sich ändernde Function der Richtung der Blicklinie sein soll. Das Princip der leichtesten Orientirung würde fordern, dafs diese Ebene, wo möglich, relativ zum Augapfel fest wäre.

Es wird natürlich am leichtesten sein, die Veränderungen der Empfindung bei der Bewegung des Augapfels als Ausdruck einer solchen Bewegung und nicht einer Bewegung der Objecte zu erkennen, wenn der Uebergang des Blicks auf den dem Netzhautpunkte *b* entsprechenden Punkt des Gesichtsfeldes immer mit derselben Verrückung des Netzhautbildes auf der Netzhaut begleitet wäre, unabhängig davon, welche Anfangslage der Augapfel hat. Es würde eine viel complicirtere Einübung in dem Gebrauche des Auges verlangen, wenn die Objecte immer als ruhend erkannt werden sollten, trotzdem die genannte Verschiebung des Netzhautbildes beim Ausgange von verschiedenen Ausgangspunkten sich als verschieden erweisen sollte. Für unmöglich freilich würden wir eine Einübung der Art nicht von vorn herein erklären können. Die Erfahrung lehrt aber, wie wir sehen werden, dafs sie nicht besteht.

Die hier aufgestellte Bedingung für die leichteste Orientirung beim indirecten Sehen ist nämlich vom menschlichen Auge nicht vollständig erfüllt und kann auch, wie die analytische Behandlung des Problems zeigt, welche ich in der ersten Auflage dieses Buches gegeben habe,<sup>1</sup> nicht vollständig erfüllt werden, ausgenommen für ein Feld, dessen Ausdehnungen gegen den Radius der Kugel verschwindend klein sind. Es ist schon oben angeführt worden, dafs nach dem LISTING'schen Gesetze die Ebenen der Drehungsaxen bei verschiedenen Stellungen der Blicklinie auch verschiedene Lagen im Auge haben. Davon hängen nun gewisse Gesichtstäuschungen ab, die am deutlichsten zu beobachten sind an sehr entfernten Objecten, von deren wirklicher Lage man keine Erfahrungen hat, namentlich an den Gestirnen.<sup>2</sup>

Man suche sich am gestirnten Himmel drei hinreichend helle und weit von einander entfernte Sterne, die nahehin in einer geraden horizontalen Linie stehen. Wir wollen voraussetzen, sie schienen in einer geraden Linie  
483 zu stehen, wenn man das Gesicht so weit erhebt, dafs die Primärstellung der Gesichtslinien auf den mittleren Stern gerichtet ist. Dann werden dieselben Sterne eine nach unten concave Linie zu bilden scheinen, wenn man ihre Reihe mit dem Blicke durchläuft, während das Gesicht weniger gehoben wird, als vorher, die Augen im Kopfe also mehr; und sie werden wie eine

<sup>1</sup> H. v. HELMHOLTZ, *Handbuch der Physiol. Optik*, 1. Aufl. S. 497–516. — Ferner: H. v. HELMHOLTZ, Über die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. *Grüfes Arch.* 9 (2), S. 153. — In etwas erweiterter Ausführung abgedruckt in meinen *Wissenschaftlichen Abhandlungen* Bd. 2, S. 396.

<sup>2</sup> Bei dem früher von mir beschriebenen entsprechenden Versuche hat die Convergenz der Augen einen eigenthümlichen Einfluß, der im nächsten Abschnitte zu besprechen ist.

pelbildern liegt, kann für parallele Augenstellungen werden, auch sind dieselben hier entschieden schwerereren Theile des Feldes. Wir können also etwa die Grenze ziehen für das Blickfeld der parallelen ist für sie ein nahehin kreisförmiges Feld übrig, er That das LISTING'sche Gesetz gültig, und die Mitte dieses Feldes. Übrigens sind die beiden icht ganz symmetrisch; mein linkes Auge kann ussen sehen als das rechte.

ngen bekommen die Augen zuerst eben wegen der g nach innen, und zweitens überwiegend nach unten. kfeldes kommen verhältnißmäfsig sehr selten nahe ir zu betrachten haben, auch sind wir nicht im ort so weit zu treiben, wie beim Blick nach unten. enzstellungen Abweichungen von dem Bewegungs- gen in dem Sinne zu erwarten, als ob die Primär- nehr nach innen liegt, als für die Parallelstellungen; r That die Abweichungen in der oben in *Fig. 203* die Stärke dieser Abweichungen wird dann wohl igen Häufigkeit der Convergenzstellungen und fsen, und bei kurzsichtigen Augen, welche haupt- eobachten, werden sich die Eigenthümlichkeiten en auch auf die verhältnißmäfsig seltner gebrauchten können.

ersuche, das Gesetz der Augenbewegungen aus urnemens herzuleiten, mußte natürlich abstrahirt fs und Schätzung der Längen und Winkel des ja selbst von der Kenntnifs der Anordnung der tzhaut, weil diese Kenntnisse, wenn man sie nicht st durch die Bewegungen des Auges gewonnen chkeit wird beides sich wohl neben einander und ssen, und es soll deshalb die gegebene Ableitung t als eine genaue Beschreibung des factischen Gesetzes während der ersten Kindheit angesehen empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen nichts leisten, als nachweisen, dafs in den Gesichts- en Bewegungen des Auges nichts vorkommt, was l zweckmäfsige Einübung unter dem Bestreben, nöglichst genau und sicher zu erkennen, gewonnen d natürlich der Gang dieser Einübung und Er- ehr in seine einzelnen Momente zerlegt dargestellt Wirklichkeit in dem bunten Gedränge zufälliger ls vor sich gehen mag.

haben als regelndes Princip für die Augen-

Das Resultat der analytischen Behandlung dieses Problems, ist folgendes: Damit die Summe der Fehler am kleinsten werde, muß die atrope Linie für jede Form des Feldes mit der Blicklinie zusammenfallen; die Vertheilung der Raddrehungen aber hängt im Allgemeinen von der Form des Feldes ab. In einem kreisförmigen Blickfelde würde das LISTING'sche Gesetz den Bedingungen der Aufgabe am vollkommensten entsprechen, und zwar mit der Primärstellung im Centrum des kreisförmigen Feldes. In nicht genau, aber annähernd kreisförmigen Feldern würden gegen den Rand hin sich Abweichungen vom LISTING'schen Gesetze zeigen müssen, deren Größe aber durch den Umstand noch verringert werden kann, daß solche periphere Stellen vom Blicke seltener durchlaufen werden, und wir, wie es scheint, auch diejenigen Bewegungsrichtungen des Auges zu vermeiden suchen, die dem Rande des Blickfelds parallel gehen und Scheinbewegungen der Objecte hervorbringen würden.

Es zeigt sich also hierbei, daß das LISTING'sche Gesetz der Augenbewegungen das vortheilhafteste für die Orientirung ist, zunächst für ein einzelnes Auge und für ein kreisförmiges Blickfeld.

Nun sehen wir aber mit zwei Augen, welche bald parallel, bald convergirend gestellt werden. Das Princip der leichtesten Orientirung für Ruhestellungen fordert nur, daß die Raddrehungen der Augen dieselben seien, sobald dieselben Stellungen beider Augen wieder eintreten, und in der That finden wir kleine Abweichungen der Raddrehung bei Convergenzstellungen von denen bei Parallelstellungen. Es werden aber beim normalen Sehen Parallelstellungen in der Regel nur in denjenigen Theilen des Gesichtsfeldes vorkommen, welche sehr weit entfernte Objecte darzubieten pflegen; das sind die oberen Theile des Feldes.

Im unteren Theile des Blickfeldes finden sich fast ausschließlich nahe Gegenstände vor; der entfernteste von ihnen ist der Fußboden. Das gemeinsame Blickfeld meiner beiden Augen bei paralleler Stellung habe ich in




Fig. 207.

Fig. 207 gezeichnet; *a* ist die Primärstellung des fernsehenden Auges, die Länge des Pfeils, *ac* bezeichnet die entsprechende Entfernung des Auges von der Tafel, auf die das Blickfeld projicirt ist; die Augen befinden sich dabei in Richtung des in *a* errichteten Lothes. Nach unten hin ist das Sehfeld jedes Auges auf der innern Seite eingeeengt durch die hervortretende Nase, *bb* der Figur; was vom Nasenrücken noch fixirt werden kann, ist durch Schattirung angedeutet. Dieser untere Theil, welcher von den Doppelbildern der Nase theilweis zugedeckt ist und


zu stehen. Es sind dies also Drehungen derselben  
führt, wenn auch mit gröfserer Freiheit veränderlich,

trische Betrachtung der Drehungen. Man denke Erdglobus, der mit seiner Polaxe drehbar in einem Gestell ist; dieser Meridianring möge selbst in Einschnitten auf dem Gestell verschiebbar sein und endlich das Gestell auf einem horizontalen Fuße stehen, so werden die Drehungen leicht zu machen sein, wobei es sich um die Lothlinie als Axe der Drehung handeln wird. Die Umdrehungsart ist so eingerichtet, daß man den Globus in alle möglichen Lagen bringen kann, wobei es sich um die Lothlinie als Axe der Drehung handeln wird. Die Umdrehungsart ist so eingerichtet, daß man den Globus in alle möglichen Lagen bringen kann, wobei es sich um die Lothlinie als Axe der Drehung handeln wird.

Die Pollinie senkrecht stehen, und der erste Meridian der Ebene des Ringes stehen. Die verticalen Coordinaten (Anfangsstellung parallel) nenne ich  $x$ , die Ebene des Meridianringes sei die Ebene der  $xy$ , die  $y$  Axe also des Ringes und die  $z$  Axe senkrecht darauf. Alle diese Mittelpunkt der Kugel gehen. Da es ganz willkürlich ist, die  $z$  Axe legen, so wollen wir annehmen, die atrope Linie in der  $y$  Ebene. Es vereinfacht sich dadurch die Aufgabe, dass die Allgemeinheit derselben beeinträchtigt wird. Die Kugel darstellen soll, würde also die atrope Linie irgend liegen.

vier rechtwinkelige Coordinatensysteme, welche alle in  $\mathcal{A}$  mit einander zusammenfallen. Das erste derselben ist absolut fest im Raume. Das zweite nennen wir  $x, y, z$ , mit dem Gestell des Globus und mit diesem Gestelle nennen wir  $x_2, y_2, z_2$ , es sei fest verbunden mit dem das vierte endlich nennen wir  $\xi, \eta, \zeta$ , es sei fest mit der

f dem Tische gedreht wird, so verschiebt sich das  
gegen das der  $xyz$ ; da aber die  $x$  Axe Drehungsaxe  
zusammenfallend mit der  $x$  Axe, und die  $y_1 z_1$  Ebene  
ist auch nach der Drehung die Entfernung  $x_1$  eines  
in der  $y_1 z_1$  Ebene ebenso groß wie seine Entfernung  $x$   
in Fig. 308. Die Ebene des Papiers die Ebene der  $yz$   
se der  $y$ .  $OH$  die der  $z$ ,  $OD$   
 $z_1$ ;  $C'$  sei die Projection des  
gesucht werden. Man falle  
 $CD$ ,  $CE$  beziehlich auf die  
lich noch vom Punkte  $E$  die  
und  $OB$ , deren Schnittpunkt  
ist.



**Fig. 208.**

$$\begin{aligned} OD &:- CE \equiv y_1 \\ OE &:= OD \equiv z_1. \end{aligned}$$

n das System der  $x_1 y_1 z_1$  gegen das der  $x y z$  gedreht

$$)A =: O(G) \vdash (G)A = O(G) \vdash KC.$$

Da nun der Winkel  $GE O = ECK = EOH = \vartheta$  ist, so ist

$$OG = OE \sin (GE O) = z_1 \sin \vartheta$$

$$KC = CE \cos (ECK) = y_1 \cos \vartheta,$$

folglich

$$y = y_1 \cos \vartheta + z_1 \sin \vartheta$$

488 und ebenso

$$z = OB = OH - KE$$

$$OH = OE \cos (EOH) = z_1 \cos \vartheta$$

$$KE = EC \sin (ECK) = y_1 \sin \vartheta,$$

also

$$z = z_1 \cos \vartheta - y_1 \sin \vartheta.$$

Wir haben also für die Coordinaten  $xyz$  des durch die  $x_1 y_1 z_1$  gegebenen Punktes nach der Drehung folgende Werthe:

$$\left. \begin{aligned} x &= x_1 \\ y &= y_1 \cos \vartheta + z_1 \sin \vartheta \\ z &= -y_1 \sin \vartheta + z_1 \cos \vartheta \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 1).$$

Wenn ferner der Messingring des Globus in dem Gestelle gedreht wird, so ändert sich die Lage des Systems der  $x_2 y_2 z_2$  gegen das der  $x_1 y_1 z_1$ , wobei die  $x_2 y_2$  Ebene aber mit der  $x_1 y_1$  Ebene in Congruenz bleibt, und also auch die  $z_2$  Axe mit der  $z_1$  Axe. Der Drehungswinkel sei  $\alpha$ , die Werthe der Coordinaten  $x_1 y_1 z_1$  findet man ausgedrückt in den Werthen der  $x_2 y_2 z_2$  ähnlich wie vorher

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x_2 \cos \alpha - y_2 \sin \alpha \\ y_1 &= x_2 \sin \alpha + y_2 \cos \alpha \\ z_1 &= z_2 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 1a).$$

Endlich drehe man den Globus um seine Polaxe, dabei verschiebt sich das System der  $\xi v \zeta$  gegen das der  $x_2 y_2 z_2$ , während die  $\xi$  und die  $x_2$  Axe, als Drehungsaxe, congruent bleiben. Die Werthe der  $x_2 y_2 z_2$  sind, wenn der Drehungswinkel mit  $\omega$  bezeichnet wird,

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= \xi \\ y_2 &= v \cos \omega + \zeta \sin \omega \\ z_2 &= -v \sin \omega + \zeta \cos \omega \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 1b).$$

Nun setze man die Werthe von  $x_1 y_1 z_1$  aus 1a) in die Gleichungen 1); man erhält

$$\begin{aligned} x &= x_2 \cos \alpha - y_2 \sin \alpha \\ y &= x_2 \sin \alpha \cos \vartheta + y_2 \cos \alpha \cos \vartheta + z_1 \sin \vartheta \\ z &= -x_2 \sin \alpha \sin \vartheta - y_2 \cos \alpha \sin \vartheta + z_2 \cos \vartheta. \end{aligned}$$

In diese Gleichungen endlich setze man für  $x_2 y_2 z_2$  deren Werthe aus den Gleichungen 1b). Man erhält

$$\left. \begin{aligned} v \cos \omega \sin \alpha - \zeta \sin \omega \sin \alpha \\ \vartheta + v (\cos \alpha \cos \vartheta \cos \omega - \sin \vartheta \sin \omega) \\ + \zeta (\cos \alpha \cos \vartheta \sin \omega + \sin \vartheta \cos \omega) \\ \vartheta - v (\cos \alpha \sin \vartheta \cos \omega + \cos \vartheta \sin \omega) \\ - \zeta (\cos \alpha \sin \vartheta \sin \omega - \cos \vartheta \cos \omega) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 1c).$$

ordinaten  $x y z$  jedes Punktes gegeben, der durch seine in der Kugel gegeben ist.  
 ist die Lage der Polaxe, welche der Blicklinie des Auges 489  
 die Axe der  $\xi$ , für ihre Punkte ist  $v = \zeta = 0$ . Daraus  
 der Polaxe, welcher um  $\xi$  vom Drehpunkte entfernt ist

$$\begin{aligned} x &= \xi \cos \alpha \\ y &= \xi \sin \alpha \cos \vartheta \\ z &= -\xi \sin \alpha \sin \vartheta. \end{aligned}$$

Polaxe und ihrer Anfangsstellung ist also  $\alpha$ , und die  
 die Horizontalebene ist  $\xi \sin \alpha$ , welche mit der  $x y$  Ebene  
 diese Projection ist nun aber die Schnittlinie einer durch  
 die Polaxe  $\xi$  gelegten Ebene mit der Horizontalebene.  
 Verhältnisse auf das Auge, so ist  
 der ersten und zweiten Lage der Blicklinie,  
 die durch die erste und zweite Lage gelegte Ebene mit  
 $y z$  Ebene bildet.

Richtung der Blicklinie gegeben.

an des Winkels  $\omega$  für die Verhältnisse am Auge an-  
 n wir fragen, wie muß der Winkel  $\omega$  gewählt werden,  
 dem Gesetze von LISTING bewegt, und die Anfangslage,  
 zusammenfallen, seine Primärlage ist. Dann müßte nach  
 Stellung die gleiche sein, als wäre das Auge durch  
 und  $y z$  Ebene liegende Drehungsaxe in die neue Lage  
 Punkte der Drehungsaxe unveränderte Lage behalten,  
 der Drehung

$$x = \xi \quad y = v \quad z = -\zeta \dots\dots\dots 2)$$

Umformungen können wir in allen Fällen die Lage der  
 der Forderung des LISTING'schen Gesetzes gemäß die  
 die liegen, das heißt für ihre Punkte  $\xi = 0$  sein soll,  
 Umformungen 1c) nach Einsetzung dieser Werthe

$$\begin{aligned} n \cos \omega \sin \alpha \\ - \sin \vartheta \sin \omega) + \zeta (\cos \alpha \cos \vartheta \sin \omega + \sin \vartheta \cos \omega) \\ - \cos \vartheta \sin \omega) - \zeta (\cos \alpha \sin \vartheta \sin \omega - \cos \vartheta \cos \omega). \end{aligned}$$



Aus der ersten Gleichung folgt:

$$v \cos \omega + \zeta \sin \omega = 0,$$

was erfüllt wird, wenn wir setzen

$$v = h \sin \omega, \quad \zeta = -h \cos \omega,$$

worin  $h$  eine willkürliche GröÙe bedeutet. Dadurch reduciren sich die beiden andern Gleichungen auf die Bedingungen

$$\begin{aligned} \sin \omega &= -\sin \vartheta \\ -\cos \omega &= -\cos \vartheta, \end{aligned}$$

die zu erfüllen sind durch die Annahme

$$\omega = -\vartheta \dots\dots\dots 2a).$$

490 Dies ist also die Bedingung, daß die durch die Gleichungen 1c) gegebenen Drehungen dem LISTING'schen Gesetze folgen. Dann werden die Werthe  $x, y, z$

$$\left. \begin{aligned} x &= \xi \cos \alpha - v \cos \vartheta \sin \alpha + \zeta \sin \vartheta \sin \alpha \\ y &= \xi \sin \alpha \cos \vartheta + v (\cos \alpha \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta) \\ &\quad + \zeta (1 - \cos \alpha) \sin \vartheta \cos \vartheta \\ z &= -\xi \sin \alpha \sin \vartheta - v (\cos \alpha - 1) \sin \vartheta \cos \vartheta \\ &\quad + \zeta (\cos \alpha \sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 2b).$$

Zu bemerken ist noch, daß überhaupt, auch abgesehen von LISTING's Gesetz, die Summe  $\omega + \vartheta$  für sehr kleine Werthe von  $\alpha$  jedenfalls verschwindend klein werden muß, wenn nicht Verschiebungen der Blicklinie um unendlich kleine Werthe von  $\alpha$  endliche Lagenveränderungen des Auges ergeben sollen.

In den Gleichungen 2b) ist  $x$  die Entfernung des Punktes, dessen Coordinaten hier gegeben sind, von der  $y, z$  Ebene;  $\xi$  ist die Entfernung desselben Punktes von der  $v, \zeta$  Ebene. Beide sind positiv genommen, wenn sie vor der Vorderseite dieser Ebenen liegen. Setzt man nun

$$x = -\xi \quad \text{oder} \quad x + \xi = 0 \dots\dots\dots 2c),$$

so ist dies die Gleichung aller der Punkte, die gleichweit von der Vorderseite der Ebene  $x = 0$  und von der Hinterseite Ebene  $\xi = 0$  abstehen. Diese Eigenschaft kommt aber den Punkten derjenigen Ebene zu, welche den Winkel  $\vartheta$ , den die Ebenen  $x = 0$  und  $\xi = 0$  mit einander machen, halbirt. Die Gleichung 2c) ist also die Gleichung dieser Halbirungsebene. Diese Gleichung wird, wenn man den Werth von  $x$  aus 2b) entnimmt

$$0 = \xi (1 + \cos \alpha) - v \cos \vartheta \sin \alpha + \zeta \sin \vartheta \sin \alpha \dots\dots\dots 2d).$$

Indem wir diese Gleichung mit dem Factor

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

multipliciren, erhalten wir

$$0 = \xi \sin \alpha - v \cos \vartheta (1 - \cos \alpha) + \zeta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha) \dots\dots\dots 2e).$$

letztere mit  $\cos \vartheta$ , so erhalten wir

$$v (\cos \alpha \cos^2 \vartheta - \cos^2 \vartheta) + \zeta \cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha).$$

dem Werthe von  $y$  in 2b) zeigt sich, daß diese identisch

$$v = y.$$

ung, welche man durch Multiplication von 2e) mit  $\sin \vartheta$

$$\zeta = z.$$

irungsebene des Winkels  $\vartheta$ , den die Ebenen  $x = 0$  und  $z = 0$  bilden, ist also

$$= -\xi, \quad y = v, \quad z = \zeta \dots \dots \dots 2f).$$

Die zweite Stellung des Bulbus, für die wir die Werthe von 491  
t  $x_0, y_0, z_0, \alpha_0, \vartheta_0$  bezeichnen, so ist für die Halbirungs-  
ebenen die Ebenen  $x_0 = 0$  und  $\xi = 0$  mit einander machen,

$$= -\xi, \quad y_0 = v, \quad z_0 = \zeta.$$

$\xi$  gleichzeitig beiden Halbirungsebenen angehört, das heißt  
so ist für ihn

$$= x_0, \quad y = y_0, \quad z = z_0.$$

Schnittlinie haben also dieselbe Lage im Raume bei der  
1. Stellung des Auges, und daraus folgt, daß, wenn man  
in die zweite Stellung durch Drehung um eine constante  
genannte Schnittlinie der Halbirungsebenen dabei als Axe  
ge dieser Axe ist gegeben durch die Gleichung 2b) und  
die zweite Stellung

$$= -\xi = 0 \text{ und } x_0 = -\xi = 0.$$

len der Bulbus um die resultirende Drehungsaxe hierbei  
die erste Stellung in die zweite überzuführen, ist doppelt  
unter dem sich die genannten beiden Halbirungsebenen  
 $= 0$  gegenseitig schneiden.

regel, nach welcher das Resultat zweier auf einander  
eine einzige Drehung reducirt wird, kann ganz unab-  
Gesetze auf jeden Körper übertragen werden, der sich  
Wenn ein solcher Körper nach einander um zwei ver-  
föhrd, und man kennt die Lage beider Axen, die sie  
g um sie geschieht, oder, was dasselbe ist, die sie haben  
nd vor der zweiten Drehung, so lege man durch beide  
A heißen mag, und construire die Lage dieser Ebene,  
ten Drehung.  $A_0$ , und diejenige, welche sie hat nach  
Da die Drehungsaxen die Schnittlinien von  $A_0$  und  $A$ ,

so wie von  $A_1$  und  $A$  sind, so ist dies ohne Schwierigkeit auszuführen, sobald man die GröÙe der Drehungswinkel kennt, welches die Winkel  $A_0A$  und  $A_1A$  sind. Man construirt die Halbierungsebenen beider Winkel; deren Schnittlinie ist die resultirende Drehungsaxe, der doppelte Werth des Winkels, unter dem sich die beiden Halbierungsebenen schneiden (gleichgültig welchen von den beiden Winkeln man nimmt), ist der Drehungswinkel.

Wenn die Drehungen unendlich klein sind, so liegt die resultirende Drehungsaxe unendlich wenig von der Ebene entfernt, welche die beiden anderen Axen enthält, und fällt im Grenzfalle mit der Diagonale des Parallelogramms zusammen, dessen zwei Seiten der Richtung nach mit den beiden Drehungsaxen zusammenfallen und eine der GröÙe der Drehungswinkel proportionale Länge haben.

Wir kehren zurück zu den Folgerungen aus dem LISTING'schen Gesetze für die Bewegungen des Bulbus. Da die Drehungsaxe, um welche das Auge zu drehen ist, um es aus der Stellung der Gleichungen 2b) überzuführen in irgend eine andere Stellung mit den Coordinaten  $x_0, y_0, z_0$ , jedenfalls in der Ebene  $x + \xi = 0$  liegt, welches auch die zweite Stellung sei, so folgt, daß jedes Mal, wo man von einer bestimmten Anfangsstellung des Bulbus in beliebige andere Stellungen durch Drehung um feste Axen übergehen will, diese Drehungsaxen alle in einer gewissen Ebene liegen müssen, deren Lage nur von der Anfangsstellung abhängt, nicht von der zu erreichenden Stellung, und daß ferner jede Drehung von beliebiger GröÙe um eine der in der genannten Ebene liegenden Axen das Auge aus der zugehörigen Anfangsstellung immer wieder in neue Stellungen überführt, die dem LISTING'schen Gesetze entsprechen.

Die Primärstellung der Blicklinie ist also nur dadurch ausgezeichnet, daß die zugehörige Ebene der Drehungsaxen auf der Blicklinie senkrecht steht.

Die Lage der Normale auf der Ebene der Drehungsaxen für irgend eine Lage der Blicklinie findet man also, wenn man den Winkel zwischen der zeitigen Lage der Blicklinie und ihrer Primärstellung halbirt. Man kann diese Normale die zeitige atrophe Linie für die betreffende Augenstellung nennen.

Bei jeder fortgesetzten Drehung um eine Axe, welche das Auge in Übereinstimmung mit dem LISTING'schen Gesetze ausführt, wird die zeitweilige atrophe Linie der Anfangsstellung einen größten Kreis auf dem kugelig gedachten Blickfelde beschreiben, weil sie senkrecht zur Drehungsaxe im Drehpunkte steht. Die Blicklinie aber, welche im Allgemeinen nicht senkrecht zur Drehungsaxe, wird keinen größten Kreis, sondern einen Parallelkreis zum größten Kreise der relativ atropen Linie ihrer Anfangsstellung beschreiben.

Es sei in Fig. 209  $O$  der Drehpunkt des Auges,  $AO$  die Primärstellung der




Fig. 209.

Blicklinie,  $OB$  eine zweite Stellung derselben. Der Kreis  $ACBDF$  stelle den Durchschnitt des kugelig gedachten Blickfeldes vor. Der Winkel  $AOB$  werde halbirt durch  $GOC$ , so ist  $GOC$  die atrophe Linie für die Stellung der Blicklinie in  $OB$ , und wenn  $OD$  ein Loth zu  $OC$  ist, so würde eine senkrecht zur Ebene der Zeichnung durch  $OD$  gelegte Ebene die Ebene der Drehungsaxen für  $OB$  sein. Nun ist leicht zu sehen, daß, wenn wir  $AO$  bis  $F$  verlängern, die Winkel  $BOD$  und  $FOD$  gleich

ante der gleichen Winkel  $BOC$  und  $GOF$  sind. Daraus folgt irgend eine andere Axe in der durch  $OD$  gelegten Ebene, so dass der Winkel  $BOE$  und  $FOE$  gleich sein müssen.

1. Bulbus um die Axe  $OE$  ganz herumdrehen könnte, würde die Lage  $OF$  kommen müssen. Folglich müssen auch die Blicklinie, ausgehend von der Stellung  $OB$ , bei der Drehung nach LISTING'schen Gesetze gemäß im kugeligen Blickfelde durch den Punkt  $F$  gehen. Die Lage des Punktes  $F$  ist aber ganz unabhängig von  $OB$ , nur abhängig von der Primärstellung  $OA$ . Wir nennen diesen Punkt den Occipitalpunkt des Blickfeldes. Daraus folgt: Die Blicklinie, welche die Blicklinie bei der Drehung um die Axe  $OE$  nach LISTING'schen Gesetze gemäß im kugeligen Blickfelde beschreibt, geht verlängert durch den Occipitalpunkt des Blickfeldes.

Die Blicklinie dem LISTING'schen Gesetze entsprechend, welche im kugeligen Blickfelde beschreibt, der Occipitalpunkt des Blickfeldes geht, so dreht sie sich um eine festbleibende Axe, die senkrecht zur Ebene des kugeligen Blickfeldes ist.

Die Kreise des kugeligen Blickfeldes, welche durch den Occipitalpunkt gehen, nennen wir Directionskreise. Ihre Wichtigkeit für die 493 Bewegung des Blickes zeigen sich in den nächsten Abschnitten mehr. Die größten Kreise des Blickfeldes sind nur, wenn sie durch die Occipitalpunkte gehen, deren Ort im Blickfelde wir den Hauptblick-

punkt nennen. Es ist leicht, dass, wenn ein linienförmiges Nachbild im Auge in das Blickfeld auf einen Directionskreis der betreffenden Richtung fällt, und das Auge in Richtung dieses Directionskreises seine scheinbare Lage in diesem Directionskreise behalten kann, wenn es seiner eigenen Länge verschoben wird; und wenn es sich in der Richtung des Directionskreises bewegt, so dass es in dem Blickpunkt einen der betreffenden Directionskreise schneidet, dass es bei der Bewegung des Blickes in diesem Directionskreise zu demselben bleiben wird.

Es ist einzusehen, dass das Nachbild congruiren wird mit der Richtung des Directionskreises, die im Occipitalpunkt die gleiche Tangente hat, wie die Tangente, die es zuerst congruirte.

Die Directionskreise, welche durch eine bestimmte Stellung der Richtung des Blickes, B. durch die in den Gleichungen 2b) gegebene, ergiebt sich, dass sie durch eine Ebene, welche durch den Occipitalpunkt des kugelförmigen Blickfeldes ausgeschnitten werden, dessen Mittelpunkt der Anfangspunkt unserer Coordinaten ist, ausgeschnitten werden. Das kugelförmig gedachte Blickfeldes

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \dots\dots\dots 3).$$

der Ebene ist

$$ax + by + cz = A.$$

Die Coordinaten des Occipitalpunktes sind

$$x = -R, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

Diese in die Gleichung der Ebene gesetzt, müssen dieser genügen, also

$$-aR = A.$$

Dadurch ist die unbekannte Größe  $A$  bestimmt, und die Gleichung einer beliebigen Ebene, die durch den Occipitalpunkt geht, wird also

$$ax + by + cz = -aR \dots\dots\dots 3a).$$

Die beiden Gleichungen 3) und 3a) sind also die Gleichungen eines beliebigen Directionskreises.

Schreiben wir diese beiden Gleichungen wie folgt:

$$x^2 \left( 1 + \frac{y^2}{x^2} + \frac{z^2}{x^2} \right) = R^2$$

$$x^2 \left( 1 + \frac{b}{a} \frac{y}{x} + \frac{c}{a} \frac{z}{x} \right)^2 = R^2$$

und dividiren sie durch einander, so erhalten wir

$$1 + \frac{y^2}{x^2} + \frac{z^2}{x^2} = \left( 1 + \frac{b}{a} \frac{y}{x} + \frac{c}{a} \frac{z}{x} \right)^2 \dots\dots\dots 3b)$$

- 494 Dies ist die Gleichung eines Kegels, dessen Spitze im Anfangspunkt der Coordinaten liegt, und der durch den Directionskreis hindurchgeht. Das letztere ist der Fall, weil wir die Gleichung 3b) aus den Gleichungen 3) und 3a) abgeleitet haben, in denen  $x, y, z$  die Coordinaten eines beliebigen Punktes des Directionskreises bezeichnen, und ein Kegel ist die in 3b) gegebene Fläche, weil die Gleichung 3b), wenn sie erfüllt wird durch die Coordinaten eines Punktes  $x, y, z$ , auch erfüllt wird durch die Coordinaten aller derjenigen Punkte, für welche die Verhältnisse  $\frac{y}{x}$  und  $\frac{z}{x}$  dieselben Werthe haben.

Wenn aber  $\frac{y}{x} = C_0$  und  $\frac{z}{x} = C_1$  gesetzt werden, so sind dies die Gleichungen einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt der Coordinaten geht. Da also alle Punkte einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt der Coordinaten und durch einen Punkt der Fläche 3b) geht, ganz in dieser Fläche liegen, so ist diese Fläche eine Kegelfläche.

Die geraden Linien, die in der Oberfläche dieses Kegels zu ziehen sind, sind die Richtungen, welche die Blicklinie annimmt, wenn sie den betreffenden Directionskreis durchläuft.

Wenn ein linienförmiges Nachbild in Richtung eines Directionskreises entworfen wird, so bleibt, wie wir hervorgehoben haben, das Nachbild in dem Directionskreise liegen, wenn das Auge dessen einzelne Punkte durchläuft. Oben haben wir die Nachbilder auf eine Ebene projicirt, die senkrecht zur Primärstellung des Auges war, deren Gleichung also ist

$$x = C.$$

$x$  constant, so wird 3 b) die Gleichung einer Hyperbel, des Directionskreises auf die genannte Ebene ist. Sie ist

$$-a^2)z^2 + 2bcyz + 2abxy + 2acxs \dots\dots\dots 3c).$$

1) giebt die Gleichung alle Hyperbeln, längs welcher irgend je Nachbilder verschoben werden können.

dagegen auf solche, welche ursprünglich einer bestimmten zum Beispiel der  $s$  Axe, so ist in der Gleichung des Constante  $c = 0$  zu setzen, und setzen wir ferner

$$a = -\sin \frac{\alpha}{2} \quad b = +\cos \frac{\alpha}{2}$$

1)

$$= y^2 \cos \alpha - z^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} - xy \sin \alpha$$

$$\left(\frac{1}{2} x \operatorname{tg} \alpha\right)^2 - z^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{4} x^2 \cos \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

$$\frac{1}{2} x \operatorname{tang} \alpha = f$$

$$x \sqrt{\frac{\operatorname{tang} \alpha}{2 \operatorname{tang} \frac{\alpha}{2}}} = g,$$

495

Hyperbel

$$\frac{(y-f)^2}{f^2} - \frac{z^2}{g^2} = 1.$$

ie,  $g$  die imaginäre, und der Mittelpunkt der Hyperbel Axe von der Linie  $z = 0$  entfernt. Der eine Scheitel ist in der  $x$  Axe, im Punkte  $z = 0$ ,  $y = 0$ , aber die- beln, welche durch diesen Punkt gehen, sind keine betreffenden Directionskreises. Sie sind vielmehr nur der hinteren nicht sichtbaren Hälfte des Directionskreises. oben construirt in *Fig. 200*.

die Drehung zu bestimmen, welche nach dem LISTING's- n Beziehung auf die Visirebene erleidet. Es sei die uthorizont des Auges, und  $z = 0$  also seine Primär- ie Primärstellung der Visirebene. Die  $y$  Axe ist dann ipunkte beider Augen verbindet. Die Visirebene muß e gehen. Die allgemeine Gleichung solcher Ebenen ist

$$ax + bz = 0.$$



Für die Blicklinie ist  $v = \zeta = 0$ , also nach 2b)

$$x = \xi \cos \alpha, \quad y = \xi \sin \alpha \cos \vartheta, \quad z = -\xi \sin \alpha \sin \vartheta$$

und da die Blicklinie in der Visirebene liegen muß, folgt, daß diese Werte  $x$  und  $z$  der allgemeinen Gleichung der Visirebene genügen müssen, also

$$a \xi \cos \alpha - b \xi \sin \alpha \sin \vartheta = 0.$$

Dem genügen wir, wenn wir setzen

$$a = \sin \alpha \sin \vartheta, \quad b = \cos \alpha.$$

Die Gleichung der Visirebene wird also

$$x \sin \alpha \sin \vartheta + z \cos \alpha = 0$$

oder wenn wir die Werthe aus 2b) einsetzen

$$0 = v \cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha) - \zeta (\sin^2 \vartheta + \cos \alpha \cos^2 \vartheta) .$$

Wenn die Gleichungen zweier Ebenen sind

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0,$$

so ist der Winkel  $k$ , den sie mit einander machen, bekanntlich

$$\cos k = \frac{a\alpha + b\beta + c\gamma}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}.$$

496 Daraus folgt, daß der Winkel, den die Visirebene der Gleichung 4) mit dem Horizont macht, dessen Gleichung ist

$$0 = \zeta \dots\dots\dots$$

gegeben wird durch die Gleichung

$$\cos k = - \frac{\sin^2 \vartheta + \cos \alpha \cos^2 \vartheta}{\sqrt{\sin^2 \vartheta + \cos^2 \alpha \cos^2 \vartheta}}$$

oder

$$\tan k = \frac{\cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha)}{\sin^2 \vartheta + \cos \alpha \cos^2 \vartheta} \dots\dots\dots$$

Der Winkel  $k$ , welcher zwischen der zeitigen Lage des Netzhauthorizonts und der Visirebene liegt, ist hierdurch gegeben.

Der Winkel  $k'$  zwischen der Ebene des ursprünglich senkrechten  $v = 0$  und einer durch die senkrechte  $z$  Axe und die Blicklinie gelegten

$$x \sin \alpha \cos \vartheta - y \cos \alpha = 0$$

wird in ähnlicher Weise gefunden

$$\cotg k' = \frac{\cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha)}{\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta \cos \alpha} \dots\dots\dots$$





auf die Mitte der Hornhaut gedient hatte, aufzustellen. dafs bei dem Fixiren des einen seitlichen Visirs der eine Haar zusammenfiel, und es wurde untersucht, ob beim Visirs der entgegengesetzte Rand der Hornhaut dem Haaries vollkommen der Fall; aber es stellte sich doch heraus, der Bogen beschrieben werden mufste. Dem entsprechend tlichen Visire um gleich viel von dem mittleren entfernt, ndlich ein genaues Zusammenfallen der Ränder der Hornhaut em man nun schnell einige Male abwechselnd nach dem sehen liefs, wurde der Einflufs einer etwaigen früheren rt.

ie der Hornhaut ist, welche man mit dem Ophthalmometer kkel, um den jedes seitliche Visir, vom beobachteten Auge it, so ist der Abstand des Drehpunkts von der horizontalen 517 gleich  $a \cdot \cotang \beta$ .

tlich bei Kurzsichtigen, war die Beweglichkeit des Auges ut den nothwendigen Raum durchlaufen lassen zu können. DONDERs einen mit zwei parallel ausgespannten Drähten, (3,02 Millimeter) genau bestimmt war, versehenen Ring. , dafs abwechselnd der eine Draht mit dem Innen-, der ler Hornhaut zusammenfiel. Um den durchlaufenen Raum r nöthig, den Abstand der Drähte von der zuvor gefundenen en, und dieser Werth wurde der ferneren Berechnung zu

versuchungen sind schon oben angegeben.

gsgesetzes der Augen mit Hilfe der Nachbilder. d für parallele Stellungen von deren Gesichtslinien ist es or einer grofsen mit hellgrauer Tapete überzogenen Wand scharf gezeichnetes Muster hat, an dem horizontale und Man befestigt in der Höhe der Augen ein horizontales rothes Mittelpunkt für die Fixation durch einen schwarzen Punkt n Punkt kurze Zeit fixirt und dann nach der Tapete hin- nes Nachbild des Bandes, und kann leicht erkennen, ob nien des Tapetenmusters parallel läuft, oder von ihrer

imärstellung der Blicklinie in Beziehung auf den Kopf zu hen, welches ein Visirzeichen trägt und zwischen die Zähne

Fig. 210 in geometrischer Projection abgebildet. Das lang, 4 breit) hat bei ntsprechenden bogen- igt es eine vierkantige orizontaler Streif  $CC'$  achs, und daher leicht Die Ränder des Aus- en Seiten mit einem bedeckt, und wenn rückt man die beiden ab, indem man das ähne nimmt. Ist das e Lage des Brettchens errückbar festgestellt, r der Versuche immer er Weise herzustellen. ird so lang gemacht.




Fig. 210.

als die Distanz der Drehpunkte der Augen. Man erkennt dies leicht, wenn man nach einem unendlich entfernten Objecte hinsieht. Dann erscheint der Papierstreifen in einem binocularen Doppelbilde; man macht ihn so lang und dreht ihn so, daß die einander zugekehrten Enden seiner Doppelbilder gerade auf einander stoßen. Alsdann müssen die spitzen Enden des Streifens von einander um die Entfernung der Drehpunkte (oder eigentlich der Centra der Visirlinien) beider Augen von einander entfernt sein und ihre Verbindungslinie mit der Verbindungslinie der beiden Drehpunkte in einer Ebene liegen.

Wenn man nun die Beobachtungen beginnen will, welche entweder mit beiden oder mit je einem Auge ausgeführt werden können, ist es nöthig, zuerst die Primärstellung der Augen empirisch zu suchen. Dies geschieht, indem man von der gewählten Stellung aus, der Mitte des rothen Streifens gegenüber an der andern Seite des Zimmers, die Mitte des rothen Streifens eine Zeitlang fest fixirt, an dem entsprechenden Ende des Streifens *CC* vorbeiblickend, und dann sein Nachbild entweder gerade nach oben und unten, oder horizontal nach rechts und links verschiebt, und bemerkt, ob dasselbe den horizontalen Linien der Tapete parallel bleibt oder nicht. Ist das letztere der Fall, so muß man den Papierstreifen des Visirbrettchens verschieben, bis man die richtige Stellung desselben gefunden hat. Und zwar muß man den Papierstreifen weiter nach links schieben, wenn man nach oben blickend das linke Ende des Nachbildes höher, nach unten blickend dasselbe tiefer stehend findet. Findet man nach oben blickend dagegen das rechte Ende des Nachbildes höher, nach unten blickend dasselbe tiefer, so verschiebt man nach rechts. Man verschiebe den Streifen dagegen nach oben, wenn man nach links blickend das linke, nach rechts blickend das rechte Ende des Nachbildes tiefer stehend findet, und umgekehrt.

Hat man endlich für jedes Auge die Stellung des Visirzeichens gefunden, wobei das Auge in die Primärstellung kommt, so ist dadurch zunächst constatirt, daß es eine Lage des Auges giebt, von der aus sich der Blick horizontal fortbewegt durch Drehung um eine verticale Axe und vertical durch Drehung um eine horizontale Axe.

Während aber bei der Verschiebung des Blicks gerade nach oben oder gerade nach unten, und gerade nach rechts oder links die Nachbilder horizontaler und verticaler Urbilder horizontal und vertical bleiben, findet man, daß dies nicht gilt für die Verschiebung des Blicks schräg nach aufwärts oder abwärts. Man findet vielmehr, daß

- 1) bei der Richtung des Blicks nach rechts oben oder links unten  
das Nachbild einer Horizontallinie gegen die Linien der Wand links gedreht,  
das Nachbild einer Verticallinie rechts gedreht erscheint, und
- 2) bei der Richtung des Blicks nach links oben oder rechts unten  
das Nachbild einer Horizontallinie rechts gedreht,  
das einer Verticallinie links gedreht erscheint.

Da horizontale und verticale Linien verschiedene Drehung zeigen, so ergibt sich daraus schon, daß zwischen ihnen Linien existiren müssen, deren Nachbilder der ursprünglichen Richtung parallel sind.

Am einfachsten ist es nun, den Kopf so seitwärts zu neigen, daß man zur Durchlaufung der horizontalen und verticalen Linien der Wand schräge Bewegungen des Auges zum Kopfe auszuführen hat. Dadurch daß man auch bei solcher Kopfstellung an dem Visirzeichen vorbei nach dem Mittelpunkt des rothen Streifens blickt, sichert man sich, daß man wieder als Anfangstellung die Primärstellung des Auges einhält. Die Richtung, in welcher sich die Bilder der beiden Spitzen des als Visirzeichen dienenden Papierstreifens auf die Wand projiciren, bezeichnet auf dieser die Richtung der Verbindungslinie der Drehpunkte. Bei solchen Augen, deren Bewegungen dem Gesetze von Listing folgen, bleiben dann auch bei seitwärts geneigtem Kopfe die Nachbilder horizontaler Streifen den Horizontallinien der Wand parallel, wenn man den Blickpunkt längs der Verticallinie und der Horizontallinie verschiebt, die durch die Mitte des rothen Streifens gehen. Ebenso verhält es sich mit den Nachbildern eines verticalen Streifens in Beziehung auf die verticalen Linien der Tapete.

wobei das Nachbild auf eine verhältnißmäßig entfernte den Vortheil, daß kleine Verschiebungen des Kopfes nach unten, einen verschwindend kleinen Einfluß auf die durch Lage der Blicklinie haben, und daß ferner die Augen von erhalten werden. Dagegen sind die Wände unserer Zimmer zug, um auch die Prüfung in den extremen Stellungen der osfer Entfernung von der Wand vornehmen zu lassen, und Beobachtungsart nicht zu gebrauchen, weil sie ohne Brille odiren können, und Brillengläser, wenn sie nicht centrisch nie stehen, die scheinbare Neigung der gesehenen Linien obachtungen in der Nähe habe ich die von mir früher idert, um auch den Einfluß der Convergenz sicherer unter-Form des Gesichtsfeldes bestimmen zu können.

ine an der Wand befestigte große hölzerne Tafel, die mit zogen ist. Um die Stellung des Kopfes vor dieser sicher r in einer für die Accommodation des Beobachters passenden hchen aufgestellt und mit eisernen Klammern am Boden n ist ein eiserner Halter mit beweglichen Armen befestigt, n Laboratorien vielfach gebraucht, und dieser hält ein 519 Fig. 210, aber ohne die Säule und das Visirzeichen. Das m Kopfe des Beobachters, wenn er die Zähne darauf fest ler Tafel gegenüber zu geben. Mittels der Zähne kann die er gesichert werden, als durch irgend welche Befestigung, esselben unmittelbar unterstützt. Ein zweiter verstellbarer s wird so festgeschraubt, daß die Stirn gegen ihn anliegt. n einen oder andern Auge gegenüber, ein passend gefärbter oder dünnem Holz befestigt, der in seiner Mitte mit einem s drehbar, befestigt wird. Den Streifen mache ich entweder oder halb grün und halb roth, so daß die Trennungslinie Streifens parallel durch die Mitte seiner Breite hinläuft. kann ein gut gezeichnetes Nachbild. Ferner werden feine d vertical über die Mitte des Streifens hingespant, und ns so lange geändert, bis die Nachbilder des horizontalen n Fadens verschoben diesem parallel bleiben, und ebenso stellten Streifens längs des verticalen Fadens. Dabei ist ichtslinien parallel gehalten werden müssen, und um dies der Entfernung meiner Augen von einander (68 Millimeter) Tafel, nach denen ich hinblicke, den einen dicht an der , den andern in gleicher Höhe seitwärts, so daß, wenn parallelen Gesichtslinien betrachte, sie sich scheinbar

an die Primärlage des einen oder andern Auges finden, Distanz der Augen selbst von einander entfernt, — dann ifen, von dem das Nachbild genommen wird, beliebige l Fäden über seine Mittellinie hinstrecken, um längs dieser . Um convergente Gesichtslinien zu haben, kann man, m Auge entwickelt ist, entweder einen Punkt der Tafel i, oder beliebige hingesezte Punkte mit convergenten oder menfallen machen.

ivergenzstellungen, die Nachbilder nicht genau mit dem lessen Richtung man den Blick hinbewegt hat, so kann gegen den Faden stellen, und diejenige Stellung desselben treffenden peripherischen Theile des Fadens parallel wird. ifen und dem Faden läßt sich leicht berechnen, wenn



man den Abstand misst, den der über den Streifen laufende Faden an beiden Enden desselben mit seiner Mittellinie macht. Oder bequemer, kann man auch gleich auf den beiden Enden des Streifens eine Gradeintheilung anbringen, die nur wenige Grade zu umfassen braucht.

Die Genauigkeit, mit welcher die Vergleichung der Richtung der Nachbilder mit der der Fäden geschieht, geht bis zu einem halben Grade etwa. Das ist freilich keine mit der von astronomischen Beobachtungen zu vergleichende Genauigkeit; aber ich glaube, es wäre bei der Natur des Gegenstandes illusorisch, nach einer sehr viel grösseren Genauigkeit zu streben. Denn schon bei diesen Beobachtungen findet man gewisse kleine Veränderungen, die nicht blos von der Convergenz, sondern auch von dem Wege abhängen, auf dem das Auge in die betreffende Stellung gebracht worden ist, und selbst an verschiedenen Tagen zu wechseln scheinen. Solche habe ich selbst nicht ganz selten gesehen, namentlich bei Schrägstellungen des Auges, noch deutlicher und grösser waren sie bei Dr. BERTHOLD, der in meinem Laboratorium arbeitete, und ich vermuthete, dass sie überhaupt bei kurzsichtigen Augen grösser sein werden, weil diese, hauptsächlich auf nahe Gegenstände angewiesen, an diesen je nach dem Grade der Convergenz stärker wechselnde Raddrehungen bei derselben Richtung der Blicklinie einüben müssen.

Herr E. HERING hat Versuche zur Controlle der Genauigkeit der Nachbildversuche angestellt, aus denen er schliesst, dass Irrthümer in der Vergleichung ihrer Richtung mit objectiven Linien vorkommen könnten, welche einen Spielraum bis zu 5 Grad hätten. 520 Solche Irrthümer muss ich bei gut entwickelten Nachbildern nach scharfer Fixation des Objects für geradezu unmöglich erklären; ich habe schon vorher angeführt, dass bei sorgfältiger Anstellung der Versuche die Fehler einen halben Grad nicht überschreiten. Abweichungen von einem Grad, die ich an dem beschriebenen Apparat leicht absichtlich herstellen konnte, sind bei guter Ausführung des Versuchs sicher zu erkennen. Ich schliesse vielmehr aus den Versuchen von Hrn. E. HERING, dass sein Auge entsprechende Schwankungen in seiner Stellung ausgeführt hat, was namentlich dadurch bedingt sein kann, dass er das fixirte Object in 10 Zoll Entfernung vor sich hatte, und bei einäugiger längerer Betrachtung eines so nahen Objects starke Schwankungen der Convergenz vorzukommen pflegen.

Die Methode der Nachbilder ist unter den bisher bekannten Methoden zur Bestimmung der Stellung eines jeden einzelnen Auges, unabhängig vom andern, die zuverlässigste, wenn sie gut eingeübt ist. Sie erfordert namentlich in der Form, wie ich sie oben beschrieben habe, nicht, — was mir von grossem Gewicht zu sein scheint, — dass das Auge lange in peripherischen Stellungen verweile, sondern jeder einzelne Versuch ist schnell beendet.

Auch die Methode von WUNDT<sup>1</sup> benutzt die Nachbilder zur Bestimmung der Augenstellungen. Derselbe entwirft die Nachbilder auf eine verstellbare und gegen die Blicklinie immer senkrecht stehende Scheibe, die an einem beweglichen Hebelarm befestigt ist. Sein Apparat hatte Winkeltheilungen, um die oben als *Longitudo*, *Latitudo* bezeichneten Winkel und die Raddrehung des verticalen Meridians gegen die Verticallinie abzulesen.

Prüfung des Drehungsgesetzes mittels des blinden Flecks. Diese Methode erlaubt ebenfalls, die Stellung jedes einzelnen Auges ganz unabhängig vom andern zu bestimmen. Sie wurde zuerst von A. FICK<sup>2</sup> angewendet. An der grauen Wand eines geräumigen Zimmers war in der Höhe, in welcher sich das Auge des auf einem Stuhle sitzenden Beobachters befand, ein geeignetes kleines Fixationsobject angebracht, ein weißer Kreis mit schwarzem zackigen Rande. Für das Auge wurde ein etwas über 6 Meter entfernter Standort so gewählt, dass die Sehlinie, wenn sie das Object fixirte, die erwähnte Wand senkrecht traf. Unter diesem Standort waren am

<sup>1</sup> W. WUNDT, *Archiv für Ophthalmologie*, Bd. VIII, 2, S. 16 und 17.

<sup>2</sup> A. FICK, *Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen*. V, 193—233.

ohnet, welche die Füße des Stuhles haben mußten, wenn seine Neigungen gegen die Wand haben sollte. Bei allen diesen die Mitte zwischen den hinteren Füßen an demselben Platze. den Rücken angelehnt, den Kopf gerade ausgerichtet, und so genügend sicher die Medianebene des Kopfes senkrecht zu Stuhles einstellte. Um die Neigung des Kopfes gegen die wurde ein hölzerner über den Kopf gehender Bügel mittels Schlingungen befestigt und ein von seiner Mitte herabgehender Nasenwurzels gestützt. Der Bügel hatte somit eine feste in das linke Ohr gehende Schraube hing ein Loth, das vor verbundenen Gradbogen spielte. So konnte die Neigung des Medianebene gedachten Geraden gegen den Horizont bestimmt

1 Blatt grauen Cartons drehbar um einen Stift im Fixations-  
ner über eine Rolle laufenden Schnur konnte der Beobachtende  
esem war ein schwarzer Fleck gemalt, in einer solchen Ent-  
ter Einstellung in den blinden Fleck fiel. Ein Gehilfe las die  
d wenn eine bestimmte Neigung hergestellt war, stellte sich  
Schnur den Carton so, daß der schwarze Fleck verschwand.  
onte die Drehung des Cartons abgelesen werden. So wurde  
Auge gegen seine Anfangseinstellung gedreht war. Die Drehung  
ongitudo bezeichneten Winkel, der Gradbogen am Ohr die  
iederholung der Versuche Differenzen der Raddrehungswinkel  
man die Stifte, die in die Ohren gesteckt waren, mit der  
bände und einen recht hellen weißen Fleck auf dunklem 527  
Projection des blinden Flecks an Größe und Gestalt genau  
icht eine größere Genauigkeit dieser Methode erreichen lassen.  
opf festgestellt und das Gesichtszentrum, auf welchem sich der  
gt. Der Kopf wurde zu dem Ende passend so festgestellt,  
Mittelpunkte eines verticalen halben Gradbogens von 10 Zoll  
ine verticale Axe um einen zu messenden Winkel gedreht  
tudo, MEISSNER's *Latitudo*). An dem Gradbogen verschieblich,  
lesen werden konnte (FICK's *Latitudo*, MEISSNER's *Longitudo*),  
r an seiner dem Centrum zugekehrten Seite, um eine eben  
r, die Scheibe mit dem dunklen Flecke trug. MEISSNER's  
r folgenden Tabelle zusammengestellt; und zwar ist der  
kel, der dem  $k'$  der Gleichung 4e) entspricht, angegeben.

Vorwärts			Schläfenwärts		
-20°	+10°	0°	-10°	-20°	-30°
0°	+ 2°	0°	+ 3°	+ 6°	+10°
- 1°,5	+ 2°,5	0°	+ 1°,5	+ 3°	+ 5°
- 5°	+ 4°	0°	0°	0°	0°
- 8°,5	+ 5°	0°	- 1°,5	- 2°,5	- 5°
-13°	+ 7°	0°	- 3°	- 6°	- 9°,5
-14°	+ 7°,5	0°	- 3°	- 7°	-10°
-14°	+ 7°	0°	- 3°	- 7°,5	-11°
-14°,5	+ 7°	0°	- 3°	- 8°	-12°
-14°,5	+ 7°	0°	- 3°	- 8°,5	-13°

Der ziemlich unregelmäßige Gang der Werthe macht es wahrscheinlich, daß Convergänzänderungen, die bei einäugiger Fixirung eines sehr nahen Objects schwer zu vermeiden sind, Einfluß gehabt haben. MEISSNER selbst betrachtet seine Versuche als annähernd übereinstimmend mit dem Gesetze von LISTING, glaubt aber, daß für die nasenwärts gerichteten Stellungen eine andere Primärlage zu nehmen sei, die unter  $45^\circ$  gegen die Horizontale nach unten gerichtet ist, für die nach außen gewendeten Stellungen dagegen liege die Primärlage in der Horizontalebene selbst. Um dieses Verhältniß herauszutreten zu lassen, hat er die Versuche noch einer Umrechnung unterworfen.

Von FICK'S Versuchen habe ich die Mittelwerthe in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

<i>Longitudo</i>	<i>Latitudo</i>										
	—33°	—30°	—28°	—14°	—11°	—6°	0°	+1°	+4°	+18°	+45°
— 29°			—4°,7								
— 26°					+3°,5						
— 21°									+1°,5		
— 14°		— 2°								+5°,7	
— 13°				+2°,5							
— 10°								+2°			
0°	+ 2°,5						0°	+0°,1			+0°,1
+ 10°											
+ 13°				+1°,7						—1°,8	
+ 14°		—4°,7									
+ 21°									—0°,3		
+ 26°					+3°,4						
+ 29°			+7°,5								
+ 38°						+2°,9				—3°,3	

522 Prüfung der Augenstellungen mittels der Vergleichung correspondirender Bilder beider Augen. Die hierher gehörigen Methoden lassen, wie es scheint, eine viel größere Genauigkeit zu, als die Methode der Nachbilder; sie können aber nur dazu dienen, die Stellungen beider Augen mit einander zu vergleichen, nicht die Stellung eines jeden einzelnen Auges zu finden. Sie sind deshalb sehr brauchbar, um die kleinen individuellen Abweichungen der Bewegungen vom LISTING'schen Gesetze zu finden. Auch kommt es in gewissen Fällen, namentlich für die Theorie des binocularen Sehens gerade wesentlich darauf an, die Differenzen in der Stellung beider Augen zu finden.

Die erste Anwendung dieser Methoden rührt von MEISSNER<sup>1</sup> her. Er machte darauf aufmerksam, daß, wenn man einen gerade vor sich und normal zur Blickebene gehaltenen Draht so betrachte, daß man die Augen auf einen nahe vor oder nahe hinter dem Drahte gelegenen Punkt convergiren lasse, der Draht der Regel nach nicht in parallelen Doppelbildern erscheine, sondern in solchen, die eine gewisse Neigung gegen einander haben, und daß man den Draht selbst gegen die Visirebene neigen müsse, um ihn in parallelen Doppelbildern zu sehen. Aus der Lage des Drahtes gegen die Visirebene ergab sich dann leicht die Stellung, welche die verticalen correspondirenden Meridiane beider Augen haben, und daraus kann man die Raddrehung des Auges wenigstens für die medianen Lagen des Convergenzpunktes ableiten. MEISSNER fand durch die nach dieser von ihm sehr sinnreich erdachten Methode ausgeführten Untersuchungen im Wesentlichen das Gesetz von LISTING bestätigt, wenn auch gewisse Fehlerquellen, die erst durch spätere Untersuchungen aufgefunden wurden, gewisse Correctionen seiner Resultate

<sup>1</sup> G. MEISSNER, Beiträge zur Physiologie des Sehorgans, 1851.

n. Erstens nämlich kannte er noch nicht den Unterschied Meridianen des Auges von den wirklichen, und glaubte, der Annahme entsprechend, daß unendlich entfernte Vertical-Meridianen beider Augen abbilden müßten, was bei dem Fall ist. Zweitens kannte er nicht den von VOLKMANN aufgeworfene Divergenz auf die Raddrehungen jedes einzelnen Auges. Auch das Parallelismus der Doppelbilder durch den Umstand, daß ein Ende des Drahtes den Augen bald um eine größere, bald um eine kleinere Distanz näher ist, was der Beobachter weiß und wahrnimmt, und das Parallelismus der Doppelbilder als zweier geneigter Stellen kann, statt der Anschauung ihres Parallelismus im Gegensatz kommt.

VON VOLKMANN<sup>1</sup> gemachte Abänderung des Verfahrens von Listing: VOLKMANN hat an einer vor den Augen gelegenen Scheibe so angebracht, daß der Drehpunkt einer jeden in der auf unendliche Ferne gerichteten Auges liegt. Auf jeder Scheibe verzeichnet, welche das Centrum der Scheibe schneidet und durch die ihre Lage ändert. Zur Bestimmung der Lagenveränderung wird ein Gradmesser angebracht. Der Beobachter betrachtet die verzeichneten Linien unter minimaler Convergenz der Augen, und in diesen Doppelbildern sieht, und sucht diese Doppelbilder durch parallel zu stellen.

Erreichung solcher Einstellungen kann man sehr genaue Mittel haben. Diese Methode zwar nicht für verschiedene Kopfstellungen, aber sie läßt die Bewegungen zu machen, aber sie läßt sich dazu eignen bei verschiedenen Kopfstellungen betrachtet.

Wie sich, wie ich gefunden habe, hierfür noch zweckmäßige Einstellung der Parallelstellungen meiner eigenen Augen habe ich an einem durch kleine Gewichte gespannten Fäden aufgehängt, einem weißen und einen schwarzen vor weißem Grunde. Die Entfernung der Fäden hing, wurde so gewählt, daß bei den Beobachtungen die Fäden die Distanz meiner Augen, 68 Millimeter, hatten. 528

Die Fäden an zwei Nadeln, die in das Holz eingesteckt convergiren machten. Hinter der Mitte der Fäden, die zu einer horizontalen Linie gezogen, gerade in der Höhe meiner Augen. Die erichteten Gesichtslinien betrachtet, wobei sie in denselben Blickfeldes zu liegen kommen, und die Nadel am unteren Ende verschoben, bis sich die Fäden nicht mehr kreuzten, und bei dem mehr in divergenten, sondern in parallelen Bildern erschienen. 1 verschiedene Farbe giebt, läßt sich ihre Congruenz im Vergleich, als wenn sie gleichfarbig sind, wobei sie leicht stereoskopisch wenn sie sich durchaus noch nicht decken. Wenn man sie so erscheinen ihre Mitten getrennt und ihre Enden vereinigt. 2, daß die Vereinigung nach oben und nach unten hin in der ist.

Über und hintenüber neigte, konnte ich diese Versuche mit Listing's gehobenen Gesichtslinien wiederholen, und fand in der That, daß dem durch Listing's Gesetz hierbei geforderten vollen Stellen, so daß der Winkel der scheinbar verticalen oberen Grenze des Blickfeldes gehobenen Blicklinien um ein wenig dem tiefsten Stande der Blicklinien, und sich hierbei im Gegensatz des verticalen Meridians jedes Auges um 0°,15 mehr nach

außen gedreht findet, als in der zweiten Stellung. Bei späteren Wiederholungen dieser Versuche fand ich es noch vortheilhafter, dem einen Auge als Object einen geradlinig begrenzten rothen Streifen von 3 Millimeter Breite, dem andern einen blauen Faden, beide auf schwarzem Grunde, zu zeigen. Der Faden muß in der Mitte des rothen Streifens erscheinen.

VOLKMANN selbst hat seine Versuche über die Augenstellungen nach einer Abänderung dieser Methode ausgeführt. Nämlich statt der Drehscheiben mit Durchmessern wendete er solche mit je einem ausgezogenen Radius an, und bemühte sich bei binocularer Betrachtung diese Radien scheinbar in eine gerade Linie zu stellen. Der Kopf wurde dabei passend festgestellt; die Drehscheiben wurden in zwei dunkle Röhren eingesetzt, welche mittels passender Gelenke beliebig gerichtet werden konnten, so daß jedes Auge durch je eine Röhre auf eine Drehscheibe hinsah, und dieselbe immer senkrecht zur Blicklinie des Auges eingestellt blieb.

Versuche mit parallelen Gesichtslinien angestellt ergaben, daß die Abweichungen beider Augen von der durch das LISTING'sche Gesetz geforderten Congruenz bei VOLKMANN's Augen sehr gering sind. Beim Blicke gerade nach oben oder nach unten, gerade nach rechts oder links von einer Stellung aus, welche VOLKMANN mittels Nachbildversuchen als Primärstellung gefunden hatte, ergaben die Versuche gar keine Differenz. Richtungen der Blicklinie schräg nach oben oder unten dagegen gaben kleine Abweichungen. Die folgenden Zahlen sind Mittelzahlen aus je 60 Beobachtungen, wobei in je 30 der bewegliche Radius dem rechten, in je 30 anderen dem linken Auge angehörte, und geben die Kreuzungswinkel der scheinbar eine senkrechte gerade Linie bildenden Radien

Primärstellung:	2°,21
30 Grad nach oben rechts:	2°,74
Ebenso weit nach oben links:	2°,92
Ebenso nach unten links:	1°,31
Ebenso nach unten rechts:	1°,41.

Die größte Abweichung von dem Winkel der Primärstellung ist 0°,9, was für jedes Auge bei gleichmäßiger Vertheilung des Fehlers 0°,45 geben würde, eine Größe, die durch Versuche mit Nachbildern allerdings nicht mehr zu entdecken sein würde.

VOLKMANN fand ferner nach derselben Methode, daß bei Convergenz auf einen 30 Centimeter entfernten Punkt in der Horizontalebene der Winkel der scheinbar verticalen Meridiane von 2°,15 bis auf 4°,16 stieg, so daß sich jedes Auge dabei um etwa einen Grad drehte, was bei derselben Richtung der Gesichtslinie und paralleler Stellung der anderen Gesichtslinie nicht der Fall gewesen sein würde.

Ich finde an meinen eigenen Augen eine sehr kleine Abweichung bei der Convergenz, aber in demselben Sinne wie VOLKMANN. Die Beobachtung geschah mittels eines feinen schwarzen Fadens, dessen Mitte durch ein Nadelöhr gezogen war. Die Nadel war in dem ebenen Felde einer weiß angestrichenen Thür in der Höhe meiner Augen befestigt, die Enden des Fadens waren über zwei andere in gleicher Höhe befestigte Nadeln geleitet und durch Gewichte gespannt. Der Faden bildete also zwei gerade Linien, die in dem Nadelöhr unter einem veränderlichen Winkel zusammenstießen. Je nachdem man die seitlichen Nadeln etwas höher oder tiefer einsteckte, konnte man diesen Winkel nach oben oder nach unten sich öffnen lassen. Die beiden Schenkel des Winkels blieben dabei immer in einer der Thürfläche parallelen Ebene. Wenn ich mit parallelen Gesichtslinien sehen wollte, hielt ich vor die mittlere Nadel einen senkrechten Streifen steifen Papiers von 68 Millimeter Breite. Bei parallelen Blicklinien treffen dann die noch sichtbaren seitlichen Theile der Fäden scheinbar in der Mitte zusammen und bilden einen Winkel. Ich veränderte die Stellung der Nadeln so lange, bis mir dieser Winkel gleich zwei Rechten erschien, also seine beiden Schenkel in eine gerade Linie fielen. Dann fixirte ich das Ohr der Nadel aus 20 Centimeter Entfernung, während ich zwischen meinem Nasenrücken und der Nadel ein Blatt Papier so anbrachte, daß ich mit jedem Auge nur die gleichseitige Hälfte des Fadens sehen konnte. Wenn die Fixation auch in der

ene geschah, erschien mir der Faden doch nicht mehr ste die eine Hälfte desselben etwas senken, damit er wieder : Convergenz auf 20 Centimeter entsprechende Drehung jedes ch 17 Minuten ( $0^{\circ},28'$ ) betragen, während sie bei VOLKMANN

e Drehung stark genug, daß er sie an dem Nachbilde einer ahnehmen kann, welche er mit einem Auge bei parallelen er das Nachbild nachher mit convergenten Blicklinien dicht dasselbe gelang auch Prof. WEICKER bei VOLKMANN. Ganz gens auch J. B. SCHUURMAN<sup>1</sup> angestellt mit negativem Erfolge, angestrengter Convergenz Drehungen von  $1^{\circ}$  bis  $3^{\circ}$  bemerkte, OLKMANN und ich. Viel deutlichere Abweichungen, durch te ich, wie schon oben gesagt ist, bei der Untersuchung der . Stellungen der Blicklinie.

Ansatzpunkte und Drehungsaxen für die Augen- er Muskeln ergibt sich leicht aus ihrer Lage und Befestigung. Strecke über den Augapfel hin verlaufen und sich seiner er, welche über eine Rolle laufen, so üben alle diese Muskeln el in tangentialer Richtung aus. Um die Richtung dieses en, muß man durch den Punkt, wo sich die Sehne anlegt, fel legen, welche für den oberen schiefen Augenmuskel nach ziehen ist, für die übrigen Muskeln dagegen nach ihrem

seiner natürlichen Befestigung nur Drehungen um seinen en wir die Wirkung der Muskeln auch nur insofern zu Drehungen entstehen. Wird ein Körper, der frei um einen Augapfel, durch eine Kraft excentrisch angegriffen, so findet s entstehenden Drehung, wenn man durch die Richtung der hpunkt eine Ebene legt und im Drehpunkt auf dieser ein ist die Axe der betreffenden Drehung. Die Richtung des aben, bestimmt durch den Punkt, wo sich die Sehne an den et, wo der Muskel (oder beziehlich seine Sehnenrolle) am ese beiden Punkte und den Drehpunkt des Auges ist also Drehungsaxe normalen Ebene bestimmt. Wenn man also 525 : geometrisch bestimmt, läßt sich daraus die Lage der

stimmungen sind von RUETE<sup>2</sup> und A. FICK gemacht worden. ideldecke durch einen Sägenschnitt nahe über der Orbita so auf, daß er die Stellung hatte, die er im Leben bei en pflegt. Darauf wurde ein Sägenschnitt in der Mitte perpendicular durch das *Os frontis*, durch die Mitte der arcica und den Rücken der Nase so tief heruntergeführt, überstehenden Draht fest einlegen konnte, in einer Richtung, n und horizontal gewendeten Sehaxen parallel stand, um orientiren zu können. Darauf wurden beide Augen bis zur sen, dann horizontal parallel gerichtet und durch jedes itzter Stahldraht in der Richtung der optischen Axe bis rbita langsam rotirend durchgestoßen, um die Augen in e Lage der Augen noch mehr zu sichern, wurde in einigen von Gyps über die geschlossenen Augenlider gegossen. nhöhlen vorsichtig von oben geöffnet und die Ursprünge

<sup>1</sup> und Onderzoek der Beweging van het Oog; Academisch Proefschrift. Utrecht 1868.  
<sup>2</sup> trop. Leipzig 1857.

und Insertionen der Muskeln sorgfältig frei präparirt, ohne von dem dazwischenliegenden Fett mehr wegzunehmen, als zur Darstellung der genannten Punkte nöthig war. Die Winkel, welche die Muskeln mit der optischen Axe bildeten, wurden dadurch gemessen, daß winkelig gebogene Drähte angelegt wurden. Die Abstände der Ursprünge und Insertionen der Muskeln vom Mittelpunkte der Augen nach oben und unten, nach rechts und links, nach hinten und vorn maß er mit dem Zirkel. Die Messungen wurden von drei Beobachtern wiederholt.

In letzterer Beziehung möchte es indessen wohl vorzuziehen sein, die Entfernungen der Muskel-Ursprünge und Ansätze, des Scheitels der Hornhaut und des Sehnerveneintritts von drei festen Punkten zu messen, wie FICK gethan hat, und danach die Coordinaten und die Lage des Mittelpunkts des Augapfels zu berechnen, da die Lage des letztern anatomisch nicht charakterisirt ist, und directe Messungen des senkrechten oder horizontalen Abstandes zweier nicht genau senkrecht oder horizontal neben einander liegender Punkte mit dem Zirkel ziemlich unsicher bleiben müssen. Im Mittel aus den Messungen an vier Köpfen giebt RUETE folgende Werthe in Millimetern, wobei die  $x$  vom Mittelpunkt des Auges horizontal nach außen, die  $y$  nach hinten, die  $z$  senkrecht nach oben gehen.

	Ansätze			Ursprünge		
	$x$	$y$	$z$	$x$	$y$	$z$
Rectus superior	+ 2,00	— 5,667	+ 10	— 10,67	+ 32	+ 4
„ inferior	+ 2,20	— 5,767	— 10	— 10,8	+ 32	— 4
„ externus	+ 10,80	— 5,00	0	— 5,4	+ 32	0
„ internus	— 9,90	— 6,00	0	— 14,67	+ 32	0
Tendo obliqui superioris	+ 2,00	+ 3,00	+ 11	— 14,1	— 10	+ 12
Obliquus inferior	+ 8,00	+ 6,00	0	— 8,1	— 6	— 15

Durchmesser des Auges = 24 Mm.

Die Angaben von A. FICK sind folgende:

	Ansätze			Ursprünge		
	$x$	$y$	$z$	$x$	$y$	$z$
Rectus superior	0	— 7,9	+ 9,1	— 16	+ 31	+ 6,5
„ inferior	0	— 7,9	— 9,1	— 17	+ 30	+ 2
„ externus	+ 9,1	— 7,9	0	— 15	+ 31	+ 2
„ internus	— 9,1	— 7,9	0	— 18	+ 30	+ 4
Obliquus superior	+ 4,6	+ 2,7	+ 9,9	— 19,6	— 10,9	+ 12,8
„ inferior	+ 10,4	+ 6,0	0	— 18	+ 30 (?)	+ 6
Sehnerveneintritt	+ 3,4	+ 11,5	0			
Scheitel der Cornea	0	— 12	0			


526 Die Werthe von  $y$  und  $z$  für den Ursprung des *Obliquus inferior* müssen, wie RUETE schon bemerkt hat, fehlerhaft sein; beide sind nämlich jedenfalls negativ.

Die Lage der Drehungsaxen hat RUETE aus seinen Coordinatenmessungen berechnet und giebt folgende Werthe für die Winkel  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , welche die (nach unserer Bezeichnung negative) Drehungshalbaxe mit den Richtungen beziehlich der positiven  $x$ ,  $y$  und  $z$  macht:

	$a$	$b$	$c$
R. internus	90 °	90 °	180 °
R. externus	90 °	90 °	0 °
R. superior	161½ °	109½ °	90 °
R. inferior	19 °	71 °	90 °
Obl. superior	51 °	141 °	84½ °
Obl. inferior	127 °	37 °	90 °



um verschiedene Axenpaare sich zusammensetzen, ist oben abnung dieser Verhältnisse schwer übersichtlich zu machen dem Namen Ophthalmotrop ein drehbares Modell der beiden a die Muskeln durch entsprechend gezogene Fäden dargestellt ant werden, und deren Verschiebungen man an einer Skale chung der Vorgänge wird in der Regel die von KWARRE vernts genügen, welche in *Fig. 211* dargestellt ist. Die beiden



*Fig. 211.*

sprechen, sind über die kleinen Rollen am oberen und fessingbalkens *B* gezogen und dann um die Rollen herum *A* geleitet, wo sie ebenfalls durch Löcher gehen und durch Die gleichnamigen Muskeln beider Augen sind durch gleich- acht man nun mit einem oder beiden Augäpfeln eine diejenigen Fäden angezogen, welche Muskeln entsprechen, gung des Auges gedehnt werden, und also der Bewegung hrt werden diejenigen Fäden nachlassen und ihre Gewichte Muskeln am Auge sich bei den betreffenden Bewegungen 537 ande sind, die Bewegung hervorzubringen oder zu unter- rauf achtet, welche Gewichte und um wie viel sie herab- sehen, welche Muskeln und mit welcher Intensität etwa müssen, um die betreffende Bewegung hervorzubringen. entlich um schnell eine Uebersicht über die oft sehr ver- hologischen Abweichungen zu gewinnen, ist der Apparat

ototrop hat WUNDT<sup>3</sup> construiert, an welchem die Fäden ind, deren Kraft und Länge denen der Augenmuskeln t worden sind, und an welchem der Augapfel von selbst über die Augenstellungen entsprechende Richtung an-

<sup>3</sup>Fig. 1857. — *Das Ophthalmotrop, dessen Bau und Gebrauch.* Göttingen 1845, Studien. *Biologie*, VIII. 2. 88.

nimmt, wenn seine der Blicklinie entsprechende Axe in die verlangte Stellung übergeführt wird. WUNDT hat dies Modell namentlich zur Erläuterung seines Princips von der geringsten Anstrengung benutzt, aus welchem er das Gesetz der Augenbewegungen herleitete.

**Historisches.** Die ersten Untersuchungen über Bewegung der Augen bezogen sich auf die Lage des Drehpunkts. JOH. MÜLLER<sup>1</sup> meinte noch, daß der Drehpunkt des Auges in der Mitte seiner Hinterfläche liegen müßte, eine Meinung, die auch von TOURTUAL<sup>2</sup> und SZOKALSKY<sup>3</sup> vertheidigt wurde. VOLKMANN<sup>4</sup> suchte mittels seines Gesichtswinkelmessers den Kreuzungspunkt der Richtungslinie zu ermitteln und den Drehpunkt, wie oben S. 111 schon auseinander-gesetzt ist, zu bestimmen; er glaubte, daß beide Punkte zusammenfielen; der Punkt, den er bestimmte, war in Wirklichkeit wohl der Drehpunkt, der nach ihm 5,6''' hinter der Hornhaut liegen sollte. Der daran sich knüpfende Streit mit MILE, KNOCHENHAUER, STAMM und BUROW ist ebenfalls schon oben erwähnt. Der Letztere machte genauere Bestimmungen des Drehpunktes.<sup>5</sup> Für den Abstand dieses Punktes von der Hornhaut fand er im Mittel von 40 Beobachtungen 5,42''' mit einer grössten Abweichung von 0,8''' VALENTIN<sup>6</sup> wiederholte diese Versuche, sowohl für horizontale, als für verticale Bewegungen, und fand im ersten Fall im Mittel 5,501''' , im letzteren 5,08''' . Sehr viel später folgten die oben erwähnten Untersuchungen von JUNGE (in russischer Sprache veröffentlicht) und von DONDERS und D. DOLJER.<sup>7</sup>

Auch die Untersuchungen über die Raddrehung hat JOH. MÜLLER begonnen.<sup>8</sup> Er sagt, daß er mittels verschiedener Punkte auf dem Augapfel, die er mit Tinte auf dem Weissen desselben bezeichnet hatte, habe erkennen können, daß das Auge während seiner Bewegungen nicht um seine Längsaxe gedreht werde. Diese Meinung blieb die herrschende unter den Physiologen, bis eine Arbeit von HUECK<sup>9</sup> den Anstoß zu vielen Untersuchungen gab. HUECK versuchte eine schon von HUNTER geäußerte Meinung zu vertheidigen, nämlich daß bei der Neigung des Kopfes nach der Schulter eine entgegengesetzte Drehung des Auges um die Gesichtsaxe stattfinden sollte. Diese Drehung schreibt er den schrägen Augenmuskeln zu. Er meinte sich von der Richtigkeit seiner Behauptung überzeugt zu haben, indem er sowohl bei sich selbst, wie bei anderen, die Verschiebungen der Conjunctival-Gefäße bei Bewegungen des Kopfes beobachtete.

Die von HUECK aufgestellten Behauptungen wurden von den meisten Physiologen als richtig angenommen. Obgleich TOURTUAL<sup>10</sup> mit Recht bemerkte, daß die Axendrehung für die Functionen des Gesichts durchaus nicht nothwendig sei, und obgleich RITTERICH und RUETE Widerspruch gegen die Thatsache erhoben, so wurde die Meinung von HUECK doch von TOURTUAL, BUROW,<sup>11</sup> VALENTIN,<sup>12</sup> KRAUSE<sup>13</sup> und VOLKMANN<sup>14</sup> vertheidigt. 528 TOURTUAL selbst überzeugte sich schon, indem er die Stellung des blinden Flecks untersuchte, daß die scheinbare Drehung des Auges im Kopfe wenigstens nicht zureiche, um die Orientirung der Meridiane des Auges ganz unverändert zu lassen. RUETE<sup>15</sup> bewies mittels der Nachbilder, daß eine Drehung des Auges bei Neigungen des Kopfes (und unveränderter Stellung des Auges im Kopfe) überhaupt nicht eintrete. DONDERS<sup>16</sup>

<sup>1</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1826. S. 254.

<sup>2</sup> TOURTUAL, *Müller's Archiv* 1840. S. XXIX.

<sup>3</sup> SZOKALSKY, C. R. 1843.

<sup>4</sup> VOLKMANN, *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinns*. 1836. S. 33.

<sup>5</sup> BUROW, *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges*. 1842.

<sup>6</sup> VALENTIN, *Lehrbuch der Physiologie des Menschen*, Bd. II, 1844.

<sup>7</sup> *Archiv für die Holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde*. 1863, III. 560.

<sup>8</sup> JOH. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. 1826, S. 254.

<sup>9</sup> HUECK, *Die Axendrehung des Auges*. 1838.

<sup>10</sup> TOURTUAL, *Müller's Archiv* 1840, 9. LV und LIV; 1846, S. 346.

<sup>11</sup> BUROW, *Beiträge zur Physiologie des Auges*. S. 8.

<sup>12</sup> VALENTIN, *Repertorium* 1842. S. 407. *Lehrbuch der Physiologie* II, 332.

<sup>13</sup> KRAUSE, *Handbuch der Anatomie*. 1843, S. 550.

<sup>14</sup> VOLKMANN, Artikel Sehen in *Wagner's Handwörterbuch*. S. 273.

<sup>15</sup> RUETE, *Lehrbuch der Ophthalmologie*, S. 14. *Das Ophthalmotrop* 1846, S. 9.

<sup>16</sup> DONDERS, *Nederlandsch Lancet*. 1846 August. *Holländische Beiträge zu den anat. und physiol. Wissenschaften*. 1848. I, 105–145; 384–386.

n RÜCKE zu einer eingehenderen Prüfung des Gegenstandes. Nach HUECK bei seinen Beobachtungen getäuscht worden war; während darauf geachtet hatte, die Stellung des Auges im Kopfe während er die Stellung des Kopfes selbst änderte, und daß die Bilder von dem ersteren, nicht vom letzteren Umstande als die Nachbilder verticaler Objecte bei rein horizontalen Blicken der Augen parallel bleiben, aber bei schräg seitlichen Blicken sich schräg stellen. Ein bestimmtes Gesetz für die Drehung hat er nicht aufgestellt.

Indessen von LISTING<sup>1</sup> aufgestellt worden, und zwar das Gesetz für normalsichtigen Augen in der That sehr genau zutreffend. Der Beweis dafür gegeben und es nicht einmal selbst verwarf dieses Gesetz zuerst einer empirischen Prüfung mittelst der Drehung und fand es im Wesentlichen durch seine Versuche bestätigt. Die Anwendung des LISTING'schen Gesetzes daraus herzuleiten, daß es ein Punkt, der weiter unten zu besprechen ist.

Erklärung des Raddrehungsgesetzes suchten FICK<sup>2</sup> und Listing<sup>3</sup> das Gesetz weiter keine Rücksicht genommen haben, und als des blinden Flecks, der letztere durch Nachbilder determinirt wurde. Sie waren der Ansicht, daß der Augapfel denjenigen Punkt einnimmt, der es erlaube, die verlangte Richtung der Gesichtslinie herzustellen. Dieser Satz ist höchst wahrscheinlich richtig. Die Berechnung der Bedingungen, von denen die Muskelanstrengung abhängt, die Berechnung auf sicheren Grundlagen durchzuführen. Ophthalmotrop, ein Modell des um einen Punkt drehbaren Auges, die Augenmuskeln durch Messingfedern von entsprechender Stärke, und an dem die Drehungen des Augapfels für die verschiedenen Beobachtungen von WUNDT an seinen eigenen Augen eintreten.

Manches aber, daß die Stärke der Muskeln selbst während der ihnen verlangten Leistungen sich anpaßt, schien mir dies als factisch richtig bewähren sollte, nicht den eigentlichen Grund zu enthalten zu können. Ich fand bei der Prüfung des Modells von Nachbildern dieses für meine eigenen Augen und alsichtiger Beobachter mit großer Genauigkeit zutreffend; auch mit Doppelbildern für mein eigenes Auge. Ich suchte zu verändern, daß die Stellung des Kopfes besser gesichert werden, die Muskeln durch Winkelmessungen in seitlichen Stellungen und suchte den Grund des Gesetzes in dem oben gegebenen Erklärung.<sup>5</sup> Einwände gegen die Methode der Beobachtung des Gesetzes, welche E. HERING<sup>6</sup> aufstellte, habe ich oben zu

## Das monoculare Gesichtsfeld.

529

den Gebrauche unserer Augen sehen wir mit ihnen nicht nur sie selbst im Kopfe hin- und herbewegen,

*Ophthalmologie*: Ein neues Ophthalmotrop. 1857.

*Physiologie des Sehorgans* 1851. *Archiv für Ophthalmologie* II. 1855.

*Versuchungen*, Bd. V, S. 193. 1858; *Zeitschrift für rationelle Medizin* 1854.

*Zeitschrift für Ophthalmologie*. VIII. 1862, S. 1—114.

*Ophthalmologie*, IX, 153—214.

*Ophthalmologie*. Leipzig 1864. S. 248—286.

als auch von Zeit zu Zeit unsern Kopf und unsern ganzen Körper im Raume seinen Ort wechseln lassen. Dabei pflegen wir die Augen in der Weise herumschweifen zu lassen, daß beide bald diesen, bald jenen Punkt der vor uns liegenden Objecte fixiren, das heißt, beide sich so wenden, um das Bild des fixirten Punktes gleichzeitig auf den Centren der Netzhäute zu empfangen. Indem wir die Augen so gebrauchen, sind wir im Stande, richtige Wahrnehmungen des Ortes derjenigen gesehenen Gegenstände zu gewinnen, von denen das Licht ungestört in seinem geradlinigen Wege zu unserem Auge gelangt.

In der That läßt sich nach den in § 10 erörterten Gesetzen der Lichtbrechung im Auge einsehen, daß wenn bekannt ist die Stellung des Körpers und des Kopfes, ferner die Stellung beider Augen im Kopfe, und  
 530 somit auch die Lage ihrer Knotenpunkte, endlich die Orte der beiden Netzhäute, welche von den Bildern desselben leuchtenden Punktes getroffen werden, daß dann auch eindeutig bestimmt werden kann der Ort, wo der leuchtende Punkt sich wirklich befindet. Denn man ziehe von dem Netzhautbilde jedes Auges eine gerade Linie durch den Knotenpunkt, und verlängere sie. Beide Richtungslinien werden sich nur in einem Punkte schneiden können, und nur in diesem Punkte wird sich das leuchtende Object befinden können.

Von der Genauigkeit der einzelnen oben geforderten Bestimmungen wird es übrigens abhängen, mit welcher Genauigkeit der Ort des gesehenen Objects im Raume wirklich bestimmt wird.

Wenn also gegeben sind:

- 1) Empfindungen, welche genügen, um eine richtige Kenntniß zu gewinnen von der Stellung unseres Körpers und Kopfes gegen ein beliebig für die Abmessungen gewählte Grundlage, zum Beispiel den Fußboden, auf dem wir stehen,
  - 2) Empfindungen, welche zu einem richtigen Urtheil über die Stellung unserer Augen im Kopfe genügen,
  - 3) Momente in der Empfindung (sogenannte Localzeichen), durch welche wir die Reizung der von dem Lichte des Objectpunktes *A* gereizten beiden Netzhautstellen von der Reizung aller anderen Netzhautstellen unterscheiden können (von welcher Art diese letzteren sind, darüber wissen wir gar nichts; daß dergleichen da sein müssen, schließeln wir eben nur aus dem Umstande, daß wir Lichteindrücke auf verschiedenen Theilen der Netzhäute zu unterscheiden vermögen),
- so ist hinreichendes Material gegeben, um den Ort des Punktes *A* im Raume unzweideutig daraus bestimmen zu können. Befände sich der Punkt *A* an irgend einem andern Orte des Raums, so würde er ein anderes Aggregat von Empfindungen erregen müssen. Die Erfahrung lehrt nun, daß wir im Allgemeinen auch wirklich durch das Gesicht die Orte der gesehenen Objectpunkte richtig bestimmen können. Die Genauigkeit dieser Bestimmung ist freilich eine wechselnde und hängt namentlich davon ab, wie nahe in

des Punktes *A* dem Centrum der Netzhautgrube

also zu untersuchen haben, wieviel die genannten  
; einzeln genommen zu der genauen Wahrnehmung  
beitragen. Wir werden dabei nicht weiter unter-  
findungen die Beurtheilung der Stellung des Körpers  
Kopfes zum Körper abhängig ist; die Untersuchung  
siologie der Sinneswahrnehmungen überhaupt, nicht  
3. Wir nehmen also an, daß die Stellung des  
runde gelegte Basis der räumlichen Abmessungen  
kannt sei. Dann bleibt also zu untersuchen, wie-  
Ortes der Objecte beitragen

Bewegungen des Kopfes

Bewegungen der Augen im Kopfe

sehen mit einem Auge

sehen mit beiden Augen.

Untersuchung damit, daß wir feststellen, was beim 531  
sehen und beim Ausschluss aller Bewegungen des  
öfne. Die Bewegungen des betreffenden Auges im  
in dem vorliegenden Abschnitte im Allgemeinen

Es wenn gegeben ist Ort und Stellung eines Auges,  
entwird eines leuchtenden Punktes, für den das  
können wir von seinem Netzhautbilde eine gerade  
Linie vom Auge ziehen, und wissen zunächst, daß  
er dem Auge in dieser Linie liegen müsse. In  
welcher Linie er aber liege, bleibt nothwendig unbekannt,  
Hilfsmittel zur Entscheidung darüber haben. Zwar  
Accommodation des Auges denken. Wäre das Auge  
accommodirt, so würde möglicher Weise der  
Anstrengung, oder die Größe des vorhandenen Zer-  
s über die Entfernung geben können. Wir werden  
sehen, welche Hilfsmittel beim monocularen Sehen für  
Entfernung noch vorhanden sind, und dabei sehen,  
in der That ein außerordentlich unvollkommenes  
Beurtheilung der Entfernung ist. Wenn wir also von  
in der Schärfe des Bildes absehen, welche durch  
hervorgebracht werden können, so ist kein  
Empfindung vorhanden, welches darüber Aufschluss  
gibt, wo der leuchtende Punkt liegt.

Es setzt, das Auge sei genau accommodirt für den  
; können wir, um seine Richtung zu finden, von  
oben vorgeschrieben ist, die gerade Richtungs-  
Linie ziehen, oder aber auch jedem anderen Strahle

folgen, der von irgend einem Punkte der Pupille nach dem Netzhautbilde hinläuft. Wenn wir die Brechung eines solchen Strahls nach den in § 10 gegebenen Regeln richtig construiren, um seinen Weg vor dem Auge zu finden, wird uns jeder solcher Strahl schliesslich zu dem leuchtenden Punkte zurückführen, von dem er ausgegangen ist. In diesem Falle bleibt es also gleichgültig, welchen von den in die Pupille gefallen Strahlen wir wählen, um die Richtung zu bestimmen, in welcher der leuchtende Punkt liegt.

Dies ist aber nicht mehr gleichgültig, wenn wir auf der Netzhaut Bilder von leuchtenden Punkten haben, für welche das Auge nicht ganz genau accommodirt ist. In solchen Fällen dürfen wir den Mittelpunkt des Zerstreuungskreises als den Ort des Netzhautbildes betrachten<sup>1</sup>. Der Strahl aber, welcher von dem leuchtenden Punkte nach der Mitte des eventuellen Zerstreuungskreises hingeht, geht, wie schon oben S. 115 bemerkt, durch den Mittelpunkt der Pupille und ist mit dem Namen einer Visirlinie 532 belegt worden. Wenn sich der leuchtende Punkt längs dieser Visirlinie hin und her bewegen würde, so würde sich in der Empfindung nichts verändern, als daſs das Zerstreuungsbild desselben kleine Vergrößerungen und Verkleinerungen erlitte, welche selbst bei sehr bedeutendem Wechsel der Entfernung unmerklich klein sein könnten.

Es läſst sich ferner zeigen, daſs auch durch eintretende Accommodation des Auges für die Nähe der Mittelpunkt der Zerstreuungskreise auf der Netzhaut seinen Ort nicht merklich verändert. Die darauf bezügliche Rechnung wird am Ende dieses Paragraphen gegeben werden.

Um nun zur Anschauung zu bringen, was wir mit einem Auge ohne Hilfe von Bewegungen des Kopfes und ohne Berücksichtigung der Accommodationsunterschiede von der Außenwelt erkennen können, dazu sind namentlich sehr weit entfernte Gegenstände als Gesichtobjecte die passendsten Beispiele. Denn bei sehr weit entfernten Objecten bringen mäßige Bewegungen unseres Kopfes keine andere Veränderung des Bildes hervor, als wir auch durch Drehungen des Auges allein hervorbringen können. Ja, beim Anblick unendlich entfernter Objecte ist es sogar gleichgültig, ob wir das zweite Auge ebenfalls öffnen, oder nicht. Denn der Gebrauch des zweiten Auges giebt uns nur dann ein neues verwerthbares Moment der Empfindung, wenn die in ihm gezogene Visirlinie die des ersten Auges irgendwo in einer meſsbaren Entfernung schneidet. Wenn beide Linien merklich parallel sind und neben einander in unabsehbare Entfernung hinauslaufen, so giebt uns das keinen Aufschluß über die wirkliche Entfernung des leuchtenden Objectes, auſser dem negativen, daſs es jenseits einer gewissen Grenze der Entfernung liegen muſs.

Betrachten wir weit entfernte irdische Gegenstände, so kann uns die früher gewonnene Bekanntschaft mit ihrer wirklichen Form und Entfernung,

<sup>1</sup> Es ist hier nur von leuchtenden Punkten die Rede; daſs es sich an den Rändern leuchtender Flächen anders verhält, ist bei der Lehre von der Irradiation in § 21 auseinandergesetzt.

herlei Hilfe in der Deutung unseres Gesichtsfeldes gewonnen von allen diesen Hilfsmitteln früherer Erinnerung frei als ein Object dar, was für diese Untersuchung in aussergewöhnlich der gestirnte Himmel. An dem finden wir die Grösse und Entfernung uns durchaus keine frühere Erfahrung hat, für deren Wahrnehmung der Gebrauch beider Augen von uns ausgeführten Bewegungen durchaus nicht zu gewähren, als ein einzelnes Auge gewähren kann, unverändert bleibt.

Wir ändern erscheinen uns die Objecte, welche in der ersten Dimension vertheilt sind, nur noch nach zwei Dimensionen. Wir sind nur noch im Stande, die Richtung der Linie zu jedem einzelnen gesehenen Punkte hinzuführt. Die Aufmerksamkeit zu ihrer Festsetzung nicht mehr drei Bestimmtheiten, sondern nur zwei; wie denn auch die Sterne werden durch je zwei Winkel, entweder ihre Länge oder ihre Breite zum Pol und Aequator, oder ihre Rectascension oder Declination als Winkeln zur Ekliptik.

In zwei Dimensionen ist eine Fläche; in einer solchen Fläche festgestellt durch je zwei Bestimmungsstücke. Wenn wir einem Auge, dessen Drehpunkt seinen Ort im Raum 533 Dimension, die Entfernung, nicht zu unterscheiden, so werden die Objecte nicht mehr im Raume, sondern nur in einer Linie vertheilt sehen. Diese scheinbare flächenartige Anordnung der Objecte nennen wir das Gesichtsfeld. So werden die Sterne an der imaginären Fläche des Himmels-

darauf zu achten, dass ich nicht gesagt habe, die Objecte sind an oder auf einer Fläche vertheilt, sondern nur in einer Linie, in flächenartiger Anordnung, in einer nach zwei Dimensionen Anordnung. In der That stellen wir uns nicht die Fläche in bestimmter Entfernung vor, an der die Objecte der Höhe des Horizonts angeheftet wären, wenn auch die Objecte und die krystallinischen Sphären der alten Zeit für eine kindlichere Art der Anschauung sind, in der wir uns zu machen suchte. Es ist dadurch manche physiologische Optik gekommen, dass man glaubte, in der That eine Fläche, meist eine Kugelfläche, als das zeitliche Gesichtsfeld annehmen zu müssen.

Man kann sich die Objecte auf einer Fläche darstellen. So haben wir die Objecte gleicher Helligkeit nach gewissen Regeln aufgestellt. Die beiden Variablen, nach denen die Farbe der Objecte hierbei der Farbenton und der Sättigungsgrad der Objecte eine continuirliche Reihe von Farbentönen von



einer Anfangsfarbe aus und zu derselben wieder zurück (das heisst, ziehen wir eine geschlossene Linie in der Farbenscheibe), so zerfällt dadurch die Gesammtheit der Farben in zwei vollständig getrennte Gruppen (die aufserhalb und innerhalb jener Linie dargestellt sind), und wir können nicht von einer Farbe der einen Gruppe continuirlich zu einer der andern Gruppe übergehen, ohne durch eine der zuerst berührten Farben (die in der geschlossenen Linie liegen) hindurchzugehen. Dies letztere ist nun auch die Charakteristik einer einfach zusammenhängenden Fläche; jede geschlossene Linie, die wir in ihr ziehen, theilt sie in zwei Theile, und wir können nicht von einem Punkte des einen Theils zu einem des andern in der Fläche übergehen, ohne durch jene geschlossene Linie durchzugehen. Eben wegen dieser Analogie machen wir uns das System der Farben anschaulich, indem wir sie auf einer Fläche ausgebreitet darstellen, und mehr will es zunächst auch nicht sagen, wenn wir die Objecte auf die imaginäre Fläche des Gesichtsfeldes, deren Ort im Raume übrigens ganz unbestimmt bleibt, entwerfen.

Uebrigens ist auch leicht einzusehen, dafs diese Anschauung einer flächenhaften Vertheilung der Gegenstände im Gesichtsfelde auch da erhalten bleiben mufs, wo wir gleichzeitig mit ihr vollständig genaue und richtige Anschauungen der wirklichen Vertheilung der Objecte im Raume durch unsern Gesichtssinn haben. Denn immer wird die Eigenthümlichkeit in der Anschauung stehen bleiben, dafs, wenn ich mit dem Blicke eine geschlossene Linie im Gesichtsfelde durchlaufen habe, ich von einem innern zu einem äufseren Punkte den Blick nicht überführen kann, ohne jene geschlossene  
 534 Linie zu durchschneiden. Wenn ich den Umfang eines Fensters mit dem Blick umschrieben habe, kann ich von einem Objecte, welches ich aufserhalb des Fensters sehe, nicht zu einem Objecte an den Wänden des Zimmers übergehen, ohne mit dem Blicke über den Rand des Fensters zu streifen, und dadurch ist das wesentliche Kennzeichen einer flächenartigen Anordnung der gesehenen Objecte gegeben, obgleich wir andererseits sehr wohl wissen, dafs im wirklichen Raume unendlich viele Linien von jenem äufseren Punkte zu dem an der Zimmerwand gezogen werden können, welche die Umgrenzungslinie des Fensters durchaus nicht schneiden.

Eben weil wir in dieser Weise mit dem Blicke über die Gesichtsobjecte hinstreifend dieselben in einer flächenhaften Anordnung finden, ist es nun auch möglich, ihren Anblick durch flächenhafte Zeichnungen und Gemälde dem Auge zurückzurufen. Der Zeichner, welcher eine Landschaft abbilden will, bemüht sich nicht zu ermitteln, wie weit jeder Punkt der Landschaft von seinem Auge oder von einem andern Punkte der Landschaft wirklich entfernt ist, sondern nur, ob er von dem ersten aus den Blick nach oben oder unten, nach rechts oder links wenden mufs, und welche Excursion sein Auge etwa machen mufs, um zu dem zweiten hinzugelangen. Das flächenhafte Bild wird von uns als ähnlich dem körperlichen Objecte anerkannt, wenn wir dieselben Bewegungen unseres Auges ausführen müssen, um von

te des Bildes zu gelangen, welche nöthig wären, um  
kte des Objects nach einander zu erblicken.  
itlich, daß wir auf diesem einfachen Wege auch die  
r Punkte in der scheinbaren Fläche des Gesichts-  
können, zunächst abgesehen von allen Gröfsen-

verstehen ist, wird am leichtesten ersichtlich, wenn  
ftes Bild auf eine dehnbare Kautschukplatte auf-  
kann man nachher beliebig ausrecken, und alle  
chen ihren einzelnen Theilen, so wie die Winkel  
Linien der Gröfse nach beliebig ändern, doch wird  
n jede geschlossene Linie, die durch dieselbe Reihe  
gezogen ist, immer denselben unveränderlichen Satz  
in sich einschließen und die andere Hälfte aus-  
continuirlichen linienförmigen Reihe von Punkten  
ihnenfolge der Punkte unverändert bleiben, so sehr  
orm der einzelnen Theile einer solchen Linie sich  
die Anordnungsweise der Punkte auf einer ebenen  
nd einem Erdglobus dieselbe, trotzdem daß die  
ler ebenen Karte nicht genau denen auf dem Globus  
so weniger, ein je größeres Stück der Erdoberfläche

chen haben, und die Punkte der einen denen der  
zten Weise entsprechen, so nenne ich die Ordnung

Flächen, gleichartig, so oft allen solchen Reihen  
Fläche, die in einer continuirlichen Linie liegen,  
en entsprechen, die ebenfalls in einer continuirlichen  
die Reihenfolge der Punkte in der ersten Linie 535  
Reihenfolge der entsprechenden Punkte in der

über das Gesichtsfeld schweifen lassen, finden wir  
nehmung, in welcher Ordnung die Objectpunkte im  
folgen, so daß zunächst wenigstens die Ordnung  
le durch solches Herumblicken unmittelbar bestimmt

it die Gröfsenverhältnisse durch das Augenmaafs  
wollen wir nachher untersuchen. Hier ist zunächst  
daß wenigstens das Auge des Erwachsenen die  
Gesichtsfelde nicht nur an Objecten bestimmt, über  
en kann, sondern daß wir ein bestimmt flächenhaft  
solchen Objecten und Erregungen haben, die in  
it ihren Ort nicht wechseln und sich mit unserem  
lt für die Nachbilder, die Netzhautgefäße, die  
überhaupt für die meisten subjectiven Erscheinungen.

Wie wir auch das Auge bewegen mögen, immer wird derselbe Punkt eines solchen subjectiven Bildes dem Fixationspunkte entsprechen, und wir können nie verschiedene Theile des Bildes nach einander auf der Mitte unserer Netzhaut wechseln lassen. Daraus folgt, daß wir im Stande sind, die Ordnung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde auch zu beurtheilen nach dem bloßen Eindruck, den das ruhende Netzhautbild auf die ruhende Netzhaut macht, ohne daß wir nöthig haben, jedes einzelne Mal durch Bewegungen zu controlliren, welches die Reihenfolge der einzelnen Objectpunkte sei.

Um diese Thatsache zu erklären, kann die Annahme gemacht werden und ist von den Anhängern der nativistischen Theorie gemacht worden, daß wir eine angeborene Kenntniß der Ordnung der Netzhautpunkte auf unserer Netzhaut (und auch wohl der GröÙe ihrer Abstände) besitzen, welche uns unmittelbar in den Stand setzt, wahrzunehmen, welche Punkte des Netzhautbildes continüirlich aneinanderstoßen, welche nicht. Wenn eine solche Annahme gemacht wird, so ist damit natürlich jede weitere Erörterung über den Ursprung unserer flächenhaften Gesichtsbilder abgeschnitten.

Andererseits ist ersichtlich, daß die Fähigkeit, auch ohne Bewegung des Auges die Ordnung der Objecte im Gesichtsfelde zu erkennen und zu beurtheilen, auch erworben sein kann, wie dies die empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen annimmt. Denn jedes Mal, wo wir durch Bewegungen des Auges die Ordnung der Theile eines ruhenden Objectes bestimmt haben, erhalten wir auch, so lange wir einen seiner Punkte ruhig fixiren, einen ruhenden Eindruck seiner verschiedenen Theile auf unsere Netzhaut, und können somit durch Erfahrung kennen lernen, wie zwei Punkte, die wir durch Bewegung des Auges als benachbart erkannt haben, sich im ruhenden Bilde des Auges darstellen, das heißt also, anatomisch gesprochen, wir können durch Erfahrung kennen lernen, welche Localzeichen der Gesichtsempfindungen benachbarten Netzhautfasern angehören, und wenn wir dies gelernt haben, werden wir im Stande sein, auch aus dem unveränderten  
536 Eindruck eines relativ zum Auge ruhenden Objectes die Anordnung der Punkte im Gesichtsfelde zu erkennen.

Wir werden also im Folgenden zu prüfen haben, ob ohne die Hypothese von der angeborenen Kenntniß der Anordnung der Netzhautpunkte die Thatsachen sich erklären lassen aus den bekannten Fähigkeiten des Sinnengedächtnisses. Directe Versuche über diese Frage an neugeborenen Kindern lassen sich natürlich nicht anstellen, und die Erfahrungen an operirten Blindgeborenen ergeben hierüber so gut wie nichts, da diese operirten sogenannten Blinden fast immer Staarkranke waren, welche durch ihre getrüßte Linse allerdings sehr wenig zu sehen, aber doch die Richtung des stärkeren Lichts noch zu erkennen im Stande waren, und also der Erfahrungen über die Localisation ihrer Netzhautindrücke nicht ganz entbehrten. In dieser Beziehung würden Fälle von angeborener Verschließung der Pupille, die durch künstliche Pupillenbildung geheilt wurden, wo dergleichen vor-

sein, als die Erfahrungen an operirten Staarkranken.  
Alle dieser Art sind am Ende dieses Abschnitts

aber nicht bloß die Ordnung der Objectpunkte im allgemeinen Sinne, wie es bisher besprochen ist, auch bis zu einem gewissen Grade der Genauigkeit der Linien und Winkel. Der Zeichner, welcher die körperlichen Objecte durch ein flächenhaftes Bild nicht bloß darauf ausgehen, die Punkte des Objects seiner Zeichnung zu ordnen, wie unser Blick sie trifft, sondern auch streben, gewisse Größenverhältnisse zwischen den Abständen der einzelnen Punkte, damit sie dem körperlichen Objecte ähnlich finden, und wenn sie auf einem Kautschukblatte ausführen und sie verschieben, so ändert sich ihr Anblick für unser Auge, trotzdem die Punkte in der Fläche dieselbe bleibt.

Die Beurtheilung der Größenverhältnisse bezüglich der Auseinandersetzung und ihrem Ursprunge nachforschen, noch einige Festsetzungen über die Flächen, auf denen Bilder des Gesichtsfeldes projectirt denken wollen,

Namen des Gesichtsfeldes in der Regel für die liegenden Gesichtsobjecte, so lange man nicht aufhört, sondern nur auf ihre scheinbare flächenhafte Anordnung achtet, ohne dabei bestimmt festzusetzen, ob die Objecte dem oder mit schweifendem Blicke, oder vielleicht durch Bewegungen unseres Kopfes und Körpers betrachtet werden. In folgenden Analyse unserer Wahrnehmungen wird zwischen verschiedenen Fällen von einander deutlich zu trennen. Das Gesichtsfeld des bewegten oder unbewegten Auges oder zusammengegriffen werden soll, was sowohl das natürliche Auge wahrnimmt, wie wir denn auch mit dem menschlichen Sinn in allen seinen Anwendungen verstehen. 537

In dem vorigen Paragraphen mit Blickfeld dasjenige Feld, in welchem der Blick des bewegten Auges hinlaufen kann. Ich betrachte das Blickfeld als eine Fläche, die fest mit dem Auge verbunden ist, und in welchem ein Punkt, der Fixationspunkt von einem, beziehlich beiden Augen, da es sich auf dem Centrum der Netzhautgrube befindet, oben und unten, rechts und links werden im vorgehenden Richtungen des Kopfes genommen. Ein Punkt ist ausgezeichnet dadurch, daß er der Fixationspunkt ist in seiner Primärstellung ist; wir wollen ihn den

Hauptblickpunkt (primären Fixationspunkt) nennen. Den gerade gegenüber liegenden, hinter dem Kopfe des Beobachters gelegenen Punkt, welcher das andere Ende des nach dem Hauptblickpunkt gerichteten Durchmessers des Blickfeldes bildet, nennen wir, wie oben, den Occipitalpunkt. Im Kopfe bestimmt für unsere Zwecke die Verbindungslinie der Drehpunkte beider Augäpfel die horizontale Richtung von rechts nach links. Legen wir durch die genannte Verbindungslinie und den Hauptblickpunkt eine Ebene, so ist diese die horizontale Meridianebene des Blickfeldes, oder die Primärlage der Blickebene. Die übrigen Meridianebenen des Blickfeldes werden durch die Verbindungslinie des Hauptblickpunkts und des Drehpunkts des betreffenden Auges gelegt. Die Schnittlinien der Meridianebenen mit der imaginären Fläche des Blickfeldes sind die Meridiane dieses Feldes. Wenn beide Augen gebraucht werden, kann von Meridianebenen nicht gesprochen werden, außer von der horizontalen, wohl aber von Meridianlinien, weil das Blickfeld so unendlich weit entfernt gedacht werden kann, daß die Richtung der Ebenen, welche durch einen Punkt des Blickfeldes und die Gesichtslinie des einen oder andern Auges gelegt sind, nicht merklich verschieden ist.

Ruhende äußere Objecte wechseln also ihren Platz im Blickfelde, wenn sich der Kopf bewegt; dieselbe Stelle des Blickfeldes wird nacheinander auf verschiedenen Stellen der Netzhaut abgebildet, wenn sich das Auge bewegt. Dagegen verlangt Fixation derselben Stelle des Blickfeldes unausbleiblich immer dieselbe Stellung des Auges im Kopfe, und dieselben Verkürzungen, beziehlich Verlängerungen der einzelnen Augenmuskeln, so daß, wie wir vermuthen dürfen, jede Stelle des Blickfeldes mehr oder weniger genau bezeichnet ist durch die besonderen Innervationsgefühle und sonstige etwa vorhandenen Empfindungen der Nachbartheile des Auges, welche zu der betreffenden Stellung des Auges im Kopfe gehören.

Wir können das Blickfeld zum Zwecke seiner geometrischen Ausmessung als eine Kugelfläche von unendlich großem Radius betrachten, ähnlich dem Himmelsgewölbe, deren Mittelpunkt im Drehpunkte des Auges gelegen ist. Der Ort eines gesehenen Punktes im Blickfelde wird gefunden, wenn man durch ihn und den Drehpunkt des Auges eine gerade Linie legt und diese bis zur imaginären Fläche des Blickfeldes verlängert denkt. Wo sie die Fläche des Blickfeldes schneidet, ist der geometrische Ort des gesehenen Punktes im Blickfelde, den wir in vielen Fällen zu unterscheiden haben  
 538 werden von dem scheinbaren Ort im Blickfelde, an welchen wir das gesehene Object nach der Schätzung vermittels des Augenmaßes verlegen.

Vom Blickfelde, das sich auf den bewegten Blick bezieht, unterscheiden wir das Sehfeld des Auges, welches wir uns mit dem Auge zugleich beweglich denken, so daß jeder Punkt des Sehfeldes immer auf demselben bestimmten Punkte der Netzhaut abgebildet wird. Daß durch veränderte Accommodation des Auges letzterer Punkt nicht wesentlich geändert werden kann, wird am Schluß dieses Paragraphen gezeigt werden. Das Sehfeld ist

1 außen projecirte Netzhaut mit ihren Bildern und  
 ümlichkeiten. Nachbilder, der Gefäfsbaum, der blinde  
 projeciren sich also immer in die gleichen Orte des  
 kt des Sehfeldes ist deshalb bezeichnet in der  
 igen Localzeichen derselben, welche den Empfindungen  
 etzhautstelle angehören, und es ist schon früher  
 dafs wir die locale Bestimmtheit der Empfindung  
 faser sowohl in unseren eigenen Vorstellungen, als  
 g für andere gar nicht anders bezeichnen und aus-  
 dem wir die Stelle des Sehfeldes bezeichnen, der sie

kann aber mit dem Blickpunkte seine Lage gegen  
 Um bestimmte Richtungen im Sehfeld festzusetzen,  
 ärlage des Augapfels aus. In dieser Lage schneidet  
 ebene des Blickfeldes das Sehfeld in einer Linie,  
 alen Meridian des Sehfeldes oder kürzer den  
 nnen werde. Die Meridianebenen des Sehfeldes sind  
 inie zu legen, das heifst, durch die Visirlinie, welche  
 einläuft, und die wir wohl als mit der Blicklinie,  
 ler vom Blickpunkt nach dem Drehpunkt des Auges  
 lenken können, da auch der Mittelpunkt der Pupille  
 besichtslinie etwas nach der Nasenseite des Auges  
 jeden gesehenen Objects im Sehfelde wird bestimmt  
 he durch den betreffenden Objectpunkt gezogen und  
 eldes verlängert ist.

tlliche geometrische Ausmessung des Sehfeldes ist es  
 ch dieses als eine mit dem Blickfelde concentrische  
 en. Dafs die scheinbare Lage der Punkte im  
 en Construction nicht entspricht, werden wir nachher  
 müssen demnach auch im Sehfelde einen geo-  
 cheinbaren Ort der Punkte unterscheiden, welcher  
 amafse bestimmt wird.

ge bewegt, verschiebt sich die Kugelfläche des Seh-  
 kfeldes. Gegeben ist die Lage des Sehfeldes mittels  
 phen entwickelten Gesetze der Augenbewegungen,  
 lickpunktes, der im Sehfelde eine unveränderliche  
 le gegeben ist. Denkt man sich die Primärstellung  
 zeitige Lage desselben durch einen gröfsten Kreis  
 weit die Augenbewegungen nach LISTING's  
 r horizontale Meridian des Blickfeldes und 539  
 t des Sehfeldes mit diesem Verbindungs-  
 el machen.

feld gegen das Blickfeld verschiebt, bleibt der geo-  
 Projectionen der einzelnen Objectpunkte in der

gemeinsamen Kugelfläche des Blickfeldes und Sehfeldes nicht ganz unverändert. Um den Ort im Sehfelde zu finden, müssen gerade Linien vom Kreuzungspunkte der Visirlinien nach den Objectpunkten gezogen werden. Da nun der Kreuzungspunkt der Visirlinien etwa 3 Millimeter hinter der Hornhaut und 12,9 Millimeter vor dem Drehpunkte liegt, so verändert er seine Lage bei Drehungen des Auges, und dadurch wird die Richtung der Visirlinien ein wenig geändert. Indessen ist diese Aenderung verhältnißmäßig sehr unbedeutend für Objectpunkte, die dem Auge nicht ziemlich nah sind. Die Rechnung ergibt, daß die scheinbaren Verschiebungen der Objecte bei Bewegungen des Auges, welche 10 Grade nicht übersteigen, kleiner sind als die Ungenauigkeit der Bilder in dem für unendliche Ferne accommodirten Auge, und also der Regel nach unter der Ungenauigkeit der Accommodation verschwinden werden. Nur bei sehr nahen Objecten und bei ausgedehnten Bewegungen des Auges werden solche Verschiebungen merklich. Wenn man zum Beispiel nahe vor das Auge einen Bleistift hält, dessen Dicke der Breite der Pupille etwa gleich kommt, und sich dadurch eine Lichtflamme vollständig verdeckt, so kann man die Lichtflamme im indirekten Sehen wahrnehmen, wenn man das Auge stark nach der Seite wendet. Dann verschiebt sich das Zerstreuungsbild des nahen Bleistiftes so stark bei der seitlichen Bewegung des Auges, daß es nun die Lichtflamme nicht mehr verdeckt. Diese Methode ist mitunter vorthelhaft anzuwenden, wenn man ermitteln will, was man im indirekten Sehen erkennen kann, weil man hierbei das Object direct zu sehen gar nicht im Stande ist.

Sobald also nur ferne Objecte im Gesichtsfelde sind, die alle zugleich von dem für die Ferne accommodirten Auge ohne merkliche Undeutlichkeit gesehen werden können, so sind die Verschiebungen ihrer Projectionen in das Blickfeld verschwindend klein, und man kann den geometrischen Ort der betreffenden Objecte im Blickfelde als unabhängig von den Bewegungen des Auges betrachten.

Unter der angegebenen Einschränkung ist das Blickfeld die äußere Projection eines unveränderlichen Netzhautbildes, das Sehfeld das der Netzhaut selbst. Das Blickfeld und Sehfeld verschieben sich bei den Bewegungen des Auges gegen einander, wie das Netzhautbild der äußeren Objecte und die Netzhaut selbst. Ich ziehe es vor, in der folgenden Darstellung die beiden außer unserem Auge liegenden Flächen an die Stelle der Netzhaut und des Netzhautbildes treten zu lassen, weil jene ein richtigerer Ausdruck unseres thatsächlichen Bewußtseins sind, und weil bei der directen Eintragung aller Orte in die beiden Kugelfelder die Zweideutigkeit des Ausdrucks vermieden wird, die bisher so oft in die Irre geführt hat, als wüßten wir etwas von unserer Netzhaut, deren Größe und Ausdehnung, wenn gesagt wird, daß wir die Lage der Objecte vor uns beurtheilen nach der Stelle der Netzhaut, welche getroffen wird. Es ist übrigens ganz gleichgiltig für alle Constructionen, die an den Kugelflächen gemacht werden, wie groß wir ihren Radius nehmen, nur müssen wir bei endlichem Radius die Visirlinien ersetzen durch Linien,



den Drehpunkt des Auges gehen. So können wir auch negativ nehmen, das heißt die Kugelflächen, wo die Netzhaut und das Netzhautbild liegen. Kugelfläche, welche in der Gegend der wirklichen Netzhaut nennen, auf der ein ideelles Bild entsteht. Man muß aber nicht glauben, daß eine solche Netzhaut wirklich in ihren Dimensionen anders als in der Wirklichkeit entspricht. Die wirkliche Netzhaut hat eine ellipsoide Netzhautbild der äußeren Gegenstände auf ihr ist durch die Brechungen des Apparats mannigfach verändert. Für mein Theil für wahrscheinlich, daß es ganz anders ist, welche Gestalt, Form und Lage die wirklichen Verzerrungen das Bild auf ihr erleidet, wenn es nur anders ist, und weder die Form der Netzhaut noch die Lage der Zeit sich merklich verändert. Im natürlichen Zustand existirt die Netzhaut gar nicht. Weder durch die gewöhnlichen Empfindung, noch selbst durch wissenschaftlich wir im Stande, von den Dimensionen und der Lage der Netzhaut des lebenden Auges irgend etwas zu erfahren, das optischen Bilde, welches die Augenmedien nach sich ziehen können. Nur durch die Augenmedien hindurch der Regel nach mit der Außenwelt, und existirt nur so, wie sie in ihrem optischen Bilde erscheint. Das optischen Bildes ist das von uns definirte Sehfeld. Die Punkte im Sehfelde vorhanden sind bei fester Stellung der Netzhaut verschiedene Sehnervenfasern durch deren Licht sie zwei Empfindungen, die durch eigenthümliche Localzeichen unterschieden sein müssen, da wir sie in der Empfindung nicht unterscheiden können. Welcher Stelle der Netzhaut diese Localzeichen entsprechen, wir von vorn herein ebenso wenig, als wo die Netzhaut sie leiten, und zu welchen Stellen des Gehirns sie werden. Wir können uns darüber nur durch wissenschaftlichen Aufschluß verschaffen; hinsichtlich des den Sehfeld betreffenden Theiles der Frage sind wir dabei bis zum ersten einleitenden Schritte hinausgekommen. Wohl 540

Die Erfahrung, wie wir den Arm ausstrecken müssen, um einen hellen Gegenstand entweder zu berühren oder zu sehen. Wir können also direct durch solche Bemerkungen im Sehfelde ermitteln, wo sich die Objecte befinden, und durch die besonderen Localzeichen der Empfindung zu vertheilen. Sehfelde, in den das Object gehört. Dies ist auch die Erfahrung, daß Gegenstände trotz ihrer umgekehrten Netzhautbilder kommen bei der Localisation der Objecte in Betracht; sie sind nur Mittel, die Lichtstrahlen

541 je eines Punktes des Gesichtsfeldes auf je eine Nervenfaser zu concentriren. Wir hätten gerade ebenso viel Recht, uns darüber zu wundern, warum die Buchstaben eines gedruckten Buches nicht von rechts nach links verkehrt sind, da ja doch die metallenen Lettern, mit denen es gedruckt ist, verkehrt sind.

Es ist also richtiger zu sagen: „wir empfinden, an welchem Orte des Sehfeldes ein Object erscheint“, als zu sagen: „wir empfinden den Ort der Netzhaut, auf dem es abgebildet ist“. Dies letztere hat einen richtigen Sinn, insofern darunter nur gemeint ist, daß gewisse Eigenthümlichkeiten der Empfindung, nämlich ihre Localzeichen, eigenthümlich sind denjenigen Empfindungen, die durch einen bestimmten Ort der Netzhaut uns zugeleitet werden, und für die wissenschaftliche Untersuchung würden wir die localen Verhältnisse der Empfindung auch durch den Ort der Netzhaut, auf den das Licht fällt, charakterisiren können. Der Ausdruck erregt aber immer das Mißverständniß, daß wir beim natürlichen Sehen irgend eine Art verborgener Kenntniß von der wirklichen Existenz und Lage der Netzhautstelle haben müßten, zu welcher Behauptung mir gar kein Grund vorzuliegen scheint.

Es ist schon früher hervorgehoben worden, daß diese Verbindung zwischen den localen Unterschieden der Empfindung und der Richtung im Sehfelde so ausschließlichsich ist, daß wir gar kein Mittel haben, die locale Bestimmtheit unserer Empfindungen weder in unserem eigenen Bewußtsein, noch in der Mittheilung für andere anders zu bezeichnen, als indem wir die Stelle des Sehfeldes angeben, auf die sich die Empfindung bezieht.

Nachdem wir diese Definition festgestellt haben, können wir uns zu der Untersuchung wenden, wie weit unsere Fähigkeit reicht, Größenverhältnisse im Gesichtsfelde zu beurtheilen, und welchen Täuschungen wir dabei ausgesetzt sind. Jede genauere Vergleichung zweier Raumgrößen, Linien, Winkel oder Flächen im Gesichtsfelde nimmt Augenbewegungen zu Hilfe. Wir wollen zunächst untersuchen, was wir mit Hilfe solcher Bewegungen erreichen können, und später, wie sich die Ausmessungen verändern, wenn wir die Augenbewegungen ausschließen. Ich wähle diese Ordnung, weil mir die Abmessungen mit Augenbewegungen, wie sie die genaueren sind, so auch die ursprünglicheren zu sein scheinen.

Ueber die Genauigkeit in der Vergleichung nahe gleicher Abstände im Gesichtsfelde sind von FECHNER<sup>1</sup> und VOLKMANN Versuche angestellt worden. Ersterer hat einen Zirkel auf Distanzen von 10, 20, 30, 40 und 50 halbe Pariser Decimallinien eingestellt, und die Spitzen eines zweiten Zirkels nach dem Augenmaafs in dieselbe Distanz gebracht, wobei beide Zirkel, bis auf die Spitzen verdeckt in deutlicher Sehweite, 1 Pariser Fuß vom Auge entfernt, vor ihm neben einander auf dem Tische lagen. Nach jeder Einstellung wurde der Fehler derselben bestimmt. VOLKMANN hing neben

<sup>1</sup> FECHNER, *Psychophysik*. Bd. I. S. 211—236. Andere auch von HEGELMAYER in *Vierordts Archiv* XI, 844—853.

richte gespannte Fäden in verticaler Richtung und r verschiebbar auf, und machte nach dem Augeneich, welche wechselten zwischen 10 und 240 Milli- 542 800 Millimeter von den Fäden entfernt war. Die r gleichen Umständen gemachten Versuchsreihen genommen, wobei vom Sinne der Fehler abgesehen durch die Zahl der Beobachtungen dividirt; so n Fehler, der bei diesen Versuchen stets nahehin der ganzen verglichenen Länge ausmachte. Die fehlers betrug im Mittel aus allen Beobachtungen en Länge der verglichenen Linien

HNER	$\frac{1}{62,1}$
KMANN, frühere Versuche	$\frac{1}{88,0}$
selben, spätere Versuche	$\frac{1}{101,1}$

nach für diese Beobachtungen das von WEBER auf-  
 er verallgemeinerte psychophysische Gesetz gültig,  
 r Untersuchung über die Abhängigkeit der Stärke  
 der objectiven Helligkeit kennen gelernt haben,  
 waren Unterschiede der Empfindungsgrößen der  
 empfundenen proportional sind.  
 rden mit viel kleineren mikrometrisch zu messenden  
 n und einem seiner Schüler angestellt. Die  
 sei feine parallele Silberfäden, von 0,445 Millimeter  
 er Länge bestimmt, welche durch Mikrometer-  
 den konnten. Sie wurden ebenfalls so eingestellt,  
 wechselnd von 0,2 bis 1,4 Millimeter nach dem  
 it wurde. Die Fehler nahmen in diesem Falle nicht  
 nessen Distanzen ab, sondern näherten sich einer  
 erwarten war, da bei so kleinen Distanzen die  
 erscheidung kleinster Theile des Gesichtsfeldes,  
 der Netzhautelemente abhängt, mit in Betracht  
 ere Fehler  $A$  konnte aber dargestellt werden als  
 ten und eines dem Abstände  $D$  der Fäden pro-  
 der Formel

$$A = r + WD$$

onstanten bezeichnen. Es ergaben sich hierbei  
 er Sehweite folgende Werthe dieser Constanten

	<i>v</i> in Millimetern	<i>W</i>
VOLKMANN horizontale Abstände	0,008210	$\frac{1}{79,1}$
Derselbe verticale Abstände	0,007319	$\frac{1}{45,1}$
APPEL horizontale Abstände	0,005331	$\frac{1}{164,5}$
Derselbe ebenso später	0,008548	$\frac{1}{85,3}$

543 Die Werthe von *W* zeigen, daß die Vergleichung verticaler Abstände viel unvollkommener ist, als die Vergleichung horizontaler. Dasselbe beobachtet man übrigens auch sogleich, wenn man eine Reihe verticaler und horizontaler Linien auf Papier zieht und sie nach dem Augenmaafse zu halbiren sucht, und dann die abgetheilten Längen mit dem Maafsstab vergleicht. Die Fehler in der Halbiring verticaler Linien werden im Allgemeinen viel größer, als die von horizontalen. Wenn man sich selbst beobachtet bei der Vergleichung zweier Abstände oder zweier gerader Linien, so findet man, daß kleine Unterschiede nur bemerkt werden, wenn man nach einander den Fixationspunkt bald in die Mitte der einen, bald in die Mitte der andern Linie bringt, sodaß die beiden Linien nach einander auf denselben Theilen der Netzhaut abgebildet werden. Bei festgehaltenem Fixationspunkte läßt man manches als gleich durchgehen, was sich sogleich als verschieden zu erkennen giebt, wenn man mit der Richtung des Blicks in der angegebenen Weise wechselt.

Sehr viel schwieriger erweist sich die Vergleichung von horizontalen Längen mit verticalen, und es zeigt sich dabei ein constanter Fehler, indem wir nämlich geneigt sind, verticale Linien für länger zu halten als gleich lange horizontale. Man sieht dies am besten, wenn man sich bemüht, nach dem Augenmaafse ein Quadrat zu zeichnen auf einem Papiere, welches man senkrecht gegen die Gesichtslinie hält. Man macht die Höhe immer zu niedrig, und zwar, wie ich bei mir selbst finde, um  $\frac{1}{30}$  bis  $\frac{1}{60}$  der Grundlinie, im Mittel etwa um  $\frac{1}{40}$ ; doch scheint dieses Verhältniß in verschiedenen Augen sehr zu variiren, WUNDT<sup>1</sup> giebt die Größe dieser Differenz an auf ein Fünftheil.

VOLKMANN<sup>2</sup> hat auch Versuche angestellt über die Fehlergrößen, welche bei Schätzung des Verhältnisses zweier nicht gleichen Distanzen begangen wurden. Der Beobachter stellte eine bewegliche Linie zwischen zwei andern ein auf  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{2}{10}$ ,  $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{4}{10}$ ,  $\frac{5}{10}$  der ganzen Entfernung. Dabei zeigten sich erstens Abweichungen zwischen dem Mittel aller Einstellungen für ein gewisses Größenverhältniß und der wirklich richtigen Einstellungen, welche VOLKMANN constante Fehler nennt, und zweitens Abweichungen von dem

<sup>1</sup> W. WUNDT, *Vorlesungen über Menschen- und Thierseele*, S. 255. Leipzig, 1868.

<sup>2</sup> A. W. VOLKMANN, *Berichte der Kön. Sächs. Ges.* vom 7. August 1868.

oder variable Fehler. Die constanten Fehler der Distanz immer etwas zu groß im Verhältniß zur zu theilende GröÙe eine Pariser Linie war, betrug ein Fehler in Tausendtheilen einer Linie im Mittel

der Fehler, aus je 40 Versuchen berechnet.

Geforderte Verhältnisse.						
0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
6,7	11,7	3,4	13,4	24,8	10,0	6,8
-20,0	-12,0	-6,2	-4,5	-9,5	-19,7	-19,4
-12,1	-5,9	-13,5	-2,2	+7,2	+5,1	+11,6
-6,0	+3,9	+9,7	+13,6	-17,4	-7,3	-10,8

in Reihen lag die zu theilende Distanz horizontal, 544  
vertical. Als Ausgangspunkt ist das Ende derselben abzumessende Theil angefangen wurde abzumessen.

wurden nach ihrer absoluten GröÙe ohne Rücksicht auf die Anzahl der Beobachtungen abgemessen. Ihre GröÙe war im Mittel von je 160 Beobachtungen (10 Beobachtungen)

der Werthe der variablen Fehler.

Gefordertes Verhältniß				
1 0,9	0,2 und 0,8	0,3 und 0,7	0,4 und 0,6	0,5
3	4,36	3,01	2,64	1,11
9	9,01	9,95	8,61	7,98.

relativ etwas kleiner wurden die Fehler in einer von der ganze zu theilende Abstand 100 Millimeter der betreffenden Abstände durch drei feine von der betreffenden Menschenhaare angezeigt waren. Die GröÙen angegeben, so daß die Einheit wieder ein Tausendtheil betragt.

Constante Fehler.

Gefordertes Verhältniß						
0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0,5	10,7	4,15	12,4	11,3	0,85	4,10
-11,1	-5,2	-4,0	-7,5	-5,5	-4,4	-2,8

## Mittelwerthe der variablen Fehler.

Für den Bruch	0,1	und	0,9	=	2,6
"	"	"	0,2	"	0,8 = 5,6
"	"	"	0,3	"	0,7 = 7,9
"	"	"	0,4	"	0,6 = 6,5
"	"	"	0,5		= 2,8.

Wenn nun nicht bloß gleiche Entfernungen als gleich erkannt, sondern ungleiche Entfernungen ihrem Gröfsenverhältniß nach erkannt werden sollen, so ist es nöthig, diejenige Linie zwischen den Endpunkten der gegebenen Entfernung zu bestimmen, welche als Maafs der Entfernung zu benutzen ist. In der Ebene ist dies die gerade Linie. Im Blickfelde, als einer gekrümmt erscheinenden Fläche, können gerade Linien nicht gezogen werden, und selbst um kürzeste Linien auf der Fläche zu ziehen, müßten wir eine genaue Anschauung von der Krümmung der Fläche des Blickfeldes mitbringen, die wir nicht bestimmt genug haben. Wenn man sich das Blickfeld als eine Kugelfläche vorstellt, deren Mittelpunkt der Drehpunkt des Auges ist, wie dies zum Zwecke wissenschaftlicher geometrischer Erörterungen gewöhnlich geschieht, so könnte man vermuthen, daß objectiv gerade Linien der Außenwelt, die sich als grösste Kreise in das kugelförmige Blickfeld 545 projiciren, als kürzeste Linien, als Linien ohne Krümmung in dem Gesichtsfelde erscheinen müßten. Das ist aber nur unter gewissen Bedingungen der Fall.

Wenn wir eine gerade Linie betrachten, zum Beispiel die Kante eines Lineals, und durch das Augenmaafs zu ermitteln suchen, ob sie wirklich gerade oder gekrümmt sei, so zeigt sich das Urtheil nach der schon im vorigen Paragraphen erwähnten Täuschung abhängig von der Richtung des Auges im Kopfe. Halten wir das Lineal horizontal und zu niedrig, so erscheint die Kante nach oben concav; halten wir es zu hoch, so erscheint sie nach unten concav. Daß dabei eine Augentäuschung stattfindet, erkennt man schnell, wenn man das Lineal so umwendet, daß die Kante statt nach oben nun nach unten sieht. Dann müßte eine wirklich nach unten concave Kante jetzt nach oben concav sein, und umgekehrt. Aber wenn das Lineal richtig und gerade ist, bleibt die Augentäuschung bestehen. Hält man das Lineal aber so, daß die Mitte seiner Kante der Primärstellung entspricht, so erscheint diese gerade, wenn sie wirklich gerade ist. Nun wählt man allerdings durch einen natürlichen Trieb die Primärstellung, wenn man über eine solche Frage durch das Augenmaafs entscheiden soll, doch ist die Sicherheit, mit der man diese Stellung einhält, nicht sehr groß. Dagegen finde ich, daß ich ziemlich geringe Krümmungen von Linealen in der Primärstellung erkennen kann, wenn ich das Lineal umwende, so daß ich bald die eine, bald die andere Fläche desselben gegen mich kehre. Auf diese Weise konnte ich bei einem Elfenbeinlineale von 200 Millimeter Länge, welches convex war und dessen Krümmung in der Mitte nur 0,35 Millimeter von der

en bauchte, dessen Krümmungsradius demnach etwa  
 Krümmung mit dem Auge richtig erkennen, ebenso  
 ven Lineale, welches in der Mitte ein halbes Milli-  
 ie Bestimmungen sind aber nicht bei fixirtem Blicke,  
 er Augenbewegungen möglich.

Stande, mit großer Genauigkeit zu entscheiden, ob  
 parallel sind oder nicht. Um das zu ermitteln, lassen  
 von ihnen, oder in der Mitte zwischen ihnen hin-  
 men dann mit ziemlich großer Genauigkeit, ob ihr

Ende hin ebenso groß, oder ob er größer ist als  
 wir ferner auch mit verhältnißmäßig großer Sicher-  
 men, daß zwei Winkel, deren Schenkel einander  
 inander gleich groß sind, weil wir eine kleine Ab-  
 aus der Schenkel leicht erkennen und daraus dann  
 inkel schließen. Nach Versuchen von E. MACH<sup>1</sup>  
 ng des Parallelismus genauer für horizontale und  
 geneigte. Dagegen ist die Vergleichung solcher  
 nicht parallel mit einander sind, nicht nur sehr  
 mlich regelmäßigen constanten Fehlern unterworfen.  
 : einfachste Aufgabe dieser Art ist, zu entscheiden,  
 ebenwinkel gleich und also ein rechter sei. Wenn  
 g kreuzenden geraden Linien die eine horizontal, die 546  
 scheinen für das rechte Auge der meisten Indivi-  
 n und links unten liegenden rechten Winkel wie  
 rn wie spitze Winkel. Für das linke Auge um-  
 m rechten Auge stumpf erscheinenden Winkel spitz,  
 ei ist zu beachten, daß man beide Augen nach  
 die Fläche der Zeichnung auf den Kreuzungspunkt  
 s. Versucht man dagegen nach dem Augenmaasse  
 ontallinie eine Verticale zu ziehen, so weicht deren  
 en Grad nach rechts herüber, wenn man mit dem  
 Zeichnung gemacht hat, und nach links, wenn es  
 ah. So stellt *Fig. 212* (auf S. 688) ein für mein rechtes  
 rechtwinkeliges Kreuz der Linien  $ab$  und  $cd$  vor,  
 $\gamma$  und  $\delta$  die Lage der wirklich richtigen Verticalen  
 mit dem linken Auge dieselbe Zeichnung an, so  
 Ende von  $cd$  im Gegentheil übertrieben nach rechts

ums, den man betreffs der rechten Winkel begeht,  
 ihrer Schenkel gegen den Netzhauthorizont ab.  
 richtig mit dem rechten Auge, wenn das obere  
 um etwa 18 Grad von der Verticale nach links



abweicht, mit dem linken Auge, wenn es um etwa ebenso viel nach rechts abweicht. Dagegen erscheint der Unterschied am größten, wenn die




Fig. 212.

Schenkel um 45 Grad von der zuletzt genannten Lage aus gedreht werden, wobei die nach rechts und links geöffneten Winkel etwa wie Winkel von  $92^\circ$ , die nach oben und unten gekehrten wie  $88^\circ$  erscheinen.

Wenn der eine Schenkel horizontal liegt, erscheinen als rechte Winkel für meine Augen solche von  $91^\circ,2$  und  $88^\circ,8$ ; bei VOLKMANN<sup>1</sup> beträgt der für das linke Auge  $91^\circ,1$ , für das rechte  $90^\circ,6$ ; doch hat letzterer Beobachter bei diesen Versuchen nicht ein Kreuz beobachtet, sondern eine einzelne Linie bald hori-

zontal, bald vertical zu stellen gestrebt; die einzelnen Beobachtungen sind dabei je 60 Mal wiederholt worden.

Ebenso finde ich, daß man auffallend große Fehler macht, wenn man einen Winkel von 30 bis 45 Grad zeichnet, dessen einer Schenkel horizontal liegt, und sich dann bemüht nach dem Augenmaasse eine dritte, der Verticalen nähere Linie durch den Scheitel des genannten Winkels zu ziehen, so daß ein zweiter Winkel entsteht, der jenem ersten gleich sei. Man macht diesen zweiten regelmässig beträchtlich zu groß. Wenn der erste Winkel 547  $30^\circ$  betrug, machte ich den zweiten größer als  $34^\circ$ , gleichviel ob ich mit dem rechten oder linken Auge hinsah, und ob der Winkel sich nach rechts oder links öffnete. Drehte ich die Figur aber so, daß der zuletzt gezeichnete Schenkel nun horizontal lag, so erschien der Größenunterschied übertrieben.

Dahin gehört auch die Thatsache, daß in einem richtig gezeichneten gleichseitigen Dreieck, dessen eine Seite horizontal liegt, der Winkel an der Spitze immer kleiner erscheint, als die Winkel an der Basis.

Fragen wir nun, wie ist es überhaupt möglich, daß Raumgrößen, die verschiedenen Theilen des Sehfeldes angehören, mit einander verglichen werden können, so lehren uns die oben erwähnten Selbstbeobachtungen schon eine Methode der Vergleichung, so oft besagte Raumgrößen so liegen, daß sie nach einander auf demselben Theile der Netzhaut, und zwar am besten auf ihrer Mitte, so abgebildet werden können, daß ihre entsprechenden Punkte nach einander auf dieselben Punkte der Netzhaut fallen. In der That ist dies das Verfahren, welches wir anwenden, um nach dem Augenmaasse zum Beispiele die Länge zweier geraden Linien *A* und *B*, die einander parallel sind, zu vergleichen. Wir richten den Blick erst auf die

<sup>1</sup> A. W. VOLKMANN, *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Heft 2. S. 224 u. 225. Leipzig, 1864.

Mitte von  $A$ , dann auf die Mitte von  $B$ , dann wieder von  $A$  und so fort, und suchen zu ermitteln, ob wir in beiden Fällen ganz denselben Eindruck erhalten, d. h. ob dieselben Netzhautpunkte in derselben Erstreckung von den Bildern beider Linien getroffen werden. Dabei brauchen wir offenbar von der Form und Länge des Bildes auf der Netzhaut nichts zu wissen. Die Netzhaut ist wie ein Zirkel, dessen Spitzen wir nach einander an die Enden verschiedener Linien ansetzen, um zu sehen, ob sie gleich lang sind, oder nicht, wobei wir über die Entfernung der Zirkelspitzen und die Form des Zirkels nichts weiter zu wissen brauchen, als daß sie unverändert geblieben sind.

Ein Unterschied aber ist zwischen der Vergleichung mittels der Netzhaut und der mittels des Zirkels. Die Verbindungslinie der Zirkelspitzen können wir nach jeder Richtung hinwenden, das können wir aber dem Gesetze der Augenbewegungen zufolge nicht thun mit der Verbindungslinie je zweier Netzhautpunkte, wenn wir nicht ausgiebige Bewegungen mit dem Kopfe machen wollen, welche wegen der damit verbundenen größeren Anstrengung lange nicht so häufig und so schnell wechselnd gemacht werden können, und wenn sie gemacht werden, meist eine wesentliche Veränderung des Gesichtspunkts, des Ortes unseres Auges im Raume und somit der ganzen perspectivischen Ansicht zu Folge haben. Wenn  $ab$  und  $\alpha\beta$  zwei Paare von Punkten im Gesichtsfelde sind, deren Entfernung verglichen werden soll, und ich etwa zuerst  $a$  fixirt habe, so daß sich  $a$  auf dem Centrum der Netzhautgrube  $A$ , und der Punkt  $b$  auf dem Netzhautpunkte  $B$  abgebildet hat, wenn ich dann das Auge wende und  $\alpha$  fixire, so daß  $\alpha$  auf dem Centrum der Netzhaut  $A$  abgebildet ist, so wird der Netzhautpunkt  $B$  bei der neuen Stellung der Gesichtslinie eine ganz bestimmte Lage haben, die ich ohne Bewegung des ganzen Kopfes nicht willkürlich ändern kann, und die Richtung der Linie  $\alpha\beta$  im Gesichtsfelde muß eine ganz bestimmte sein, damit sich  $\beta$  auf  $B$  abbilden kann.

Wenn  $a$ ,  $b$ ,  $\alpha$  und  $\beta$  nahe genug dem Hauptblickpunkte liegen, daß wir das sie umschließende Stück des Gesichtsfeldes als Ebene betrachten 548 können, so können die Linien  $ab$  und  $\alpha\beta$  nach einander auf denselben Netzhautpunkten nur dann abgebildet werden, wenn sie einander parallel sind. Eben deshalb können nun die Längen zweier paralleler Linien gut und sicher miteinander verglichen werden, während wir bei der Vergleichung nicht paralleler Linien, selbst wenn sie einander nahe liegen, großen Irrthümern ausgesetzt sind.

In derselben Weise kann, wie schon oben angeführt ist, der Parallelismus zweier Linien durch die Gleichheit ihrer Abstände an allen Stellen, und die Gleichheit von Winkeln mit parallelen Schenkeln gut beurtheilt werden.

Wenn nun eine Linie im Gesichtsfelde als gerade anerkannt werden soll, und sie geht durch den Hauptblickpunkt, so können wir, indem wir das Auge an ihr hingeleiten lassen, ebenfalls ihre einzelnen Theile alle nach einander auf derselben Linie der Netzhaut abbilden. Wir haben im vorigen

Paragraphen gesehen, daß wenn wir von einem geraden Linienstück, welches den Hauptblickpunkt schneidet, ein Nachbild entwickeln und den Blick in Richtung des Meridians wandern lassen, in welchem jenes Linienstück liegt, das Nachbild immer mit jenem Meridiane zusammenfällt. Das Nachbild bezeichnet bei jenen Versuchen die Projectionen jener Netzhautstellen in das Gesichtsfeld, welche den Eindruck des linienförmigen Objectes empfangen haben, und es folgt aus diesem Versuche, daß alle Theile eines solchen Meridians nach einander auf denselben Netzhauptpunkten abgebildet werden können.

Indem also das Auge einem solchen Meridiane des Sehfeldes folgt, verschiebt sich die entsprechende Linie des Netzhautbildes auf der entsprechenden Linie der Netzhaut selbst, indem beide fortdauernd congruent zusammenfallen, und vor dem Auge verschiebt sich das Sehfeld gegen das Blickbild so, daß der betreffende Meridian des Sehfeldes sich in dem des Blickfeldes und stets mit ihm zusammenfallend verschiebt.

Dergleichen Linien im Blickfelde, deren Bild sich in sich selbst verschiebt, sind nun auch die im vorigen Paragraphen (Seite 651) erwähnten Directionskreise oder Richtkreise, welche alle durch den Occipitalpunkt des Blickfeldes hindurchgehen. Dort ist nachgewiesen worden, daß, wenn ein linienförmiges Nachbild bei Fixirung eines Punktes eines solchen Richtkreises mit seiner Richtung congruirt, es auch in allen anderen Punkten mit ihm congruirt. Da das Nachbild auf der Netzhaut festliegt, so wird dadurch auch constatirt, daß die Linienelemente eines solchen Richtkreises sich, wenn wir ihn mit dem Blicke durchlaufen, fortdauernd auf derselben Netzhautlinie abbilden.

Daß ein linienförmiges Nachbild von geringer Länge mit denjenigen andern Directionskreisen congruirt, welche im Occipitalpunkte dieselbe Tangente haben, ist ebenfalls an der citirten Stelle schon bemerkt worden.

Durch die erwähnten Eigenthümlichkeiten bekommen nun die Richtkreise für das Auge eine ganz besondere Bedeutung. Die gerade Linie in der Ebene zeichnet sich dadurch vor allen anderen aus, daß jedes Stück derselben jedem anderen Stücke congruent ist, wie man die beiden auch zusammenlegen mag. Die Eigenschaft der Congruenz jedes Theils mit jedem andern Theile und die damit zusammenhängende Verschiebbarkeit der Linie in sich selbst theilt mit der geraden Linie nur noch der Kreis. Aber zwei Kreisbögen von gleicher Länge und Krümmung müssen schon in einer bestimmten Weise zusammengelegt werden, um zu congruiren. Man kann ihre Enden auch so aufeinander legen, daß die Linienstücke selbst nicht congruiren. Auf dieser Eigenschaft der geraden Linie beruht auch wesentlich ihre Bedeutung als Längenmaafs. Denn dafür können wir nur eine Linie gebrauchen, die eindeutig bestimmt ist, wenn ihre Endpunkte bestimmt sind, und deren jeder Theil congruierend auf jeden andern gelegt werden kann.

Im Blickfelde giebt es nun nur eine Art von Linien, an denen wir durch einen unmittelbaren Act der Empfindung constatiren können, daß sie

die Mitte von  $B$ , dann wieder von  $A$  und so fort, n, ob wir in beiden Fällen ganz denselben Eindruck elben Netzhautpunkte in derselben Erstreckung von uen getroffen werden. Dabei brauchen wir offenbar nge des Bildes auf der Netzhaut nichts zu wissen. in Zirkel, dessen Spitzen wir nach einander an die nien ansetzen, um zu sehen, ob sie gleich lang sind, iber die Entfernung der Zirkelspitzen und die Form r zu wissen brauchen, als dafs sie unverändert ge-

er ist zwischen der Vergleichung mittels der Netz- es Zirkels. Die Verbindungslinie der Zirkelspitzen Richtung hinwenden, das können wir aber dem Ge- igen zufolge nicht thun mit der Verbindungslinie je wenn wir nicht ausgiebige Bewegungen mit dem elche wegen der damit verbundenen gröfseren An- o häufig und so schnell wechselnd gemacht werden emacht werden, meist eine wesentliche Veränderung s Ortes unseres Auges im Raume und somit der Ansicht zu Folge haben. Wenn  $ab$  und  $\alpha\beta$  zwei

Gesichtsfelde sind, deren Entfernung verglichen etwa zuerst  $a$  fixirt habe, so dafs sich  $a$  auf dem rube  $A$ , und der Punkt  $b$  auf dem Netzhautpunkte ich dann das Auge wende und  $\alpha$  fixire, so dafs  $\alpha$  etzhaut  $A$  abgebildet ist, so wird der Netzhautpunkt g der Gesichtslinie eine ganz bestimmte Lage haben, des ganzen Kopfes nicht willkürlich ändern kann, nie  $\alpha\beta$  im Gesichtsfelde mufs eine ganz bestimmte } abbilden kann.

$\beta$  nahe genug dem Hauptblickpunkte liegen, dafs de Stück des Gesichtsfeldes als Ebene betrachten 548 inien  $ab$  und  $\alpha\beta$  nach einander auf denselben Netz- gebildet werden, wenn sie einander parallel sind. un die Längen zweier paralleler Linien gut und lichen werden, während wir bei der Vergleichung elbst wenn sie einander nahe liegen, grofsen Irr-

kann, wie schon oben angeführt ist, der Parallelismus Gleichheit ihrer Abstände an allen Stellen, und die nit parallelen Schenkeln gut beurtheilt werden.

ie im Gesichtsfelde als gerade anerkannt werden den Hauptblickpunkt, so können wir, indem wir en lassen, ebenfalls ihre einzelnen Theile alle nach inie der Netzhaut abbilden. Wir haben im vorigen

wir aber, wie oben schon bemerkt worden ist, daß auch bei vollkommen ruhendem Auge im indirecten Sehen eine gewisse Beurtheilung der Abmessungen des Sehfeldes möglich ist, die natürlich sehr viel unbestimmter ist, als die, welche mittels des bewegten Blicks gewonnen wird, schon weil das indirecte Sehen überhaupt keine große Genauigkeit gewährt. Daß aber die Fähigkeit zu solcher Abmessung da sei, zeigt sich am schlagendsten an subjectiven Erscheinungen, die überhaupt nur im indirecten Sehen beobachtet werden können, wie an der Aderfigur. Wir sind im Stande, eine solche Figur nachzuzeichnen, ihre Verziehungen bei wechselnder Beleuchtungsrichtung wahrzunehmen, und haben überhaupt eine bestimmte flächenhafte Anschauung derselben, trotzdem wir nicht im Stande sind, durch Bewegungen des Auges die Lage derselben auf der Netzhaut zu verändern und die einzelnen Theile derselben mit dem Blicke zu durchlaufen. Ebenso zeigt sich bei momentaner Beleuchtung des Gesichtsfeldes durch einen Blitz, dessen Dauer zu kurz ist, als daß eine merkliche Bewegung des Auges während der Dauer der Beleuchtung ausgeführt werden könnte, daß wir im Stande sind, die Gestalt der vor uns liegenden Objecte der Hauptsache nach richtig zu beurtheilen.

Es kommen aber auch bei dieser Art der Betrachtung eigenthümliche Täuschungen des Augenmaasses vor, welche in so fern wichtig sind, als sie uns Andeutungen über die Art, wie wir zur Ausmessung des Feldes des indirecten Sehens gekommen sind, zu geben scheinen.

Erstens gehören hierher die schon vorher beschriebenen Täuschungen in der Vergleichung von Winkeln mit nicht parallelen Schenkeln und von Linien nicht übereinstimmender Richtung, weil, wie die Selbstbeobachtung lehrt, Bewegung des Auges in diesen Fällen nichts beiträgt und auch nichts beitragen kann zur Verbesserung des Urtheils. Die genannten Täuschungen treten ebenso gut ein bei strenger Fixation eines Punktes als bei wanderndem Blick.

Dazu kommt nun noch ein anderes System von Täuschungen, die ich bisher noch nirgends erwähnt gefunden habe, und welche sich beziehen auf die als ungekrümmt erscheinenden Linien des Sehfeldes und auf die scheinbare Größe seiner peripherischen Theile. In der Ebene sind die geraden Linien gleichzeitig die kürzesten und die, welche weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin eine Krümmung zeigen. Auf der Kugel sind es die größten Kreise; deren Krümmungsradius ist senkrecht zur Kugelfläche gerichtet, in der Kugel selbst zeigen sie keine Krümmung. Alle Kreise dagegen, welche kleiner sind als ein größter, erscheinen concav auf der Seite, wo das kleinere von ihnen abgegrenzte Kugelstück liegt, convex auf der entgegengesetzten Seite.

Wir können nun fragen, welches sind die ungekrümmten Linien im 551 Sehfelde? Sind es, wie man zunächst vielleicht vermuthen sollte, die größten Kreise des kugelig gedachten Feldes? Davon, daß diese es nicht in allen Fällen sind, kann man sich leicht überzeugen.

abbar und sich selbst also in allen ihren Theilen  
ind, wie die vorausgehende Erörterung zeigt, unter  
ne'schen Gesetzes, die Richtkreise. Zwar können  
Blickfelde erscheinen, die wir für in sich selbst  
üssen, aber wir können dies nur durch Messungen  
h einen unmittelbaren Act der Empfindung constatiren.  
n seinen Bewegungen abweicht vom LISTING'schen  
ei einem solchen nicht nothwendig Linien, die bei  
in ganzer Länge in sich selbst verschiebbar sind;  
al Linien construiren können, deren Elemente alle  
lben das Centrum der Netzhaut schneidenden Linien-  
lgebildet werden können. Solche wollen wir Richt-  
ennen. Nur unter Voraussetzung des LISTING'schen  
bewegungen sind alle Richtlinien des Blickfeldes in  
und erscheinen dem Auge, dessen Blick an ihnen  
d in unverändertem Netzhautbilde. Es ist dies eine  
chkeit der dem LISTING'schen Gesetze folgenden

objectiven Raumes erscheinen im kugelförmigen  
: Kreise desselben. Größte Kreise fallen mit den  
men, wenn sie durch den Hauptblickpunkt (die  
linie) gehen. Dann erscheinen kurze Stücke von  
hriebenen Versuche zeigen, als gerade Linien, sonst  
ar entgegengesetzt der wirklichen Krümmung der

ziehlich Richtlinien, müssen in der That in dem  
die Stelle der geraden Linien, welches die Linien  
ler Ebene sind, vertreten. Wir können mit einem  
ene eine beliebig lange gerade Linie ziehen, indem  
ehen, so lang als das Lineal es erlaubt, dann das  
nen Linie eine Strecke weit verschieben und so  
al genau gerade, so erhalten wir bei diesem Ver-  
; ist es selbst etwas gekrümmt, so erhalten wir  
verschiebbaren Lineals dient uns im Gesichtsfelde  
n Gesichtseindruck, der unter Umständen bis zum  
kann, versehene centrale Stelle des deutlichsten  
den Blick in Richtung dieser Linie, dabei verschiebt  
l zeigt uns die Fortsetzung dieser Richtung an. 550  
jenes Verfahren gleich gut mit jedem geradlinigen  
ihren, im Gesichtsfelde aber ist für jede Richtung  
gung nur eine einzige Art von Linie möglich, die  
eigenen Richtung verschieben läßt.

durch die Augenbewegungen und ihr bestimmtes  
agen im Blickfelde möglich werden. Nun finden

wir aber, wie oben schon bemerkt worden ist, daß auch bei vollkommen ruhendem Auge im indirecten Sehen eine gewisse Beurtheilung der Abmessungen des Sehfeldes möglich ist, die natürlich sehr viel unbestimmter ist, als die, welche mittels des bewegten Blicks gewonnen wird, schon weil das indirecte Sehen überhaupt keine große Genauigkeit gewährt. Daß aber die Fähigkeit zu solcher Abmessung da sei, zeigt sich am schlagendsten an subjectiven Erscheinungen, die überhaupt nur im indirecten Sehen beobachtet werden können, wie an der Aderfigur. Wir sind im Stande, eine solche Figur nachzuzeichnen, ihre Verziehungen bei wechselnder Beleuchtungsrichtung wahrzunehmen, und haben überhaupt eine bestimmte flächenhafte Anschauung derselben, trotzdem wir nicht im Stande sind, durch Bewegungen des Auges die Lage derselben auf der Netzhaut zu verändern und die einzelnen Theile derselben mit dem Blicke zu durchlaufen. Ebenso zeigt sich bei momentaner Beleuchtung des Gesichtsfeldes durch einen Blitz, dessen Dauer zu kurz ist, als daß eine merkliche Bewegung des Auges während der Dauer der Beleuchtung ausgeführt werden könnte, daß wir im Stande sind, die Gestalt der vor uns liegenden Objecte der Hauptsache nach richtig zu beurtheilen.

Es kommen aber auch bei dieser Art der Betrachtung eigenthümliche Täuschungen des Augenmaasses vor, welche in so fern wichtig sind, als sie uns Andeutungen über die Art, wie wir zur Ausmessung des Feldes des indirecten Sehens gekommen sind, zu geben scheinen.

Erstens gehören hierher die schon vorher beschriebenen Täuschungen in der Vergleichung von Winkeln mit nicht parallelen Schenkeln und von Linien nicht übereinstimmender Richtung, weil, wie die Selbstbeobachtung lehrt, Bewegung des Auges in diesen Fällen nichts beiträgt und auch nichts beitragen kann zur Verbesserung des Urtheils. Die genannten Täuschungen treten ebenso gut ein bei strenger Fixation eines Punktes als bei wanderndem Blick.

Dazu kommt nun noch ein anderes System von Täuschungen, die ich bisher noch nirgends erwähnt gefunden habe, und welche sich beziehen auf die als ungekrümmt erscheinenden Linien des Sehfeldes und auf die scheinbare Größe seiner peripherischen Theile. In der Ebene sind die geraden Linien gleichzeitig die kürzesten und die, welche weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin eine Krümmung zeigen. Auf der Kugel sind es die größten Kreise; deren Krümmungsradius ist senkrecht zur Kugelfläche gerichtet, in der Kugelfläche selbst zeigen sie keine Krümmung. Alle Kreise dagegen, welche kleiner sind als ein größter, erscheinen concav auf der Seite, wo das kleinere von ihnen abgegrenzte Kugelstück liegt, convex auf der entgegengesetzten Seite.

Wir können nun fragen, welches sind die ungekrümmten Linien im  
 551 Sehfelde? Sind es, wie man zunächst vielleicht vermuthen sollte, die größten Kreise des kugelig gedachten Feldes? Davon, daß diese es nicht in allen Fällen sind, kann man sich leicht überzeugen.



wiederhole den früher erwähnten Versuch mit drei Sternen mit 100 Fuss Entfernung, während früher Bewegung des Blicks über dieselben hinzugefügt war. Man suche sich am Sternenhimmel drei helle Sterne, die annähernd in einem grössten Kreise liegen, was man mittels gespannten Fadens, an dem man vorbei nach den drei Sternen hinreichend genau erkennen kann. Man wähle diese Sterne weit von einander entfernt; doch müssen sie hell genug sein, um directen Sehen noch leicht erkannt und von den benachbarten unterschieden zu werden. Wenn man solche gefunden hat, fixire sie; sie werden in einer geraden Linie zu liegen scheinen, sie nicht ganz genau in einem grössten Kreise liegen, so erkennt man den Sinn und ungefähr auch die Grösse der Abweichung. Nun aber den Fixationspunkt in einiger Entfernung auf der einen Seite der Sternenreihe, man wird sogleich und sehr deutlich gegen den Fixationspunkt concav sehen, um desto mehr concav, je weiter der Fixationspunkt von der Reihe der drei Sterne ist. Man wird nun sehen, dass am Sternenhimmel bei unbewegter Blickrichtung der Kreis nur dann ungekrümmt erscheint, wenn er durch den Fixationspunkt geht, dagegen concav gegen den Fixationspunkt, wenn er nicht durch den Fixationspunkt geht. Es folgt daraus weiter, dass Linien, welche auf den peripherischen Theilen des Gesichtsfeldes ungekrümmt erscheinen sollen, in der That auf dem Himmelsgewölbe convex gegen den Fixationspunkt sein

sollen. Bei der Beurtheilung der Ausmessungen der Objecte wird man es zwar leicht beeinflusst durch die schon vorher erworbene Erfahrung der wirklichen Ausmessungen des Objects, es gelingt aber doch nicht, dieselbe Täuschung wahrzunehmen.

Am einfachsten ist es, sich weit über eine grosse Tischplatte zu setzen, so dass man keine erkennbaren geraden Linien mehr im Gesichtsfelde sieht, denen man sich richten könnte, und einen Punkt der Platte wählen. Wenn man dann in einiger Entfernung vom Fixationspunkte ein kleines hellgelbes oder andere helle Objecte hinlegt und dieselben in einer geraden Linie zu richten strebt, so findet man stets, sobald man den Blick auf das Object richtet, dass man sie in einen gegen den Fixationspunkt convexen Bogen gelegt hat.

Man lege über dieselbe Tischplatte einen langen von zwei parallelen geraden Linien umgebenen und etwa drei Zoll breiten Papierstreifen legt und dessen Enden so bemerkt man, dass seine Enden im indirecten Sehen schmäler erscheinen, und dass er von zwei mit ihrer Convacität gegen die Enden Bögen begrenzt erscheint.

Die geraden Linien von geringerer scheinbarer Erstreckung bemerkt man nicht, weil wir viel mehr geneigt sind, die geraden Linien der körperlichen Objecte, denn als grösste Kreise des Gesichtsfeldes zu betrachten und zu deuten.

552 Während nun größte Kreise concav gegen den Fixationspunkt erscheinen, wenn sie nicht durch diesen selbst hindurchgehen, so erscheinen im Gegentheil Kreise, welche Parallelkreise zu einem durch den Fixationspunkt gehenden größten Kreise sind, convex gegen den genannten Punkt. Man biege, um dies zu prüfen, einen drei bis fünf Zoll breiten Papierstreifen zu einem Halbcylinder und bringe das Auge in dessen Axe. Fixirt man nun die Mitte des Papierstreifens, so scheint derselbe nach beiden Seiten hin breiter zu werden und von zwei mit der Convexität gegen einander gekehrten Bögen begrenzt. Die seitlichen Theile des Streifens befinden sich in derselben Entfernung vom Auge, wie die Mitte desselben, und erscheinen deshalb, geometrisch betrachtet, unter demselben Gesichtswinkel, wie die Mitte, während sie scheinbar im Sehfelde sich größer darstellen als die Mitte des Streifens.

Denken wir uns den Fixationspunkt am Horizont gelegen, über ihm befinde sich in der Höhe  $h$  ein Punkt, durch den im indirecten Sehen eine scheinbar ungekrümmte horizontal verlaufende Linie gezogen werden soll. Der größte Kreis, welcher rechts und links in gleicher Entfernung den Horizont schneidet und in der Entfernung  $h$  unter dem Occipitalpunkt des Beobachters hindurchgeht, erscheint nach unten concav. Ein wirklich überall horizontal verlaufender Parallelkreis des Horizontes, der in der Entfernung  $h$  auch über dem Occipitalpunkt hinweggeht, entspricht ebenfalls nicht der Aufgabe, er erscheint convex nach unten. Da der erste dieser Kreise nach unten concav, der zweite convex erscheint, so muß die scheinbar ungekrümmte Linie zwischen diesen beiden liegen, und wenn sie ein Kreis ist, so muß sie weniger als  $h$  vom Occipitalpunkt entfernt über oder unter diesem hindurchgehen. Da können wir nun an die Richtkreise des Blickfeldes denken, die durch den Occipitalpunkt selbst hingehen. Versuchen wir es mit diesen.

Zu dem Ende habe ich die Richtkreise des Blickfeldes, welche mit der durch den Fixationspunkt gehenden verticalen und horizontalen Linie übereinstimmende Richtung haben, auf eine ebene Tafel projecirt; sie erscheinen dabei als Hyperbeln. Um sie im ganzen Sehfelde, auch in den indirect gesehenen Theilen desselben möglichst deutlich erscheinen zu lassen, habe ich die Felder des von den Curven gebildeten Gitters schachbrettartig schwarz und weiß gemalt, wie *Fig. 213* in verkleinertem Maafstabe  $\frac{3}{16}$  zeigt;  $A$  bezeichnet die in gleichem Verhältniß verkleinerte Entfernung, in der das Auge des Beobachters von der Tafel, der Mitte derselben gerade gegenüberstehend, entfernt sein muß. Der Mittelpunkt der Tafel wird fixirt. Das Original der *Fig. 213* hatte ich an der Wand des Zimmers, seine Mitte in der Höhe meiner Augen über dem Boden befestigt; ein rechtwinkliges Winkelmaafs, dessen Katheten die Länge der für das Auge verlangten Entfernung von 20 Centimeter hatten, diente zur Controlle dieses Abstandes, indem man eine seiner Katheten an die Tafel anlegte und die Spitze des gegenüberliegenden Winkels den äußern Augenwinkel berühren liefs.

In der That erscheinen nun die als Hyperbeln<sup>1</sup> projecirten Richtkreise des Blickfeldes unter diesen Umständen im Gesichtsfelde als gerade Linien, 553 oder wenigstens als Linien, die nicht in der Fläche des Sehfeldes gekrümmt sind.

Die einzelnen Verticalreihen und Horizontalreihen schwarzweisser Felder sehen überall gerade und überall gleich breit aus, so lange man unverwandt den Mittelpunkt der Zeichnung fixirt. Natürlich erkennt man aber die Krümmung der seitlich gelegenen Felderreihen, sobald man den Blick nach ihnen hinwendet. Hierbei tritt eine eigenthümliche Täuschung ein. Ich sehe nämlich, so wie ich den Blick wandern lasse, die Zeichnung gewölbt, wie eine flache Schüssel, so daß die Krümmung der Hyperbeln wie eine




Fig. 213.

Krümmung nach der Fläche erscheint und in dieser gekrümmten Fläche die Linien als grösste Kreise (oder kürzeste Linien) erscheinen. Es wird durch diese Anschauung der Widerspruch zwischen directem und indirectem Sehen einigermaassen aufgehoben. Nach den im Gesichtsfelde selbst gelegenen Richtungen erscheinen die Hyperbeln nicht gekrümmt, nur des Gesichtsfeld selbst erscheint gekrümmt.

Man muß also wohl darauf achten, daß man bei dieser Beobachtung den Blick fest auf den Mittelpunkt der Tafel gerichtet hält. Sollte man sich von der Vorstellung ihrer wirklichen Gestalt nicht so schnell frei machen können, so erleichtert es die Täuschung, wenn man dicht vor das Auge eine Linse hält, in deren Brennpunkt die Tafel liegt. Freilich erscheinen die peripherischen Theile der Tafel dadurch etwas verzerrt; die Brechung in der Linse vergrößert bei sehr schiefer Einfall der Strahlen die Krümmung der Hyperbeln; aber der grössere mittlere Theil der Tafel wird durch die Linse,

<sup>1</sup> Die Gleichung dieser Hyperbeln ist im vorigen Paragraphen auf S. 653 unter 3 c) und den folgenden Nummern gegeben; die Abstände derselben in der mittleren Horizontale und Verticale sind so gewählt, daß sie gleichen Gesichtswinkeln entsprechen.

wie in unendlicher Entfernung liegend gesehen und dadurch die Abstraction von seiner wahren körperlichen Gestalt begünstigt.

Am vollkommensten gelingt die Täuschung, wenn man den Mittelpunkt der Tafel so lange fixiert, bis ein kräftiges Nachbild entwickelt ist und man dies mit geschlossenen Augenlidern gegen das helle Fenster gewendet betrachtet.

554 Ich verfuhr weiter so, daß ich anfangs mein Auge weiter als 20 Centimeter von der Tafel entfernte, wobei die rechts und links, oben und unten gelegenen Hyperbeln gekrümmt erschienen, und mich dann allmählich näherte, bis sie mir gerade geworden waren, dann maß ich den Abstand meines Auges von der Tafel mittels des erwähnten Winkelmaasses. Ging ich noch näher heran, so fingen die Hyperbeln an, sich scheinbar nach der entgegengesetzten Seite zu krümmen, als nach der sie wirklich gekrümmt waren. Dabei fand ich fast stets für die Entfernung meines Auges von der Tafel 20 Centimeter, wenn ich auf die Horizontallinien der Tafel achtete und diese gerade zu sehen trachtete, und auch für die mittleren Verticalstreifen stimmte es gut. Für die äußeren, besonders die nach der Schläfenseite liegenden Verticalstreifen dagegen war ich geneigt, eine der Tafel etwas nähere Stellung zu wählen. Deren wirkliche Krümmung schien in der Entfernung von 20 Centimeter, für die die Tafel berechnet war, noch nicht ganz aufgehoben zu sein.

Auch bei schief gehaltenem Kopfe, wobei die Linien der Tafel auf schräg liegende Meridiane der Netzhaut fielen, blieben die Erscheinungen dieselben.

Daraus geht also hervor, daß so weit die Unbestimmtheit des indirecten Sehens und des entsprechenden Augenmaasses zu beurtheilen erlaubt, die Richtlinien des Blickfeldes, wie sie im Sehfelde bei fixirtem Hauptblickpunkte erscheinen würden, die scheinbar ungekrümmten, also auch scheinbar kürzesten Linien des Sehfeldes sind.

Diese besondere Gestalt der kürzesten Linien im Sehfelde hat nun noch weitere Folgen für dessen scheinbare Gestalt und die scheinbare Gröfse der Objecte, wie schon vorher bemerkt wurde. Man denke sich den horizontalen Meridian des Sehfeldes gezogen und  $10^\circ$  über dessen Mitte in horizontaler Richtung eine Richtlinie. Diese trifft mit jenem Meridian in  $180^\circ$  Entfernung hinter dem Kopfe des Beobachters zusammen und tangirt ihn dort; in  $90^\circ$  Entfernung aber an den Rändern des Gesichtsfeldes ist die Richtlinie nur noch um  $5^\circ$  senkrecht entfernt von dem genannten Meridiane, und da die beiden Kreise im Sehfelde als parallele Linien erscheinen, so erscheint der senkrechte Abstand beider von  $5^\circ$  am Rande ebenso groß wie der von  $10^\circ$  in der Mitte, und in gleicher Weise erscheinen auch an anderen Stellen des Randes des Sehfeldes die diesem Rande parallelen Dimensionen der Bilder relativ zu groß.

Dies zeigt sich nun auch in folgenden Versuchen. Man stelle sich so, daß man zur Seite um etwa  $90^\circ$  vom Fixationspunkt entfernt eine weiße

Thür in einer dunklen Wand, oder einen dunklen Baum vor der hellen Himmelsfläche hat, und beachte, wie hoch diese im indirecten Sehen erscheinen. Man wende dann Auge und Kopf direct nach diesen Gegenständen hin, so wird man finden, daß sie viel niedriger erscheinen, und daß im Gegensatz zu der verminderten Höhe ihre Breite viel mehr heraustritt. Berge am Rande des Gesichtsfeldes erscheinen in ähnlicher Weise höher und steiler, als wenn man direct hinblickt.

Andererseits lege man einen weissen Bogen Papier vor sich auf einen dunklen Fußboden und sehe horizontal gerade aus, so daß das Papier am unteren Rande des Gesichtsfeldes erscheint, es wird relativ zu breit von rechts nach links erscheinen und sich scheinbar zusammenziehen, sobald man direct hinblickt.

Während so die der Peripherie des Sehfeldes parallelen Bögen ver- 555 größert erscheinen, erscheinen die peripherischen Theile der radial verlaufenden Linien etwas verkleinert. Die Hyperbeln der *Fig. 213* sind so construirt, daß aus der Entfernung *A* gesehen die Scheitel der horizontal und die der vertical verlaufenden Hyperbeln um gleiche Gesichtswinkel von je 10 Grad von einander abstehen. Wenn also die Hyperbeln als gerade Linien erscheinen, so sollten die schwarzen und weissen Felder alle als gleich große Quadrate erscheinen. Das ist aber nicht der Fall; vielmehr erscheinen die von der horizontalen Mittellinie weit nach oben und nach unten gelegenen Quadrate zu niedrig gegen ihre Breiten. Weniger deutlich finde ich es, daß die nach rechts und links gelegenen vielleicht etwas zu schmal in ihrer Breite erscheinen. Doch ist überhaupt diese Vergleichung der Größen direct und indirect gesehener Objecte sehr unvollkommen.

Eine farbige kreisförmige Pappscheibe vor einen contrastirenden Grund gehalten, erscheint daher am oberen und unteren Rande des Sehfeldes als eine elliptische Scheibe mit längerem horizontalen Durchmesser. Weniger deutlich zeigt sie sich am rechten und linken Rande des Sehfeldes als eine Ellipse mit längerem verticalen Durchmesser.

Da die Seitentheile des Sehfeldes uns etwas zu hoch und etwas zu schmal erscheinen, so besteht eine gewisse Neigung, sie für näher und schräg gestellt gegen die Gesichtslinie zu halten. Sowie man den Blick nach ihnen hinwendet, scheinen sie zurückzuweichen und sich mehr senkrecht gegen die Blicklinie zu stellen. Es ist dies eine Täuschung, die ich bei weit entfernten Objecten am Horizont, am Sternenhimmel sehr gewöhnlich sehe. Das Sehfeld erscheint mir dann nicht als eine Kugel, in deren Mittelpunkt sich das Auge befindet, sondern es erscheint stärker concav als eine solche; doch möchte ich nicht sagen, daß das monoculare Sehfeld bei unbewegtem Blicke sich uns mit einiger Entschiedenheit als eine bestimmt geformte Fläche darstellte.

In der That lassen sich nun die hauptsächlichsten der eben beschriebenen Eigenthümlichkeiten der Wahrnehmung in folgendem geometrischen Bilde zusammenfassen. Man denke sich zuerst das Blickfeld als eine Hohlkugel,

in deren Mittelpunkt das Auge sich befindet. Man denke Radien vom Mittelpunkte (Richtungslinien des Sehens) gezogen nach den einzelnen Objectpunkten und verlängert bis zur Kugeloberfläche. Wo diese Radien die Kugeloberfläche schneiden, ist das auf die Kugelschale projecirte Bild des Objectes. Man denke sich die Objecte entfernt und nur durch ihre Bilder auf der Kugelfläche des Blickfeldes ersetzt. Das Auge fixire den Hauptblickpunkt; ihm gegenüber liegt der Occipitalpunkt. Ich sage: das Auge sieht die Objecte im Sehfelde scheinbar so vertheilt, wie es sie nach geometrisch richtiger Projection sehen würde, wenn es die Bilder auf der Kugelfläche vom Occipitalpunkte derselben aus ansähe. Oder auch: Das Auge sieht die Gegenstände des Gesichtsfeldes wie in einer vom Occipitalpunkte aus entworfenen stereographischen Projection, diese vom Occipitalpunkte selbst aus betrachtet. Es ist dieselbe Art der Projection, wie sie bei geographischen Karten für Erdhalbkugeln immer angewendet wird.

566 In der That liegen die im Sehfelde als ungekrümmt erscheinenden Richtkreise in Ebenen, die durch den Occipitalpunkt gehen, und müssen sich also von dort gesehen als geradlinig projeciren. Tangential gerichtete Erstreckungen längs der Peripherie des Sehfeldes müssen relativ größer als ihnen parallele Strecken in der Mitte des Feldes erscheinen, weil erstere dem Auge näher sind, als letztere. Dazu kommt nun noch, daß in der That das Sehfeld jedes Auges, welches geometrisch genommen von rechts nach links etwa 180 Grade einnimmt, scheinbar viel enger ist. Denn die äußersten nach rechts und links gelegenen Objecte, welche wir noch im indirecten Sehen erkennen können, und deren gerade Verbindungslinie durch unser Auge hindurchgeht, erscheinen uns doch noch immer, wie vor uns liegend, als ob die zu ihnen geführten Richtungslinien des Sehens einen stumpfen oder auch wohl rechten Winkel mit einander bildeten. Namentlich wenn man nach dem Himmel blickt, so daß man keine irdischen Objecte von bekannter Lage und Größe im Sehfelde hat, so scheint das helle Feld, welches man vor sich hat, etwa den Durchmesser eines rechten Winkels von rechts nach links, noch weniger sogar von oben nach unten zu haben, wo Augenbrauen und Wange das Feld etwas verengern. Es macht den Eindruck, als blickte man aus einer gewissen Tiefe des Kopfes hervor in die Außenwelt.

Das eben angeführte geometrische Bild möchte ich nur als solches betrachtet wissen; es faßt die Hauptzüge der scheinbaren Vertheilung im Sehfelde zusammen, aber nicht alle. Die scheinbare Verkürzung der radial gerichteten, vom Hauptblickpunkte auslaufenden Strecken nahe der Peripherie, die namentlich am untern und obern Rande des Gesichtsfeldes deutlich vorhanden ist, wird durch jenes Bild nicht gegeben. Gleiche radiale Strecken würden vielmehr in allen Theilen des Feldes gleich groß erscheinen, da sie für das im Rückenpunkt der Kugel gelegene Auge durch gleiche Peripheriewinkel gemessen werden, wie für das im Mittelpunkte befindliche durch gleiche Centriwinkel. Zu gleichen Centriwinkeln gehören aber bekanntlich gleiche Peripheriewinkel.

die scheinbare Abweichung der verticalen Meridiane und des der verticalen und horizontalen Dimensionen ist nicht gt.

ommen jetzt zu der Untersuchung, wie kann eine solche Aus-  
s Sehfeldes entstehen.

ne der nativistischen Theorie ist sie durch gewisse organische  
n von Geburt auf gegeben, eine Erklärung aus den Gesicht-  
n also nicht weiter zu suchen.

piristische Theorie aber wird versuchen müssen, eine solche  
i finden. Wir setzen dabei voraus, daß das Bewegungsgesetz  
ausgebildet sei, was, wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde,  
enntniß der Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde geschehen  
lge des Bestrebens, die Veränderungen der Eindrücke bei Be-  
Auges als abhängig von dieser Bewegung und nicht von  
der äußeren Objecte zu constatiren. In Wirklichkeit mag, wie  
bemerkt wurde, die Ausbildung des Augenmaasses sich theil-  
seitig mit dem Gesetz der Bewegungen entwickeln und die ganze  
cht so methodisch und in einzelne Stadien getrennt vor sich  
ir es hier der Uebersichtlichkeit wegen haben darstellen müssen. 557  
hen wird dadurch nichts geändert.

en im Anfange dieses Paragraphen auseinandergesetzt, wie unter  
wegungen des Auges zunächst ermittelt werden kann, in welcher  
ie Objecte und die durch besondere Localzeichen charakterisirten  
chenden Netzhautpunkte in der Fläche jene des Gesichtsfeldes,  
tzhaut geordnet sind. Es blieb nur noch übrig, die Entstehung  
en Größenverhältnisse zu erörtern.

en dann gesehen, wie die Kenntniß gewisser Linien im Blick-  
allen ihren Theilen übereinstimmende Richtung haben, und als  
; verschiebbar wahrzunehmen sind, der Richtlinien, durch  
te Bewegungsgesetz der Augen gewonnen werden kann.

r nun irgend ein Object im indirecten Sehen wahrnehmen, von  
i begrenzten Eindruck auf einen seitlichen Theil der Netzhaut  
i, und dann den Blick jenem Objecte zuwenden, so erhalten  
einen Eindruck desselben Objects mit seiner gleichen schein-  
auch auf dem Centrum der Netzhaut, und können also aus  
ählich lernen, welchem centralen Eindrücke ein gewisser peri-  
Qualität und Größe gleich gilt. Dadurch ist die Möglichkeit  
mittels des indirecten Sehens, soweit dessen Genauigkeit  
ecte ihrer Form und scheinbaren Größe nach beurtheilen zu

r Größe und Form wird aber auch eine Vergleichung der  
erst indirect und dann direct gesehenen Objectes mit dem  
gesehenen eintreten, es wird wahrgenommen werden, welche  
Objecte sich auf denselben Meridianen der Netzhaut abbilden.



Diese Vergleichung der Lage wird allerdings etwas verschieden ausfallen müssen, je nachdem wir von der Primärstellung oder von einer Secundärstellung des Blicks ausgehen, obgleich das für normalsichtige Augen geltende LISTING'sche Gesetz die Summe dieser Verschiedenheiten so klein als möglich macht. Im Mittel aller Fälle aber wird die Vergleichung so ausfallen, als wäre das erste Object in der mittleren Stellung, das heisst in der Primärstellung fixirt worden. Ausserdem ist schon früher hervorgehoben worden, dafs die Primärstellung als die bequemste und zur Orientirung vortheilhafteste am meisten vom Auge eingenommen wird, und dafs wir Bewegungen, welche mit Drehung um die Blicklinie verbunden sind, zu vermeiden suchen. So werden wir also durch Erfahrung kennen lernen können, welche Richtungen in den Seitentheilen des Sehfeldes übereinstimmen mit den durch den Fixationspunkt gezogenen Linien, und diese Uebereinstimmung wird sich als Regel so feststellen, wie sie stattfindet, wenn der Fixationspunkt auch Hauptblickpunkt ist, das heisst sämtliche Linienelemente ein und derselben Richtlinie werden im Sehfelde übereinstimmende Richtung zu haben scheinen, und sämtliche Richtlinien, die im Occipitalpunkt einen und denselben Meridian des Sehfeldes tangiren, werden übereinstimmende Richtung haben.

Nun tritt aber diese Bestimmung der Linien von übereinstimmender Richtung in Widerspruch mit den Bestimmungen der scheinbaren Gröfse, 558 welche bei Vergleichung der direct und indirect gesehenen Objecte anzustellen sind. Linien von übereinstimmender Richtung im Sinne unserer Definition dieses Begriffs können sich nämlich nicht schneiden, denn wo sie sich schneiden, würden sie nicht in übereinstimmender Richtung erscheinen können. Sie erscheinen uns vielmehr thatsächlich parallel und überall in gleichem Abstände. Dadurch wird es aber bedingt, wie wir oben gesehen haben, dafs die tangential gerichteten peripherischen Strecken relativ zu grofs erscheinen.

Dafs wir bei diesen Vergleichungen die Richtung der übereinstimmenden Linien mehr berücksichtigen als die Gröfse der Objecte, hängt wohl davon ab, dafs wir bei undeutlichen und verwaschenen Bildern, wie es die peripherischen des Sehfeldes in hohem Grade sind, Richtungen von Linien noch ziemlich gut und genau erkennen können, wenn die Form und Dimensionen des Objects nur noch sehr ungenau erkannt werden. Wenn man eine feine schwarze Linie unter Umständen betrachtet, wo man nicht für sie accommodiren kann und sie als einen verwaschenen Schattenstreifen sieht, so wird man ihre Breite gar nicht, ihre Länge nur sehr unvollkommen bemessen, ihre Richtung aber noch sehr genau mit der eines scharf gesehenen Fadens vergleichen können, indem man diesen dem Rande des Schattenstreifens parallel oder auch gerade in die Mitte des Schattens einstellt. Nun machen die Bilder in den Seitentheilen des Sehfeldes ungefähr denselben subjectiven Eindruck, wenn auch aus einem ganz andern Grunde, wie Bilder, die wegen schlechter Accommodation sehr verwaschen sind, und es scheint mir deshalb die Annahme

und wird auch, wie mir scheint, durch directe Beobachtung bestätigt, die Richtung der durch sie verlaufenden Linien verhältnissmässig bestimmt, als die Grösse der dort befindlichen Objecte. Es ist wenigstens viel schwerer, mich über die Stellung zu entscheiden, als ihnen muß, um die äusseren Felder des Schachbrettmusters leicht breit mit den mittleren zu sehen, als es der Fall ist, wenn man gerade gestreckt sehen will.

In den äussersten Grenzen des schachbrettförmigen Feldes die noch etwas gekrümmt erschienen, erklärt sich daraus, dass von der Stellung ausgehend diese Stellen nur mit angestrengter Seitenwendung des Auges zu erreichen waren, wie wir sie gewöhnlich nicht erreichen können, mußte der Blicklinie für das Centrum der Scheibe nach der entgegengesetzten Seite gegeben werden. Bei solcher Stellung würden die Richtlinien des Sehfeldes an der betreffenden Peripherie wirklich weniger gekrümmt sein, als die Hyperbeln.

Die mittleren deutlich gesehenen Theile des Sehfeldes können wir, trotz der geringen Ausdehnung von der Krümmung der Kugelfläche und gezogenen Richtlinien, absehen. Wir können in diesem Theile des Sehfeldes übereinstimmende Richtlinien als parallele gerade Linien betrachten.

Hier muß auch die Vergleichung der Form, Grösse und Lage

wenn wir sie bald indirect, bald direct betrachten, übereinstimmende Resultate geben. Hier wird also auch eine genauere Vergleichung der Strecken mit parallelen direct gesehenen möglich werden, während die Vergleichungen solcher Strecken von den peripherischen 559 Gesichtsfeldes sehr unsicher und fehlerhaft sind. Nicht übereinstimmende Strecken werden aber auch in der Mitte des Gesichtsfeldes sichtbar, sondern nur mit Hilfe von Drehungen des Kopfes und der Objecte verglichen werden können, eine Art der Vergleichung, die wenigstens viel unvollkommener ist, als die durch Drehung des Auges


Die angegebenen Thatsachen lehren nun auch weiter, dass man solche Linien und Winkel, welche übereinstimmende Lage haben, mit denselben Netzhauptpunkten zur Deckung gebracht werden kann und gut auch der Grösse nach miteinander vergleicht, während die Verhältnisse solcher Linien und Winkel, die nicht übereinstimmende Lage haben, sowohl eine beträchtliche Unsicherheit, als auch gewisse regelartige Fehler bei der Vergleichung zeigen. Bis zu einem gewissen Grade lernen wir natürlich auch Linien und Winkel vergleichen, die übereinstimmende Lage haben, wie die Seiten und Winkel eines Quadrats oder eines gleichseitigen Dreiecks, indem wir entweder die Objecte vor uns herumdrehen, so dass wir sie in verschiedener Stellung erblicken, oder wir unseren Kopf drehen. Beides geschieht aber nicht so häufig, sondern vielmehr auf regelmässiger wiederkehrender Weise, wie die bloße Bewegung des

Auges, daher die Uebung in Bezug auf die Vergleichung von Objecten nicht übereinstimmender Lage natürlich sehr mangelhaft bleibt.

Bei einer unsicheren Wahrnehmung wird nun unser Urtheil auch leicht durch andere Motive, die darauf Einfluss haben, irre geleitet. Wir werden sehen, dass die Täuschung über die Gröfse der rechten Winkel in einer ganz besonderen Beziehung zum zweiäugigen Sehen steht und deshalb bei verschiedenen normalsichtigen Individuen auch in ziemlich übereinstimmender Gröfse wiederkehrt. Die Täuschung, durch welche uns verticale Linien zu grofs erscheinen im Vergleich zu horizontalen, zeigt dagegen sehr grofse Differenzen bei verschiedenen Individuen, und hier finde ich auch bei mir selbst das Urtheil sehr wechselnd und sehr unsicher. Dabei mag vielleicht von Einfluss sein, dass die meisten Figuren der Art, gegen welche wir unsere Stellung so wechseln, oder deren Stellung gegen uns wir so wechseln lassen können, dass ihre verschieden gerichteten Linien und Winkel sich nach einander auf denselben Netzhautparthien abbilden, solche sind, die auf dem Fußboden gezogen sind, oder auf ebenen Tafeln, die wir, wie unsere Bücher, so in der Hand halten, dass ihr unteres Ende dem Auge näher ist, als das obere. Warum wir diese Haltung wählen, wird sich in der Lehre vom Horopter zeigen. Bei solcher Lage der Linien erscheinen aber in der That verticale Linien immer in perspectivischer Verkürzung, und wir können dadurch geneigt werden, sie immer für länger zu halten, als sie ihrer scheinbaren Gröfse nach sind.

Uebrigens ist ferner ersichtlich, dass wenn einmal durch irgend welche Motive festgestellt ist, welcher Meridian für senkrecht gehalten werden soll, und welches Längenverhältnifs verticaler und horizontaler Linien gleich der Einheit erscheinen soll, dass dann auch die scheinbare Lage jedes anderen Punktes im Sehfelde bestimmt ist.

560 Wenn wir uns hierbei beschränken auf den mittleren Theil des Sehfeldes, welcher annähernd als Ebene betrachtet werden kann, so können wir uns die geometrische Lage der Punkte durch rechtwinkelige Coordinaten gegeben denken. Es sei in *Fig. 214* *AB* die dem Netzhauthorizont ent-



*Fig. 214.*

sprechende Horizontale, *CA* eine Verticale, *A* der Blickpunkt. Dem entspreche die scheinbare Lage im Sehfelde *ab* für den Netzhauthorizont, *ac* für den verticalen Meridian. Es sei der Punkt *F* im geometrischen Sehfelde abstehend um zwei Längeneinheiten von der Axe *AB*, um drei von der Axe *AC*. Tragen wir auf *ab* drei

Längeneinheiten ab gleich denen von *AB*, und auf *ac* die Linie *ad*, welche zwei Längeneinheiten von *AC* gleich lang erscheint, und vervollständigen das Parallelogramm *abdf*, so ist *f* die scheinbare Lage von *F*, denn

action gemäß müssen alle einzelnen Linienstücke und Winkel der  
iren einander gleich erscheinen.

heinbare Lage der Punkte im mittleren, scharf gesehenen Theile  
es, welchen wir als Ebene betrachten können, wird also nach der  
en Theorie, wie es auch in der That der Fall ist, aus der geo-  
hergeleitet werden, wenn wir die Punkte aus einem rechtwinke-  
linatensystem in ein schiefwinkeliges mit verändertem Axen-  
übertragen. Indessen läßt sich auch, wie aus bekannten Sätzen  
chen Geometrie erhellt, in solchen Fällen immer eine bestimmte  
z eines rechtwinkligen Systems angeben, an dem die Ueber-  
lurch vorgenommen werden kann, daß nur die der einen Axe  
ordinaten in einem bestimmten Verhältnisse verkürzt oder ver-  
den. Die Winkel und Axenverhältnisse, welche diesen Um-  
u Grunde zu legen sind, sind schon oben angegeben.

fs hier noch bemerken, daß die beschriebenen thatsächlichen  
nicht passen zu zwei anderen Theorien, die über die Ausmes-  
sfeldes aufgestellt worden sind. Eine Anzahl von Physiologen  
Annahme von J. MÜLLER angeschlossen, daß die Netzhaut die  
tte, ihre eigenen räumlichen Dimensionen wahrzunehmen. Dann  
tangential gerichteten Strecken nahe der Peripherie des Seh-  
zu groß, wie sie es thun, sondern vielmehr zu klein erscheinen  
wie der Querschnitt des Auges *Fig. 1* (S. 5) lehrt, die  
en ihren vorderen Rand an der *Ora serrata gg* hin beträchtlich  
als eine um den Knotenpunkt beschriebene Halbkugel. Wie es  
eser Annahme mit den radialen Dimensionen verhalten müßte,  
ht gut entscheiden, da die Brechung der Strahlen, welche sie  
im Einfall in Richtung zur Axe hin erleiden, und die Lage des  
s nicht genau bestimmt werden können.

ite Annahme, die zur Erklärung der Ausmessung des Sehfeldes 561  
orden ist, ist von mehreren Physiologen aus E. H. WEBER's  
ber die Empfindungskreise der Haut und der Netzhaut her-  
en, freilich wohl kaum, wie mir scheint, im Sinne dieses Autors<sup>1</sup>.  
i die kleinsten räumlich unterscheidbaren Ausdehnungen als  
Flächenmaafses benutzt werden. Räumliche Trennung zweier  
un, wie schon auf Seite 256 erörtert wurde, nur wahr-  
rden, wenn zwischen zwei erregten Flächenelementen ein nicht  
anders erregtes übrigbleibt und wahrgenommen werden kann.  
r kleinsten unterscheidbaren Flächenelemente ist nun an ver-  
eilen der Netzhaut sowohl, wie außer WEBER auch AUBERT  
erwiesen haben, als auch an verschiedenen Stellen der Haut  
en, so daß die Entfernung der erregten Punkte an verschie-  
sehr verschieden groß gewählt werden muß, wenn man sie

1 über den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. *Berichte*  
S. 85—164.

als zwei unterscheiden soll. Setzt man also zwei Zirkelspitzen auf eine Stelle der Haut, wo ihre Distanz kleiner als die kleinsten unterscheidbaren Entfernungen ist, so verschmelzen ihre Eindrücke in einen, man glaubt nur mit einer Spitze berührt zu sein. Setzt man sie auf eine Stelle auf, wo ihre gesonderte Unterscheidung nur undeutlich erfolgt, so ist man allerdings geneigt, sie für näher zu halten, als sie wirklich sind; setzt man sie endlich an feiner unterscheidenden Theilen auf, wo ihre Trennung leicht erkannt wird, so erkennt man, wie ich wenigstens finde, richtig ihre wahre Distanz. So erscheinen mir also zum Beispiel Zirkelspitzen von vier Linien Distanz an der Zungenspitze, an der Fingerspitze, an den Lippen in gleicher Entfernung von einander, obgleich an der Zunge ein Abstand von  $\frac{1}{2}$  Linie unterschieden wird, an der Fingerspitze dagegen nur einer von 1, an den Lippen von 2 Linien. Dagegen am Kinn und unterhalb des Kinnes, wo die Unterscheidung der Spitzen bei der genannten Distanz schwierig und unsicher wird, erscheinen sie mir, wenn ich sie unterscheide, wohl etwas näher zusammengedrückt zu sein, als sie wirklich sind, nach dem allgemeinen Gesetze des Empfindens, wonach deutlich wahrnehmbare Unterschiede größer erscheinen als undeutlich wahrnehmbare. Aber doch scheinen sie mir am Halse, so lange ich sie überhaupt noch unterscheiden kann, niemals so nahe zu sein, als wenn ich die Spitzen eine halbe Linie oder eine Linie von einander entfernt, an die Zungenspitze ansetze. Die kleinsten unterscheidbaren Größen erscheinen also keineswegs an allen Stellen der Haut gleich groß, sondern sie erscheinen sehr verschieden groß.

Ebenso verhält es sich auf der Netzhaut. Wenn ich zwei kleine schwarze Kreise von 2 Millimeter Durchmesser und ebensoviel gegenseitigem Abstand im indirecten Sehen betrachte, und eine Stelle suche, wo sie zuerst mir anfangen sichtbar zu werden, so erscheinen sie mir dort keineswegs näher aneinanderzustehen, als sie wirklich sind, und jedenfalls nicht im entferntesten so nahe, als zwei mit dem Centrum der Netzhaut fixirte Punkte, die an der Grenze der Unterscheidbarkeit sind.

562 Ich glaube deshalb, daß es eine unzulässige Erweiterung der WEBER'schen Theorie von den Empfindungskreisen ist, wenn man diesen Kreisen überall dieselbe scheinbare GröÙe zuschreiben und sie als elementare Maafseinheiten der Raumabmessungen benutzen will. Für das Auge würde aus einer solchen Annahme in der That auch folgen, daß die ganze Peripherie des Sehfeldes in allen Dimensionen relativ viel kleiner erscheinen müßte, als Objecte gleicher WinkelgröÙe in der Mitte des Sehfeldes. Wir haben im Gegentheil gesehen, daß die tangentialen Richtungen vergrößert erscheinen; die radialen allerdings, wenigstens am oberen und unteren Rande des Sehfeldes verkleinert.

Damit steht es keineswegs in Widerspruch, daß bei der Ausmessung sehr kleiner Abstände, für deren Beurtheilung das mittels der Augenbewegungen ausgebildete Augenmaaf nicht genau genug ist, die Empfindungskreise, wie schon oben bemerkt wurde, benutzt werden. Wir kommen auf

diese Fragen übrigens bei den Phänomenen des blinden Flecks weiter unten noch einmal zurück.

Außer den hier beschriebenen allgemeinen Täuschungen über die Größenverhältnisse des Sehfeldes, welche vom Gesetz der Augenbewegungen und von der Art, wie wir unser Sehfeld kennen lernen, abhängig sind, giebt es noch eine Reihe von Täuschungen, welche von besonderen Eigenthümlichkeiten der betrachteten Figuren abhängen, aber auch interessant sind, weil sie mehr oder weniger deutlich die Motive kennen lehren, denen wir bei der Schätzung der GröÙe und Formen im Sehfelde folgen.

Man kann die hier in Betracht kommenden Phänomene meist auf die schon bei den Contrasterscheinungen aufgestellte Regel zurückführen, daß deutlich zu erkennende Unterschiede bei allen Sinneswahrnehmungen größer erscheinen, als undeutlich zu erkennende Unterschiede von gleicher objectiver GröÙe. Eine erste Folge davon ist, daß wir eine getheilte RaumgröÙe leicht für größer halten, als eine ungetheilte, weil die directe Wahrnehmung der Theile uns deutlicher erkennen läßt, daß die betreffende GröÙe so viel und so große Theile enthalte, als wenn die Theile nicht erkennbar abgezeichnet sind. So wird man in der nebenstehenden Linie *Fig. 215* leicht das Stück *ab* gleich *bc* halten, obgleich in der That *ab* größer ist als *bc*. Eine Reihe von Messungen über diese Art der Täuschung ist von A. KUNDT<sup>1</sup> ausgeführt worden.




Fig. 215.

Er blickte nach 5 stählernen Spitzen *A, B, C, D, E*, die hinter einem Schirme so hervorragten, daß die Entfernung  $AB = 20,2$  Mm.,  $BC = 40,2$  Mm.,  $AE = 241,9$  Mm. war. Die Spitze *D* wurde nach dem Augenmaasse in die Mitte eingestellt. Wäre sie wirklich in der Mitte gewesen, so hätte die Entfernung *CD* betragen müssen 60,55 Mm. Sie wurde aber im Mittel aus 120 Versuchen eines Beobachters gemacht gleich 57,87 Mm., so daß die scheinbare Mitte um 2,68 Mm. nach der Seite der Spitzen *A, B* und *C* von der Mitte hin entfernt lag. Bei einem anderen Beobachter ergab sich im Mittel aus 120 Versuchen die Abweichung gleich 3,95 Mm. Die Entfernung der Spitze *D* vom Knotenpunkte des Auges betrug in allen Fällen 338 Mm. 563

Zu bemerken ist, wie bei diesen Versuchen sich herausstellte, daß das rechte Auge die rechte Hälfte einer zu halbirenden Distanz größer zu machen strebt, das linke Auge die linke Hälfte. Der erste Beobachter machte die dem gebrauchten Auge entsprechende Hälfte um 2,24 Mm., der zweite um 4,77 Mm. größer als die andere.

Bei den beschriebenen Versuchen werden Distanzen verglichen, welche mit denselben Netzhautpunkten zur Deckung gebracht werden können. Viel auffallender werden die Täuschungen, wenn die zu vergleichenden Distanzen verschiedene Richtung haben.

<sup>1</sup> A. KUNDT, *Poggendorfs Annalen* CXX. S. 118.

V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik*, 2. Aufl.

Man betrachte *Fig. 216 A* und *B*; die beiden liniirten Flächen sind richtig gezeichnete Quadrate. Beide sollten höher als breit erscheinen der oben besprochenen Täuschung gemäfs. Das ist bei *A* auch in übertriebenem Maafse der Fall; *B* sieht umgekehrt zu breit aus.





Fig. 216.

Dasselbe gilt für Winkel; man betrachte *Fig. 217*. Die Winkel 1, 2, 3, 4 sind rechte Winkel, und sollten, mit beiden Augen gleichzeitig betrachtet, so erscheinen. Aber 1 und 2 erscheinen spitz, 3 und 4 stumpf; noch stärker wird die Täuschung, wenn man die Figur nur mit dem rechten Auge betrachtet; mit dem linken gesehen, sollten dagegen 1 und 2 stumpf erscheinen, wegen der oben erwähnten Abweichung des verticalen Meridians; sie erscheinen aber nur etwa als rechte, in ihrer wahren Form. Dreht man die Figur, daß 2 und 3 nach unten sehen, so erscheint im Gegentheil 1 und 2 dem linken Auge übertrieben spitz, dem rechten richtig. Es erscheinen die getheilten Winkel also verhältnißmäfsig immer größer, als sie ohne die Theilung erscheinen würden.




Fig. 217.

Die *Fig. 218* zeigt zwei gleichseitige Dreiecke; *A*, was horizontal getheilt ist, erscheint viel zu hoch, wie es auch ohne die Liniirung der Fall sein würde. In *B* dagegen erscheint der Winkel rechts an der Grundlinie größer als der links und die Spitze des Dreiecks nach rechts herübergerückt. Derselbe Einfluß zeigt sich bei vielen aus dem gewöhnlichen Leben bekannten Beispielen.




Fig. 218.

Ein leeres Zimmer sieht kleiner aus als ein möblirtes, eine mit einem Tapetenmuster bedeckte Wand größer als eine einfarbig angestrichene. Damenkleider mit Querstrichen lassen die Figur höher erscheinen. Ein bekannter gesellschaftlicher Scherz ist es, daß man 564 Jemandem einen cylindrischen Herrnhut zeigt und ihn auffordert, an der Wand vom Fußboden ab anzuzeigen, wie hoch der Hut sei. Er macht ihn in der Regel anderthalb Mal zu hoch.

Hierher möchte auch eine von BRAVAIS' beobachtete Thatsache gehören. Er berichtet: Wenn ein Beobachter, der sich auf dem Meere in einer gewissen Entfernung von einer Küste befindet, welche große Unregelmäßigkeiten des Terrains darbietet, dieselbe so zeichnet, wie sie dem Auge erscheint, so findet er durch vergleichende mathematische Ermittlung, daß

<sup>1</sup> FECHNER, *Centralblatt* 374—379; 558—561.



nen Zeichnung die horizontalen Lineargrößen nach den Winkeln unter einander, die verticalen Winkeldistanzen aber nach den Maafsstäben geschätzt sind. Diese Täuschung, der man bei dieser Art Schätzungen unterliegt, ist nicht individuell, wie man sieht, vielmehr beweisen zahlreiche Beobachtungen ihre Allgemeinheit. Diese Fälle schließen sich verschiedene in neuerer Zeit entdeckte optische Täuschungen an.


*Fig. 219 A.* Nicht  $d$  erscheint als Fortsetzung der Linie  $a$ , sondern

etwas niedriger und weiter entfernt ist diese Linie.

Die Figur in *B* ist ausgeführt, wie die beiden Stücke in *A* wirklich verlaufen, und in *C*, wo es nicht so ist.

Die Figuren wie *A*, *B* und betrachtet man sie von einer


geringeren Entfernung als die Accommodation (durch Brillen wird), so daß sie in immer kleinerer scheinbarer GröÙe vorliegt, so laßt man, daß man  $f$  immer weiter herunterrücken muß, um die Fortsetzung von  $a$  erscheinen zu lassen, je ferner und scheinbar kleiner



*Fig. 219.*

die dünnen Linien sehr lang, wie in *Fig. 220 A*, so wird es so, als ob sie in der Nähe der breiteren Linien eingebogen erscheinen, wie ich in *B* gezeichnet habe, daß die Fortsetzungen der dünnen Linien allerdings nur durch jene Einbiegungen der Fortsetzungen von einander erscheinen, nur durch jene Einbiegungen der Fortsetzungen der dünnen Linien, die sie schneidenden starken Linien, die sie schneiden, als trafen sie nicht auf

nun gerade die Erscheinungen, die in *Falle* die Irradiation hervorgerufen werden, es ist schwer zu scheiden, und was etwa noch daran durch die Erscheinungen, wie sie theils schon erwähnt worden sind, in den folgenden Täuschungen noch enthalten, bewirkt wird. Daß auch




*Fig. 220.*

Irradiation von schwarzen Linien auf weißem Grunde vorkommt, ist schon oben S. 398—400 erörtert worden. Nahe dem Scheitel der beiden spitzen Winkel treffen die Zerstreuungskreise der beiden schwarzen Linien zusammen und verstärken sich gegenseitig; dadurch rückt das Maximum des Dunkels in dem Netzhautbilde der schmalen Linie dem breiten Streifen näher und sie erscheint gegen diesen hingelenkt. Bei den in größerem Maassstabe gezeichneten Figuren derselben Art, wie *Fig. 219 A*, kann indessen kaum Irradiation der einzige Grund sein.

Die *Fig. 221 A* und *B* zeigt Beispiele, welche von HERING angegeben wurden; die geraden und parallelen Linien *a b* und *c d* erscheinen in *A* nach außen, in *B* nach innen gebrochen.

Am auffallendsten aber ist das in *Fig. 222* gegebene, von ZOELLNER veröffentlichte Beispiel. Die verticalen schwarzen Streifen der letzteren Figur sind



*Fig. 221.*

einander parallel, erscheinen aber convergent und divergent, so daß sie immer in entgegengesetzter Richtung von der Verticalen abzuweichen scheinen, als die kurzen schrägen Striche, von denen sie geschnitten werden. Dabei sind die Hälften der schrägen Striche so gegen einander verschoben, wie die Hälften der schmalen Linien in *Fig. 219*. Dreht man die Zeichnung so, daß die breiten Verticalstriche unter  $45^\circ$  gegen den Horizont geneigt erscheinen, so wird die scheinbare Convergenz auffallender, dagegen die scheinbare Verschiebung der Hälften der dann horizontal und vertical liegenden Querstriche weniger auffallend. Die verticalen und horizontalen Linien werden also im Ganzen weniger in ihrer Richtung verändert, als die schräg durch das Gesichtsfeld laufenden.

566 Diese zuletzt beschriebenen Täuschungen kann man betrachten als neue Beispiele für die oben gegebene Regel, daß spitze Winkel, als deutlich abgegrenzte kleine Größen, in der Regel verhältnißmäßig zu groß erscheinen, wenn wir sie mit stumpfen oder rechten ungetheilten Winkeln ver-

gleichen. Wenn nun die scheinbare Vergrößerung eines spitzen Winkels so geschieht, daß seine beiden Schenkel scheinbar nach außen rücken, so müssen die Täuschungen in den *Fig. 219*, *221* und *222* eintreten. In *Fig. 219* würden sich die dünnen Linien dabei scheinbar um den Punkt drehen, wo sie in den dicken Streifen eintreten und dann nicht mehr in gegenseitiger Verlängerung liegen. In *Fig. 221* werden die beiden Hälften jeder der beiden geraden Linien immer scheinbar so verstellt, daß sich die spitzen Winkel, die sie mit den schrägen Linien machen, vergrößern. Dasselbe geschieht scheinbar mit den Verticalstreifen der *Fig. 222*.





Fig. 222.

Indessen ist in den Fällen von *Fig. 221* und *222* die angegebene Ursache unter gewöhnlichen Verhältnissen nur an einem kleinen Theile der Wirkung Schuld; und der gröfsere Theil der Wirkung hängt, wie ich gefunden habe, von Bewegungen der Augen ab. Die genannten Täuschungen schwinden nämlich ganz, oder bleiben nur in schwachen Resten bestehen, wenn ich einen Punkt der Zeichnungen so fixire, wie es nöthig sein würde, um ein Nachbild zu entwickeln, und wenn es gelingt, ein scharf gezeichnetes Nachbild zu erhalten, was namentlich für das ZOELLNERSche Muster *Fig. 222* möglich ist, so ist in dem Nachbilde keine Spur der Täuschung mehr zu erkennen.

In *Fig. 219* hat Bewegung des Blicks keinen deutlichen Einfluß auf Verstärkung der Täuschung, im Gegentheile verschwindet diese, wenn ich der dünnen Linie *a d* mit dem Blicke folge. Dagegen verschwindet die Täuschung umgekehrt durch Fixation verhältnismäfsig leicht bei *Fig. 221*, schwerer bei *Fig. 222*. Doch kann ich sie auch bei dieser letztern Figur beseitigen, wenn ich fest fixire und nicht die schwarzen Streifen als Objecte, die auf weifsem Grunde liegen, betrachte, sondern die weifsen Streifen gleichsam als Zweige mit Fliederblättchen, die auf schwarzem Grunde liegen, aufzufassen suche. Sobald mir dies gelingt, sehe ich alles richtig. So wie ich dann aber anfangs, den Blick über die Zeichnungen hin zu bewegen, ist die Täuschung in voller Stärke wieder da.

Auch gelingt es bei diesen Figuren die Täuschung ganz oder fast ganz zu vermeiden, wenn man sie zuerst mit einem undurchsichtigen Papiere bedeckt, über dieses eine Nadelspitze als Fixationspunkt unbeweglich hält, und während man diese ganz scharf und sicher fixirt, das bedeckende Papier zwischen ihr und der Zeichnung fortzieht. Ob man gut fixirt hat, kann man nach der Schärfe des dabei ausgebildeten Nachbildes beurtheilen.

Die sicherste und leichteste Methode, den Einfluss der Augenbewegungen zu beseitigen, ist die Beleuchtung mittels des elektrischen Funkens, weil während der außerordentlich kurzen Dauer eines solchen Funkens das Auge keine merkliche Bewegung ausführen kann. Dazu benutze ich einen hölzernen innen schwarz angestrichenen Kasten *A B C D*, *Fig. 223*. Bei *f* in der vorderen und bei *g* in der hinteren Wand waren in der Entfernung



*Fig. 223.*

der Augen von einander je zwei Löcher<sup>1</sup> eingebohrt worden. Durch die Löcher *f* blickte der Beobachter hinein, vor die Löcher *g* wurden innen die Zeichnungen befestigt, welche selbst mit einem Nadelstich durchbohrt waren, der auch ohne die elektrische Entladung in dem übrigens ganz dunklen Kasten gesehen und fixirt werden konnte. An seiner untern Seite, die auf der Tischplatte *B D* ruht, ist der Kasten offen; wenn man die Zeichnung wechseln will, kehrt man ihn um und greift hinein. Das Zimmer wurde mäfsig dunkel gemacht, so dafs der Beobachter die elektrischen Apparate noch sehen und handhaben konnte, dafs aber doch im Innern des Kastens nichts aufser jenen Nadelstichen sichtbar war. Die Drähte, welche zur Zuleitung der Elektrizität dienen, sind *hi*, bei *k* ist die Unterbrechungsstelle; *l* ist ein Kartenstreifen, der auf der dem Funken zugekehrten Seite weifs ist und das Licht desselben vom Auge des Beobachters abhält, es dagegen nach der Zeichnung hinwirft. Die Funken wurden durch die secundäre Spirale eines grofsen Inductionsapparates von *RUHMKORFF*, die mit den Belegen einer Leydener Flasche verbunden war, gegeben. Den Schluss der primären Spirale und deren Unterbrechung brachte der Beobachter mit der Hand hervor.<sup>2</sup>

Es fand sich, dafs bei elektrischer Beleuchtung die Täuschung bei der *Fig. 219* unverändert blieb, dagegen bei den Zeichnungen der *Fig. 221* ganz schwand, bei *222* nicht immer ganz fehlte, aber, falls sie eintrat, viel schwächer und zweifelhafter war, als sonst, während doch andererseits die Beleuchtung durch den elektrischen Funken vollkommen genügend war, um die Formen der gerade gesehenen Gegenstände deutlich zu erkennen.

Es sind also zwei verschiedene Erscheinungen zu erklären, nämlich erstens der geringere Grad der Täuschung, der bei Vermeidung der Augen-

<sup>1</sup> Je zwei Löcher, weil der Apparat namentlich auch für stereoskopische Versuche gebraucht werden sollte.

<sup>2</sup> Beim Mangel hinreichend starker elektrischer Apparate kann das von *VOLKMANN* construirte Tachistoskop dienen (*Leipz. Sitzungsab.* 1850, p. 90–98), auf welchem ein fallender Schieber für einen Moment die eine oder zwei Oeffnungen öffnet, durch die der Beobachter blickt.


einsetzen kann, und zweitens die Verstärkung der Täuschung 568  
 eugung des Auges. In ersterer Beziehung genügt, wie ich glaube,  
 z des Contrastes, wonach ein deutlich wahrnehmbarer Unterschied  
 scheint, als ein weniger deutlich wahrnehmbarer. Am deutlichsten  
 ar ist im indirecten Sehen die Uebereinstimmung der Richtung  
 er Raumgrößen. Die Abweichung des Schenkels eines spitzen  
 oßen Winkels von der Richtung des anderen Schenkels im Schnitt-  
 deutlicher wahrgenommen, als die Abweichung desselben Schenkels  
 cht gezeichneten Loth, welches auf dem anderen Schenkel senkrecht  
 nit erscheint der Unterschied eines Winkels von  $0^\circ$  oder  $180^\circ$   
 grofs gegen den von  $90^\circ$ ; ein spitzer Winkel also zu grofs, ein  
 u klein. Indem diese scheinbare Vergrößerung der Winkel auf  
 nkel vertheilt wird, entstehen die scheinbaren Verschiebungen  
 ingsänderungen der Schenkel. Scheinbare Verschiebungen der  
 ei sie ihrer wirklichen Richtung parallel bleiben, werden schwer  
 aher die Täuschung der *Fig. 219* verhältnismäfsig am hart-  
 ist. Richtungsänderungen dagegen können durch eine genauere  
 der Figur leichter erkannt werden, wenn dadurch scheinbare  
 nstimmung zwischen übereinstimmenden Linien hervorgebracht  
 und nur dadurch, dafs in *Fig. 221* und *222* die übereinstimmenden  
 he verändert erscheinen, durch die grofse Zahl kreuzender schräger  
 der im Anblick unähnlich gemacht werden, ist es wohl überhaupt  
 s ihre Uebereinstimmung übersehen werden kann.

aben wir noch den Einfluß der Bewegung auf die scheinbare  
 sehener Linien zu untersuchen. Einfache Versuche zeigen, dafs  
 nfachen geraden Linien ein solcher Einfluß besteht, wenn die  
 r Bewegung unter einem spitzen Winkel gegen die Richtung  
 neigt ist. Da wir eine überwiegende Neigung haben, bei den  
 unseres Auges der Richtung der hervorstechenderen Linien des  
 s zu folgen, so ist es bei diesen Versuchen nöthig, den Blick-  
 ickfelde so, wie man es beabsichtigt, zu führen mittels einer  
 an fortdauernd fixirt und über die betreffende Zeichnung hin-

he auf einem Papier eine lange gerade Linie *A* und bewege  
 elche man fixirt, in Richtung einer zweiten geraden Linie *B*,  
 rste unter einem sehr kleinen Winkel schneidet. Die zweite  
 braucht nicht gezeichnet zu sein; doch schadet es auch nicht,  
 klich sichtbar gezogen wird. Wenn man der bewegten Spitze  
 ke folgt, so scheint dabei die gerade Linie *A* auf dem Papier  
 g gegen die Nadelspitze hin oder von ihr weg zu machen, je  
 die Nadel ihr nähert oder von ihr entfernt. Das Bild der  
 hiebt sich dabei auf der Netzhaut theils parallel sich selbst,  
 tung der Breite. Die erstere Bewegung wird wenig oder gar  
 ;, wenn die Linie lang ist und keine deutlich gezeichneten

Merkpunkte besitzt; die zweite Bewegung senkrecht zu ihrer Länge wird dagegen desto deutlicher bemerkt.

Dabei scheint auch die Richtung der Linie *A* verändert, und zwar so, 569 dafs der Winkel, den sie mit der Linie *B* macht, in der sich die Spitze bewegt, vergrößert erscheint. Das letztere erkennt man am besten, wenn man eine gerade Linie *ab*, *Fig. 224*, zieht, und eine Spitze eines Zirkels



*Fig. 224.*

so auf das Papier aufsetzt, dafs die andere sich in dem Bogen *cde* hin- und herbewegen kann. Wenn man dann dieser beweglichen Spitze mit dem Auge folgt, so scheint die Linie *ab* sich abwärts zu bewegen, so lange man die Zirkelspitze von *c* nach *d* gehen läfst, aufwärts, wenn sie von *d* nach *e* geht. Gleichzeitig erhält die ganze Linie *ab* scheinbar eine Richtung wie *fg*, so lange sich der Blick des Beobachters der Spitze folgend längs *cd* bewegt, und eine Richtung wie *hi*, wenn er sich zwischen *d* und *e* bewegt. Während man bei der Bewegung von *c* nach *e* durch den höchsten Theil des Bogens bei *d* hindurchgeht, verändert die Linie *ab* deutlich ihre Richtung.

Wenn man nun über das ZOELLNER'sche Muster horizontal von rechts nach links eine Nadelspitze führt und ihr mit dem Blicke folgt, so kommt die Figur in die seltsamste Unruhe; der erste, dritte, fünfte schwarze Streifen steigen aufwärts, der zweite, vierte, sechste abwärts; oder umgekehrt, wenn die Richtung der Bewegung umgekehrt wird. Dabei erscheinen die aufwärtssteigenden den abwärtssteigenden nicht parallel, sondern theils gegen einander, theils auch gegen die Ebene der Zeichnung in entgegengesetzter Weise geneigt, und zwar neigen sich die aufwärtssteigenden mit ihrem oberen Ende der Richtung, in der die Nadelspitze bewegt wird, entgegen, die abwärtssteigenden mit demselben Ende dagegen im Sinne der genannten Richtung, so dafs also in besonders auffallender Weise während dieser Scheinbewegung die eigenthümliche Täuschung durch die beschriebene Figur zum Vorschein kommt.

Um die Scheinbewegung recht deutlich zu sehen, muß man eine mittlere Geschwindigkeit mit der Nadelspitze einhalten, die weder zu groß noch zu klein sein darf, und muß den Blick ganz fest an die Nadelspitze heften. Wenn es nicht gleich gelingt, kann man auch die Nadelspitze fest stellen und fest betrachten und hinter ihr die Zeichnung vorbeiziehen. Die Ursache der Scheinbewegung ist offenbar dieselbe, wie bei dem oben beschriebenen Versuche mit der einzelnen geraden Linie. Wir nähern uns in geneigter Richtung den schrägen Querstrichen und diese scheinen sich deshalb zu bewegen; sie nehmen dabei die verticalen schwarzen Streifen, mit denen sie verschmolzen sind, gleichsam mit. Wenn nun der schwarze verticale Streifen,

uns nähern, dabei eine verticale Bewegung zeigt nach aufwärts, so eine ähnliche Erscheinung, als wir haben würden, wenn wir uns in senkrechter Richtung näherten, sondern unter einem spitzen Winkel, dessen Spitze nach aufwärts sieht, und umgekehrt bei den abwärts-Streifen ist die Scheinbewegung dieselbe, als wenn wir uns ihnen unter einem spitzen Winkel, dessen Spitze nach aufwärts sieht, näher die Richtung der wirklichen Bewegung unseres Blicks für alle dieselbe ist, so erscheinen uns umgekehrt die Streifen gegen die Linie des Blicks geneigt, die aufsteigenden mit dem oberen Ende der Bewegung entgegen, die absteigenden ihr folgend, wie in Fig. 225. angezeichnet ist, wo  $a b$  die Richtung bezeichnen soll, in der der Blick bewegt,  $c c$ ,  $d d$ , die scheinbare Lage der Streifen in übertriebener GröÙe, und die Pfeile die Richtung der letzteren Linien angeben, in der sich so eine Scheinbewegung zeigt, wenn der Blick der horizontalen Linie folgt.




Fig. 225.

Man kann die Bewegung, die das Auge folgt, allmählich langsamer, so wird auch die Scheinbewegung langsamer, wird leichter übersehen, kann aber bei einiger Aufmerksamkeit erkannt werden, und gleichzeitig finde ich, daß die scheinbare Bewegung der verticalen Streifen sich weniger bestimmt zeigt. Ohne Hilfe der Nadeln kommt weder die Scheinbewegung der Streifen noch die Divergenz so schön zum Vorschein, wie mit einer solchen, weil wir unseren Blick über eine Zeichnung mit so hervorstechenden Linien nicht so gleichmäßig und so geradlinig hingleiten lassen. Da übrigens die Täuschung über die Richtung der Streifen mit ihrer Bewegung gleichzeitig wächst und fällt, so zweifle ich auch die Verstärkung der Täuschung bei den gewöhnlichen Zeichnungen des Blicks dieselbe Ursache habe.

Man die fixirte Nadelspitze parallel den verticalen Streifen überlagern, so wird die Täuschung nicht nur nicht verstärkt, sondern schwächt oder ganz beseitigt. Die verticalen Streifen zeigen sich dann alle Richtlinien im Blickfelde dadurch, daß ihre Netzhautbilder selbst verschieben.

Der beschriebene Einfluß der Scheinbewegung der verticalen Streifen auf die scheinbare GröÙe des Winkels zwischen ihnen und der Richtung des Blicks läßt sich übrigens ganz ebenso an einem bewegten Körper zeigen. Man lege einen mit Theilstrichen versehenen Stab in horizontaler Richtung auf ein Blatt Papier, setze dicht



neben ihm die eine Spitze eines weit geöffneten Zirkels ein und bewege die andre nahe über der Kante des Maafsstabes hin und her; sie wird sich dabei genau normal zur Richtung des Maafsstabes bewegen. Jetzt bewege man auch den Maafsstab in seiner eigenen Richtung hin und her, so wird die Bewegungslinie der Zirkelspitze durchaus nicht mehr senkrecht zur Richtung des Maafsstabes, sondern sehr stark geneigt gegen diese erscheinen, wie sie sich denn in der That in einem am Maafsstabe festen Coordinatensystem wirklich als geneigt darstellen würde, während sie, auf ein absolut festes Coordinatensystem bezogen, senkrecht zur Kante des Maafsstabes bleibt. 571 Die Veränderung des Winkels ist übrigens in diesem Falle viel bedeutender als an der ZOELLNER'schen Figur, weil bei dieser die scheinbare Lagenveränderung nie so weit gehen kann, daß die verschobenen Streifen gegen einander stoßen oder gar sich kreuzen, was dem Bilde des indirecten Sehens zu sehr widersprechen würde.

Die HERING'schen Beispiele, *Fig. 221*, bieten dieselben Verhältnisse nur in weniger auffallendem Grade. Die Täuschung wird bei ihnen verstärkt durch Bewegungen des Blicks zwischen oben und unten, geschwächt durch solche von rechts nach links.

Es kann vielleicht auffallen, daß ich zweierlei anscheinend so verschiedene Ursachen zur Erzeugung derselben Täuschungen zusammenwirken lasse. Wenn man sich aber erinnert, daß nach der hier vorgetragenen Ansicht die Kenntniß der Ausmessungen des Sehfeldes im indirecten Sehen auf Erinnerung an frühere bei Bewegungen gemachte Erfahrungen beruht, während bei bewegtem Blick neue ähnliche Eindrücke hinzukommen, so ergibt sich, daß die beiden Ursachen nicht so verschieden sind, wie sie in der Auseinandersetzung zu sein scheinen; sie sind nur unterschieden wie Erinnerung und gegenwärtige Anschauung analoger Verhältnisse.

Es kommt durch diese Verhältnisse eine Art Contrast für die Richtungen von Linien und für die Entfernungen zu Stande von ähnlicher Wirkung, wie wir ihn in § 24 für die Lichtstärken und Farben kennen gelernt haben. Die Unterschiede nahe gleicher Richtungen erscheinen vergrößert; dadurch daß wir eine Linie von einer oder vielen andern geneigten Linien schneiden lassen, wird sie scheinbar nach der entgegengesetzten Seite geneigt, als jene. Die Erscheinungen des Contrastes der Lichtstärken und Farben ließen sich mit Hilfe der Hypothese von Th. Young auf die Vergleichung verschieden starker, aber qualitativ gleicher Erregungen der Fasern zurückführen. Wollte man sich die Localzeichen der Netzhautfasern als Empfindungen von zwei, irgend welchen zwei Coordinatenrichtungen entsprechenden Qualitäten denken, deren Intensität sich continuirlich in der Fläche änderte, so würden die Contraste der Richtungen gerade auf dieselben Eigenthümlichkeiten der Unterscheidung der Empfindungsstärke zurückzuführen sein, wie die der Farben. Da es aber gelang, den Einfluß der Augenbewegungen auf direct sichtbare Erscheinungen zurückzuführen, so können wir eine solche Hypothese vorläufig auf sich beruhen lassen. Uebrigens hat auch ZOELLNER bei seiner

Beschreibung der Täuschung an dem Muster der *Fig. 222* dieselbe auf die Bewegungen des Auges zurückzuführen gesucht. Ganz unzulässig erscheint mir dagegen die von E. HERING gegebene Erklärung. Derselbe meint, daß wir die Entfernung zweier Punkte nach der geradlinigen Entfernung ihrer beiden Netzhautbilder beurtheilen. Demgemäfs werden nach ihm im Allgemeinen kleine Entfernungen relativ gröfser gesehen als grofse ungetheilte, weil bei kleinen Bögen der Unterschied zwischen dem Bogen und der Sehne, welche die Distanz seiner Enden misst, relativ kleiner ist, als bei grofsen. Eben deshalb sollen kleine Winkel stets relativ zu grofs im Vergleich zu ihren gröfseren Nebenwinkeln gesehen werden. Auf dasselbe Princip hat auch A. KUNDT eine ausführlichere Theorie dieser Erscheinungen zu gründen <sup>572</sup> gesucht und Messungen in der schon oben erwähnten Weise ausgeführt, die sie stützen sollen,<sup>1</sup> indem er ungetheilte Linien nach dem Augenmaafs getheilten Linien gleich zu machen suchte. Für eine gewisse Länge der Linien stimmen auch Beobachtung und Berechnung ziemlich gut überein, aber bei kleineren Linien ist die Differenz fast doppelt so grofs, als sie nach dem aufgestellten Erklärungsprincip sein sollte. Herr KUNDT findet nämlich

Gesichtswinkel für die zu vergleichenden Distanzen	Fehler	
	beobachtet	berechnet
20° 14'	4,40	4,62
19° 41'	3,31	4,47 .
12° 47'	1,48	0,84

Ich muß hinzufügen, daß die Täuschungen auch bei viel kleineren Figuren bestehen bleiben, bis die Objecte sich der Grenze des deutlichen Sehens nähern, und daß bei so kleinen Objecten ein Unterschied zwischen dem Bogen und der Sehne nicht mehr merklich sein kann. KUNDT selbst hat gefunden, daß zum Beispiel seine *Fig. 4* bis auf 9 Fuß Entfernung die Täuschung zeigte, wobei zwischen den betreffenden Bögen und Winkeln selbst in der 5ten Decimale noch kein Unterschied vorhanden ist.

Ich halte deshalb das von HERING und KUNDT gebrauchte Erklärungsprincip nicht einmal für einen richtigen Ausdruck der Thatsachen. Wollte man es gar als Erklärung der wirklichen Ursache der Erscheinungen auffassen, so müfste man die Annahmen der nativistischen Theorie dahin ausdehnen, daß uns eine Kenntniß unserer Netzhaut, und zwar nicht nur der räumlichen Anordnung der empfindenden Punkte auf ihr, sondern sogar ihrer Krümmung angeboren sei.

Zu erwähnen ist endlich noch, daß in einer Reihe von Fällen die binoculare Körperanschauung störend auf die Vergleichung der Distanzen im Gesichtsfelde einwirkt. Es macht sich hierbei geltend, daß unser natürliches Sehen Sehen von Körpern ist, und daß alle unsere Uebung darauf abzweckt, die Dimensionen und Lagen der gesehenen Körper richtig zu beurtheilen.

<sup>1</sup> A. KUNDT, *Poggendorff's Annalen*, 1863, CXX, 113—158.

Ich kann mit großer Sicherheit erkennen, ob mein Zeigefinger dicker oder dünner ist, als eine an dem entgegengesetzten Ende des Zimmers befindliche Gasröhre, obgleich ein kolossaler Unterschied in der scheinbaren Grösse beider Körper vorhanden ist. Dagegen bin ich sehr unsicher, ob mein Zeigefinger, wenn ich ihn in einer bestimmten Entfernung vom Auge halte, dieselbe scheinbare Grösse hat, wie ein an der anderen Seite des Zimmers befindliches Buch, oder etwa wie der Mond, vorausgesetzt, daß ich die zu vergleichenden Objecte nicht im Gesichtsfelde nahe an einander bringe. Ich finde vielmehr, daß ich eine sehr starke Neigung habe, den Gesichtswinkel, unter dem der Finger erscheint, für viel kleiner als den des Buches oder des Mondes zu halten, bis ich beide ganz nahe zusammenbringe oder sich im Gesichtsfelde decken lasse.

Damit scheint es mir auch zusammenzuhängen, daß wir, wie die Versuche 573 von KUNDT zeigen, wenn wir eine horizontale Linie zu halbiren suchen, für das rechte Auge deren rechte Hälfte, für das linke Auge die linke zu groß zu machen pflegen. Bei einer Linie von 100 Millimeter Länge, aus 226 Millimeter Entfernung gesehen, verlegte das linke Auge die Mitte im Durchschnitt von 40 Beobachtungen auf 50,33 Millimeter vom linken Ende entfernt, das rechte Auge nur 49,845 von demselben entfernt. Diese Abweichungen der scheinbaren von der wahren Mitte, 0,33 und 0,155 Millim. betragend, sind übrigens viel kleiner als die Abweichungen der einzelnen Beobachtungen vom Mittel, deren mittlerer Fehler 0,50 und 0,66 betrug, so daß eben nur in einer großen Zahl von Versuchen die genannte Abweichung sichtbar wird.

Diese Abweichung kann, wie mir scheint, dadurch veranlaßt sein, daß wir beim binocularen Betrachten einer halbirtten Linie diese symmetrisch zum Kopfe vor die Mitte des Gesichts zu halten pflegen, und wir deshalb gewöhnt sind, die rechte Hälfte mit dem rechten Auge größer zu sehen, die linke mit dem linken.

Zum Schluß der Beschreibung des Sehfeldes ist noch über seine Grenzen und Lücken zu reden. Seine Ausdehnung umfaßt alle Punkte des uns umgebenden Raums, von denen durch die Pupille noch Licht eindringen und noch auf empfindende Theile der Netzhaut fallen kann. Ausgeschlossen vom Sehfeld sind diejenigen Theile des Raums, namentlich also die hinter uns liegenden, von denen niemals Licht auf dem normalen Wege unsere Netzhaut erreichen kann. Die Fläche unseres Sehfeldes entspricht also dem nach außen projecirten Bilde unserer Netzhaut und die Grenze des Sehfeldes der Grenze der Netzhaut. Wir sind uns dieser Begrenzung bewußt, wir wissen, daß wir von den hinter uns liegenden Objecten durch das Gesicht nichts wahrnehmen, und können bei einiger Aufmerksamkeit auf das Feld des indirecten Sehens angeben, welche Gegenstände an dem Rande des Sehfeldes noch erscheinen, welche nicht, so weit die große Undeutlichkeit des Sehens mit den äußersten Theilen der Netzhaut dies eben erlaubt. Dabei ist zu bemerken, daß in der Empfindung ein wesentlicher Unterschied

n dem Theile des (verlängert gedachten) Sehfeldes, der überhaupt gesehen werden kann, und dem sichtbaren Theile desselben, wenn Lichtmangels zeitweilig nicht gesehen wird. Bei Abschluß alles Lichtes haben wir ein bestimmt begrenztes dunkles Feld vor unsern Augen. Wir sind uns aber wohl bewußt, daß wir dabei den hinter uns liegenden Raum nicht dunkel sehen, sondern daß wir ihn gar nicht sehen. Die Empfindung des Dunkels ist die Empfindung des Ruhezustandes oder, anders gesagt, der Mangel von Empfindung in Theilen unseres Sehorgans, die erregt werden könnten, wenn ein Reiz auf sie wirkte. Ihr Vorhandensein in der Wahrnehmung die Vorstellung vor uns gelegener Theile des Raumes, welche unserem Auge kein Licht zusenden, was also eine negative Aussage über den objectiven Zustand dieser Theile des Raums enthält. Den nicht sichtbaren Theilen des Raums fehlen aber auch kein empfindendes Organ, welches den Zustand seiner Theile bemerken und unterscheiden könnte. In der Wahrnehmung haben wir also gar nichts ausgesagt, als daß wir nichts über sie wissen, weder ob sie hell, noch ob sie dunkel seien. Beides ist wohl zu unter-

sucht es aber auch innerhalb der äußeren Begrenzungslinie unseres Sehfeldes eine Lücke, entsprechend der für Licht unempfindlichen Eintrittsstelle des Sehorgans, wo wir nichts sehen. Die Lage und Ausdehnung dieser Lücke ist im Anfange von § 18 bestimmt worden; dort wurde auch ausgesagt, daß sie wirklich unempfindlich für Licht sei. Wir haben jetzt zu untersuchen, wie uns die entsprechende Stelle des Sehfeldes erscheint. Im gewöhnlichen Fall ist, daß wir gar nicht im Stande sind zu bemerken, daß eine Lücke im Sehfelde sei, oder unsere Aufmerksamkeit auf das, was dort zu geschehen scheint, zu lenken. Dies ist nicht nur der Fall, wenn wir die Anschauung der Objecte, welche in die Lücke fallen, ergänzt wird durch Wahrnehmungen des anderen offenen Auges, oder falls dies nicht der Fall ist, ergänzt wird durch Bewegungen des einen geöffneten Auges, sondern auch, wenn die Lücke ihren Platz im Gesichtsfelde stets wechselt und daher, was wir in dem einen Augenblicke nicht gesehen wird, im andern Augenblicke sehen können. Wir bemerken vielmehr auch bei festgeheftetem Auge die Lücke nicht, wenn der der Lücke benachbarte Theil des Sehfeldes hell und gleichmäßig erhellt und gefärbt darstellt; es erscheint uns dann, als ob dieser ganze Theil des Feldes ohne Unterbrechung von der Umgebung ausgefüllt wäre. Was für nicht gesehene Objecte sich dabei in der Lücke des Sehfeldes wirklich befinden, ist natürlich ganz gleichgültig. Wir bemerken eben, wie schon oben gezeigt worden ist. Es ist dabei nur, daß wir überhaupt das indirecte Sehen gewöhnlich nicht benutzen, sondern uns über die Form, Größe und Ordnung der in ihm gesehenen Objecte nur eine rohe Auskunft zu verschaffen, sondern daß es hauptsächlich nur dazu dient, eine rohe Skizze von der Umgebung des fixirten Punktes, auf die unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist, zu geben und um unsere Auf-

merksamkeit jeder etwa neu auftretenden oder ungewöhnlichen Erscheinung, die im seitlichen Theile des Sehfeldes zum Vorschein kommt, sogleich zuzulenken. Ein Theil des Sehfeldes nun, der wie der blinde Fleck niemals irgend welche, also auch keine auffallende Erscheinung darbieten kann, wird daher unter gewöhnlichen Umständen niemals Gegenstand der Aufmerksamkeit. Ja ich habe gebildete und unterrichtete Leute, selbst Aerzte, gekannt, denen es nicht gelang, sich von dem Verschwinden kleiner Objecte an dieser Stelle zu überzeugen. Wenn wir dann durch physiologisch optische Versuche uns üben, Gegenstände im indirecten Sehen zu erkennen, so sind es doch zunächst nur gröfsere durch Helligkeit oder Färbung oder Bewegung von ihrer Umgebung absteckende Gegenstände, auf die wir unsere Aufmerksamkeit, ohne den Fixationspunkt zu ändern, lenken und deren Ordnung wir erkennen können. Aber unsere Aufmerksamkeit einer bestimmten, durch gar keinen sinnlichen Eindruck ausgezeichneten Stelle, wie es die Lücke des Sehfeldes ist, wenn sie auf gleichmäfsig gefärbten Grund fällt, im indirecten Sehen zuzuwenden, vermögen wir nicht.

Ich mufs hierbei jedoch bemerken, dafs ich in der letzten Zeit angefangen habe, beim Aufschlagen eines Auges gegen eine ausgedehnte weisse Fläche und bei kleinen Bewegungen des Auges oder bei eintretender  
575 Accommodationsspannung den blinden Fleck als einen schattigen Fleck zu sehen, so dafs, wenn ich mit der Spitze des Zeigefingers darauf hinweise, mir die Fingerspitze verschwindet. Es ist dies eine subjective Erscheinung, welche mit den auf Seite 239 beschriebenen Erscheinungen zusammenhängt, und bald wieder schwindet, wenn man das Auge unbewegt geöffnet hält. Das ist also nur eine scheinbare, nicht eine wirkliche Ausnahme von dem Gesagten, denn dabei ist das Sehfeld subjectiv nicht einförmig erregt, sondern die Nachbarschaft des blinden Flecks durch besondere Erscheinungen ausgezeichnet, welche die Aufmerksamkeit auf diese Stelle zu fixiren im Stande sind. Dazwischen kommt es doch immer wieder vor, dafs ich ein helles Feld ansehe, ohne im Geringsten im Stande zu sein, ohne vorgängigen Versuch zu sagen, wo der blinde Fleck im Sehfelde liegt.





Fig. 226.

Anders verhält es sich, wenigstens für einen im indirecten Sehen etwas geübten Beobachter, wenn man Merkzeichen im Sehfelde anbringt, welche die Aufmerksamkeit gerade auf die Lücke hinzuleiten im Stande sind. Dazu kann man zum Beispiel sehr zweckmäfsig ein Kreuz brauchen, dessen verticaler Schenkel durch Farbe oder Helligkeit deutlich von dem

gleichen. Wenn nun die scheinbare Vergrößerung eines spitzen Winkels so geschieht, daß seine beiden Schenkel scheinbar nach außen rücken, so müssen die Täuschungen in den *Fig. 219*, *221* und *222* eintreten. In *Fig. 219* würden sich die dünnen Linien dabei scheinbar um den Punkt drehen, wo sie in den dicken Streifen eintreten und dann nicht mehr in gegenseitiger Verlängerung liegen. In *Fig. 221* werden die beiden Hälften jeder der beiden geraden Linien immer scheinbar so gestellt, daß sich die spitzen Winkel, die sie mit den schrägen Linien machen, vergrößern. Dasselbe geschieht scheinbar mit den Verticalstreifen der *Fig. 222*.

*Fig. 222.*

Indessen ist in den Fällen von *Fig. 221* und *222* die angegebene Ursache unter gewöhnlichen Verhältnissen nur an einem kleinen Theile der Wirkung Schuld; und der grössere Theil der Wirkung hängt, wie ich gefunden habe, von Bewegungen der Augen ab. Die genannten Täuschungen schwinden nämlich ganz, oder bleiben nur in schwachen Resten bestehen, wenn ich einen Punkt der Zeichnungen so fixire, wie es nöthig sein würde, um ein Nachbild zu entwickeln, und wenn es gelingt, ein scharf gezeichnetes Nachbild zu erhalten, was namentlich für das ZOELLNERSche Muster *Fig. 222* möglich ist, so ist in dem Nachbilde keine Spur der Täuschung mehr zu erkennen.

In *Fig. 219* hat Bewegung des Blicks keinen deutlichen Einfluß auf Verstärkung der Täuschung, im Gegentheile verschwindet diese, wenn ich der dünnen Linie *a d* mit dem Blicke folge. Dagegen verschwindet die Täuschung umgekehrt durch Fixation verhältnismäßig leicht bei *Fig. 221*, schwerer bei *Fig. 222*. Doch kann ich sie auch bei dieser letztern Figur beseitigen, wenn ich fest fixire und nicht die schwarzen Streifen als Objecte, die auf weißem Grunde liegen, betrachte, sondern die weißen Streifen gleichsam als Zweige mit Fliederblättchen, die auf schwarzem Grunde liegen, aufzufassen suche. Sobald mir dies gelingt, sehe ich alles richtig. So wie ich dann aber anfangs, den Blick über die Zeichnungen hin zu bewegen, ist die Täuschung in voller Stärke wieder da.

Auch gelingt es bei diesen Figuren die Täuschung ganz oder fast ganz zu vermeiden, wenn man sie zuerst mit einem undurchsichtigen Papiere bedeckt, über dieses eine Nadelspitze als Fixationspunkt unbeweglich hinhält, und während man diese ganz scharf und sicher fixirt, das bedeckende Papier zwischen ihr und der Zeichnung fortzieht. Ob man gut fixirt hat, kann man nach der Schärfe des dabei ausgebildeten Nachbildes beurtheilen. 567

schwarzen Blattes an der Schläfenseite des blinden Flecks eintritt, weil hier das indirecte Sehen schon viel unvollkommener ist. Wunderlich ist dabei, aber charakteristisch für das Wesen der Erscheinung, daß ich nirgends eine Lücke zwischen dem weißen und schwarzen Felde sehe, obgleich ich erkenne, daß ich an einer Stelle die Begrenzungslinie nicht sehen kann, daß sich zwischen das Schwarze und Weiße nichts einschiebt, und ich doch nicht angeben kann, wo und wie geformt die Grenze sei. Auch kann ich nicht sagen, daß Weiß und Schwarz dort verwaschen in einander übergangen, denn das Grau dieses Uebergangs wäre wieder etwas bestimmt Wahrnehmbares. Ich kann es nur vergleichen mit dem Eindruck, den man hat, wenn man im halben Dunkel lichtschwache Objecte zu fixiren und zu erkennen sucht und dann durch die Nachbilder einzelne Theile der Zeichnung ausgelöscht werden.

Sehr viel leichter, als bei einer geraden Linie, erkenne ich die Lücke, wenn sie auf einen Theil einer Kreislinie oder auf die Peripherie einer Kreisfläche fällt; dabei kann ich auch ziemlich gut angeben, wieviel von dem Kreise fehlt.

Habe ich im Gesichtsfelde vor mir eine große Zahl verschiedenartiger kleiner Objecte, so bin ich im Stande, die Stelle des blinden Flecks sogleich zu erkennen an einer gewissen Unklarheit und Undeutlichkeit, wodurch sie 577 sich unterscheidet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ich nach einem Gebüsch, einer gemusterten Tapete, einem mit Buchstaben bedruckten Blatte hinsehe.

Dem entsprechend muß ich behaupten, daß überhaupt keinerlei Empfindung dem blinden Flecke entspricht, und daß namentlich auch nicht etwa irgend welche Empfindungen aus der Nachbarschaft sich auf die Lücke des Sehfeldes übertragen, sondern bei genauer Beobachtung und bei Anwendung der nöthigen Hilfe, um die Aufmerksamkeit auf den blinden Fleck hinzulenken, kann man sich überzeugen, daß dort die Empfindung fehlt. Man sieht in der Lücke des Sehfeldes weder irgend etwas Helles oder Farbiges oder Dunkles, man sieht hier im strengen Sinne des Wortes Nichts, und dieses Nichts kann sich nicht einmal als Lücke und Grenze des Sichtbaren geltend machen; denn wenn die Lücke des sichtbaren Sehfeldes selbst sichtbar sein sollte, so müßte sie in irgend einer Qualität des Sichtbaren erscheinen, was sie nicht thut. Nur negativ können wir ihr Vorhandensein ermitteln dadurch, daß wir beobachten, welches die letzten Objecte sind, die wir noch sehen. Wenn wir dann ermitteln, daß diese im Raume nicht aneinanderstoßen, so kommen wir zur Anerkennung der Lücke und ihrer räumlichen Lage und Größe. Da nun aber hierzu Localisirung der Gesichtseindrücke nöthig ist, und diese nach unserer Auffassung erst durch Erfahrung erworben wird, so beruht dieses Auffinden der Lücke in der That auf einem Urtheil; sie wird nicht unmittelbar empfunden.

Mit der größeren Lücke des Gesichtsfeldes hinter unserem Rücken verhält es sich übrigens ganz ähnlich, nur daß uns ihre Anwesenheit besser



t, als die des blinden Flecks, weil wir zu ihrer Ausfüllung zu t sinnliche Hilfsmittel gehabt haben, während die Lücke des blinden : gewöhnlich durch die Wahrnehmungen des andern Auges und Bewegungen des Blicks genügend ausgefüllt und daher nicht als albar wird. Auch die Grenze des Sehfeldes können wir nur negativ , indem wir im indirecten Sehen aufsuchen, welche Objecte noch ind, welche nicht. Wenn wir dagegen einen einförmigen Grund zum Beispiel das Auge nach dem innern Augenwinkel drehen urchscheinendes beleuchtetes Blatt Papier vorhalten, wobei dann äußern Augenwinkel hin nichts von den Theilen unseres Gesichts bar wird, sondern allein die weiße Fläche: dann ist es absolut zu sagen, wo diese helle Fläche aufhört und wo das Nichtsehen Väre dagegen dort irgend ein dunkler oder farbiger Fleck auf ; so würden wir sogleich die Richtung bestimmen können, in dem sehen. Auch hier also kann sich das nicht Sichtbare nicht als Sichtbaren geltend machen und von ihm abheben.

verhält es sich nun, wenn wir in Folge unserer Empfindungen lungen von den Objecten bilden. Der objective Raum und die ltenen Objecte können kein Loch haben entsprechend der Lücke feldes. Wir befinden uns dann im Wesentlichen in der Lage von der ein beflecktes oder durchlöchertes Gemälde betrachtet und eine Anschauung von dem zu bilden sucht, was der Maler hat vollen. Wenn hierbei ein Fleck auf irgend einen der unter- Theile des Gemäldes fällt und die Ergänzung selbstverständlich ist, 578

Betrachtende den Fleck vielleicht kaum beachten, oder wenig- der Vorstellung der Objecte durch ihn gar nicht gehindert werden r Beziehung den Fleck als nicht vorhanden betrachten können. Fleck also auf eine einförmig gefärbte Fläche oder auf eine gemusterte Fläche fallen, so wird der Beschauer ohne Weiteres ke in seiner Vorstellung mit der Farbe des Grundes ausfüllen, nn ganz besondere Gründe haben zu vermuthen, daß dort die r das Muster ursprünglich abweichend gewesen sei. Und ebenso Ergänzung ohne alles Zögern und Schwanken machen, wenn der kleinen Theil einer geradlinigen Kante oder einer Kreisperipherie rst wenn der Fleck auf wichtige Punkte des Gemäldes oder

Bedeutung nicht so ganz selbstverständlich ist, fällt, wird er samkeit des Beschauers anziehen und ihn in der Vollendung uungsbildes von den dargestellten Gegenständen stören.

Vergleich kann das Verhältniß ungefähr klar machen; nament- sich denkt, daß der Fleck bei einem reichen und interessanten seitlich gelegene und ganz unwichtige Nebensachen des t und nicht durch seine Farbe oder Helligkeit im Stande ist, amkeit des Beobachters anzuziehen. Dann wird er möglicher unentdeckt bleiben, wie die Lücke im Sehfelde es gewöhnlich

ist. Der Vergleich hinkt nur insofern, als der Fleck auf dem Gemälde etwas Sichtbares ist, auf welches die Aufmerksamkeit vollkommen leicht gefesselt werden kann, wenn sie einmal darauf hingelenkt war, während die Lücke des Gesichtsfeldes nicht die Qualität von etwas Sichtbarem hat und es ganz gegen unsere Gewöhnung und Uebung ist, die Aufmerksamkeit im Felde des indirecten Sehens anders als auf einzelne positiv auffallende Phänomene zu richten. In beiden Fällen bilden wir uns aus den vorhandenen positiven Momenten der Empfindung unsere Vorstellung von den Objecten aus, so gut es eben geht; nur daß wir bei der Lücke des Sehfeldes sehr viel schwerer auf den Mangel des Anschauungsmaterials aufmerksam werden, als bei dem Fleck des Gemäldes. VOLKMANN sagt daher in dieser Beziehung mit Recht, daß man die Lücke im Sehfelde durch einen Act der Einbildungskraft ausfüllt; nur muß man hinzufügen, daß diesem Acte der Einbildungskraft nicht die volle Evidenz der sinnlichen Anschauung zukommt, wenn auch in diesem Falle allerdings schwerer als in anderen ähnlichen Fällen zu ermitteln ist, daß ein Mangel des sinnlichen Materials stattfindet. Eines der hübschesten Beispiele, was VOLKMANN für diese Ergänzung durch die Einbildungskraft anführt, ist, daß wenn man die Lücke auf die bedruckte Seite eines Buches fallen läßt, man sie mit Druckschrift ausgefüllt zu sehen glaubt, welche man freilich nicht lesen kann. Aber allerdings ist diese Ausfüllung nur so lange scheinbar vorhanden, bis man sich durch genauere Aufmerksamkeit überzeugt, daß man an der betreffenden Stelle gar nichts wahrnimmt. Die Thätigkeit der Einbildungskraft geht also keineswegs so weit, daß dadurch die fehlende sinnliche Empfindung ersetzt und vorgespiegelt würde.

Es ist nun noch zu untersuchen, wie die räumlichen Abmessungen durch das Augenmaas für die Punkte nahe der Lücke ausfallen. In dieser Beziehung 379 fallen die Aussagen verschiedener Beobachter sehr verschieden aus. Einige, wie namentlich v. WITTICH, sehen die der Lücke nächstgelegenen Objecte gegen die Lücke hingezogen und diese dadurch ausgefüllt, Andere, wie E. H. WEBER, VOLKMANN, ich selbst, sehen die umgebenden Theile in ihrer richtigen Lagerung, abgesehen von den Verziehungen, welche die seitlichen Theile des Gesichtsfeldes überhaupt erleiden. Bei wieder Anderen, wie bei FUNCKE, wechselt es, so daß sie unter etwas veränderten Umständen bald das eine sehen, bald das andere.

Die Unterschiede zeigen sich namentlich deutlich bei folgendem von VOLKMANN erfundenen Versuche: Man setze neun Buchstaben, so wie *A* bis *I* in Fig. 227, und fixire mit dem rechten Auge aus einem Abstände von 20 Centimeter das Kreuzchen bei *k*, so wird *E* in die Lücke fallen. Die Gröfse der Lücke ist für mein Auge unter diesen Umständen durch den gestrichelten Kreis angegeben, in dessen Mitte *E* steht. Dadurch, daß man eine kleine rothe Oblate auf *E* legt und diese nach allen Seiten hin so weit vorschiebt, daß sie eben anfängt sichtbar zu werden, kann man controlliren, wie groß die Lücke ist und ob auch keiner der anderen Buchstaben dadurch

Wenn wir uns nähern, dabei eine verticale Bewegung zeigt nach aufwärts, so ist dies eine ähnliche Erscheinung, als wir haben würden, wenn wir uns nicht in senkrechter Richtung näherten, sondern unter einem spitzen Winkel, dessen Spitze nach abwärts sieht, und umgekehrt bei den abwärtssteigenden Streifen ist die Scheinbewegung dieselbe, als wenn wir uns ihnen näherten unter einem spitzen Winkel, dessen Spitze nach aufwärts sieht. Da nun aber die Richtung der wirklichen Bewegung unseres Blicks für alle Streifen dieselbe ist, so erscheinen uns umgekehrt die Streifen gegen die Bewegungslinie des Blicks geneigt, die aufsteigenden mit dem oberen Ende in der Richtung dieser Bewegung entgegen, die absteigenden ihr folgend, wie in *Fig. 225* angezeichnet ist, wo *a b* die Richtung bezeichnen soll, in der sich der Blick bewegt, *c c*, *d d*, *e e*, *f f* die scheinbare Lage der verticalen Streifen in übertriebener Divergenz, und die Pfeile neben diesen letzteren Linien die Richtung, in der sich so gestellte Linien scheinbar bewegen würden, wenn der Blick in Richtung der horizontalen Pfeile fortgleitet.




Fig. 225.

Macht man die Bewegung der Spitze, der das Auge folgt, allmählich langsamer, so wird auch die Scheinbewegung langsamer, wird leichter übersehen, kann aber bei einiger Aufmerksamkeit erkannt werden, und gleichzeitig finde ich, daß die scheinbare Divergenz der verticalen Streifen sich weniger bestimmt zeigt. Ohne Hilfe einer leitenden Spitze kommt weder die Scheinbewegung der Streifen noch ihre scheinbare Divergenz so schön zum Vorschein, wie mit einer solchen, wahrscheinlich weil wir unseren Blick über eine Zeichnung mit so hervortretenden Liniensystemen nicht so gleichmäßig und so geradlinig hingleiten lassen können. Da übrigens die Täuschung über die Richtung der Streifen mit der über ihre Bewegung gleichzeitig wächst und fällt, so zweifle ich nicht, daß auch die Verstärkung der Täuschung bei den gewöhnlichen Bewegungen des Blicks dieselbe Ursache habe.

Führt man die fixirte Nadelspitze parallel den verticalen Streifen über die Zeichnung, so wird die Täuschung nicht nur nicht verstärkt, sondern sogar geschwächt oder ganz beseitigt. Die verticalen Streifen zeigen sich dann als parallele Richtlinien im Blickfelde dadurch, daß ihre Netzhautbilder sich in sich selbst verschieben.

Der hier beschriebene Einfluß der Scheinbewegung der verticalen Streifen auf die scheinbare GröÙe des Winkels zwischen ihnen und der Bewegungsrichtung des Blicks läßt sich übrigens ganz ebenso an einem wirklich bewegten Körper zeigen. Man lege einen mit Theilstrichen versehenen Maafsstab in horizontaler Richtung auf ein Blatt Papier, setze dicht

Punkte, die auf verschiedenen Seiten des Fixationspunktes sich befinden, von ihm gleich weit abstehen oder nicht, können wir nicht mit derselben Genauigkeit entscheiden, als wenn beide auf derselben Seite und nahe aneinander liegen und zwischen ihnen noch ein weißer Fleck des Grundes sichtbar ist, dann ist es nicht zweifelhaft, welcher dem Fixationspunkt näher ist, welcher ferner.

Nun stimmen in den übrigen Theilen des Sehfeldes beiderlei Bestimmungsweisen nothwendig überein; in der Gegend des blinden Flecks dagegen fehlen die Eindrücke, welche wir zwischen denen des Randes der Lücke erwarten sollten und welche das sinnliche Zeichen ihrer räumlichen Trennung sein sollten. Andererseits können wir mittels der Bewegungen des Auges doch richtige Erfahrungen über die wirkliche Lage der Randpunkte der Lücke machen und sie als getrennt erkennen. Daher ist es möglich, daß verschiedene Beobachter, die bald mehr auf dieses, bald mehr auf jenes Moment zu achten gewohnt sind, verschieden urtheilen, und daß selbst bei einem und demselben Beobachter nebensächliche Verhältnisse für das eine oder andere den Ausschlag geben.

Ich habe früher bemerkt, daß im Allgemeinen die Lücke eines jeden Auges beim gewöhnlichen zweiäugigen Sehen ausgefüllt wird durch das, was das andere Auge an jener Stelle des Sehfeldes wahrnimmt. Diese Regel erleidet aber, wie VOLKMANN gezeigt hat, ebenfalls Ausnahmen. Bezeichnen wir den blinden Fleck des einen Auges mit  $a$ , die entsprechende Stelle des andern Auges mit  $\alpha$ , die Umgebung von  $a$  mit  $b$ , die von  $\alpha$  mit  $\beta$ , die den beiden Stellen  $a$  und  $\alpha$  entsprechende Stelle im Gesichtsfelde mit  $A$ , ihre Umgebung mit  $B$ , so lassen sich leicht folgende Versuche machen:

1. Wir sehen mit dem ersten Auge auf weißes Papier und schliessen das andere Auge, so empfinden wir
 

auf $a$ : Nichts,	auf $b$ : Weiß
auf $\alpha$ : Dunkel,	auf $\beta$ : Dunkel

 und meinen zu sehen
 

auf $A$ : Weiß,	auf $B$ : Weiß.
-----------------	-----------------
- 581 2. Wir sehen mit beiden Augen auf weißes Papier, halten aber vor das zweite ein blaues Glas; wir empfinden also
 

auf $a$ : Nichts,	auf $b$ : Weiß
auf $\alpha$ : Blau,	auf $\beta$ : Blau

 und meinen zu sehen
 

auf $A$ : Blauweiß,	auf $B$ : Blauweiß.
---------------------	---------------------
3. Aehnlich fällt der Versuch aus, wenn wir mit beiden Augen durch verschiedenfarbige Gläser sehen, wobei ein ungleichförmiges und wechselndes Gemisch beider Farben im Sehfelde erscheint; auch dann zeichnet sich  $A$  von dem Rest des Feldes in keiner Weise aus.

In den bisherigen Fällen, wo die Stelle  $\alpha$  ebenso beleuchtet war, wie  $\beta$ , glaubten wir die Lücke in der Farbe des Grundes zu sehen, wobei dann das sonderbare Resultat eintritt, daß die Stelle  $A$  des Sehfeldes, die in dem

ge gar keine Empfindung, im andern die von Schwarz oder Blau, uns weiß oder blauweiß erscheint.

blicken wir nach einem schwarzen Blatte, auf dem ein weißer is liegt, der der Lücke  $a$  entspricht. Wir empfinden

auf  $a$ : Nichts, auf  $b$ : Schwarz  
auf  $\alpha$ : Weiß, auf  $\beta$ : Schwarz.

sehen

auf  $A$ : Weiß, auf  $B$ : Schwarz.

ten wir vor das zweite Auge ein blaues Glas, so tritt hierbei statt fs natürlich überall Blau ein.

blicken nach einem weißen Felde, auf dem sich ein schwarzer k, der Lücke  $a$  entsprechend, befindet. Wir empfinden

auf  $a$ : Nichts, auf  $b$ : Weiß  
auf  $\alpha$ : Schwarz, auf  $\beta$ : Weiß

sehen

auf  $A$ : Schwarz, auf  $B$ : Weiß.

dem wir die Fixation des vorigen Versuchs eine Weile unverändert halten haben, blicken wir auf einen andern Punkt der weißen ie, dann erscheint ein helleres weißes Nachbild des schwarzen ts, welches ebenfalls dem Orte der Lücke entspricht. Also auch schwache Unterschied zwischen dem etwas helleren Weiß des bildes und dem etwas matteren des Grundes genügt, den Gesicht-uck der Lücke zu bestimmen. Dadurch können nun auch schein-  
Widersprüche mit Versuch 3 eintreten.

Bedingungen des vorigen Versuchs werden dahin abgeändert, dafs or das Auge  $ab$  ein grünes Glas, vor  $\alpha\beta$  ein rothes setze und so fixire, dafs der schwarze Fleck der Lücke  $a$  entspricht, dann ich den Fleck schwarzgrün, fast als ob ich ihn durch das grüne mit der Lücke  $a$  sähe. In Wahrheit aber ist das eine Contrast-  
im andern Auge auf  $\alpha$  gegen den rothen Grund  $\beta$ . Wenn ich kleine Weile fixirt habe und dann eine andere Stelle des Papiers so sehe ich die Stelle  $A$  des Gesichtsfeldes rein roth, scheinbar m Auge  $\alpha\beta$  allein. Aber in diesem Falle ist es hier das heller 582  
Nachbild des vorhergesehenen Schwarz, wodurch sich  $\alpha$  vor  $\beta$  ehnet und daher den Eindruck bestimmt.

sen letzteren Versuchen scheint also hervorzugehen, dafs der f  $\alpha$  das Gesamtbild wenigstens dann bestimmt, wenn  $\alpha$  von  $\beta$  keit und Farbe deutlich unterschieden ist. Doch ist auch in n  $\alpha$  nicht allein bestimmend.

icke nach einem hellgrauen Papier, auf dem eine weiße Oblate ler Lücke  $a$  entsprechend; vor das geschlossene Auge  $\alpha\beta$  bringe rothes Glas und öffne es dann. Nun habe ich in der Empfindung

auf  $a$ : Nichts, auf  $b$ : Grau  
auf  $\alpha$ : Roth, auf  $\beta$ : Mattes Roth.

Ich meine zu sehen:

auf  $A$ : Rothweiß      auf  $B$ : Grauroth.

Das Roth auf  $\alpha$ , wenn das Auge  $a b$  geschlossen ist, ist entschieden gesättigter, als es in  $A$  ist, wenn  $a b$  geöffnet ist, trotzdem  $a$  keinen Eindruck empfängt. Das Entsprechende sieht man auch bei Anwendung andersfarbiger Gläser. Der Unterschied wurde noch deutlicher, wenn ich nahe neben die weiße Oblate eine rothe legte, die durch das rothe Glas gesehen ebenso aussah, wie die weiße. Die rothe Oblate muß aber, bis das Auge hinter dem rothen Glase geöffnet wird, verdeckt werden durch einen dem Grunde gleichfarbigen Schirm, damit sie kein Nachbild entwickelt, welches ihr Roth abschwächt und grau macht, wenn es zur Vergleichung kommt.

In diesem letzteren Falle ist es unverkennbar der Einfluß des grauen Grundes in  $b$ , der uns  $a$  weißlich sehen läßt. Es lassen sich alle diese Erscheinungen auf das Gesetz zurückführen, daß wir mit beiden Augen die der Lücke entsprechende Stelle  $A$  des Sehfeldes um so viel heller oder dunkler als den Grund  $B$  zu sehen glauben, wie wir in dem anderen Auge ( $\alpha$  und  $\beta$ ) sie wirklich heller oder dunkler sehen. Die gemeinsame Färbung des Sehfeldes  $\alpha$  und  $\beta$  wird nicht übertragen auf die Lücke des andern Auges, wohl aber die Differenz zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  auch als für  $a$  und  $b$  bestehend angeschaut. Aehnliche Verhältnisse werden wir unten in der Lehre vom binocularen Contraste wiederfinden.

Einigen Anstofs haben diejenigen subjektiven Erscheinungen erregt, welche gerade an der Eintrittsstelle des Sehnerven auftreten, wie die Lichtgarben bei schneller Bewegung des Auges und die hellen oder dunklen Kreisflächen bei elektrischer Durchströmung. Zu erklären sind sie nur, wenn man annimmt, daß dabei die den Sehnerven unmittelbar umgebenden Netzhauttheile betroffen sind. Bei der elektrischen Durchströmung erklärt sich dies auch wohl einfach dadurch, daß die hinter der Sclerotica liegende schlecht leitende, sehnige Masse des Sehnerven die elektrische Durchströmung der unmittelbar davor liegenden Netzhauttheile erschwert und diese deshalb gegen das übrige Gesichtsfeld contrastiren. Aufsteigender Strom, der das Gesichtsfeld licht macht, läßt den schlecht leitenden Sehnerveneintritt dunkel erscheinen, absteigender, der das Feld dunkel und röthlichgelb macht, dagegen licht und blau.

583 Für die leuchtenden Garben bei schneller Bewegung des Auges kann man den Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung nicht führen, wohl aber für die entsprechenden dunklen Flecke, welche man sieht, wenn man die Augen stark seitwärts und gegen ein gleichmäßig erleuchtetes Feld wendet. Hat man die Augen nach links gewendet, so sieht man mit dem rechten Auge einen dunklen Fleck nach rechts hin im Gesichtsfelde, dessen rechter Rand sehr gut begrenzt ist, der linke, gegen die Mitte des Gesichtsfeldes gekehrte dagegen sehr unbestimmt. Hier ist auch die Lücke des Gesichts-

denn wenn man eine Bleistiftspitze vor dieses innere Ende des Flecks schiebt, verschwindet sie; nicht aber in dem übrigen Theile den Flecks.

Man sieht man vor dem nach links gewendeten linken Auge den Fleck zwischen dem Fixationspunkte dieses Auges und dem blinden Ecken. Bei nach links gewendeten Augen wird also die Netzhaut

Augen an der linken Seite des Sehnerven (im Gesichtsfelde ist der Fleck nach rechts gewendet) unempfindlicher gemacht. Dies ist, wo der Nervenstamm gegen die Sclerotica hingebogen wird, wahrscheinlich etwas einbiegt und so die Netzhaut verzerrt. Für diese Flecke läßt sich also erweisen, daß sie nicht der eigentlichen Stelle des Sehnerven entsprechen, sondern daneben liegen. Die Erscheinungen im dunklen Felde werden hier wohl, ebenso wie bei Bildern, dieselbe Stelle einnehmen; auch meine ich bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit erkannt zu haben, daß die Spitze der Garbe bis zum Fixationspunkte hinreicht, wie der eine dunkle Fleck nach der andern sind die oben S. 239 gemachten Angaben über den Ort der Flecke zu verbessern.

Man sieht man nach zwei ungleich weit entfernten Punkten des Gesichtsfeldes, welche das Auge also auch nicht gleichzeitig vollkommen accommodirt, so sieht man wenigstens den einen derselben als Zerstreuungsbild. Der Punkt, welcher dieses Zerstreuungsbild bildet, wird abgegrenzt durch die Pupille, und es liegt derjenige Strahl in der Axe dieses Strahlenbündels durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen ist. Wenn also auf der Netzhautpunkt  $a$  die Mittelpunkte zweier Zerstreuungskreise ungleich weit voneinander zusammenfallen, oder ein punktförmiges Bild mit der Mitte des Bildes des zweiten Punktes, so müssen diejenigen beiden Strahlen beider Punkte, welche durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen sind, ganz parallel sein, oder derjenige Strahl, welcher durch beide Objectpunkte geht, muß durch den Mittelpunkt der Pupille gehen.

Der Mittelpunkt der Pupille befindet sich nun im Innern des optischen Systems vor ihm liegt die Hornhaut, hinter ihm die Krystalline. Die Strahlen werden durch eine Brechung, ehe sie zu diesem Punkte gelangen, und werden auch von ihrem Wege abgelenkt, nachdem sie ihn verlassen haben.

Die Strahlen, welche von dem wirklichen Mittelpunkte der Pupille ausgehen, werden durch die Hornhaut so gebrochen, daß sie nachher von dem Bilde des Mittelpunktes der Pupille, welches die Hornhaut entwirft, auszugehen scheinen werden. Umgekehrt werden die Strahlen, welche außerhalb des Auges gegen das Bild des Mittelpunktes der Pupille gehen, durch den Mittelpunkt der Pupille selbst hindurchgehen.

Der Punkt, welcher bei der Brechung der Strahlen in der Hornhaut vom Bilde der Pupille entworfen wird, ist also derjenige Punkt, welchen wir den Kreuzungspunkt der Visirlinien genannt haben. Wenn zwei leuchtende Punkte in einem Auge in einer durch diesen Punkt gehenden geraden Linie liegen, werden die Mittelpunkte ihrer Zerstreuungskreise auf der Netzhaut zusammen-

fallen. Das schematische Auge, welches auf S. 140 berechnet ist, habe ich auch den Kreuzungspunkt der Visirlinien von der Hornhaut in Millimetern



1. Abstand des Mittelpunkts der Pupille
2. Abstand des Kreuzungspunktes der Visirlinien von der Hornhaut
3. Abstand des Kreuzungspunktes von dem Mittelpunkt der Pupille

Fernsehend	Nahesehend
3,6 Millim.	3,2 Millim.
3,036 "	2,661 "
0,564 "	0,539 "

In anderer Weise bestimmt sich der Scheitelpunkt der Gesichtswinkel, wenn die Accommodation des Auges fortdauernd den beobachteten Objecten angepaßt wird, weil nämlich bei der veränderten Accommodation des Auges die Knotenpunkte selbst sich verrücken. Wir finden diesen Scheitelpunkt unter diesen Bedingungen in folgender Weise am einfachsten.

Setzen wir voraus, es sei der Punkt *A*, *Fig. 228*, der gesuchte Scheitelpunkt der Gesichtswinkel *DA* und *CA* zwei durch ihn gezogene gerade Linien, welche gleiche Winkel mit der optischen Axe *EA* machen, und mit ihr in einer Ebene liegen. Es wird verlangt, daß Objecte wie die beiden Pfeile, wenn ihre Endpunkte in den Linien *DA* und *CA* liegen, gleich große Netzhautbilder *FG* geben, wenn das Auge für die Endpunkte der betreffenden Objecte richtig accommodirt ist. Nun sei *B<sub>0</sub>* das Bild von




Fig. 228.

*A* im fernsehenden Auge, *B<sub>1</sub>* dasselbe im nahesehenden Auge. Wenn wir die Linien *DA* und *CA* als Strahlen betrachten, so werden diese so gebrochen werden, daß sie im Glaskörper von *B<sub>0</sub>* oder *B<sub>1</sub>* aus divergiren, um beziehlich nach *F* und *G* zu gehen.

Nun denke man sich im Punkte *A* ein kleines, zur Achse senkrechtes Object  $\alpha$ , und in *B<sub>0</sub>*, beziehlich *B<sub>1</sub>* dessen optische Bilder  $\beta_0$ , beziehlich  $\beta_1$ , so findet nach S. 71, Gleichung 7d), folgende Beziehung zwischen den Winkeln *DAC*, *FB<sub>0</sub>G*, *FB<sub>1</sub>G* und diesen Bildern statt

$$\begin{aligned} n_1 \cdot \alpha \cdot \tan \frac{DAC}{2} &= n_2 \cdot \beta_0 \cdot \tan \frac{FB_0 G}{2} \\ &= n_2 \cdot \beta_1 \cdot \tan \frac{FB_1 G}{2}, \end{aligned}$$

wo  $n_1$  und  $n_2$  die Brechungsverhältnisse von Luft- und Glaskörper sind. Da nun

$$\tan \frac{FB_0 G}{2} = \frac{FH}{HB_0}$$

$$\tan \frac{FB_1 G}{2} = \frac{FH}{HB_1},$$

585 so folgt

$$\beta_0 : \beta_1 = HB_0 : HB_1.$$

gesuchte Scheitelpunkt der Gesichtswinkel ist also durch die Eigenschaft bestimmt, daß wenn in ihm ein kleines, zur Axe senkrechtes (virtuelles) Object ein Bild bei den Veränderungen der Accommodation seinem Abstände von der Axe proportional wächst.

Man für die mittleren Werthe der optischen Constanten des fernsehenden Auges, welche auf S. 140 gegeben sind, die Lage dieses Punktes rechnet, so findet man seinen Abstand gleich 2,942 Millimeter von der Hornhaut, so daß er fast genau zusammenfällt mit dem vorher berechneten Scheitelpunkt der Visirlinien des fernsehenden Auges, dessen Abstand gleich 2,942 von der Hornhaut gefunden war. Bei den praktischen Anwendungen kann daher beide Punkte als zusammenfallend betrachten, besonders da so verschiedene, wie der hier gefundene, bei dem bisher erreichbaren Grade der Genauigkeit unserer Kenntniss der optischen Constanten des Auges nicht zu unterscheiden sind.

Die Größe der Gesichtswinkel des unbewegten Auges würde es danach nicht sehr verschieden machen, ob wir seine Accommodation den zu beobachtenden Objecten anpassen oder das Auge für unendliche Ferne einrichten.

ASTING<sup>1</sup> hat den Unterschied des Winkels, den zwei von zwei Objecten zum Knotenpunkte des Auges gezogene Linien bilden, von dem Winkel, den die von denselben Objectpunkten nach dem Drehpunkte des Auges gezogenen Linien bilden, die Parallaxe zwischen der scheinbaren und der wirklichen Lage der Objecte bei directem und indirectem Sehen genannt. Ich empfehle, diesen Namen so anzuwenden, daß als Spitze des ersten Winkels der Kreuzungspunkt der Visirlinien<sup>2</sup> gebraucht würde, weil zwei Punkte im indirecten Sehen gleiche Lagen haben, wenn sie in derselben Richtung liegen.

Die Parallaxe ist gleich Null, wenn die Objecte unendlich entfernt sind; endlich weit entfernte Objecte die Schenkel der beiden zu vergleichenden Winkel paarweise parallel werden. Ist nun das eine Object unendlich entfernt, so bezeichnet die genannte Parallaxe, um wie viel sich scheinbar das Object vor einem unendlich entfernten Hintergrunde verschiebt, wenn man es auf dasselbe hinrichtet.

In diesem verhältnißmäßig einfachsten Fall die Größe der genannten Parallaxe berechnen zu können mit den Ungenauigkeiten der Accommodation, sei  $o$  der Drehpunkt des Auges,  $oc = oe = \sigma$  die Entfernung des Scheitelpunktes der Visirer Richtung  $oa$  von der Drehpunkt,  $a$  sei ein entferntes Object,  $b$  sei ein näheres Object, so wird  $b$ , wenn man durch  $a$  sieht, in der Richtung  $ob$  erscheinen und die Richtung  $ob$  liegenden Objecte unendlich entfernt werden. Wenn die Richtung  $oa$  fixirt ist, so ist  $e$  der Kreuzungspunkt




Fig. 229.

ASTING, Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen 1845. S. 14—16.

<sup>2</sup> Die Visirlinien sind die vom Objecte nach dem Drehpunkte des Auges gezogenen Linien.

der Visirlinien in  $e$  liegen und  $b$  in der Richtung  $ef$  erscheinen. Der Winkel  $ebc = fbg = \varepsilon$  ist also die Parallaxe zwischen directem und indirectem Sehen. Bezeichnen wir den Abstand des Punktes  $b$  vom Punkte  $c$  mit  $\varrho$ , so ist

$$\text{tang } \varepsilon = \frac{eh}{hb} = \frac{\sigma \sin \alpha}{\varrho + \sigma (1 - \cos \alpha)}.$$

Der Durchmesser  $p$  des Zerstreuungskreises von  $b$  in einem für unendliche Ferne accommodirten Auge ist nach S. 126, Gleichung 1 b), wenn  $P$  der Durchmesser der durch die Krystalllinse gesehenen Pupille und  $H$  der Abstand des vorderen Brennpunktes vom Kreuzungspunkte der Visirlinien ist

$$p = \frac{P \cdot H}{\varrho}$$

und wenn  $\eta$  der Winkel ist, unter dem der Radius des Zerstreuungskreises auf dem unendlich entfernten Hintergrund entworfen erscheint,  $f$  aber der Abstand des Knotenpunktes der Hornhaut vom hintern Brennpunkte, so ist

$$\text{tang } \eta = \frac{p}{2f} = \frac{P \cdot H}{2\varrho \cdot f}$$

und wenn wir in dem Werthe von  $\text{tang } \varepsilon$  die Größe  $\sigma$  (10,5 Millimeter) gegen  $\varrho$  (die Entfernung des Objectes) vernachlässigen, so ist

$$\text{tang } \varepsilon = \frac{\sigma \sin \alpha}{\varrho}$$

und daher  $\eta > \varepsilon$ , so lange

$$\frac{PH}{2\sigma f} > \sin \alpha.$$

Es ist aber für das fernsehende Auge

$$\begin{aligned} H &= 15,869 \text{ Millimeter,} \\ f &= 15,007 \quad \text{,,} \\ \sigma &= 10,521 \quad \text{,,} \end{aligned}$$

$P$  kann schwanken zwischen etwa 3 und 6 Millimeter; dem ersten Werthe entspricht

$$\alpha < 8^\circ,40, \text{ dem zweiten } \alpha < 17^\circ,33.$$

So lange die Bewegung des Auges nicht größer ist, als diese Werthe des Winkels  $\alpha$ , so lange ist die Verschiebung beim Uebergang vom indirecten zum directen Sehen nicht größer als der Radius des Zerstreuungskreises, unter dem der nähere Punkt erscheint.

Wenn man dabei berücksichtigt, wie außerordentlich undeutlich das indirecte Sehen in  $8^\circ$  Entfernung vom Blickpunkte ist, so wird dadurch begreiflich, daß wir nur ausnahmsweise, wenn irgend ein sehr heller Punkt hinter dem Rande eines dunklen Schirms auftaucht, die Veränderung des Bildes, welche von den Bewegungen des Auges abhängt, bemerken.

asse hier noch zwei wichtige Actenstücke für die Lehre von dem s der Gesichterscheinungen folgen, welche die Beobachtungen von 7 und WARDROP an zwei Blindgeborenen berichten, denen erst in lter das Gesicht durch eine Operation wiedergegeben wurde. CHESELDEN ien Knaben von 13 Jahren, welcher mit sehr stark getrübbten Krystall- iem Staar) geboren war.

LDEN<sup>1</sup> berichtet Folgendes über seine Fähigkeit, Formen zu unter- 587

Anfangs, nachdem er sein Gesicht bekommen hatte, wußte er so wenig nungen zu urtheilen, daß er sich vielmehr einbildete, alle Sachen, die rührten seine Augen, wie das, was er fühlte, seine Haut. Keine Sachen so angenehm, als glatte und regelmässige (vielleicht wegen des ein- d leichter zu analysirenden Gesichtseindrucks, oder wegen des Glanzes?), von ihrer Gestalt nicht urtheilen oder errathen konnte, was ihm an gefiele. Er machte sich keinen Begriff von der Gestalt irgend einer schied auch keine Sache von der anderen, so verschieden sie auch an Gröfse waren; wenn man ihm aber sagte, was das für Dinge wären, durchs Gefühl erkannt hatte, so betrachtete er sie sehr aufmerksam, ler zu kennen; weil er aber auf einmal zu viel Sachen zu lernen hatte, mer wieder viel davon und lernte, wie er sagte, in einem Tage tausend n und vergaß sie wieder. Zum Exempel, er hatte oft vergessen, Katze und welches der Hund war, und schämte sich darum weiter zu also die Katze, die er durch das Gefühl kannte, betrachtete sie sehr sie nieder und sagte: „So, Miezech, nun will ich dich ein andermal Man glaubte, er würde bald verstehen lernen, was Gemälde vorstellten, h aber das Gegentheil. Denn zwei Monate, nachdem ihm der Staar r, machte er plötzlich die Entdeckung, daß sie Körper mit Erhöhungen ingen darstellten; bis dahin hatte er sie nur als buntscheckige sehen. Dabei aber erstaunte er nicht wenig, daß sich die Gemälde fühlen ließen, wie die Dinge, welche sie vorstellten, und daß die e durch ihr Licht und Schatten rund und uneben aussahen, flach, wie anzufühlen waren. Er fragte, welcher von seinen Sinnen ihn betröge, der das Gesicht. Als man ihm seines Vaters Bild in einem Angehänge utter Uhr zeigte und ihm sagte, was es wäre, erkannte er es für erte sich aber sehr, daß ein großes Gesicht sich in einem so kleinen llen liefs, welches ihm, wie er sagte, so unmöglich würde geschienen ien Scheffel in eine Metze zu bringen.

konnte er wenig Licht vertragen und hielt alles, was er sah, für fs; als er aber größere Sachen sah, hielt er jene für kleiner, weil keine Linien auferhalb des Umfangs, den er sah, vorstellen konnte. mer, worin er wäre, ein Theil des Hauses sei, sagte er, wußte er aber nicht begreifen, wie das ganze Haus größer als das Zimmer te.

hr, nachdem er sein Gesicht wiedererhalten hatte, brachte man ihn von Epsom, wo er eine weite Aussicht hatte; diese ergötzte ihn war ihm, wie er sagte, eine neue Art von Sehen.

der Staar an dem andern Auge gestochen ward, kamen ihm, wie

<sup>1</sup>EN, *Phil. Transact.* 1728. XXXV, p. 447: *Smith Opticks Remarks*, p. 27.

er sagte, die Sachen mit diesem Auge größer vor, doch nicht so groß, als sie ihm anfangs mit dem ersten erschienen waren. Wenn er einerlei Sache mit beiden Augen ansah, so kam sie ihm noch einmal so groß vor, als mit dem zuerst erhaltenen allein; aber doppelt sah er nichts, soviel man entdecken konnte.<sup>4</sup>

Hierbei ist zu bemerken, daß auch bei einer noch so undurchsichtigen Linse der Blinde immer im Stande war zu lernen, wie er die Augen bewegen mußte, um von der Sonne den hellsten Eindruck zu empfangen, d. h. nach der Sonne hinzusehen. Also in der Beurtheilung der Richtung der Objecte aus der Richtung des Blicks nach ihnen hin konnte er nicht als ganz ungetrüb betrachtet werden. 568 Ja, es ist selbst unwahrscheinlich, daß die Linse jemals das Licht so vollständig gleichmäßig nach allen Richtungen hin verstreue, daß nicht doch am Ende die Theile der Netzhaut, welche dem Orte, wo der Focus der Strahlen sich bilden sollte, benachbart waren, etwas stärker erleuchtet gewesen wären, als die übrige Fläche der Netzhaut. Dann konnte auch selbst ein gewisser, wenn auch sehr unvollkommener und ungenauer Grad der Localisirung im Sehfelde ausgebildet sein, wie auch J. WARE<sup>1</sup> bei einem ähnlichen Falle bemerkte. Letzterer fand, daß Kinder mit Cataract nicht nur die Farben gefärbter Gegenstände, die man dem Auge nahe brachte, noch erkennen konnten, sondern sogar einigermaßen die Entfernung. Ein siebenjähriger Knabe, der von WARE operirt war, war von Anfang an viel geschickter und sicherer als CHESELDEN's Patient. Es ist sehr interessant, daß in dem beschriebenen Falle dennoch das Erlernen der Gesichtswahrnehmungen so deutlich hervortritt.

Noch merkwürdiger in mancher Beziehung ist ein von WARDROP<sup>2</sup> mitgetheilte Fall von einer Dame, welche blind, wahrscheinlich mit getrübbten Linsen geboren war. Im Alter von sechs Monaten wurde sie in Paris einer Operation unterworfen, nach welcher das rechte Auge ganz zu Grunde ging, im andern die Pupille vollständig verwuchs, so daß keine Spur derselben mehr zu sehen war, außer einigen Streifen von gelben Ausschwitzungen, die in unregelmäßiger Weise über die Mitte der Iris verbreitet waren. Sie war demnach viel blinder, als Staarkranke zu sein pflegen, und konnte wohl kaum mehr vom Licht und seiner Richtung erkennen, als Gesunde hinter den geschlossenen Augenlidern erkennen können. Sie konnte ein sehr helles von einem dunklen Zimmer unterscheiden, ohne indessen die Richtung des Fensters erkennen zu können, durch welches das Licht drang; dagegen bei Sonnenschein und hellem Mondschein erkannte sie die Richtung, wo das Licht herkam.

Am 26. Januar 1826 wurde versucht, die Ausschwitzungen, die die Pupille verschlossen, zu durchschneiden, was nicht gelang. Am 8. Februar darauf wurde ein Schnitt durch die Iris gemacht, der reichlich Licht in das Auge treten ließ; hinter demselben lag aber noch eine undurchsichtige Masse. Während der mäßigen Entzündung, welche folgte, war die Patientin gegen Licht sehr empfindlich; man bemerkte, daß sie oft versuchte ihre Hände zu sehen. Am 17. Februar endlich wurde die Oeffnung in der Iris erweitert und die opaken Massen hinter derselben entfernt, wodurch endlich das Sehen frei wurde. Ich lasse hier das Wesentliche von WARDROP's Bericht folgen:

<sup>1</sup> J. WARE Case of a young gentleman who recovered his sight, when seven years of age. *Phil. Trans.* 1801. XCI. p. 382—396

<sup>2</sup> J. WARDROP Case of a lady born blind, who received sight at an advanced age by the formation of an artificial pupil. *Phil. Trans.* 1826. III. 529—540.

der Operation kehrte sie in einem Wagen nach Haus zurück, die Augen mit einem seidenen Tuch verbunden; das erste, was sie bemerkte, war ein Wagen, der vorbeikam, wobei sie ausrief: „Was für ein großes Ding ist vorbeigekommen?“ Im Lauf des Abends bat sie ihren Bruder, ihr seine Augen, in Betreff deren sie viel Neugier bewies, und sie blickte nach ihm eine Zeit, indem sie sie nahe an ihr Auge hielt. Man fragte, was sie ihm antwortete, daß eine Seite dunkel und die andere hell wäre; sie zeigte auf die Ziffer 12 und lächelte. Ihr Bruder fragte, ob sie noch etwas ihm antwortete „Ja“ und zeigte auf die Ziffer 6 und auf die Zeiger. Dann betrachtete sie die Kette und die Siegel, und bemerkte, daß eines hell sei, was in der That sich so verhielt, da es aus Bergkrystall war. Am dritten Tage bat sie Herr WARDROP wieder nach der Uhr zu sehen, was sie ihm antwortete, indem sie sagte, daß das Licht ihrem Auge wehe thäte und daß sie 589 dumm vorkäme, indem sie damit meinte, sie sei zu sehr verwirrt durch die neue Welt, die ihr so zum ersten Male eröffnet war. Am dritten Tage bat sie die Thüren an der andern Seite der Strafe und fragte, ob sie roth wären in der That von der Farbe des Eichenholzes. Am Abend blickte sie ihres Bruders Gesicht und sagte, sie sähe seine Nase; er forderte sie zu greifen, was sie that; dann warf er sich ein Taschentuch über das Gesicht und sagte, sie möchte noch einmal hinsehen, worauf sie es scherzend antwortete: „Was soll das heißen?“ Am vierten Tage erklärte sie, daß sie besser sähe, als an irgend einem Tage; „aber ich kann nicht sagen, was ich sehe, ich bin ganz dumm“. In der That dadurch ganz verwirrt zu sein, daß sie nicht fähig war, Erfahrungen durch den Tastsinn mit denen durch den Gesichtssinn zu vergleichen, fühlte sich enttäuscht, daß sie nicht fähig war, sogleich Gegenstände zu unterscheiden, die sie so leicht durch Betasten unterscheiden

Am fünften Tage bemerkte sie die Hauswirthin, bei der sie wohnte, und bat sie, sie schlank sei. Sie fragte, was die Farbe ihres Kleides sei? Sie antwortete, es sei blau. „So ist auch das Ding auf Eurem Kopfe“, sagte sie, was richtig war; „und Euer Taschentuch ist von anderer Farbe“, sagte sie, was richtig war. Sie fügte hinzu: „Ich sehe Euch ziemlich gut, denke ich.“ Und Untertassen wurden einer Prüfung unterzogen. „Was ist dies?“ sagte sie. „Ich weiß es nicht“, antwortete sie, „es sieht sehr verqueert aus.“ Sie kann im Augenblick sagen, was es ist, wenn ich es anfasse.“ Sie ließ sie über dem Kamin liegen, aber hatte keinen Begriff, was es wäre, rührte. Sie schien nun heiterer zu werden und größere Hoffnungen zu setzen, tritt in die Welt des Sichtbaren zu hegen; auch meinte sie, daß sie ihre eigenen Fähigkeiten würde besser gebrauchen können, wenn sie nach Hause käme, wo ihr Alles genau bekannt war.

Am sechsten Tage fragte sie ihren Bruder bei Tische, was er sich da gerade als ihr gesagt wurde, es sei ein Glas mit Portwein, antwortete sie: „dunkel und sieht sehr häßlich aus.“ Als Kerzen in das Zimmer kamen, bemerkte sie ihres Bruders Gesicht im Spiegel und auch das Bild der Dame; sie ging auch zum ersten Male ohne Beistand von ihrem Sopha und wieder zurück zu dem Stuhl. Beim Thee fiel ihr das ein, sie bemerkte den Glanz des Porzellans und sie fragte: „was die Farbe

längs der Kante sei“. Man sagte ihr, es sei Gelb, worauf sie erwiderte: „Die Farbe will ich wieder kennen.“

Am neunten Tage kam sie zum Frühstück herab in sehr guter Laune; sie sagte zu ihrem Bruder: „Heut sehe ich Dich sehr gut“, kam zu ihm heran und reichte ihm die Hand. Sie bemerkte auch einen Miethzettel an dem Fenster eines Hauses auf der entgegengesetzten Seite der Strafe, und ihr Bruder, um sich zu überzeugen, führte sie drei verschiedene Male an das Fenster, und zu seinem Erstaunen und Freude deutete sie jedesmal ganz bestimmt danach hin.

Sie brachte einen großen Theil des elften Tages damit zu, aus dem Fenster zu sehen, und sprach sehr wenig.

Am zwölften Tage wurde ihr der Rath gegeben auszugehen, worüber sie sehr vergnügt war. Ihr Bruder ging mit ihr, als ihr Führer, und nahm sie mit sich zweimal um die Säulenhallen von Coventgarden herum. Sie schien sehr erstaunt, aber offenbar erfreut zu sein; der klare blaue Himmel zog ihre Aufmerksamkeit zuerst auf sich, und sie sagte: „Das ist das Hübscheste, was ich bisher gesehen  
590 habe, und immer gleich hübsch, so oft ich mich danach wende und hinsehe“. Sie unterschied den Straßendamm vom Trottoir und trat von dem einen zum andern herüber, wie Jemand, der an den Gebrauch seiner Augen gewöhnt ist. Ihre große Neugier und die Art, wie sie die Menge von Gegenständen rings herum anstarrte und danach zeigte, erregte die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden und ihr Bruder brachte sie bald nach Hause, sehr gegen ihren Willen.

Am dreizehnten Tage trug sich nichts Besonderes zu bis zur Theezeit, wo sie bemerkte, daß anderes Theegeschirr aufgesetzt war, welches nicht hübsch sei und einen dunkeln Rand habe, was eine richtige Angabe war. Ihr Bruder forderte sie auf, in den Spiegel zu sehen und ihm zu sagen, ob sie sein Gesicht darin sähe; worauf sie, sichtbar enttäuscht, antwortete: „Ich sehe mein eignes; laß mich gehen“.

Am vierzehnten Tage fuhr sie in einem Wagen vier Meilen weit auf der Wandsworth-Strafe, bewunderte meistens den Himmel und die Felder, bemerkte die Bäume und auch die Themse, als sie über Vauxhallbrücke kam. Es war heller Sonnenschein und sie sagte, daß etwas sie blende, wenn sie auf das Wasser sähe.

Am fünfzehnten Tage, einem Sonntage, ging sie nach einer Kapelle in einiger Entfernung; sie sah jetzt entschieden deutlicher als früher, aber erschien noch verwirrter als während der Zeit, wo ihr Gesicht weniger vollkommen war. Die Leute, welche auf dem Trottoir vorbeikamen, erschreckten sie; und einmal als ein Herr an ihr vorbeikam, der eine weiße Weste und einen blauen Rock mit gelben Knöpfen hatte, die im Sonnenschein stark erglänzten, schreckte sie so zusammen, daß sie ihren Bruder, der mit ihr ging, von dem Trottoir herabzog. Sie erkannte, daß der Geistliche seine Hände auf der Kanzel bewegte und daß er etwas darin hielt; es war ein weißes Taschentuch.

Am sechzehnten Tage fuhr sie aus, um eine Visite in einem entfernten Theile der Stadt zu machen; das Getreibe in den Straßen schien sie sehr zu unterhalten. Als sie gefragt wurde, wie sie an diesem Tage sähe, antwortete sie: „Ich sehe sehr viel, wenn ich nur sagen könnte, was ich sehe; aber sicherlich, ich bin sehr dumm“.

Nichts Besonderes fiel am siebenzehnten Tage vor; und als ihr Bruder sie fragte, wie es ihr ginge, antwortete sie: „Es geht mir gut, und ich sehe immer besser; aber quält mich nicht mit vielen Fragen, bis ich etwas besser gelernt habe,



zu gebrauchen. Alles, was ich sagen kann, ist, daß ich versichert alles Das, was ich sehe, welch' eine große Veränderung mit mir vor-  
 ist; aber ich kann nicht beschreiben, was ich empfinde.“

Einige Tage nach der Operation versuchte Herr WARDROP durch einige Genauigkeit ihrer Begriffe von der Farbe, Gestalt, Form, Lage, Entfernung der äußeren Objecte festzustellen. Da sie nur mit einem konnte, konnte nichts ermittelt werden über das Doppeltsehen mit n. Sie erkannte offenbar die Verschiedenheit der Farben, das heißt, und empfand verschiedene Eindrücke von verschiedenen Farben. Als ihr farbige Stücke Papier,  $1\frac{1}{2}$  Zoll im Quadrat, vorgelegt wurden, untersie nicht nur sogleich von einander, sondern gab einigen Farben auch niederen Vorzug; Gelb gefiel ihr am besten, und dann Rosaroth. Hierbei merkt werden, daß wenn sie einen Gegenstand zu prüfen wünschte, lich schwer wurde, ihr Auge dahin zu richten und seine Lage ausfindig indem sie ihre Hand sowohl, wie ihr Auge in verschiedenen Richtungen gte, wie Jemand mit verbundenen Augen oder im Dunkeln mit seinen vergreift, um zu fassen, was er wünscht. Sie unterschied auch große

Gegenständen, wenn beide ihr neben einander zum Vergleich vord- 591  
 rden. Sie sagte, sie sähe verschiedene Formen an verschiedenen Gegen-

ihr gezeigt wurden. Man fragte, was sie meinte unter verschiedenen n Beispiel langen, runden, viereckigen, und nachdem man sie gebeten rem Finger diese Formen auf ihrer anderen Hand zu zeichnen, brachte

Auge die betreffenden Formen, wobei sie richtig nach ihnen hinwies. ied nicht nur kleine von großen Gegenständen, sondern wußte auch, d unten sei. Um dies zu prüfen, wurde eine mit Tinte gezeichnete r Auge gebracht, deren eines Ende breit, das andere schmal war; sie age, wie sie wirklich war, nicht umgekehrt. Sie konnte auch Be- merken; denn als ein Glas Wasser auf den Tisch vor sie gestellt ls sie ihre Hand näherte, schnell fortgezogen wurde in größere Ent- e sie sogleich: „Sie bewegen es; Sie nehmen es fort“.

en dagegen die größte Schwierigkeit zu haben in der Schätzung der er Dinge; denn während ein Gegenstand dicht vor ihr Auge gehalten i sie wohl danach mit ausgestreckter Hand weit jenseits seiner wirklichen d sie bei anderen Gelegenheiten nahe an ihrem Gesicht herumgriff Dinge, was weit entfernt war.

ie mit Leichtigkeit die Namen der verschiedenen Farben, und zwei m ihr die farbigen Papiere gezeigt waren, bemerkte sie beim Eintritt rothes Zimmer, daß es roth sei. Sie bemerkte auch einige Gemälde, then Wand des Zimmers hingen, in dem sie saß, wobei sie einige a auf ihnen unterschied, aber nicht wußte, was sie darstellten, und n Rahmen bewunderte.

ag noch bemerkt werden, daß sie durch die Uebung ihres Gesichts g Kenntniß irgend welcher Formen gewonnen hatte und unfähig war. ungen des neu gewonnenen Sinnes anzuwenden und zu vergleichen sie durch den Tastsinn zu erkennen gewöhnt war. Als man daher machte, ihr einen silbernen Bleistifthalter und einen großen Schlüssel zu geben, so unterschied sie und erkannte beide ganz genau. Aber n einander auf den Tisch gelegt wurden, sah sie, daß beide ver-

schieden seien, aber sie konnte nicht sagen, welches der Bleistifthalter sei und welches der Schlüssel.

Nichts weiter kam vor in der Geschichte dieser Dame, was der Erwähnung werth wäre, bis zum fünfundzwanzigsten Tage nach der Operation. An dem Tage fuhr sie in einem Wagen durch Regent's Park, und schien dort mehr als gewöhnlich sich zu unterhalten, und stellte mehr Fragen über die umgebenden Gegenstände, zum Beispiel: „Was ist das?“ Es ist ein Soldat, war die Antwort. „Und das, sieh! sieh!“ Es waren Kerzen von verschiedenen Farben in einem Ladenfenster. „Was ist das, das da vorbeikam?“ Es war ein Herr zu Pferde. „Aber was ist das Rothes auf dem Trottoir?“ Es waren ein Paar Damen, die rothe Shawls trugen. Als sie in den Park kam, wurde sie gefragt, was sie vorzugsweise sähe, oder ob sie errathen könnte, was einzelne von den Gegenständen wären. „O ja“, antwortete sie, „da ist der Himmel, da ist Gras, dort ist Wasser und zwei weiße Dinge“, welches zwei Schwäne waren. Als sie auf dem Rückweg durch Piccadilly kam, erstaunte sie sehr über die Juwelierläden und ihre Aeußerungen erregten herzliches Lachen bei ihren Begleitern.

Von da bis zu der Zeit, wo sie London verließ, am 31. März, sechs Wochen nach der Operation, fuhr sie fort, fast täglich mehr Kenntniß der sichtbaren Welt zu gewinnen, aber es blieb noch viel zu lernen übrig. Sie hatte eine ziemlich genaue Kenntniß der Farben und ihrer verschiedenen Abstufungen und Namen gewonnen; und als sie Herrn WARDROP ihren Abschiedsbesuch machte, trug sie 592 das erste Kleid, was sie sich selbst ausgewählt hatte, helles Purpurroth, was ihr sehr zu gefallen schien, ebenso wie ihr Hut, der mit rothen Bändern geziert war. Sie hatte noch durchaus keine genaue Kenntniß der Entfernungen oder Formen gewonnen, und bis zu dieser Zeit hin war sie immer noch verwirrt bei jedem (neuen) Gegenstand, auf den sie blickte. Auch war sie noch nicht fähig, ohne beträchtliche Schwierigkeit und zahllose vergebliche Versuche, ihr Auge auf einen Gegenstand zu richten, so daß, wenn sie versuchte danach hinzublicken, sie ihren Kopf nach verschiedenen Seiten wendete, bis ihr Auge den Gegenstand erfasste, nach dem sie suchte. Sie hegte indessen noch immer die Hoffnung, die sie kurz nach der Operation geäußert hatte, daß wenn sie nach Hause käme, ihre Kenntniß der Aufsendinge genauer und verständlicher werden würde, und daß, wenn sie auf die Sachen blicken könnte, mit denen ihr Tastsinn so lange vertraut gewesen war, die Verwirrung, welche die Mannigfaltigkeit der Gegenstände ihr bis jetzt verursacht hatte, schwinden würde.

So weit WARDROP. Es ist bei diesem Berichte zu bedenken, daß die Patientin vor der letzten Operation schon mehrere Tage lang sich bemüht hat, bei freilich noch nicht vollständig wiedererlangtem Gesichtsvermögen, ihre Hände zu besehen, und daher wohl gelernt haben konnte, diese im Gesichtsfelde zu kennen und ihren Bewegungen mit dem Blicke zu folgen, wie sie denn auch selbst vorher schon gelernt haben konnte, ihre Augen der Sonne zuzuwenden, also einen gewissen Grad der Richtung des Blicks und die Kenntniß der ohngefähren Richtung, aus der das ihre Augen erregende Licht herkam, erhalten haben mochte. Die optischen Bilder in ihrem Auge müssen ziemlich gut gewesen sein, da sie die Ziffern und Zeiger einer Taschenuhr, einen Miethszettel an einem gegenüberliegenden Fenster, Wachskerzen, Juwelenschmuck am Schaufenster von der Mitte der Straße her aus dem Wagen erkennen konnte. Das Erste, was sie als Gegenstände unterscheiden lernte, waren bewegliche Dinge, namentlich menschliche Gestalten und durch Farbe

ende Objecte, wie die röthlichen Thüren, die Orange, die farbigen Frauen. Es ist übrigens auch bei den neugeborenen Kindern auf viel früher sie menschliche Gestalten und Gesichter zu erkennen und lücke zu verfolgen wissen, als andere Gegenstände. Die menschlichen sehen natürlich vor anderen Dingen das Interesse auf sich und sind Art der Bewegungen, die sie ausführen, von andern Objecten des wesentlich unterschieden. Bei diesen Bewegungen sind sie auch als ingendes Ganzes charakterisirt, und das Gesicht, als ein weifs-röthlicher len beiden glänzenden Augen ist immerhin eine Stelle dieses Bildes, t wiederzuerkennen sein wird, auch für Jemanden, der sie erst wenige n hat.

ie Unterscheidung der Formen betrifft, auf die es uns hier hauptsächlich würde, so ist zunächst klar, dafs in einem solchen Falle die Haupt sein mufs, die wechselnden perspectivischen Projectionen körperlicher kennen zu lernen. Denn der Blinde weifs natürlich gar nichts von keit einer solchen Projection. Aber einzelne Züge in dem Bericht die Dame auch solche Formen, die durch perspectivische Projection lt waren, nicht zu erkennen wufste, wie zum Beispiel den Schlüssel sistifthalter. Ersterer mit Bart und Ring, von der Fläche gesehen, er Netzhaut sich in derselben Gestalt darstellen, wie man ihn fühlt. in angeborenes Vermögen da wäre, die Formen der Netzhautbilder zu Sinne der nativistischen Theorie, so hätte der Schlüssel am Ringe kannt werden müssen. Dazu kommt die mehrfach erwähnte Unfähigkeit, s indirect gesehenen Objectes mit dem Blicke und der Hand zu finden. ichtungen der Verbindungslinien zwischen dem centralen und einem le der Netzhaut schon durch angeborene Anschauung bekannt, so könnte 593 se Schwierigkeit gemacht haben, den Blick längs der Verbindungslinie, r auf dieser liegenden Bilder folgend, nach dem gewünschten Punkte

nt mir dagegen nicht zu streiten, dafs dieselbe Dame am achtzehnten er Operation einfache Formen zu unterscheiden wufste. Wenn man gs des Umfanges eines Kreises, eines länglichen Rechtecks, eines fen läfst, wird man unter ähnlichen Umständen wohl bald fähig sein, s Begrenzungsstück von einem krummlinigen zu unterscheiden, eine ie zu erkennen, zu wissen, ob man den Blick hauptsächlich von oben der von rechts nach links laufen läfst, u. s. w.; was zur Erkennung Figuren genügen würde. Es ist hierbei nur nöthig, den Blick längs lich fortlaufenden Umfangslinie fortzuführen, was natürlich leichter ist, inem entfernten Object im Seitentheil des Gesichtsfeldes hinzuleiten. ennen der Nase, als eines Vorsprunges an dem röthlichen Fleck, den hres Bruders im Gesichtsfeld bildete, läfst sich auf diese Weise Uhr, die sie am ersten Abend untersuchte, hatte sie in der Hand sie also durch das Getast; die Ziffern und Zeiger hat sie nicht als et, sondern nur bemerkt, dafs sie markirte Stellen für das Gesicht der tastende Finger durch das Uhrglas hindurch nichts davon te. Diese Theile zu zeigen, war ihr möglich, indem sie das Bild was sie schon kannte, bis zu dem Bilde der genannten dunklen ewegte.

Andererseits scheint mir die Geschwindigkeit, mit der die Patientin einige Dinge sehen lernte, doch zu groß gewesen zu sein, um zu der Annahme zu stimmen, die Localzeichen der Netzhautpunkte seien discontinuirliche und ungeordnete Zeichen, für welche erst aus Erfahrung gelernt werden müßte, welche Localzeichen benachbarten Netzhautpunkten angehören. Wenn die Localzeichen aber selbst continuirlich über das Feld der Netzhaut veränderliche Größen sind, so würden von vorn herein, ohne Erfahrung, benachbarte Netzhautpunkte in der Empfindung als benachbart charakterisirt sein. Nur im letzteren Fall kann der Eindruck eines beleuchteten Flächenstücks der Netzhaut gleich als Beleuchtung einer zusammenhängenden Fläche im Sehfelde aufgefaßt werden, ohne daß vorausgehende Erfahrung lehrt, daß die Localzeichen der erregten Netzhautfasern zusammenliegenden Faserenden und nicht punktförmig im Felde verstreuten angehören.<sup>1</sup>

Geschichtliches. Die Frage, ob die Kenntniß der Ausmessungen des Gesichtsfeldes angeboren sei oder erworben, wurde von den Sensualisten des vorigen Jahrhunderts eifrig discutirt. MOLYNEUX warf die Frage auf, ob ein Blindgeborener, der durch das Gefühl einen Würfel von einer Kugel zu unterscheiden gelernt hätte, sie auch sogleich durch das Gesicht unterscheiden würde, wenn er dieses erlangte. MOLYNEUX und LOCKE<sup>2</sup> antworteten beide mit Nein. JURIN<sup>3</sup> schloß sich dem an, bemerkte nur dabei, daß, wenn der Blindgeborene Würfel und Kugel von verschiedenen Richtungen betrachten dürfte, die letztere ihm immer dieselben, ersterer verschiedene Bilder geben und er sie daran zu unterscheiden vermögen würde. Diese Ansicht, 694 wonach alle Kenntniß der Form in den Gesichtswahrnehmungen auf Erfahrung und Vergleichung mit dem Tastsinn beruhe, blieb während des vorigen Jahrhunderts wohl die herrschende, so weit man überhaupt dieser Frage Aufmerksamkeit zuwandte, bis unter dem Einfluß der KANT'schen Lehre, daß der Raum eine angeborene Form unserer Anschauung sei, JOHANNES MÜLLER<sup>4</sup> die entgegengesetzte Ansicht aufstellte. Nach ihm beruht Fühlen und Sehen auf denselben Grundanschauungen von der Ausbreitung unserer eigenen Organe im Raume. Er geht also aus von der Annahme, daß wir eine angeborene Kenntniß der räumlichen Dimensionen der empfindenden Theile der Netzhaut und ihrer Anordnung von vorn herein mitbringen, und daß dadurch die ursprünglichen Ausmessungen des gesehenen flächenhaften Bildes unmittelbar in der Empfindung gegeben sind. Nur das nach außen Sehen, die Beurtheilung der Entfernung, der Körperform der Objecte sind ihm durch Erfahrung gegeben. Nach außen sehen, heißt nach J. MÜLLER die Gegenstände als außerhalb unseres Körpers anschauen. Nun sehen wir fortdauernd oder immer wiederkehrend Theile unseres Körpers auf dem Felde unserer Netzhaut abgebildet, und erkennen sie als uns zugehörig, durch unsern Willen unmittelbar beweglich an. Das Andere, was wir sehen, wechselt, und wir sehen es also als nicht zugehörig oder äußerlich unserem Körper. Dann lernen wir später die zwei Localisationen durch den Tastsinn der Haut und durch das Sehen mit der Netzhaut in der Vorstellung vereinigen. Doch erkennt J. MÜLLER an, daß dies wunderbar scheinen

<sup>1</sup> Andere Fälle: GRANT in *Voigt's Magaz.* IV. 1. S. 21. HOFBAUER, *Beiträge*, II. 2. S. 249. WARE, *Phil. Trans.* 1801, p. 332. HOME, *Phil. Trans.*, 1807, I. p. 834. *Bibl. Britann.* XXXVII. p. 85. Jahr 1808. TRINCINETTI in *Arch. des sc. phys. et nat. de Genève*, VI. 336. *Giorn. d. ist. Lomb.* 1847, fasc. 46 e 47.

<sup>2</sup> LOCKE, *Essay concerning human understanding*. Bd. II. Ch. 9, § 8. Siehe auch BERKELEY, *New Theory of vision* 1709, Section 79.

<sup>3</sup> SMITH, *Opticks. Remarks*, p. 27. Ebenso PRIESTLEY, *Geschichte der Optik*, II. 512 der deutschen Uebersetzung.

<sup>4</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1826. — J. MÜLLER, *Handbuch der Physiologie des Menschen*. Coblenz 1840. Bd. II, S. 362.

nlich vom Standpunkte seiner Theorie aus; er vergleicht es mit den Augen, welche durch gleichzeitige Wirkung des Tastgefühls und durch eines Spiegelbildes unseres Körpers (z. B. beim Rasiren) zu Stande kommen. Was das Problem des Aufrechtsehens trotz der umgekehrten Netzhautbilder betrifft, so erscheint uns nach MÜLLER wirklich alles und nur weil unser eigener Körper und die durch den Tastsinn an ihm Stellen uns alle auch verkehrt erscheinen, tritt kein Widerspruch ein. werden also nach dieser Ansicht nicht die Bilder in den äußern Raum vorstellen projicirt, sondern der Anschauungsraum ist ein innerer, in anderweitigen Wahrnehmungen der Dinge hineingetragen werden. er noch hat UEBERWEG<sup>1</sup> diese Seite der MÜLLER'schen Theorie während HERING<sup>2</sup> diesen Anschauungsraum zu einem Raum von drei macht und eigenthümliche Hypothesen hinzugefügt hat, um die dritte desselben durch die Anschauung entstehen zu lassen, von denen erst in den Abschnitten die Rede sein kann. Der Letztgenannte hält auch in mitt über einäugige Stereoskopie durchaus die Ansicht fest, daß die sich so vollständig in ihrer Räumlichkeit anschane, daß sogar die aller Punkte auf ihr nach der geradlinigen Sehne, statt nach dem Bogen werden, eine Ansicht, deren Unbrauchbarkeit zur Erklärung der Gesichtssicht, die sie erklären soll, wir schon oben berührt haben, und die in Widersprüche zu stehen scheint mit der in § 118 und 124 desselben achten Annahme, wonach eine Ebene der scheinbare Ort der von beiden übereinstimmend und identisch gesehenen Punkte sein soll. unmittelbare Kenntniß der Distanzen auf der Netzhaut als Grund der der gesehenen Punkte im Sehfeld liegt auch denjenigen Ansichten zu welche eine unmittelbar angeborene Projection der Bilder in Richtung Linien nach außen annahmen. PORTERFIELD<sup>3</sup> und BARTELS<sup>4</sup> ließen tion nach den Normalen der Netzhäute geschehen, VOLKMANN<sup>5</sup> nach 595 gsinien, das heißt den Linien, die durch die hintern Knotenpunkte beiden Ansichten ist also wenigstens die Schätzung der Winkeldistanzen durch angeborene Momente gegeben; ähnlich TOURNAI<sup>6</sup>. VOLKMANN äter seine Ansicht noch näher dahin specificirt, daß er glaubt, die röße der Gesichtswinkel im Sehfelde hänge ab von der Zahl der einzelnen 1 Nerven-elemente, welche auf der entsprechenden Strecke der Netzhaut se Ansicht von VOLKMANN liegt sehr vielen neueren Arbeiten über les Auges zu Grunde; so benutzt sie unter andern namentlich auch USEN,<sup>8</sup> um die Erklärung für die Abweichung des scheinbar verticalen d andere optische Täuschungen zu geben, indem er die Möglichkeit r Verziehungen des Netzhautbildes nachzuweisen sucht. kkehr der Physiologen zu der älteren entgegenstehenden Ansicht, wonach ilung des Räumlichen auf Erfahrungen beruhe, findet ihr Vorspiel hischer Seite in den Ansichten von HERBART über die Sinneswahr-

G, *Zeitschrift für rationelle Medicin*. R. 3, Bd. V, S. 268—282.

NG, *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig 1864.

FIELD, *On the eye*, II, 285.

4, *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinns*. Berlin 1834.

OLKMANN, *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1836.

AL, *Die Sinne des Menschen*. Münster 1827.

OLKMANN, *Berichte der Kön. Sächs. Ges. der Wissenschaften*. 30. April 1853.

GHAUSEN, *Archiv für Ophthalmologie*, V, 2, S. 127. — *Poggendorff's Annalen*. CX, 65—92.

nehmungen. Es war sein metaphysisches Princip von der Einheit der Seele, welches ihn veranlafte, alle Vorstellungen für qualitative und zeitlich einander folgende, nicht neben einander bestehende Processe zu erklären. Daher mußte er alle Raumanschauung von der Bewegung herleiten und die localen Unterschiede der Empfindung mußten qualitative sein. LOTZE war es namentlich, der diese Ansichten auf die factischen Verhältnisse bei den sinnlichen Wahrnehmungen zu übertragen suchte, und an den sich physiologischerseits zunächst MEISSNER<sup>1</sup> und CZERMAK<sup>2</sup> in ihren Untersuchungen über den Tastsinn anschlossen. In der physiologischen Optik wurde die Aufmerksamkeit zunächst durch das Studium der Bewegungen des Auges wieder in diese Richtung gelenkt. Einer der ersten Schritte war die von BRÜCKE aufgestellte und in den folgenden Abschnitten zu besprechende Ansicht über den Einfluß der Bewegungen beim stereoskopischen Sehen. Ich selbst habe in einem populären Vortrage<sup>3</sup> die Sache von dieser Seite dargestellt. W. WUNDT<sup>4</sup> hat das Verdienst, den ersten vollständigeren Versuch gemacht zu haben, die Bildung des Sehfeldes aus den Bewegungserfahrungen herzuleiten, eine Aufgabe, deren Existenz und Wichtigkeit so gut wie ganz vergessen war. Er betrachtet darin als Localzeichen die qualitativen Veränderungen der Empfindung auf verschiedenen Stellen der Netzhaut, die von PURKINJE, AUBERT und SCHELSKE beobachtet waren und oben S. 372—374 erwähnt wurden. Ich habe diese Annahme in der oben gegebenen Darstellung nicht benutzt, weil ich nicht sehe, wie der Eindruck zum Beispiel von Schwarz in der Mitte des Feldes von Roth auf dem Randtheil local unterschieden werden kann, wenn kein anderes Erkennungszeichen für den localen Unterschied da ist, als der qualitative Unterschied, wonach Roth in der Mitte roth, am Rande des Sehfeldes schwarz erscheint. Die Beurtheilung der Distanzen im Sehfelde leitet WUNDT ab von dem Gefühl der Muskelanstrengung, welche nöthig sei, um sie mit dem Blicke zu durchlaufen. Da die Erfahrung lehrt, daß das Urtheil über die  
 596 Muskelanstrengungen einige Sicherheit nur hat, wenn fortdauernd die Wirkungen derselben mit den Gesichtsbildern verglichen werden, so bin ich von den möglichen Erfahrungen über die Congruenz gleicher Strecken von correspondirender Richtung ausgegangen, welche Annahme, wie mir scheint, wesentlich bestätigt wird durch die Erfahrung, daß Strecken von übereinstimmender Richtung genau und sicher verglichen werden, solche von nicht übereinstimmender Richtung nicht. Dadurch wird freilich nicht ausgeschlossen, daß nicht auch das von WUNDT in Anspruch genommene Gefühl der Muskelanstrengung mitbenutzt werde.

Die Untersuchungen über die Genauigkeit des Augenmaafes wurden zunächst veranlaßt durch E. H. WEBER's<sup>5</sup> Gesetz, welches später von FECHNER<sup>6</sup> als psychophysisches Gesetz bezeichnet worden ist und wonach die kleinsten empfindbaren Unterschiede proportional der ganzen empfundenen Gröfse sind. Ausser den beiden Genannten hat namentlich auch VOLKMANN<sup>7</sup> eine große Reihe sorgfältiger Mes-

<sup>1</sup> G. MEISSNER, *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut*. Leipzig 1852. — *Zeitschrift für rationelle Medicin*. R. 2. Bd. IV. S. 260.

<sup>2</sup> CZERMAK, *Sitzungsberichte der K. K. Akademie der Wiss. zu Wien* 1855. XV. 466 u. XVII. 577. — *Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen*. I. 183.

<sup>3</sup> H. HELMHOLTZ, *Ueber das Sehen des Menschen*. Leipzig 1855.

<sup>4</sup> W. WUNDT, *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung*. Leipzig u. Heidelberg 1862. Abdrücke aus *Zeitschr. für rat. Medicin* 1858—1862.

<sup>5</sup> E. H. WEBER, *Über den Tastsinn und das Gemeingefühl*, S. 559 in *Wagner's physiologischem Wörterbuch*. — *Programmata collecta*, Fasc. III. 1851. — E. H. WEBER, *Berichte der sächs. Societät* 1852, S. 85 ff.

<sup>6</sup> TH. FECHNER, *Elemente der Psychophysik*. Leipzig 1860. Bd. I, S. 211—236.

<sup>7</sup> A. W. VOLKMANN, *Berichte der Sächsischen Soc.* 1858, p. 140. — *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Leipzig 1863. Heft I, S. 117—139.

gestellt. Den Einfluß der Zeit, welche zwischen zwei solchen Versuchen verstreicht, hat F. HEGELMAYER<sup>1</sup> untersucht.

constanten Fehler in der Vergleichung horizontaler und verticaler Distanzen. Zuerst bemerkt,<sup>2</sup> die constante Abweichung des scheinbar verticalen RECKLINGHAUSEN,<sup>3</sup> letzterer auch die scheinbare Krümmung der geraden peripherischen Theilen des Sehfeldes, die Gesichtstäuschungen an dem ZOELLNER,<sup>4</sup> dessen Entdeckung dann von HERING,<sup>5</sup> A. KUNDT<sup>6</sup> und RT<sup>7</sup> weiter verfolgt wurde.

Die ältere Geschichte und Literatur der Untersuchungen über den blinden Menschen, bei es sich hauptsächlich um den Nachweis der Thatsache und um die richtige Erklärung der Blindheit handelt, ist auf S. 273—274 gegeben. Die Untersuchungen über die Art der Ausfüllung der Lücke in der Vorstellung beginnen mit WEBER's<sup>8</sup> Untersuchungen, denen sich A. FICK und P. DU BOIS-REYMOND<sup>9</sup> und VOLKMANN<sup>10</sup> anschlossen, die fast ausschließlich richtige Localisirungen um den Fleck gesehenen Objecte beobachteten und die Ausfüllung psychologisch erklärten. Dagegen trat WITTICH<sup>11</sup> auf mit der Beobachtung psychischer Localisationen, während FUNCKE<sup>12</sup> auf die Möglichkeit und das Vorhandensein von individuellen Unterschieden in dieser Beziehung aufmerksam machte.

## § 29. Die Richtung des Sehens.

In den bisherigen Thatsachen bezogen sich nur auf die relative Lage der leuchtenden Punkte neben einander im Gesichtsfeld. Wir können nun noch über die Beurtheilung ihrer absoluten Richtung sprechen. Diese ist zunächst zweierlei zu unterscheiden. Im Allgemeinen ist die Richtung einer Linie gegeben durch zwei Winkel, die sie mit den Richtungen zweier gewählter fester Axen oder Ebenen bildet, ohne daß wir dabei verlangen, daß die Linie durch einen bestimmten Punkt gehen solle. Wir können mit jener ersten Linie parallelen Linien die gleiche Richtung geben. Zum Beispiel alle Magnetnadeln, die innerhalb einer Stadt liegen, zeigen die gleiche Richtung von Süden nach Norden. Etwas anders ist es, wenn wir die Richtung nicht nur im Allgemeinen gegen ein bestimmtes Coordinatensystem, wie es im Gebiete einer Stadt etwa durch die Niveauebene und in dieser der terrestrische Meridian gegeben, sondern wenn wir die Richtungen alle auf einen bestimmten Punkt beziehen wollen. Dann sind die Richtungen darzustellen durch

<sup>1</sup> HEGELMAYER, *Vierordt's Archiv* XI, S. 844—853.

<sup>2</sup> De errore quodam optico asymmetria bulbi effecto. Marburg 1851. Auszug in *Zeitschrift für Psychologie*. R. 2. Bd. II. S. 83.

<sup>3</sup> oben citirten Aufsätzen.

<sup>4</sup> Poggendorff's *Annalen* CX, S. 500—523.

<sup>5</sup> Hering, *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig 1861. Heft I, S. 65—80.

<sup>6</sup> RT, *Poggendorff's Annalen* CXX, S. 118.

<sup>7</sup> RT, *Physiologie der Netzhaut*. Breslau 1866. S. 269—271.

<sup>8</sup> WEBER, Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. *Monatsschrift für Psychologie*. 1852. S. 138.

<sup>9</sup> *Archiv für Anat.* 1853. S. 396.

<sup>10</sup> VOLKMANN, *Berichte der Königl. Sächs. Ges.* 30. April 1853. S. 40.

<sup>11</sup> WITTICH, *Archiv für Ophthalmologie*. IX. 3. 1863. S. 1—31.

<sup>12</sup> FUNCKE, *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br.* Bd. III, Heft 3, S. 12 u. 13.



ganz bestimmte gerade Linien, die durch den gewählten Mittelpunkt hindurchgehen, und deren Richtung außerdem durch zwei Winkel zu bestimmen ist, die sie mit passend gewählten festen Axen machen. In diesem Falle kann die Richtung nicht bezeichnet werden durch eine andere parallele Linie, die die gleiche Richtung hat, sondern sie muß dieselbe oder identische Richtung haben, das heisst, wenn hinreichend verlängert, mit der ersten Linie vollständig zusammenfallen.

So lange man nur von Gleichheit der Richtungen spricht, sind also nur Winkel zu bestimmen, welche die Richtung definiren; wenn man von Identität der Richtungen spricht, ist auch der Punkt zu bestimmen, welcher als Mittelpunkt gelten soll. Wir können sagen, daß wir im ersteren Falle nur die Richtung bestimmen, im letzteren Falle eine bestimmte Richtungslinie.

Wenn wir nun von den Richtungen des Sehens sprechen, so beziehen wir diese allerdings auf einen Mittelpunkt, nämlich auf uns selbst und unseren Standpunkt im Raume. Indessen giebt es eine Reihe von Erscheinungen, welche unabhängig sind von der Bestimmung des Mittelpunkts der Richtungslinien. Es sind dies namentlich alle diejenigen, welche beim Sehen entfernter Objecte eintreten können, der Sterne zum Beispiel oder auch weit entfernter Berge und Gebäude. Denn solche Objecte sind 599 wenigstens auch groß, und jede Richtungslinie, die durch irgend einen Punkt unseres Kopfes oder auch unseres Körpers geht, parallel einer bestimmten Richtung, wird das Object treffen.

Die Richtung, in der die Objecte des Sehfeldes liegen, wird im Allgemeinen, abgesehen von den schon bisher besprochenen Täuschungen, bestimmt sein, sobald erstens die Richtung der Blicklinie und zweitens die Richtung irgend eines durch den Blickpunkt gehenden Meridians gegeben ist.

Die Richtung, in welcher der Blickpunkt liegt, wechselt mit der Stellung des Auges gegen den Kopf, beziehlich gegen den Körper; indessen sind wir im Allgemeinen im Stande, die jedesmalige Richtung der Blicklinie richtig zu beurtheilen. Man hat die Empfindungen, auf denen die Wahrnehmung der durch Muskelwirkung veränderten Stellung der Theile unseres Körpers beruht, das Muskelgefühl genannt. Unter diesem Ausdruck sind aber mehrere wesentlich verschiedene Empfindungen von einander zu trennen. Wir können nämlich wahrnehmen

1. die Intensität unserer Willensanstrengung, durch welche wir die Muskeln in Wirksamkeit zu setzen suchen;
2. die Spannung der Muskeln, also die Kraft, mit der diese zu wirken streben;
3. den Erfolg der Anstrengung, der, abgesehen von seiner Wahrnehmung durch andere Sinnesorgane, namentlich Gesicht und Getast, am Muskel sich äußert durch wirklich eintretende Verkürzung, wobei auch an den Gliedern veränderte Spannung der sie bedeckenden Haut möglicher Weise wahrgenommen werden kann.

kann bei sehr ermüdeten Muskeln zum Beispiel im Stande sein, ihnen, daß ich den äußersten Grad von Willensanstrengung anbiete, Muskeln in Spannung zu versetzen, daß aber deren Spannung nicht genügend ist, den Erfolg zu erreichen. Andererseits kann ich bei Muskeln durch eine mäßige Willensanstrengung eine deutlich fühlbare Anspannung der Muskeln hervorbringen, ohne doch wegen irgend eines Widerstandes den Erfolg zu erreichen, den ich wünsche. Alle diese unterscheiden sich in meiner Wahrnehmung von dem Falle, wo Erfolg wirklich erziele, und wir müssen diese verschiedenen Unterschiede in der Theorie des Muskelgefühls unterscheiden.

beschränken uns in der vorliegenden Untersuchung natürlich auf die Augen vorkommenden Verhältnisse.

Am besten zeigen bekannte Erfahrungen, daß wir die Richtung unseres Auges nicht nach der wirklich vorhandenen Stellung unseres Auges beurtheilen, sondern dieselbe durch andere Kräfte als die unserer Muskeln ver-

Wenn man auf den von den Lidern bedeckten Theil des Auges blickt, oder die den Augapfel umgebende Haut zerrt, so werden keine Veränderungen in der Stellung des Augapfels selbst hervor-

Am besten gelingt dies dadurch, daß man am äußeren Augenwinkel die Hautfalte zusammenkneift und dann das Auge nach innen wendet, so daß die den Augapfel bedeckende Bindehaut an der äußeren Seite nach außen wird. Oeffnet man beide Augen, indem man an der Hautfalte zieht, erhält man Doppelbilder, indem das Bild des gezerrten Auges in

in eine anderen Richtung hin verlegt wird, als das Bild des andern, und

nur das erstere Auge, so sieht man bei jedem Zuge an der Hautfalte eine Scheinbewegung der Gegenstände im Gesichtsfelde eintreten. Wenn man nach außen am rechten Auge gerichtete Zug läßt die Gegenstände einander nach links hin weichen. Die Richtung der Gesichtslinie verschiebt sich nach rechts hin verschoben; wir beurtheilen aber die Lage der Gegenstände so, als wenn durch die Zerrung die Richtung der Gesichtslinie unverändert bliebe.

entsprechend zeigt sich, daß die Lage der Nachbilder, im ge-

Augen Auge oder auf einen gleichmäßigen unbegrenzten Schirm projectirt, die Richtung scheinbar unverändert bleibt, während diese Bilder wirklich bewegt werden.

Man läßt auch während einer solchen Zerrung jede durch die Muskeln hervorgerufene Bewegung der Augen die scheinbare Lage der äußeren Gegenstände unverändert, während die Nachbilder sich scheinbar bewegen.

Wir können so durch einen äußerlichen Zug den Augapfel nach außen ziehen, natürlich der innere gerade Muskel desselben um ebenso viel, als der äußere um ebenso viel kürzer, als wenn eine solche Rollung der Augen einwirkte. Denn die Muskeln sind auch im ruhenden Zustand elastische Bänder, welche sich stets so weit verkürzen, als es die Befestigungspunkte erlaubt.

Wir beurtheilen also die Richtung unserer Gesichtslinie weder nach der wirklichen Stellung des Augapfels, noch nach der von ihm abhängigen wirklichen Verlängerung oder Verkürzung der Augenmuskeln.

Dafs wir die Richtung der Gesichtslinie auch nicht nach der Spannung der Augenmuskeln beurtheilen, geht daraus hervor, dafs in solchen Fällen, wo Lähmungen einzelner Augenmuskeln plötzlich eingetreten sind, die Patienten, wenn sie ihr Auge nach einer Richtung zu bewegen streben, nach der sie es nicht mehr bewegen können, Scheinbewegungen sehen, die bei gleichzeitig geöffnetem anderen Auge Doppelbilder hervorbringen. Wenn also zum Beispiel der äufsere gerade Muskel des rechten Auges oder sein Nerv gelähmt ist, so kann das Auge nicht mehr nach der rechten Seite herübergezogen werden. So lange der Patient es nur nach der inneren Seite wendet, macht es noch regelmässige Bewegungen, und er nimmt die Richtung der Objecte im Gesichtsfeld richtig wahr. Sobald er versucht es nach ausen, also nach rechts hin zu wenden, folgt es seinem Willen nicht mehr, sondern bleibt in der Mitte stehen und die Objecte bewegen sich scheinbar nach rechts, obgleich die Stellung des Auges und der Netzhautbilder im Auge unverändert bleibt.

In einem solchen Falle eines gelähmten Muskels tritt in Folge der Willensanstrengung weder Bewegung des Auges, noch Verkürzung der zu verkürzenden Muskeln, noch auch erhöhte Spannung in diesen Muskeln ein. Der Willensact hat ausserhalb des Nervensystems gar keine Folgen mehr und doch urtheilen wir über die Richtung der Gesichtslinie so, als hätte der Wille die normalen Wirkungen ausgeübt; wir glauben, dafs die Gesichtslinie sich in dem letztgenannten Falle nach rechts verschoben habe, und da die Lage der Netzhautbilder auf der Netzhaut des gelähmten Auges hierbei unverändert bleibt, erscheint uns das so, als machten die Objecte die irrtümlich vorausgesetzte Bewegung des Augapfels mit.

Ist die Lähmung nicht vollständig, so dafs das Auge zwar noch ein nach ausen liegendes Object fixiren kann, dazu aber einen gröfseren Aufwand von Innervation des gelähmten Muskels bedarf, als im normalen Zustande, so tritt doch eine falsche Vorstellung von der Richtung der Gesichtslinie und von der Lage des Objectes ein, wie man dadurch erkennen kann, dafs man den Patienten schnell nach dem Objecte greifen läfst. Er greift dann zuerst daneben.<sup>1</sup>

Diese Erscheinungen lassen keinen Zweifel darüber, dafs wir die Richtung der Gesichtslinie nur beurtheilen nach der Willensanstrengung, mittels der wir die Stellung der Augen zu ändern suchen. Es giebt zwar auch gewisse schwache Empfindungen in unseren Augenlidern, wenn sich die Hornhaut unter ihnen verschiebt, welche uns über die wirkliche Stellung des Auges einigermaafsen unterrichten könnten, und ferner fühlen wir bei angestrengten

<sup>1</sup> A. v. GRAEFE im *Archiv für Ophthalmologie*, Bd. I. Abth. I, S. 67. Anmerkung. — A. NAGEL, *Das Sehen mit zwei Augen*, 1861, S. 124—129. ALFRED GRAEFE im *Archiv für Ophthalmologie*, XI. 2. S. 6—16.

regungen der Augen eine ermüdende Spannung in den Muskeln, diese Empfindungen scheinen zu schwach und zu unbestimmt zu dafs sie für die Wahrnehmung der Richtung verwerthet werden

wissen also, welche Willensimpulse und wie stark wir sie anzuwenden in das Auge in eine bestimmte beabsichtigte Stellung zu versetzen. In den gewöhnlichen normalen Umständen sich der Bewegung des Auges fremde Hindernisse entgegensetzen, so kann auch meistens aus dem Willensimpulse der Effect genügend beurtheilt werden, viel geringer wenigstens, als dies bei den Extremitäten und den meisten beweglichen Theilen des Körpers möglich sein würde. Die einzige Ursache des Willensimpulses, die wir am Auge direct und hinreichend wahrnehmen, ist die veränderte Lagerung der Objecte im Sehfeld durch eine neue Stellung des Auges. Es läfst sich nun zeigen, dafs wir in diese Veränderungen des Bildes fortdauernd als Controlle für das Verhältnifs der Willensimpulse zu ihrem Effecte benutzen.

Man setze sich zwei Glasprismen von 16 bis 18 Grad brechenden Winkel in ein Brillengestell zusammen, so dafs die brechenden Winkel nach links gekehrt sind. Die Gegenstände des Gesichtsfeldes erscheinen durch die Prismen alle nach links von ihrem wirklichen Orte abgelenkt. Um zu sehen, wie es zunächst, die Hand in das Gesichtsfeld zu bringen, betrachte man ein bestimmtes erreichbares Object genau, schliesse dann die Augen und versuche mit geschlossenen Augen das Object mit dem Zeigefinger zu treffen; man wird natürlich links daneben vorbeifahren. Wenn man diese Versuche eine Weile fortgesetzt hat, oder noch schneller, wenn man die Hand in das Gesichtsfeld bringt und mit ihr kurze Zeit unter Leitung des Auges die Objecte betastet, so wird man finden, daß bei Wiederholung des erst beschriebenen Versuchs nicht mehr links, sondern die Objecte richtig trifft; ebenso auch neue Objecte, <sup>602</sup>

an die Stelle der schon bekannten bringt. Hat man dies erreicht und die Hand nun, nachdem man die Hand aus dem Gesichtsfelde entfernt, die Augen geschlossen und irgend ein Object angeblickt hat, dies bei geschlossenen Augen zu greifen, so wird man finden, dafs man jetzt mit der Hand vorbeifährt, bis durch mehrere vergebliche Versuche die Blickrichtung, in der die Augen stehen, wieder berichtigt ist.<sup>1</sup>

Bei dieser Berichtigung der Blickrichtung ist dabei nicht etwa das Muskelgefühl der Hand und die Beurtheilung der Hand, sondern die Beurtheilung der Blickrichtung gefälscht wird, daraus, dafs, wenn man, durch die Prismen blickend, sich mit der rechten Hand die gesehenen Objecte zu treffen, und mit der linken Hand berührten Objecte nun bei geschlossenen Augen die linken, vorher gar nicht benutzten und nicht im Gesichtsfelde befindlichen Hand zu treffen sucht, man sie ganz sicher und richtig trifft.

<sup>1</sup> Auch ist von CZERNIAK im Wesentlichen ähnlich angegeben in *Wien. Berichte*. XVII,

Man bestimmt also in einem solchen Falle durch das Tastgefühl den Ort vollkommen richtig und weiß ihn nach dieser Angabe durch ein anderes tastendes Organ sicher zu finden.

Dafs vierteljährige Kinder erst sehr langsam lernen ihre Hände nach Gesichtsobjecten hin zu dirigiren, wenn sie schon sehr gut wissen, sie nach dem Munde oder nach einer juckenden Hautstelle, also mittels Tastempfindungen, zu lenken, lehrt die Erfahrung. Wie also hier die Uebereinstimmung zwischen Augenbewegungen und Handbewegungen erst durch Versuche gelernt wird, so muß ihre Genauigkeit auch bei Erwachsenen durch immer erneute Versuche und Beobachtungen fortwährend controllirt werden.

Ich habe schon früher angeführt, dafs die Uebereinstimmung der Bewegungen beider Augen in ähnlicher Weise gestört werden kann, wenn man durch ein Prisma das Bild des einen Sehfeldes allmählich in die Höhe schiebt; dann folgt das betreffende Auge, und beide Augen fahren fort einfach zu sehen, während das eine etwas mehr nach oben gerichtet ist als das andere. Auch hier kommt es schnell zur Gewöhnung, diese Stellung als die normale Fixationsstellung zu benutzen; und wenn man die Prismen fortnimmt, fährt man fort in derselben Weise zu fixiren, wobei man über einander stehende Doppelbilder der Objecte erhält, die sich erst bei einer Aenderung der Augenstellung schnell wieder vereinigen. Es zeigt sich hierbei, dafs auch die übereinstimmende Stellung beider Augen nach dem Erfolg geregelt wird, indem man sich gewöhnt, solche Willensimpulse zu geben, welche geeignet sind, unter den obwaltenden Umständen beide Fixationspunkte auf dasselbe Object zu richten.

Es gehört hierher ferner die Erfahrung, dafs, wenn man bewegte Objecte längere Zeit zu fixiren bemüht gewesen ist, nachher ruhende Objecte in der entgegengesetzten Richtung bewegt erscheinen. Man bezeichnet das Sehen dieser Scheinbewegungen als Schwindel. Wenn man zum Beispiel in einem Eisenbahnzug fährt und eine Weile nach den draussen dicht an der Bahn befindlichen Gegenständen geblickt hat, dann aber den Blick auf den Fußboden des Wagens wirft, so erscheint dieser, der sich zum Körper des Reisenden in relativer Ruhe befindet, in Richtung des Zuges von ihm fort zu fliehen.

Es erklärt sich dies daraus, dafs die Gegenstände an der Bahn eine scheinbare, der des Zuges entgegengesetzte Bewegung haben. So oft der Reisende einen derselben zu fixiren sucht, muß er seine Augen schnell der Richtung des Zuges entgegen bewegen. Nachdem er sich gewöhnt hat, die unter diesen Umständen ausgeübten Willensimpulse als die für die Fixation eines Objects geeigneten zu betrachten, versucht er in derselben Weise auch ruhende Objecte zu fixiren. Die genannten Willensimpulse bringen aber Bewegungen der Augen hervor, und da der Beobachter seine Augen für festgestellt hält, so scheinen sich ihm nun die Objecte und zwar der vorher angeschauten objectiven Bewegung entgegengesetzt zu bewegen.

Wenn man dagegen, während man aus dem Wagen blickt, etwa ein

an in der Fensterscheibe dauernd fixirt, so kommt der beschriebene Schwindel nicht zu Stande, obgleich man wie vorher bewegte Objecte fliegen sehen, aber ohne die zu ihrer Fixation nöthigen Bewegungen zu thun. Bei ganz fester Fixation eines zum Auge relativ ruhenden Gegenstandes verwischen sich übrigens auch die Bilder der bewegten Objecte voll- oder theilweise bei der für diese Täuschung nöthigen Geschwindigkeit. Man kann dies erkennen, wenn man ihnen kurze Strecken mit den Augen folgt. Diese nöthigen Augenbewegungen bleiben meist unbewusst, und sie sind nach PLATEAU<sup>1</sup> und OPPEL,<sup>2</sup> welche über diese Erscheinungen Beobachtungen angestellt haben, nicht bemerkt worden. Dafs aber solche Augenbewegungen vorhanden sind, folgt aus dem Umstand, dafs bei absolut fester Fixation die bewegten Bilder sich verwischen.

Man beobachtet man bei dem Drehschwindel, wenn man sich mit dem Kopfe eine Weile um seine eigene Längsaxe gedreht hat. So wie man sich wendet, scheinen die Objecte sich noch eine Zeitlang in der Richtung zu bewegen, in der man sich gedreht hat. Ich finde, dafs nach einer Zeit, wenn man die Augen geschlossen hat, diese Art der Scheinbewegung nicht eintritt, sondern die Augen erst öffnet, wenn man wirklich bis zum festen Stehen gekommen ist. Thut man es früher, so tritt eine Scheinbewegung der Gegenstände entgegen, die der bisherigen Drehung des Körpers ein; aber man kann sich auch leicht, dafs der Körper auf den Füfsen noch etwa eine halbe Umdrehung ausführt, ehe er wirklich zu Ruhe kommt, zu einer Zeit, wo man schon für ruhend hält. Dann ist also eine Täuschung über die Ursache der Scheinbewegung der Objecte. Zuweilen tritt übrigens auch diese der objectiven Drehung des Körpers entgegengesetzte Scheinbewegung nach der Drehung mit offenen Augen zum Vorschein, wie denn überhaupt dieser Versuch nicht so rein ist wie die Versuche, bei denen der Körper des Beobachters nicht mitbewegt wird.

Man findet auch solche Arten von Gesichtsschwindel vor, wo verschiedene Theile des bewegten Körpers verschieden gerichtete Bewegungen gehabt haben. 604

z. B. die in *Fig. 196*, S. 531 dargestellte Scheibe mit der Spirale, die, so scheint die Spirale, je nach der Richtung ihrer Drehung, sich fortwährend auszudehnen oder zusammenzuziehen. Hält man die Scheibe plötzlich an, so scheint sie nachher sich einen Augenblick zusammenzuziehen, wenn sie sich vorher ausdehnte, oder auszudehnen, wenn sie sich zusammenzog. Und auch andere Objecte, z. B. ein bedrucktes Blatt, das man unmittelbar nach der Spirale betrachtet, zeigen eine solche - oder Dilatationsbewegung.

Etwas weniger deutlich ist eine ähnliche Schwindelbewegung, die sich nach einer rotirenden sternförmigen Figur einstellt, und wobei der objectiv ruhende Körper, den man betrachtet, sich ein wenig in entgegengesetzter Richtung drehen scheint, als der Stern.

<sup>1</sup> In *Poggendorffs Annalen*, LXXX, 287. — *Bull. de Bruxelles* XVI. 1861, p. 100. — *Benda*, XCIX, 543.

Am deutlichsten werden diese letztern Scheinbewegungen, wenn man den Blick nach dem ruhenden Mittelpunkte der Axe richtet, dabei aber im indirecten Sehen auf die bewegte Figur achtet, welche nicht so schnell rotiren darf, daß man ihre einzelnen Züge nicht mehr wahrzunehmen im Stande wäre, aber auch nicht so langsam, daß man sie ganz ohne Schwierigkeit wahrnimmt. Wenn man ganz scharf den Mittelpunkt der Axe fixirt und nur auf diesen achtet, so hat man allerdings auf den Seitentheilen der Netzhaut, ebenso wie vorher, die bewegte Figur, aber die Schwindelbewegung tritt nicht ein. Es scheint mir daraus hervorzugehen, daß bei diesem Achten auf die bewegte Figur leise Augenbewegungen im Spiele sind, wahrscheinlich kreisförmige Bewegungen, deren Richtung immer auf denjenigen Theil des Sehfeldes hinzielt, auf den die Aufmerksamkeit des indirecten Sehens gerade gerichtet ist. In der That würde ohne solche Bewegungen, die der bewegten Figur nachfolgen, die letztere nicht ganz so deutlich erscheinen können, als sie es bei derjenigen Art des Anblickens thut, die den Schwindel entwickelt. Wenn dieselbe Art des Blickens nachher auf einen ruhenden Gegenstand angewendet wird, muß dieser natürlich eine entgegengesetzte Scheinbewegung zeigen.

So lange wir eine große Zahl ruhender Gesichtsubjecte vor uns haben, ist es leicht, an diesen fortdauernd sich über den Grad der Innervation zu vergewissern, der nöthig ist, um das Auge in bestimmten Stellungen festzuhalten. Wenn man dagegen überwiegend bewegte Massen vor sich hat, ist es schwer, das Urtheil über Ruhe und Bewegung richtig zu erhalten. Wenn man auf einem Balken über einen schnell fließenden Bach gehen will, muß man vermeiden, nach dem Wasser zu sehen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn man auf einem der unteren Gerüste des Schlosses Laufen an den Rheinfall herantritt und nichts vor sich sieht als die stürzende Wassermasse, so entsteht eine Neigung hintenüber zu fallen. Eben deshalb wird man auf Schiffen so verwirrt in der Orientirung; man fühlt den Zug der Schwere scheinbar bald nach rechts, bald nach links, bald nach vorn oder nach hinten gehend, weil man die Richtung der Verticalen nicht mehr zu finden weiß. Nach längerer Gewöhnung erst lernt man, wie ich an mir selbst erfahren habe, die Schwerkraft als Orientierungsmittel brauchen, und  
605 dann hört auch der Schwindel auf. Dem Neuling scheint in der Cajüte eines Schiffs das in Cardanischer Aufhängung befestigte Barometer hin und her zu schwanken, welches in Wirklichkeit immer senkrecht hängt, die Cajüte dagegen festzustehen, während ihn selbst die Schwerkraft bald hier, bald dorthin zerrt. Sobald man den Schwindel verloren hat, sieht man das Barometer feststehen und die Cajüte schwanken. Wie sehr aber hierbei die Sicherheit der Innervation der Augenmuskeln zeitweilig leidet, zeigt sich daran, daß Passagiere, die seekrank waren, sogar nachher am Lande, bei jeder schnellen Bewegung der Augen die Wände des Zimmers, in dem sie sich befinden, scheinbar dieselben Bewegungen ausführen sehen, welche die Cajüte des Schiffs zu machen pflegte.



diese Erscheinungen lassen deutlich erkennen, daß eine fortwährende Controlle der für die Augenstellungen und Augenbewegungen erforderlichen Innervationsstärke durch die Beobachtung ihres Erfolgs an Zerrbildern stattfinden muß, wenn richtige Urtheile über die Richtung der Bewegungslinie und der fixirten Gegenstände gefällt werden sollen.

Eine andere Art von Täuschung, die hierher gehört, hat F. ZÖLLNER<sup>1</sup> beschrieben. Man zeichne auf ein Blatt Papier einen Kreis und schneide in das dunkle und steife Blatt einen Schlitz, der länger ist als der Durchmesser des Kreises und dessen Breite  $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{3}{10}$  dieses Durchmessers beträgt. Man halte das Blatt mit dem Schlitz fest und schiebe das Blatt mit dem Kreise hin und her, so daß der Kreis selbst durch den Schlitz sich vollständig vorbeischiebt, bald in der einen, bald in der anderen Richtung. Unter diesen Umständen erscheint der Kreis wie eine Ellipse, deren größere Axe senkrecht zur Richtung der Bewegung steht. Der Grund davon ist darin zu suchen, daß der Beobachter, während die bewegte Figur zu sehen sich bestrebt, unwillkürlich und ohne zu wissen, ihr mit den Augen folgt, aber mit geringerer Geschwindigkeit. Dadurch entstehen nach einander auf den verschiedenen Stellen der Netzhaut, auf denen der Spalt während dieser Bewegung sich befindet, Eindrücke von dem gerade vorliegenden Stücke des Kreises gerade wie im Anorthoskop, nur daß bei diesem der Spalt selbst bewegt wird, während hier das Auge bewegt ist und der Spalt stillsteht. Der optische Eindruck ist hierbei derselbe, als ob der Spalt sich in der umgekehrten Richtung wie das Auge bewegte, also auch entgegengesetzt zur Richtung der Bewegung der Bilde, und dies giebt im Anorthoskop, wie oben S. 498—500 angegeben ist, eine scheinbare Verkürzung der Figur nach der Richtung der Bewegung.

Die Ursachen der Täuschung sind, kann man annehmen, daß man bei der Geschwindigkeit, welche die Täuschung hervorruft, überhaupt nichts mehr von der Figur erkennen kann, sondern ganz fest einen Punkt am Rande des Spaltes fixirt. Um die Figur zu verfolgen, muß man ihr eben mit dem Auge folgen. Außerdem können auch solche Augenbewegungen bemerkt werden, wie oben gefunden hat.

Wenn man den Kreis sehr langsam hinter dem Spalte vorbeizieht, so<sup>606</sup> ist im Gegentheil in Richtung der Bewegung verlängert zu sein. Es kann von hierher rühren, daß die Theile der Begrenzungslinie, welche im Augenblicke in der einen, wegen der scheinbaren Vergrößerung der spitzen Winkel der Ecken, die Seiten des Spaltes zu stehen scheinen, als sie wirklich stehen würde aber in Wirklichkeit der Fall sein, wenn eine quer verlaufende Linie hinter dem Spalt vorbeigezogen würde, daher der Beobachter die Ellipse nur als eine solche Ellipse deutet.

<sup>1</sup> ZÖLLNER, Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder in *Poggendorff's Annalen*, 1862.

Nachdem wir uns durch die vorher beschriebenen Thatsachen überzeugt haben, daß die Uebereinstimmung zwischen den Wahrnehmungen durch das Gesicht und denen des Tastsinns auch beim ausgebildeten Auge eines Erwachsenen dauernd nur durch die fortlaufende Vergleichung mit der Erfahrung erhalten wird, erledigt sich die so übermächtig viel behandelte Frage über den Grund, warum wir die Gesichtsobjecte aufrecht sehen trotz des verkehrten Netzhautbildes, ganz von selbst. Der Tastsinn an und für sich ist fähig, vollständige Raumanschauungen auszubilden, selbst ohne alle Hilfe durch den Gesichtssinn; wir wissen dies durch die Erfahrungen an blindgeborenen Personen. Ja, die Richtung der Schwere, welche das Oben und Unten bestimmt, wird sogar ausschließlich durch den Tastsinn und nicht durch den Gesichtssinn unmittelbar wahrgenommen. Daß die Gesichtsempfindungen an und für sich, ohne alle vorausgängige Erfahrung Vorstellungen von einer bestimmten Richtung des Gesehenen hervorrufen sollen, ist eine, wie mir scheint, vollkommen unnöthige Hypothese, und noch weniger begründet ist vom Standpunkte der empiristischen Ansicht aus die Voraussetzung, daß die Vorstellung der Richtung hierbei sogar beeinflusst sein soll durch den Ort, wo sich das Bild auf der Netzhaut befindet, daß ein unten abgebildeter Punkt auch deshalb unten erscheinen müßte, während doch das natürliche Bewußtsein nicht einmal von der Existenz einer Netzhaut oder optischer Bilder auf ihr, geschweige denn von der Lage derselben etwas weiß.

In der nativistischen Theorie der Sinneswahrnehmungen, wo man voraussetzt, daß die Nervenreizung auch unmittelbar und unabhängig von aller Erfahrung die Vorstellung eines gewissen Orts des wahrgenommenen Objects hervorbringen soll, muß allerdings vorausgesetzt werden, daß die angeborenen Localisationen durch das Gesicht in einer gewissen angeborenen Uebereinstimmung mit denen durch den Tastsinn sich befinden, sei es nun, daß man sich denkt, die Sehnervenfasern, welche von den unteren Seiten der Netzhäute kommen, wendeten sich im Gehirn nach oben, und es entstände dort ein richtig gestelltes Bild der Objecte, was die Seele anschaute, oder daß man das Anschauen in den Netzhäuten vor sich gehen läßt und die Tastwahrnehmungen entsprechend den auch verkehrt gesehenen eigenen Händen und Beinen des Beobachters ebenfalls verkehrt in dieses Anschauungsbild eintragen läßt, wo dann also alle unsere Raumvorstellung verkehrt sein und bleiben würde. Es ist hier natürlich der weiteste Spielraum für die wildesten Hypothesen eröffnet.

Ich meine, daß eine angeborene Uebereinstimmung der Localisationen durch den Gesichtssinn und Tastsinn den Erfahrungen gegenüber, welche die 607 Wirksamkeit der fortdauernden Controlle für die richtigen Beziehungen beider Sinne auf einander durch die Erfahrung beweisen, nicht festgehalten werden kann, weil man sonst in die Schwierigkeit kommt, daß die angeblich angeborene und durch unmittelbare Empfindung gegebene Uebereinstimmung jeden Augenblick durch Erfahrung, also durch Urtheilsacte so verändert und

gt werden kann, daß von dieser hypothetischen Empfindung sich gar sehr merklich macht.

Des Erachtens hat der Streit über den Grund des Aufrechtsehens psychologische Interesse zu zeigen, wie schwer selbst Männer von der wissenschaftlichen Befähigung sich dazu verstehen, das subjective in unseren Sinneswahrnehmungen wirklich und wesentlich anzuerkennen und in ihnen Wirkungen der Objecte zu sehen, statt unveränderter (*sit venia verbo*) der Objecte, welcher letztere Begriff offenbar sich widerspricht.

Man hat bisher nur untersucht, in welchen Richtungen wir weit entfernte Objecte zu sehen glauben; es bleibt noch übrig, das Centrum zu finden, auf welches diese Richtungslinien bezogen werden, was namentlich die Beurtheilung der Richtung naher Objecte nicht gleichgültig ist. Geistesfrüher ist die Annahme gemacht worden, daß jedes Auge die

Gegenstände in Richtung der auf Seite 91 definirten Richtungslinie aufsuchen setze, wonach dann die Richtungen, in denen nahe Objecte gesehen werden, im Allgemeinen für beide Augen verschieden wären. In dieser Beziehung hat E. HERRING auf eine merkwürdige Thatsache aufmerksam gemacht, vermöge deren wir die Richtung der Gegenstände so wahrnehmen, als ob beide Augen in der Mittelebene stünden und auf ihren gemeinsamen Fixationspunkt gerichtet

wären im Anfang beide Augen *A* und *B*, Fig. 228, hinausblicken

in Richtungen *Aa* und *Bb*,

aber möge dann geschlossen

während *A* noch immer das

weit entfernte Object *a* fixirt

Richtungen beider Augen also

bleiben. Man sieht *a* unter

ändern in richtiger Richtung.

Indem man *A* für einen

gelegenen Punkt *f* der Linie

also die Lage des Auges *A*

Gesichtslinie *Aa*, so wie

das Netzhautbildes von *a* auf

das des Auges *A*, ganz un-

verändert bleiben und das Netzhaut-

Bild etwas weniger scharf

erscheint. Der Erfolg ist, daß eine Scheinbewegung des Objects *a*

etwa in die Richtung *Ac* hinübereückt. So wie man

in unendliche Ferne accommodirt, weicht *a* scheinbar an seinen

Ort zurück.

Verändert sich bei diesem Versuche durchaus nicht die Richtung

der Gesichtslinie *Aa*, wenigstens nicht um eine bemerkbare und in Betracht




Fig. 228.

kommende Größe, sondern nur die Stellung des verschlossenen Auges *B* verändert sich, weil bei dem Streben, für den Punkt *f* zu accommodiren, sich gleichzeitig auch die andere Gesichtslinie auf *f* hinrichtet. Die Gesichtslinie des Auges *B* kommt also, während *f* fixirt wird, in die Richtung *Bf*.

Umgekehrt ist es mir möglich, meine Gesichtslinien etwas divergent zu machen auch bei geschlossenen Augen, so daß das Auge *B* in der Richtung *Bβ* blickt. Diese Divergenz kann ich nur langsam erreichen und sehe deshalb keine deutliche Scheinbewegung. Dagegen tritt eine solche ein, wenn ich mit der Anstrengung für die Divergenz plötzlich nachlasse und nun die Gesichtslinien in parallele Stellung zurückspringen. Dabei sehe ich dann das Object *a* etwa aus der Stellung *γ* nach *a* zurückweichen.

Es hat also nicht nur die Stellung des sehenden Auges *A*, sondern auch die des geschlossenen Auges *B* Einfluß auf unsere Beurtheilung der Richtung, in der der fixirte Gegenstand liegt. Wenn das geöffnete Auge unbeweglich stehen bleibt, das geschlossene Auge sich aber nach rechts oder links bewegt, bewegt sich scheinbar auch der vom geöffneten Auge fixirte Gegenstand nach rechts oder links.

Für meine beiden Augen ist die Größe dieser Scheinbewegung ziemlich verschieden; sie ist gering, wenn das rechte geöffnet ist und fixirt, viel größer, wenn das linke geöffnet, das rechte geschlossen ist. Die Richtung der Gesichtslinie wird also nach den Innervationen, welche auf beide Augen gleichzeitig ausgeübt werden, bestimmt und nicht allein nach der des geöffneten Auges. Dabei dürfen wir wohl vermuthen, daß die scheinbare Richtung der Gesichtslinie im Allgemeinen der mittleren Richtung der Gesichtslinien beider Augen entspricht, wobei aber bei Leuten, die gewöhnt sind, beim Mikroskopiren und Teleskopiren ein Auge vorzugsweise zu gebrauchen, die scheinbare Richtung sich der wahren Richtung der Gesichtslinie des bevorzugten Auges mehr annähert, als der des andern Auges. Genauere Aufschlüsse über die scheinbare gleichzeitige Richtung beider Gesichtslinien werden wir später durch das Phänomen der Doppelbilder erhalten.

Ich habe nun gefunden, daß auch für die scheinbare Lage des Netzhauthorizonts eine ähnliche Abhängigkeit von den Raddrehungen beider Augen besteht, wie für die scheinbare Richtung der Gesichtslinie.

Die darauf bezüglichen Versuche gelangen mir selbst am einfachsten in folgender Weise. Ich spannte über das eine Ende einer cylindrischen Röhre von etwa einem Fuß Länge einen schwarzen Faden als Durchmesser aus, nahm das andere Ende der Röhre vor ein Auge, während das zweite Auge geschlossen war, hielt vor das entferntere Ende der Röhre ein weißes Blatt Papier, so daß ich nichts von den Gegenständen des Zimmers sah, und suchte nun den schwarzen Faden durch Drehung der Röhre um ihre Längsaxe möglichst genau horizontal oder vertical zu stellen, und zwar mit parallel gerichteten Blicklinien, eine Bedingung, die ich auch bei verschlossenem zweiten Auge zu erfüllen gelernt habe. Wenn ich dann das

weiße Papier von dem vorderen Ende der Röhre wegzog, konnte ich die 609 Richtung, welche ich dem Faden gegeben hatte, mit der Richtung verschiedener objectiver horizontaler und verticaler Linien vergleichen, die sich im Zimmer vorfanden. Ich setzte mich bei diesen Versuchen fest auf einen Lehnstuhl und bog den Kopf bald vornüber, bald hintenüber, oder hielt ihn vertical, während die Röhre immer horizontal gehalten, dabei aber bald gerade aus, bald nach rechts, bald nach links gerichtet wurde, so daß sich dabei die Blicklinie nach einander in alle möglichen Lagen gegen den Kopf einstellte.

Es zeigte sich, daß ich in allen diesen Stellungen, soweit das Auge sich ohne fühlbaren Zwang bewegen konnte, bei parallelen Blickrichtungen die horizontal erscheinende Linie wirklich horizontal stellte und die vertical scheinende nur um einen solchen Winkel von der wirklich verticalen abweichen ließ, wie der scheinbar verticale Meridian des betreffenden Auges vom wirklich verticalen abweicht.

Es geht also namentlich aus diesen Versuchen hervor, daß keineswegs in jeder Stellung des Auges der ursprünglich horizontale Meridian, den wir Netzhauthorizont genannt haben, immer für horizontal und der darauf senkrechte für vertical gehalten wird.<sup>1</sup> Im Gegentheil bei seitlich und stirnwärts oder wangenwärts gerichtetem Blick kann der Netzhauthorizont Winkel bis zu zehn Graden mit der Horizontalebene machen, und doch wird auch dann eine wirklich horizontale und in der horizontalen Visirebene liegende Linie für horizontal gehalten.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn man die Augen convergiren läßt. Man schaue bei hintenüber gebogenem Kopfe durch das horizontal geradeaus gerichtete Rohr und richte den Faden bei parallelen Gesichtslinien horizontal. Prüft man seine Richtung, so findet man ihn dann, wie gesagt, wirklich horizontal. Jetzt fixire man einen Punkt des Fadens selbst, oder accommodire möglichst für die Nähe, während die Richtung des Blicks unverändert bleibt. Sogleich erleidet der Faden eine sehr auffallende scheinbare Drehung, und zwar in dem Sinne, wie sich der Netzhauthorizont des anderen Auges des Beobachters dreht, indem dieses Auge aus der Parallelstellung in die Convergenzstellung übergeht. Blickt man also zum Beispiel bei hintenüber gebogenem Kopfe mit dem rechten Auge horizontal gerade aus, so senkt sich bei eintretender Convergenz das rechte Ende des Fadens scheinbar, während sich das linke hebt. Bei vornüber gebogenem Kopfe ist es umgekehrt. Umgekehrt auch für das linke Auge. Soll der Faden bei convergenten Augen horizontal erscheinen, so muß die Röhre um einige Grade im entgegengesetzten Sinne seiner scheinbaren Ablenkung gedreht werden, worauf er bei wiederhergestellten parallelen Blickrichtungen nicht mehr horizontal erscheint. Die hierbei anzuwendenden Drehungen der Röhre

<sup>1</sup> H. v. E. HERRING hat die Regel in dieser Form aufgestellt (*Beiträge zur Physiologie* S. 264), aber er hat nicht in parallelen Augenstellungen experimentirt und nicht in solchen Blickrichtungen, wo sich die Abweichung hätte zeigen können, da sein Fixationspunkt immer in der Medianebene lag.

sind viel bedeutender, als die außerordentlich kleinen wirklichen Drehungen meines beobachtenden Auges bei eintretender Convergenz des andern (siehe Seite 626) und können durch diese nicht erklärt werden.<sup>1</sup>

610 Wir haben hier vielmehr eine Erscheinung gleicher Art, wie bei der Beurtheilung der Richtung der gesehenen Gegenstände. Trotz der unveränderten Haltung des sehenden Auges bringt die veränderte Richtung und Drehung des nicht sehenden ein verändertes Urtheil über die Richtungen der horizontalen und verticalen Linien hervor.

Da nicht alle Beobachter die Fähigkeit haben, willkürlich ohne entsprechenden Fixationspunkt ihre Augen parallel oder convergent zu stellen, habe ich die Methode für parallele Gesichtslinien noch in folgender Weise abgeändert. Vor einer breiten einförmig angestrichenen grauen Wand wurde ein langer schwarzer Faden mit einem kleinen Gewichte vertical aufgehängt. An dem Gewichte waren rechts und links noch horizontale Fäden befestigt, die durch Ringe gingen. Einer dieser Fäden wurde durch ein kleines Gewicht gespannt gehalten, der andere war zum Beobachter hingeleitet, der etwa sechs Fuß von dem verticalen Faden entfernt saß, und je nachdem der Beobachter diesen Faden anzog oder nachließ, wurde der verticale Faden etwas nach rechts oder links von der Verticallinie abgelenkt. Der Beobachter blickte durch eine cylindrische, horizontal gehaltene Röhre nach dem verticalen Faden, so daß er keine anderen verticalen oder horizontalen Linien im Gesichtsfelde hatte, und suchte jenen Faden genau vertical zu stellen. Das untere Ende des verticalen Fadens bewegte sich vor einer kleinen Scale, an der seine Ablenkung abgelesen werden konnte.

Nach dieser Methode hat Herr Dr. DASTICH im Heidelberger physiologischen Laboratorium Versuche angestellt. Sein linkes Auge, welches normalsichtig war, wurde hauptsächlich gebraucht, da das rechte kurzsichtig ist. Um den Faden vertical zu sehen, stellte er das untere Ende desselben stets etwas nach rechts, entsprechend dem Sinne der Abweichung des scheinbar verticalen vom wirklich verticalen Meridian. Die Abweichung von der Verticale betrug:

Linkes Auge.

Kopf senkrecht, geradeaus sehend:	1° 52'
nach rechts sehend:	2° 4'
nach links sehend:	1° 49'
Kopf vorgebeugt, geradeaus sehend:	1° 37'
rechts oder links sehend:	2° 22'
Kopf zurückgebeugt, geradeaus sehend:	1° 37'
rechts oder links sehend:	2° 7'

Rechtes Auge.

Kopf senkrecht, geradeaus sehend:	— 0° 42'.
-----------------------------------	-----------

<sup>1</sup> Messungsreihen über die Größe dieser Winkel konnte ich nicht machen, weil oft wiederholte starke Accommodationsanstrengungen mir bald heftiges Kopfweh machten.

Seitenbewegungen der Augen eine ermüdende Spannung in den Muskeln, aber alle diese Empfindungen scheinen zu schwach und zu unbestimmt zu sein, als daß sie für die Wahrnehmung der Richtung verwerthet werden könnten.

Wir wissen also, welche Willensimpulse und wie stark wir sie anzuwenden haben, um das Auge in eine bestimmte beabsichtigte Stellung zu versetzen. Da unter den gewöhnlichen normalen Umständen sich der Bewegung des Auges keine fremden Hindernisse entgegensetzen, so kann auch meistens aus der Stärke des Willensimpulses der Effect genügend beurtheilt werden, viel vollständiger wenigstens, als dies bei den Extremitäten und den meisten andern beweglichen Theilen des Körpers möglich sein würde. Die einzige Wirkung des Willensimpulses, die wir am Auge direct und hinreichend deutlich wahrnehmen, ist die veränderte Lagerung der Objecte im Sehfeld bei der neuen Stellung des Auges. Es läßt sich nun zeigen, daß wir in der That diese Veränderungen des Bildes fortdauernd als Controlle für das richtige Verhältniß der Willensimpulse zu ihrem Effecte benutzen.

Man setze sich zwei Glasprismen von 16 bis 18 Grad brechenden Winkels in ein Brillengestell zusammen, so daß die brechenden Winkel beider nach links gekehrt sind. Die Gegenstände des Gesichtsfeldes erscheinen durch diese Prismen alle nach links von ihrem wirklichen Orte abgelenkt. Man vermeide es zunächst, die Hand in das Gesichtsfeld zu bringen, betrachte sich irgend ein bestimmtes erreichbares Object genau, schliesse dann die Augen und versuche mit geschlossenen Augen das Object mit dem Zeigefinger zu treffen; man wird natürlich links daneben vorbeifahren. Wenn man aber diese Versuche eine Weile fortgesetzt hat, oder noch schneller, wenn man die Hand in das Gesichtsfeld bringt und mit ihr kurze Zeit hindurch unter Leitung des Auges die Objecte betastet, so wird man finden, daß man bei Wiederholung des erst beschriebenen Versuchs nicht mehr vorbeifährt, sondern die Objecte richtig trifft; ebenso auch neue Objecte, <sup>602</sup> die man an Stelle der schon bekannten bringt. Hat man dies erreicht und versucht man nun, nachdem man die Hand aus dem Gesichtsfelde entfernt, die Prismen weggenommen und irgend ein Object angeblickt hat, dies bei geschlossenen Augen zu greifen, so wird man finden, daß man jetzt mit der Hand rechts vorbeifährt, bis durch mehrere vergebliche Versuche die Beurtheilung der Richtung, in der die Augen stehen, wieder berichtigt ist.<sup>1</sup>

Daß hierbei nicht etwa das Muskelgefühl der Hand und die Beurtheilung von deren Ort, sondern die Beurtheilung der Blickrichtung gefälscht wird, ergibt sich daraus, daß, wenn man, durch die Prismen blickend, sich gewöhnt hat, mit der rechten Hand die gesehenen Objecte zu treffen, und man die mit der rechten Hand berührten Objecte nun bei geschlossenen Augen mit der linken, vorher gar nicht benutzten und nicht im Gesichtsfelde gewesenen Hand zu treffen sucht, man sie ganz sicher und richtig trifft.

<sup>1</sup> Der Versuch ist von CZERNIAK im Wesentlichen ähnlich angegeben in *Wien. Berichte*. XVII, 576—577.



Man denke sich in der Mitte zwischen beiden Augen ein imaginäres mittleres Cyclopedenauge, welches auf den gemeinsamen Fixationspunkt beider Augen gerichtet ist, und dessen Raddrehungen nach demselben Gesetze erfolgen, wie die der beiden wirklichen Augen. Man denke sich die Netzhautbilder aus einem der wirklichen Augen in dieses imaginäre Auge übertragen, so daß Blickpunkt auf Blickpunkt und Netzhautauthorizont auf Netzhautauthorizont fällt. Dann werden die Punkte des Netzhautbildes nach außen projicirt, in der Richtungslinie des imaginären Cyclopedenauges.<sup>1</sup>

Stellen wir also zum Beispiel unser rechtes Auge fest, lassen aber das linke aus paralleler in convergente Stellung übergehen, also sich nach rechts bewegen, wobei es im Allgemeinen auch eine Raddrehung machen wird, so müßte sich auch das Cyclopedenauge um einen etwa halb so großen Winkel nach rechts drehen und eine etwa halb so große Raddrehung machen. Die Folge davon ist, daß die Gesichtsbilder des rechten ruhenden Auges scheinbar um denselben Winkel verschoben und gedreht werden, wie das Cyclopedenauge.

So lange der Fixationspunkt in der Medianebene liegt, erleidet das Cyclopedenauge keine Raddrehung, und dem entsprechend erscheinen für alle diese Stellungen die Netzhautauthorizonte horizontal.

Um die Erklärung dieses sonderbaren Verhaltens zu geben, müssen wir uns erinnern, daß unser natürliches Sehen binocular ist, und daß wir unmittelbar aus der Erfahrung nur lernen die Lagenverhältnisse von Körpern, die wir fixiren, zu beurtheilen in Beziehung auf die Lage unseres eigenen Körpers, den wir fühlen. Rechts für uns ist ein Körper, der rechts von der Mittelebene unseres Körpers liegt, der aber, wenn er dieser näher als unser rechtes Auge ist, mit schwacher Linkswendung des rechten Auges bei starker Rechtswendung des linken gesehen werden kann. Wir gehen nicht darauf aus, die Richtung der Objecte gegen jedes einzelne unserer Augen, nicht einmal gegen unseren Kopf, sondern vielmehr gegen unseren Rumpf, als den Träger unserer Bewegungsorgane zu beurtheilen. Auf die letztere Beziehung kommt es in praktischer Beziehung wesentlich an.

Das sinnliche Zeichen für ein rechts gelegenes Object ist also nicht, daß eines oder beide Augen bei seiner Fixation nach rechts gewendet sind, sondern nur, daß ihre mittlere Richtung nach rechts gewendet ist. Die Eindrücke der einzelnen Augen von einander zu sondern, sind wir auch nur in wenigen Fällen geübt, nämlich in denen, wo es praktische Wichtigkeit hat, wie beim zweiäugigen Sehen von Körpern. Daher sind wir gut geübt, die gemeinsame mittlere Richtung und Drehung beider Augen wahrzunehmen und nach ihr die Lage der fixirten Objecte zu beurtheilen, aber schlecht geübt, die Richtung jedes einzelnen Auges zu beurtheilen oder

<sup>1</sup> Der wesentliche Unterschied gegen die Regel von HERING ist, daß ich das Cyclopedenauge Raddrehungen machen lasse, während HERING dessen Netzhautauthorizont immer in der Visirebene liegen läßt.

Pünktchen in der Fensterscheibe dauernd fixirt, so kommt der beschriebene Gesichtsschwindel nicht zu Stande, obgleich man wie vorher bewegte Objecte hat vorbeifliegen sehen, aber ohne die zu ihrer Fixation nöthigen Bewegungen zu machen. Bei ganz fester Fixation eines zum Auge relativ ruhenden Punktes verwischen sich übrigens auch die Bilder der bewegten Objecte vollständig bei der für diese Täuschung nöthigen Geschwindigkeit. Man kann diese nur erkennen, wenn man ihnen kurze Strecken mit den Augen folgt. Die dazu nöthigen Augenbewegungen bleiben meist unbewusst, und sie sind deshalb von PLATEAU<sup>1</sup> und OPPEL,<sup>2</sup> welche über diese Erscheinungen Beobachtungen angestellt haben, nicht bemerkt worden. Dafs aber solche Augenbewegungen vorhanden sind, folgt aus dem Umstand, dafs bei absolut fester Fixation die bewegten Bilder sich verwischen.

Dasselbe beobachtet man bei dem Drehschwindel, wenn man sich mit offenen Augen eine Weile um seine eigene Längsaxe gedreht hat. So wie man anhält, scheinen die Objecte sich noch eine Zeitlang in der Richtung fortzubewegen, in der man sich gedreht hat. Ich finde, dafs nach einer Drehung mit geschlossenen Augen diese Art der Scheinbewegung nicht eintritt, so bald man die Augen erst öffnet, wenn man wirklich bis zum festen Stehen gekommen ist. Thut man es früher, so tritt eine Scheinbewegung der Gegenstände entgegengesetzt der bisherigen Drehung des Körpers ein; aber man überzeugt sich auch leicht, dafs der Körper auf den Füfsen noch etwa eine Viertelkreisdrehung ausführt, ehe er wirklich zu Ruhe kommt, zu einer Zeit, wo man ihn schon für ruhend hält. Dann ist also eine Täuschung über die Haltung des Körpers Ursache der Scheinbewegung der Objecte. Zuweilen kommt übrigens auch diese der objectiven Drehung des Körpers entgegengesetzte Schwindelbewegung nach der Drehung mit offenen Augen zum Vorschein, wie denn überhaupt dieser Versuch nicht so rein ist wie die andern, bei denen der Körper des Beobachters nicht mitbewegt wird.

Es kommen auch solche Arten von Gesichtsschwindel vor, wo verschiedene Theile des bewegten Körpers verschieden gerichtete Bewegung gehabt haben. 604 Wenn man z. B. die in *Fig. 196*, S. 531 dargestellte Scheibe mit der Spirale rotiren läfst, so scheint die Spirale, je nach der Richtung ihrer Drehung, sich entweder fortdauernd auszudehnen oder zusammenzuziehen. Hält man die Scheibe plötzlich an, so scheint sie nachher sich einen Augenblick zusammenzuziehen, wenn sie sich vorher ausdehnte, oder auszudehnen, wenn sie sich vorher zusammenzog. Und auch andere Objecte, z. B. ein bedrucktes Blatt Papier, was man unmittelbar nach der Spirale betrachtet, zeigen eine solche Contractions- oder Dilatationsbewegung.

Viel weniger deutlich ist eine ähnliche Schwindelbewegung, die sich nach Anblick einer rotirenden sternförmigen Figur einstellt, und wobei der objectiv ruhende Körper, den man betrachtet, sich ein wenig in entgegengesetzter Richtung zu drehen scheint, als der Stern.

<sup>1</sup> PLATEAU in *Poggendorffs Annalen*, LXXX, 287. — *Bull. de Bruxelles* XVI.

<sup>2</sup> OPPEL ebenda, XCIX, 543.

ich aber eine deutlichere Vorstellung vom Orte des Fingers, wenn ich bei geschlossenen Augen seine Spitze mit dem Daumen derselben Hand berühre und reibe. Dann bin ich in der That im Stande, schon bei geschlossenen Lidern die Augen so einzustellen, daß ich den Finger einfach sehe im Augenblick, wo ich sie aufschlage. Dasselbe geschieht auch, wenn ich mit dem Finger einen äußeren festen Körper berühre und betaste.

Wenn nun endlich durch die Vergleichen der Tast- und Gesichtswahrnehmungen die Kenntniß der Richtung gewonnen ist, in der wir die gesehenen objectiven Gegenstände zu suchen haben, so ergibt sich daraus auch schliesslich die Localisation der anderweitig entstandenen optischen Bilder und subjectiven Erregungen unserer Netzhaut und unseres Sehnervenapparats.

Wir verlegen nämlich alle Erregungen der Sehnervenfasern nach dem Gesetze hinaus in den Raum, daß wir Lichterscheinungen in denjenigen Theilen des Sehfeldes oder beider Sehfelder zu haben glauben, in denen körperliche Objecte erscheinen würden, welche im Stande wären, durch ihr Licht die entsprechenden Stellen der Netzhäute zu beleuchten. Die Richtigkeit dieser Behauptung zeigt sich einfach dann, wenn wir subjective Erscheinungen hervorrufen, während gleichzeitig wirkliche Objecte im Gesichtsfelde gesehen werden. Wenn wir z. B. ein Nachbild von der Sonne im Auge entwickelt haben und nach der Landschaft hinsehen, so deckt sich  
614 dieses Nachbild mit gewissen äußeren Objecten, welche wir wegen der Existenz des Nachbildes schlechter sehen, als wir sonst gethan hätten. Gewisse Theile der Netzhaut sind ermüdet; die Bilder derjenigen äußeren Objecte, welche sich darauf abbilden, sind dunkler als sonst. Der Inbegriff dieser dunkleren Objecte im Gesichtsfelde ist das Nachbild. Es ist also selbstverständlich, daß das Nachbild im Gesichtsfelde zusammenfällt mit denjenigen Objecten, welche sich auf der ermüdeten Stelle der Netzhaut abbilden. Ebenso können Schatten entoptischer Objecte, Gefäßfiguren, Druckbilder, elektrische Bilder im Gesichtsfelde mit äußeren Objecten zusammenfallen. Eine solche Coincidenz bewirkt allemal, daß die Empfindung des von außen kommenden Lichts gewisser Punkte des Gesichtsfeldes entweder ausgelöscht, oder geschwächt, oder mit anderen subjectiven Lichtempfindungen gemischt wird. Indem wir die entsprechende Veränderung in dem Aussehen gewisser äußerer Punkte bemerken, kann natürlich die Veränderung im Gesichtsfelde nicht anders localisirt werden, als diejenigen Punkte, welche verändert erscheinen, schon localisirt sind, und die subjective Erscheinung muß nach denselben Regeln in die Außenwelt hinausverlegt werden, welche als Ergebnis der Erfahrung für die durch wirkliches äußeres Licht wahrgenommenen Punkte erlernt worden sind.

Nun können freilich einzelne subjective Lichterscheinungen auch im ganz dunklen Gesichtsfelde vorkommen, wo sie natürlich nach derselben Regel localisirt werden. Wenn sie hier auch nicht mit wahrnehmbaren Bildern wirklich gesehener äußerer Gegenstände zusammenfallen, so ist doch

Stelle der Netzhaut durch Erfahrung die Richtung schon bekannt, so gesehene Objecte liegen müßten, die sich auf ihr abbilden, mit alsdann das subjective Phänomen zusammenfallen würde. Daß auch in den Felde die subjectiven Erscheinungen, Nachbilder zum Beispiel, denselben Gesetze wie die Eindrücke wirklich gesehener Objecte werden, zeigt sich empirisch dann, wenn wir das dunkle Gesichtsfeld, das Auge zu bewegen, plötzlich hell machen; so sehen wir auch das Licht und zwar ohne daß es seinen Platz veränderte, nunmehr mit denselben Objecten vor uns zusammenfallen und diese decken. Da es nun der Übergang von Dunkel zu Hell seinen Platz nicht änderte, so war es vorher so localisirt, wie die äußeren Objecte, mit denen es zusammenfiel.

Betrachtungen lassen wohl über die Richtigkeit unseres Gesetzes kein Zweifel, wonach jeder Eindruck auf die Netzhaut genau in dem Theile des Gesichtsfeldes verlegt wird, wo ein äußeres Object sich befindet, welches passend gelegen ist, um bei geradlinigem Einfall des Lichts in das Auge denselben Eindruck auf die Netzhaut zu machen. Das Gesetz läßt sich auch durch directere Versuche erweisen, aber nicht mit sehr großer Schärfe. Wir wissen, daß ein rechts gelegenes Object auf der linken Seite der Netzhaut abgebildet wird, ein Object oben auf der rechten, ein oben liegendes unten, ein unten liegendes oben. Bei Leuten mit dünnen und durchscheinenden Augenhäuten sieht man das optische Bild eines sehr hellen Lichtes, ja sogar an den Stellen durch die Sclerotica scheinen sehen (S. 86). Wenn wir die rechte Seite des Auges mit dem Nagel drücken, sehen wir das Licht links (S. 236). Wenn wir durch eine Brennlinse starkes Licht auf die rechte Seite der Sclera auffallen lassen, erscheint uns links im Gesichtsfelde eine entsprechende Lichterscheinung. Wenn wir an der Stelle einen absteigenden elektrischen Strom aus dem Auge ausströmen, erscheint uns ebenfalls links der entsprechende helle Fleck. Wenn wir das Auge dagegen links reizen, haben wir die subjective Erscheinung rechts im Gesichtsfelde, wenn wir unten reizen, haben wir sie oben, wenn wir oben reizen, haben wir sie unten.

Die optischen Täuschungen, welche auf diesem Principe beruhen, sind sehr zahlreich. Wir können sie in folgende Hauptklassen eintheilen:

1. Lichtstrahlen des Objects sind, ehe sie in das Auge kommen, von ihrem Wege abgelenkt worden durch Reflexion, Refraction oder Diffraction. Wenn das Licht nach der Veränderung seines Verlaufes concentrisch bleibt, so glauben wir im Allgemeinen, mit Vorbehalt wegen der oben erwähnten Urtheilstäuschungen, das Object an derjenigen Stelle des Gesichtsfeldes zu sehen, wo der Durchschnittspunkt der in das Auge eintretenden (oder rückwärts verlängerten) Strahlen liegt. Wir nennen diesen Punkt deshalb das optische Bild des Objectes (S. 55). Von dem Orte und den optischen Wirkungen unserer dioptrischen und katoptri-

schen Fernröhre und Mikroskope, unserer ebenen und kugelig gekrümmten Spiegel, der Loupen und anderer Glaslinsen, so wie auch der Prismen, wenn sie so angewendet werden, daß sie merklich homocentrisches Licht geben. Ich brauche hier auf die Wirkung dieser Instrumente nicht näher einzugehen, da die Lehre davon einen breit und sorgfältig ausgebildeten Zweig der physikalischen Optik bildet. Alle diese Instrumente entwerfen optische Bilder der Objecte, welche wir statt der letzteren zu sehen glauben, sie bringen also optische Täuschungen hervor, aber solche, deren Irrthum wir leicht zu vermeiden wissen, während wir im Stande sind an den vergrößerten oder sonst veränderten optischen Bildern mancherlei zu erkennen, was wir bei directer Betrachtung des Objects nicht erkennen können. Ein ebener Spiegel läßt uns die Objecte von einem Standpunkte aus sehen, den wir in Wirklichkeit oft nicht einnehmen können, nämlich vom Standpunkte eines hinter der Spiegelebene befindlichen Beobachters, der z. B. unser eigenes Gesicht von vorn erblickt, was wir direct nicht können. Ein Prisma trennt uns die Bilder eines lichten Objects, welche den verschiedenen einfachen Farben seines Lichts entsprechen, und so fort.

Wenn bei der Veränderung des Weges das Licht nicht homocentrisch bleibt, erblicken wir dagegen mehr oder weniger verwaschene lichte Stellen in denjenigen Theilen des Gesichtsfeldes, welche den beleuchteten Stellen der Netzhaut entsprechen. Von dieser Art sind die Erscheinungen des Regenbogens, die Diffractionsfransen, das Glitzern bewegten Wassers und so weiter.

2) Das Licht fällt geradlinig in das Auge, letzteres ist aber nicht für den leuchtenden Punkt accommodirt. Ist die Pupille frei, so erscheinen in einem solchen Falle im Gesichtsfelde statt leuchtender Punkte leuchtende Flächen mehr oder weniger unregelmäßig gebildet in Form  
 616 der bekannten strahligen Figur kleiner Zerstreuungskreise (S. 170); kleinere Objecte, wie die Mondsichel, erscheinen sehr gewöhnlich als doppelt oder mehrfach (S. 171 u. 172). Es sind diese Erscheinungen bedingt dadurch, daß das Licht eines Punktes des Objects nicht mehr auf einen einzelnen Punkt der Netzhaut concentrirt wird, sondern sich über eine kleine Fläche derselben zerstreut. Der beleuchteten Netzhautfläche entsprechend wird eine flächenhaft ausgebreitete Lichterscheinung im Gesichtsfelde gesehen.

Wenn nicht die ganze Pupille frei ist, sondern man durch ein Kartenblatt mit einer engen Oeffnung blickt, so erscheinen die Objecte auch in falscher Richtung und Größe; bewegt man das Kartenblatt, so bewegt sich auch scheinbar der Gegenstand, wie dies auf S. 118 erklärt ist. Hier hat allerdings jeder helle Punkt des Objects ein fast punktförmiges Bild auf der Netzhaut, aber dieses hat wegen der mangelhaften Accommodation des Auges nicht seine normale Lage.

Wenn man durch Kartenblätter mit zwei oder drei Oeffnungen sieht, erblickt man bei mangelhafter Accommodation die Objecte verdoppelt oder verdreifacht.

Die Versuche sind wichtig, weil sie erkennen lassen, daß auch die Accommodation des Auges mit zu den Bedingungen des normalen Sehens gehört, auf welches sich die Einübung bei der Localisation der Drucke bezieht. Wir projiciren die Zerstreuungskreise oder die Zerstreuungskreise, welche beim Sehen durch enge Oeffnungen eintreten, so in das Gesichtsfeld, als wären es Bilder, die bei genauer Accommodation gebildet wären. Für jeden beleuchteten Punkt der Netzhaut tritt auch dabei wieder ein lichter Punkt in das Gesichtsfeld. Es sind diese Versuche bei der Entwicklung der physiologischen Optik Wichtigkeit gehabt, weil sie erkennen ließen, daß nicht die Richtung, in der ein Lichtstrahl in das Auge gelangt, noch die Richtung, in der die Netzhaut trifft, sondern nur der Ort der Netzhaut, welcher getroffen wird, die Richtung der Projection bestimmen. Betrachtet man auf S. 119, so weichen hier die Projectionslinien  $f\varphi$  und  $g\gamma$  wesentlich von den wirklichen Richtungen der gebrochenen und ungebrochenen Strahlen ab.

Es erscheinen körperliche Objecte aus dem Auge selbst, optischen Objecte: fliegende Mücken, Gefäßsschatten, Netzhautschatten, wie sie in § 15 und zum Theil in § 25 beschrieben sind. Sie durchdringen die hintere Schicht der Netzhaut und erscheinen deshalb im Gesichtsfelde selbst als Schatten. Die optische Täuschung versetzt uns so Gegenstände, die im Auge liegen, nach außen und zwar in verkehrter Lage, da gewöhnlich der Schatten des Objects auf der Netzhaut aufrecht stehend ist. Da die Lage dieser Gebilde sich nicht auf ihre subjective Erscheinung bestimmen läßt, so lehren sie für die Wissenschaft Neues.

Die Nerven werden gereizt, oder ihre Erregungsstärke ändert. In diesen Fällen ist nicht das Licht selbst, sondern die Reizung verändert; hierher gehören die Druckbilder, das Accommodationsphänomen, die leuchtenden Garben an der Eintrittsstelle des Sehnervs, die Bewegung des Auges, das Eigenlicht der Netzhaut, die elektrischen Erscheinungen, wie sie in § 17 beschrieben sind. Bei dieser letzten Art der Erscheinungen besteht die Täuschung nicht mehr allein in einer Vertheilung der Lichtstrahlen, sondern in der Localisation eines leuchtenden oder dunklen Objects. Es ist vielmehr beides vorhanden, sondern nur die Empfindung, welche der Regel nach bei solchen Objecten hervorgebracht zu werden pflegt.

Bei wachen Menschen im wachen Zustande treten alle diese täuschenden Erscheinungen, welche wir beschrieben haben, im Gesichtsfelde wohl auf, lassen sich nicht einmal beseitigen durch die bessere Einsicht, sondern als Täuschungen anerkannt werden. Indessen ist diese bessere Einsicht der Regel nach vorhanden, die Täuschung ist als Täuschung anerkannt, wenn wir durch ein optisches Instrument oder in einen Spiegel schauen, wenn wir wissen, daß wir unter abgeänderten Bedingungen sehen, und wenn wir die richtigen Urtheile über die wirkliche Beschaffenheit der

Gegenstände mittelst des falschen Bildes fällen. Wir lernen zum Beispiel nach dem Anblick des Spiegelbildes uns rasiren, kämmen u. s. w., trotzdem dieses Bild überall rechts und links verkehrt zeigt. Wir lernen nach einiger Uebung mit Nadeln unter der Loupe oder selbst unter dem zusammengesetzten Mikroskope zu präpariren, obgleich beide Instrumente jede Bewegung unserer Hand in übertriebener Gröfse, das letztere auch in verkehrter Richtung zeigen, so dafs wir also sogar eine neue Einübung unserer Bewegungen nach falschen optischen Bildern ausbilden können.

Bei den übrigen Erscheinungen, welche in dem Auge selbst ihren Grund finden, scheint es namentlich der Umstand, dafs die subjectiven Phänomene sich mit dem Auge bewegen, zu sein, welcher sie als subjectiv erkennen läfst. Bei schnell aufblitzenden Erscheinungen der Art, welche ebenso schnell wieder verschwunden sind, fällt dieses Merkmal fort, und da kann man in der That oft zweifelhaft sein, ob man etwas Wirkliches gesehen habe. Wenn man zum Beispiel im Finsternen seinen Weg sucht und im indirecten Sehen bei einer Bewegung des Körpers und Auges seitlich ein Lichtschein aufblitzt, ist mitunter der bestunterrichtete Beobachter aufser Stande bestimmt zu sagen, ob ein solcher objectiv oder subjectiv war. Dafs manche Gespenstergeschichten durch solche subjective Erscheinungen hervorgerufen sind, ist sehr wahrscheinlich. Das Eigenlicht der Netzhaut ist reich an Gestaltungen, denen von einem furchtsamen Menschen leicht allerlei wunderliche Deutungen untergeschoben werden können, namentlich wenn er das Auge starr auf die gefürchtete Erscheinung richtet und daher nicht bemerken kann, dafs sie sich mit dem Auge bewegt. In Fiebern und Gehirnkrankheiten, wo die regelrechte Verbindung der Vorstellungen gestört ist, die einzelnen nicht fest gehalten, verglichen und combinirt werden können, fehlt dann auch die zur Anerkennung der subjectiven Natur der genannten optischen Erscheinungen nöthige Ueberlegung, und es knüpfen sich daran häufig phantastische Vorstellungen. Im Säuerwahnsinn sind schwarze Flecke im Gesichtsfelde, welche sich mit dem Auge schnell umherbewegen; diese erwecken die Vorstellung von herumlaufenden Mäusen, schwarzen Käfern oder Fliegen. In Fieberphantasien erkennt man aus den Beschreibungen der Kranken dagegen  
 618 oft die lichten und farbigen Punkte und Kreise wieder, welche bei leichtem Druck auf das Auge auch bei Gesunden hervorgebracht werden können und bald für Feuerfunken, bald für feurige Augen u. s. w. gelten.

Bei den bisher beschriebenen Erscheinungen ist von uns immer angenommen worden, dafs der Kopf aufrechte Haltung habe, oder wenn nicht, dafs wir eine richtige Kenntnifs seiner Neigung haben. Schliesslich ist noch eine Täuschung zu erwähnen, welche von einer falschen Schätzung der Richtung des Kopfes herrührt. AUBERT<sup>1</sup> brachte in einem Fensterausschnitt eines übrigens verdunkelten Zimmers einen Spalt von 5 Centimeter Länge und 2 Centimeter Breite an, der den einzigen hellen und sichtbaren Gegen-

<sup>1</sup> H. AUBERT, *Virchow's Arch. f. pathol. Anatomie*. Bd. XX.



dem umgebenden Raume bildete. War diese helle Linie vertical, so neigte er den Kopf nach rechts, so daß das rechte Ohr sich nach unten so erschien die Linie geneigt von rechts unten nach links oben. Wenn der Kopf nach links gab die entgegengesetzte Scheinverschiebung. War die Linie unter 45 Grad gegen den Horizont geneigt und neigte er den Kopf nach links unten nach rechts oben, so erschien sie bei der Neigung des Kopfes nach rechts vertical, ja über die Verticale hinaus nach entgegengesetzter Richtung gedreht. Bei der Neigung nach links erschien die Linie horizontal, ja über die Horizontale hinausgedreht. Das Maximum der Helligkeit der hellen Linie trat ein, wenn der Kopf um etwa  $135^\circ$  geneigt war. Die Drehung der hellen Linie folgt der Neigung des Kopfes, wenn langsam ausgeführt wird, ziemlich unmittelbar; neigt man aber den Kopf plötzlich bedeutend, so vergehen einige Secunden, bevor die Linie die Drehung vollendet.

Wenn man bei unverändert schiefer Haltung des Kopfes das Zimmer umdreht, so erscheint die verticale Linie wieder vertical. Läßt man den Kopf auslöschen, so geht sie in ihre frühere Neigung zurück.

Man kann es hierbei nicht zu thun mit einer wirklichen Drehung des Kopfes, wie man sich mit Hilfe von Nachbildern überzeugen kann. Der verticale Meridian des Auges entwickeltes Nachbild scheint bei Drehung des Kopfes um einen rechten Winkel nach rechts im dunklen Zimmer nicht horizontal zu liegen, wie es wirklich liegt, sondern schräg von links unten nach rechts oben, und eine objective helle Linie, welche wirklich dieselbe Neigung hat, erscheint vertical.

Die Täuschung beruht vielmehr darauf, daß wir im Dunkeln die Seitenansicht unseres Kopfes für kleiner halten, als sie wirklich ist.

Im dunklen Zimmer zu beobachten, kann man die Linie auch an einer weiß angestrichenen Wand anbringen und vor das Gesicht einen weißen Schirm anbringen, der den Anblick aller seitwärts gelegenen Gegenstände verhindert.

Man höre hierher ferner die bekannten Erscheinungen über die Scheinbewegung der gesehenen Gegenstände, wenn unser Körper selbst auf einer Bahn hin- und hergeht oder in einem langsam und leise vorwärts bewegten Eisenbahnwagen Bewegung ist, oder umgekehrt die täuschende Erscheinung einer scheinbaren Bewegung, wenn wir selbst zwar ruhig sitzen, aber die Gegenstände um uns herum sich in Bewegung befinden, 619

Die häufigsten Gegenstände mit constanter Geschwindigkeit bewegt werden. Das größte Beispiel der ersteren Art ist die scheinbare Ruhe der Sterne, während die scheinbare Bewegung des Sternenhimmels. Zweifel entstehen, wenn auf einer Station zwei Eisenbahnzüge neben einander stehen. Wenn dann einer von beiden sich in Bewegung setzt, ist es oft schwierig zu ermitteln, ob dies der eigene oder der andere ist, wenn es nicht feststehende Theile des Erdbodens oder der Gebäude zu sehen. Auf Eisenbahnstationen mit drehbarem Kuppeldach, wie solche für die Auf-

stellung des Heliometers gebraucht werden, tritt bei der Drehung des Daches wohl die Täuschung ein, daß sich der Fußboden drehe und das Dach still stehe.

Im Allgemeinen hält man dabei gewöhnlich den größeren Theil des gesehenen Gesichtsfeldes für ruhend, den kleineren für bewegt. Dann kommt aber hinzu, daß wir beim Anfange einer Bewegung Stöße oder Erschütterungen unseres Körpers oder wenigstens Wirkungen der Trägheit seiner schweren Masse zu fühlen erwarten. Wenn nun die Bewegung sehr leise beginnt, wie die eines Nachens, so glauben wir nicht uns in Bewegung zu befinden, oder wenn wir Stöße gefühlt haben, wie von einem dicht daneben fahrenden Eisenbahnzuge, die sich auf den stehenden übertragen, so glauben wir bewegt zu sein. Wenn die eine oder andere Deutung gleich möglich ist, kann der Beobachter auch willkürlich die eine oder andere Anschauung in sich erzeugen.

Für die Beobachtung des Gesichtsschwindels, der durch eine angeschaute Bewegung entsteht und den Herr J. J. OPPEL an strömendem Wasser (dem Rhein bei Schaffhausen kurz vor dem Falle) bemerkt hatte, hat derselbe einen Apparat construiert, den er Antirrheoskop nennt und mit dem man die Erscheinung jederzeit beobachten kann. Derselbe besteht aus fünf parallel neben einander liegenden Walzen von  $2\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser und  $2\frac{1}{2}$  Fuß Länge, welche durch eine größere Rolle alle nach derselben Richtung in Umdrehung gesetzt werden können. Jede Walze ist mit weißem Papier überzogen, auf dem je zwei schwarze Spiralen von je  $2\frac{1}{2}$  Windungen gezeichnet sind. Jede Spirale besteht wiederum aus einem breiten mittleren schwarzen Streifen von  $1\frac{1}{2}$  Zoll Breite, neben dem in einer Entfernung von je einem halben Zoll zwei schmalere schwarze Streifen von einem halben Zoll Breite hergehen. Das weiße Band zwischen dem schwarzen Streifen der einen und der nächstbenachbarten Spiralwindung hat dann wieder  $1\frac{1}{2}$  Zoll Breite, so daß Weiß und Schwarz symmetrisch vertheilt sind. Wird nun die größere Scheibe, deren Rand mit Reibung an den Enden der Walzen schleift, gedreht, so drehen sich alle Walzen in gleichem Sinne, die mittleren mit etwas größerer Geschwindigkeit als die äußeren, um die ungleiche Bewegung des Wassers im Flusse nachzuahmen. Die Spiralbänder scheinen dann mit gleichförmiger Geschwindigkeit sich der Länge der Walzen parallel zu verschieben, und wenn der Beobachter eine Zeit lang auf die scheinbar bewegten Bänder hingeblickt hat und nun auf ruhige Objecte sieht, scheinen diese rückwärts zu gehen.

Herr OPPEL hat vor den Walzen auch noch ein Gesichtszeichen befestigt, um den Blick fixirt zu halten. Da aber bei fester Fixation dieses Zeichens, wie es scheint, der Versuch ihm oft mißlungen ist, und er glaubte, daß feste Fixation zur Erzeugung des Schwindels nöthig und daß die feste Fixation nur durch den Anblick der bewegten Masse gehindert sei, so hat er als Fixationszeichen ein rautenförmiges Holztäfelchen von  $\frac{1}{2}$  Zoll Breite und  $\frac{1}{4}$  Zoll Höhe angewendet, welches selbst langsam durch die Mechanik des Instrumentes gedreht wurde und dem Beschauer bald die eine, bald die andere Seite zukehrte. Hiermit gelangen die Versuche, weil, wie ich selbst meine, durch diese  
620 Einrichtung dauernde feste Fixation ein und desselben festen Punktes unmöglich gemacht war, da jeder Punkt des Holztäfelchens, den man etwa hätte fixiren wollen. abwechselnd schwand und wieder zum Vorschein kam. Ich selbst muß nach meinen Versuchen gerade das Entgegengesetzte von OPPEL behaupten, nämlich, daß bei ganz strenger Fixirung des Blicks der Schwindel nicht zu Stande kommt, sondern nur durch die unwillkürlichen und meist unbewussten kleinen Bewegungen, mittels deren wir den bewegten Körpern folgen. Darin aber hat OPPEL Recht, daß größere willkürliche Bewegungen des Auges, mit denen wir bewußter Weise eine längere Strecke hindurch dem bewegten Körper folgen, der Täuschung hinderlich sind.

torisches. Dafs man die Objecte aufrecht sieht, ohngeachtet ihre Netzhautbilder ind, schrieb KEPLER<sup>1</sup> der Seele zu, welche den Eindruck auf einen untern Theil aut sich so vorstellen soll, als wenn er von den Strahlen eines höheren Punktes entstände. Ebenso SCHREINER,<sup>2</sup> PRIESTLEY<sup>3</sup> leitet diese Eigenthümlichkeit der orstellungen aus der Vergleichung mit dem Tastsinn her. DESCARTES<sup>4</sup> erläutert die Methode, die Gröfse, Lage und Entfernung der Gegenstände aus der Richtung naxen zu beurtheilen, indem er sie vergleicht mit der Art, wie ein Blinder von e und Entfernung einer Sache vermittels zweier Stäbe, selbst von unbekannter theilt, wenn seine Hände, worin er die Stäbe hält, in einer bekannten Entfernung gegen einander sind. Uebrigens veranlafste die Frage wegen des Aufrecht- r Objecte eine grofse Menge von Schriften.<sup>5</sup>

LER<sup>6</sup> fand auch schon die richtige Regel für die scheinbare Lage der durch oder spiegelnde Instrumente gesehenen Objecte, indem er sie in den zpunkt der in das Auge tretenden Strahlen verlegte. Die Schwierigkeiten, iter zu vielfachen Discussionen über diesen Punkt führten, betrafen nicht sowohl ng, in der das Object gesehen wurde, als vielmehr seine Entfernung, wovon len Abschnitt zu sprechen sein wird.

ERFIELD<sup>7</sup> glaubte, dafs wir vermöge einer ursprünglichen Einrichtung unserer Gegenstände irgendwo in der geraden Linie sehen, die senkrecht auf die n der Stelle, wohin das Bild fällt, gezogen wird. Dieselbe Annahme wurde auch WERT,<sup>8</sup> BARTELS<sup>9</sup> und vielen Anderen festgehalten. VOLKMANN<sup>10</sup> hat für die der Netzhaut die Richtungslinien gesetzt, welches nach der auf S. 91 gegebenen die durch das Netzhautbild und den (hintern) Knotenpunkt des Auges gezogenen l. Diese Linien sind in der That die richtigen, um objectiv bei physikalischen ngen den leuchtenden Punkt zu finden, wenn der Ort des Netzhautbildes in commodirten Auge und dessen Stellung vollständig gegeben sind. So spielen chtungslinien eine wichtige Rolle in der physiologischen Optik, namentlich, darum handelt, zu ermitteln, mit den Bildern welcher äufseren Objecte irgend gungen der Netzhaut durch Licht oder durch innere Reize sich decken. So so den Ort der gesehenen Gegenstände objectiv richtig beurtheilen, so weit n's Darstellungsweise im Recht. Eine solche richtige Beurtheilung trifft aber für die direct mit beiden Augen gesehenen Punkte und selbst für diese nicht e indirect gesehenen Punkte verlegen wir in falsche Richtungen, indem wir zwischen ihrer Richtungslinie und der Blicklinie zu klein nehmen, wie der graph gelehrt hat, und so oft wir die Augen convergiren lassen und auf ecte richten, beurtheilen wir die Richtungen der gesehenen Objecte falsch, u beschriebenen Versuche lehren. Eine Hauptschwierigkeit der Theorie von st die Erklärung der binocularen Doppelbilder, wie HERING<sup>11</sup> richtig bemerkt 621 können also die Theorie von VOLKMANN nicht als ein angeborenes und Gesetz auffassen, welches an und für sich schon die Richtung des Gesehenen

R, *Paralipomena*, p. 169. — SMITH, *Opticks. Rem.*, p. 4.

VER, *Oculus*, p. 192.

LEY, *Geschichte der Optik*, übersetzt von KLÜGEL, Leipzig 1776, S. 69.

RES, *Dioptrics*, p. 68 und *De homine*, p. 66.

NER im *Hamburger Magazin*, VIII, St. 4, Art. 8—IX, St. 1, Art. 4. — LICHTENBERG in *starlehre*, 6. Aufl., S. 328. — RUDOLPHI, *Physiologie*, II, 227. — L. FICK in *Müller's Archiv* 34, S. 220. — Noch andere unten im Literaturverzeichnis.

R, *Paralipomena*, p. 285 und p. 69—70.

FIELD, *On the eye*, II, 2—5.

BERT, *Opuscula mathem.*, I, p. 26.

SS, *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes*, Berlin 1834.

ANN, *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes*, Leipzig 1836, und Artikel Sehen in R. Wagner's *der Physiologie*. — S. auch MILE, über Richtungslinien des Sehens, *Poggendorff's Annalen*, Müller's *Archiv für Anatomie*, 1838, S. 387.

ING, *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig 1861. S. 35—64.

bestimmte. Ein wesentliches Verdienst HERRING's ist es, den Einfluss der Convergenzstellungen hierbei in das Licht gestellt zu haben.

Den Einfluss der Schwindelbewegungen und Scheinbewegungen haben untersucht PLATEAU<sup>1</sup>, OPPEL<sup>2</sup> und ZOELLNER<sup>3</sup>; den Einfluss falscher Beurtheilung der Kopfstellung AUBERT<sup>4</sup>; über den Einfluss der Lähmung einzelner Muskeln A. V. GRAEFE<sup>5</sup> und NAGEL.<sup>6</sup>

### § 30. Wahrnehmung der Tiefendimension.

Wir haben in den beiden vorangehenden Paragraphen beschrieben, wie sich die gesehenen Objecte in der Fläche des Sehfeldes scheinbar neben einander ordnen, und welche Momente auf die Art dieser Anordnung, die scheinbaren Abstände der einzelnen Objecte im Sehfelde Einfluss haben. Wir haben dabei allerdings zur Erleichterung der geometrischen Auffassung uns erlaubt für das Sehfeld die Gestalt einer Kugel anzunehmen, aber dabei ausdrücklich hervorgehoben, dass die scheinbare Anordnung im Sehfelde überhaupt eben nur eine flächenhafte Anordnung, nach zwei Dimensionen ausgedehnt, sei, aber keineswegs eine Anordnung auf irgend einer bestimmten Fläche, die ihre feste Lage und Grösse hätte. Die Form dieser Fläche des Sehfeldes blieb vielmehr vollständig unbestimmt. Eben deshalb kann sie aber nun noch jede beliebige Form annehmen, so bald irgend welche neue Momente der Wahrnehmung hinzutreten, die über eine solche Aufschluss geben.

Das einäugige Sehen giebt zunächst nur die Wahrnehmung der Richtung, in der der gesehene Punkt liegt. Dieser kann sich in der Visirlinie, in der er liegt, hin und her bewegen, ohne dass in dem Eindruck auf das Auge sich etwas ändert mit Ausnahme der Grösse des Zerstreuungskreises, den er auf der Netzhaut erzeugt; und so lange die Verschiebung die Länge von CZERMAK's Accommodationslinie (s. S. 114) nicht überschreitet, wird diese Veränderung des Zerstreuungskreises gar keine wahrnehmbare Grösse haben. Welche Fehler wir in der Wahrnehmung der Richtung einer solchen Visirlinie begehen, ist im vorigen Paragraphen auseinandergesetzt worden. Das einäugige Sehen giebt uns also zunächst weiter nichts als die scheinbare Richtung der Visirlinie, in der der gesehene Punkt zu suchen ist.

Um nun eine vollständige Kenntniss der wirklichen Vertheilung der gesehenen Objecte im Raume zu erhalten, ist es weiter noch nöthig, in der genannten Visirlinie auch den Abstand jedes gesehenen Punktes vom Auge zu kennen. Zur Kenntniss der Flächendimensionen des Feldes muss auch noch die Kenntniss seiner Tiefendimension kommen. Die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass wir auch diese Tiefendimensionen beurtheilen,

<sup>1</sup> PLATEAU, *Bulletin de Bruxelles*, T. XVI. — *Poggendorff's Annalen*, LXXX, S. 287.

<sup>2</sup> OPPEL, *Poggendorff's Annalen*, XLIX, 543.

<sup>3</sup> F. ZÖLLNER, *Poggendorff's Annalen*, CX, 500.

<sup>4</sup> H. AUBERT, *Virchow's Archiv für pathologische Anatomie*, XX, 381—393.

<sup>5</sup> A. V. GRAEFE, *Archiv für Ophthalmologie*, I, 1, S. 67.

<sup>6</sup> NAGEL, *Das Sehen mit zwei Augen*. Breslau 1861. S. 124—129.

ir, bald weniger genau. Wir haben also zu untersuchen, auf welche 623  
ir zur Kenntniß der Abstände der gesehenen Objecte vor unserem  
ennen.

bei sind zweierlei Hilfsmittel zu trennen, die einen gehören der  
g über die besondere Natur der gesehenen Objecte an und geben  
Vorstellungen des Abstandes, die andern gehören der  
ng an und geben eine wirkliche Wahrnehmung des Abstandes.  
en letzteren gehören: 1) das Gefühl der nothwendigen  
nodationsanstrengung, 2) die Beobachtung bei be-  
Kopf und Körper, 3) der gleichzeitige Gebrauch beider

wir untersuchen, wann und wieviel diese letztgenannten Hilfsmittel  
rnehmung leisten, wird es nöthig sein die aus der Erfahrung  
nen Momente zu untersuchen, um abscheiden zu können, was diesen

Diesen gehört alles an, was wir zu unterscheiden wissen in Bezug  
Tiefendimensionen des Gesichtsfeldes mit einem Auge, bei un-  
Köpfe, an Gegenständen, die weit genug entfernt oder so ver-  
gezeichnet sind, daß keine deutlich fühlbare Accommodations-  
ng für ihre Betrachtung stattfindet. Es kommt hierbei in Betrach-  
ie mitgebrachte Kenntniß der GröÙe der gesehenen Objecte, dann  
Form, ferner die Vertheilung des Schattens, endlich die Trübung  
nen liegenden Luft.

elbe Gegenstand aus verschiedener Entfernung gesehen giebt ver-  
groÙe Netzhautbilder und erscheint unter verschiedenen Gesichts-  
Je entfernter er ist, desto kleiner der Gesichtswinkel, unter dem  
nt. Wie also die Astronomen aus der Messung der wechselnden  
nkel, unter denen uns Sonne und Mond erscheinen, die Aenderungen  
tfernung dieser Gestirne berechnen können, so können wir aus  
htswinkel, oder was dem entspricht, aus der GröÙe des Netzhaut-  
eines gesehenen Gegenstandes von bekannter GröÙe, eines  
zum Beispiel, die Entfernung schätzen, in der er sich von uns befindet.  
umentlich Menschen und Hausthiere, welche in dieser Beziehung

Merkzeichen in der Landschaft bilden, weil sie durch ihre  
leicht erkennbar sind, nur wenig in der GröÙe wechseln und ihre  
sehr gut bekannt ist. Namentlich Militärpersonen pflegen gut geübt  
f den Abstand entfernter Truppenmassen auf unbekanntem Terrain  
weise richtig zu schließsen, so wie man denn auch zu militärischen  
erschiedene kleine optische Apparate eingerichtet hat, mit denen  
Gesichtswinkel für die Höhe eines entfernten Mannes messen und  
ie Entfernung ablesen kann. Häuser, Bäume und Culturpflanzen  
selben Zwecke weniger sicher, wegen ihrer weniger constanten  
bei denn auch gelegentlich starke Irrthümer unterlaufen. Ein  
ler Ebene hält Weinberge leicht für Kartoffelfelder, oder Tannen  
hohen Bergen für Heidekraut, und schätzt danach die Entfernungen

und Gröſſen der Berge zu klein. Aus derselben Rücksicht brauchen die Maler Staffage von Menschen und Vieh in Landschaften, um die Gröſſe der dargestellten Dinge einigermaafsen kenntlich zu machen.

Damit hängt nun auch noch zusammen, daß dieselben Objecte, wie der Mond oder ferne Berge, wenn wir sie wegen trüberer Luft oder aus anderen 624 Gründen für ferner halten, uns gleichzeitig auch immer in demselben Maafse an Gröſſe zu wachsen scheinen. Ferner die Erfahrung, daß ferne Theile der Landschaft, durch ein vergrößerndes Fernrohr gesehen, dem Beschauer in der Regel nicht vergrößert, sondern nur genähert erscheinen, und er sich erst durch Öffnen des anderen Auges davon überzeugen muß, daß die Bilder auch vergrößert sind.

Da übrigens diese Beziehung zwischen Entfernung und Gröſſe erst durch lange Erfahrung erlernt werden muß, wird es nicht auffallen können, daß Kinder hierin ziemlich ungeübt sind und leicht grobe Irrthümer machen. Ich selbst entsinne mich noch, daß ich als Kind an einem Kirchthurm (der Garnisonkirche zu Potsdam) vorübergegangen bin und auf dessen Gallerie Menschen sah, die ich für Püppchen hielt, und daß ich meine Mutter bat, sie mir herunterzulangen, was, wie ich damals glaubte, sie können würde, wenn sie den Arm ausstreckte. Der Zug hat sich meinem Gedächtnisse eingeprägt, weil mir an meinem Irrthum das Gesetz der perspectivischen Verkleinerung deutlich wurde.

Zur Kenntniß der Gröſſe kommt ferner in sehr vielen Fällen die Kenntniß der Form der gesehenen Objecte, namentlich in solchen Fällen, wo das eine zum Theil vom andern gedeckt wird. Wenn wir zum Beispiel in der Entfernung zwei Hügel sehen, von denen der eine mit seiner Basis sich vor den andern vorschiebt und den letzteren zum Theil verdeckt, so schliessen wir daraus unmittelbar, daß der deckende vor dem gedeckten liegt; denn wenn dies nicht der Fall wäre, so müßte der andere einen überstehenden Theil und eine nach unten sehende Begrenzungsfläche haben, wie sie an Hügeln nie vorkommt, und außerdem müßte der Zufall es mit sich bringen, daß diese überhängende Grenzlinie desselben gerade in der Contourlinie des anderen Hügels, wo dieser nicht deckt, ihre Fortsetzung fände. Es wäre dies eine an sich mögliche Auslegung des gesehenen Bildes, die aber aller Erfahrung widerspräche. Dasselbe kann natürlich bei allen möglichen Arten von Gegenständen vorkommen, die sich theilweis decken. Selbst wenn uns ihre Gestalt noch durchaus unbekannt ist, wird in den meisten Fällen der Umstand, daß die Contourlinie des deckenden Objects, wo sie über die Contourlinie des bedeckten hingeht, ihre Richtung nicht ändert, entscheidend sein, um den deckenden von dem gedeckten Gegenstande zu unterscheiden. Man kann auch leicht Täuschungen hervorbringen, wenn man absichtlich ein deckendes Papierblatt so hält, daß es eine Ecke darbietet, wo es mit dem theilweis gedeckten zusammenstößt, an letzterem aber die Contour in derselben Richtung fortläuft.

Am auffallendsten sind die Täuschungen, die auf diesem Principe

an spiegelnden und brechenden Flächen, die vor ihrer dem Beobachter gegenüber liegenden Seite ein reelles optisches Bild entwerfen. Die meisten Personen wissen sich nur schwer davon, daß dieses Bild vor dem Spiegel in der Luft liegt; denn sie sehen Lücken im Bilde, wo der Spiegel ein Fleckchen zwischen dem Bild begrenzt durch den Rand des Spiegels, sie sehen auch alle kleinen Unregelmäßigkeiten des Spiegelbelegs ungetrübt durch hindurch. Das Bild erscheint durchaus als der bedeckte, also verdeckte Gegenstand, während es in der That der vordere ist. Ja selbst, wenn man mit Hilfe des zweiäugigen Sehens, der Kopfbewegungen und der Accommodation sinnliche Momente in das Spiel bringt, welche die Wahrnehmung des Bildes an seinem richtigen Orte unzweideutig feststellen könnten, gelingt es immer ganz leicht, sich von der Täuschung frei zu machen. Ein Mittel ist noch, daß man in der Ebene des Bildes einen Schirm mit einem Ausschnitt, in dem das Bild erscheint, während der Rand des spiegelnden oder brechenden Fläche, die es entwirft, dadurch verdeckt wird, so daß man sieht der Beobachter leicht, daß das Bild in der Ebene des Spiegels liegt.<sup>1</sup>

Es gehört hierher ferner auch die Erfahrung, daß subjective Gesichtsbilder bei geöffneten Augen immer auf die Fläche der im Gesichtsfeld befindlichen körperlichen Objecte projecirt erscheinen. Da sie bei Bewegungen des Auges sich mitbewegen, werden sie gleich als subjective Bilder von den objectiven getrennt, und es wird ihnen keine Realität beigemessen, sondern sie erscheinen nur als Flecken auf den reellen Objecten, auf die Aufmerksamkeit ihnen überhaupt zugewendet wird. Dies geschieht selbst dann, wenn binoculare Nachbilder in beiden Augen entstehen, welche die Wahrnehmung einer bestimmten Localisation im Gesichtsfeld gleich machen würden. Auch solche ist man meist geneigt auf die reellen Objecte zu projeciren, statt eine stereoskopische Raumvorstellung von ihnen auszubilden, und nur bei besonders darauf gerichteter Aufmerksamkeit gelingt das letztere.

In den Fällen genügt es zu wissen oder zu vermuthen, daß der Gegenstand eine Form von gewisser Regelmäßigkeit hat, um sein reelles Bild, wie es uns entweder das Auge oder eine künstliche perspectivische Zeichnung zeigt, richtig als Körperform zu deuten.<sup>2</sup> Wenn ein Tisch oder andere von Menschen gefertigte Gegenstände dargestellt werden, dürfen wir voraussetzen, daß deren Winkel rechte sind und daß sie auf ebenen Ebenen oder cylindrische und kugelige Flächen. Das genügt, damit die richtigen perspectivischen Zeichnung sich richtige Anschauungen bilden. Eine perspectivische Zeichnung eines Hauses oder eines optischen Apparates verstehen wir ohne Schwierigkeit, selbst wenn sie sehr verwickelte Verhältnisse darstellt. Ist sie gut schattirt, so ist der Uebersicht noch leichter. Aber die vollkommenste Zeichnung oder

<sup>1</sup> siehe DOVE in *Poggendorfs Annalen* LXXXV.  
<sup>2</sup> GAUSEN im *Archiv für Ophthalmologie* V, 2, S. 163.



selbst Photographie eines Meteorsteines, eines Eisklumpens, mancher anatomischen Präparate und ähnlicher unregelmässiger Gegenstände giebt kaum ein Bild ihrer körperlichen Form. Namentlich Photographien von Landschaften, Felsen, Gletschern bieten dem Auge oft nichts als ein halbverständliches Gewirr grauer Flecken, während dieselben Photographien bei passender stereoskopischer Combination die allerschlagendste Naturwahrheit wiedergeben.

Wenn dergleichen regelmässig gebildete Producte menschlichen Kunstfleisses, deren Grundformen rechtwinkelige Parallelepipede, Cylinder und Kugelflächen sind, aus der Nähe betrachtet werden, so daß die vorderen Theile in einem deutlich grösseren Maassstabe auf der Netzhaut sich abbilden 626 als die hinteren, so läßt eine richtige perspectivische Abbildung derselben meist nur eine Deutung zu, und wir kommen nicht in Verlegenheit zu erkennen, welches die vorderen, welches die hinteren Theile sind. Werden sie aus grosser Ferne gesehen, oder sind sie sehr flach im Relief, so kann es aber zweifelhaft werden, wie sie zu deuten sind. Dahin gehört die von SINSTEDEN<sup>1</sup> an einer Windmühle gemachte Beobachtung, die sich des Abends gegen den hellen Himmel projecirte, so daß sie nur wie in einer Silhouette halb von der Seite erschien, als gleichmässig dunkles Object auf hellem Grunde, und nur ihre Umrisslinie sichtbar war. Er beobachtete nämlich, daß die Flügel der Mühle bald in der einen, bald in der andern Richtung herumzugehen schienen. Bei einem solchen Anblicke bleibt es nämlich unentschieden, ob die Frontseite der Mühle, welche die Flügel trägt, oder die Rückseite dem Beobachter zugekehrt ist, und ob er also die Flügel selbst schräg von vorn oder von hinten sieht. Sähe er sie von vorn, so würde die perspectivisch der Mühle zugekehrte Seite der Flügel ihm die nähere sein; sähe er sie von hinten, so würde diese ihm die fernere sein. Je nachdem er die eine oder andere Auslegung wählt, scheint die ihm zugekehrte Seite der Flügel bei der Drehung aufzusteigen oder abzusteigen, und er erhält also beim Wechsel der Deutung des Bildes auch eine scheinbar umgekehrte Bewegung der Flügel. Ob man nun in die eine oder andere Deutung der Erscheinung verfällt, hängt zunächst scheinbar vom Zufall ab. Auch lassen sich die Gründe, warum die Erscheinung oft plötzlich wechselt, nicht immer ermitteln; dagegen kann man auch willkürlich den Wechsel herbeiführen, nämlich dadurch, daß man sich das entgegengesetzte Verhalten der Mühle lebhaft vorstellt. So wie man dann den sinnlichen Eindruck als vollkommen übereinstimmend mit dieser Vorstellung wahrnimmt, tritt die Vorstellung als sinnliches Anschauungsbild ein.

Es gehört hierher auch folgende von SCHROEDER<sup>2</sup> angegebene Figur, welche ohne Schattirung in Fig. 229 wiedergegeben ist. Dieselbe wird zuerst und am leichtesten als die geometrische Projection einer Treppe auf-

<sup>1</sup> SINSTEDEN, *Poggendorffs Annalen* CXI, 336—339. MOHR, ebenda 638—642.

<sup>2</sup> SCHROEDER, *Poggendorffs Annalen* CV, 298.

gefaßt werden, so daß die mit *a* bezeichnete Fläche dem Beschauer näher ist, als die mit *b* bezeichnete, welche letztere die Wand darstellt, an die die Treppe sich anlehnt. Sie kann aber auch so aufgefaßt werden, als sähe man ein überhängendes Mauerstück *b*, welches nach unten und links treppenförmig endet, so daß die Fläche *b* näher, *a* ferner wäre und der Beobachter von unten und links her nach der treppenförmigen Fläche schaut. Die erstere Deutung ist uns die geläufigere, und sie tritt deshalb meist zuerst ein, doch schlägt sie auch




Fig. 229.

leicht und ohne bestimmt zu bezeichnenden Grund in die zweite um. So wie ich mir aber lebhaft die eine oder andere Körperform vorstelle, so tritt auch sogleich die Anschauung derselben an der Figur hervor. Gelingt es nicht von selbst aus der ersten Anschauung in die zweite überzugehen, so kann man das, wie SCHROEDER bemerkt, dadurch bewirken, daß man das Buch langsam umdreht, bis das untere Ende desselben nach oben gekehrt ist, und während der ganzen Zeit die Figur betrachtet. Dann bleibt die Fläche *a*, die einmal dem Beschauer näher vorgestellt wird, ihm fort-dauernd die nähere, und nach einer Drehung um  $180^\circ$  hat man genau dieselbe Figur wieder, wie im Anfang, nur daß die Buchstaben *a* und *b* ihre Lage vertauscht haben, und daß nur scheinbar die rechts oben gelegene senkrechte Fläche die nähere geworden ist. Bei SCHROEDER ist dieselbe Figur in zweierlei Weise schattirt, was den Erfolg weiter nicht verändert.

Ähnliches kann man an einer großen Zahl perspectivischer Linienzeichnungen, zum Beispiel solchen, welche regelmäßige Körper, Krystallmodelle u. s. w. in geometrischer Projection (also wie von einem unendlich entfernten Punkte aus gesehen) darstellen, beobachten. Dieselbe Ecke oder Kante kann bald einspringend, bald ausspringend erscheinen. Oft wechselt die Vorstellung unwillkürlich. Ich finde aber, daß man sie auch immer willkürlich wechseln lassen kann, wenn man lebhaft eine andere Deutung sich vorstellt.

Es schlossen sich hieran die Beobachtungen über die scheinbare Umkehrung des Reliefs von Matritzen für Medaillen, wobei indessen auch die Beschattung einen Einfluß ausübt. Wenn man von einer Medaille, welche in ziemlich flachem Relief geschnitten ist, einen Abguß in Gyps oder Stearin macht, der also eine Matritze darstellt, an der alle convexen Krümmungen des Originals concav, alle hervorragenden Theile vertieft erscheinen, und man diese Matritze so legt, daß sie von schräg überfallendem Tageslicht beleuchtet wird, und also kräftig schattirt erscheint, so glaubt man, mit einem Auge danach hinsehend, sehr leicht eine Patritze zu sehen von der

ursprünglichen Form der Medaille. Sieht man mit beiden Augen gleichzeitig nach der Matritze hin, so schwindet in der Regel die Täuschung; ebenso wenn man den Kopf oder die Form hin- und herbewegt. Je ruhiger Auge und Object sind, desto leichter tritt die Täuschung ein. Namentlich ist sie unter den angegebenen Umständen fast unvermeidlich, wie SCHROEDER besonders hervorgehoben hat, wenn das Relief einen menschlichen Kopf oder Körper, oder auch thierische Formen, Blätter und dergleichen darstellt. Bei bloßen Buchstaben und Ornamenten bleibt die Täuschung viel leichter aus.

Dabei tritt nun eine eigenthümliche Täuschung auch betreffs der Beleuchtung ein. Eine Hohlform nämlich zeigt die Schatten an der dem Fenster zugekehrten Seite, die Lichter an der abgekehrten; eine erhabene Form umgekehrt.

Wenn uns daher die Matritze als Patritze erscheint, so erscheint sie auch gleichzeitig von der dem Fenster entgegengesetzten Seite her beleuchtet zu sein. Dazu kommt nun noch, daß eine so schräg beleuchtete erhabene Form einen merklichen Schlagschatten auf den ebenen Grund werfen müßte, welcher Schlagschatten natürlich an der verkehrt gesehenen Matritze fehlt. Dadurch entsteht, wie SCHROEDER es nennt, eine Art magischer Beleuchtung des Reliefs, die gleichsam aus dem Innern zu kommen scheint. Die Ursache davon scheint mir zu sein, daß der Schlagschatten auf dem ebenen Grunde fehlt, und daher dieser Grund wie transparent beleuchtet erscheint.

Man kann übrigens, wie schon RITZENHOUSE und nach ihm viele Andere bemerkten, die Täuschung erhöhen und erleichtern dadurch, daß man auch die Beleuchtung der Matritze umkehrt. Entweder, wie OPPEL in seinem Anaglyptoskop<sup>1</sup> gethan hat, dadurch, daß man das Licht des Fensters durch einen Schirm abhält und dafür einen Spiegel an der entgegengesetzten Seite anbringt, den der Beobachter nicht bemerkt; dann erscheint die scheinbare Patritze vom Fenster her beleuchtet zu sein. Oder man kann die Matritze durch ein spiegelndes rechtwinkeliges Prisma betrachten oder durch eine Linse, die ein umgekehrtes Bild von ihr entwirft. In allen diesen Fällen erscheint die Beleuchtung richtig, obgleich sie immer etwas fremdartiges durch den fehlenden Schlagschatten behält, namentlich, wenn das Relief sehr stark ist. Die Beobachtung durch eine umkehrende Linse trennt außerdem für den Beobachter die Form aus ihrer übrigen Umgebung los und erfordert eine unveränderliche Lage des Auges, weil das Bild der Medaille sonst von der Grenze der Linse verdeckt wird. Alle diese Umstände begünstigen die Täuschung. Daher ist es wohl zu erklären, daß man sie bei solchen umgekehrten von Linsen und Spiegeln entworfenen Bildern zuerst wahrgenommen hat.

Daß es im Ganzen viel seltener gelingt, Patritzen als scheinbare Matritzen zu sehen, scheint nur davon herzurühren, daß jene gewöhnlich einige Schlagschatten zeigen, welche die Deutung der convexen als eine hohle Form unmöglich machen.

<sup>1</sup> OPPEL, *Poggendorff's Annalen* XCIX, 466—469.

die eigenthümliche hierher gehörige Täuschung beschreibt D. BREWSTER.<sup>1</sup> Wenn im Sande erschienen ihm erhöht. Es zeigte sich, daß der hellere Sand hineingeweht und an einem Rande aufgehäuft hatte, dieser Rand scheinbar stärker beleuchtet erschien. Auch der Mond, durch ein umkehrendes Fernrohr betrachtet, erscheint, wie SCHWEIZER zuweilen in verkehrtem Relief.

BOEDER macht noch auf einige andere Täuschungen ähnlicher Art aufmerksam. Wenn wir ein rechteckiges Streifchen Papier auf eine horizontale Platte legen und schräg von oben her mit einer umkehrenden Linse sehen, so sollte bei richtiger Umkehrung der obere Rand des Bildes näher und der Tischplatte dem Beobachter näher erscheinen, der entfernter. Der Regel nach verhält es sich umgekehrt, wir glauben den Tisch und das Papier in ihrer wirklichen Richtung zu sehen, wenn eine feine Nadel schräg in das Papier eingestochen wird, von der Nadel end gestellte Lampenflamme einen scharf begrenzten Schlagschatten werft, erscheint uns vermöge derselben Umkehrung oft das Bild des Schattens als das der Nadel und umgekehrt. BREWSTER bemerkt, daß bei der Täuschung ein in die Ebene eingeschnittenes Intaglio wegen der Vertiefung leicht als Relief hervortritt, weil man die nähere Seite für die entferntere hält.

von noch größerer Wichtigkeit, als die verschiedenartige Beleuchtung eines Körpers je nach ihrer Neigung gegen die einfallenden Lichtstrahlen sind die Schlagschatten. Wenn wir eine erleuchtete Fläche sehen, auf der der leuchtende Körper vor dieser Fläche befindet, und wenn der Schatten auf sie fällt, so muß sich der Schatten werfende Körper vor der Fläche befinden, die den Schatten empfängt. (Vor und hinter hier in Beziehung auf die Fläche zu nehmen, nicht in Beziehung auf die Stellung des Beobachters.) Dadurch ist also eine gewisse geometrische Beziehung des Schatten werfenden Körpers zur beschatteten Fläche festgestellt. Eine wie entscheidende Rolle die Schlagschatten bei der Beurtheilung der Gesichterscheinungen spielen, werden wir später bei astronomischen Erscheinungen noch ersehen. Auch ist allgemein bekannt, wieviel deutlichere Vorstellung eine gut schattirte Zeichnung eines Gegenstandes giebt, als eine, die bloß seine Umrisse darstellt; daher ist es orthoepischer für eine Landschaft, namentlich wenn man sie aus der Ferne sieht, die Beleuchtung des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs durch die Stellung der hochstehenden Sonne. Es kommen hier nicht bloß die Farben in Betracht, welche die tief stehende Sonne giebt, sondern namentlich die bessere Modellirung der Formen des Terrains, welche durch die reichere Schattirung entsteht. Im Allgemeinen sind ja wenige Gegenstände so steil, daß sie bei hoch stehender Sonne nicht beleuchtet wären. Die Gegenstandsbeleuchtung ist daher mit wenigen Ausnahmen alles hell und

<sup>1</sup> BREWSTER, *Athenaeum* 1860, 2, p. 24; *Rep. of Brit. Assoc.* 1860, 2 p. 7—8.

wenig Schatten vorhanden; die Formen der Berge und Thäler, wo sie nicht sehr schroff sind, sind deshalb wenig deutlich. Wenn dagegen die Sonne schräg steht und viele Abwechselung von Licht und Schatten giebt, so wird alles viel deutlicher und verständlicher.

Ein weiteres von der Beleuchtung hergenommenes Moment für die Beurtheilung der Entfernung namentlich entfernterer Gegenstände giebt die sogenannte Luftperspective. Wir verstehen darunter die Trübung und Farbenveränderung des Bildes ferner Objecte, welche durch die unvollkommene Durchsichtigkeit der vor ihnen liegenden Luftschicht bewirkt wird. Die Luft, wenn sie schwach mit Wassernebel gefüllt ist, wie es in ihren tieferen Schichten, namentlich in der Nähe großer Wasserflächen, gewöhnlich der Fall ist, wirkt wie ein trübes Medium, welches beleuchtet vor dunklen Hintergründe selbst bläulich erscheint, eindringendes Licht heller Objecte aber mit röthlicher Farbe durchläßt. Je dicker die Luftschicht zwischen dem Auge des Beobachters und dem fernen Objecte ist, desto stärker wird dessen Farbe verändert, entweder in das Bläuliche, wenn es dunkler, oder in das Röthliche, wenn es heller als die vorliegende Luftschicht ist. So erscheinen ferne Berge blau, die untergehende Sonne roth.

Den Einfluß, den die Luftperspective auf unser Urtheil ausübt, können wir leicht bemerken, wenn die Luft ungewöhnlich klar oder ungewöhnlich trüb ist. Im ersteren Falle erscheinen ferne Bergreihen sehr viel näher und kleiner, im zweiten ferner und größer als gewöhnlich. Für den Bewohner der Ebene beruht darauf eine gewöhnliche Art der Täuschung, wenn er in das Hochgebirge kommt. In der Ebene, namentlich in der Nähe  
630 großer Wasserflächen, ist die Luft gewöhnlich trüb, im Hochgebirge gewöhnlich außerordentlich durchsichtig. So erscheinen denn dem Reisenden entfernte Berggipfel, namentlich wenn sie mit Schnee bedeckt im Sonnenschein glänzen, so klar, wie er sonst nur nahe Gegenstände gesehen hat, und er schätzt deshalb im Allgemeinen alle Distanzen und Höhen viel zu klein, bis er, ihre Dimensionen selbst durchmessend, durch Anstrengung und Erfahrung eines Bessern belehrt wird.

Hierher gehört auch die berühmte Frage, warum der Mond nahe dem Horizonte größer aussieht, als wenn er hoch am Himmel steht, trotzdem er wegen der atmosphärischen Strahlenbrechung im verticalen Durchmesser dort eigentlich kleiner aussehen sollte. Dafs er am Horizonte größer erscheint, weil er uns dort weiter entfernt erscheint, haben schon PTOLEMAEUS und die arabischen Astronomen<sup>1</sup> richtig gewußt. Die eigentliche Frage ist also, warum erscheint uns das Himmelsgewölbe am Horizonte entfernter als im Zenith. Es sind eine Menge Motive dafür angeführt worden, warum dies so sei; ich glaube auch, dafs nicht nur eines, sondern viele verschiedene Motive dahin zusammenwirken, wobei freilich schwer auszumitteln ist, welches das überwiegende in jedem einzelnen Falle sei.

<sup>1</sup> MONTUCLA *Histoire des Mathém.* Vol. I, p. 309 u. 352. — ROGERI BACONIS *Perspect.*, p. 118. — PORTA, *De refractione*, p. 24, 128. — PRIESTLEY, *Geschichte der Optik*. Periode 6, Kap. 8.

nächst ist zu bedenken, daß kein entscheidender Grund da ist, der Sternenhimmel uns als eine regelmäßige Kugelfläche erscheinen läßt. Er zeigt unendlich entfernte Objecte; daraus folgt nur, daß er als eine Fläche von unbestimmter Form erscheinen kann, wenn irgend welche Motive ihm eine solche zuweisen. Wenn wir im leeren Raume den Sternenhimmel gleichzeitig und gleichmäßig in seiner Ausdehnung überschauen könnten, oder wenn seine Bewegung so schnell wäre, daß wir eine wirkliche sinnliche Anschauung davon erhalten könnten, so wäre der Grund sein, ihn gerade als Kugelfläche anzuschauen. So aber ist That seine scheinbare Richtung und Gestalt eine sehr wechselnde, indem das Stück, was wir von ihm sehen, von verschiedenen irdischen Punkten eingefasst ist, und wir einen höheren oder tieferen Punkt wählen. Wir werden später noch sehen, daß wir eine Neigung haben, ihn bei der binocularer Fixation eines Punktes für eine auf die jedesmaligen senkrechte Ebene zu halten.

Anders ist es mit dem Wolkenhimmel. Die Wolken sind meistens weit genug von uns entfernt, daß wir mittels der Erkennungsart, welche das zweiäugige Sehen und die Bewegung unseres Körpers erlauben, nichts oder so gut wie nichts über ihre Entfernung ausmachen können. Aber sie sind oft parallelstreifig, sie bewegen sich meistens in einer Richtung und mit constanter Geschwindigkeit über das Himmelsgewölbe, sie erscheinen in der Nähe des Horizontes strichförmig, von der Kante gesehen und so beleuchtet, daß man sie als perspectivisch horizontal gedehnte Körper erkennen kann. Alles das kann dazu dienen, uns zu machen, daß die wahre Form des Wolkenhimmels im Zenith ein sehr plattes Gewölbe ist. Am Horizont freilich haben wir diese Hilfsmittel, und da erscheinen dann die Wolken wie die 631 gleichmäßig auf eine von unten nach oben ansteigende und allmählig den Erdboden, wie in das Himmelsgewölbe übergehende Fläche zu sein. Da wir nun kein Mittel der sinnlichen Anschauung haben, um die Entfernung des Wolkenhimmels von der des Sternenhimmels zu vergleichen, scheint es nur natürlich, daß wir dem letzteren die wirkliche Entfernung ersteren, so weit wir sie unterscheiden können, mit zuschreiben, und auf diese Weise die doch immer sehr vage, unbestimmte und verworrene Vorstellung von der flach kuppelförmigen Wölbung des Himmels

entschieden und überraschend tritt übrigens die Vergrößerung der Sonne oder der Sonne nur dann auf, wenn die Luft am Horizont recht dünn ist und die genannten Himmelskörper nur noch eine geringe Lichtstärke haben. Dann haben wir an ihnen dieselbe Wirkung wie an fernen Sternen. Dann sehen wir viel entfernter als bei klarer Luft und deshalb größer. Wir verstärken passende irdische Objecte am Horizont die Wirkung der Vergrößerung. Der Mond zum Beispiel neben oder hinter einer etwa zwei Fuß entfernten Baumkrone untergeht, welche selbst 20 Fuß Durch-

messer hat, so erscheint er unter demselben Gesichtswinkel, aber viel weiter entfernt, also auch viel größer als der Baum; während er hinter flachem Horizonte untergehend keinen Gegenstand zur Vergleichung findet, an dem wir erkennen könnten, daß seine geringe scheinbare Größe einer sehr bedeutenden absoluten Größe entspricht.

Wenn man mittels einer planparallelen Glastafel ein Reflexbild des Mondes entwirft, welches scheinbar nahe am Horizonte gelegen ist, so finde ich nicht, daß dasselbe entschieden größer aussieht, als der direct gesehene Mond oben am Himmel, obgleich man die scheinbare Größe des reflectirten Mondes dann leicht mit den gleichzeitig gesehenen irdischen Körpern vergleichen kann. Es fehlt aber dem Spiegelbilde das Aussehen, als sei es durch den dunstigen Theil der Atmosphäre gesehen.

Auch scheint mir, daß die scheinbare Vergrößerung am Horizonte viel bemerklicher am Monde auftritt, als an der Sonne, die, wenn man ihre Gestalt überhaupt noch erkennen kann, gewöhnlich auch noch hell genug ist, daß man sie nicht ganz bequem betrachten kann, und daß sie also auch nicht unmittelbar mit den irdischen Objecten des Horizonts auf eine Linie gestellt werden kann. Bei recht klarem Himmel ist aber die Täuschung auch für den Mond nicht gerade sehr evident. Sie hängt immer in sehr hohem Grade vom Zustande der Atmosphäre ab.

Die bisher genannten Motive sind es allein, welche die Maler benutzen können, um durch flächenhafte Zeichnungen und Gemälde eine Vorstellung von den dargestellten körperlichen Objecten zu geben. Leichter ist ihre Aufgabe, wo es sich um Objecte von wohlbekannter oder von geometrisch regelmäßiger Form handelt, ersteres namentlich bei menschlichen und thierischen Gestalten, letzteres bei Häusern, Geräthen und anderen Erzeugnissen menschlichen Kunstfleißes. Bei solchen ist eine richtige perspectivische Zeichnung schon meistens ausreichend und kann durch eine richtige Schatten-  
632 gebung sehr lebendig gemacht werden. In der Kunst der kräftigen Schatten-  
gebungen, welche die Körperform so sehr deutlich heraustreten läßt, sind bekanntlich die alten Meister des Porträtirens so ausgezeichnet gewesen. Ein allseitig beleuchtetes, schwach beschattetes Gesicht, noch so richtig dargestellt, giebt einen lebhaften Eindruck allenfalls, so lange man die dargestellte Person noch oft sieht, aber es verliert seine Lebendigkeit bald, wenn dies nicht mehr geschieht. Schwieriger ist die Aufgabe des Malers, wenn er Naturgegenstände von unregelmäßiger Form darzustellen hat, Landschaften, Berge, Felsen. Die Staffage mit Menschen, Thieren, Bäumen, Häusern giebt dann ein wichtiges äußerliches Hilfsmittel ab, um die Entfernung der dargestellten Objecte ungefähr zu bezeichnen. Luftperspective aber und Schatten sind die Hauptmittel. Daher ist nicht jede Beleuchtung einer Landschaft zur Darstellung geeignet. Ein gewisser Grad der Trübung der Luft und eine niedrig stehende Sonne, welche viel Wechsel von Schatten und Licht hervorbringt, sind wesentliche Erfordernisse, um nur die Formen der Landschaft deutlich werden zu lassen, abgesehen von



heren und mannigfacheren Färbungen, die auch ihre Schönheit

bisher beschriebenen Motive der Tiefenanschauung sind auch in zischer Beziehung interessant und wichtig, weil sie zeigen, welchen die Erfahrung auf unsere scheinbar ganz unmittelbar und ohne Hilfe Thätigkeiten gewonnenen Sinneswahrnehmungen hat. Die Gesetze der Schattung, des Schlagschattens, der Lufttrübung, der perspectivischen Verkürzung und Deckung verschiedener Körper, die GröÙe der Menschen, die Entfernung u. s. w. können wir erst durch Erfahrung kennen gelernt haben; uns hat noch kein Vertheidiger der angeborenen Anschauungen ihre Ursprünglichkeit zu behaupten gewagt, und für einige derselben, längere Einübung erfordern, kann man, wie oben bemerkt, bei direct nachweisen, daß sie nicht angeboren sind. Und doch genügen Momente in vielen Verhältnissen, um eine Anschauung der räumlichen und Verhältnisse von vollkommener sinnlicher Lebhaftigkeit hervorzuheben, ohne daß irgend ein Bewußtsein davon in uns rege wird, wie die Vergleichung des jetzigen Eindrucks mit früheren Eindrücken

Art in das Spiel kommt. Das gegenwärtige Bild ruft in uns Erinnerung an alles, was in früheren Gesichtsbildern Aehnliches sich hat, und auch an alles, was von sonstigen Erfahrungen mit diesen Gesichtsbildern regelmäßig verbunden war, also zum Beispiel die Schritte, die wir haben machen müssen, um an einen Menschen zu kommen, dessen Erscheinung im Gesichtsfelde eine gewisse GröÙe hatte u. s. w. Diese Art der Association der Vorstellungen geschieht nicht willkürlich, sondern wie durch eine blinde Natur, denn auch nach den Gesetzen unseres eigenen Geistes, und sie tritt in unseren Wahrnehmungen ebenso gut als eine äußere uns an, wie die von außen kommenden Eindrücke, und was vermittels dieser auf die gesammelten Erfahrungen sich stützenden Vorstellungen den gegenwärtigen Empfindungen hinzufügen, erscheint uns, wie letztere, uns ohne Willkür und ohne bewußte Thätigkeit von der Seite als unmittelbar gegeben, also als unmittelbare Wahrnehmung, 633  
s doch nur zu den Vorstellungen zu rechnen ist.

Anders interessant sind hierbei solche Fälle, wie die Täuschungen des Reliefs von Medaillen, von perspectivischen Zeichnungen und andere, wo ein Schwanken zwischen zwei Deutungen möglich ist. Hier

daß wir beim ersten Anblick in eine dieser Deutungen unverfallen, und zwar der Regel nach wohl in diejenige, welche die zahl ähnliche Erinnerungsbilder zurückruft, wie bei den Reliefs menschlichen Gesichtern, wo wir der Regel nach die der Wirklichkeit ähnliche convexe Form zu sehen glauben. In andern Fällen schwankt willkürlich, wie bei SINSTEDEN's Windmühle, wenn durch äußere Ursachen oder Bewegungen des Auges bald diese bald jene Aehnlichkeit tritt. Aber wir können auch absichtlich einen Wechsel der

Deutung hervorbringen, wenn wir die Vorstellung der entgegengesetzten Figur möglichst lebhaft in uns aufrufen, bis deren Aehnlichkeit mit dem eben angeschauten Gesichtsbilde sich geltend macht, wo sie dann von selbst und ohne weitere Anstrengung stehen bleibt. Während der Zeit aber, wo sie stehen bleibt, besteht sie mit der vollen Energie sinnlicher Gewissheit, und wenn sich in Folge irgend eines wechselnden Umstandes die entgegengesetzte Deutung wieder hervordrängt, hat auch diese wiederum dieselbe Deutlichkeit und Sicherheit, wenn auch das selbstbewusste Denken nun aufmerksam wird, dafs es mit einer zweideutigen Anschauung zu thun hat.

Wir gehen jetzt über zur zweiten Klasse der Momente, auf welche sich die Tiefenwahrnehmung stützt, solche nämlich, denen bestimmte sinnliche Empfindungen zu Grunde liegen. Unter ihnen ist zuerst zu erörtern, wie viel die Accommodation des Auges leisten kann. Es ist kein Zweifel darüber, dafs Jemand, der seine Accommodationsänderungen viel beobachtet hat und das Muskelgefühl der dazu gehörigen Anstrengung kennt, im Stande ist anzugeben, ob er bei der Fixirung eines Gegenstandes oder eines optischen Bildes für grofse oder kleine Sehweiten accommodirt. Aber die Beurtheilung der Entfernung mittels dieses Hilfsmittels ist äufserst unvollkommen. WUNDT<sup>1</sup> hat darüber Versuche angestellt, indem er den Beobachter mit einem Auge durch eine Oeffnung eines feststehenden Schirms nach einem vertical ausgespannten schwarzen Faden hinblicken liefs. Eine weifse Tafel bildete den Hintergrund. Der Faden konnte längs einer horizontal liegenden Scale verschoben und in gemessene Entfernungen vom Beobachter gestellt werden. Ueber seine absolute Entfernung konnten dabei so gut wie gar keine Angaben gemacht werden; wohl aber zeigte es sich, dafs, wenn dem Faden nach einander zwei verschiedene Stellungen gegeben wurden, mittels der veränderten Accommodation erkannt werden konnte, ob sich der Faden entfernt oder genähert habe. Doch wurde dabei eine Annäherung des Fadens, wobei die active Muskelanstrengung des Accommodationsapparats zunehmen muss, deutlicher erkannt, als eine Entfernung desselben. Die bei den Versuchen eintretende Ermüdung des  
634 Auges bewirkte eine wachsende Unsicherheit in der Wahrnehmung auch der Annäherungen. WUNDT giebt folgende Resultate seiner Versuche:

Entfernung des Fadens vom Auge	Unterscheidungsgrenze	
	für Annäherung	für Entfernung
250 Ctm.	12 Ctm.	12 Ctm.
220 „	10 „	12 „
200 „	8 „	12 „
180 „	8 „	12 „
100 „	8 „	11 „
80 „	5 „	7 „
50 „	4,5 „	6,5 „
40 „	4,5 „	4,5 „

<sup>1</sup> W. WUNDT, *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung*. Leipzig und Heidelberg 1862. S. 106—112.

enn zwei Fäden in verschiedener Entfernung gleichzeitig aus-  
t wurden, ergaben sich dieselben Resultate wie für die Annäherung  
dens.

1 habe am Ende einer innen geschwärzten Röhre einen schwarzen  
mit zwei senkrechten Spalten angebracht, dann den einen mit einem  
den andern mit einem blauen Glase geschlossen. Ich bedurfte einer  
h stärkeren Accommodationsanstrengung, um den rothen Streifen  
zu sehen, als für den blauen. Nach langen Vergleichen beider  
entstand auch endlich der Eindruck, als wäre der rothe Streifen  
ler blaue ferner, aber die Täuschung trat schwer ein und schwand  
eder, sie liefs sich nur durch fortdauernd wechselnde Accommodation  
einen und den andern Streifen unterhalten. Die Täuschung liefs  
urch unterstützen, dafs ich den rothen Streifen etwas breiter machte  
auch dadurch das Ansehen eines näheren Objectes gab.

htiger aber und genauer als die genannten Hilfsmittel, die  
ngen zu schätzen, ist die Vergleichung der perspectivischen Bilder,  
erselbe Gegenstand, von verschiedenen Standpunkten aus gesehen,  
. Eine solche Vergleichung kann praktisch in doppelter Weise zu  
kommen, entweder monocular bei Fortbewegung des Kopfes und  
oder binocular mittels der beiden verschiedenen Bilder, welche  
ngen gleichzeitig von demselben Gegenstande geben. Da die beiden  
was verschiedenen Ort im Raume haben, so sehen sie auch die  
iegenden Gegenstände von zwei etwas verschiedenen Gesichtspunkten  
erzeugen dadurch eine ähnliche Verschiedenheit der Bilder, wie sie  
rtbewegung im Raume nach einander hervorgebracht wird.

n wir vorwärts gehen, so bleiben die Gegenstände, welche sich am  
end befinden, hinter uns zurück; sie gleiten in unserem Gesichts-  
inbar an uns vorbei, und zwar in entgegengesetzter Richtung, als  
hreiten. Entferntere Gegenstände thun dasselbe, aber langsamer,  
sehr entfernte Gegenstände, wie die Sterne, ruhig ihren Platz im  
lde behaupten, so lange wir die Richtung unseres Körpers und  
eibehalten. Es ist leicht ersichtlich, dafs die scheinbare  
igkeit der Winkelverschiebungen der Gegenstände im Gesichtsfelde  
er wahren Entfernung umgekehrt proportional sein mufs, so dafs  
eschwindigkeit der scheinbaren Bewegung sichere Schlüsse auf die 635  
fernung gemacht werden können.

egenstände verschiedener Entfernung verschieben sich dabei auch  
gegen einander. Die entfernten gehen im Vergleich zu den  
scheinbar in Richtung des Beobachters vorwärts, die näheren  
scheinbar zurück. Dadurch entsteht eine sehr deutliche Anschauung  
schiedenen Entfernung. Wenn man zum Beispiel in einem  
alde still steht, ist es nur in undeutlicher und gröberer Weise  
as Gewirr der Blätter und Zweige, welches man vor sich hat,  
und zu unterscheiden, welche diesem und jenem Baume angehören,

in welcher Entfernung die einzelnen hinter einander sich befinden u. s. v. So wie man aber sich fortbewegt, löst sich alles von einander, und man bekommt sogleich eine körperliche Raumanschauung von dem Walde, genau so, als wenn man ein gutes stereoskopisches Bild desselben ansähe.

Auch ist leicht einzusehen, daß sich durch diese scheinbaren Verschiebungen der einzelnen Stämme, Aeste und Blätter gegen einander der wirkliche Wald im unmittelbaren sinnlichen Eindrucke durchaus unterscheiden muß von jedem noch so vollkommenen Gemälde dieses Waldes. Wenn wir an der ebenen Fläche des Gemäldes uns vorüberbewegen, bleibt die scheinbare Lage aller Theile desselben gegen einander im Gesichtsfelde durchaus die gleiche. Die, welche entfernte Objecte darstellen, verschieben sich gegen den Beobachter durchaus in derselben Weise, als benachbarte Theile, welche nahen Objecten entsprechen. Ein Gemälde kann immer nur den Anblick des Gegenstandes von einem einzigen festen Gesichtspunkte aus gesehen darstellen; wollen wir durch dasselbe eine möglichst vollkommene Täuschung hervorrufen, so muß auch der Beschauer seinen Standpunkt unverändert beibehalten. Jede Bewegung läßt sogleich den Unterschied zwischen dem Urbilde und dem Abbilde in sinnlicher Erscheinung hervortreten.

Nähere Gegenstände bewegen sich schneller, entferntere langsamer. Wenn wir selbst uns ungewöhnlich schnell bewegen, zum Beispiel in Eisenbahnzügen, so erscheinen uns die schnell vorübergleitenden Gegenstände deshalb leicht zu nah, und in Folge dessen auch kleiner, als sie sind. Es ist dies eine Gesichtstäuschung, welche von vielen Personen beobachtet und beschrieben wird<sup>1</sup>. Ich selbst habe diese Verkleinerung niemals recht deutlich sehen können, wie es denn viele solche Täuschungen giebt, welche bei der Gewohnheit größerer Aufmerksamkeit auf die Gesichterscheinungen von selbst schwinden, weil der Beobachter sich in seinem Urtheil von den störenden Einflüssen unabhängig zu machen lernt.

Auch bei wissenschaftlichen Beobachtungen kann man die scheinbaren relativen Verschiebungen verschieden entfernter Gegenstände oft benutzen. Soll man zum Beispiel das Fadenkreuz eines Fernrohrs auf das Bild des Objectes genau einstellen, so bewege man das Auge hinter dem Ocular ein wenig hin und her, von rechts nach links und zurück. Man wird dann  
636 sogleich sehen, ob das Fadenkreuz dabei im Verhältniß zum Bilde still steht oder sich verschiebt. Im ersten Falle fällt es mit dem Bilde zusammen. Im zweiten ist es vor oder hinter ihm; und welches von beiden der Fall sei, ergiebt sich ebenfalls sogleich.

Die Bestimmungen der Fixsternparallaxen beruhen bekanntlich auf derselben scheinbaren Verschiebung, wobei nur als Mittel der Fortbewegung des Beobachters die Bewegung der Erde um die Sonne benutzt wird.

Ich glaube auch, daß die Veränderungen des Retinalbildes bei Bewegungen des Körpers es hauptsächlich sind, wodurch einäugige Personen

<sup>1</sup> DOVE in *Poggendorff's Annalen* 1847. LXXI, S. 118.

htige Anschauungen von den körperlichen Formen der Umgebungen fen. Wenn Jemand, der zwei gesunde Augen besitzt, eines derselben und unregelmäßig gestaltete, unbekannte Gegenstände einäugig et, so erhält er eine falsche oder mindestens unsichere Vorstellung r Form. So wie er sich aber bewegt, gewinnt er sogleich die rich- schauungen.

h vergesse man nicht, worauf bisher noch nicht immer der nöthige ck gelegt worden ist, daß in allen physiologisch-optischen Versuchen, ich um Beurtheilung der Entfernung eines irgend wie gesehenen oder Bildes handelt, wohl darauf zu achten ist, daß der Kopf ge gegen das Gesehene nicht ändere, sonst tritt sogleich eine ver- äßig gute und genaue Bestimmung der wirklichen Entfernung durch i beobachtete Verschiebung ein.

den bisher besprochenen Aenderungen des Retinalbildes durch g entsteht eine Anschauung von den Entfernungsunterschieden nur daß das augenblicklich bestehende Bild verglichen wird mit den rinnerung bewahrten unmittelbar vorhergegangenen Bildern im Auge. en schon in der Lehre vom Contrast hervorgehoben, daß eine ung mittels der Erinnerung viel unsicherer zu sein pflegt, als eine ung zweier gegenwärtiger sinnlicher Eindrücke. So ist nun auch heilung der Entfernungen mittels der gleichzeitigen Bilder beider l vollkommener, sicherer und genauer, als sie durch Bewegungen s innerhalb so geringer Distanzen, wie die Entfernung der Augen der ist, gewonnen werden kann.

einzelne Auge zeigt uns ein perspectivisches Bild der vor uns Gegenstände. Da aber beide Augen nicht denselben Platz im nehmen, also die Objecte von etwas verschiedenen Gesichtspunkten hten, so sind die beiden perspectivischen Bilder, welche sie von verfen, auch etwas von einander verschieden. Wenn ich ein Blatt vor mich hinhalte, daß es in die verlängerte Mittelebene meines lt, so sehe ich mit dem rechten Auge die rechte Seite des Papiers, nken die linke. Das entferntere Ende dieses Papiers erscheint meines rechten Auges rechts, in dem des linken links von dem t liegen. Aehnliche Unterschiede, mehr oder weniger merklich, bei genauerer Aufmerksamkeit viele finden, so oft man mit beiden : Anzahl verschieden entfernter Gegenstände betrachtet. Es sind le derselben Art und Größe, wie sie entstehen, wenn man das l einäugig ansieht, das Auge aber fortbewegt um eine Strecke, Entfernung beider Augen von einander gleich ist.

htet man dagegen eine ebene Zeichnung oder ein ebenes Gemälde, 637

beide Augen dadurch durchaus dasselbe Netzhautbild (abgesehen en perspectivischen Verziehungen, die die Ebene des Gemäldes en beiden Netzhautbildern erleiden kann), während der im Ge- gestellte Gegenstand, wenn er nicht selbst eben ist, nothwendig

in beiden Augen verschiedene Netzhautbilder hervorrufen würde. Dadurch ist also wiederum in der unmittelbaren sinnlichen Anschauung ein Kennzeichen gegeben, wodurch sich der Anblick eines jeden nach drei Dimensionen ausgedehnten Objects unterscheiden muß von dem Anblick eines ebenen Bildes desselben Objects.

Auch ist klar, daß, wenn der Ort der beiden Netzhautbilder eines leuchtenden Punktes gegeben ist, daraus für die wissenschaftliche Untersuchung wenigstens, wenn auch noch nicht nothwendig für das gemeine Bewußtsein, unzweideutig der Ort des leuchtenden Punktes gefunden werden kann. Man lege durch jedes Netzhautbild und den Knotenpunkt des betreffenden Auges eine gerade Linie, so muß, wie wir früher gezeigt haben, der leuchtende Punkt selbst in jeder dieser beiden Richtungslinien liegen. Also liegt er, wo sich beide schneiden.

Während also durch das einäugige Sehen bei ruhendem Kopfe nur die Richtung, in welcher der gesehene Punkt sich befindet, bestimmt ist, giebt das zweiäugige Sehen hinreichende Beobachtungsthatfachen, daß aus ihnen auch die Entfernung des gesehenen Punktes bestimmt werden kann, wenigstens insoweit, als die vorhandenen Data hinreichende Genauigkeit dazu haben und zu dem angegebenen Ende zweckmäßig benutzt werden. Im Allgemeinen ist die Genauigkeit in der Bestimmung der Entfernung desto kleiner, je größer diese selbst ist, da weit entfernte Gegenstände in beiden Augen nicht mehr merklich verschiedene Bilder geben.

Daß nun in der That auf diesem Wege außerordentlich genaue und deutliche sinnliche Anschauungen der Entfernungen gewonnen werden, läßt sich mittels der stereoskopischen Bilder zeigen; es sind dies Bilder, von denen je zwei zusammengehörige die beiden Ansichten darstellen, welche das rechte und das linke Auge desselben Beobachters von dem dargestellten Objecte haben.

Wir haben gesehen, daß ein einzelnes ebenes Bild, mit beiden Augen gesehen, stets einen andern Eindruck machen muß, als der Gegenstand des Bildes, selbst gesehen, machen würde. Wenn wir nun aber beiden Augen verschiedene Bilder zeigen, einem jeden dasjenige, welches es bei Betrachtung des Gegenstandes selbst wirklich gesehen haben würde, so sind wir im Stande, denselben Eindruck auf beiden Netzhäuten hervorzurufen, den der räumlich ausgedehnte Gegenstand wirklich gemacht haben würde, und unter diesen Umständen gewinnen wir durch die beiden Bilder in der That dieselbe Anschauung der körperlichen Form, wie bei wirklicher Betrachtung des Gegenstandes selbst.

Zwei Bilder, welche einen stereoskopischen Effect machen sollen, müssen also zwei verschiedenen perspectivischen Ansichten desselben Gegenstandes entsprechen, welche von verschiedenen Gesichtspunkten aus aufgenommen sind. Sie dürfen einander also nicht gleich sein, vielmehr müssen, verglichen mit den Bildern unendlich entfernter Punkte, die Bilder näherer Punkte in der Zeichnung für das rechte Auge desto mehr nach links hin, in dem Bilde

linke Auge desto mehr nach rechts hin liegen, je näher die Objecte 638  
 beobachtet sind. Denkt man sich also die Zeichnungen so aufeinander  
 laßt die Bilder der unendlich entfernten Gegenstände aufeinander  
 werden die Bilder der näheren Objecte desto weiter auseinander  
 näher sie sind. Ihre Distanz kann man die stereoskopische  
 Parallaxe nennen. Diese ist positiv, wenn die näheren Punkte für das  
 Auge nach links, für das linke nach rechts abweichen. Die stereo-  
 scopische Parallaxe ist gleich groß für Objecte, welche gleichen Abstand von  
 der Zeichnung haben.

Man kann keine unendlich entfernten Objecte in der Zeichnung dargestellt,  
 man kann nur die Unterschiede der stereoskopischen Parallaxe ermitteln  
 auf irgend welchen beliebigen Punkt des Objects. Die Parallaxe  
 auf solchen Ausgangspunkt ist dann positiv für die näheren, negativ  
 für die entfernteren übrigen Punkte.

Wenn wir den Abstand der Augen  $2a$ , den Abstand der Zeichnung  
 von den Augen  $b$ , den Abstand des Objects von einer parallel der Zeichnung  
 gelegten Ebene  $q$ , und  $e$  die stereoskopische Parallaxe, so

$$e = \frac{2ab}{q},$$

desto kleiner, je entfernter das Object, und für unendlich entfernte  
 gleich Null.

Die zusammengehörigen stereoskopischen Bilder müssen bei einem  
 Versuche so vor die beiden Augen gebracht werden, daß die unend-  
 lichen Punkte darin beiden Augen in derselben Richtung erscheinen.  
 Dies ohne Instrument erreichen, wenn man beide Bilder neben  
 einander legt, eins rechts, das andere links, so daß zusammengehörige Punkte  
 etwa so weit von einander entfernt sind, als die Knotenpunkte  
 der Augen des Beobachters. Wenn der Beobachter sich dann mit  
 gerichteten Gesichtslinien vor die Bilder stellt, so sieht er sie beide  
 in gleicher Richtung und die stereoskopische Täuschung  
 tritt ein. Freilich sieht er hierbei mit dem rechten Auge nicht bloß das  
 rechte Bild, sondern links daneben auch noch das für das linke Auge  
 Bild, und ebenso mit dem linken Auge nicht bloß das letztere  
 sondern rechts daneben auch noch das andere. Wenn die richtige  
 Distanz der Augen gefunden ist, sieht der Beobachter also neben einander  
 drei Bilder, von denen die beiden äußeren nur mit je einem Auge  
 gesehen werden (das rechte vom linken, das linke vom rechten Auge) und  
 in der Mitte erscheinen, das mittlere beiden Augen zugleich angehört  
 und als ein Bild erscheint.

Im beschriebenen Versuche ist die Anwesenheit der drei Bilder  
 außerdem muß man für die Nähe accommodiren, während man die  
 Augen parallel einstellt, wie es beim Betrachten ferner Gegenstände



der Fall ist, und wobei man gewöhnt ist die Accommodation für die Ferne einzurichten. Deshalb gehört einige Uebung dazu, ehe man in dieser Weise ohne weitere Hilfsmittel stereoskopisch sehen lernt. Uebrigens ist die dabei entstehende Gesichtstäuschung ebenso vollkommen, wie bei der Anwendung  
 639 der gleich zu beschreibenden Instrumente. Ungeübte erleichtern sich das Gelingen des Versuchs, wenn sie nach den beiden Zeichnungen durch zwei innen geschwärzte Röhren blicken, weil dann die Nebenbilder fortfallen, und wenn sie dabei den beiden Zeichnungen eine geringere Distanz geben, als die der Augen ist. Bei einiger Uebung gelingt es auch ohne solche Hilfe; und es ist dies sogar die bequemste Art, große Mengen stereoskopischer Bilder hinter einander durchzusehen. Statt die Gesichtslinien nach einem weit entfernten Punkte einander nahehin parallel zu richten, kann man sie auch nach einem näheren Punkte convergiren lassen und die stereoskopischen Bilder zur Deckung bringen, indem man das rechte Auge nach dem linken, das linke nach dem rechten Bilde hinwendet, wobei ihre Blicklinien sich also zwischen den Bildern und dem Beobachter schneiden. Die Stellung der Augen ist dabei also so, als wenn man diesen Schnittpunkt fixirte, und dort, also den Augen näher, als die Bilder wirklich sind, erscheint auch der stereoskopisch gesehene Gegenstand. Bei diesem Versuche muß man aber natürlich auch das für das rechte Auge bestimmte Bild nach links legen, das für das linke nach rechts, sonst wird die stereoskopische Parallaxe negativ, und man bekommt verkehrtes Relief, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man zwei neben einander liegende Linienzeichnungen ohne Schattirung, zum Beispiel von Krystallmodellen bald mit ungekreuzten, bald mit gekreuzten Blicklinien combinirt.

Die Instrumente, welche unter dem Namen der Stereoskope zur Betrachtung der stereoskopischen Bilder gebraucht werden, haben nur zum Zweck, dem Beobachter die Auffindung und Erhaltung der richtigen Augenstellung zu erleichtern und die störenden Nebenumstände wegzuschaffen; für die Erzeugung der Gesichtstäuschung sind sie ohne wesentlichen Vortheil.




Fig. 230.

Das erste war das Stereoskop von WHEATSTONE, im Durchschnitte dargestellt in Fig. 230. Der wesentliche Theil des Instruments sind zwei Spiegel  $ab$  und  $\alpha\beta$ , welche unter  $45^\circ$  gegen den Horizont geneigt sind, und deren nach oben gekehrte Flächen spiegeln;  $cd$  und  $\gamma\delta$  sind Brettchen, an denen die Zeichnungen angebracht werden. Der Beobachter, dessen Augen durch  $r$  und  $\rho$

et sind, blickt von oben her in die Spiegel. Das Licht, was von  $cd$  wird vom Spiegel  $ab$  gegen das Auge  $r$  so reflectirt, als käme es Spiegelbilde  $ff$ . Aber auch das von  $\gamma\delta$  kommende Licht wird in Spiegel  $\alpha\beta$  nach dem Auge  $q$  so reflectirt, als käme es vom . So glauben also beide Augen das betreffende Bild bei  $ff$  zu und wenn nun die beiden Bilder Unterschiede zeigen, wie sie ein findlicher- Gegenstand zeigen würde, so entsteht derselbe sinnliche 640 t, als sähe der Beobachter bei  $ff$  nicht die Bilder, sondern den ausgedehnten Gegenstand. Da die Zeichnungen hierbei durch gesehen werden, welche rechts in links verkehren, so müssen sie stereoskopische Parallaxe haben.

Stereoskop von BREWSTER, welches gegenwärtig am meisten vert, enthält zwei Prismen  $p$  und  $\pi$  mit convexen Flächen, Stücke dicken Convexlinie von 0,18 Meter Brennweite, die optisch wirken Combination eines ebenen Prisma mit einer Convexlinse. Die beiden zen  $ab$  und  $\alpha\beta$ , Fig. 231, befinden sich nebeneinander auf dem- platte. Das rechte Auge  $r$  blickt durch das nach der Zeichnung  $ab$ , das linke Auge  $q$  s Prisma  $\pi$  nach der Zeichnung  $\alpha\beta$ ; die und  $g$  hindert, daß jedes Auge die für das estimmte Zeichnung sehen kann. Die von nungen ausgehenden Strahlen  $cp$  und  $\gamma\pi$  urch die Prismen in die Richtungen  $pr$  und e verlängert sich in  $q$  schneiden, gebrochen. convexen Flächen der Prismen werden die idel zugleich weniger divergent gemacht, so Augen ein Bild der zugehörigen Zeichnung en. Das Object erscheint körperlich in der




Fig. 231.

Das Ganze ist in einen passenden Holz- geschlossen; um transparente Bilder be- können, befindet sich hinter den Zeich-  $\alpha\beta$  eine mattgeschliffene Glasplatte. Die Bilder werden durch spalte an den Seiten des Kastens bei  $a$  und  $\beta$  ein- und aus-

tereoskop von BREWSTER ist viel compendiöser, als das von re, man kann leichter eine gleichmäßige Beleuchtung beider irken und die Zeichnungen erscheinen vergrößert; doch ist zu daß an den Grenzen von Hell und Dunkel schmale farbige Ränder wenn die Prismen nicht achromatisch gemacht werden, was übrigens dieser Instrumente geschehen ist. Andere Formen von Stereo- den weiter unter beschrieben werden.

chlagendsten treten die Wirkungen des Stereoskops hervor an 1, welche nur Umrisse von Körpern und Flächen darstellen, wo en Hilfsmittel der Täuschung, Farbe, Schatten u. s. w. fortfallen,

mit ihren schwarzen Linien von der Fläche des Papiers vollkommen abhebt und sich in den Raum hinein zu erstrecken. Selbst die verwickeltesten stereometrischen Zeichnungen, Darstellungen von Krystallmodellen, die ohne Stereoskop gesehen kaum verständlich sind, lassen sich vollständig auf und erscheinen als räumliche Gebilde.

Während bei solchen Linienfiguren der Unterschied zwischen dem stereoskopischen und nicht stereoskopischen Anblicke am auffallendsten ist, ist die Lebhaftigkeit der Tauschung selbst natürlich am größten, wenn auch durch eine naturgetreue Schattirung die Körperform herausgehoben ist. 647 Doch ist es fast unmöglich, mit dem Bleistift oder dem Pinsel in der Schattirung von Zeichnungen die feinen Unterschiede beider Bilder genau wiederzugeben, welche dem Bilde des rechten und linken Auges entsprechen, und nur mit Hilfe der Photographie gelingt es, die genaue Uebereinstimmung beider Bilder zu erreichen, welche für einen guten stereoskopischen Eindruck nothig ist. Da dergleichen stereoskopische Photographien jetzt überall im Handel zu haben sind, so darf ich voraussetzen, daß sie meinen Lesern allgemein bekannt sind. Sie werden angefertigt, indem man denselben Gegenstand zwei Mal photographisch abbildet, und zwar von zwei etwas verschiedenen Standpunkten aus. Entweder thut man es gleichzeitig mit zwei photographischen Apparaten oder schnell nach einander mit demselben Apparate. Die Anwendung von zwei Apparaten ist namentlich bei schnell veränderlichen Gegenständen nöthig. Schon wenn die Objecte von der Sonne direct beleuchtet sind, verschieben sich die Schlagschatten oft merklich zwischen der Aufnahme des ersten und zweiten Bildes, da doch gewöhnlich 5 bis 10 Minuten vergehen, ehe der Apparat für die zweite Aufnahme eingestellt ist. Noch nothwendiger ist die Anwendung zweier photographischer dunkler Kammern, wenn sogenannte instantane Bilder von beweglichen Gegenständen, Wellen, Schiffen, Pferden u. s. w. gemacht werden sollen, bei denen unter Benützung scharfer Sonnenbeleuchtung und sehr empfindlicher photographischer Präparate die Expositionszeit auf einen Bruchtheil einer Secunde beschränkt werden kann.

Die Naturwahrheit solcher stereoskopischer Photographien und die Lebhaftigkeit, mit der sie die Körperform darstellen, ist nun in der That so groß, daß manche Objecte, zum Beispiel Gebäude, die man aus stereoskopischen Bildern kennt, wenn man später in Wirklichkeit vor sie hintritt, nicht mehr den Eindruck eines unbekannten oder nur halb bekannten Gegenstandes machen. Man gewinnt in solchen Fällen durch den wirklichen Anblick des abgebildeten Gegenstandes, wenigstens für die Formverhältnisse, keine neuen und genaueren Anschauungen mehr, als man schon hat. Wie viel durch das stereoskopische Sehen gewonnen wird, ist auch hierbei natürlich am auffallendsten an den Bildern solcher Gegenstände, welche sich schlecht zur Darstellung in einer einfachen Zeichnung oder einem Gemälde eignen, wie zum Beispiel an Bildern von unregelmäßigen Felsen, Eisblöcken, mikroskopischen Objecten, Thieren, Wäldern u. s. w. Namentlich die Ab-

bildungen von Gletschereis mit seinen tiefen Spalten, welche durch die Masse des Eises hindurch erleuchtet sind, machen eine überraschende Wirkung. Das einzelne Bild, einzeln betrachtet, macht in solchem Falle gewöhnlich nur den Eindruck eines unverständlichen Aggregats grauer Flecke, während in der stereoskopischen Combination die Formen der Eisblöcke, so wie das transparente und reflectirte Licht derselben auf das deutlichste hervortreten. Es wird in diesem Falle das Verständniss des einzelnen Bildes so schwer, weil einmal schon so unregelmäßige Formen, wie die der Eisblöcke, auch bei blosser Beleuchtung durch auffallendes Licht nicht deutlich wiederzugeben sind, vollends aber bei der transparenten Beleuchtung auch die gewöhnlichen Gesetze der Schattirung ganz abgeändert werden.

Sehr überraschend ist auch die stereoskopische Darstellung glänzender Gegenstände, z. B. einer von leichten Wellen bewegten Wasseroberfläche; doch können wir die stereoskopische Darstellung des Glanzes erst im folgenden 649 Paragraphen besprechen.

Wir gehen nun über zur Untersuchung der Genauigkeit, mit welcher sich die Tiefendimensionen des Gesichtsfeldes mittels der gleichzeitigen Thätigkeit beider Augen beurtheilen lassen. Dabei haben wir zu unterscheiden die Beurtheilung der absoluten Entfernung der gesehenen Objecte, und die Beurtheilung der Entfernungsunterschiede verschiedener Objectpunkte. Die erstere kann bei Ausschluss der früher besprochenen Momente nur gestützt werden auf die Empfindung des absoluten Grades der Convergenz, in welchem sich die beiden Blicklinien befinden, wenn sie auf einen gewissen Objectpunkt gerichtet sind; die Unterschiede der beiden Netzhautbilder können dazu nichts beitragen, oder wenigstens sind, wie es scheint, diejenigen Unterschiede der Bilder, welche etwa dazu beitragen könnten, zu unbedeutend, als dass daraus ein wirklicher Nutzen gezogen würde. — Die Beurtheilung der Entfernungsunterschiede verschiedener Objectpunkte beruht auf dem Unterschiede der Bilder in beiden Sehfeldern. Sie könnte beruhen, einmal auf einer Perception des Unterschiedes der beiden Netzhautbilder bei ruhenden Blicklinien, oder auf einer Perception der Bewegungsunterschiede, welche eintreten, wenn die Augen von der Fixation eines Objectpunktes zu der eines andern übergeführt werden. Bei den bisherigen Versuchen hat sich noch kein Unterschied in der Schärfe der Wahrnehmung herausgestellt, der von der Vermeidung oder Ausführung von Augenbewegungen abhinge, und die Vergleichung der Netzhautbilder scheint daher mit so überwiegender Feinheit vollzogen zu werden, dass die Bewegungsunterschiede daneben nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Wir werden später indessen sehen, dass namentlich bei schwer zu combinirenden Bildern die Evidenz der Täuschung durch die Bewegungen des Auges wesentlich unterstützt wird.

Wir beginnen mit der Beurtheilung der Entfernungsunterschiede, soweit dieselbe von der Vergleichung verschiedener Netzhautbilder abhängt,

wobei aber wohl zu verstehen ist, daß hier die Differenzen der Bilder in beiden Sehfeldern als solche noch nicht zum Bewußtsein kommen, sondern nur die Unterschiede der Tiefendimension, die von jenen Unterschieden abhängen, aufgefaßt und geschätzt werden.

Die Vergleichung der beiden Netzhautbilder, wie sie sich in der Wahrnehmung der Tiefendimension zu erkennen giebt, ist außerordentlich genau und es werden darin zuweilen Unterschiede wahrgenommen, welche kaum in anderer Weise ohne künstliche Meßinstrumente wahrgenommen werden können. Schon bei den gewöhnlichen stereoskopischen Photographien sind die Unterschiede beider Bilder meistens so klein, daß eine außerordentlich genaue Untersuchung dazu gehört dieselben zu entdecken, und gewöhnlich bemerkt man Unterschiede nur längs der Contourlinien vorderer Gegenstände, welche die dahinter liegenden bald im rechten, bald im linken Bilde etwas mehr verdecken.

Dove<sup>1</sup> hat schon folgende Beispiele von der Genauigkeit des stereoskopischen Sehens gegeben:

643 Wenn man zwei Medaillen, die mit demselben Stempel geschlagen sind, aber aus verschiedenen Metallen, stereoskopisch combinirt, so sieht das Gesamtbild schräg liegend und gewölbt aus, nicht eben. Der Grund davon beruht darin, daß die Metalle durch den Druck des Stempels beim Prägen comprimirt werden und sich nachher ihrer verschiedenen Elasticität entsprechend wieder verschieden stark ausdehnen. Deshalb sind Medaillen aus verschiedenen Metallen geprägt nicht genau gleich groß, aber ihre Größenunterschiede sind außerordentlich klein. Ich selbst habe bei Professor Dove solche Medaillen gesehen, eine aus Silber, eine aus Bronze bestehend, deren Größenunterschied mit bloßem Auge gar nicht zu entdecken war, selbst wenn man sie aufeinander legte, und die doch ein deutlich gewölbtcs Bild gaben.

Wenn in einer Buchdruckerpresse derselbe Satz von Buchstaben zwei Mal gesetzt wird, so ist es, wenigstens ohne ungewöhnliche Vorsichtsmaafsregeln, nicht möglich, die Abstände der Buchstaben genau gleich zu machen. In Folge dessen erscheinen im Stereoskop bei der Combination zweier solcher Drucke einzelne Worte und Buchstaben vor oder hinter den andern liegend. Ganz eben erscheint ein solcher Druck nur, wenn beide Exemplare mit demselben Buchstabensatze gedruckt sind; und auch dann kann das Ganze noch gewölbt und schräg liegend erscheinen, wenn durch verschiedene Befeuchtung oder Zerrung das Papierblatt im Ganzen sich gedehnt hat; doch erscheinen dann keine unregelmäßigen Erhöhungen einzelner Buchstaben.

Wie man auf diese Weise die zweite Auflage eines Drucks von der ersten unterscheiden kann, so kann man auch nachgemachte Geldpapiere von ächten unterscheiden, weil es nicht möglich ist, in der Copie den Abstand

<sup>1</sup> W. H. Dove, *Optische Studien*. Berlin 1859. S. 26—36.

hstaben so genau gleich denen des Originals zu machen, daß nicht gen und Vertiefungen einzelner unter ihnen zum Vorschein kämen, an ein ächtes und ein unächttes Papier im Stereoskope combinirt.

zwei ächten Exemplaren desselben Werthpapiers zeigen sich übrigens Theile, welche mit verschiedenen Druckplatten gedruckt sind, ge- in verschiedener Ebene, und man kann mittels des Stereoskops mitteln, wieviel Platten zum Drucke des Papiers angewendet sind. quem ist dieselbe Methode auch, um an Maafsstäben zu controlliren, heilstriche alle gleich groß sind. Man braucht nur zwei verschiedene desselben Maafsstabs stereoskopisch zum Decken zu bringen. Sind le gleich groß, so erscheinen alle Theilstriche in einer Ebene zu sind die Theile unregelmäßig, so treten einige Striche vor, andere zurück.

anderes Beispiel solcher kleinen Verschiebungen, welche durch opische Combinationen leicht sichtbar werden, und welches mir ge- auffiel, ist folgendes. Wenn man mit einem Auge frei, mit dem aber durch den warmen Luftstrom über dem Schornstein einer len Lampe nach der Tapete des Zimmers blickt, so sieht man bei Aufmerksamkeit eine große einspringende und eine ausspringende der Tapete, als hätte sich diese von der Mauer losgelöst. Sieht e Auge durch den warmen Luftstrom, so erscheint rechts die vore- le, links die zurückspringende Falte; umgekehrt dem linken Auge. lichsten wird das Phänomen, wenn sich der Beobachter etwa drei 644 der Wand aufstellt, und die Lampe in die Mitte dieser Entfernung. en die beiden ausspringenden Falten für beide Augen an denselben mmen und die Wirkung verstärkt sich somit. Die Erscheinung ich durch die Brechung des Lichts in dem warmen Luftstrom. n Querschnitt durch den Kreis  $A$  in *Fig. 232* angedeutet,  $r$  und  $q$  beiden Augen des Beobachters,  $a, b, c$  er Wand, so erscheinen diese dem in Richtung der drei geradlinigen strahlen  $ra, rb$  und  $rc$ . In das elangen die Strahlen aber auf den  $q, bq$  und  $cc_1q$ , wegen der Brechung rmen Luftstrome  $A$ . Nur der durch tte gehende Strahl  $bq$  kann gerad- en. Dem Auge  $q$  erscheinen die und  $a$  also in Richtung der Ver- der Strahlen  $qc_1$  und  $qa_1$ , beiden sammen also in  $\gamma$  und  $\alpha$ , wo sich  $qc_1$  mit  $rc$  und  $qa_1$  mit  $ra$  schneidet. nt also die Tapete hervorgetrieben ite des Auges, welches durch den ftstrom sieht, auf der andern Seite nd.




Fig. 232.

Ich habe noch einige Versuche angestellt über den Grad von Genauigkeit, der in der stereoskopischen Vergleichung der beiden Netzhautbilder erreicht werden kann. Zu dem Ende habe ich drei gleiche Nadeln senkrecht befestigt an dem Ende dreier vierkantiger kleiner Holzbalken, diese nebeneinander auf einen ebenen Tisch gelegt, so daß sich die drei Nadeln nebeneinander in Abständen von je 12 Millimetern und nahehin in derselben Ebene befanden. Ich stellte mich dann so auf, daß meine Augen sich in der Höhe oder etwas unter der verlängerten oberen Ebene der drei Balkchen befanden und ich also die drei Nadeln sah, ohne die Begrenzungslinie desjenigen Endes der Holzbalken sehen zu können, an welchem die Nadeln befestigt waren. Die Entfernung meiner Augen von den Nadeln betrug 340 Millimeter. Unter diesen Umständen konnte ich nur mittels der Vergleichung der beiden Netzhautbilder erkennen, ob die Nadeln genau in einer verticalen Ebene sich befanden oder nicht. Waren sie es nicht, so konnten sie durch Verschiebung eines der Hölzer, in denen sie befestigt waren, in eine Ebene gebracht werden, so gut es der Beobachter eben erkennen konnte, und wenn man nachher das eine Auge in Richtung dieser Ebene brachte und nach den Nadeln hinblickte, konnte man leicht erkennen, in wie weit die Einstellung der Nadeln gelungen war. Es ist dabei zu bemerken, daß man die Abstände der Nadeln von einander nicht zu groß machen darf, weil sich dann eine eigenthümliche Täuschung des Urtheils einmischte, die im folgenden Abschnitt bei der Lehre vom Horopter besprochen werden soll. Für den Zweck sind die oben angegebenen Distanzen passend und machen jene Täuschung ohne Einfluß. Ich habe mich unter diesen Umständen nie, auch nur um eine halbe Dicke der Nadeln, d. h. um  $\frac{1}{4}$  Millimeter geirrt, wenn die Ebene der Nadeln senkrecht zur Gesichtslinie war. War dieselbe stark gegen die Gesichtslinie geneigt, so war die Vergleichung nicht ganz so sicher. Wenn eine Nadel um ihre eigene Dicke, also um  $\frac{1}{2}$  Millimeter, vor oder hinter die Ebene der andern getreten war, war dies mit vollkommener Sicherheit zu erkennen. Man kann unter diesen Umständen leicht berechnen, um wieviel das Bild der mittleren Nadel verglichen mit den Bildern der beiden äußeren in dem einen Auge anders lag, als in dem andern, wenn dieselbe  $\frac{1}{2}$  Millimeter vor der Ebene der beiden anderen sich befand. Die Distanz meiner Augen beträgt 68 Millimeter. Auf die Ebene der beiden andern Nadeln projicirt, würde die Lage der mittleren Nadel in den beiden Netzhautbildern  $\frac{1}{2} \cdot \frac{68}{340} = \frac{1}{10}$  Millimeter verschieden gewesen sein. Eine Breite von  $\frac{1}{10}$  Millimeter auf 340 Mm. Distanz liegt schon an der Grenze der kleinsten sichtbaren Abstände. Sie entspricht einem Winkel von  $60\frac{1}{2}$  Winkelsekunden, oder 0,0044 Millimeter Distanz auf der Netzhaut. Daraus folgt also, daß die Vergleichung der Netzhautbilder beider Augen zum Zweck des stereoskopischen Sehens mit derselben Genauigkeit geschieht, mit



er die kleinsten Abstände von einem und demselben Auge  
en werden.

hr kleine Unterschiede, herrührend von der verschiedenen Brechbar-  
rschiedenfarbiger Lichtstrahlen, kommen auch zur Wirkung nach  
bemerkung von BREWSTER, wenn man durch eine Convexlinse von  
s drei Zoll Breite nach einem rothen und einem blauen Objecte  
, die in gleicher Entfernung vom Beobachter sich befinden. Dann  
it das rothe näher als das blaue.

stereoskopische Unterscheidbarkeit der Tiefendistanzen nimmt für  
ere Gegenstände schnell ab. Das mathematische Gesetz dafür hat  
liche Form, wie das für die Bilder von Convexlinsen. Es sei  $r$  die  
des entfernteren Punktes vom Auge,  $\varrho$  die des näheren, und  $f$  eine  
e, von der die Genauigkeit abhängt, so ist die Tiefendistanz der  
unterscheidbar, wenn

$$\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{r} > \frac{1}{f}.$$

h den eben angeführten Messungen können wir den Werth von  $f$   
er größer als 240 Meter setzen. Setzen wir statt  $r$  den Abstand  
ts, statt  $\varrho$  den Abstand des Bildes von einer convexen Linse, deren  
Brennweite gleich  $f$  ist, so wird

$$\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{r} = \frac{1}{f}.$$

n man also irgend einen Gegenstand durch eine äußerst schwache  
se von 240 Meter negativer Brennweite ansehen würde, so würde  
des Gegenstandes an der Stelle des entferntesten Objects liegen,  
tereoskopisch noch, als vor jenem ersten liegend, erkannt werden  
Wer daran gewöhnt ist, die Lage der Linsenbilder zu übersehen, 646  
durch gleich erkennen, daß in der Entfernung nur sehr große  
ensionen, in der Nähe dagegen sehr kleine erkannt werden können.  
Größe  $f$  in dieser Formel bezeichnet die weiteste Distanz, in  
in Object stereoskopisch noch von unendlich weit dahinter ge-  
legenständen unterschieden werden kann.

r die Energie, mit welcher die stereoskopische Vergleichung der  
ilder die Vorstellung verschiedener Entfernung giebt, im Vergleich  
ibrigen Hilfsmitteln des Sehens, ist namentlich eine Abänderung  
skops, das Pseudoskop, lehrreich. Dieses Instrument ist dazu  
die binocularen Bilder wirklicher Gegenstände so zu verändern,  
falsche stereoskopische Reliefs davon erhält. Das Pseudoskop  
ATSTONE enthält zwei rechtwinkelige Glasprismen, deren Kanten  
lig zur Visirebene gestellt sind, und durch welche der Beobachter

in einer ihrer Hypotenusenfläche parallelen Richtung hindurchblickt. Es ist oben auf Seite 634 und in *Fig. 205* schon der Gang der Strahlen in einem solchen Prisma angegeben worden. Man sieht durch ein solches Prisma Objecte, die in Richtung des ihrer Hypotenusenfläche parallelen unabgelenkten Strahls liegen, an ihrem richtigen Orte, die rechts daneben befindlichen dagegen durch die Spiegelung nach links, die links befindlichen nach rechts verlegt. Da jedes Auge die Objecte in dieser Weise durch die Spiegelung symmetrisch umgelagert erblickt, so sind die Bilder beider Augen wieder mit einander in Uebereinstimmung. Die beiden Prismen werden übrigens in kurze Röhren eingesetzt, so daß ihre Hypotenusenfläche der Axe der Röhre parallel ist. Die Röhren müssen um ihre eigene Axe und um eine zur Visirebene senkrechte Axe drehbar sein, damit man die beiden Bilder in übereinstimmende Stellung bringen kann.

Daß dabei auch das stereoskopische Relief verkehrt werden muß, läßt sich leicht an einem einfachen Beispiele erkennen. Man denke sich als Object symmetrisch zu der Mittelebene des Kopfes gelegen einen viereckigen Balken. Beide Augen werden von diesem die vordere Fläche sehen, das rechte auch noch etwas von der rechten Seitenfläche, das linke etwas von der linken. Wenn man nun aber durch das Pseudoskop sieht, erscheint dem rechten Auge das, was es von der rechten Seitenfläche sieht, links neben der vorderen Fläche zu liegen. Das linke Auge sieht umgekehrt etwas von einer Seitenfläche rechts von dieser. Das kann nun an einem Balken nicht vorkommen, wohl aber an einer hohlen Rinne von viereckigem Querschnitt, welche an der dem Beobachter zugekehrten Seite geöffnet ist. In einer solchen würde das rechte Auge in der That ein verkürztes Bild der linken Seitenfläche sehen, das linke Auge eines der rechten. Dem entsprechend erscheint nun auch der Balken durch das Pseudoskop in der That als eine hohle Rinne. Ebenso erscheinen überhaupt convexe Körper als concav, nähere Gegenstände entfernter und so fort.

Die pseudoskopische Täuschung gelingt übrigens doch nur an einer kleinen Zahl von Gegenständen, weil ihr theils die Kenntnifs der gewöhnlichen Formen, theils die Schlagschatten hindernd in den Weg treten. Ich habe schon früher hervorgehoben, daß die Schlagschatten immer unzweideutige Auskunft über gewisse geometrische Verhältnisse geben. Der schattengebende Körper muß immer vor der beschatteten Fläche liegen. Wenn nun auf einer ebenen Fläche irgend ein hervorspringender Körper liegt, so wirft er seinen Schatten auf die Unterlage. Im Pseudoskop sollte er nun eigentlich hinter der Fläche liegend erscheinen, als wäre er in diese eingegraben. Dann hat aber der Schlagschatten keinen Sinn und stört die Möglichkeit der Täuschung. Ebenso hinderlich ist es, wenn eine vorliegende Fläche eine hinterliegende theilweise verdeckt. Dann sieht das rechte Auge an der rechten Seite der vorliegenden Fläche etwas mehr von der hinterliegenden als das linke, und das hat ebenfalls bei der pseudoskopischen Umkehrung keinen Sinn.

Körper, welche man pseudoskopisch sehen will, muß man deshalb gemeinen frei im Raume aufstellen, vor einer entfernteren gleichgefärbten Wand als Hintergrund, auf die sie keinen deutlichen Schatten mehr werfen können, und die keine auffallenden Merkzeichen sich selbst als Gesichtsobject darböten. Ferner muß man verdaß ein Theil des Objects perspectivisch einen andern Theil theildeckt. Passende Objecte sind zum Beispiel Cylinder von beschriebenem gedrucktem Papier, von Holz etc., welche wie hohle Rinnen aussehen, welche wie ein hohles Tabaksblatt aussehen, Medaillen, von vorn et, welche wie Siegel vertieft erscheinen. Sehr lebhaft finde ich schung bei der pseudoskopischen Betrachtung eines hohlen Glas-, der eine eingezätzte Theilung zur Abmessung von Flüssigkeiten ist die Theilung dem Beschauer zugekehrt, so erscheint sie durch daskop an der abgewendeten Seite des Cylinders. Auch verticale der Fäden, die sich in verschiedener Entfernung vom Beobachter geben ein sehr geeignetes Object. Die näheren erscheinen durch daskop entfernter, die entfernteren nahe.

die Bekanntschaft mit der wirklichen Form der Objecte oder der atten hindernd entgegentritt, gelingt es oft noch durch eine lebhaftig der pseudoskopischen Form, wie sie erscheinen sollte, die Vorderseiben hervorzurufen; und wenn sie sich einmal gebildet hat, auch ohne Mühe bestehen. Andererseits kann man auch wohl e Anschauung der wirklichen Form zurückrufen, doch fühlt man dieser durch die dazu nicht stimmenden Differenzen der beiden ilder immer einigermaßen beunruhigt und gestört.

end das Pseudoskop das Relief der gesehenen Gegenstände wird es von dem Telestereoskop stärker hervorgehoben, als es türlichen Anschauung geschieht, und das letztere Instrument ist sonders brauchbar, um an sehr entfernten Gegenständen, die im a Sehen keine oder nur eine sehr undeutliche stereoskopische ig geben, das Relief deutlicher hervorzuheben. Für die Betrachtung entfernter Gegenstände sind die menschlichen Augen nicht weit einander entfernt, um zwei merklich verschiedene Bilder derselben man muß also die Distanz der Gesichtspunkte künstlich verum zwei hinreichend verschiedene Bilder zu erhalten. Dies im Telestereoskop mit Hilfe von vier Planspiegeln, welche in 648 bei  $a$ ,  $b$ ,  $\alpha$  und  $\beta$  im Durchschnitt dargestellt sind. Die beiden

Beobachters befinden sich bei  $r$  und  $\rho$ . Die Linien  $char$  und  $\rho$  zeichnen den Gang der Lichtstrahlen. Die vier Spiegel sind in ten, dessen Wände im Durchschnitt dargestellt sind, so befestigt, eine Drehungen erlauben, um die Bilder zur Coincidenz zu bringen.

wenn die Spiegel  $a$  und  $\alpha$  rechtwinkelig zu einander und zur Kastens befestigt sind, daß der Spiegel  $\beta$  mittels einer Stelln eine horizontale, und der Spiegel  $b$  durch eine andere Schraube

um eine verticale Axe gedreht werden kann. Um ein großes Gesichtsfeld zu haben, muß man die äußeren Spiegel möglichst groß machen.

Wenn  $r_1$  den Ort des Spiegelbildes bezeichnet, welches das System der beiden Spiegel  $a$  und  $b$  vom Auge  $r$  entwirft, und ebenso  $q_1$  das Spiegelbild von  $q$ , entworfen durch die Spiegel  $\alpha$  und  $\beta$ , so sieht das Auge  $r$  mittels der beiden Spiegel die vorliegende Landschaft so, wie sie einem in  $r_1$  befindlichen Auge ohne die Spiegel erscheinen würde; und das Auge  $q$  sieht die Landschaft, wie sie von  $q_1$  aus erscheint. Da nun die Punkte  $r$  und  $q_1$  viel weiter auseinanderliegen als die wirklichen Augen  $r$  und  $q$ , so sind auch die Differenzen der beiden Bilder der Landschaft, wie sie von  $r$  und  $q_1$  aus gesehen erscheinen würde, viel größer, als die natürlichen




Fig. 233.

Differenzen in beiden Augen, und demgemäß erscheint nun auch das stereoskopische Relief der entfernten Objecte, namentlich entfernter Bergzüge und Terrainformen, viel deutlicher als dem bloßen Auge. Wenn die Spiegel so gestellt sind, daß unendlich entfernte Objecte durch das Telestereoskop mit parallelen Gesichtslinien gesehen werden, so erhält die Landschaft dadurch das Ansehen, als wenn der Beobachter nicht die natürliche Landschaft, sondern ein sehr zierliches und genaues Modell derselben vor sich hätte, welches im Verhältniß der Distanzen  $r_1 q_1 : r q$  (Fig. 233) verkleinert ist.

649 Etwas ähnliches wie das Telestereoskop leisten auch die meisten stereoskopischen Photographien von Landschaften, weil in der Regel der Abstand der beiden Gesichtspunkte auch bei der photographischen Aufnahme viel größer gewählt wird, als die natürliche Distanz der Augen. Andererseits können mittels der Photographie stereoskopische Bilder selbst von Himmels-

körpern, namentlich schön vom Monde, erhalten werden, wenn man zwei zu verschiedenen Zeiten aufgenommene Bilder combinirt, wobei die betreffenden Gestirne der Erde etwas verschiedene Seiten zugewendet haben. Obgleich der Mond der Erde im Ganzen fortdauernd dieselbe Seite zukehrt, so kommen doch kleine Schwankungen in seiner Stellung vor, welche es möglich machen von ihm stereoskopische Bilder zu erhalten, wenn man ihn in zwei verschiedenen Monaten photographirt, in solchen Augenblicken, wo die Beleuchtung desselben durch die Sonne genau dieselbe war. Solche Photographien geben nicht bloß die Kugelgestalt unseres Trabanten deutlich wieder, sondern auch einzelnes von dem Relief seiner Ringgebirge.

Die Beurtheilung der absoluten Entfernung eines zweiäugig gesehenen Objects würde, wenn alle andern Mittel der Schätzung fehlen, vollzogen werden können mittels des Gefühls für den Grad der Convergenz, in die unsere auf das Object gerichteten Blicklinien sich stellen. Doch ist dieses Gefühl ziemlich unsicher und ungenau, und wir sind in dieser Beziehung unter Umständen ziemlich bedeutenden Täuschungen ausgesetzt.

Um zunächst zu erweisen, daß wir in der That die absolute Entfernung der gesehenen Objecte und demgemäß auch ihre Größe nach der Convergenz der Blicklinien beurtheilen, so lange nicht andere hindernde Umstände dazwischentreten, dient der von WHEATSTONE angegebene Versuch. Dieser hatte sich sein Spiegelstereoskop so einrichten lassen, daß erstens die beiden Bilder den Spiegeln genähert und von ihnen entfernt werden konnten. Die parallelen Wände, an welchen die Bilder aufgestellt sind, sind auf Schlitten verschiebbar, die beiden Arme des Stereoskops aber drehbar um eine feste Axe, welche zwischen den Spiegeln liegt. Je näher die beiden Bilder den Spiegeln gebracht werden, desto größer werden die beiden Retinabilder ohne Veränderung der Convergenz. Dabei nimmt die scheinbare Größe des gesehenen Objects zu, ohne Veränderung seiner scheinbaren Entfernung. Läßt man dagegen die Bilder an den Armen des Instruments unverrückt, dreht aber die Spiegel um ihre mittlere Axe, so ändert sich die Convergenz, während die Größe des Netzhautbildes unverändert bleibt. Dabei vermindern sich scheinbare Größe und Entfernung des gesehenen Objects, wenn die Convergenz zunimmt.

Ähnliche Verkleinerung und Vergrößerung der Objecte läßt sich auch an jedem Paar stereoskopischer Zeichnungen beobachten, die man entweder mit bloßen Augen oder mit dem Linsenstereoskope vereinigt, wenn man die Zeichnungen einander nähert oder von einander entfernt. Einen Apparat, um die nöthigen Messungen hierbei anstellen zu können, hat H. MEYER<sup>1</sup> angegeben.

WUNDT hat directe Versuche angestellt über die Schätzung der Entfernung nach dem Grade der Convergenz. Er blickte dabei nach einem 650 schwarzen verticalen Faden, der vor einem entfernteren gleichmäßig weißen

<sup>1</sup> H. MEYER, *Poggendorff's Annalen*. LXXXV, S. 198—207.

Grunde sich abzeichnete, und zwar blickte er durch einen horizontalen gegen den Faden hin etwas röhrenförmig verlängerten Schlitz mit beiden Augen, so daß er nur den mittleren Theil des Fadens, nicht seine Enden sah, und auch von den seitlich gelegenen Gegenständen nichts, was ihm als Maafsstab der Entfernung hätte dienen können. Der Faden war an einem horizontal in der Medianebene des Beobachters ausgespannten Drahte aufgehängt und verschiebbar. Zunächst suchte er die absolute Entfernung zu beurtheilen, und zu vergleichen mit der Länge eines in der Hand gehaltenen Maafsstabes. Die Resultate waren folgende:

Wirkliche Entfernung	Geschätzte Entfernung.
180 cm	120 cm
160 "	92 "
140 "	78 "
120 "	58 "
100 "	48 "
90 "	47 "
80 "	47 "
70 "	37 "
50 "	22 "
40 "	25 "

In allen diesen Fällen ist die geschätzte Entfernung kleiner gewesen, als die wirkliche. Ich habe eine ähnliche Versuchsreihe nach etwas abgeändertem Plane und mit dem entgegengesetzten Erfolge gemacht. Dicht vor das Gesicht in die Medianebene hielt ich ein Blatt steifen Papiers und blickte nach einem vertical herabhängenden Faden. Das Papier verdeckte dem rechten Auge alles, was sich links in einigem Abstände neben dem Faden befand, dem linken Auge, was sich rechts neben dem Faden befand. Näherte ich nun von der rechten Seite her einen Bleistift dem Faden, so sah ich diesen nur mit dem rechten Auge, nicht mit beiden. Ich versuchte dann mit dem Bleistift den Faden zu treffen, indem ich ihn schnell vorschob. Dann ging aber immer der Bleistift hinter dem Faden vorbei. Oeffnete ich die vorher geschlossenen Augen, nachdem ich meine Stellung verändert hatte, richtete sie auf den Faden und versuchte dann schnell ihn in der angegebenen Weise zu treffen, so war die Entfernung zwischen Bleistift und Faden gering. Wartete ich länger, indem ich fortdauernd den Faden fixirte, so wurde der Fehler immer größer, wohl wegen steigender Ermüdung der inneren Augenmuskeln.

Sehr viel genauer war die Perception der Entfernungsänderung, wenn bei WUNDT's Versuchen der Faden genähert oder entfernt wurde. Die kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede waren hierbei:

Entfernung des Fadens vom Auge	Unterscheidungsgrenze	
	für Annäherung	für Entfernung
180 cm	3,5 cm	5 cm
170 "	3 "	4 "
160 "	3 "	3 "
150 "	3 "	3 "
130 "	2 "	3 "
110 "	2 "	2 "
80 "	2 "	2 "
70 "	1,5 "	1,5 "
50 "	1 "	1 "

651

Bei 180 Centimeter Entfernung ist jedes Auge um  $1^{\circ} 1'$  nach innen gewendet, und eine Annäherung des Fadens um 3,5 Centimeter entspricht einer Verschiebung jedes einzelnen Netzhautbildes um 72 Winkelsekunden. Diese GröÙe ist schon an der Grenze des durch das Auge Unterscheidbaren. Bei den geringeren Abständen des Fadens werden dagegen erst gröÙere Winkelverschiebungen bemerkt; bei 50 Centimeter Abstand eine solche von 263 Sekunden.

Uebrigens bleibt es bei diesen Versuchen wohl noch zweifelhaft, ob die beiden Augen dem Faden gefolgt und das Netzhautbild auf der Netzhaut ruhend geblieben ist, oder ob die Augen festgehalten wurden und die Verschiebung des Netzhautbildes bemerkt wurde. Die geringere Genauigkeit bei den stärkeren Convergenzen würde dann daraus zu erklären sein, dafs bei vorhandener Convergenzanstrengung die Lage des Augapfels schwerer festzuhalten ist, als bei unangestrebter Parallelstellung.

Die Unvollkommenheit in der Beurtheilung der Entfernung des Fixationspunktes zeigt sich auch, wenn wir bei geschlossenen Augen einen Bleistift in einiger Entfernung vor unserem Gesicht halten und die Augen hinter den Augenlidern auf denselben hinzurichten suchen, so dafs wir ihn fixiren, wenn wir bei unveränderter Augenstellung die Augen öffnen. Meist sind sie dann zu wenig convergent gestellt, und man sieht den Bleistift doppelt, wenn man sie öffnet. Doch gelingt es viel besser sie richtig einzustellen, wie ich schon oben bemerkt habe, wenn man die Spitze des Bleistifts betastet und daran mit der Fingerspitze reibt. Man erhält dann eine deutlichere sinnliche Vorstellung von seinem Orte, und dann gelingt es mir gewöhnlich die geschlossenen Augen so darauf zu richten, dafs ich beim Oeffnen derselben keine Doppelbilder sehe.

Die Unsicherheit, mit der wir den absoluten Grad der Convergenz beurtheilen und danach die absolute Entfernung des fixirten Objects, macht sich in vielen Fällen merklich. Wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier, auf dem stereoskopische Bilder gezeichnet sind, in der Hand hält und die Bilder combinirt, so erscheinen dieselben der Regel nach auf oder nahe vor der Fläche des Papiers, dessen Ort wir kennen, zu liegen, während doch die



parallel oder nahe parallel gestellten Blicklinien sich erst in sehr großer Entfernung hinter dem Papiere schneiden sollten, und dort der scheinbare Ort des körperlich erscheinenden Objects sein sollte. Ebenso gelingt es in der Regel nicht, negative Nachbilder eines hellen Objects zu einer körperlichen Anschauung zu combiniren; sondern sie erscheinen auf die Oberfläche desjenigen reellen Objects, auf welches die Augen gerade gerichtet sind, projecirt zu sein. Zuweilen indessen, wenn die Nachbilder recht scharf und deutlich sind, und wenn die vorliegende reelle Oberfläche keine hervortretende Zeichnung hat, gelingt es auch wohl das Nachbild mit körperlichen Dimensionen und selbständiger Lage im Raume zu erkennen.

Auch wenn man stereoskopische Zeichnungen im Stereoskop combinirt, wo man aufer ihnen keinen andern Gegenstand sieht, mit dem man die absolute Entfernung des erscheinenden Raumbildes vergleichen könnte, ist man ziemlich unsicher über die absolute Entfernung desselben; und wenn man die Lage des scheinbar gesehenen Objects mit der Hand auferhalb des Kastens zu bezeichnen sucht, begeht man ähnliche Fehler, wie WUNDT sie bei der Schätzung der Entfernung des zweiäugig gesehenen Fadens fand. Blickt man dann abwechselnd über dem Instrumente hinweg und durch dasselbe, so kann man leicht die Lage der Hand mit der des stereoskopischen Raumbildes vergleichen und den Fehler schätzen, den man gemacht hat. Auch hierbei finde ich, wie WUNDT, daß ich meist geneigt bin, das Raumbild für näher zu halten, als es ist. Sehr viel besser als mit der nach dem Gefühl bestimmten Lage der nicht gesehenen Hand pflegt dagegen die Vergleichung mit einäugig rechts und links vom Stereoskop gesehenen Objecten zu gelingen. Die Kästen der BREWSTERSchen Stereoskope sind meistens nicht so breit, daß man nicht mit dem rechten Auge einige von den rechts liegenden reellen Objecten, mit dem linken links liegende sehen könnte, deren Entfernung und Größe bekannt ist. Trotzdem man diese nur einäugig sieht, und trotzdem die Entfernung des stereoskopischen Raumbildes nur durch das zweiäugige Sehen bestimmt wird, macht man meist ziemlich genaue Bestimmungen, die nicht viel geändert werden, wenn man nachher das Raumbild mit zweiäugig über oder unter dem Stereoskop gesehenen reellen Objecten vergleicht.

Dieses letztere Verfahren zeigt, daß die Beurtheilung der Entfernung nach der Convergenz der Gesichtslinien unter günstigen Umständen und wenn sie durch keinerlei beirrende Einflüsse gestört wird, ziemlich gute Resultate giebt. Aber es ist eines derjenigen Momente der Beurtheilung, welches leicht überwogen wird durch andere, die ihm widersprechen, wie in dem vorher citirten Beispiele der Bilder, die sich auf eine Fläche von bekannter Entfernung projeciren.

Auch die sogenannten Tapetenbilder<sup>1</sup> zeigen unzweideutig den Einfluß der Convergenz. Wenn man nämlich nach einer Tapete, deren

<sup>1</sup> H. MEYER in ROBER und WUNDERLICH's *Archiv*. 1842 Bd. I. — D. BREWSTER in *Philos. Magaz.* XXX, 305.

sich gleichmäfsig wiederholt, mit convergenten Blicklinien hinsieht, ist es bei gewissen Graden der Convergenz entsprechende Theile des zur Deckung zu bringen, entweder das erste mit dem benachbarten oder auch das erste mit dem dritten oder vierten. Man sieht ein verkleinertes Bild der Tapete, welches, dem Beobachter näher, in der Luft schwebt, desto näher und kleiner, je gröfser die Distanz ist. Wenn hierbei jeder Theil des Musters sich mit nächst- 653  
 urten gleichen deckt, ist das Bild nicht so klein und nah, als wenn mit dem dritten oder vierten gleichen deckt.

Vorstellung von der Entfernung des so gesehenen Tapeten-Musters ist ein Unbestimmtes; sie ist nicht sehr deutlich und wird geändert, sowie andere Gegenstände auf der Tapete vorhanden sind — Bilder, Nägel u. s. w. welche die regelmäfsige Periodicität des Musters stören.

Wenn man sich nun ein solches Tapetenbild entwirft und dann den Kopf von rechts nach links, oder von oben nach unten oder von vorn nach hinten verschiebt, so tritt eine scheinbare Bewegung des Tapetenbildes gegen das reelle Object, welches man mit richtig gestellten Augen binocular anschaut, keine derartige Bewegung; bei diesem Versuch ist die Einrichtung, wir erwarten die Winkelverschiebung, welche dasselbe Object wenn wir unsern Kopf willkürlich verschieben. Solange hierbei die scheinbaren Bewegungen des reellen Objectes die uns gewohnten Grenzen der Distanzen einhalten, beurtheilen wir das Object als ruhend. Bei einer Distanzenveränderung wird die Combination gelöst. Also selbst eine ruhende Distanz, welche auf eine bestimmte Entfernung eingerichtet ist, wird unklar und fein unterschieden von dem andern Grade der Convergenz, welcher die wirklichen Lage des Objectes entsprechen würde. Ich habe hierbei bemerkt, dafs in diesem Falle in der That die vorhandene Convergenz mit einer Genauigkeit den Erfolg bestimmt, und dafs mit recht grofser Sicherheit die nicht objective Natur des Tapetenbildes sich verräth, indem eine Bewegung des Kopfes eine scheinbare Winkelbewegung des Bildes herbeiführt. Bei Convergenz der Blicklinien auf einen Punkt, der hinter der Tapete liegt, bewegen sich die Tapetenbilder stets nach entgegenge-  
 richteter Richtung als der Kopf; bei Convergenz auf einen Punkt vor der Tapete bewegen sie sich in derselben Richtung wie der Kopf.

Es ist leicht zu machenden Beobachtungen scheinen mir von einiger Wichtigkeit zu sein, um die Schätzung derjenigen Momente zu geben, von denen die Beurtheilung der Entfernung gesehener Objecte abhängt.

Dazu gehört auch der Fall, wo stereoskopische Bilder vereinigt werden, 653  
 wenn entsprechende Punkte weiter von einander entfernt sind als die Distanz der Augen, die also nur bei divergenter Richtung der Blicklinien vereinigt werden können. Beobachter, welche wenig in der Erzeugung stereoskopischer Augenstellungen geübt sind, erreichen dies am besten, wenn sie die entsprechenden stereoskopischen Zeichnungen auseinander schneiden, in ein gewöhnliches Stereoskop einlegen und sie nun langsam von

einander entfernen, während sie sie fortdauernd vereinigt zu sehen suchen. Oder man zeichnet, wie ROLLET<sup>1</sup> und BECKER thaten, unter einander auf einem Papier eine Reihe von stereoskopischen Figuren, die einander einzeln congruent sind, aber immer weiter auseinander rücken. Die genannten Beobachter haben eine Reihe von Figuren gegeben, deren jede einzeln einen größeren Kreis, vor dessen Fläche ein kleinerer liegt, stereoskopisch darstellen. Die Mittelpunkte der kleinen Kreise des nächstfolgenden Paares sind immer so weit von einander entfernt, wie die der großen des vorausgehenden Paares. Hat man also die letzteren vereinigt, so vereinigen sich auch die kleinen Kreise des nächsten Paares von selbst; von denen gelang man zur Vereinigung der großen dieses selben Paares, von diesen zur Vereinigung der kleinen eines dritten Paares und so fort. Die Mittelpunkte des ersten Paares kleiner Kreise sind 44 Millimeter distant, die der letzten großen 93 Millimeter, und doch kann ich bei einer Augendistanz von 68 Millimeter auch die letzteren in 30 Centimeter Abstand vereinigen.

In solchen Fällen können sich die Blicklinien nun in gar keinem Punkte des vor uns gelegenen Raums schneiden, sondern nur hinter unserem Kopfe, und dennoch glauben wir ebenso gut, wie bei richtiger Distanz der Bilder, ein stereoskopisches Raumbild vor uns zu haben. Höchstens werden wir durch das Gefühl ungewöhnlicher Anstrengung unserer Augen benachrichtigt, daß dieselben eine ungewöhnliche Stellung haben. Und wenn wir ein stereoskopisches Raumbild, welches mit divergenten Sehaxen betrachtet wird, vergleichen mit reellen sehr entfernten Objecten, die über dem Stereoskop sichtbar sind, einer weit entfernten Bergkette zum Beispiel, so erscheint uns jenes Raumbild nur eben noch sehr viel weiter entfernt, als die entferntesten reellen Objecte.

Auch wenn wir reelle ferne Objecte durch zwei Prismen ansehen, von etwa vier Grad brechendem Winkel, deren brechende Kanten nach außen gekehrt sind, so müssen wir sie mit divergenten Gesichtslinien betrachten, und sie erscheinen uns wohl etwas entfernter, als mit bloßen Augen, im Ganzen aber doch nicht viel anders. Das unendlich Entfernte macht sich in unseren Gesichtsanschauungen eben nicht geltend als eine Grenze, die nicht überschritten werden könnte. Abnehmende Convergenz der Gesichtslinien ist für uns ein Zeichen wachsender Entfernung des Objects. Diesem Zeichen  
 654 gemäß urtheilen wir auch, wenn die Convergenz bis zu negativen Werthen abnimmt, obgleich dann kein vor uns liegender reeller Raumpunkt solcher Convergenz mehr entspricht. Selbst wenn wir durch das Gefühl mehr oder weniger sicher wahrnehmen sollten, daß wir mit einer Augenstellung sehen, die bei der normalen Betrachtung wirklicher Objecte nie vorgekommen ist, so würden wir den Eindruck nach der Regel, der wir bei abnormen Sinnes-eindrücken zu folgen pflegen, doch immer nur vergleichen können demjenigen, welcher ihm am ähnlichsten ist und sich nur durch geringere Convergenz

<sup>1</sup> A. ROLLET, *Wiener Sitzungsberichte*, 10. Mai 1861. Bd. XLIII. — Combination bei divergenten Gesichtslinien auch schon früher ausgeführt durch BURCKHARDT in *Verhandl. d. naturforsch. Ges. zu Basel*, I, 145.

chtlinien davon unterscheidet, dem Eindruck weit entfernter reeller auf das Auge.

gen der Unvollkommenheit, mit der wir den Grad der Convergenzen, können nun auch Täuschungen in der Beurtheilung der zwei-sehenen Raumformen vorkommen, indem wir eine Interpretation der erscheinungen machen, welche für eine andere Convergenz passend er nicht für die wirklich stattfindende richtig ist. Am auffallendsten an solchen Gegenständen, deren Netzhautbilder bei verschiedenen der Convergenz gleich guten Sinn haben würden. Man befestige spiel an einem hoch über und vor unserem Auge gelegenen len Querbalken in einigen Zollen Entfernung von einander drei inge an diesen drei feine schwarze Seidenfäden mittels loser weiter auf und spanne sie durch kleine Gewichte. Zunächst richte man 1 so, daß alle drei in einer Ebene hängen. Dann setze man sich or die Fäden um Armeslänge von ihnen entfernt, so daß der mittlere edianebene des Gesichtes liegt und die Ebene der Fäden senkrecht Medianebene sei. Hinter den Fäden muß sich in größerer g ein gleichmäßig gefärbter Grund ohne besonders markirte Punkte

Man betrachte die Fäden aufmerksam, ob sie wohl wirklich in ne zu liegen scheinen; es zeigt sich dann, daß der mittlere von der Ebene der beiden andern sich befindet, desto mehr je 1 das Gesicht den Fäden bringt. Nun schiebe man den mittleren vas zurück, so daß die Fäden in einer gegen den Beobachter Cylinderfläche liegen, und setze sich wieder davor. Betrachtet un aus größerer Entfernung, so erscheinen sie in einer gegen den concaven Fläche zu liegen; nähert man sich mehr, so wird diese ich bei noch größerer Annäherung tritt der mittlere Faden, obgleich der Ebene der beiden andern liegt, scheinbar vor die Ebene der lern nach vorn heraus. Die Entfernung, aus der die Fäden als 1 erscheinen, ist für verschiedene Beobachter sehr verschieden.

ERING, der diesen Versuch durch Anwendung von Fäden verbessert em ich ihn schon zuvor mit Nadeln in der oben beschriebenen geführt hatte, findet, daß er sich um die ganze Länge des rs des durch die Fäden zu legenden geraden kreisförmigen entfernen müsse, um die Fäden in einer Ebene zu sehen, und mit seiner Horoptertheorie in Zusammenhang, wovon weiter unten selbst sehe aus einer solchen Entfernung die Fläche der Fäden noch icav gegen mich hin, ebenso die Hrn. BERTHOLD, BERNSTEIN und e in meinem Heidelberger Laboratorium darüber Versuche anstellten. BERTHOLD und DASTICH mußten sich bis etwa zur Hälfte jenes 655 rs nähern, ich selbst noch mehr, nämlich auf etwa  $\frac{3}{10}$ , ehe ich in einer Ebene erblickte; am nächsten mußte Hr. BERNSTEIN

Das Verhältniß blieb für verschiedene Entfernungen der Fäden r und für verschiedene Abstände des mittleren Fadens von der

Ebene der beiden andern ziemlich dasselbe, so daß Herr Dr. BERTHOLD die Fäden immer dann nahehin eben sah, wenn seine Nasenwurzel etwa in der Axe des Cylinders sich befand, der durch die Fäden zu legen ist, ich selbst aber immer bis nahe, aber nicht ganz zur Mitte des Radius, oder bis auf ein Viertel des Durchmessers herangehen mußte.

Dabei zeigte sich auch ein Einfluß der Ermüdung der Augen, indem nämlich beim ersten Uebergang aus paralleler Richtung zur Convergenz auf die Fäden der Fehler in der Beurtheilung ihrer Lage kleiner ausfällt, und man näher heran zu gehen geneigt ist, um sie eben zu sehen. Bei länger andauernder Convergenz aber tritt dann der mittlere Faden etwas vor, und man muß wieder weiter zurückgehen.

Hier sind einige Beobachtungsergebnisse, für mein Auge bei längerer Betrachtung erhalten:

Abstand der beiden äußeren Fäden von einander	Abstand des mittleren von der Ebene der beiden andern	Durchmesser des Cylinders	Distanz, in der ich die Fäden in einer Ebene sah	Distanz in Theilen des Durchmessers.
256 mm	10,5 mm	1571 mm	450 mm	0,286 mm
256 "	6 "	2737 "	730 "	0,267 "
117 "	4,2 "	819 "	237 "	0,289 "
117 "	8,1 "	429 "	129 "	0,301 "
120 "	2 "	1802 "	550 "	0,305 "

Die Täuschung bei diesen Versuchen erklärt sich aus der oben bemerkten Thatsache, daß, wenn wir nur nach der Convergenz der Gesichtslinien die Entfernung beurtheilen, wir dieselbe gewöhnlich für kleiner halten, als sie wirklich ist, und sie überhaupt unsicher beurtheilen.

Wenn wir nun auf eine senkrechte durch senkrechte parallele Linien eingetheilte Ebene blicken, so erscheinen die nach rechts hin gelegenen Streifen derselben dem rechten Auge unter größerem Gesichtswinkel als dem linken, weil sie erstens jenem Auge näher sind, und weil zweitens seine Gesichtslinie die genannten Streifen unter einem weniger spitzen Winkel trifft, als die des linken Auges. Umgekehrt erscheinen die nach links gelegenen Streifen dem linken Auge breiter, als dem rechten. Je näher die Augen der besagten Ebene kommen, desto größer werden die Differenzen der Gesichtswinkel für den gleichen Streifen. Um nun entscheiden zu können, ob die wahrgenommenen Differenzen dieser Art der Projection einer ebenen Fläche oder einer gekrümmten angehören, müßte man die Entfernung des Objects nach der Convergenz der Gesichtslinien sehr genau schätzen können. Denn die gleichen Differenzen der beiderseitigen Bilder würde auch ein entfernteres Object zeigen können, wenn es gegen den Beobachter convex wäre, oder ein näheres, wenn es gegen den Beobachter concav wäre. Daß wir nun das gesehene zweiäugige Bild bei den beschriebenen Versuchen  
656 so interpretiren, als gehörte es einem entfernteren Objecte an, rührt, wie ich glaube, nicht oder wenigstens nicht allein davon her, daß wir die

ng des Objects unter ähnlichen Umständen meist als zu groß, wie die oben beschriebenen Versuche bei dem Zielen mit dem gesehenen Bleistift auf den zweiäugig gesehenen Faden zeigen; der That müßte der Irrthum über die Entfernung größer sein, als sich bei jenen Versuchen herausstellt, wenn er die gleiche ng in der scheinbaren Form des Raumbildes geben sollte. So wir in dem ersten Falle der auf Seite 802 gegebenen Beobachtungen ernung auf 627 Millimeter statt auf 450, in dem dritten auf 350 237 schätzen müssen. So groß habe ich die Irrthümer nie gefunden. ie vielmehr, daß wir hier eine falsche Auslegung machen, weil ein Umstand wegfällt, der sonst unser Urtheil unterstützt. Wenn wir nicht bloß gleichmäßig fortlaufende gerade Linien in ähnlicher Lage Fäden bei dem zuletzt beschriebenen Versuche vor Augen haben, inien, welche deutlich sichtbare Merkmale darbieten, oder Objecte, auch horizontale Grenzlinien vorkommen, so erscheinen uns die Längen, welche dem rechten Auge näher liegen, unter größerem inkel, als dem linken Auge und umgekehrt.

diese Unterschiede in den verticalen Dimensionen für beide Augen ht kommen, zeigt evident die Vergleichung der stereoskopischen auf *Taf. III A* und *B*. Das Figurenpaar *A* zeigt die beiden en einer nahe vor dem Gesicht befindlichen, schachbrettartig en Ebene und erscheint als Ebene. Das Paar *B* dagegen zeigt i Projectionen einer schachbrettartig gemusterten, weit entfernten irsch gekrümmten Fläche und erscheint als solche. Nun sind die Linien in dem einen Paar Zeichnungen genau so weit von einander wie die entsprechenden verticalen Linien in dem andern Paare nungen. Wenn also die scheinbare Krümmung nur von der gegenage der verticalen Linien abhinge, wie man bisher meist voraus- t,<sup>1</sup> so müßten beide Zeichnungen genau dieselbe Flächenkrümmung

An und für sich entspricht die relative Lage der verticalen r ebenso gut einem nahe liegenden ebenen, wie einem entfernteren Schachbrett, und erst die Führung der queren Linien giebt für der andere Deutung den Ausschlag. Umgekehrt sind in *Taf. III* : horizontalen Distanzen der Verticallinien überall gleich groß, izenden Querlinien aber gekrümmt und am äußern Rande der iter von einander entfernt, als am innern, wie es in den Bildern n concaven Fläche der Fall sein würde. Aus der Combination hnungen entsteht auch wirklich das binoculare Bild einer gegen chter concaven Fläche, trotz paralleler Stellung der Blicklinien, nahen Objecte nicht entspricht. Wenn wir hier nur nach den len in horizontaler Richtung urtheilen wollten, die ganz fehlen, als ein ebenes Schachbrett erscheinen. Die unpassende Convergenz

<sup>1</sup> namentlich Herr E. HERING als Grundgesetz des binocularen Sehens ausgesprochen hat.

stört hier ebenso wenig, wie bei der Betrachtung der Doppelzeichnung *A Taf. III*,  
 657 wo wir urtheilen, daß wir eine nahe ebene Fläche vor uns haben, trotzdem  
 die dazu nöthige Convergenz fehlt. Die Aehnlichkeit der beiden Bilder *A*  
 mit denen einer nahen Ebene entscheidet unsere Deutung trotz des Gefühls  
 unpassender Convergenz.

Wenn man nun die Bilder so wählt, daß Verschiedenheiten in den  
 verticalen Dimensionen für beide Augen gar nicht vorkommen können, als  
 zum Beispiel wie in dem oben besprochenen Versuche drei verticale Fäden  
 ganz gleichmäÙig fortlaufend und ohne Merkpunkte, betrachtet, so fällt ein  
 Theil derjenigen Zeichen fort, an denen wir sonst die Nähe der Bilder  
 erkennen. Die Differenzen, welche die horizontalen Abstände der Fäden in  
 den beiden Netzhautbildern zeigen, sind nicht begleitet von den sonst immer  
 gleichzeitig vorkommenden entsprechenden verticalen Differenzen, oder  
 wenigstens sind letztere nicht wahrnehmbar, und da wir in der Beurtheilung  
 der Nähe durch Convergenz nicht sehr sicher sind, so beurtheilen wir die  
 drei Fäden wie ein Object, welches etwas ferner ist, und an dem alsdann  
 die vorhandenen Differenzen der horizontalen Dimensionen nur vorkommen  
 können, wenn es gegen den Beobachter convex ist.

Da bei verschiedenen Individuen die Sicherheit der Beurtheilung der  
 Entfernung durch Convergenz sehr verschieden ist, so erklärt es sich, daß  
 die Täuschung an den drei verticalen Fäden bei verschiedenen Individuen  
 sehr verschiedenes Maas hat. Bei Herrn E. HERING ist die Täuschung am  
 meisten entwickelt; bei demselben scheint aber auch die Beurtheilung  
 der Entfernung nach der Convergenz der Gesichtslinien besonders un-  
 vollkommen zu sein, da er sie nach seinen eigenen Beobachtungen ganz zu  
 läugnen geneigt ist.

Zur Prüfung der gegebenen Erklärung habe ich auf die drei schwarzen  
 Fäden kleine Goldperlen aufgezogen und dieselben in Zwischenräumen von  
 etwa vier Centimeter von einander befestigt. Sie dienten als Merkpunkte  
 an den Fäden, die auch im indirecten Sehen deutlich sichtbar waren. Die  
 oben beschriebene Täuschung war danach bis auf einen geringen Rest  
 geschwunden, während ich bei drei ganz schwarzen Fäden, deren äußere  
 256 Millimeter von einander entfernt waren, und die aus 450 Millimeter  
 Entfernung betrachtet wurden, den mittleren 10,5 Millimeter hatte zurück-  
 schieben müssen, um sie eben zu sehen, brauchte ich ihn nach Anbringung  
 der Perlen nur 2 Millimeter zurückzuschieben. Bei 120 Millimeter Abstand  
 der äußeren Fäden, wobei der mittlere 2 Millimeter zurückgeschoben war,  
 mußte ich früher 550 Millimeter abgehen, nach Anbringung der Perlen nur  
 230 Millimeter.

Auch wenn man den drei schwarzen Fäden irgend einen andern Gegen-  
 stand nahe bringt, der hinreichend viele Merkpunkte darbietet, so erkennt  
 man die Krümmung der Fläche, in der die Fäden hängen, selbst wenn der  
 genäherte Gegenstand an sich gar keine geraden Linien zur Vergleichung  
 darbietet. Ich benutzte dazu zum Beispiel einen Sförmig gekrümmten aus-



zten Papierschneider, und selbst wenn ich seinen am stärksten nten Rand den Fäden zuwendete, liefs er die Täuschung über deren ; fast ganz schwinden.

es sehr schwierig ist, ausser durch Maschinen eine hinreichend Uebereinstimmung der verticalen Linien in stereoskopischen Bildern bringen, habe ich Versuche über den Einfluß der Convergenz noch der Weise angestellt. Ich habe zwei rechtwinkelige Prismen neben befestigt, so daß ihre Querschnitte wie die rechtwinkligen Dreiecke 234 234 liegen, daß ihre Kanten einander parallel und zwei ihrer flächen unter einem

Winkel  $\alpha$  gegen geneigt sind. Trifft hl  $af$  bei  $b$  nahehin t auf eine Katheten- dher Prismen, so Strahl zwei Mal d  $d$  reflectirt, wie anzeigt, und tritt h aus der letzten r der Richtung  $eg$  r ersten Richtung




Fig. 234.

einen Winkel abgelenkt, der das Doppelte des Winkels  $\alpha$  beträgt.<sup>1</sup> n in der angegebenen Weise durch ein solches Doppelpisma bei er Stellung seiner Kanten blickt, so sieht man genau dasselbe bild, wie mit bloßem Auge, aber um es zu sehen, muß man das as mehr nach rechts oder links wenden, als es ohne das Prisma re.

t man durch ein solches Prisma nach drei parallelen verticalen ie in einer Ebene sich befinden und deren mittelster daher den eten Augen ein wenig vor die Ebene der beiden anderen vor- scheint, so muß man die Augen, je nachdem man die Fläche  $b$  s Prisma ihm zukehrt, mehr convergiren oder mehr divergiren : vorher, sieht aber genau dieselben Netzhautbilder. Im Falle die vergrößert wird, erscheint der mittlere Faden noch stärker vor- s bisher; im Falle die Convergenz vermehrt wird, tritt er in die r andern scheinbar zurück, oder sogar hinter dieselbe. Da die sammenstellung eine ganz geringe telestereoskopische Wirkung inge man für Convergenz die Fläche  $e$  vor das rechte, für Divergenz  $b$  echte Auge; oder man bringe nach einander beide Flächen vor das

hierbei keine Verzerrung des Bildes durch die Brechung an den Glasflächen zu fürchten, schiefwinkligen Prismen vorkommt und bei stereoskopischen Versuchen sehr störend weil die Veränderungen nur derselben Art sind, wie sie beim Sehen senkrecht durch eine alle Glasplatte vorkommen; in der Mitte des Bildes verschwindend klein und nach den nmetrisch, so daß sie bei den hier zu machenden Versuchen nicht stören können.

linke Auge; die telestereoskopische Wirkung des kleinen Apparats ist in den ersten beiden Fällen gleich, wo der Abstand der Gesichtspunkte durch die Prismen vergrößert wird, und ebenso in den letzteren beiden Fällen, wo dieser Abstand verkleinert wird.

Aus diesem Versuche folgt, daß dieselben Netzhautbilder die Vorstellung eines concaven, ebenen oder convexen Objects hervorbringen, je nachdem die Convergenz der Augen größer oder kleiner ist, daß also die Convergenz bei solchen Objects wohl beachtet wird.

Andererseits betrachte man durch die Prismencombination eine eben mit deutlich sichtbaren Figuren oder Buchstaben bedeckte Fläche, deren Netzhautbilder daher nur bei einem bestimmten Convergenzgrade einem wirklichen Objecte entsprechen können, so wird man dieselbe auch bei vermehrter oder verminderter Convergenz eben sehen. In einem solchen Falle können die Netzhautbilder nur einem bestimmten Objecte angehören, und die Anschauung dieses Objects entsteht auch bei unpassender Convergenz. Ähnlich verhält es sich bei den Fäden mit Perlen; auch da ist die Wirkung der vermehrten Convergenz und Divergenz sehr unbedeutend, und man beobachtet hauptsächlich nur die telestereoskopische Wirkung der scheinbar vermehrten Distanz der Gesichtspunkte.

Ganz anders wirken die gewöhnlichen einfachen Prismen von schwachem brechenden Winkel. Wenn man durch die Mitte eines solchen unter dem Minimum der Ablenkung blickt, die brechende Kante der Nase zugekehrt, so erscheinen alle Objecte nach innen abgelenkt und erfordern erhöhte Convergenz zu ihrer Betrachtung. Aber gleichzeitig erscheinen alle Verticallinien nasenwärts concav, die schläfenwärts gelegenen Theile des Bildes zu schmal, die nasenwärts gelegenen zu breit, Horizontallinien dagegen nach der Nasenseite divergirend. Daraus folgt, daß, wenn das rechte Auge durch ein solches Prisma blickt, die Objecte zweiäugig gesehen, näher erscheinen und so, daß sowohl ihre geraden Horizontallinien wie ihre geraden Verticallinien gegen den Beschauer concav erscheinen. Durch die scheinbare Vergrößerung der verticalen Abstände an der inneren Seite werden die Unterschiede der natürlichen Projection, wonach die jenseits der Medianebene gelegenen Theile des Objects scheinbar kleiner sind, zum Theil oder ganz ausgeglichen. Das Object erscheint ungefähr in derselben Entfernung wie vorher, oder auch trotz der vermehrten Convergenz etwas größer und ferner. Unter diesen Umständen kann die Verbreiterung der nasenwärts gelegenen und Verschmälerung der schläfenwärts gelegenen Theile des Bildes nur auf eine concave Wölbung desselben bezogen werden. Die Krümmung der Verticallinien bedingt die scheinbare Concavität derselben.

Kehrt man die scharfe Kante des Prisma nach außen, so erscheinen ebene Objecte im Gegentheil convex gegen den Beobachter.

Mit den hier betrachteten Erscheinungen, wobei zweiäugige Bilder von Objects bei bald vermehrter, bald verminderter Convergenz der Augen betrachtet werden, hängt auch die Möglichkeit zusammen, Reliefbilder

jecte zu construiren, welche bei geringerer Entfernung und bei den Tiefendimensionen als das Original doch den Eindruck des nach seinen wirklichen Formen und Dimensionen, seiner wirklichen Gestalt, und zwar nicht nur für monoculare, sondern selbst für die Betrachtung nachahmen, indem sie annähernd auch dieselben Eindrücke beider Netzhautbilder herstellen, wie sie die Betrachtung des Originals selbst ergeben würde. Eben deshalb ist ein Reliefbild aus dem Standpunkte angesehen eine sehr viel vollkommenere Art der Darstellung, wenigstens der Form des Objects, als es das vollkommenste Reliefbild je sein kann. Es gehören dahin nicht nur die Basreliefs und die Figuren der Sculptur, welche menschliche Köpfe, Figuren und Figuren darstellen, sondern auch Theaterdecorationen, welche Landschaften darstellen, Kirchenportale, welche perspectivisch verkürzte Säulenhallen darstellen u. s. w.

Man kann die empirisch von den Künstlern<sup>1</sup> gefundenen Regeln der Construction aus einem einfachen stereoskopischen Versuche herleiten. Man nehme eine stereoskopische Doppelzeichnung, deren beide Bilder aber auf zwei getrennten Papierstücken ausgeführt sind, zunächst in solcher Lage zur Hand, daß sie bei richtig gewähltem Convergenzgrade der Augen denselben Anblick wie das Original gewähren. Dann nähere man die beiden Bilder einander, aber so, daß beide in derselben Ebene bleiben. Zunächst die Convergenz der Gesichtslinien, während die Netzhautbilder beider Bilder keine, oder wenigstens nur sehr kleine Veränderungen erleiden, und der sinnliche Eindruck bleibt also, abgesehen von einem allmählich zunehmenden undeutlichen Wahrnehmung der vermehrten Convergenz, derselbe wie zuvor. Denken wir uns nun das Object construirt, welches aus der Lage der Bilder diesen entsprechen würde, so ist dieses ein Bild des Originalobjects. An dem Relief ist zu unterscheiden eine Ebene (Ebene des Hintergrundes), in die alle die unendlich entfernten Punkte des Originals zu liegen kommen, und eine ihr parallele Ebene, in der die Punkte liegen, die mit ihrem Bilde zu liegen kommen. Wenn das Relief dem Beschauer das Original in natürlicher Gestalt darstellen soll, muß die Congruenzfläche durch die Augen des Beschauers gehen. Will man dagegen den Anblick des Originals nicht in der natürlichen Größe, sondern den eines verkleinerten oder vergrößerten Originals wiedergeben, so kann die Congruenzfläche auch anders liegen, so daß der Gesichtspunkt, welcher den Mittelpunkt beider Bilder des Beobachters repräsentirt, nicht in ihr liegt.

Ebenen des Originals bleiben im Reliefbild Ebenen, alle geraden Linien bleiben gerade Linien.

Ebenen des Originals und alle geraden Linien, die der Congruenzfläche parallel sind, bleiben dieser und sich selbst parallel auch im Relief.

<sup>1</sup> BREYSIG, Versuch einer Erläuterung der Reliefperspective. Magdeburg 1798.

Alle anderen einander parallelen Ebenen des Originals schneiden sich im Relief in einer geraden Linie des Hintergrundes.

Alle parallelen Geraden des Originals, die nicht der Congruenzfläche parallel sind, schneiden sich in einem Punkte des Hintergrundes.

Alle Ebenen und Geraden, die durch den Gesichtspunkt gehen, behalten ihre Lage bei auch im Reliefbild.

Endlich, wenn  $f$  und  $\varphi$  die Abstände beziehlich eines Punktes des Originals und seines Bildes von der Congruenzfläche bezeichnen und  $g$  den Abstand des Hintergrundes von der Congruenzfläche, so ist

$$\frac{1}{\varphi} - \frac{1}{f} = \frac{1}{g}$$

die Gleichung, welche den Abstand  $\varphi$  giebt; dieselbe, welche den Abstand des Bildes  $\varphi$  von einer Concavlinse von der Brennweite —  $g$  ergeben würde.

Ganz wie in den Bildern einer solchen werden die Bilder entfernter Gegenstände sehr nahe zusammengedrückt, während die von näheren  
661 Objecten relativ größere Tiefendimensionen erhalten. Eine Concavlinse zeigt also ein richtig construirtes Reliefbild der durch sie gesehenen Objecte.

Wenn man die Congruenzebene und die Ebene des Hintergrunds zusammenfallen läßt, so wird aus dem Reliefbild ein perspectivisches ebenes Bild.

In den Reliefbildern werden gleich gut wahrnehmbare Theile der Tiefendimensionen dargestellt durch gleich große Tiefenunterschiede; und in diesem Sinne können wir sagen, daß wir die objective Welt binocular wie in einem Reliefbild sehen. Wie in einem solchen sind selbst große Abstände sehr entfernter Gegenstände von einander, in Richtung der Tiefe genommen, nur sehr schwach wahrnehmbar, während selbst kleine Tiefenabstände naher Objecte deutlich ausgedrückt sind.

Schließlich habe ich noch gewisse Fehler zu besprechen, welche bei der Beurtheilung von Linienrichtungen beim zweiäugigen Sehen eintreten, und auf welche E. HERING aufmerksam gemacht hat. Wenn man nämlich nach einem langen vertical hängenden Faden hinsieht, der sich vor einer entfernteren gleichmäßig angestrichenen Wand befindet, welche keine deutlich sichtbaren Merkpunkte oder Linien darbietet, nach denen man sich über die Lage der Verticale oder Horizontale orientiren könnte, den Faden selbst aber so lang macht, daß man seinen oberen und unteren Endpunkt nicht sehen kann, oder aber ihn durch einen Hohlcyylinder von der Breite des Gesichts hindurch betrachtet, der den Anblick seiner Enden und seitlicher Gegenstände ausschließt, so kann man bei zweiäugiger Betrachtung doch noch beurtheilen, ob der Faden wirklich vertical sei oder nicht, und wenn er nicht vertical erscheint, ihn durch Verschiebung seines unteren Endes vertical zu machen suchen. Dabei zeigt es sich, wie ich übereinstimmend mit HERING<sup>1</sup> finde, daß, wenn bei der gewählten Kopfstellung die horizontale

<sup>1</sup> E. HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Heft V, S. 297.

ne sich in ihrer Primärlage und der Faden sich in der Medianebene, der wirklich verticale Faden auch für vertical gehalten wird. Wenn gegen den Kopf nach hinten über gebeugt hat, so daß die Visirebene in ihrer Primärlage sich befindet, während der Faden in der Medianlage bleibt, so muß man das untere Ende des Fadens vom Beobachter n. Ist umgekehrt der Kopf vornübergeneigt und die Visirebene überimärlage, so muß man das untere Ende des Fadens dem Beobachter damit der Faden vertical erscheine.

nn der Faden sich nicht in der Medianebene befindet, sondern on derselben, so erscheint er bei aufrechter Kopfhaltung, wenn die ale Visirebene in ihrer Primärlage befindlich ist, wieder vertical, wirklich vertical ist, und wieder muß sein unteres Ende genähert wenn der Kopf vorn über gebeugt wird. Um die Ebene annähernd nmen, in der er geneigt werden muß, zum vertical zu erscheinen, um den unteren Theil des Fadens einen zweiten gelegt, der eine linge bildete, und mittels dieses zweiten den ersten so an mich ogen, daß jener vertical schien. Wenn ich dann nach dem horizon- len herabblickte, wobei der verticale in stark divergirenden Doppel- rscheint, halbirte gewöhnlich der horizontale den Winkel dieser 662 lder, woraus folgt, daß der vertical erscheinende Faden, wenigstens soweit die hier erreichbare Genauigkeit zu beurtheilen zuläßt, in Convergenzwinkel halbirenden Verticalebene liegen mußte. hinten übergeneigtem Kopfe dagegen mußte ich das untere Ende ns von mir wegziehen, wobei die Richtung des ziehenden Fadens weit erkennbar, dieselbe blieb, wie vorher.

Erklärung dieser Thatsachen scheint mir zusammenzuhängen mit rigen Paragraphen Seite 755 und 756 erwähnten Umstände, daß bei enden Augen die Richtung und Lage der gesehenen Objecte so wird, als wenn das Auge eine der mittleren Sehrichtung parallele und die entsprechende Raddrehung hätte. Die stattfindende Con- er Augen wird hierbei nicht berücksichtigt. Wenn wir dies auf den genden Fall übertragen, so würde folgen, daß diejenigen Linien zur Visirebene erscheinen, welche sich abbilden auf Meridianen des Auges, welche bei der Stellung des arallel der mittleren Sehrichtung wirklich vertical sein zur Visirebene.

der Fixationspunkt in der Medianebene liegt, so wird die mittlere g der Medianebene parallel sein, und bei Augen, die dem hen Gesetze folgen, keine Drehung um ihre Längsaxe bedingen. en die in der Primärstellung zur Visirebene verticalen Meridiane geneigter Visirebene zu dieser normal sein, so lange die Augen ren Sehrichtung, also der Medianebene parallel gerichtet sind. aber zur Convergenzstellung über, so werden sie bei nach unten Visirebene sich so drehen, daß die vorher senkrechten Median-

ebenen derselben nach oben hin convergiren, umgekehrt bei nach oben geneigter Visirebene. Die Schnittlinie jener beiden Meridianebenen würde die scheinbar zur Visirebene senkrechte Linie sein, welche im ersteren Falle nach oben, im andern nach unten sich dem Beobachter nähert.

Bei den seitlich nach unten oder oben geneigten Blickrichtungen sind aber nicht mehr dieselben Meridiane der Augen zur Visirebene normal, wie in der Primärstellung. Dafs auch der scheinbar verticale Faden sich in beiden Augen nicht auf den in der Primärstellung verticalen Meridianen abbildet, kann man leicht erkennen, wenn man gerade vor sich an der Wand einen verticalen Streifen befestigt, der deutliche Nachbilder liefert. Diese Nachbilder bilden dann zum Theil sehr grofse Winkel mit dem scheinbar verticalen Faden, sobald man diesen fixirt. Der scheinbar verticale Faden scheint also hier zu liegen in denjenigen Meridianen, welche bei der mittleren Sehrichtung parallelen Blickrichtung vertical sein würden.<sup>1</sup>

Zu bemerken ist aber, dafs nach VOLKMANN's Versuchen, die ich selbst bestätigt finde, bei mangelnder Raddrehung und monocularem Sehen die 663 scheinbar zum Netzhauthorizont verticalen Meridiane auch absolut vertical erscheinen, während beim binocularen Sehen die verticale Linie entsprechen muß den beiden zur Visirebene absolut verticalen Meridianen. Beim binocularen Sehen hebt sich also der einander entgegengesetzte Einfluß, den die Neigung der scheinbar verticalen Meridiane beider Augen auf die Beurtheilung der Stellung einer Senkrechten haben könnte, gegenseitig auf. Dafs dies für die Neigungen nach rechts und links hin geschieht, erklärt sich leicht; zu bemerken aber ist, dafs für die Beurtheilung der Neigung der gesehenen Linie nach vorn- oder nach hintenüber die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane ohne Wirkung bleibt. Wir werden im nächsten Paragraphen sehen, dafs diese Abweichung sich wahrscheinlich an der Anschauung horizontaler Linien erzeugt hat, und daraus erklärt sich dann, dafs sie uns nicht über verticale Linien täuscht.

Ein ähnlicher Irrthum über die Tiefendistanz kommt nun übrigens nicht bloß bei solchen Linien vor, die durch den Fixationspunkt gehen und in der Medianebene liegen, sondern auch bei anders gerichteten Linien, die durch den Fixationspunkt gehen und nur nahehin senkrecht zur mittleren Sehrichtung sind. Die scheinbare Lage solcher Linien entspricht dem vorher aufgestellten Gesetze. Wir deuten sie so, als wenn wir dieselben Netzhautbilder erhalten hätten bei einer Stellung der Augen, parallel der mittleren Sehrichtung.

In dieser Beziehung hat RECKLINGHAUSEN gezeigt, dafs, wenn man auf einer ebenen Fläche einen Stern zeichnet, aus einer Anzahl von Linien

<sup>1</sup> Herr E. HERRING hat diese Erscheinungen mit der Horopterlehre in Verbindung gebracht, wovon im folgenden Paragraphen mehr. Ich bemerke, dafs die vertical zur Visirebene erscheinenden Linien bei mir nie im Horopter liegen, sondern stets in gekreuzten Doppelbildern erscheinen. Da bei Herrn HERRING's Augen die Abweichung der zum Netzhauthorizont wirklich und scheinbar verticalen Meridiane fehlt oder sehr gering ist, so wird seine Regel für sein Auge, wenigstens in den Medianstellungen, von denen er spricht, individuelle Richtigkeit haben.

und, die sich in einem Punkte schneiden, und man diesen Mittelpunkt nach oben gerichtetem Blick fixirt, die nach oben gerichteten des Sterns in einer concaven Kegelfläche zu liegen scheinen, die unten gerichteten in einer convexen; umgekehrt, wenn man den Fixationspunkt der Strahlen mit nach unten gerichtetem Blicke fixirt. Ich finde die Täuschung noch auffallender, wenn man die nahehin horizontalen Linien wegläßt und statt der auf Papier gezeichneten Linien feine glatte Nadeln benutzt, die man in einem Korke so feststeckt, daß sie von einem Punkte aus divergiren und in einer Ebene liegen.

Nach der Theorie, welche aus dem oben angeführten Gesetze hergeleitet werden kann, sollen die besagten Linien scheinbar in einer Kegelfläche zu liegen kommen, deren Spitze im Fixationspunkte liegt, die ferner durch die Blicklinien geht und deren Durchschnitt mit der durch die Mittelpunkte der Augen senkrecht zur Visirebene gelegten Ebene eine Ellipse in der verticalen Axe etwas größer ist, als die horizontale.

RECKLINGHAUSEN hat auch durch Versuche die Lage solcher Linien geprüft, die zur mittleren Sehrichtung bei gehobenem oder gesenktem Kopfe senkrecht erschienen. Er benutzte dazu einen feinen glatten Draht, der in der Mitte mittels eines feinen Charniergelenks so verstellbar wurde, daß er verschiedene Neigung gegen die mittlere Sehrichtung (die Mittellinie des Convergenzwinkels) erhielt. Das Gelenk, was ihn trug, war einerseits an einer runden Eisenstange befestigt, welche in der Verticalen der mittleren Sehrichtung lag und um ihre Längsaxe gedreht werden konnte. Durch Drehung um diese Axe konnte der Winkel, in welchem sich bewegte, verschiedene Neigung gegen die Visirebene gegeben werden. Um jeder Stellung dieser Ebene die Stellung des Drahtes gesucht werden, 664

hat er sein oberes und unteres Ende gleich weit vom Beobachter entfernt gehalten. Die Theorie fordert für die genannten Lagen des Drahtes wiederum die Kegelfläche, die durch den Fixationspunkt und die Blicklinien gehend ist. Die Messungen von RECKLINGHAUSEN stimmten sehr gut mit der Folgerung der Theorie. Er nannte diese Fläche die Normalfläche, weil in ihr die zur mittleren Sehrichtung scheinbar normalen Linien

liegen. Die Normalfläche würde für solche Augen, welche keine Abweichung von den scheinbar verticalen Meridianen haben, mit der im nächsten Paragraphen beschriebenen Horopterfläche für Linien, die durch den Fixationspunkt zusammenfallen. Dagegen ist sie mit dieser nicht identisch bei solchen Augen, deren scheinbar verticale Meridiane nicht mit den wirklich verticalen zusammenfallen,<sup>1</sup> wie sich weiter unten zeigen wird.

Man zeichne ein System concentrischer Kreise auf ein Blatt und

<sup>1</sup> RECKLINGHAUSEN selbst hat diesen Unterschied nicht gemacht; denn obgleich er die Abweichung von den scheinbar verticalen Meridianen entdeckt hat, hat er den Einfluß dieser Abweichung auf die Lage der Linien noch nicht gekannt.




bei convergirenden Gesichtslinien und geneigter Blickenebene deren Mittelpunkt fixirt, so erhalten diese Kreise ebenfalls eine kleine scheinbare Drehung um ihre horizontale Axe in demselben Sinne, wie die verticalen Linien, aber von geringerer Gröfse. Hat man nun einen verticalen Diameter der Kreise hinzugefügt, so wird dieser stärker geneigt, als die Kreise, und löst sich scheinbar von ihnen los. Bei gehobener Blickenebene erscheint das obere Ende des Durchmessers dem Beobachter näher als die Ebene der Kreise das untere entfernter. Umgekehrt bei gesenkter Blickenebene.

Da die horizontal verlaufenden Bögen der Kreise keine sichere binoculare Anschauung geben, erscheinen sie auch zuweilen winkelig verbogen und dem Durchmesser anzuhaften.

Auch dieser Versuch gelingt sehr viel leichter, wenn man Kreise und Durchmesser aus sehr feinen Drähten zusammenfügt. Die hierbei vorkommende Täuschung erfordert, daß der Beobachter am Bilde die stattgefundene Drehung der Augen nicht erkennen könne. Auf einem Papierblatte sind in der Regel Merkpunkte genug, an denen der Beobachter erkennt, daß er zwei gegen einander gedrehte Bilder desselben Objects vor sich hat. Die Objecte für die hier beschriebenen Versuche müssen so beschaffen sein, daß sie auch unter Voraussetzung kleiner Drehungen ihres Netzhautbildes noch eine reelle Deutung zulassen. Wir fanden oben ein ähnliches Verhältniß für die Erkennung der Convergenz aus gewissen Eigenthümlichkeiten der Bilder.

#### Regeln der stereoskopischen Projection.

Es sei in *Fig. 235* die Ebene des Papiers die Visirebene, in der *P* und *Q* die Mittelpunkte der Visirlinien für beide Augen darstellen. Es sei *AB* der



*Fig. 235.*

und *SQ*, welche die Ebene der Zeichnung in *R* und *T* schneiden. Die letzteren beiden Punkte sind diejenigen, in welchen *S* beziehlich für das Auge *P* oder *Q*

Durchschnitt einer stereoskopischen Zeichnung, deren Ebene normal sowohl zur Visirebene als zur Medianebene des Kopfes sei, der gewöhnlichen Haltung entsprechend, in der man stereoskopische Zeichnungen zu betrachten pflegt. *CD* sei die Medianlinie der Visirebene, *S* ein darzustellender Punkt, der auch außerhalb der Visirebene liegen kann; in diesem Falle stellt das *S* in der Zeichnung den Fußpunkt des von ihm auf die Visirebene gefällten Perpendikels dar. Um die Projection des Punktes *S* in den beiden Zeichnungen zu finden, ziehe man die Linien *SP*

darzustellen ist. Um die Lage dieser Punkte zu bezeichnen, wollen wir rechtwinkelige Koordinaten benutzen, welche beziehlich der Visirebene, der Medianebene und der Ebene der zu machenden Zeichnung parallel seien, deren Mittelpunkt  $O$  der Durchschnittspunkt der drei genannten Ebenen ist. Und zwar sei  $OA$  die Richtung der positiven  $x$ ,  $OD$  die der positiven  $z$ , die  $y$  senkrecht zur Ebene des Papiers. Bezeichnen wir demgemäß die Koordinaten

1) des Punktes $P$ mit $x = + a$ $z = - b$ $y = 0$	2) des Punktes $Q$ $x = - a$ $z = - b$ $y = 0$
---	---

3) des Punktes  $S$

mit  $x = \alpha$   
 $y = \beta$   
 $z = \gamma$

4) des Punktes  $R$

mit  $x = \xi_0$   
 $y = v_0$   
 $z = 0$

5) des Punktes  $T$

$x = \xi_1$   
 $y = v_1$   
 $z = 0,$

so sind die Bedingungen dafür, daß die Punkte  $P, R, S$  in einer geraden Linie liegen,

$$\frac{\alpha - a}{\alpha - \xi_0} = \frac{\beta}{\beta - v_0} = \frac{\gamma + b}{\gamma} \dots \dots \dots 1)$$

und die Bedingungen, daß  $Q, T, S$  in einer geraden Linie liegen,

$$\frac{\alpha + a}{\alpha - \xi_1} = \frac{\beta}{\beta - v_1} = \frac{\gamma + b}{\gamma} \dots \dots \dots 2).$$

Zunächst zeigt sich, daß

$$v_0 = v_1 = \frac{\beta b}{\gamma + b} \dots \dots \dots 1 a),$$

daß also in beiden Bildern die Höhen entsprechender Punkte über der Horizontalinie  $AB$  gleich groß sein müssen.

Die beiden Gleichungen ergeben ferner

$$\xi_0 = \alpha - \frac{\gamma(\alpha - a)}{\gamma + b} = \frac{\alpha b + \gamma a}{b + \gamma}$$

$$\xi_1 = \alpha - \frac{\gamma(\alpha + a)}{\gamma + b} = \frac{\alpha b - \gamma a}{b + \gamma}$$

666 Die Differenz  $\epsilon$  dieser beiden Werthe

$$\epsilon = \xi_0 - \xi_1 = \frac{2\gamma a}{b + \gamma} \dots \dots \dots 1b)$$

ist unabhängig von den Werthen von  $\alpha$  und  $\beta$ ; sie ist also für alle Objectpunkte dieselbe, welche als in gleicher Entfernung hinter der Ebene der Zeichnung liegend angenommen werden. Diese Differenz  $(\xi_0 - \xi_1)$  bezeichnet die Gröfse der Verschiebung, welche die Punkte der einen Zeichnung im Vergleich zu denen der andern nach rechts oder nach links hin erlitten haben. Dabei ist angenommen, dafs die Zeichnungen so aufeinander gelegt sind, dafs Punkte, die in dieser Ebene der Zeichnung selbst gedacht werden (z. B. die Linie, welche die Zeichnung einrahmt), aufeinander fallen. In vielen Fällen ist es dagegen passender, die Zeichnungen so zu vergleichen, dafs unendlich weit entfernte Punkte aufeinander fallen, zum Beispiel die Punkte  $p, q$ , welche durch die beiden parallel mit  $CD$  gerichteten Blicklinien  $Pp$  und  $Qq$  getroffen werden. Setzen wir  $\gamma = \infty$ , so wird nach Gleichung 1 b)

$$\epsilon_\infty = 2a$$

und setzen wir

$$e = \epsilon_\infty - \epsilon$$

und

$$b + \gamma = \varrho,$$

so ist

$$e = \frac{2ab}{\varrho} \dots \dots \dots 1c).$$

In dieser Gleichung bezeichnet  $2a$  die Distanz beider Augen,  $b$  den Abstand der Zeichnung,  $\varrho$  den Abstand des Objects von einer Ebene, die durch die Mittelpunkte beider Augen senkrecht zur Visirebene gelegt ist. Für alle reellen, vor den Augen liegenden Punkte mufs  $e$  immer positiv sein, weil  $2a$ ,  $b$  und  $\varrho$  immer positiv sind. Dabei liegt in dem Bilde für das rechte Auge jeder nähere Punkt mehr nach links als in dem des linken Auges. Zugleich läfst die Gleichung 1 c) erkennen, dafs die stereoskopische Differenz  $e$  für sehr grofse Werthe von  $\varrho$  sehr klein ist und erst für kleine Werthe von  $\varrho$  grofs wird.

Den Umstand, dafs die Gröfse von  $e$  gleich grofs ist für Gegenstände, die alle in derselben, der Ebene der Zeichnung parallelen Ebene liegen, hat O. N. ROOD<sup>1</sup> benutzt, um ein Instrument zu construiren, mit dem man von gegebenen einzelnen perspectivischen Zeichnungen beliebiger Objecte ein Paar zusammengehörige stereoskopische Zeichnungen copiren kann. Das Original, mit Oel transparent gemacht, wird auf einer horizontalen Glasplatte befestigt und von unten her beleuchtet. Darauf wird ein ebener viereckiger Rahmen gelegt, dessen untere Seite mit Schreibpapier überzogen ist. Dieser Rahmen kann mittels einer Stellschraube um kleine Distanzen von rechts nach links verschoben werden. Man zeichnet nun zunächst eine Zeichnung vollständig nach, ohne die Stellung des Rahmens zu verändern, und die andere so, dafs man mit den ganz vorn befindlichen Linien beginnt und dann zu den nächst entfernteren übergeht und so fort. Bei jedem Uebergange aber zu entfernteren Punkten verschiebt man den Rahmen, der die Copie trägt,

<sup>1</sup> O. N. ROOD, *American Journal of Science and Arts*. Vol. XXXI, p. 71. 1861.

ig, entsprechend dem Tiefenabstande. So erhält man zwei Zeichnungen, stereoskopisch combinirt ein körperliches Relief zeigen.

Ann zwei Punkte von verschiedenem Abstände  $q'$  und  $q''$  stereoskopisch sind und die entsprechenden stereoskopischen Differenzen mit  $e'$  und  $e''$  667 et werden, so ist

$$e' - e'' = 2ab \left( \frac{1}{q'} - \frac{1}{q''} \right) . . . . . 2a)$$

Wenn wir hierin für  $e' - e''$  den kleinsten in der Zeichnung erkennbaren so erhalten wir zusammengehörige Werthe der Abstände  $q'$  und  $q''$ , in der Grenze der erkennbaren Unterschiede liegen. Setzen wir zur

$$\frac{2ab}{e' - e''} = f,$$

die Gleichung 2a)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q'} - \frac{1}{q''}$$

für diesen Fall gegebene Formel. Wenn wir die mittlere geometrische Abstände zwischen  $q'$  und  $q''$  mit  $r$  bezeichnen, so läßt sich die letzte Formel schreiben

$$q'' - q' = \frac{r^2}{f},$$

stereoskopisch unterscheidbaren Unterschiede der Entfernung wie die Größe des Quadrats der mittleren Entfernung  $r$ .

Die Veränderungen zu übersehen, welche das stereoskopische Relief bei kleinen Verschiebungen der Bilder liefert, müssen wir die scheinbaren Coordinates Objectpunktes  $\alpha, \beta, \gamma$  ausdrücken durch die Coordinaten seiner beiden  $\xi'', v$ . Aus den obigen Gleichungen 1) und 2) ergibt sich

$$\frac{\alpha - a}{\alpha - \xi_0} = \frac{\alpha + a}{\alpha - \xi_1} .$$

$$\alpha = \frac{a(\xi_1 + \xi_0)}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

$$\beta = \frac{2va}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

$$\gamma = \frac{b(\xi_0 - \xi_1)}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

wir wie vorher die stereoskopische Differenz

$$2a + \xi_1 - \xi_0 = e$$





so ergibt sich aus den Gleichungen 4) und 4 a)

$$A\alpha_1 + B\beta_1 + \left[C - \frac{D}{p}\right] \varrho_1 + D = 0 \quad . \quad . \quad . \quad 5 a)$$

Die Bildpunkte liegen also auch in einer Ebene; und wenn  $A = B = 0$ , das heisst die Ebene des Originals der durch beide Augen gehenden Verticalebene  $\varrho = 0$  parallel ist, so ist die Bildebene derselben Ebene also auch ihrem Original parallel. Wenn andererseits  $D = 0$  ist, das heisst die Originalebene durch den Mittelpunkt der Coordinaten, oder den Gesichtspunkt geht, so fällt die Bildebene ganz mit ihrem Original zusammen.

Wenn wir im Original eine Schaar paralleler Ebenen haben, deren Gleichung in der Form 5) gegeben ist und die einzeln dadurch unterschieden sind, daß  $D$  für jede einen andern Werth hat, so reducirt sich die Gleichung 5 a) für die Bildebenen, wenn man darin  $\varrho_1 = p$  setzt, auf

$$A\alpha_1 + B\beta_1 + Cp = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 4 b)$$

welche unabhängig von  $D$  ist. Das heisst die Abbilder aller jener parallelen Ebenen schneiden die Ebene  $\varrho_1 = p$  (die Hauptebene) in derselben geraden Linie, deren Gleichung in 4 b) gegeben ist.

Die Abbilder einer Schaar paralleler Ebenen schneiden sich also entweder einander und die Hauptebene gar nicht, oder sie schneiden sich und die Hauptebene alle in einer geraden Linie, ihrer Fluchtlinie. Da nach der vorher gemachten Bemerkung diejenige in jener Schaar paralleler Ebenen, welche durch den Mittelpunkt des Coordinatensystems geht, mit ihrem Bilde zusammenfallen muß, so muß diese 670 Ebene auch die Hauptebene in der Fluchtlinie schneiden. Um die Fluchtlinie einer Schaar paralleler Ebenen zu finden, lege man ihnen parallel also eine Ebene durch den Gesichtspunkt; diese schneidet die Hauptebene in der gesuchten Fluchtlinie.

Wenn wir ferner die Gleichungen 4) in die Form setzen

$$\alpha_1 - \alpha + \frac{\alpha \varrho_1}{p} = 0, \quad \beta_1 - \beta + \frac{\beta \varrho_1}{p} = 0,$$

$$\varrho_1 = \frac{\varrho ab}{ab + \varrho \eta},$$

so ergibt sich, daß für  $\varrho = 0$  sein muß

$$\varrho_1 = \varrho = 0, \quad \alpha_1 = \alpha, \quad \beta_1 = \beta,$$

daß also für jeden Punkt der Ebene  $\varrho = 0$  das Abbild mit dem Original zusammenfällt.

Nennen wir diese Ebene  $\varrho = 0$  die Congruenzebene (BREYSIG's Bildebene), so ist das Bild jeder Ebene  $A$  des Originals zu construiren, indem man eine Ebene legt durch die Schnittlinie von  $A$  mit der Congruenzebene und die zu  $A$  gehörige Fluchtlinie.

Gerade Linien des Originals sind zu betrachten als Schnittlinien je zweier Ebenen. Ihr Bild muß die Schnittlinie der Abbilder beider Ebenen, also wieder eine gerade Linie sein. Eine Schaar paralleler gerader Linien kann angesehen werden als das System der Schnittlinien von zwei Schaaren paralleler Ebenen. Die





Wenn  $D = 0$ , so ist die zweite Gleichung identisch mit der ersten und die Originalebene fällt mit ihrem Bilde zusammen. Dieser Bedingung genügen die Ebenen, welche durch den Punkt  $\alpha = \beta = \rho = 0$  gehen, der also die Bedeutung des Gesichtspunktes hat. Endlich schneiden sich die Ebenen 5) und 5b),

oder

$$\left. \begin{aligned} D &= Dn - Dn \frac{q_1}{p} . . . . . \\ q_1 &= p \cdot \frac{n-1}{n} . . . . . \end{aligned} \right\} 56$$

Die durch die Gleichung 5 c) gegebene Ebene, die den Gesichtspunkt nicht enthält, ist also die Congruenzebene. Sobald also das Relief nach den gewöhnlich angenommenen Regeln construiert ist und der Gesichtspunkt nicht in der Congruenzebene liegt, so ist es, aus dem richtigen Gesichtspunkte betrachtet, optisch ähnlich der Darstellung eines verkleinerten oder vergrößerten Modells des Originals, in welchem der Gesichtspunkt des Beobachters seine relative Lage behalten hat. Dabei ist dann der Gesichtswinkel, unter dem das Reliefbild erscheint, noch derselbe, wie für das Original. Wenn die Congruenzebene zwischen Beobachter und Relief liegt, entspricht letzteres einem linear vergrößerten Objecte, wenn die Bildebene dagegen hinter dem Beobachter liegt, einem linear verkleinerten Objecte.

Wenn die Congruenzebene sich der Hauptebene unendlich nähert ( $n = \infty$ ), so verwandelt sich das Reliefbild in eine ebene perspectivische Zeichnung.

Die Veränderungen, welche scheinbar vor sich gehen, wenn man zwei richtige stereoskopische Abbildungen eines Objects in ihrer eigenen Ebene einander nähert oder entfernt, sind also von derselben Art, wie sie bei der Ausführung von Reliefbildern des Originals stattfinden. Man beobachtet die Erscheinung auch leicht an stereoskopischen Bildern, wenn man die angegebenen Bewegungen ausführt, und kann durch dieses Mittel leicht die gewünschte richtige Tiefenanschauung des Objects hervorbringen. Doch ist zu bemerken, daß wir auch ohne den Bildern die richtige Entfernung zu geben, bei bekannten Objecten meistens die richtige Tiefenanschauung bilden, weil wir nicht sehr empfindlich für den absoluten Werth der Convergenz unserer Gesichtslinien sind, und eben deshalb leicht, wenn andere Vergleichungspunkte fehlen, so urtheilen, als hätten unsere Blicklinien den Grad der Convergenz, der einer richtigen Tiefenanschauung des Objects entsprechen würde.

672 Es ist hierbei freilich zu bemerken, daß bei einer solchen Verschiebung stereoskopischer Bilder nicht bloß der Grad der Convergenz der Gesichtslinien geändert wird, sondern auch die Ansicht der Bilder selbst, weil bei unveränderter Fixation derselben Punkte die Gesichtslinien, wenn sie vor der Verschiebung senkrecht auf der Fläche des Bildes waren, es nach der Verschiebung nicht mehr sind und daher auch das Bild sich etwas anders auf die Netzhaut projicirt. Es läßt sich aber leicht einsehen, daß, wenn wir die Bilder selbst so drehen wollen, daß ihr Netzhautbild unverändert bleibt, die nach entsprechenden Punkten der Bilder gezogenen geraden Linien sich größtentheils nicht mehr schneiden würden, und also kein reeller Punkt gleichzeitig den beiden Punkten in den Zeichnungen entsprechen würde. Wie die Projection des Bildes in solchen Fällen geschieht, kann erst im folgenden Abschnitte bei der Lehre vom Horopter ermittelt werden.

Wenn man stereoskopische Bilder durch **convexe** oder **concave** Linsen ansieht, welche dicht vor die beiden Augen des Beobachters gestellt sind, und deren Mittel-

gleich weit von einander entfernt sind wie die Mittelpunkte beider Augen, hängen dadurch die Größen  $e$ ,  $\xi$  und  $v$  der Gleichungen 3 a) in demselben wie die scheinbare Entfernung des Bildes  $b$ ; es bleiben demnach die Werthe  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\varrho$  ungeändert. Solche Linsen verändern also nicht die Lage und GröÙe des stereoskopischen Reliefs. Es ist dies wichtig der Brillengläser, welche, wenn sie richtig gestellt sind, keine Größenerhöhung im Gesamtbilde hervorbringen, trotzdem jedes einzelne optische Bild That vergrößert oder verkleinert ist.

mit aber Brillengläser richtige GröÙen und Entfernungen der Objecte ist es wesentlich nöthig, daß ihre optischen Mittelpunkte gerade so weit voneinander entfernt sind, wie die Knotenpunkte der parallel gestellten Augen. In Fig. 236  $a_0$  der optische Mittelpunkt eines concaven Brillenglases ist, Object,  $a_0 f_0$  die optische Axe des so liegt das Bild  $\beta_0$  von  $b$  in der Verbindungslinie von  $a_0$  mit  $b$ ; und wenn  $b$  und  $\beta_0$  die Lothe  $b f_0$  und  $\beta_0 f_0$  die optische Axe fällt, die Mitte des Glases mit  $p$  bezeichnet man setzt

$$a_0 f_0 = r \quad a_0 \varphi_0 = s,$$

in den Theoremen des § 9, S. 84:

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{p}.$$




Fig. 236.

durch ist die Lage von  $\beta_0$  gegeben. Wenn nun die Linse parallel ihrer Axe verschoben wird, so daß ihr optischer Mittelpunkt in  $a_1$  und ihre optische Axe in  $a_1 f_1$  liegt, so wird das Bild von  $b$  in die Verbindungslinie von  $b$  und  $a_1$  fallen, übrigens in dem Lothe  $\varphi_0 \beta_0$  bleiben. Das Bild verschiebt sich die Länge

$$\beta_0 \beta_1 = a_0 a_1 \times \frac{\varphi_0 f_0}{a_0 f_0} = \alpha \cdot \frac{r - s}{r},$$

die Verschiebung des Glases  $a_0 a_1 = \alpha$  setzen. Daraus folgt mit Hülfe der Gleichung zwischen  $r$  und  $s$

$$\beta_0 \beta_1 = \alpha \frac{s}{p} = \alpha \frac{r}{r + p}.$$

Wenn wir uns dicht hinter den Concavlinen bei  $o$  ein Auge stehend, welches die Bilder  $\beta_0$  und  $\beta_1$  hinblickt und diese Bilder auf die feste Ebene  $cc$  in  $\gamma_0$  und  $\gamma_1$ , so ist die scheinbare Verschiebung der Projection auf dieser Ebene den Abstand von  $a_0$  wir mit  $A$  bezeichnen wollen,

$$\gamma_0 \gamma_1 = \beta_0 \beta_1 \cdot \frac{A}{s} = \frac{\alpha A}{p},$$

also unabhängig von der Lage des Objects  $b$ . Die Verschiebung des optischen Bildes bei Verschiebung der Concaulinse von  $a_0$  nach  $a_1$  ist also gerade dieselbe, als wenn man eine perspectivische Zeichnung des Objects auf der Ebene  $cc$  um die GröÙe  $\gamma_0\gamma_1$  verschöbe. Denken wir uns die Projectionsebene  $cc$  im Brennpunkt der Linse, machen wir also  $A = p$ , so wird  $\gamma_0\gamma_1 = \alpha$ , also gleich der wirklichen Verschiebung des Glases.

Die Erscheinungen, welche entstehen, wenn Brillengläser vor den Augen seitwärts verschoben werden, sind also dieselben, welche bei gegenseitiger Entfernung oder Näherung stereoskopischer Zeichnungen sich zeigen. Der Versuch bestätigt vollkommen diese Folgerung der Theorie. Stehen die Centren der Conca Brillengläser einander näher als die Augenmittelpunkte, so erscheinen die Gegenstände zu nah, im andern Falle zu weit. Bei Convexbrillen ist es umgekehrt, weil  $p$  das entgegengesetzte Vorzeichen hat.

Es ist dieser Umstand bei der Verfertigung der Brillen<sup>1</sup> wohl zu beachten, namentlich auch deshalb, weil eine fortgesetzte angestrenzte Haltung des Auges leicht Schmerzen im Auge und im Kopfe hervorbringt. Conca Brillen, deren optische Mittelpunkte nicht weit genug von einander entfernt sind, zwingen die Augen fortdauernd zu convergiren; sind die Mittelpunkte im Gegentheile zu weit entfernt, so muß der Beobachter divergiren. Am schlimmsten ist es, wenn ein Mittelpunkt höher als der andere liegt. Namentlich die Nasenklemmer sind in dieser Beziehung oft falsch construirt. Wenn die optischen Mittelpunkte der Gläser in der Mitte ihrer Fläche sitzen, so sind sie einander zu nah und zwingen zum dauernden Convergiren. Auch Höhenabweichungen treten leicht ein, weil der Klemmer sich in der Regel nicht ganz horizontal auf dem Nasenrücken festsetzt.

Blickt man nach wirklichen Objecten durch zwei parallel gestellte Teleskope, zum Beispiel Binocles, so erhält man denselben Erfolg, als wenn man die entsprechenden stereoskopischen Zeichnungen dem Auge nähert; die Gesichtswinkel werden für alle Theile des Bildes gleichmäÙig vergrößert. Das entspricht nun, wie wir oben für diesen Fall bei den Zeichnungen gesehen haben, einer Annäherung und Verkürzung der Tiefendimensionen des Objects ohne Veränderung seiner zur Gesichtslinie senkrechten Dimensionen. Durch Binocles erscheinen also die Objecte genähert, übrigens in natürlicher GröÙe, aber verflacht, als Basrelief. Das ist auch an menschlichen Gesichtern deutlich zu erkennen; sie nehmen immer einen unnatürlichen, halb bildartigen Ausdruck an.

Die Theorie des Telestereoskops ergibt sich leicht, wenn man bedenkt, daß ein Beobachter die Objecte in einem Planspiegel so sieht, nur symmetrisch von rechts nach links umgekehrt, wie das Spiegelbild des Beobachters die wirklichen Gegenstände durch das Glas des Spiegels hindurch sehen würde.

Es sei  $AA$  Fig. 237 (S. 823) der eine,  $BB$  der andere Spiegel,  $C$  das Auge des Beobachters. Das Auge  $C$  sieht im ersten Spiegel  $BB$  die Dinge so, wie das Spiegelbild  $D$  dieses Auges sie durch  $BB$  hindurch sehen würde. Dabei muß die Entfernung  $Cb = Db$  sein. Das Spiegelbild  $D$  sieht wieder die Dinge im Spiegel  $AA$  so, wie sie  $E$ , das von  $AA$  entworfene Spiegelbild, von  $D$  durch  $AA$  hindurch sehen würde, und der Ort von  $E$  ist dadurch bestimmt, daß  $Es$  längs des reflectirten Strahls gemessen gleich  $Da$  längs des einfallenden gemessen sein muß. Daraus folgt, wie schon oben erwähnt ist, daß das Auge  $C$

<sup>1</sup> Die stereoskopischen Erscheinungen, zu denen Brillengläser Veranlassung geben, sind genauer untersucht von F. C. DONDERS in *Anomalies of accommodation and refraction*. London 1864. p. 152–169.

bestehend, die sich in einem Punkte schneiden, und man diesen Mittelpunkt fest mit nach oben gerichtetem Blick fixirt, die nach oben gerichteten Strahlen des Sterns in einer concaven Kegelfläche zu liegen scheinen, die nach unten gerichteten in einer convexen; umgekehrt, wenn man den Kreuzungspunkt der Strahlen mit nach unten gerichtetem Blicke fixirt. Ich finde die Täuschung noch auffallender, wenn man die nahehin horizontalen Strahlen wegläßt und statt der auf Papier gezeichneten Linien feine glatte Drähte benutzt, die man in einem Korke so feststeckt, daß sie von einem Punkte aus divergiren und in einer Ebene liegen.

Der Theorie nach, welche aus dem oben angeführten Gesetze hergeleitet ist, müssen die besagten Linien scheinbar in einer Kegelfläche zweiten Grades liegen, deren Spitze im Fixationspunkte liegt, die ferner durch die beiden Blicklinien geht und deren Durchschnitt mit der durch die Mittelpunkte der Augen senkrecht zur Visirebene gelegten Ebene eine Ellipse ist, deren verticale Axe etwas größer ist, als die horizontale.

RECKLINGHAUSEN hat auch durch Versuche die Lage solcher Linien ermittelt, die zur mittleren Sehrichtung bei gehobenem oder gesenktem Blicke senkrecht erschienen. Er benutzte dazu einen feinen glatten Draht, der in der Mitte mittels eines feinen Charniergelenks so verstellt werden konnte, daß er verschiedene Neigung gegen die mittlere Sehrichtung (Halbirungslinie des Convergenzwinkels) erhielt. Das Gelenk, was ihn trug, war andererseits an einer runden Eisenstange befestigt, welche in der Verlängerung der mittleren Sehrichtung lag und um ihre Längsaxe gedreht werden konnte. Durch Drehung um diese Axe konnte der Ebene, in welcher der Draht sich bewegte, verschiedene Neigung gegen die Visirebene gegeben und bei jeder Stellung dieser Ebene die Stellung des Drahtes gesucht werden, 664 bei welcher sein oberes und unteres Ende gleich weit vom Beobachter entfernt schien.

Die Theorie fordert für die genannten Lagen des Drahtes wiederum eine durch den Fixationspunkt und die Blicklinien gehende Kegelfläche zweiten Grades. Die Messungen von RECKLINGHAUSEN stimmten sehr gut mit dieser Folgerung der Theorie. Er nannte diese Fläche die Normalfläche, weil in ihr die zur mittleren Sehrichtung scheinbar normalen Linien liegen.

Diese Normalfläche würde für solche Augen, welche keine Abweichung des scheinbar verticalen Meridians haben, mit der im nächsten Paragraphen zu untersuchenden Horopterfläche für Linien, die durch den Fixationspunkt gehen, zusammenfallen. Dagegen ist sie mit dieser nicht identisch bei Augen, deren scheinbar verticale Meridiane nicht mit den wirklich verticalen zusammenfallen,<sup>1</sup> wie sich weiter unten zeigen wird.

Wenn man ein System concentrischer Kreise auf ein Blatt zeichnet und

<sup>1</sup> RECKLINGHAUSEN selbst hat diesen Unterschied nicht gemacht; denn obgleich er die Abweichung des scheinbar verticalen Meridians entdeckt hat, hat er den Einfluß dieser Abweichung auf die Lage der identischen Stellen noch nicht gekannt.

der Visirebene; die  $sz$  Ebene sei die Medianebene des Körpers. Die Coordinaten des rechten Auges seien:

$$x = a \quad y = b \quad z = 0,$$

die des linken Auges:

$$x = a \quad y = -b \quad z = 0,$$

so daß  $2b$  die Distanz der Mittelpunkte beider Augen bezeichnet,  $a$  den Abstand des Fixationspunktes von der Verbindungslinie der Augenmittelpunkte.

Die Blicklinie des rechten Auges ist gegeben durch die Gleichungen

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \text{ und } z = 0 \quad . . . . . 1),$$

die Blicklinie des linken Auges durch die Gleichungen

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \text{ und } z = 0 \quad . . . . . 1 a).$$

Bildet man aus den beiden Gleichungen 1) durch Multiplication der ersten mit dem constanten Factor  $p$  und Addition der zweiten die neue Gleichung

$$p\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) + z = 0 \quad . . . . . 1 b),$$

so ist dies die Gleichung einer Ebene, die durch die rechte Blicklinie geht, denn für alle Punkte dieser Blicklinie sind die beiden Gleichungen 1), folglich auch 1 b) erfüllt. Nach bekannten Sätzen ist der Cosinus des Winkels  $\alpha$ , den die Normale dieser Ebene mit der  $sz$  Axe, oder die Ebene selbst mit der Visirebene,  $z = 0$ , macht, gegeben durch die Gleichung

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{p^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2}}} \quad . . . . . 1 c).$$

Bilden wir entsprechend aus den Gleichungen 1 a) die neue

$$-p\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) + z = 0 \quad . . . . . 1 d),$$

so geht diese durch die linke Blicklinie, und der Werth von  $\cos \alpha$  ist für sie derselbe, wie in 1 c).

Aus 1 c) folgt

$$p = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}}$$

oder wenn wir setzen

$$a = r \cos \gamma, \quad b = r \sin \gamma,$$

$r$  halbe Convergenzwinkel, und  $r$  die Entfernung jedes Auges vom Fixationspunkt ist:

$$p = r \tan \alpha \sin \gamma \cdot \cos \gamma,$$

die Gleichungen 1 b) und 1 d) werden:

676

$$(x \sin \gamma - y \cos \gamma) \tan \alpha + z = 0 \quad . \quad . \quad . \quad 1 \text{ b}).$$

$$- (x \sin \gamma + y \cos \gamma) \tan \alpha + z = 0 \quad . \quad . \quad . \quad 1 \text{ d}).$$

btrahirt man die zweite von der ersten, so erhält man

$$x \sin \gamma = 0,$$

ist, die Schnittlinie der beiden Ebenen 1 b) und 1 d) liegt in der durch den Fixationspunkt, senkrecht zur Visirebene und zur Medianebene gelegten Ebene, welches auch der Winkel  $\alpha$  sei. Diese Schnittlinie sei eine gesehene Linie, dann sind die beiden Ebenen 1 b) und 1 d) die Ebenen ihrer Richtungs-

er nun die bisher betrachtete Stellung der Augen eine ohne Raddrehung, dann wir übergehen zu einer Stellung mit Raddrehung, indem wir in 1 b) Winkel  $\alpha$  und  $\delta$  vergrößern, in 1 d) um ebenso viel verkleinern. Dann dann wir für die neue Lage beider Ebenen:

$$\tan (\alpha + \delta) = \frac{z}{y \cos \gamma - x \sin \gamma}$$

$$\tan (\alpha - \delta) = \frac{z}{y \cos \gamma + x \sin \gamma}.$$

den wir hieraus die Tangente der Differenz beider Winkel, so erhalten wir:

$$\tan (2\delta) = \frac{2zx \sin \gamma}{y^2 \cos^2 \gamma - x^2 \sin^2 \gamma + z^2}$$

$$+ y^2 \cos^2 \gamma - x^2 \sin^2 \gamma - 2zx \sin \gamma \cdot \cotang (2\delta) = 0 \quad . \quad . \quad 2),$$

die Gleichung eines Kegels ist, dessen Spitze im Mittelpunkt der Coordinaten liegt. Aus der Gleichung 2) erhellt nämlich, daß wenn  $x$ ,  $y$ ,  $z$  Werthe der Gleichung 2) genügen, auch  $nx$ ,  $ny$  und  $nz$  genügen; daraus folgt, daß jede durch einen Punkt der Fläche 2) und den Anfangspunkt der Ebene gezogene gerade Linie ganz in der Fläche 2) liegt, daß diese also eine Kegelfläche ist.

In den Gleichungen 1) und 1 a) angegebenen Werthe der Coordinaten für die Augen genügen ebenfalls der Gleichung 2). Die Kegelfläche geht also in die Blicklinien über.

Man kann nach den oben aufgestellten Grundsätzen bei medianem Fixationspunkte die Bilder so ausgelegt werden, als wäre keine Raddrehung erfolgt, so



werden das vor der Drehung in der Ebene  $x = 0$  gezogene Strahlenbündel und das auf dem Kegel der Gleichung 2) gelegene nicht unterschieden werden, und das Strahlenbündel wird also eben oder kegelförmig erscheinen, je nachdem in der ersten oder zweiten Stellung der Augen die Netzhauthorizonte mit der Visirebene zusammenfallen.

Dabei ist noch zu bemerken, daß diejenigen Kanten des Kegels, welche den Blicklinien sehr nahe kommen und also gegen die Augen des Beobachters selbst hingerrichtet erscheinen müßten, ein zu kühnes und unwahrscheinliches Relief geben und deshalb besser vermieden werden. Außerdem ist zu bemerken, daß diejenigen Kanten der Kegelfläche, die zwischen den Augen durchgehen, in den Bildern beider Netzhäute gerade entgegengesetzte Richtung bekommen, und deshalb von ihnen abzusehen ist.

Um die scheinbare Lage von Kreisen zu berechnen, deren Mittelpunkt fixirt wird und deren Ebene senkrecht zur Halbirungslinie des Convergenzwinkels ist, 677 benutzen wir den Satz, daß, wenn die Gleichung einer Ebene in der Normalform gegeben ist,

$$U = ax + by + cz + d$$

und

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

der Ausdruck  $U$  den Abstand des Punktes  $(x, y, z)$  von der Ebene  $U = 0$  bezeichnet, wobei  $d$  den Abstand des Mittelpunkts der Coordinaten von derselben Ebene anzeigt.

Bringen wir die Gleichung 1 b) auf die Form

$$x \sin \gamma \sin \alpha - y \cos \gamma \sin \alpha + z \cos \alpha = U \quad . \quad . \quad . \quad 3),$$

nehmen wir dazu eine zweite Ebene, die auch durch die Blicklinie geht, in der aber der Winkel  $\alpha$  um einen Rechten gewachsen ist und die deshalb auf 3) senkrecht steht,

$$x \sin \gamma \cos \alpha - y \cos \gamma \cos \alpha - z \sin \alpha = V \quad . \quad . \quad . \quad 3a),$$

und endlich eine dritte Ebene, die auf der Blicklinie senkrecht steht,

$$x \cos \gamma + y \sin \gamma - z = W \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 3b).$$

so sind  $U, V, W$  rechtwinkelige Coordinaten des Punktes  $(x, y, z)$  bezogen auf das System dieser drei Ebenen und

$$\frac{1}{m^2} U^2 + \frac{1}{n^2} V^2 = W^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 3c)$$

ist die Gleichung eines Kegels zweiten Grades, der seine Spitze im Mittelpunkte des rechten Auges hat und dessen drei Hauptaxen in den Schnittlinien der Ebenen

$$U = 0, \quad V = 0, \quad W = 0$$

liegen.

Die Schnittlinie des Kegels 3 c) mit der Ebene,  $x = 0$ , ist gegeben durch die Gleichung

$$\begin{aligned} y^2 \cos^2 \gamma \left\{ \frac{\sin^2 \alpha}{m^2} + \frac{\cos^2 \alpha}{n^2} \right\} + z^2 \left\{ \frac{\cos^2 \alpha}{m^2} + \frac{\sin^2 \alpha}{n^2} \right\} \\ + 2yz \cos \gamma \cos \alpha \sin \alpha \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \\ = y^2 \sin^2 \gamma - 2ry \sin \gamma + r^2. \end{aligned}$$

Wenn wir nun verlangen, daß bei derjenigen Raddrehung des Auges, wo  $\alpha = 0$ , diese Schnittlinie ein Kreis sei, muß sein

$$\frac{\cos^2 \gamma}{n^2} - \sin^2 \gamma = \frac{1}{m^2} \quad \dots \dots \dots 3 d).$$

Für symmetrische Stellungen des andern Auges muß gleichzeitig  $\gamma$  und  $\alpha$  negativ genommen werden. Setzen wir also

$$\begin{aligned} x \sin \gamma \sin \alpha + y \cos \gamma \sin \alpha + z \cos \alpha &= U' \\ -x \sin \gamma \cos \alpha - y \cos \gamma \cos \alpha + z \sin \alpha &= V' \\ x \cos \gamma \quad \quad - y \sin \gamma \quad \quad - r &= W' \end{aligned}$$

so ist

$$\frac{1}{m^2} U'^2 + \frac{1}{n^2} V'^2 = W'^2 \quad \dots \dots \dots 3 e)$$

678

die Gleichung eines entsprechenden Kegels, dessen Axe die Blicklinie des zweiten Auges ist, dessen Spitze im Mittelpunkte dieses Auges liegt, und der, wenn  $\alpha = 0$  gemacht wird, die Ebene  $x = 0$  und die ihr parallelen Ebenen ebenfalls in einem Kreise schneidet, wie der Kegel 3 c).

Ist nun die Stellung der Augen  $\alpha = 0$  eine mit Raddrehung verbundene Stellung derselben, und die Schnittlinie der beiden Kegel ein objectiv vorhandener Kreis, so wird das Netzhautbild nach den oben gegebenen Regeln so gedeutet, als wären dieselben Netzhautbilder ohne Raddrehung erhalten worden. Das scheinbar vorhandene Object muß also eine Schnittlinie der Kegel 3 c) und 3 e) sein. Wenn wir deren Gleichungen von einander subtrahiren, so bleiben nur diejenigen Glieder stehen, welche in beiden verschiedenes Vorzeichen haben, diese sind:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{m^2} y \cos \gamma \sin \alpha (x \sin \gamma \sin \alpha + z \cos \alpha) \\ -\frac{1}{n^2} y \cos \gamma \cos \alpha (x \sin \gamma \cos \alpha - z \sin \alpha) \\ = y \sin \gamma (x \cos \gamma - r). \end{aligned}$$

Diese Gleichung wird erfüllt, wenn entweder

$$y = 0$$

oder

$$x \sin \gamma \cos \gamma \left[ \frac{\sin^2 \alpha}{m^2} + \frac{\cos^2 \alpha}{n^2} + 1 \right] + z \cos \gamma \cos \alpha \sin \alpha \left[ \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right] = r \sin \gamma.$$

Die erste Schnittlinie läge also in der Medianebene, und wird sich nicht leicht als Object darstellen, die Ebene der zweiten wird mit Berücksichtigung der Gleichung 3 d)

$$x (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \gamma) - z \sin \gamma \sin \alpha \cos \alpha = \frac{r n^2}{(n^2 + 1) \cos \gamma} \quad . . . \quad 3f).$$

Für den Fall, daß  $\alpha = 0$ , wird diese Gleichung

$$x = \frac{r n^2}{(n^2 + 1) \cos \gamma} = x_0.$$

Die Schnittlinie der beiden Kegel liegt also in diesem Falle in der Entfernung  $x_0$  vor der Ebene,  $x = 0$ , in einer dieser parallelen Ebene, und ist ein Kreis. Wenn  $\alpha$  nicht gleich Null ist, ist die Ebene der Schnittlinie geneigt gegen die Ebene  $x = 0$  um einen Winkel  $\eta$ , dessen Tangente ist

$$\text{tang } \eta = \frac{\sin \gamma \sin \alpha \cos \alpha}{1 - \sin^2 \gamma \sin^2 \alpha}$$

und sie schneidet die Visirebene  $z = 0$  in der Linie

$$x = \frac{x_0}{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \gamma},$$

also etwas entfernter vom Auge, als vorher. Die Schnittlinie ist in diesem Falle eine Ellipse.

679 Die nahehin verticalen Axenebenen der beiden Kegel

$$V = 0 \text{ und } V' = 0$$

schneiden sich in der geraden Linie, deren Gleichungen sind

$$\left. \begin{array}{l} x \sin \gamma = y \text{ tang } \alpha \\ y = 0 \end{array} \right\} . . . . . 4),$$

für  $\alpha = 0$  werden die Gleichungen dieser Linie

$$x = 0, \quad z = 0.$$

Eine zur Visirebene senkrechte Linie erscheint also bei der Raddrehung  $\alpha$  beider Augen gegen die Ebene  $x = 0$  geneigt unter dem Winkel  $\eta'$ , dessen Tangente ist

$$\text{tang } \eta' = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha \cdot \sin \gamma}.$$

Wenn nun die Winkel  $\alpha$  und  $\gamma$ , wie dies bei den praktisch ausführbaren Versuchen immer der Fall sein wird, klein sind, so ist


$$\text{tang } \eta' > \text{tang } \eta.$$

Der senkrechte Durchmesser des Kreises erscheint also stärker gegen die  $x = 0$  geneigt, als die Ebene des Kreises, und daher scheint er sich vom zu lösen, wie dies RECKLINGHAUSEN beobachtet hat. Da gerade die tal verlaufenden Theile der Kreislinie nur eine sehr unbestimmte binoculare sation geben, so kann der Kreis auch verbogen erscheinen, wo der Durch- ihn schneidet, ohne sich von ihm zu lösen.

etrachtet man nicht einen Kreis, sondern Ellipsen, so findet die Gleichung cht statt, und man findet, daß Ellipsen mit längerer verticaler Axe sich ne einer verticalen Linie neigen müssen, dieser desto näher kommend, je r sie sind. Ellipsen dagegen mit längerer horizontaler Axe neigen sich ngesetzt, auch um so stärker, je schmaler sie sind.

bänderung des Linsenstereoskops von HELMHOLTZ. Da die Entfernung hender Punkte in den gewöhnlichen photographischen Stereoskopbildern nicht gleich der der Augen ist, sie zuweilen auch verschiedene Höhe über der Grund- ben, so muß man, um eine möglichst natürliche Projection der Objecte zu er- das Instrument jedem Bilde adaptiren können. In einem Stereoskop, was OERTLING in Berlin erhalten hatte, war dies in einfachster Weise dadurch daß zwei prismatische Linsen in zwei cylindrischen, drehbaren Röhren saßen. Iem man den brechenden Winkel der Prismen mehr nach einwärts oder nach stellte, konnte man eine gröfsere oder geringere Convergenz der Augen hervor- und auch Höhenunterschiede corrigiren. In anderer Weise, wobei die Ein- leichter wird und die Unregelmäßigkeiten der Brechung in prismatischen Gläsern t klein bleiben, habe ich denselben Zweck erreicht in dem in *Fig. 238* perspectivisch *Fig. 239* (S. 830) im Querschnitt in  $\frac{2}{3}$  der natürlichen Gröfse dargestellten nte. Der Zweck desselben ist namentlich auch stärkere Vergröfserungen anwenden n, als die gewöhnlichen Stereoskope geben, wobei man einen dem natürlichen hr entsprechenden Eindruck erreicht. Doch ist zu bemerken, daß fast nur

phien auf Glas  
ie stärkere Ver-  
g ertragen. Der  
t ähnlich dem  
reoskops von  
: mit prisma-  
Linsen einge-  
urch die Schlitz-  
er Bodenplatte  
elche selbst  
eils durch eine  
liffene Glas-  
bildet ist, wird  
eingeschoben.  
shauer blickt  
beiden cylin-  
röhren  $B_0$   $B_1$ ,  
centrirte Con-  
nicht Prismen<sup>1</sup>,



*Fig. 238.*

680

darauf hin. Beide Röhren enthalten zunächst dem Auge eine Linse von eter Brennweite und gegen ihr unteres Ende hin eine solche von 18 Centi- anweite. Die letztere kann ausgeschraubt werden, wenn man nur die gewöhn-

<sup>1</sup> CLAUDET hat bemerkt (*Proc. Royal Soc.* VIII, 104—110), daß es richtiger ist und Bilder giebt, wenn man Landschaftsbilder durch Linsen mit parallelen Gesichtslinien

liche Vergrößerung der Stereoskope zu haben wünscht, bei welcher aber die Bilder (Landschaften) meist kleiner erscheinen als das wirkliche Object dem unbewaffneten Auge von dem betreffenden Standpunkte aus erscheinen würde. Jede der Röhren  $B_0$  und  $B_1$  sitzt in einem zwischen Schienen verschiebbaren rechtwinkligen Schlitten, sodaß  $B_0$  in der Richtung




Fig. 239.

von oben nach unten (bezüglich zum Beobachter),  $B_1$  dagegen von rechts nach links verstellt werden kann durch Drehung der Schrauben  $C_0$  und  $C_1$ . In Fig. 238 ist dargestellt, wie die Schrauben auf die Schlitten wirken,  $C_1$  unmittelbar,  $C_0$  mittels eines Winkelhebels.

Ich pflege die Röhren erst so weit herausziehen, bis das photographische Bild im Brenn-

punkte der Concavlinse steht, was sich leicht erkennen läßt, wenn man von unten auf die matte Glasplatte blickt und das Bild entfernter heller Objecte auf der Fläche der stereoskopischen Darstellung auffängt. Ist der Beschauer kurzsichtig, so lasse ich ihn lieber durch die ihm gewöhnte Brille hineinsehen. Dadurch daß man das Bild in den Brennpunkt der Linsen bringt, hat man den Vortheil, daß es erstens auch bei Bewegungen des Kopfes vor den Gläsern wie ein unendlich entferntes Object erscheint; zweitens daß die Deckung der Bilder auch nicht gestört wird, wenn der Beobachter den Kopf nach der Seite neigt. Namentlich also, wenn man das Stereoskop fest aufstellt und den Beschauer davor treten läßt, um hindurchzusehen, so erhält er, was die Formen betrifft, in allen Beziehungen denselben optischen Eindruck, als blickte er nach den entfernten reellen Objecten. Die Schrauben  $C_0$  und  $C_1$  werden dann gebraucht, um den Stand der beiden optischen Bilder zu corrigiren. Indem ich meine Augen etwas convergiren lasse, erzeuge ich Doppelbilder von irgend einem hell hervortretenden Objecte, und sehe zu, ob diese gleich hoch neben einander stehen; wenn nicht, so corrigire ich mit der Schraube  $C_0$  so lange, bis dies der Fall ist. Die Einstellung in den Brennpunkt kann man dann noch genauer controlliren, wenn man seitliche Neigungen des Kopfes macht. Um annähernd die richtige Convergenz hervorzubringen, gehe ich mit dem Kopfe etwas zurück von den Gläsern, blicke über das Stereoskop fort nach wirklichen Gegenständen und vergleiche deren Entfernung mit der scheinbaren der Objecte im Stereoskop. Danach läßt sich dann mittels der Schraube  $C_1$  leicht die nöthige Correction machen.

Die Objecte erscheinen durch ein solches Instrument gesehen bei richtiger Einstellung nicht nur viel größer und viel entfernter, sondern auch körperlicher als durch die gewöhnlichen Instrumente, welche fast immer zu starke Convergenz verlangen und deshalb die Gegenstände als Basreliefs erscheinen lassen. Man hat auch den sehr wesentlichen Vortheil, daß man die sonst so leicht eintretende Ermüdung und Schmerzhaftigkeit der Augen hierbei gänzlich vermeiden kann.

Außer dem schon genannten Spiegelstereoskop von WHEATSTONE, dem Linsenstereoskop von BREWSTER in seinen verschiedenen Modificationen, dem Pseudoskop, welches auch gebraucht werden kann, um je zwei Zeichnungen mit einander zur Deckung zu bringen, können auch stereoskopische Wirkungen mit nur einer Zeichnung und einem Prisma erzeugt werden.<sup>1</sup> Wenn die Zeichnung nämlich einen zur Medianebene

<sup>1</sup> DOVE, *Poggend. Ann.* LXXXIII. 183. *Berliner Monatsberichte.* 1850, p. 152. BREWSTER *Phil. Mag.* (4) III, 16–26. *Rep. of Brit. Assoc.* 1849, 2, p. 5.

symmetrisch gebildeten Gegenstand darstellt, rechten Auge gesehen wird, so würde die Ansicht des linken Auges ihr symmetrisch oder congruent sein. Statt der zweiten Zeichnung also auch wirklich ein Spiegelbild der ersten nan mit dem linken Auge durch ein recht-Prisma parallel dessen Hypotenusenfläche hinein, wie mehrfach schon erwähnt ist, der der Hypotenusenfläche durch totale Reflexion Spiegelbild des Objectes sieht. Das rechte Auge direct nach der Zeichnung. Wenn man die Augen zum Decken bringt, sieht man das körpernmt man das Prisma vor das linke Auge, so umgekehrte Relief. Man kann auf diese Weise zu stereoskopischen Effecten benutzen, die bestimmt sind, wie zum Beispiel photograph's, welche von vorn mit einer sehr kleinen h einer Seite hin aufgenommen worden sind. stereoskopische Effecte erreichte Dove<sup>1</sup>, indem assenden Zeichnung mit einem astronomischen ei'schen Fernrohr von gleicher Vergrößerung s kehrt die Zeichnung um, letzteres nicht. dieselben Zeichnungen brauchen, wie für das stereoskop, nur muß die obere Hälfte des dar- rs auch mit der untern symmetrisch sein. ie Telestereoskop ohne Vergrößerung habe ieben; ich habe ein ähnliches Instrument mit construiren lassen, mit welchem man entfernte ihrer körperlichen Form stereoskopisch sehen sche Theil des Instruments ist dargestellt in r in der untern Hälfte, zwischen  $n_1$  und  $h_1$   $h_1$  ohres ausgelassen ist, damit die Figur auf der t. Man muß die Figur sich so ergänzt denken, en Hälfte die Entfernung zwischen  $n_1$  und  $h_1$   $h_1$  t, wie in der oberen Hälfte die Entfernung  $h h$ . Das Licht, was von den Objecten kommt, ifgefangen durch die beiden ebenen Spiegel  $aa$  Spiegel müssen aber von der größten Vollen- sie sonst bei der Vergrößerung durch die Fern- bilder geben. Durch drei Schrauben werden sie  $k$  und  $k'$  angezogen, während zwischen ihnen Federn liegen, die sie so weit entfernen, als s zulassen. Mittels der Schrauben kann man r Spiegel so weit abändern, daß die Bilder usammenfallen. Die Objectivlinsen der Fern- i  $c$  und  $c'$ . Sie sind in Röhren eingesetzt, er gezahnten Triebe  $i$  und  $i'$ , die in gezahnte  $h'$  eingreifen, hin und hergeschoben werden Focaldistanz des Fernrohrs reguliren zu können. en eines terrestrischen Oculars liegen bei  $d$  ällt das Licht auf das Prisma  $b$ , um in den die dritte und vierte Ocularlinse  $g$  zu fallen. kann mittels der in den dahinter liegenden




Fig. 240.

682<sup>7</sup> Metallklotz *p* eingreifenden Schraube verschoben werden, um die optische Axe der beiden Theile des Fernrohrs in Uebereinstimmung zu setzen. Endlich dient der gezahnte Trieb *a* dazu, die beiden Ocularröhren mit den ganzen Fernröhren von einander zu entfernen oder einander zu nähern, um sie der Augendistanz des Beobachters anzupassen.

Da die Entfernung der Spiegel an dem Instrumente 1080 Millimeter beträgt, so ist sie 16 mal größer als die der menschlichen Augen, und die stereoskopischen Unterschiede werden also 16 mal größer, als für die unbewaffneten Augen. Da die Vergrößerung auch eine sechzehnmalige ist, so ist die Wirkung des Instruments die, als sähe man das Object mit unbewaffneten Augen aus einer sechzehnmal kleineren Entfernung, als man es wirklich sieht.

Den entgegengesetzten Effect von dem telestereoskopischen erhält man nach einer Bemerkung von OPPEL,<sup>1</sup> wenn man zwei einander congruente Körper in der Entfernung der Augen von einander, beide gleich gerichtet, aufstellt und mit parallelen Gesichtslinien betrachtet.

**Stereoskopisches Mikroskop.** Ein solches nach NACHET's Construction ist dargestellt in Fig. 241. Bei *a* ist das Objectivlinsensystem. Das durchtretende Strahlenbündel trifft zunächst auf das kleine reflectirende Glasprisma bei *b*, die eine Hälfte des Strahlenbündels geht an diesem vorbei und durch das Rohr *E* zum Ocular *e*, um in das eine Auge des Beobachters zu fallen. Die andere Hälfte des Strahlenbündels dagegen, welche in das beinahe rechtwinkelige Prisma *b* eintritt, wird von dessen Hypotenusenfläche reflectirt und gegen das zweite Prisma *c* hin geworfen, um hier noch einmal reflectirt zu werden in das Rohr *F* hinein und zum Ocular *f*, durch welches es in das andere Auge des Beobachters fällt. Mittels der Schraube *g* kann das ganze Rohr *F* mit dem Prisma *c* dem Rohre *E* genähert oder von ihm entfernt werden, um das Instrument dem Abstände der beiden Augen des jedesmaligen Beobachters anzupassen. Da die Lichtbündel, welche aus den Ocularen *e* und *f* austreten, sehr schmal sind, so muß ihre Entfernung der der Pupillen genau gleich sein, damit beide Augen ein Bild empfangen. In den englischen Instrumenten ähnlicher Art sind beide Röhren fest verbunden, und die Accommodation für die Augendistanz des Beobachters wird dadurch erreicht, daß man die Ocularstücke der Röhren mehr oder weniger herauszieht.




Fig. 241.

Die stereoskopische Wirkung bei diesen Instrumenten ist sehr auffallend und erleichtert die Beobachtung von Objecten verwickelterer Form außerordentlich. Sie kommt vermittels ganz anderer Umstände zu Stande als in den übrigen stereoskopischen Instrumenten. Wir haben in diesem Falle nämlich keine von zwei verschiedenen Standpunkten aus aufgenommenen Bilder

des Objects, da das eine Objectivlinsensystem des Mikroskops die beiden Bilder für beide Augen entwirft und nur die eine Hälfte des Lichts an das eine Auge, die andere an das andere vertheilt wird. Eine stereoskopische Wirkung kommt hier nur deshalb zu Stande, weil allein die Punkte der Focalebene des Mikroskops ein punktförmiges Bild geben; alle Punkte aber, die vor oder hinter der Focalebene liegen, geben kleine Zerstreuungskreise, und wegen der Halbierung des Strahlenbündels fällt die eine Hälfte eines jeden Zerstreuungskreises in das rechte, die andere in das linke Auge. Da nun die rechte Hälfte des Zerstreuungskreises anders liegt als die linke, so kommt dadurch eine stereoskopische Wirkung zu Stande.

<sup>1</sup> OPPEL, Jahresbericht des Frankfurter Vereins 1858—59, p. 64—75.



nach den auf Seite 77 bis 80 gegebenen Regeln können die Hauptpunkte und Brennpunkte des ganzen optischen Systems eines Mikroskops leicht gefunden werden. Der erste Hauptpunkt liegt unterhalb des Objectivglases, der erste Brennpunkt ebenfalls, dem Objectiv näher. Der zweite Haupt- und Brennpunkt liegen oberhalb des Objectivglases, und zwar wieder der Brennpunkt diesem näher. Das Auge des Beobachters stellt sich im zweiten Brennpunkte befindlich denken und  $p$  die Brennweite des Systems nennen. Sind nun  $f$  und  $\varphi$  die Entfernungen beziehlich des Objectes vom ersten Brennpunkte nach oben und des Bildes vom zweiten Brennpunkte nach unten, so ist nach S. 70 Gleichung 7 b)

$$\varphi = \frac{p^2}{f}.$$

zeichnet  $b$  die Größe des Objectes,  $\beta$  die seines Bildes, so ist

$$\frac{\beta}{b} = \frac{p - \varphi}{f - p} = \frac{p}{f} = \frac{\varphi}{p}.$$

Setzen wir uns nun das Auge accommodirt für das Bild  $\beta$ , und vor oder hinter demselben noch ein anderes Object  $b'$ , welches, da jenes erste durchsichtig ist, zugleich gesehen werden kann, und dessen Entfernung vom Brennpunkte  $f'$  ist, so ist die Entfernung seines Bildes vom Auge und vom zweiten Brennpunkte

$$\varphi' = \frac{p^2}{f'}.$$

folgt

$$\varphi' - \varphi = p^2 \cdot \frac{f - f'}{f \cdot f'}.$$

Winkel, unter dem die Strahlen vom Bilde  $b$  aus in das Objectivglas fallen, ist der zugehörige Divergenzwinkel der Strahlen des Bildes  $\beta$  sei  $\alpha$ , so ist nach Gleichung 7 d) und Seite 75, Gleichung 9)

$$b \tan \alpha = \beta \tan \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{f}{p} \tan \alpha$$

so für die Bilder  $b'$  und  $\beta'$  nebst den zugehörigen Divergenzen der Strahlen  $\alpha'$

$$\tan \alpha' = \frac{f'}{p} \tan \alpha'.$$

Radius  $\varrho$  des Zerstreuungskreises in der Ebene des Bildes  $\beta$ , für welche das Auge accommodirt ist, ist, wie leicht ersichtlich,

$$\varrho = (\varphi' - \varphi) \tan \alpha' = \frac{p}{f} (f - f') \tan \alpha'.$$

Wenn Gegenstände beobachtet werden können, für welche der Zerstreuungskreis sehr klein ist, also  $\varphi' - \varphi$  und  $f - f'$  sehr klein sind, so kann die Veränderlichkeit des  $\alpha'$  für verschiedene sichtbare Objecte und sein Unterschied vom Winkel  $\alpha$  vernachlässigt werden, und wir können deshalb unter dieser Beschränkung die letzte Gleichung schreiben

$$\varrho = \frac{p \tan \alpha}{f} \cdot (f - f').$$

Nun fällt von diesem Zerstreuungskreise bei der beschriebenen Einrichtung des stereoskopischen Mikroskopes die eine Hälfte in das rechte, die andere in das linke Auge. Dadurch wird jede zur Visirebene verticale Linie des Bildes, sei sie nun isolirt gezogen oder Theil einer gleichmäßig gefärbten Fläche, verwandelt in einen Streifen  
684 von der Breite  $q$ , so daß die Verbreiterung in dem einen Bilde nach rechts hin, im anderen nach links hin geschieht. Zwei solche Streifen haben also in den beiden Bildern eine stereoskopische Parallaxe gleich  $q$  im Vergleich mit den Punkten der Focalebene.

Ist  $f'$  kleiner als  $f$ , liegt also das Object weiter vom Objectivglase als diejenigen Punkte, für deren Bild das Auge accommodirt ist, so ist  $q'$  größer als  $q$ , das heißt das Bild von  $b'$  liegt unterhalb des Bildes von  $b$ , und in der Ebene von  $b$  sind die Strahlen des Bildes  $b'$  schon gekreuzt. Dann fällt die rechte Hälfte des Zerstreuungskreises in das rechte Auge des Beobachters, die linke in das linke Auge, die stereoskopische Parallaxe ist also negativ, verglichen mit der des Bildes  $b$ , und  $b'$  scheint, wie es wirklich liegt, hinter  $b$  zu liegen. Dabei gelangt die eine Hälfte des Zerstreuungskreises durch doppelte Spiegelung in das entsprechende Auge des Beobachters und erscheint deshalb nicht von rechts nach links verkehrt, sondern in natürlicher Lage.

Umgekehrt verhält sich alles, wenn das Object  $b'$  oberhalb  $b$  liegt.

In den Instrumenten von NACHET kann man den Schieber, der die Prismen enthält, so weit hervorziehen, daß das kleine Glasprisma  $b$  der Fig. 240 vor die andere (rechte) Hälfte der Oeffnung tritt, dann erhält man einen pseudoskopischen Effect; was in Wirklichkeit unten liegt, erscheint dann oben.

Ähnlich wirkt der binoculare Augenspiegel, welcher in Fig. 242 nach NACHET'S Construction abgebildet ist.  $A$  ist ein Concavspiegel von Glas, von dessen




Fig. 242.

Mitte die Belegung weggenommen ist. Die vordere und hintere Fläche des Glases haben gleiche Krümmung, so daß es die Strahlen ungebrochen durchgehen läßt. Der Spiegel dient zur Beleuchtung des zu beobachtenden Auges. Zwischen ihn und das Auge wird eine Convexlinse gehalten, deren reelles umgekehrtes Bild der Beobachter betrachtet, wie in dem auf Seite 218 Fig. 110 schematisch dargestellten Versuche. Das Licht, welches vom beobachteten Auge kommt, theilt sich hinter der Oeffnung, indem es auf die beiden reflectirenden Prismen  $a$  und  $b$  fällt. Das Prisma  $a$  hat einen parallelogrammatischen Querschnitt; zwei seiner Winkel sind gleich halben Rechten. Die Prismen  $b$  und  $c$  zusammengenommen bilden ein Prisma von derselben Gestalt, wie  $a$ , welches aber quer durchschnitten ist, damit man den Theil  $c$  mittels der Schraube  $d$  dem andern Theil  $b$  nähern und davon entfernen kann. Dadurch wird das Instrument der Augendistanz des Beobachters angepaßt. Die Strahlen, welche durch die mittlere Oeffnung zuerst rechtwinkelig in die vordere Fläche des Prisma  $a$  eingetreten sind, werden dann von der kleinen Seite des Parallelogramms gegen die zweite nach aufsen gekehrte kleine Seite reflectirt, und von dieser letztern zum zweiten Male reflectirt gegen die Oeffnung  $e$  hin, und treten durch diese aus in das eine Auge des Beobachters. Die zweite Hälfte der Strahlen, welche in das Prisma  $b$  eintreten, werden ebenso von dessen geneigten Fläche gegen die geneigte Fläche von  $c$  reflectirt, und von dieser gegen die Oeffnung  $h$  hin, um in das zweite Auge des Beobachters zu fallen. In die Oeffnungen  $e$  und  $h$

schwach brechende Prismen eingesetzt, damit der Beobachter mit schwach convergenten Blicklinien das gemeinsame Bild betrachten kann. Die Prismen sitzen in je zwei Schieberchen, welches ausserdem noch zwei andere Prismen mit convexen Flächen enthält, die, wenn sie vorgeschoben werden, zugleich vergrößernd wirken.

Die vortheilhafteste Stellung der Convexlinse, durch welche man beobachtet, ist, wie ein Bild der Pupille des beobachteten Auges auf die Oeffnung des Spiegels, wie auf Seite 218—221 erörtert ist. Unter diesen Umständen fällt das Licht, welches die rechte Hälfte der Pupille kommt, in das links gelegene Prisma *a*, und der linken Seite der Pupille kommende in das rechts gelegene Prisma *b*. Das Auge des Beobachters sieht also den Hintergrund des beobachteten Auges, wie der linken Hälfte der Pupille aus erscheint, das linke Auge, wie er von ihrer rechten Hälfte aus erscheint. Da das Bild übrigens auch verkehrt ist, so giebt dies den richtigen stereoskopischen Effect, der sehr merklich und für die medicinische Untersuchung des Augenhintergrundes sehr nützlich ist.

Hierbei will ich hier noch die eigenthümliche Methode der Stereoskopie von *W. J. M. D'ALMEIDA* erwähnen. Er zeichnet beide Projectionen auf dieselbe schwarze Tafel, die er mit rothen Linien, die andere mit blauen. Dann nimmt er vor das eine Auge ein rothes Glas, vor das andere ein blaues und sieht nun mit jenem nur die rothen Linien, mit dem andern nur die blauen, die sich dann zum Relief verbinden lassen. Wenn man diese beiden Gläser vertheilt, kann man eine solche Zeichnung vielen Personen zu gleicher Zeit zeigen. *J. C. D'ALMEIDA* entwirft die betreffenden Bilder mittels zweier Vorrichtungen, von denen eine ein rothes, vor die andere ein grünes Glas eingeschaltet ist, auf einen Schirm.

Man kann übrigens die verschiedenartigsten brechenden und spiegelnden Apparate construirt werden, um die für stereoskopische Zwecke gewünschte Verschiebung der Bilder hervorzubringen, wobei bald beide, bald nur ein Bild verschoben wird. Wie *JOHANNES* ursprünglich zwei Planspiegel benutzt hat, so hat *BREWSTER* ein ähnliches Instrument construirt, ein anderes mit einem Spiegel, das letztere entweder mit einer oder mehreren Spiegeln beschreiben. Statt der Spiegel können auch, wie *Dove* und *BREWSTER* angegeben haben, total reflectirende Prismen, eines oder zwei, im letzteren Falle eines vor ein Auge, oder beide zum Reversionsprisma verbunden, vor ein Instrument gestellt, gebraucht werden. Ebenso genügt ein schwach brechendes Prisma mit zwei Flächen, um eines der Bilder bis zur Deckung mit dem andern zu verschieben. *D'ALMEIDA* brauchte zu demselben Zweck das doppelt reflectirende Prisma einer *Camera*

ohne Ablenkung der Lichtstrahlen die Combination stereoskopischer Bilder zu construiren schlägt *BREWSTER* vor, vor sie eine Glasplatte mit einem schwarzen Fleckchen, einen Schirm, nan fixirt, in passender Entfernung zu halten. *FAYE* wendet einen Schirm mit einem Loch an, so daß jedes Auge nur die zugehörige Zeichnung sieht, *ELLIOT* benutzte Röhren, durch die das rechte Auge das linke Bild sieht und umgekehrt. Es ist, wegen der Schwierigkeit die passende Accommodation herzustellen, für den Beobachter leichter bei gekreuzten Gesichtslinien, kurzsichtige bei ungleichen combiniren.

*UBOSCQ* hat prismatische Linsen in ein Opernguckerstativ gesetzt und dadurch eine Wand hängende Doppelzeichnung betrachtet, so daß man durch Näherung oder Entfernung die Convergenz der Augenaxen verändern kann, wodurch das Relief vergrößert oder verkleinert wird. — Um beliebig große Bilder zu combiniren, stellt er

*LMANN*, *Poggend. Ann.* XC. 186—187.

*W. J. M. D'ALMEIDA*, *Phil. Magaz.* (4) III, 16—26.

*E.*, *Poggend. Ann.* LXXXVIII, 183.

*VILDE*, *Poggend. Ann.* LXXXV, 63—67.

*E.*, *Comptes rendus*. XLIII, 673—674. *Poggend. Ann.* XCIX, 641—642.

*JOHANNES*, *Phil. Mag.* (4) XIII, 78.

*UBOSCQ*, *Cosmos*. I, 97—104; 703—705.

in seinem Panoramenstereoskop die Bilder über einander und zwei, um eine horizontale Axe drehbaren, neben einander stehenden Spiegeln gegenüber. Der Beobachter blickt zwischen den Bildern oder unter ihnen hindurch nach den Spiegeln, die so gestellt sind, daß die entsprechenden Theile der Bilder sich decken. Die Bilder können beliebig breit gemacht werden und vor den Augen des Beobachters vorbeigleiten. Eine andere Form zur Combination großer Bilder, die dem Stereoskop von BREWSTER ähnlicher ist mit achromatischen ebenflächigen Prismen und davon getrennten Linsen, beide verschiebbar, um Correctionen des Bildes auszuführen, hat DUBOSCQ später beschrieben.

686 In das Panoramenstereoskop können statt der Bilder nun auch rotirende stereoskopische Scheiben eingesetzt werden, so daß man die bewegten Figuren auch körperlich sieht. Diese Einrichtung giebt das Stereophantaskop oder Bioskop. Ein Instrument, was dasselbe Resultat giebt, hat CZERMAK<sup>2</sup> unter dem Namen Stereophoroskop beschrieben. Er wählte dazu das gewöhnliche Linsenstereoskop, für welches beide Bilder auf einen und denselben Pappstreifen neben einander geklebt werden. Diese Pappstreifen mit ihren je zwei Bildern wurden an den Seitenflächen eines mehrseitigen um eine horizontale Axe drehbaren Prismas befestigt. Um das Prisma herum in der Entfernung von einigen Zollen von den Bildern läuft noch ein Gürtel von Pappdeckelstücken, in welche die nöthigen Oeffnungen eingeschnitten sind, um in den richtigen Momenten die Zeichnungen zu sehen. Außerhalb dieses Gürtels wird die Prismencombination eines BREWSTER'schen Stereoskops festgestellt, so daß der Beobachter durch sie und durch die vorbeipassirenden Spalten nach den Bildern hinsehen kann.

C. CLARKE<sup>3</sup> hat das BREWSTER'sche Stereoskop mit einem Fusse versehen, KILBARN<sup>4</sup> es zum Zusammenlegen eingerichtet. SMITH und BECK<sup>5</sup> haben einen Fuß, eine festere Bahn für die Bilder, reichlichere Beleuchtung von allen Seiten, achromatische Linsen angebracht, SAMUEL<sup>6</sup> eine Vorrichtung, um die Entfernung der Bilder von den Linsen der Sehweite des Beobachters anzupassen.

Eigenthümlich ist die Einrichtung von CLAUDET's Stereomonoskop.<sup>7</sup> Er bemerkt, daß die Bilder einer *Camera obscura*, auf einer mattgeschliffenen Glasplatte entworfen und binocular betrachtet, etwas stereoskopisches Relief zeigen. Die Erscheinung erklärt sich dadurch, daß jedes Auge auf der matten Glasplatte diejenigen Strahlen am stärksten sieht, welche in Richtung seiner eigenen Gesichtslinie auffallen. Er construirte darauf das Stereomonoskop, welches mittels zweier Linsen zwei zusammengehörige stereoskopische Bilder auf dieselbe Stelle einer matten Glasfläche entwirft. Wenn die Glasplatte binocular betrachtet wird, sieht jedes Auge nur das für dasselbe bestimmte Bild, und es entsteht der Eindruck des Reliefs.

Um Veränderungen in der Stellung der Bilder für Untersuchungen über den optischen Effect solcher Verschiebungen vornehmen zu können, hat WHEATSTONE<sup>8</sup> an seinem oben beschriebenen Spiegelstereoskope die parallelen Wände, an denen die Bilder aufgestellt sind, auf Schlitten verschiebbar gemacht; außerdem sind die beiden Arme des Stereoskops drehbar um eine feste Axe zwischen den beiden Spiegeln, so daß man den Convergenzwinkel der Augen verändern kann. HARDIE<sup>9</sup> hat zu ähnlichem Zwecke, um pseudoskopische Reliefs hervorzubringen, ein dem später von mir construirten und oben beschriebenen Telestereoskope ähnliches Instrument mit zwei Spiegelpaaren construiert. Man kann damit die Bilder bald verkehrt, bald in ihrer wahren Lage zeigen.

<sup>1</sup> DUBOSCQ, *Comptes rendus*. XI, IV, 148—150.

<sup>2</sup> CZERMAK, *Wiener Ber.* XV, 8. 463—466. Ein anderes ähnliches Instrument Stereotrope von SHAW in *Proc. Royal Soc.* XI, 70—78.

<sup>3</sup> C. CLARKE, *Cosmos*. III. 123.

<sup>4</sup> KILBARN, *Cosmos*. III, 770.

<sup>5</sup> SMITH und BECK, *Athenaeum*. 1858, II, 269—270. *London J. of Arts*. Juni 1860.

<sup>6</sup> SAMUEL, *Rep. of Brit. Assoc.* 1858, 2, p. 19.

<sup>7</sup> CLAUDET, *Proc. Royal Soc.* IX, 194—196.

<sup>8</sup> WHEATSTONE, *Phil. Transact.* 1852, p. 1—17.

<sup>9</sup> HARDIE, *Phil. Magaz.* (4) V, 442—446.

lief übertreiben, schwächen oder umkehren. H. MEYER<sup>1</sup> hat zu demselben die Bilder des WHEATSTONE'schen Spiegelstereoskops nach ihrer Fläche verarg gemacht, und eine Scale zur Messung der Verschiebungen hinzugefügt. Doch von WHEATSTONE vorgeschlagene Einrichtung, wo sich die Bilder im Kreise befinden und ihr Abstand von den Augen ganz unverändert gelassen werden kann, wohl rtheil, daß sie bei Seitenverschiebungen der Bilder die Netzhautbilder derselben verändert läßt, während bei MEYER's Einrichtung kleine Correctionen wegen der erlichkeit des Abstandes der Bilder von den Augen bei Verschiebungen längs ebenen Fläche berechnet werden müssen.

Ähnliche Veränderungen<sup>2</sup> der Convergenz bei der Betrachtung wirklicher Körper LER erreicht, indem er vor jedes Auge schräg gerichtet eine planparallele dicke 687 ste stellte. Je nachdem deren vordere Flächen der Nasenseite oder der Schläfens betreffenden Auges zugekehrt sind, machen sie die Blicklinien divergenter oder enter. Die Erscheinungen waren dabei den Erfahrungen von WHEATSTONE ent-

id.  
ereoskopienbilder sind theils durch perspectivische Construction der be-  
en Zeichnungen verfertigt und durch Lithographie oder Kupferstich verviel-  
vorden,<sup>3</sup> theils durch Photographie. Unter den ersteren sind nur die nicht schat-  
nienzeichnungen geometrischer Gestalten, regelmässiger Körper oder Krystallmodelle  
er Wirkung. Sie sind gleichzeitig die evidentesten Beispiele der stereoskopischen  
gen, da hier alle Mittel der Beleuchtung und Schattirung fehlen, welche die  
ng unterstützen könnten. Zu ihrer Construction gehört aber eine außerordentliche  
reit, wenn sie nicht verzerrt aussehen sollen, da schon die allerkleinsten Ab-  
gen sehr merkbliche Veränderungen des Reliefs nach sich ziehen können. Es  
ganz außerordentlich verwickelte geometrische Gestalten durch dieses Mittel zu  
ren körperlichen Anschauung gebracht werden. Da übrigens dergleichen Zeich-  
überall käuflich zu haben sind, so gebe ich hier keine Beispiele derselben. Die  
n Versuche, dergleichen lithographirte Figuren auch zu schattiren, sind ziemlich  
n, weil die Abstufungen des Schattens in den beiden entsprechenden Figuren  
ichmässig genug gemacht werden können. Der Hilfsapparat von Rood zur  
ion solcher Zeichnungen ist schon oben S. 814 erwähnt worden.

it vollkommener ist die Wirkung der stereoskopischen Photographien, die zuerst  
ER in Königsberg gemacht wurden, deren Anfertigung schon einen aus-  
t Industriezweig bildet und in denen wir Landschaften und Gebäude aller  
r Erde, Statuen, Thiere, Blumen u. s. w. dargestellt finden. Dieselben wurden  
weist so gemacht, daß man mit derselben Camera obscura nach einander Ansichten  
ts von zwei verschiedenen Punkten aufnahm. Das hatte aber den Nachtheil,  
heller Sonnenbeleuchtung die Schlagschatten während der Zeit zwischen der  
d zweiten Aufnahme ihren Ort wechselten und dann einen falschen Effect in  
: machten. Diese Schatten erscheinen dann mitunter wie körperliche in der  
dlliche dunkle Schirme. Ich fand einen solchen Effect an einem Bilde von  
durch die Stellung des Zeigers an der Uhr eines Kirchthurms constatirt werden  
afs nur fünf Minuten zwischen der Aufnahme der beiden Bilder vergangen  
azu kommt die Schwierigkeit der zwei zu präparirenden lichtempfindlichen  
s. w. In neuerer Zeit werden deshalb nach D. BREWSTER's<sup>4</sup> Vorschlag vielfach  
te mit zwei Objectivgläsern benutzt, welche auf zwei verschiedenen Abschnitten  
Platte gleich die beiden Bilder geben. Die Centra der beiden Objectivlinsen

Abstand der menschlichen Augen von einander, oder auch wohl einen etwas  
70 bis 75 Millimeter, und die Camera obscura selbst bildet also gleichsam ein

MEYER, Poggendorff's Annalen. LXXXV, 198—207.

LET, Wiener Sitzungsber. XLII, 488—502.

SEMER hat sehr gute der Art herausgegeben und die Regeln der Construction besprochen  
s polytechn. Journal. LXXXIX, 111—121.

BREWSTER, Phil. Mag. (4) III, 26—30; 1852. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2, p. 5.

umgekehrtes Stereoskop. Diese Instrumente sind sehr zweckmäÙig zur Aufnahme nahe Gegenstände und sie geben unmittelbar die Ansicht, wie sie ein am Orte des Instrument ruhig weilender Beobachter von dem Objecte gehabt haben würde. Sie haben namentlich den Vortheil, daÙ man bei scharfer Sonnenbeleuchtung durch instantane Exposition der Platte gute Bilder von beweglichen Objecten, Menschen, Thieren, Schiffen, ja selbst prachtvolle Bilder der Wellen einer bewegten Wasseroberfläche erzielen kann. Aber sie genügen eigentlich nicht für Landschaften mit weit entfernten Objecten, weil die Distanz der Gesichtspunkte zu klein ist, um in diesen hinreichend große Unterschiede zu erhalten, und die ferneren Theile der Landschaft deshalb gewöhnlich ganz flach aus-  
 688 sehen.<sup>1</sup> Für diese ist es besser, eine Art telestereoskopischer Wirkung zu erzielen, dadurch daÙ man zwei Aufnahmen von zwei entfernten Punkten macht. So habe ich zum Beispiel unter den sehr vollendeten photographischen Landschaften von BRATT in Dornach Abbildungen des Wetterhorn von je zwei verschiedenen Punkten von Grindelwald aus gefunden, zwei desselben Berges von zwei verschiedenen Punkten der Bachalp aus, ebenso der Jungfrau von Mürren aus, welche eine ausgezeichnete schöne Modellirung der Bergform geben, wenn man die ursprünglichen Bilderpaare aus einander schneidet und je zwei aus verschiedenen Paaren combinirt, die also größerer Distanz der Gesichtspunkte entsprechen, als wenn man die zusammengehörigen combinirt. Im letzteren Falle erkennt man die körperliche Form der Berge ebenso wenig, wie ein stillsitzender Beobachter; im ersteren erkennt man sie besser, ähnlich einem Beobachter, der hin- und hergeht und die nach einander entstehenden Ansichten des Berges vergleicht.

Stereoskopische Abbildungen mikroskopischer Gegenstände von sehr schöner Wirkung sind von BABO<sup>2</sup> angefertigt worden. Bei der Aufnahme wurde die Neigung des Objecttisches gegen die Axe des Mikroskops für die beiden Bilder verschieden gemacht und so die stereoskopische Parallaxe gewonnen.

Bewegliche Bilder hat J. G. HALSKE verfertigt. Zuerst machte er in einem Doppelbilde, einen abgestumpften Kegel darstellend, die mittleren kleinen Kreise in einer horizontalen Linie verschiebbar. Am hübschesten war aber die Erscheinung zu sehen auf einer schwarzen horizontalen kreisförmigen Scheibe von etwa drei Zoll Durchmesser, die um ihre Axe sich sehr leicht drehte und, einmal angestossen, ziemlich lange in Bewegung blieb. Auf dieselbe wurde eine kleinere weiÙe Kreisscheibe (Oblate) gelegt und die Scheibe mit einem Auge durch ein passend befestigtes total reflectirendes rechtwinkeliges Prisma betrachtet, mit dem andern frei. Wenn sich der kleinere Kreis bei der Drehung rechts vom Mittelpunkt befand, sah ihn das freie Auge rechts, das durch das Prisma schauende Auge aber wegen der Spiegelung links vom Mittelpunkte, und so wurde die stereoskopische Parallaxe hergestellt. Der kleine Kreis schien durch die Fläche des großen hindurch wechselnd bald aufzusteigen, bald hinabzusinken.

Geschichtliches. Die älteren Ansichten über die Tiefenwahrnehmung schlossen sich zunächst an die Frage über die scheinbar verschiedene Größe des Mondes. PROLEMAEUS (150 n. Chr.) sagt schon, daÙ die Seele von der Größe der Gegenstände nach einer vorgefaÙten Schätzung ihrer Entfernung urtheilt; diese scheine größer, wenn viele Gegenstände zwischen dem Auge und der betrachteten Sache liegen, wie es der Fall ist, wenn die Himmelskörper nahe beim Horizont sind.<sup>3</sup> An einer andern Stelle freilich schreibt er die Vergrößerung der Brechung der Strahlen durch die Dünste zu.<sup>4</sup> ALHAZEN<sup>5</sup> (im 10. Jahrh.) widerlegt die letztere Ansicht und kehrt zur ersteren zurück. Ihm

<sup>1</sup> Ueber die Wahl des Winkels CLAUDET im *Cosmos*, IV, 65–67, 1847. — SUTTON im *Cosmos*, IX, 313–319.

<sup>2</sup> BABO, *Bericht der Freihurg. Ges.* II, 312–314.

<sup>3</sup> MONTUCLA, *Hist. des Mathém.* Vol. I, p. 309. — ROGERI BACONIS *Perspect.*, p. 118. — PRIESTLEY, *Geschichte der Optik*, übersetzt von KLFEL, p. 11–12. — GREGORY *Geometria. Pars univers.*, p. 141. — MALEBRANCHE, *Recherche de la vérité*. P. I. — HUYGENS in SMITH *Opticks*. Art. 586. — LOGAN in *Phil. Trans.* XXXIX, 404.

<sup>4</sup> *Almagest*, L. III, c. 3. Auch STRABO, *Geogr.* I, 3.

<sup>5</sup> ALHAZEN, L. VII, p. 53–54.

et ROGER BACO bei, während PORTA<sup>1</sup> es bestreitet. VITELLIO<sup>2</sup> (1270) schließt sich an und macht auch darauf aufmerksam, daß überhaupt das Himmelsgewölbe rizont scheinbar entfernter sei, als im Zenith. KEPLER,<sup>3</sup> dem sich CARTESIUS<sup>4</sup> im tlichen anschloß, sagt über die Beurtheilung der Entfernung schon, die Entfernung den Augen sei die Grundlinie, deren man sich zur Messung der Entfernung der en Objecte bediene. Und weil ein Auge von beiden Augen diese Art zu messen so könne auch bei verhältnißmäßig kleinen Entfernungen die Breite des Sterns e als Grundlinie dienen. Dann bemerkt er weiter, daß man auch mit einem ie verschiedenen Grade des Lichts zu schätzen und die Größe mit der Entfernung che durch die Uebung zu vergleichen wisse, indem man durch die Erfahrung wie weit man die Hand darnach auszustrecken und dahin zu gehen habe. Er also schon die Hauptmomente dieser Beurtheilung, abgesehen von der Verschieden- r Bilder.

ASSENDI<sup>5</sup> konnte indessen in Bezug auf den Mond wieder behaupten, er erscheine in der Nähe des Horizonts, weil dann wegen des schwächeren Lichts die Pupille weitere. HOBBS<sup>6</sup> ging auf die Erklärungen der Alten zurück und bestimmte die 689 re Gestalt des Himmelsgewölbes als ein Stück einer Kugelfläche. PATER GOUZE,<sup>7</sup> ux<sup>8</sup> und SAMUEL DUNN<sup>9</sup> bemerkten dagegen, daß es nicht nöthig sei, Gegenstände 1 dem Auge und dem Monde zu haben, und daß doch die Täuschung nicht ens nicht immer) aufhöre. DESAGULIERS<sup>10</sup> arrangirte Versuche, wobei die Zu- zu falschen Schlüssen über die Entfernung inducirt wurden und demgemäß auch se falsch beurtheilten. BERKELEY<sup>11</sup> hob das trübe Ansehen und die Lichtschwäche des am Horizonte hervor, Umstände, die jedenfalls einen sehr deutlichen Einfluß Auch SMITH<sup>12</sup> untersuchte den Einfluß der scheinbaren Gestalt des Himmels- ; er stellte eine Reihe Schätzungen an über scheinbar gleiche Distanzen, die n Zenith, bald dem Horizont näher gelegen waren, und fand, daß die Entfernung izonts scheinbar drei bis vier Mal größer sei, als die des Zeniths. LAMBERT<sup>13</sup> den Querschnitt des Himmelsgewölbes mit einer Muschellinie. Auch die Gestalt ite des Regenbogens wird dadurch verändert, er erscheint flach elliptisch, seine maler als die Fußpunkte; ebenso werden Sonnenhöfe, Sterndistanzen scheinbar t. SMITH hat auch folgenden hübschen Versuch angegeben. Wenn man in den akt einer Convexlinse eine kleine kreisrunde Oblate stellt, so erscheint deren ch die Linse gesehen, immer unter demselben Gesichtswinkel, wie weit auch achter sich entferne, so lange seine Ränder überhaupt noch durch die Linse sind. Scheinbar wächst aber die Größe des Bildes außerordentlich, wenn sich achter entfernt, weil wir es nicht in unendlicher Entfernung, sondern noch r Linse befindlich denken.

TH, der gegen BERKELEY's Einmischung der Luftperspective polemisirte, muß doch zugeben, daß der Mond am Horizont bald größer, bald kleiner aussieht. ER<sup>14</sup> schließt sich BERKELEY an.

Einfluß, den die scheinbare Entfernung auf die Schätzung der absoluten Größe

ITA. *De refractione*, p. 24, 128.

ELLIO, *Optica*, Editio RISNERI, p. 412. Basel 1572.

LER, *Paralipomena*, p. 62—66. 1604.

TESIUS, *Dioptr.* p. 68. *De homine*, p. 66—71.

SENDI, *Opera*. Vol. II. p. 325.

INS *tracts*. Vol. II, p. 241—244.

YE, *Mém. de l'Acad. de Paris*. 1700, p. 11.

YNEUX, *Philos. Transact.* Vol. I, p. 221.

UEL DUNN, *Philos. Transact.* Vol. I.II. p. 462.

AGULIERS, *Philos. Transact.* Vol. VIII, p. 130.

KELEY, *Essay toward a new theory of vision*. Dublin 1709. p. 30 — ROBINS *mathemat. tracts*. II, 242.

TH, *Optik*, deutsche Ausg. 8. 118.

IBERT, *Beiträge*. I, § 60—73.

ER, *Briefe an eine deutsche Prinzessin*. 8. 317.



hat, hoben auch MALEBRANCHE und BOUGUER<sup>1</sup> gegen VARIGNON<sup>2</sup> hervor. Ueber die Mittel, die Entfernung zu beurtheilen, sprachen sich DE LA HIRE<sup>3</sup> und PORTERFIELD<sup>4</sup> ebenfalls den bisher erwähnten Ansichten entsprechend aus.

Umkehrung des Reliefs ist auch schon früh bemerkt worden und zwar zuerst bei der Betrachtung durch umkehrende Mikroskope oder Teleskope von JABLOT<sup>5</sup> und G. P. GMELIN<sup>6</sup>, und wurde von RITTENHOUSE<sup>7</sup> auf verkehrte Beleuchtung geschoben. MUNCKE<sup>8</sup> hob dagegen hervor, daß sie auch bei der Betrachtung durch eine einfache Loupe eintreten kann. ABAT fügte die hübsche Beobachtung hinzu, daß, wenn man eine mit Wasser halb gefüllte Glasflasche im umgekehrten Bilde eines Hohlspiegels betrachtet, der leere Theil gefüllt, der gefüllte leer erscheint, weil man die Flüssigkeit sich immer unterhalb der Grenzfläche denkt. Die neueren Ermittlungen und Ansichten über die Umkehrung des Reliefs sind oben schon angeführt worden.

Daß die Bilder, welche beide Augen von einem körperlichen Gegenstande erhalten müßten, etwas verschieden seien, hatten EUKLID, GALEN, PORTA, AGUILONIUS<sup>9</sup> schon gewußt und Schwierigkeiten darin gefunden. LEONARDO DA VINCI<sup>10</sup> hob schon hervor, daß bei dem zweiäugigen Sehen von Körpern dadurch ein Unterschied gesetzt werde, der durch kein Gemälde nachgesahmt werden könnte. SMITH<sup>11</sup> blickte mit parallelen 690 Gesichtslinien nach den beiden Schenkeln eines Cirkels, die bis zur Augendistanz geöffnet waren, und bemerkte plötzlich, wie sich beide Schenkel zu einem vereinigten, der in weite Entfernung hinauszureichen schien. Es war dies eine stereoskopische Wahrnehmung. Ähnliche Wahrnehmungen an Linealen und Fäden sind von WELLS<sup>12</sup> gemacht worden.

Wie viel die Verschiedenheit der Bilder beider Augen zur Unterscheidung der Tiefendimensionen beiträgt, wurde aber erst durch WHEATSTONE's geistreiche Erfindung des Stereoskops nachgewiesen. Die erste Nachricht davon wurde 1833 veröffentlicht,<sup>13</sup> die ausführliche Beschreibung der Erscheinungen und ihre Theorie 1838.<sup>14</sup> Nach D. BREWSTER's Angaben<sup>15</sup> hätte ein Mathematiker J. ELLIOTT in Edinburg es ebenfalls im Jahre 1834 erfunden und 1839 veröffentlicht. Ein Dritter, der die Erfindung in Anspruch nimmt, ist G. MAYNARD.<sup>16</sup> WHEATSTONE kann jedenfalls den Vorrang der Priorität behaupten, und ist auch sein Aufsatz von 1838, der die Beschreibung des Spiegelstereoskops enthält, voll von einer reichen Menge von Versuchen und Beobachtungen, durch welche alle wesentlichen hierher gehörigen Verhältnisse deutlich dargelegt und erwiesen werden. Später wurde im Jahre 1859 von Dr. A. BROWN<sup>17</sup> im Museum Wicar in Lille eine Doppelzeichnung von JACOPO CHIMENTI (geboren 1554, gestorben 1640) gefunden, einen Mann darstellend, der auf einem Schemel sitzt und in der einen Hand einen Cirkel, in der andern einen Lothfaden hält. Die beiden Zeichnungen, stereoskopisch vereinigt, geben eine Art von Relief. D. BREWSTER glaubte annehmen zu dürfen, daß sie von CHIMENTI zur Prüfung der Theorie von PORTA, die 1593

<sup>1</sup> MALEBRANCHE und BOUGUER, *Mém. de l'Académie*. 1755. p. 99 u. 156.

<sup>2</sup> VARIGNON, *Ebenda*. 1717.

<sup>3</sup> DE LA HIRE, *Mém. de Paris*. 1694.

<sup>4</sup> PORTERFIELD, *Treatise on the eye*. 1769.

<sup>5</sup> JABLOT, *Description de plusieurs nouveaux microscopes*. 1712.

<sup>6</sup> G. P. GMELIN, *Philos. Transact.* 1747.

<sup>7</sup> RITTENHOUSE, *Transact. of the American Philos. Society*. 1786. II.

<sup>8</sup> MUNCKE, *Gehler's physik. Wörterbuch*, neu bearbeitet. Leipzig 1826. IV. 1455.

<sup>9</sup> Siehe BREWSTER *the stereoscope, its history, theory and construction*. London 1856.

<sup>10</sup> LEONARDO DA VINCI, *Trattato della pittura*.

<sup>11</sup> SMITH, *System of Optics*. II, 388 u. 526.

<sup>12</sup> WELLS, *Essay upon single vision with two eyes*. Zweite Aufl. 1818.

<sup>13</sup> In H. MAYO *Outlines of human physiology*. p. 288.

<sup>14</sup> C. WHEATSTONE, *Philosophical Transactions*. 1838. P. II. S. 371–394.

<sup>15</sup> D. BREWSTER, *Liverpool and Manchester Photographic Journal*. 1857. January 1, p. 4–7. — January 15. p. 21–23.

<sup>16</sup> G. MAYNARD, *Toronto Royal Standard*. 1836. *Toronto Times*. 1857. October 8.

<sup>17</sup> A. BROWN, *Photographic Journal*. 1860, May 15. — *Encyclop. Britann.* Artikel: *Stereoskope*.

veröffentlicht war, ausgeführt seien. Seitdem sind photographische Abbildungen dieser Zeichnungen in den Handel gekommen. Die beiden Bilder des Mannes sind in der That von verschiedenen Gesichtspunkten aus aufgenommen; ich muß indessen gestehen, daß ich es für unwahrscheinlich halte, daß der Zeichner sie für einen stereoskopischen Versuch bestimmt habe; denn gerade der Sessel, der Cirkel und der Faden, welche leicht richtig zu construiren gewesen wären, sind als Nebendinge behandelt und so unregelmäßig und verschiedenartig gezeichnet, daß sie sich nicht vereinigen lassen. Und hätte der Zeichner die Theorie prüfen wollen, so müßte man eher erwarten, daß die leicht zu zeichnenden Dinge richtig, die schwer zu zeichnenden, wie die Gestalt des Menschen, ungenau gemacht worden wären. Es scheint mir wahrscheinlicher, daß der Zeichner, mit der ersten Figur nicht ganz zufrieden, sie noch einmal von einem etwas anderen Standpunkte aus gezeichnet und zwar zufällig auf dasselbe Blatt.

Die jetzt gewöhnliche Form des Linsenstereoskops wurde von D. BREWSTER 1843 veröffentlicht. Die Uebersicht der weiteren Erfindungen gibt die weiter unten folgende Uebersicht der Literatur; die Geschichte der Theorie dieser Erscheinungen wird bei den nächsten Paragraphen folgen. Die Untersuchungen über die Fehler der reinen binocular Localisation sind von RECKLINGHAUSEN,<sup>1</sup> E. HERING,<sup>2</sup> J. TOWNE und mir selbst<sup>3</sup> in Angriff genommen worden, bedürfen aber noch vielfach erneuerter Wiederholung und Erweiterung von andern Beobachtern.

### § 31. Das binoculare Doppeltsehen.

Wir haben bisher die Erscheinungen des zweiäugigen Sehens betrachtet, 695 insofern sie sinnliche Zeichen für eine bestimmte Lage der gesehenen Raum-objecte sind. Es bleibt noch übrig, die subjectiven Erscheinungen, die sich hierbei zeigen, zu untersuchen.

Ich habe oben auseinandergesetzt, wie im monoculareren Sehen neben der Anschauung der wirklichen Vertheilung der Objecte nach den drei Dimensionen des Raumes sich, wenn man auf die Art, wie sie gesehen werden, achtet, die Anschauung ihrer Vertheilung in dem flächenhaften Gesichtsfelde ausbildet. Wenn nun mit zwei Augen gesehen wird, so erscheinen die Gegenstände in dem Sehfelde jedes Auges, aber da die Bilder in beiden Sehfeldern, wie wir schon gesehen haben, im Allgemeinen nicht gleich sind, so können sie sich im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde auch nicht absolut decken, sondern es bleiben gewisse Ungleichheiten beider Sehfelder bestehen und werden wahrgenommen. In diesem Kapitel sollen die Erscheinungen betrachtet werden, welche von der Ungleichheit der räumlichen Verhältnisse der Bilder beider Sehfelder herrühren, im nächsten die, welche von der ungleichen Beleuchtung oder Färbung der Sehfelder oder ihrer Theile verursacht werden.

Es ist wohl zu beachten, daß diese Betrachtungsweise des Gesichtsfeldes als solchen, nicht die natürliche und zuerst erworbene Art des Wahrnehmens ist, sondern vielmehr stets erst durch bewusste Reflexion auf die Beschaffenheit unserer Gesichtseindrücke veranlaßt wird. Wir betrachten dann nicht mehr die Welt der Objecte an sich, wie sie ist, sondern wir beobachten, wie sie uns von unserem dermaligen Standpunkte aus erscheint.

<sup>1</sup> RECKLINGHAUSEN, *Netzhautfunctionen im Archiv für Ophthalmologie*. V. 147—178.

<sup>2</sup> E. HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig 1864. 4. und 5. Heft.

<sup>3</sup> H. HELMHOLTZ, *Archiv für Ophthalmologie*. X, 1, 8. 27—40.

Es ist dann wesentlich die Erscheinung, die uns interessirt, entweder weil wir sie als Zeichner nachbilden, oder als Physiologen theoretisch untersuchen wollen.

So wie wir nun im zweiäugigen Sehen anfangen das Gesichtsfeld als solches zu untersuchen, bemerken wir, daß die Ordnung der Objecte in den beiden Sehfeldern nicht übereinstimmt. Indem wir zum Beispiel durch das Fenster nach den Bäumen draussen sehen, sind wir im Stande, das Laubwerk mit dem linken Auge noch etwas weiter nach rechts hin zu verfolgen, als mit dem rechten. Wir sehen mit jenem Auge am rechten Rande des Fensters noch Theile des Laubwerks, die wir mit dem rechten nicht sehen können, welche für das rechte durch den Rahmen des Fensters verdeckt sind. Wir sehen also den Rahmen des Fensters in den beiden Gesichtsfeldern an zwei verschiedene Theile der Laubmasse angrenzen.

Ebenso verdeckt das Fensterkreuz dem rechten Auge einen andern Theil der Laubwand, als dem linken. Indem wir also der Laubwand mit  
696 dem Blicke folgen, tritt uns zwei Mal das Fensterkreuz an zwei verschiedenen Stellen entgegen, die Laubwand, wenn auch unvollständig verdeckend. Das Fensterkreuz erscheint also in zwei Stellen des Gesichtsfeldes, es erscheint doppelt.

Wenn man dagegen den Blick auf das Fensterkreuz oder die Glasseiben richtet und ihn entlang wandern läßt über die kleinen Flecken der einen Scheibe, dann über den mittleren verticalen Balken des Kreuzes, dann über die andere Scheibe, so kann es kommen, daß ein Baumstamm, der im Gesichtsfelde des rechten Auges rechts neben und hinter dem verticalen Holze erscheint, für das linke Auge links daneben liegt. Also wird auch das fernere Object in der durchlaufenen Reihenfolge der betrachteten Punkte zwei Mal vorkommen und doppelt erscheinen.

Wir haben in § 28 gesehen, daß wir die Reihenfolge der Punkte im Gesichtsfelde nicht bloß durch wirkliche Bewegung bestimmen können, sondern sie auch lernen nach der Reihenfolge ihrer neben einander liegenden Netzhautbilder im Auge zu beurtheilen. Wir brauchen also auch nicht den Blick wirklich über das Gesichtsfeld hingehen zu lassen, um die Doppelbilder zu sehen, sondern können dauernd einen Punkt fixiren und doch die verschiedene Anordnung der Objecte in beiden Sehfeldern erkennen. Wenn dasselbe Object entweder auf verschiedenen Seiten des fixirten Punktes erscheint, oder aber die GröÙe und Richtung seines Abstandes vom Fixationspunkte in hinreichend auffallender Weise verschieden ist, wird man erkennen, daß das betreffende Object in zwei verschiedene Stellen des Gesichtsfeldes eingeordnet erscheint.

Es seien in *Fig. 243*  $b_0$  und  $b_1$  die beiden Augen, welche den Punkt  $a$  fixiren, der ihnen demnach einfach an seinem wahren Orte im Raume erscheint. Der Punkt  $c$ , welcher näher als  $a$  ist, wird dem Auge  $b_0$  rechts von dem Punkte  $a$  im Gesichtsfelde erscheinen müssen, da  $c$  rechts von der Gesichtslinie  $ab_0$  liegt. Dem Auge  $b_1$  erscheint aber der Punkt  $c$  links von  $a$  zu liegen.

Also kommt er im gemeinsamen Gesichtsfelde einmal rechts, einmal links von  $a$  vor, erscheint also doppelt, und zwar in sogenannten ungleichnamigen Doppelbildern, da das scheinbar rechts liegende Bild von  $a$  dem linken Auge, das scheinbar links liegende dem rechten Auge angehört.

Umgekehrt ist es mit dem entfernter liegenden Punkte  $d$ . Er erscheint im Gesichtsfelde des rechten Auges  $b_1$  rechts neben  $a$ , in dem des linken Auges links neben  $a$ , folglich in gleichnamigen Doppelbildern.

Ein etwas anderer Fall ist der in *Fig. 244* dargestellte;  $b_0$  und  $b_1$  sind wieder die Augen,  $a$  der gemeinsame Fixationspunkt. Der Punkt  $c$  liege außerhalb des Winkels  $b_0 a b_1$ , in geringerem Abstände von den Augen als der Fixationspunkt. Dies Mal liegt  $c$  allerdings in den Gesichtsfeldern beider Augen nach links von  $a$ , weil die Richtungslinien  $cb_0$  und  $cb_1$  beide nach links beziehlich von  $a b_0$  und  $a b_1$  liegen. Aber der Winkel  $cb_0 a$  ist viel kleiner, als der Winkel  $cb_1 a$ . Im Gesichtsfelde von  $b_0$  ist also  $c$  um einen viel kleineren Winkel von  $a$  entfernt, als im Gesichtsfelde des andern Auges. Ist diese Differenz merklich genug, so erscheint das Bild wieder an zwei verschiedenen Orten des gemeinsamen Gesichtsfeldes, also doppelt. Die Doppelbilder sind aber in diesem Falle nicht so deutlich, als wenn sie auf verschiedenen Seiten des Fixationspunktes liegen, wie in *Fig. 243*. Namentlich 697




Fig. 243.




Fig. 244.

wenn sie sich mehr von  $a$  entfernen und in die Seitentheile des Gesichtsfeldes zu liegen kommen, muß ihr Abstand und der Unterschied ihrer Helligkeit von der der Umgebung schon ziemlich bedeutend sein, wenn sie bemerkt werden sollen. Etwas deutlicher werden sie, wenn sich zur Seite von  $a$ , etwa gleich weit von den Augen absteheend wie  $a$ , ein scharf bezeichnetes Object  $f$  zwischen den verlängerten Schenkeln des Winkels  $b_0 c b_1$  befindet,

so daß im gemeinsamen Gesichtsfelde die Doppelbilder von  $c$  auf verschiedenen Seiten von  $f$  liegen. Man hat dann im Gesichtsfelde des Auges  $b_0$  die scheinbare Reihenfolge  $acf$ , in dem von  $b_1$  die Folge  $afc$ . Dann ist es leichter die Trennung der Bilder zu erkennen, als wenn man sie vor einem gleichmäßig gefärbten und erleuchteten Hintergrund sieht.

Endlich kann man auch Doppelbilder sehen, wenn die Bilder desselben Punktes in den Gesichtsfeldern beider Augen zwar gleiche Distanz von dem fixirten Punkte haben, aber hinreichend verschiedene Richtung, daß deren Unterschied auffällig genug ist.

Dies ist der Fall, wenn der Punkt  $c$  höher oder tiefer und gleichzeitig den Augen ein wenig näher als der Punkt  $a$  gelegen ist.

Wir sehen also diejenigen Objectpunkte im Allgemeinen doppelt, welche in beiden Sehfeldern hinreichend verschiedene scheinbare Lage bezüglich zum Blickpunkte haben, daß diese Verschiedenheit durch die Schätzung des Augenmaasses bemerkt werden kann. Solche Objecte dagegen, welche scheinbar gleiche Lage gegen den Fixationspunkt im Sehfelde haben, sehen wir einfach.

Ich will ein von beiden Augen als einfach gesehenes Bild ein Ganzbild nennen, die zwei Bilder zusammengenommen, welche von demselben Objecte entworfen werden, welches nicht einfach gesehen wird, ein Doppelbild, jedes einzelne der letzteren dagegen ein Halbbild.

Wir haben nun näher zu untersuchen, welche Punkte beider Sehfelder scheinbar gleiche Lage zum Fixationspunkte haben und also im gemeinsamen 698 Gesichtsfelde sich decken. Ich nenne solche Punkte Deckpunkte oder correspondirende Punkte; man hat sie auch, einer besonderen theoretischen Auffassung zu Liebe, identische Punkte genannt. Da jedem Punkte jedes Sehfeldes ein Netzhautpunkt entspricht, so kann man auch von Deckpunkten, correspondirenden oder identischen Punkten der beiden Netzhäute reden. Punkte, welche einander nicht correspondiren, nenne ich mit FECHNER disparat.

1. Die Blickpunkte der beiden Sehfelder normaler Augen sind Deckpunkte. Der Blickpunkt jedes Sehfeldes entspricht der anatomisch ausgezeichneten Stelle der Netzhaut, der Mitte der *Fovea centralis*, der Stelle des deutlichsten Sehens. Der Blickpunkt ist der fixirte Punkt des Gesichtsfeldes. Mit dem ausgesprochenen Satze gleichgeltend ist es also auch zu sagen, der fixirte Punkt des vor uns liegenden Raumes werde stets einfach gesehen, und ein Objectpunkt, der sich auf den beiden Centren der Netzhautgruben abbilde, werde einfach gesehen.

Es ist dies ein Satz, der sich bei allen Beobachtungen normaler Augen bestätigt, von gewissen Fällen des Schielens, wo er Ausnahmen erleidet, werden wir unten handeln.

Wenn wir nach dem Grunde dieses Verhaltens fragen, so kommen wir auf die viel besprochene Frage, warum wir mit zwei Augen doch einfach sehen. Wenn man die Sinnesempfindungen einfach als Zeichen ansieht, deren

Deutung erlernt werden muß, so bietet die Beantwortung keine besondere Schwierigkeit. Fast alle äußeren Objecte afficiren gleichzeitig verschiedene Nervenfasern unseres Körpers und bringen zusammengesetzte Sinnesempfindungen hervor, die wir in ihrer Zusammensetzung als das gegebene sinnliche Zeichen des betreffenden Objects auffassen lernen, ohne uns der Zusammensetzung dieses Zeichens selbst bewußt zu werden. Im Gegentheil lernen wir die zusammengesetzte Beschaffenheit der Empfindung in den bei weitem meisten Fällen dieser Art erst durch wissenschaftliche Analyse kennen. Die Empfindung einer bestimmten Klangfarbe ist zusammengesetzt aus einer Mehrzahl von Empfindungen vieler einfacher Töne; einen Stift, den wir in der Hand halten, fühlen wir mit zwei Fingern und also durch zwei Gruppen getrennter Nervenfasern, wir riechen denselben Geruch mit zwei Nasenhöhlen, das scheinbar einfache Gefühl des Nassen, welches ein berührter Körper erzeugt, ist aus dem des Glatten und des Kalten zusammengesetzt u. s. w. In der That ist kein Grund, aus einer complicirten Wirkung auf ein so complicirtes Reagenz, wie unser Körper ist, auf ein entsprechend complicirtes Object zu schließen.

Es wird also im Allgemeinen durchaus von der Erfahrung abhängen, ob eine häufig wiederkehrende Gruppe von Empfindungen als das sinnliche Zeichen eines oder mehrerer Objecte von uns kennen gelernt wird.

Berücksichtigen wir nun, daß der normale Gebrauch der Augen derjenige ist, wobei wir das Object, welches unsere Aufmerksamkeit zur Zeit fesselt, mit beiden Augen fixiren, also auf den Centren der beiden Netzhautgruben abbilden, mit denen wir es am genauesten sehen können, so ergibt sich daraus, daß die beiden Centra der Netzhautgruben immer Bilder desselben einen äußeren Objectes abbilden werden, dessen Einheit übrigens 699 durch den Tastsinn, so oft als nöthig, zu constatiren ist, und daß ihre Empfindungen daher in räumlicher Beziehung immer als gleichgeltend kennen gelernt werden. Wir sehen also einfach mit beiden Blickpunkten, weil beim natürlichen normalen Gebrauche der Augen auf beiden Netzhautgruben immer dasselbe Object abgebildet ist, von dessen nur einmaligem Vorhandensein wir durch den Tastsinn unterrichtet sind oder uns unterrichten können.

Die entgegengesetzte Ansicht dagegen, wonach gewisse Empfindungen unseres Körpers schon vor aller Erfahrung gewisse Raumvorstellungen hervorzurufen im Stande sind, muß annehmen, daß die beiden Netzhautcentra ebenso, wie jedes andere Paar zusammengehöriger Deckstellen beider Netzhäute, durch einen angeborenen Mechanismus identische Raumanschauungen geben. Dies war auch der Grund, aus welchem die Deckstellen der Netzhäute zuerst als identische Stellen bezeichnet wurden. Eine kritische Vergleichung beider Ansichten läßt sich erst am Schlusse des folgenden Paragraphen geben.

Bei vielen Fällen sogenannten concomitirenden Schielens finden sich Ausnahmen von dem Gesetze, daß die Netzhautgruben Deckstellen sind, namentlich bei solchen Individuen, deren beide Augen annähernd gleich gut

brauchbar zum Sehen sind. Bei der genannten Art des Schielens können beide Augen nicht parallel gerichtet werden, sondern stehen entweder convergent oder divergent, und zwar so, daß bei allen Richtungen der Gesichtslinien der Winkel der Convergenz oder Divergenz nahehin die gleiche GröÙe behält. Hat ein Auge eine beträchtlich gröÙere Sehschärfe, als das andere, so pflegt der Kranke die Objecte nur mit dem besseren Auge zu fixiren, und nur, wenn man dieses mit der Hand bedeckt, fixirt er sie mit dem andern Auge. Sind beide Augen von ziemlich gleicher Sehschärfe, so ist das Schielen alternirend, das heißt der Patient braucht zum Fixiren bald das eine, bald das andere Auge, beurtheilt übrigens mit beiden Augen die Richtung der gesehenen Gegenstände richtig. In der Mehrzahl dieser letzteren Fälle nun zeigt es sich, daß die beiden Fixationspunkte nicht mehr Deckstellen sind, sondern dem Centrum der Netzhautgrube des einen Auges eine andere, je nach der Richtung des Schielens mehr nach innen oder außen gelegene Stelle der andern Netzhaut correspondirt. Der Schielende sieht alsdann einfach trotz der falschen Stellung seiner Augen, Der Nachweis, daß er wirklich mit beiden Augen sieht, und nicht etwa bloß das eine Bild vernachlässigt, wie man sonst anzunehmen pflegte, kann geführt werden, wenn man vor eines seiner Augen ein Prisma mit der brechenden Kante nach oben oder unten gekehrt bringt. Er sieht dann, wie ein Normalsichtiger, zwei übereinanderstehende Doppelbilder des Objects. Durch das Prisma wird nämlich das Bild des einen Auges nach oben verschoben, und bei einer solchen Trennung des binocularen Ganzbildes in übereinander stehende Halbbilder kann man leicht und sicher erkennen, ob beide Halbbilder gesehen werden, und ob das eine oder das andere mehr nach rechts oder links steht. Ebenso treten Doppelbilder auf, wenn man vor das eine Auge ein Prisma mit der brechenden Kante nach links oder rechts gekehrt hält, wodurch das eine Halbbild seitlich verschoben wird, selbst wenn das Prisma so gewählt  
 700 und so gehalten ist, daß nun Bilder des gleichen Objects auf die beiden Netzhautcentra fallen. Auch wenn dergleichen Patienten noch fähig sind, durch besondere Anstrengung die Augen in parallele Stellung zu bringen, wo sie entfernte Objecte einfach sehen sollten, sehen sie diese doppelt.

Dasselbe geschieht nun auch, wenn durch eine gelungene Operation den Augen die normale Stellung wiedergegeben ist. Die Patienten werden dann in den ersten Tagen von den Doppelbildern sehr gequält, später lernen sie diese zu übersehen, bis dann endlich, nach einem Jahre oder längerer Zeit, sich das normale Identitätsverhältniß hergestellt findet. Doch geschieht das letztere nicht in allen Fällen, namentlich nicht in solchen, wo das eine Auge eine erheblich geringere Sehschärfe hat, als das andere; in solchen bleiben meist die nach der Operation auftretenden Doppelbilder in unveränderter Stellung zu einander bestehen, aber das undeutlichere wird bei der Orientirung vernachlässigt. Endlich kommen auch Fälle vor, wo diese Vernachlässigung des einen Bildes so weit geht, daß es selbst mit Hilfe von Prismen und farbigen Gläsern nicht zur Wahrnehmung gebracht werden kann.



Ebenso wie bei geringer Sehschärfe des einen Auges die Patienten nach der Operation sich von den Doppelbildern leichter befreien durch Vernachlässigung des einen, als durch Ausbildung eines neuen Identitätsverhältnisses, so bildet sich auch bei Schielenden mit einem schlecht sehenden Auge weniger leicht die beschriebene Incongruenz der Netzhäute aus. Bei solchen zeigen sich dann selbst nach jahrelangem Schielen noch immer die beiden Netzhautcentra als correspondirend. Dasselbe ist der Fall in allen denjenigen Fällen, wo der Convergenz-, beziehlich Divergenzwinkel, den die Blicklinien miteinander bilden, veränderlich ist, entweder bei verschiedener Richtung des Sehens oder periodisch wechselnd zu verschiedenen Zeiten, weil in solchen Fällen die Bilder, welche die Netzhautgrube des einen Auges treffen, auf sehr verschiedene Stellen der andern Netzhaut fallen und sich deshalb keine feste Gewöhnung der Zusammengehörigkeit ausbilden kann.<sup>1</sup>

Auch zeigte sich in der That bei Schielenden, deren eines Auge verminderte Sehschärfe hat, daßs sie beim Vorhalten eines rothen Glases vor ein Auge Doppelbilder bald sehen, bald plötzlich wieder nicht sehen, ohne daßs sich die Stellung des Auges geändert hat, oder daßs sie nach der Operation das farbige Bild bald rechts, bald wieder links von dem ungefärbten Bilde sehen, oder gar nicht zu sagen wissen, ob es rechts oder links sei. Bei einem solchen Auge, dessen Bilder wegen ihrer Unvollkommenheit wenig beachtet werden, bleibt, wie es scheint, die Orientirung überhaupt immer eine unsichere, und die Erinnerung an das vor dem Schielen vorhanden gewesene Identitätsverhältniß kämpft gleichsam mit dem neuen, was sich nicht recht sicher und bestimmt ausbilden kann. ALFRED GRAEFE 701 bemerkt mit Recht, daßs hier gerade das Schwanken der Aussagen charakteristisch für den Vorgang sei.

2. Die Netzhauthorizonte beider Augen correspondiren einander. Ich habe oben auf S. 618 die Netzhauthorizonte für normal-sichtige Augen definirt als diejenigen Meridiane beider Augen, welche bei paralleler Richtung derselben in der Primärstellung mit der Visirebene zusammenfallen, und schon angeführt, daßs diese mit einander correspondiren. Bei kurzsichtigen Augen ist das meist nicht der Fall, und ich habe oben schon vorgeschlagen, als Netzhauthorizonte diejenigen Meridiane zu betrachten, welche in die Visirebene fallen bei einer solchen Stellung der Augen, wo eine Reihe Deckstellen beider Netzhäute in der genannten Ebene liegt. Dies wird für kurzsichtige Augen meist eine etwas nach abwärts gerichtete

<sup>1</sup> Der Nachweis, daßs viele Schielende mit beiden Augen und doch einfach sehen, wurde geliefert von PICKFORD in ROSEN und WUNDERLICH's *Archiv für physiologische Heilkunde*, 1842, S. 590. Die ersten Fälle von Incongruenz beschrieben durch ALBRECHT v. GRAEFE im *Archiv für Ophthalmologie*, I, 1, 234; darüber auch NAGEL, *Das Sehen mit zwei Augen*. Leipzig, 1861. S. 130–135. Die Resultate aus einer größeren Zahl von Beobachtungen giebt ALFRED GRAEFE im *Archiv für Ophthalmologie*, XI, 2, p. 1–46. Ferner F. C. DONDER'S im *Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde*, Bd. III, S. 357 und 358; *Anomalies of accommodation and refr.*, p. 164–166. Es sind dies Beobachtungen von fundamentaler Wichtigkeit für die Theorie des Binocularsehens, und wäre eine möglichst häufige und genaue Wiederholung derselben zu wünschen.

Convergenzstellung sein. Dann würde der oben hingestellte Satz nur Consequenz der Definition des Begriffs „Netzhauthorizont“ sein. Es ist aber noch zu bemerken, daß die Netzhauthorizonte auch dadurch ausgezeichnet sind, daß bei der Lage des Fixationspunktes in der Medianebene für das Augenmaafs ihre Ebenen in der Visirebene zu liegen scheinen.

Genaue Bestimmungen über die Lage der Netzhauthorizonte sind von VOLKMANN für seine (etwas kurzsichtigen) Augen gegeben worden.<sup>1</sup> An einer ebenen, vor den Augen befindlichen senkrechten Wand waren zwei Drehscheiben so angebracht, daß der Drehpunkt einer jeden in der optischen Axe des bezüglichen, auf die unendliche Ferne gerichteten Auges lag. Auf jeder Scheibe war eine feine Linie verzeichnet, die entweder einen Durchmesser oder einen Radius bildete und mit der Umdrehung der Scheibe ihre Lage veränderte. Die Gröfse der Drehung konnte mittels einer am Rande der Scheiben angebrachten Gradtheilung gemessen werden.

1. Versuchsreihe: Links ein Durchmesser horizontal gestellt; der Durchmesser der rechten Scheibe wurde gesucht ihm parallel zu stellen. Um die Linien getrennt zu sehen, war es nöthig, den Kopf ein wenig nach der Seite zu neigen. Im Mittel aus 30 Versuchen betrug

der Kreuzungswinkel . . . . .  $0^{\circ},443$   
der wahrscheinliche Beobachtungsfehler . . . .  $0^{\circ},08$

2. Versuchsreihe: Der rechte Durchmesser war horizontal gestellt, der linke wurde ihm parallel gestellt; sonst ebenso,

Kreuzungswinkel . . . . .  $0^{\circ},553$   
wahrscheinlicher Fehler . . . . .  $0^{\circ},11$

3. Versuchsreihe: Der linke Durchmesser liegt horizontal, der rechte wird so eingestellt, daß er beim Decken mit ihm eine möglichst feine Linie darstellt. Wieder im Mittel aus 30 Versuchen

Kreuzungswinkel . . . . .  $0^{\circ},397$   
wahrscheinlicher Fehler . . . . .  $0^{\circ},13$

702 4. Versuchsreihe: Ebenso, nur ist der rechte Durchmesser festgestellt, der linke wird bewegt,

Kreuzungswinkel . . . . .  $0^{\circ},467$   
wahrscheinlicher Fehler . . . . .  $0^{\circ},14$

5. Versuchsreihe: Links ein horizontal gerichteter Radius; der Radius der rechten Scheibe wird so gestellt, daß er mit jenem eine gerade Linie zu bilden scheint. Im Mittel aus 30 Versuchen

Kreuzungswinkel . . . . .  $0^{\circ},46$   
wahrscheinlicher Fehler . . . . .  $0^{\circ},125$

<sup>1</sup> A. W. VOLKMANN, *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Leipzig 1864, Heft 2, S. 206–206 und 222.

Versuchsreihe: Ebenso, nur liegt der rechte Radius fest, der linke stellt.

Kreuzungswinkel .....  $0^{\circ},463$   
 wahrscheinlicher Fehler .....  $0^{\circ},096$

man sieht, daß diese Versuche alle nahe übereinstimmende Resultate geben,

1.	$0^{\circ},443$
2.	$0^{\circ},553$
3.	$0^{\circ},397$
4.	$0^{\circ},467$
5.	$0^{\circ},460$
6.	$0^{\circ},463$
Mittel:	$0^{\circ},464.$

Der Sinn dieser Abweichung ist ein solcher, daß die äußere Seite jedes Autorizontes etwas tiefer liegt, als die innere.

Versuchsreihe: Endlich hat VOLKMANN noch Versuche angestellt, bei denen er nur eine Scheibe mit dem linken Auge betrachtete und den darauf gemessenen Durchmesser horizontal zu stellen suchte; dabei stellte er im Mittel der Versuche das linke Ende um  $0^{\circ},203$  zu tief.

Versuchsreihe: Ebenso, nur wurde das rechte Auge gebraucht. Das linke Ende des Durchmessers wurde um  $0^{\circ},233$  zu tief gestellt.

Summe beider Abweichungen  $0^{\circ},203 + 0^{\circ},233 = 0^{\circ},436$  entspricht hingegen genau dem oben gefundenen Kreuzungswinkel der Netzhauthorizonte.

Bei den Methoden der ersten vier Versuchsreihen fand VOLKMANN bei mehreren Beobachtern den Kreuzungswinkel der Netzhauthorizonte, wie folgt

Professor H. WELCKER .....  $0^{\circ},72$   
 Stud. med. KÄHERL .....  $0^{\circ},26$   
 Dr. SCHWEIGGER-SEIDEL .....  $0^{\circ},43.$

meinen eigenen Augen habe ich Versuche nach der Methode von VOLKMANN 5. und 6. Reihe angestellt und finde keine merkliche Abweichung der Netzhauthorizonte, wenn ich vorher nur ferne Gegenstände angeblickt, oder durch Fortsetzung der Versuche meine Gesichtslinien parallel erhalten habe. Ich habe aber vom Lesen oder Schreiben, wobei meine Augen also convergiren, eine kleine Abweichung in demselben Sinne, wie VOLKMANN, und von derselben Größe, die bei längerer Fortsetzung der Versuche wieder verschwindet.

Dr. DASTICH, dessen linkes Auge normalsichtig, das rechte kurzsichtig, fand eine Abweichung von  $0^{\circ},31$ .

Wenn nun die vermuthliche Entstehungsweise dieses Identitätsverhältnisses 703 der horizontalen Meridiane betrifft, so müssen wir beachten, daß wir bei der Vision eines bestimmten Objectpunktes in denjenigen beiden Meridianen die Sehfelder und der Netzhäute, welche mit der Visirebene zusammenhängen, immer eine Reihe von Bildern derselben Objectpunkte finden, die auch übrigens die Schnittlinie der Visirebene mit der Oberfläche der Netzhäute verlaufen möge. Für alle anderen Meridiane dagegen wird das

Verhältniß, je nach der Lage und Form des Objects sehr wechseln. Gehen zum Beispiel durch den Fixationspunkt eine gerade senkrechte Linie, so werden deren Bilder in die senkrechten Meridiane der Sehfelder und auf die entsprechenden Netzhautpunkte fallen. Ist die gesehene Linie oben gegen den Beobachter hingeneigt, so fallen ihre Bilder in zwei nach oben convergirende Meridiane der Sehfelder; entfernt sie sich dagegen nach oben hin von dem Beobachter, so wird sie in zwei nach oben divergirende Meridianen erscheinen. So ist es also mit Ausnahme der in der Visirebene gelegenen Meridiane für jeden andern Meridian je eines Auges von der Form und Lage des gesehenen Objects abhängig, welcher Meridian des andern Auges die Bilder der auf jenem abgebildeten Objectpunkte empfängt. Nur die in der Visirebene liegenden Meridiane enthalten entsprechende Bilder unabhängig von der Form und Lage der Objecte.

Nun können allerdings bei verschiedenen Richtungen der Augen verschiedene Netzhautmeridiane in die Visirebene fallen. Wir dürfen aber wohl voraussetzen, daß bei natürlicher Lebensweise des Menschen, wenn nicht zu anhaltend einseitige Beschäftigungen mit bestimmter Haltung des Körpers und der Augen eingeschlagen werden, die Augen sich überwiegend oft in oder nahe der Primärlage befinden, und daß also diejenigen Netzhautmeridiane, die in der Primärstellung der Augen mit der Visirebene zusammenfallen — das sind aber die Netzhauthorizonte —, unter allen andern am häufigsten entsprechende Bilder empfangen und daher für sie die Gewöhnung gleicher Raumprojection sich ausbildet.

Ueberwiegende Beschäftigung mit nahen Gegenständen, die mit nach unten gerichteten convergirenden Blicken betrachtet werden, würde dagegen das Auftreten einer solchen Abweichung, wie sie VOLKMANN an sich und anderen beobachtet hat, bedingen können, denn bei einer solchen Richtung des Blickes rücken wirklich seine Netzhauthorizonte in die Visirebene.

3. Die zu den Netzhauthorizonten scheinbar verticalen Meridiane decken sich. Es ist schon oben auf Seite 687 hervorgehoben worden, daß diejenigen Meridiane der Sehfelder, welche für das Augenmaas einen scheinbar richtigen rechten Winkel mit den Netzhauthorizonten bilden, in Wahrheit mit ihrem oberen Ende etwas nach außen geneigt sind. Liegen also die Netzhauthorizonte in der Visirebene, so divergiren die scheinbar verticalen Meridiane etwas nach oben und convergiren nach unten. Diese selben scheinbar verticalen Meridiane, welche also in den beiden Sehfeldern scheinbar dieselbe Lage gegen den Fixationspunkt und Netzhauthorizont haben, zeigen sich als correspondirend in dem binocularen Gesichtsfelde.

Den Kreuzungswinkel der correspondirenden scheinbaren Verticallinien kann man nach denselben Methoden finden, wie den der Netzhauthorizonte, 704 ausgenommen diejenige, wobei die Linien zum Decken gebracht werden. Dabei verschmelzen nämlich zwei einander ähnlich gefärbte Linien zu leicht zu einem stereoskopischen Gesamtbilde, selbst wenn sie noch ziemlich disparate Richtungen haben. Man kann dies aber vermeiden, wenn man

beiden Linien ganz verschiedene Färbung giebt, zum Beispiel einen blauen Faden auf schwarzem Grund mit einem schwarzen auf weißem Grunde.

Die sichersten und übereinstimmendsten Urtheile bei solchen Vergleichen habe ich schließlich bei folgender Methode gewonnen.

Man spannt auf einer senkrechten hölzernen Tafel ein Blatt schwarzen Papiers an und auf diesem neben einander befestigt erstens ein rother Faden, der 1 cm breiter und von zwei parallelen geraden Rändern begrenzter Streifen, und zweitens ein blauer Faden. Beide erhalten nahehin senkrechte

Richtung, nach oben ein wenig divergirend, und solche Entfernung voneinander, daß ihr Abstand in der Höhe der Augen des Beobachters dem Abstande dieser Augen gleich ist. Der Papierstreifen wird mit beiden Enden festgesteckt, der Faden mit dem oberen Ende; sein unteres ist durch ein kleines Gewicht gespannt. Das untere Ende des Fadens schiebt man, als nöthig, mit einer Nadel zur Seite, die man schließlich fest sticht, so daß der Faden die richtige Lage hat. Man blickt nun nach dem Faden durch den Streifen mit parallelen Gesichtslinien, so daß der blaue Faden auf der Mitte des rothen Streifens erscheint, und verschiebt den Faden so lange, bis er genau auf der Mitte des Streifens zu liegen kommt.

Dann steckt man die Nadel fest. Indem man die Entfernung des Fadens vom Streifen am oberen und unteren Ende abmisst, und auch den Abstand der gemessenen Punkte, kann man den Winkel, den die Fäden mit einander bilden, leicht bestimmen.

Der obige Satz ergibt sich am directesten, wenn man in der besten Weise die Abweichung der horizontalen und verticalen Decklinien bestimmt und außerdem die Winkel, welche die zu einer Horizontallinie senkrechten Linien mit jener machen. Solche Bestimmungen hat Dr. DASTICH in meinem Heidelberger Laboratorium ausgeführt und folgende Werthe gefunden:

Winkel zwischen den scheinbar verticalen Decklinien:	2° 40'
Winkel zwischen den Netzhauthorizonten:	0° 18'
	<hr/>
	Differenz 2° 22'.

Der selbe fand die Abweichung vom rechten Winkel

für sein rechtes Auge	1° 12'
für sein linkes Auge	1° 21'
	<hr/>
Summe:	2° 33'.

Die Differenz der ersten beiden Winkel, im Betrag von 2° 22', ist der Winkel, den die scheinbar verticalen Meridiane mit einander bilden würden. Die Stellung der Augen, wo die Netzhauthorizonte in die Visirebene fallen, ist der Summe 2° 33' so nahe gleich, als die Genauigkeit solcher Bestimmungen erwarten läßt. Das heißt also, die scheinbar verticalen Decklinien fallen sich nicht merklich von denjenigen Linien, die nach dem Gesetze als normal zu den Netzhauthorizonten scheinen.

705 Dasselbe geht übrigens auch indirect aus VOLKMANN's Versuchen hervor. Derselbe hat nämlich außer den schon erwähnten Versuchen, einen monocular gesehenen Durchmesser seiner Scheiben horizontal zu stellen (7. und 8. Versuchsreihe), auch Versuche gemacht; ihn vertical zu stellen, wobei er also die absolute verticale Richtung einzuhalten suchte, nicht die normale gegen eine horizontale sichtbare gerade Linie. Da indessen schon oben bemerkt ist, daß die Netzhaut-horizonte ihm absolut horizontal erschienen unter den Umständen des Versuchs, so folgt, daß ihm die hier bestimmten scheinbar verticalen Richtungen auch normal zu den Netzhauthorizonten erscheinen mußten.

9. Versuchsreihe: Die Scheibe wird mit dem linken Auge betrachtet und der Durchmesser scheinbar vertical gestellt. Im Mittel von 30 Versuchen beträgt die Abweichung  $1^{\circ},307$ .

10. Versuchsreihe: Ebenso mit dem rechten Auge; Abweichung im Mittel  $0^{\circ},82$ .

Die Winkel zwischen den scheinbar verticalen Decklinien hat er nach denselben Methoden bestimmt, wie für die horizontalen, und folgende Zahlen erhalten

Methode der Versuchsreihe	Mittelwerth	Wahrscheinlicher Fehler.
1	$2^{\circ},23$	$0^{\circ},16$
" "	$2^{\circ},06$	$0^{\circ},07$
" "	$2^{\circ},16$	$0^{\circ},22$
" "	$2^{\circ},14$	$0^{\circ},21$
Gesamtmittel:	$2^{\circ},15$	

Nun ist die Summe der Abweichungen der jedem einzelnen Auge normal erscheinenden Linien:

$$1^{\circ},307 + 0^{\circ},82 = 2^{\circ},127$$

der Abweichung der Decklinien von einander so nahehin gleich, daß daraus folgt, die für das Augenmaß in jedem Sehfelde vertical erscheinenden Linien seien auch Decklinien, und dies entspricht wieder unserem Satze.

Auf VOLKMANN's Veranlassung wiederholte SCHWEIGGER-SEIDEL die Versuche. Die Abweichung der scheinbar verticalen Linie von der wirklich Verticalen fand er für das linke Auge gleich  $0^{\circ},663$ , für das rechte Auge gleich  $0^{\circ},657$ . Die Summe beider Größen ist  $1^{\circ},32$ . Damit nahe übereinstimmend, fand sich der Winkel zwischen den beiden scheinbar verticalen Decklinien bei ihm gleich  $1^{\circ},44$ .

VOLKMANN hat endlich auch Versuchsreihen noch in der Weise angestellt, daß der Diameter der einen Scheibe horizontal lag und er den der andern im binocularen Gesamtbilde senkrecht zu jenem zu stellen suchte. Auch diese Versuche zeigen gute Uebereinstimmung mit den früheren und mit dem oben hingestellten Satze, daß die scheinbar verticalen Meridiane Decklinien seien, und dieser Satz ist wieder ein Fall des oben hingestellten allgemeineren, daß Linien, die in den monoculareren Sehfeldern scheinbar gleiche Lage haben, Decklinien sind. Nachdem nämlich festgestellt ist, daß die Netzhauthorizonte Decklinien sind, müssen die zu ihnen und dem Fixationspunkt scheinbar gleiche Lage habenden scheinbaren Verticalen auch Decklinien sein.

Der Winkel der scheinbaren Verticallinien hat bei normalsichtigen Augen, wie es scheint, immer ziemlich dieselbe Größe von etwa  $2\frac{1}{2}$  Grad; bei kurz-

gen Augen habe ich ihn meist viel kleiner gefunden. Auch E. HERRING, kurzsichtig ist, hat ihn für seine Augen beinahe gleich Null gefunden. In den theoretischen Untersuchungen über das monoculare Gesichtsfeld 706 wir, daß die dort betrachteten Vorgänge bei der Ausbildung des maasses für diesen Winkel keine bestimmte Gröfse ergaben, ihn vielmehr timmt liefsen. Gründe, die seine Gröfse zu bestimmen scheinen, werden eiter unten in der Lehre vom Horopter finden.

. In den scheinbar verticalen Decklinien sind Punkte, welche weit von den Netzhauthorizonten abliegen, Deckpunkte. hierüber liegen genaue Versuche von VOLKMANN vor. Jedes Auge ein rechtwinkeliges Kreuz vor sich, gebildet aus der Horizontalen  $aa'$ , 45, und den Senkrechten  $s$  und  $s'$ , deren Abstand dem der Augen




Fig. 243.

obachters gleich zu machen ist. Unterhalb der Horizontallinie und fassen von der Verticallinie jedes Kreuzes war eine zweite Horizontal- und  $b'$  gezogen, von denen die eine  $b$  fest, die andere  $b'$  beweglich, daß sie sich selbst parallel verschoben werden konnte. Der Beob- fixirte die Mittelpunkte beider Kreuze mit parallelen Gesichtslinien, sie sich scheinbar deckten, und verschob dann die bewegliche tallinie  $b'$  so lange, bis sie scheinbar die genaue Fortsetzung der lhorizontallinie  $b$  im anderen Sehfelde bildete.

Mittel aus je 30 Versuchen erhielt er den Abstand der beweglichen ullinie

Bewegliche Horizontale rechts . . . . .	5,51	Millimeter
Bewegliche Horizontale links . . . . .	5,47	"
Abstand der festen Horizontale . . . . .	5,50	"

Abstand der Linien von den Augen war 300 Millimeter, die Differenzen den beiden verglichenen Gröfsen liegen unter der Grenze der wahrnehm- stände.



Um eine feste Uebung in der Vergleichung verticaler Distanzen zwischen beiden Sehfeldern zu erlangen, sind die Verhältnisse des natürlichen Sehens besonders günstig. So oft nämlich der Fixationspunkt in der Medianebeue des Körpers liegt, der Blick also geradeaus gerichtet ist, können oberhalb und unterhalb des Fixationspunktes liegende Objectpunkte zwar beiden Augen in etwas disparaten Meridianen erscheinen, aber ihr Winkelabstand vom Fixationspunkte wird immer in beiden Sehfeldern derselbe sein müssen. 707 auch wenn jene Punkte dem Auge beträchtlich näher oder ferner liegen, als der fixirte Punkt; und es wird deshalb, so oft wir geradeaus blicken, Gelegenheit gegeben sein, Erfahrungen zu machen, welche verticale Dimensionen des einen Sehfeldes denen des andern entsprechen. Dem entsprechend werden wir später finden, daß vertical übereinander liegende Doppelbilder besonders leicht erkannt werden.

5. In den Netzhauthorizonten sind solche Punkte, welche gleich weit vom Fixationspunkt abliegen, Deckpunkte. VOLKMANN hat hierüber Versuchsreihen angestellt nach ähnlicher Weise wie die zuletzt erwähnten, nur daß statt der festen und beweglichen Horizontallinie rechts von der Verticallinie jedes Kreuzes eine zweite Verticallinie angebracht war, die eine fest oberhalb der Horizontallinie des Kreuzes, die andere beweglich darunter. Wieder im Mittel von je dreißig Versuchen fand sich der Abstand der beweglichen Verticallinie,

wenn sie rechts lag, . . . . .	5,24	Millimeter,
wenn sie links lag, . . . . .	5,21	"
Abstand der festen Verticale	5,20	"

Die Unterschiede sind hier also wieder kleiner, als die kleinsten wahrnehmbaren Größen. VOLKMANN machte also auch diese Bestimmung mit sehr großer Genauigkeit.

Ich selbst finde diese Art des Einstellens sehr viel schwerer, als die von horizontalen Linien, weil bei mir eine scheinbare stereoskopische Vereinigung der Verticallinien des Kreuzes, welche fixirt werden sollen, eintritt, auch wenn meine Blicklinien etwas mehr convergiren oder divergiren, als zur genauen Vereinigung nöthig ist; und dabei schwanken dann die seitlichen Verticallinien hin und her, so daß ich nach Belieben bald die eine, bald die andere der fixirten Verticallinien näher sehen kann. Sicherer gelingt mir der Versuch, wenn auch von den fixirten Verticallinien die eine nur oberhalb, die andere nur unterhalb der Horizontalen gezogen ist.

Die Vergleichung horizontaler Distanzen in beiden Sehfeldern kann im Allgemeinen nur dann ein constantes Resultat geben, wenn sie an unendlich entfernten Objecten, des irdischen Horizontes zum Beispiel, angestellt wird. Die Entfernung zweier Punkte des Horizontes in den Bildern beider Sehfelder muß allerdings immer die gleiche sein, und durch Vergleichung solcher Bilder werden wir lernen können, welche horizontale Strecken in beiden Sehfeldern (bezüglich auf beiden Netzhäuten) gleich groß sind. An

näheren Gegenständen werden nur ausnahmsweise zwei horizontal neben  
 ler gelegene Objectpunkte in beiden Sehfeldern unter gleichem Distanz-  
 l erscheinen, wegen der Verschiedenheit ihrer perspectivischen Projec-  
 1. Dem entsprechend finden wir auch, daß horizontal neben einander  
 de Doppelbilder viel leichter verschmelzen und schwerer als doppelt  
 nt werden, als vertical über einander liegende. Dennoch reicht, wie  
 MANN'S Versuche zeigen, unter günstigen Bedingungen und bei sehr  
 er Wiederholung der Versuche die vorhandene Uebung in der Ver-  
 ung beider Sehfelder aus, um die Gleichheit oder Ungleichheit zweier  
 r Distanzen ziemlich genau und richtig zu erkennen. Es kommt  
 1 noch hinzu, daß wegen der symmetrischen Anordnung beider Augen 708  
 unsymmetrische Vertheilung der Fehler zwischen beiden Augen ein-  
 kann. Wenn  $a$  und  $a_1$  zwei gleiche Strecken in den äußeren Hälften  
 Sehfelder sind,  $b$  und  $b_1$  gleich große auf den inneren Hälften, so  
 gen der Symmetrie der Augen kein Grund vorhanden  $a$  für größer  
 leiner als  $a_1$ , und  $b$  für größer oder kleiner als  $b_1$  zu halten. Da  
 rner durch das Augenmaafs richtig erkennen, daß  $a = b$ , und daß  
 1, so werden wir auch richtig erkennen, daß die Decklinien  $a = b_1$   
 $= a_1$  sind.

achdem wir festgestellt haben, welche Richtungen in beiden Sehfeldern,  
 ich auf beiden Netzhäuten, als scheinbar horizontale Decklinien sich  
 chen, welche als verticale Decklinien, welche Längen auf den ersteren  
 lche auf den letzteren gleich groß erscheinen, so sind die nöthigen  
 gegeben, um die scheinbare Lage aller Punkte des einen monocularen  
 sfeldes mit denen des andern vergleichen zu können. Von einer  
 1 Vergleichung der Lage der Doppelbilder kann, wie schon oben  
 ehoben wurde, nur in den mittleren Theilen der Sehfelder die Rede  
 an ihren peripherischen Theilen sowohl die Erkennung der Deck-  
 wie auch die Abmessung der Distanzen durch das Augenmaafs zu  
 ist. Wir werden also den bei unserer vorliegenden Untersuchung  
 acht kommenden mittleren Theil jedes Sehfeldes als eine Ebene  
 können.

sei in *Fig. 246* (S. 856)  $o$  der Fixationspunkt des rechten Auges in der  
 les Papiers,  $o'$  der des linken Auges;  $ak$  sei die scheinbare horizon-  
 die scheinbar verticale Linie für jenes,  $a'k'$  und  $l'b'$  seien dieselben  
 m andern Sehfelde. Es seien ferner  $co = c'o'$  gleiche Längen auf  
 len scheinbar verticalen Linien abgeschnitten, dann erscheinen auch  
 inien gleich lang und  $c$  und  $c'$  sind Deckpunkte. Ebenso seien  
 $o'$  gleiche Längen auf den scheinbaren Horizontalen. Durch  $c$  denke  
 e Parallele  $ef$  mit  $ak$ , durch  $c'$  ebenso eine Parallele  $e'f'$  mit  $a'k'$   
 Jeder Punkt von  $f$  muß nicht bloß wirklich, sondern auch scheinbar  
 oßen Abstand von  $ak$  haben wie  $c$ , da die Abstände von parallelen  
 urch das Augenmaafs richtig und genau verglichen werden können.  
 muß jeder Punkt von  $e'f'$  scheinbar den gleichen Abstand von  $a'k'$  709

haben wie  $c'$ , und da die scheinbaren Abstände des Punktes  $c$  von der Linie  $ak$  und des Punktes  $c'$  von der Linie  $a'k'$  als gleich vorausgesetzt sind, so müssen die Linien  $ef$  und  $e'f'$  in beiden Sehfeldern erscheinen als Horizontallinien, die gleichen Abstand von den sich deckenden Netzhart-horizonten haben, und müssen also selbst Decklinien sein, wenn der oben vorangestellte Satz richtig ist, daß alle Punkte, welche in beiden Sehfeldern scheinbar gleiche Lage haben, Deckpunkte seien.

Ebenso folgt, daß die Linien  $gh$  und  $g'h'$  Decklinien sind, und schliesslich, daß die Punkte  $m$  und  $m'$ , in denen sich  $ef$  mit  $gh$  und  $e'f'$  mit  $g'h'$  schneidet, Deckpunkte sind.




Fig. 246.

Diese Schlüsse zusammengefaßt kann man so aussprechen, daß unter Voraussetzung der Gültigkeit des mehrerwähnten Grundsatzes diejenigen Punkte beider Sehfelder Deckpunkte sind, welche gleiche und gleich gerichtete Abstände von den scheinbar horizontalen und scheinbar verticalen Decklinien haben.

Um diesen Satz an der Erfahrung zu prüfen, kann man die stereoskopischen Figuren *D*, *Taf. IV*, gebrauchen. Um eine zu leichte Verschmelzung correspondirender Linien zu verhindern, ist die rechte Seite mit weißen Linien auf schwarzem Grunde, die linke mit schwarzen Linien auf weißem Grunde gezeichnet. Die Figuren sollen mit parallelen Blicklinien angesehen werden, so daß beide sich im gemeinsamen Gesichtsfelde scheinbar decken. Wer dies nicht erreichen kann, brauche das Stereoskop. Die rechte Seite bildet für mein rechtes Auge, die linke für mein linkes ein scheinbar genau rechtwinkeliges Gitter; ich hoffe, daß dies für die meisten normalsichtigen Leser der Fall sein wird. Andernfalls muß jeder Beobachter sich ähnliche Figuren für seine Augen passend zeichnen, so daß sowohl die horizontalen wie auch die verticalen Linien der einen Figur mit den entsprechenden der andern denjenigen Winkel bilden, welcher nöthig ist, damit sie bei paralleler Blickrichtung zur Deckung gebracht werden können. Der Abstand der Mittel-

beider Figuren ist gleich dem Abstände der Augenmittelpunkte des Beobachters zu machen; die Abstände der horizontalen Linien von einander in beiden Figuren gleich zu machen, ebenso die Abstände der Verticalen von einander.

Fixire ich nun den Mittelpunkt des rechten Gitters mit dem rechten, den linken Gitters mit dem linken Auge, so fallen in dem gemeinschaftlichen Gesichtsfelde alle Linien des einen auf die entsprechenden des andern, man leicht erkennen kann, da übrigens die schwarzen Linien der linken nicht leicht mit den weissen der rechten Seite verschmelzen.<sup>1</sup>

Der Versuch, der mit der *Fig. D, Taf. IV*, ausgeführt ist, giebt uns auch Aufschluß darüber, wie correspondirende Punkte in beiden Augen liegen sind. Man richte die Gesichtslinien parallel der Medianebene auf die beiden Mittelpunkte der genannten Figuren, deren Ebene selbst senkrecht zur Gesichtslinie stehen soll, und denke sich durch die Horizontallinien der Figuren und durch die Knotenpunkte der Augen Ebenen gelegt. Diejenigen Ebenen, welche durch die mittlere Horizontallinie gehen, auf der der Fixationspunkt liegt, fallen unter diesen Umständen mit den Netzhauthorizonten beider Augen zusammen. Die anderen Ebenen schneiden sich unter einander und schneiden den Netzhauthorizont in einer zur Gesichtslinie normalen Horizontallinie, die wir die Aequatorialaxe des Netzhauthorizontes nennen wollen. Den Winkel zwischen einer der beschriebenen Ebenen und dem Netzhauthorizonte nennen wir den Höhenwinkel der betreffenden Ebene. Für alle Punkte einer Ebene ist die scheinbare Höhe über der Visirebene gleich, wenn wir ein unendlich entferntes Gesichtsfeld projecirt denken; dem entsprechend ist für sie eine Ebene gleichen Höhenwinkels.

Ebenso denken wir uns Ebenen construirt durch jede der verticalen Linien der Figuren und den Knotenpunkt des betreffenden Auges. Die mittlere Ebene, welche den Fixationspunkt enthält, ist die Ebene des scheinbar verticalen Meridians und wird von sämtlichen anderen Ebenen dieser Art senkrecht zur Gesichtslinie normalen Linie geschnitten, welche wir die Aequatorialaxe des scheinbar verticalen Meridians nennen. Den Winkel zwischen einer solchen Ebene und der Ebene des scheinbar verticalen Meridians nennen wir Breitenwinkel, und zählen diesen in beiden Augen positiv nach rechts hin, negativ nach links. Die Ebenen, welche den Nullwinkel einschließen, selbst nennen wir Ebenen gleichen Breitenwinkels.

Die Feststellung dieser Begriffe läßt sich die Lage identischer Punkte im Sehfeldern leicht finden. Man denke sich durch den betreffenden Punkt des Gesichtsfeldes und die Aequatorialaxen sowohl des Netzhauthorizonts

<sup>1</sup> Beobachter, welcher durch die größere Anzahl der Linien verwirrt zu werden fürchten sollte, HERING, kann die entsprechenden Beobachtungen auch leicht an einer Reihe von einfacheren Figuren ausführen, wie ich es übrigens selbst auch gethan habe, ehe ich mir die beschriebenen Figuren construirt hatte. Ich hatte nicht geglaubt dies in meinem Aufsatze über den Horopter erwähnen zu müssen, will es hier aber ausdrücklich hervorheben, da es Veranlassung zu kritischen Einwürfen geben könnte.

als auch des scheinbar verticalen Meridians Ebenen gelegt, durch welche der Höhenwinkel und der Breitenwinkel für den betreffenden Punkt des Gesichtsfeldes gegeben wird. Identisch sind solche Punkte beider Gesichtsfelder, welche gleiche Höhenwinkel und gleiche Breitenwinkel haben.

Diese Definition identischer Punkte stützt sich auf einen direct auszuführenden Versuch. Denkt man sich die beiden Figuren, welche die Eintheilung des Gesichtsfeldes darstellen, zu unendlichen Ebenen erweitert, so erhält man die Abtheilungen der identischen Punkte bis zu  $90^\circ$  auf jeder Seite der Gesichtslinie. Dies genügt auch vollkommen für diesen Zweck, denn wenn auch das Gesichtsfeld jedes einzelnen Auges nach aufsen etwas weiter als  $90^\circ$  reicht, so ist das binoculare Gesichtsfeld doch viel kleiner, weil der Nasenrücken dem andern Auge diese äußersten Theile des Feldes verdeckt. Uebrigens ist eine genaue Bestimmung der identischen Punkte durch den Versuch auch nur möglich für diejenigen Stellen beider Sehfelder, die dem Fixationspunkt ziemlich nahe liegen, denn in größerer Entfernung wird die Entscheidung darüber, welche indirect gesehene Gegenstände beider Gesichtsfelder sich decken, welche nicht, so außerordentlich unbestimmt, daß nur ganz erhebliche Differenzen der Doppelbilder überhaupt wahrgenommen werden können.

Es ist noch zu bemerken, daß nicht auf allen correspondirenden Meridianen der Sehfelder die Deckpunkte gleichweit vom Blickpunkte entfernt sind, wie dies von den scheinbar horizontalen und scheinbar verticalen Decklinien gilt. 711 Wenn man in der *Fig. 246* von den Fixationspunkten  $o$  und  $o'$  die Diagonalen  $om$  und  $o'm'$  nach den Deckpunkten  $m$  und  $m'$  zieht, so ist  $om$  länger als  $o'm'$  und doch sind beides correspondirende Strecken auf correspondirenden Meridianen. Der genannte Unterschied ist klein.

Bezeichnet man die Strecken

$$md = co = m'd' = c'o' \text{ mit } a$$

und

$$mc = od = m'c' = o'd' \text{ mit } b$$

und die Abweichung der beiden Winkel  $cod$  und  $c'o'k'$  von  $90^\circ$  mit  $\epsilon$ , so sind die correspondirenden Längen

$$mo = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \sin \epsilon}$$

$$m'o' = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \sin \epsilon}.$$

Relativ am größten wird dieser Unterschied, wenn  $a = b$ ; dann werden nämlich diese Längen

$$mo = 2a \cos \left( 45^\circ - \frac{\epsilon}{2} \right) \text{ und } m'o' = 2a \cos \left( 45^\circ + \frac{\epsilon}{2} \right).$$

Wenn  $\delta = 1^\circ 13'$ , wie für meine Augen, so ist das Verhältniß dieser beiden Größen wie 1 : 1,0215, oder wie 47 : 48. Um diesen Unterschied zu

chten, habe ich das Liniensystem der *Fig. 247* angewendet. Das rechte fixirt  $a'$ , das linke  $a$ , die Linien  $ac$  und  $a'c'$  fallen dann im binocularen scheinbar in eine zusammen, ebenso  $ab$  und  $a'b'$ . Die Linie  $fg$  ist auf andern Papierstreifen gezogen, der um den entfernten Punkt  $g$  drehbar. Man sucht nun, während man  $a$  und  $a'$  streng fixirt,  $gf$  so einzustellen, sie als Fortsetzung der Linie  $ed$  erscheint. Dann fand sich, daß ich  $a'f$  gleich 19,5 Millimeter machte, während  $ad$  20 Millimeter betrug. Man natürlich gleichzeitig genau darauf achten, daß  $ac$  und  $a'c'$  als eine gebrochene Linie erscheinen. Der Unterschied, um den es sich hier 712  
 lt, liegt ziemlich an der Grenze des Wahrnehmbaren.  
 ch finde, daß die zuletzt erwähnten Unterschiede sich auch merklich  
 n, wenn ich zwei Systeme concentrischer Kreise, das linke mit schwarzen  
 auf weißem Grund gezeichnet, das rechte mit weißen Linien auf




Fig. 247.

dem Grunde ausgeführt, wie *O, Taf. VI*, bei fester Fixation ihrer Punkte mit parallelen Gesichtslinien zum Decken bringe. Dann decken die weißen und schwarzen Linien wirklich in dem verticalen und allen Meridian; aber in den schräg liegenden Meridianen fallen sie auseinander, und zwar nach oben rechts und unten links die schwarzen rücken, dagegen oben links und unten rechts die weißen. Der nach rechts gerichtete Radius des rechten Feldes müßte nämlich länger werden, als der nach oben rechts gerichtete Radius des linken um ihm gleich zu erscheinen. Folglich erscheint jener kürzer, länger.

ergibt sich aus der oben hingestellten Betrachtungsweise auch ein für die Größe derjenigen Winkel, welche verschieden gerichtete Deckung miteinander machen. Die Berechnung, welche unten nachzusehen steht für die Winkeldifferenz  $\Delta$  zweier correspondirender Meridiane parallelen Blicklinien den Ausdruck

$$\Delta = \gamma + 2\epsilon \sin^2 \beta,$$

worin  $\gamma$  der Winkel zwischen den Netzhauthorizonten in der betreffenden Augenstellung,  $2\varepsilon$  der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Meridianen und  $\beta$  der Mittelwerth des Winkels ist, den die beiden zu vergleichenden Decklinien mit ihren Netzhauthorizonten bilden.

Eine Reihe von Messungen, welche VOLKMANN über die Winkel zwischen correspondirenden Meridianen angestellt hat,<sup>1</sup> machen eine Vergleichung dieser Formel mit der Erfahrung möglich. In der folgenden Tabelle sind die Constanten  $\gamma$  und  $\varepsilon$  der obigen Formel nach der Methode der kleinsten Quadrate aus den gesammten Beobachtungen bestimmt worden.

Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane für VOLKMANN's Augen.

Neigung gegen die Verticale $90^\circ - \beta$	Kreuzungswinkel			Differenz zwischen Beobachtung und Rechnung
	beobachteter Mittelwerth	wahrschein- licher Fehler	berechnet	
$0^\circ$	$2^\circ,15$	$0^\circ,106$	$2^\circ,166$	— 0,016
$15^\circ$	$1^\circ,99$	$0^\circ,064$	$2^\circ,062$	— 0,072
$30^\circ$	$1^\circ,78$	$0^\circ,195$	$1^\circ,781$	— 0,001
$45^\circ$	$1^\circ,51$	$0^\circ,075$	$1^\circ,397$	+ 0,113
$60^\circ$	$1^\circ,15^2$	$0^\circ,114$	$1^\circ,013$	+ 0,137
$75^\circ$	$0^\circ,81$	$0^\circ,084$	$0^\circ,732$	+ 0,078
$90^\circ$	$0^\circ,46^3$	$0^\circ,062$	$0^\circ,628$	— 0,168

$$\gamma = 0^\circ,628$$

$$2\varepsilon = 1^\circ,5375$$

Die wahrscheinlichen Fehler des Beobachtungsmittels sind aus den von VOLKMANN für die einzelnen Reihen angegebenen Werthen berechnet. Man sieht, daß die 713 Abweichung zwischen Rechnung und Beobachtung im Allgemeinen nicht größer ist, als die wahrscheinlichen Fehler, welche bei solchen Beobachtungsreihen vorkommen, und wir dürfen die Uebereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtungen wohl für befriedigend ansehen.

Nachdem wir die Lage der Deckpunkte in den beiden Sehfeldern bestimmt haben, können wir dazu übergehn, die Lage derjenigen Punkte des äußeren Raumes zu bestimmen, welche sich auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute abbilden und deshalb einfach gesehen werden. Man nennt den Inbegriff dieser Punkte den Horopter. Derselbe ist im Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung, welche als die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades (Hyperboloide mit einer Mantelfläche, Kegel oder Cylinder) angesehen werden kann. Die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades ist im Allgemeinen vom vierten Grade, das heißt, kann von einer Ebene in je vier Punkten geschnitten werden. In dem hier vorliegenden Falle haben aber die beiden schneidenden Flächen eine gerade Linie gemein, welche nicht Horopter ist, und der Rest der Schnittlinie ist eine Curve dritten

<sup>1</sup> Versuch 100 bis 112 im zweiten Hefte seiner *Physiologischen Untersuchungen im Gebiete der Optik*. S. 202–213.

<sup>2</sup> Bei VOLKMANN, S. 213, ein Rechnungsfehler.

<sup>3</sup> Mittel aus den beiden Versuchsreihen 106 und 107.



ies, das heißt eine solche, welche von einer beliebigen Ebene nur in Punkten geschnitten werden kann. Diese Curve hat die bemerkenswerte Eigenschaft, daß wenn man durch irgend' einen festen Punkt der Curve einerseits und durch alle andern Punkte der Curve andererseits gerade Linien legt, diese Linien einen Kegel zweiten Grades bilden. Wählt man Spitze des Kegels einen unendlich entfernten Punkt der Curve (dieselbe nämlich mit mindestens zwei Aesten in das Unendliche hinaus), so wird der Kegel ein Cylinder, dessen Basis eine Curve zweiten Grades ist. Um Anschauung von der Gestalt einer solchen Curve dritten Grades zu bekommen, können wir uns dieselbe auf eine Cylinderfläche gezeichnet denken und die Cylinderfläche in die Ebene abgerollt.

Die ausgezogene Curve *ea b c f* der *Fig. 248* würde dann die Form der Horoptercurve darstellen. Man denke sich das Papier zu einem Cylinder mit kreis-




Fig. 248.

zylinder Basis zusammengerollt, so daß die Linien *gg* und *hh* aufeinander kommen. So würde die gezeichnete Curve die Form einer Curve dritten Grades annehmen. Die punktierte Curve bezeichnet die Schnittlinie einer Ebene (zum Beispiel der Visirebene) mit dem Cylinder. Von dieser Ebene wird die Horoptercurve dritten Grades in drei Punkten *a*, *b*, *c* geschnitten. An zwei Stellen verläßt die Curve in das Unendliche aus, indem sie sich asymptotisch den Linien *gg* oder der damit identischen *hh* nähert.

Betrachten wir die Curve dritten Grades als Horoptercurve, so muß durch die Mittelpunkte der Visirlinien beider Augen gehen. Es seien *a* und *f* die Orte der beiden Augen, *a* der Fixationspunkt. Dann fällt das Fixationszentrum der Curve, welches zwischen ihnen liegt, nämlich *b c* zwischen beide

Augen in das Innere des Kopfes und kann nicht als Theil des Horopters (wenigstens nicht nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, dem die oben gegebene Definition entspricht) angesehen werden, weil Punkte dieses Theils, wenn sie Strahlen aussenden und diese wirklich in beide Augen fallen könnten, sich auf den beiden äußeren, also nicht correspondirenden Netzhauthälften abbilden würden; wie denn überhaupt die ganze Bestimmung des Horopters für die den Augen sehr nahe gelegenen Raumpunkte, von denen sie nur breite Zerstreuungsbilder bilden können, alle praktische Bedeutung verliert. Der Horopter, als solcher, besteht dann also aus zwei vollkommen getrennten Zweigen, *eb* und *fc*, aus denjenigen beiden Stücken der Curve dritten Grades, welche zwischen den Augen und Unendlich liegen. Da es für die mathematische Behandlung bequemer ist, die Curve dritten Grades in ihrem ganzen Zusammenhang zu betrachten, wollen wir sie die Horoptercurve nennen und den Namen des Horopters oder Punkthoropters für diejenigen Stücke derselben bewahren, welche einfach gesehen werden. In der Horoptercurve schneiden sich also correspondirende Visirlinien, aber bald beide mit ihren vorderen Abschnitten, bald die eine nur mit der hinteren Verlängerung; wo das letztere geschieht, ist sie nicht Horopter.

Unter gewissen Bedingungen kann die Horoptercurve sich übrigens ihrer geraden Asymptotenlinie *gg* und der zu einer ebenen Curve zweiten Grades zusammengelegten Linie *ad* so weit nähern, daß sie mit ihnen zusammenfällt. Dann besteht die Horoptercurve also aus einer geraden Linie und einer ebenen Curve zweiten Grades, die sich in einem Punkte schneiden. Die beiden getrennten Zweige der Horoptercurve sind dann in diesem Schnittpunkte zusammengestoßen. Es geschieht dies, so oft die beiden Netzhauthorizonte gleiche, aber nach entgegengesetzten Seiten gekehrte Winkel mit der Visirebene bilden, während der Fixationspunkt in endlicher Entfernung liegt, und diese Bedingung ist bei Augen, deren Bewegungen dem LISTING'schen Gesetze folgen, wiederum erfüllt, wenn der Fixationspunkt entweder in der Medianebene des Kopfes, oder in der Primärlage der Visirebene liegt. Im ersten Falle liegt der Fixationspunkt auf der geraden Horopterlinie, im zweiten auf dem Kegelschnitt, der unter dieser Bedingung ein Kreis wird, J. MÜLLER's Horopterkreis. Und endlich wenn der Fixationspunkt sowohl in der Medianebene des Kopfes, als auch in der Primärlage der Visirebene 715 liegt, so schneiden sich in ihm die gerade Horopterlinie und der Kreis. Genauere Contructionsmethoden für die Lage der Horopterlinien werden unten mit der mathematischen Theorie des Horopters gegeben werden.

In einem einzigen Falle ist der Horopter eine Fläche, und zwar eine Ebene, wenn nämlich der Fixationspunkt in der Medianebene in unendlicher Entfernung liegt und die Netzhauthorizonte, wie es bei normalsichtigen Augen mindestens sehr angenähert zu sein pflegt, dabei in der Visirebene liegen. Diese Horopterebene ist dann der Visirebene parallel; ihre Entfernung von dieser hängt ab von der GröÙe der Divergenz der scheinbar verticalen Meridiane beider Sehfelder; sie geht nämlich durch die Schnittlinie der

nten beiden Meridianebenen und pflegt für normalsichtige Augen, die aus gegen den Horizont gerichtet sind, mit der Fußbodenebene des Beobachters nahehin zusammenzufallen, während sie bei kurzgen meist in größerer Entfernung liegt.

Die Entfernung der Mittelpunkte meiner Augen von einander ist 68 Millimeter, Höhe über dem Boden 1660. Legt man durch ihre Mittelpunkte und die Linie des Fußbodens Ebenen, so schneiden sich diese unter einem Winkel  $20^{\circ} 48''$ ; der Winkel zwischen meinen scheinbar verticalen Meridianen ist  $2^{\circ} 22'$ . Bei Herrn Dr. KNAPP, welcher normalsichtig ist, beträgt die Distanz 62,5, die Höhe der Augen über dem Boden 1627 Millimeter. Dies ist einem Winkel von  $2^{\circ} 14' 20''$ . Die Beobachtung ergab im Mittel . Bei Herrn Professor VOLKMANN, der schwach kurzsichtige Augen von der Distanz und nahehin derselben Höhe über dem Boden hat, wie ich selbst, Abweichung etwas größer, da der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Ebenen nur  $2^{\circ} 9'$  beträgt. Bei Herrn Dr. DASTICH ist die Augendistanz 62,8, Höhe über dem Boden 1640, der entsprechende Winkel würde  $2^{\circ} 11'$  sein; Divergenzwinkel der verticalen Meridiane war bei ihm größer  $2^{\circ} 33' 40''$ .

Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, daß in diesem Verhältniß und für die schiefe Lage der scheinbar verticalen Meridiane liegen. Wir sahen oben, daß das Augenmaas im monocularen Gesichtsfeld einen sicheren Anhaltspunkt für ihre Feststellung giebt, weil Winkel, deren Meridiane nicht übereinstimmende Richtung haben, nicht durch Deckung mit den Netzhautstellen verglichen werden können. Wenn wir nun beide Augen gebrauchen und sie auf weit entfernte Gegenstände richten, welche constante Resultate für die Vergleichung der Ausmessungen beider Augen geben, so haben wir oberhalb des Horizonts meist den Himmel, unterhalb den Fußboden, der nicht nur bestimmte Markpunkte in Menge darbietet, sondern dessen Beachtung im indirecten Sehen wesentlich wichtig ist, wenn wir vorwärts gehen. Daraus kann sich dann bei normalen Augen die Uebung bilden, die Bilder derjenigen Netzhautpunkte zu localisiren, auf welchen beim Gehen die gleichen Punkte des Bodens abgebildet werden. Kurzsichtige Augen, die den Fußboden nicht deutlich sehen, werden diesem Einflusse entzogen sein und ihre Identitätsverhältnisse mit nahen Gegenständen ausbilden müssen.

Wie erwähnt ist noch, daß wenn bei aufrechter Haltung des Körpers des Kopfes ein Punkt der Fußbodenlinie betrachtet wird, der auch in der Ebene des Kopfes liegt, zwar nicht die ganze Bodenebene Horopter 716 ist, doch die gerade Horopterlinie ganz in die Bodenfläche fällt.

Es scheinen übrigens auch Augen vorzukommen, bei denen die scheinbar verticalen Meridiane nicht ganz gerade sind, sondern in der Gegend des Scheitelpunktes eine schwache Knickung haben, so daß ihre oberen Hälften einen Winkel mit einander machen, als die unteren. Ein in diesen Beobachtungen sehr geübter Studirender beschrieb mir die

Erscheinungen in seinen Augen so. Da scheint dann der Einfluss des Fußbodens nur für die unteren Theile der Sehfelder (obere Netzhauthälften) sich geltend gemacht zu haben, während für die anderen Theile nicht das Bedürfnis gerade Linien als gerade zu sehen entscheidend war, sondern Beobachtungen an steiler stehenden Objectflächen ein selbständiges Identitätsverhältnis ausbildeten.

Die bisherigen Angaben bezogen sich auf den Horopter, als Ort von Punkten, welche einfach gesehen werden sollen. Wenn Linien einfach gesehen werden sollen, so ist nur nöthig, daß die Linien beider Netzhäute, auf denen sie abgebildet sind, Decklinien seien, ohne daß gerade Punkt für Punkt der Bilder correspondirt. Wenn ein zweites Bild einer Linie in Richtung der Linie selbst verschoben ist, kann es mit dem ersten doch noch in ganzer Länge sich decken. Dieser Fall wird namentlich an geraden Linien, die sich in sich selbst fortdauernd congruent verschieben können, vorkommen. Die Fläche, in welcher gerade Linien bestimmter Richtung liegen müssen, um in dieser Weise zwei correspondirende Bilder zu liefern, heißt ein Linienhoropter. Derselbe heißt Verticalhoropter für die Linien, die in den beiden Sehfeldern normal zu den Netzhauthorizonten erscheinen, Horizontalhoropter für die, welche den Netzhauthorizonten parallel erscheinen. Ein solcher Linienhoropter für Linien, deren Bilder in den Sehfeldern parallele Richtung haben, ist im Allgemeinen ein Hyperboloid mit einer Mantelfläche, was in besonderen Fällen in einen Cylinder oder Kegel übergehen kann. Der Linienhoropter für solche Systeme gerader Linien, die sich in einem Punkte der Horoptercurve schneiden, ist ein Kegel zweiten Grades, welcher den gemeinsamen Schnittpunkt mit den andern Punkten der Horoptercurve verbindet.


Überhaupt wird jede gerade Linie, welche durch zwei Punkte der Horoptercurve geht, einfach gesehen, und durch jeden binocular gesehenen Punkt des Raumes läßt sich mindestens eine einfach erscheinende gerade Linie legen. Diese letztere läßt sich folgendermaassen finden. Von dem betreffenden Punkte werden die Visirlinien nach beiden Augen gezogen; die eine sei bezeichnet mit  $a$ , die andere mit  $b'$ . Im ersten Auge giebt es eine Visirlinie  $b$ , die mit  $b'$  correspondirt, und im zweiten Auge eine solche  $a'$ , die mit  $a$  correspondirt. Man lege eine Ebene durch  $a$  und  $b$ , eine zweite durch  $a'$  und  $b'$ ; die Linie, in der beide Ebenen sich schneiden, ist die gesuchte einfach gesehene Linie.

Ich lasse hier noch die Beschreibung der Constructionen folgen, mittels deren man in den beiden oben erwähnten einfacheren Fällen die Lage des Vertical- und Horizontalhoropters und damit auch die Lage der Horoptercurve finden kann, unter der Voraussetzung, daß die Augen des Beobachters dem Bewegungsgesetze von LISTING folgen und in der Primärstellung keine merkliche Abweichung der Netzhauthorizonte von der Visirebene haben.

A. Fixationspunkt in der Medianebene. Der Verticalhoropter ist ein Kegel, der Horizontalhoropter besteht aus zwei sich schneidenden

Ebenen, die Horoptercurve aus einer geraden Linie und einem ebenen Kegelschnitt.

In *Fig. 249* falle die Ebene der Zeichnung zusammen mit der Medianebene des Kopfes des stehenden Beobachters, und die Haltung des Kopfes sei so, daß die Primärlage der Blicklinien horizontal und parallel  $Ao$  in die Ferne gerichtet sei. Der Punkt  $o$  sei der zwischen den Mittelpunkten der Visirlinie beider Augen mitten inne gelegene Punkt. Man errichte in  $o$  das Loth  $oa$  auf der Linie  $oA$  und mache es so lang, daß sich in seinem tiefsten Punkte  $a$  die scheinbar verticalen Äquatorialaxen der Augen, wie sie in der Primärlage der Blicklinien gestellt sind, schneiden. Eine horizontal durch  $a$  gelegte Ebene, die durch  $DE$  geht, ist dann der Horopter für die Sehrichtung  $oA$ . Diese Ebene fällt, wie bemerkt, bei normalsichtigen Augen nahehin mit der Fußbodenfläche zusammen.



*Fig. 249.*

Nun werde  $B$  Fixationspunkt, welcher Punkt in der Ebene der Zeichnung, das heißt in der Medianebene des Kopfes des Beobachters angenommen wird.  $Bo$  ist die Schnittlinie der Visirebene mit der Medianebene. In der Visirebene denken wir uns den MÜLLER'schen Kreis construiert, der durch  $B$  und die Centra der Visirlinien beider Augen geht; sein medianer Durchmesser sei  $Bp$ . Man errichte auf  $Bp$  das Loth  $pb$ , in welchem die Spitze des Verticalhoropterkegels liegt.

Um den Ort dieser Spitze zu finden, nehmen wir einen dritten Fixationspunkt zu Hilfe  $C$ , der so gewählt ist, daß wenn wir unter  $o'$  das Centrum der Visirlinien des einen oder andern Auges verstehen, welcher Punkt also etwas vor oder hinter der Ebene der Zeichnung in einem in  $o$  errichteten Perpendikel liegen müßte, dann die Linie  $Co'$  den Winkel  $Ao'B$  halbirt.

Die Visirebene für den Fixationspunkt  $C$  ist dann die eine Ebene des Horizontalhoropters für den Fixationspunkt  $B$ . Die zweite Ebene des Horizontal-

718 horopters ist die Medianebene. Construiert man in der Visirebene für  $C$  den MÜLLER'schen Kreis, das heißt einen Kreis, der durch den Fixationspunkt und die beiden Centra der Visirlinien geht, und dessen Durchmesser  $Cq$  sein möge, so werden einfach gesehen 1. alle geraden Linien überhaupt, welche in der Ebene  $Coo'$  liegen, 2. alle geraden Linien in der Medianebene, welche durch den Punkt  $q$  gehen. Bei den letzteren aber freilich correspondirt das Bild ihres entfernteren Endes im einen Auge mit dem Bilde des näheren Endes im andern.

Man errichte in  $q$  ein Loth auf  $Cq$ , welches die Linie  $DE$  in  $c$  schneidet, dann ist  $Bc$  die gerade Horopterlinie und der Punkt  $f$ , in welchem sich  $Bc$  und  $pb$  schneiden, ist die Spitze des Verticalhoropterkegels, welcher übrigens durch den MÜLLER'schen Kreis vom Durchmesser  $Bp$  in der Visirebene des Beobachters geht, und dadurch gegeben ist.

Während also die eine Linie des Punkthoropters die Gerade  $Bf$  ist, ist die zweite diejenige Ellipse, in welcher der Kegel die Ebene  $Coo'$  schneidet.

Der Schnitt  $Bp$  des Kegels ist kreisförmig und steht rechtwinkelig auf der Kante  $pf$  des Kegels; ein Schnitt, der auf der diametral gegenüber liegenden Kante  $Bf$  senkrecht steht und die Medianebene in  $Go$  schneiden mag, muß ebenfalls kreisförmig sein. Die durch die Mittelpunkte der Augen gelegten Schnitte des Kegels, welche zwischen  $Bo$  und  $Go$  hineinfallen, müssen Ellipsen mit längerer Queraxe sein. Die Schnitte, welche außerhalb des Winkels  $BoG$  fallen, wie  $Co$ , müssen Ellipsen mit längerer medianer Axe sein, beziehlich Parabeln oder Hyperbeln, wenn sie die Linie  $Bf$  erst jenseits  $f$  schneiden sollten.

B. Der Fixationspunkt in der Primärlage der Blickebene. Der Verticalhoropter ist in diesem Falle ein Hyperboloid, welches die Visirebene in einem Kreise (MÜLLER'schen Horopterkreise) schneidet, der durch den Fixationspunkt und die beiden Centra der Visirlinien geht. Der Horizontal-

horopter besteht aus zwei Ebenen, von denen die eine die Visirebene, die andere normal dazu ist. Die Horoptercurve besteht aus dem MÜLLER'schen Kreise und einer geraden Linie.




Fig. 250.

Es seien in Fig. 250  $a$  und  $b$  die Centra der Visirlinien für beide Augen,  $c$  der fixirte Punkt, so ist der durch  $abc$  gelegte Kreis der MÜLLER'sche Horopterkreis und ein Theil der Horoptercurve. Es sei ferner  $fg$  die Medianlinie der Visirebene, so schneidet die gerade Horopterlinie den Kreis in  $f$ , also seitlich vom Fixationspunkte. Man ziehe den Durchmesser  $cd$  und die Linie  $fd$ . In letzterer

te man eine Ebene normal zur Ebene des Kreises; diese ist die zweite Ebene des Horizontalhoropters. Alle geraden Linien, die in dieser Ebene liegen und durch den Punkt  $d$  gehen, werden einfach gesehen; andererseits werden alle geraden Linien, die in der Visirebene liegen.

Um die gerade Horopterlinie vollständig zu construiren, schneide man  $dh$  die Länge  $fh = fa$  ab, errichte in  $h$  ein Loth auf der Visirebene; dieses schneidet die Fußbodenfläche, das heißt die unendliche Horopterlinie für die Primärlagen der Blicklinien, in demselben Punkte wie die gerade Horopterlinie, und dadurch ist letztere zu finden.

Wenn die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane gleich Null wird, wird die gerade Horopterlinie senkrecht zur Ebene des Kreises.

Empirisch kann man die Richtung des Linienhoropters finden, wenn man einen glänzenden geraden Draht oder einen weißen gespannten Faden vor dem Grunde so richtet, daß man ihn durch zwei verschiedenfarbige Gläser einfach sieht, oder besser so, daß man bei etwas vermehrter oder verminderter Convergenz der Augen ihn in parallelen Doppelbildern erblickt. Man kann zum Beispiel einen senkrechten Draht nahe vor die Augen in der Visirebene des Kopfes und fixirt seine Mitte bei horizontaler Blickrichtung, so daß man findet, daß sein oberes Ende im rechten Auge etwas nach rechts und im linken nach rechts hinüber geneigt erscheint. Fixirt man einen Punkt, der nahe hinter der Mitte des Drahtes liegt, so erscheint dieser in zwei oben divergirenden gekreuzten Doppelbildern; fixirt man einen Punkt, der nahe unten liegt, so erscheint der Draht in zwei unten divergirenden un- gekreuzten Doppelbildern. Um den Draht durch zwei farbige Gläser genau zu sehen, muß man das obere Ende etwas vom Beobachter entfernen. Es wurde diese Erfahrung zuerst von BAUM beobachtet und von MEISSNER, wie früher erwähnt, zur Untersuchung der Raddrehungen der Augen benutzt. Sowie durch Raddrehung der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Meridianen verändert wird, muß auch die Neigung des Drahtes gegen die Visirebene geändert werden, wenn er einfach erscheinen soll. Je entfernter der Fixationspunkt und je mehr die Blickebene gehoben ist, desto stärker muß der Draht gegen diese Ebene geneigt werden. Bei gesenkter Blickebene und nahem Fixationspunkte dagegen kann er senkrecht gegen die Visirebene, oder sogar mit seinem oberen Ende dem Beobachter zugeneigt

Nachdem wir in solcher Weise bestimmt haben, welche Dimensionen in den Sehfeldern als gleich und ungleich erscheinen, haben wir noch die Aufgabe, die Richtigkeit dieser Vergleichung der Sehfelder zu untersuchen. Diese Aufgabe ist, wie schon im vorigen Paragraphen erörtert wurde, sehr wichtig, denn es sich wie beim gewöhnlichen Gebrauche der Augen darum, die Verschiedenheiten der Tiefendimensionen der gesehenen Objecte zu vergleichen. Die Vergleichung ist dagegen verhältnißmäßig ungenau und ist leicht Täuschungen unterworfen, wenn es sich darum handelt, Doppel-



bilder zu erkennen, oder die Lage der Bilder in den beiden Sehfeldern zu vergleichen. Obgleich das letztere der einfachere Vorgang zu sein scheinen könnte, während die Beurtheilung des stereoskopischen Reliefs mannigfache Erfahrungsmomente zu Hülfe nehmen muß, so ist die letztere doch um so besser eingeübt, weil sie von der hervorragendsten praktischen Wichtigkeit ist, während die Wahrnehmung der Doppelbilder und ihrer Lage gegen einander nur die Erscheinung der Objecte, nicht diese selbst betrifft. Ebenso  
 730 vergleichen wir die wirklichen Dimensionen zweier verschieden entfernter Objecte viel sicherer, als die Gesichtswinkel, unter denen sie erscheinen, obgleich die letzteren unmittelbar gleichen oder ungleichen Netzhautstrecken entsprechen, während bei ersterer Vergleichung eine lange Einübung durch Erfahrung nothwendig ist, um den Einfluß der Entfernung auf die Größe der Netzhautbilder desselben Objects kennen zu lernen. .

Was zunächst die Beurtheilung der Tiefendimensionen mittels des binocularen Sehens betrifft, so geschieht diese am genauesten bei denjenigen Objecten, welche im Horopter liegen und genau einfach gesehen werden, gewisse oben schon erwähnte Täuschungen ausgenommen, die von mangelhafter Schätzung der Convergenz der Gesichtslinien herrühren. Weniger genau ist dieselbe für Objectpunkte die sich zwar vom Horopter entfernen, aber noch nicht so weit, daß die entstehenden Doppelbilder als solche wahrgenommen würden, am geringsten endlich bei Objecten, welche in deutlich getrennten Doppelbildern erscheinen, um so geringer, je weiter diese auseinander treten.

Ich habe schon früher<sup>1</sup> darauf aufmerksam gemacht, und dasselbe ist durch E. HERING<sup>2</sup> bestätigt worden, daß die Doppelbilder keineswegs, wie es die ältere Annahme war, in der gleichen Entfernung wie das fixirte Object erscheinen und etwa auf eine imaginäre Horopterfläche, die durch den Fixationspunkt gehen sollte, projecirt würden. Sondern die Doppelbilder erscheinen nahehin in der richtigen Entfernung, wo sich das entsprechende Object befindet. Man kann sich davon durch einfache Versuche leicht überzeugen. Man fixire ganz fest und ohne die Augen zu verwenden einen Punkt der Wand in der Entfernung von einigen Fuß und halte dabei ein Blatt steifen Papiers so vor den unteren Theil des Gesichts, daß sein oberer Rand einige Zoll vor den Augen und ungefähr in derselben Höhe liegt. Der Papierschirm verdeckt in dieser Stellung alle Gegenstände, die vor dem Beobachter unterhalb seiner Visirebene liegen. Nun lasse man von einem seitlich stehenden Gehilfen eine Stricknadel von unten her in einer beliebig von ihm gewählten Entfernung so in die Höhe schieben, daß ihr oberes Ende dem Beobachter sichtbar, und zwar, wenn dieser gut und sicher fixirt, von Anfang an nur in Doppelbildern sichtbar wird. Sogleich wird der Beobachter eine Vorstellung von der Entfernung des Drahtes erhalten, auch wenn er nicht ein einziges Mal seinen Fixationspunkt verlassen und die

<sup>1</sup> v. HELMHOLTZ, *Archiv für Ophthalmologie*. X. 1, S. 27.

<sup>2</sup> HERING, *Beiträge zur Physiologie*, Heft 5, S. 335.

el einfach gesehen hat. Zur Probe versuche er nach dem verdeckten le derselben zu greifen, so daß ihm seine Hand auch durchaus verdeckt t. Er wird den Draht gleich beim ersten Versuche treffen, oder gstens ganz nahe daran vorbeifahren. Damit der Beobachter hierbei Urtheil aus der scheinbaren Dicke des Drahtes auf seine Entfernung , was freilich kaum zu fürchten ist, lasse er den Gehilfen aus einem ath verschieden dicker Nadeln eine beliebige wählen.

Auch bei den Versuchen mit beweglichen stereoskopischen Objecten, ie scheinbar ihre Entfernung vom Beobachter ändern, wie bei dem oben, 8 beschriebenen Instrument von HALSKE, kommen oft deutlich getrennte elbilder zum Vorschein, namentlich bei schneller Bewegung, der die 721 linien nicht schnell genug folgen können, wodurch aber die Täuschung die scheinbare Tiefenbewegung durchaus nicht gehindert wird.

Nur bei sehr weit getrennten Doppelbildern, wie sie namentlich von entfernten Objecten sich bilden, wenn ein naher Gegenstand fixirt wird, an denen kaum noch die Zusammengehörigkeit beider Bilder erkannt hört die binoculare Tiefenwahrnehmung auf und es kann dann wie beim ularen Sehen die Winkelgröße des entfernten Objects mit der Winkel- des fixirten verglichen werden. Von dem fixirten Objecte kennt man die wahre lineare Größe, und diese wird dann unwillkürlich der Maafs- uch für das Bild des entfernteren Objects. Wendet man sich also zum el gegen die Häuser jenseits der Strafe und fixirt den vorgehaltenen ; so werden die in weit getrennten Doppelbildern sichtbaren Häuser bar größer, wenn man den Finger entfernt, kleiner, wenn man ihn . Im ersten Falle nimmt die Winkelgröße des Fingers ab; relativ zu ird die Winkelgröße der Häuser also größer, und wir brauchen den als constanten Maafsstab, da dessen lineare Größe und Entfernung iernd deutlich wahrgenommen wird, die der entfernten Häuser aber nicht. ie nun bei solchen weit von einander getrennten Doppelbildern die nende Unsicherheit der binocularen Tiefenwahrnehmung leicht auffällt, st sich andererseits auch für die ganz und beinahe einfach gesehenen e nachweisen, daß ihr Relief desto genauer erkannt wird, je weniger vom Horopter entfernen, — abgesehen immer von den oben erwähnten ernen Täuschungen.

m dies für die gerade Horopterlinie zu zeigen, nehme man eine dünne Stricknadel und biege sie in der Mitte ganz wenig, so daß ihre Hälften einen Winkel von etwa  $175^\circ$  mit einander machen. Man ie dann vor sich, so daß beide Schenkel dieses Winkels in der Median- des Kopfes liegen, wobei sie für ein Auge, was sich auf dem Nasen- des Beobachters befände, ganz gerade erscheinen würde, und auch es der wirklichen Augen die schwache Biegung, in starker perspecti- Verkürzung gesehen, ganz unmerklich wird. Doch erkennt man liesen Umständen, mit beiden Augen zugleich sehend, die Knickung del, vorausgesetzt daß diese ungefähr die Richtung der geraden

Horopterlinie hat, und also bei Fixation eines entfernteren oder etwas näheren Punktes in merklich parallelen Doppelbildern erscheint. Man erkennt die Knickung der Nadel aber nicht, wenn man derselben eine andere Richtung in der Medianebene giebt, wobei sie einen erheblichen Winkel mit der geraden Horopterlinie macht.

Für den MÜLLER'schen Horopterkreis habe ich den Versuch in folgender Weise eingerichtet: Auf einen Tisch, nahe über dessen Rande sich meine Augen befanden, legte ich neben einander zwei Brettchen. In das eine wurden neben einander, etwa ein Centimeter von einander entfernt, zwei feine lange Stecknadeln festgesteckt, in das zweite Hölzchen eine Nadel derselben Art. Die Hölzchen wurden so neben einander gelegt, daß die drei Nadeln sich etwa gleich weit vom Beobachter befanden, die beiden äußeren gleich weit 722 von der mittleren entfernt. Ein passender Schirm bewirkte, daß ich nur die Köpfe und den oberen Theil der drei Nadeln sehen konnte, die etwa 50 Centimeter von meinen Augen entfernt waren. Ich untersuchte nun, wie weit ich die seitliche Nadel nach vorn oder hinten verschieben konnte, ehe ich merkte, daß die drei Nadeln nicht mehr in einer Ebene, sondern in einem Bogen standen. Wenn die Verschiebung auch nur eine halbe Nadel-dicke, also etwa ein Viertel Millimeter betrug, merkte ich es schon. Der Winkelunterschied in der Stellung der mittleren Nadel im Verhältniß zu den beiden äußeren betrug hierbei nur 21 Secunden. Um aber eine so große Genauigkeit zu erreichen, mußte die Richtung der Nadelreihe der Richtung entsprechen, die der Horopterkreis an dem betreffenden Orte hatte. Wenn die Nadeln also gerade vor mir, die mittlere in der Medianebene meines Kopfes und die rechte und linke gleich weit von mir entfernt waren, so urtheilte ich mit großer Genauigkeit, ob sie in einer Ebene standen. Befand sich aber die rechte Nadel etwas näher zu mir, die linke ferner, so war ich weit weniger sicher in der Entscheidung, ob sie in einer geraden Linie oder in einem Bogen standen. Befand sich die mittlere Nadel dagegen rechts seitwärts von der Mittelebene meines Kopfes, wo die Richtung des Horopterkreises sich nach rechts hin dem Beobachter nähert, so mußte auch die rechte Nadel mir etwas näher stehen, als die linke, wenn ich die größte Sicherheit in der Beurtheilung des Reliefs der Nadelreihen haben sollte. War die Reihe der Nadeln bei dieser Stellung senkrecht gegen die Blickrichtung, so war die Wahrnehmung, ob sie einen Bogen oder eine gerade Linie bildeten, merklich schwieriger. Am günstigsten war es also immer, wenn die Richtung der Nadelreihe der Richtung der Tangente des Horopterkreises entsprach.<sup>1</sup>

Es ist bei diesem Versuche zu bemerken, daß man die Nadeln nicht zu weit auseinander rücken darf, weil sonst die erwähnte Täuschung eintritt, vermöge deren wir einen gegen uns concaven horizontalen Bogen für gerade zu halten geneigt sind. Bei den oben angegebenen Entfernungen der Nadeln

<sup>1</sup> Der Sinn dieses Versuchs ist von Herrn E. HERING in seiner Kritik gänzlich mißverstanden worden.

le die Tiefe des Bogens, der als gerade Linie erscheint, für die meisten en weniger als 0,1 Millimeter betragen, also viel kleiner sein als die mehmbaren Verrückungen.<sup>1</sup> Und auch bei solchen gröfseren Entfernungen Nadeln, wo die Täuschung sichtbar werden sollte, wird man finden, dafs Spielraum zwischen den Verschiebungen, welche einen anscheinend con- n und convexen Bogen vortäuschen, sehr viel kleiner ist, wenn die Reihe Nadeln der Richtung des Horopterkreises sich anschliesst, als wenn sie ihr einen Winkel bildet.

Wenn wir geradeaus nach einem Punkt des Horizonts blicken, ist der pter eine unterhalb der Visirebene liegende horizontale Ebene, welche normalsichtigen Augen meist ganz oder nahehin mit der Fußbodenfläche stehenden Beobachters zusammenzufallen scheint. Wenn wir einen Punkt r Medianlinie der Fußbodenebene fixiren, so ist zwar nicht die ganze e Horopter, aber die gerade Horopterlinie liegt auch dann doch ganz 723 r Fußbodenebene. An der Fußbodenebene beobachte ich nun ent- nende Erscheinungen, welche schliessen lassen, dafs auch in diesem Falle urtheilung des Reliefs der Fußbodenebene besonders genau ist, weil oropterfläche ist. Um dies zu prüfen, betrachte man, auf ebenem Felde nd, zunächst das Relief der Bodenfläche in gewöhnlicher Weise. Man diese Fläche mit ihren kleinen Wölbungen und Senkungen deutlich ntal bis in ziemlich grofse Entfernungen. Nun sehe man nach derselben e entweder mit seitwärts geneigtem Kopfe unter dem Arme durch, mit abwärts geneigtem Kopfe zwischen den Beinen, wobei man aber nen Stein oder Erdhügel steigt, so dafs die Höhe des Kopfes über der ntalen Fläche nicht merklich geändert wird. Man wird nun die fernerer : der Bodenfläche nicht mehr horizontal, sondern wie eine auf die elsfäche gemalte Wand sehen. Ich habe viele solche Beobachtungen er von Heidelberg nach Mannheim führenden Strafse angestellt. Vor g hinter einer Reihe von Feldern der Neckar, der einen Einschnitt in bene Terrain macht, jenseits wieder ebenes Land, welches sich etwa leile weit bis an den Ölberg bei Schriesheim ausdehnt. Bei aufrechter g des Kopfes erkannte ich vollkommen gut die weitgedehnte Ebene s des Flusses; bei schräger oder verkehrter Haltung schien das Terrain lusse aus unmittelbar zu dem Ölberg in die Höhe zu steigen. Eine die durch ein Stück Feld von einem dahinter liegenden Hause getrennt ras ebenfalls bei aufrechtem Kopfe deutlich zu sehen war, schien bei r Haltung ganz nahe vor dem Hause zu liegen, und so weiter. Auch inen Unebenheiten der Strafse waren mir bei natürlicher Kopfhaltung astischer.

le diese Erscheinungen treten ebenso ein, wenn man, statt den Kopf ehen, das Bild umkehrt. Am vortheilhaftesten sind dazu rechtwinkelige

<sup>1</sup> Ich in meiner früheren Arbeit angegeben habe: ein Bogen, dessen Krümmung etwa der des reises entspricht, erscheine gerade, beruhte auf Messungen bei zu kleinen Distanzen der ler Bogen ist in der That beträchtlich flacher, als der des Horopterkreises.

Prismen zu verwenden mit horizontal liegender Hypotenusenfläche, durch welche man, wie oben Seite 634 erörtert ist, die vorliegenden Gegenstände verkehrt sieht. Ich klebte zwei solche Prismen in der Entfernung meiser beiden Augen von einander entfernt, auf ein ebenes Brettchen und beobachtete durch sie die Landschaft. Das stereoskopische Relief der Bodenfläche schwand hierbei ebenso, wie beim Sehen zwischen den Füßen durch. Andererseits sieht man durch sie zuweilen das Relief niedrig liegender Wolken besser als mit bloßen Augen, weil die Wolken, durch die Prismen gesehen, in Richtung des Fußbodens zu liegen kommen.

Wenn man endlich mit verkehrtem Kopfe zwischen den Beinen hindurch und gleichzeitig durch die umkehrenden Prismen die Landschaft betrachtet, so hat man wieder das deutliche Relief der Bodenfläche wie beim natürlichen Sehen. In diesem Falle ist das Spiegelbild der Bodenfläche wieder im Horopter der umgekehrten Augen. Dieser letzte Versuch zeigt, daß nicht die ungewöhnliche Stellung des Kopfes an sich, noch die ungewohnte Richtung des Bildes an der mangelhaften Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung Schuld sind, sondern die verkehrte Lage des Bildes gegen die Augen.

724 Hiermit stimmt es ferner überein, daß Herr E. HERING,<sup>1</sup> dessen Augen eine sehr geringe Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane haben, erklärt, daß er die ferneren Theile der Fußbodenfläche mit zwei Augen nicht anders als bei monocularer Betrachtung sehe.

Wie wesentlich die richtige Wahrnehmung des Reliefs der Bodenfläche beim Gehen ist, ist ersichtlich. Meistens gehen wir vorwärts, ohne die Bodenfläche direct anzusehen, und bleiben doch genügend unterrichtet über die kleinen Unebenheiten ihrer Form. Wie sehr selbst eine ganz kleine scheinbare Verschiebung des Bildes der Bodenfläche stören kann, habe ich neuerdings noch vielfältig erfahren. Wegen eines geringen Grades von Kurzsichtigkeit trug ich bei einer Gebirgsreise eine Conca Brillle (Nasenklemmer) mit ganz schwachen Gläsern (36 Zoll Brennweite), um die Fernsichten besser zu sehen. Die Gläser habe ich so abschleifen lassen, daß ihre optischen Centra gleich weit von einander stehen, wie meine Augen, so daß ferne Objecte, durch die Centra der Brille gesehen, keine sichtliche Tiefenverschiebung erleiden, wie dies geschieht, wenn die Centra der Gläser einander zu nahe stehen. Dennoch ist eine kleine Verschiebung der durch die unteren Theile der Gläser gesehenen Objecte da, weil die Axen der beiden Gläser durch die sie verbindende Feder nicht ganz genau parallel gehalten werden, und wenn ich genau auf den Fußboden achte, so scheint dieser dicht vor meinen Füßen eine kleine ansteigende Wölbung zu haben, die von einer falschen stereoskopischen Wirkung der Gläser herrührt. Obgleich dies so schwach ist, daß es nur bei aufmerksamer Betrachtung bemerkt werden kann, macht mir dieser Umstand es unmöglich, die Brille zu gebrauchen, wenn ich schnell steile steinige Gebirgswege hinabgehen will, wo es nöthig ist, den Fuß ganz

<sup>1</sup> E. HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Heft 5, S. 355. Daß mir die Fußbodenfläche nicht, wie er aus seiner Theorie schließt, als eine verticale Ebene erscheint, brauche ich wohl kaum zu versichern.

zu setzen, und die Zeit fehlt, jeden Stein, auf den man treten will, zu betrachten und seine Entfernung zu schätzen. Trotzdem ich durch die Steine etwas scharfer sehe, als mit bloßen Augen, gehe ich ohne die Brille. Es war mir dies ein auffallender Beweis für die Genauigkeit und Schnelligkeit, mit der die eingeübte Association zwischen Empfindungen und Bewegungen eintritt.

Mit der Veränderung des Reliefs bei veränderter Kopfhaltung scheint auch die scheinbare Veränderung der Farben der Landschaft zusammenzugehen, die dabei eintritt. So lange wir ihre Tiefendimensionen deutlich erkennen, sind die Veränderungen der Farben der Objecte durch die eingelagerte Luft die natürlichen und gewohnten Attribute der Ferne, die daher nicht als solche auffallen. Sobald wir aber die Wirkung des Scheiters zerstören durch Umkehrung des Kopfes oder Umkehrung des Bildes der Landschaft als ebenes Bild sehen, so wird unsere Aufmerksamkeit auf die Farben hingelenkt. Auch bei monocularer Betrachtung der Landschaft ist noch ein geringer Unterschied da, wenn man erst aufrecht und unter dem Arme durchsieht, der mir davon herzurühren scheint, daß der obere Theil der Netzhaut gegen das Grün des Bodens, der untere gegen das Blau des Himmels ermüdet ist, und deshalb die Farben etwas lebhafter erscheinen, wenn sie auf neue Stellen der Netzhaut fallen. Aber dieses eigen- 725  
liche Heraustreten der Lufttöne an den fernen Objecten finde ich nur bei monocularer Betrachtung recht deutlich. Auch hierfür ist es charakteristisch, daß Herr HERING seiner Versicherung nach monoculare und binoculare Betrachtung keinen Unterschied macht.

Der Grund dieser besonderen Genauigkeit des Reliefs im Horopter ist, nach E. HERING annimmt, in dem psychophysischen Gesetze von FECHNER zu finden. Für Gegenstände im Horopter sind die scheinbaren Entfernungen von den Fixationspunkten gleich; die kleinsten Abweichungen von der Gleichheit des Verhältnisses erkennen wir leicht und genau. Einer solchen entspricht eine Abweichung des betreffenden Objectpunkts vom Horopter. Wenn man die Form von Objecten beurtheilt werden soll, welche nicht im Horopter liegen, so kommt es auf die Verhältnisse zwischen den Distanzen der Doppelbilder ihrer verschiedenen Punkte an und nicht mehr bloß auf die Intensität eines Unterschiedes zwischen beiden Bildern. Correspondirende Punkte sind nach unserer Ansicht solche, deren gegenseitige Lage am häufigsten verglichen worden ist, nach der anatomischen Erfahrung solche, welche einen natürlichen Zusammenhang in ihrer Localisation haben. Durch beide Voraussetzungen erklärt es sich, daß die Vergleiche correspondirender oder nahehin correspondirender Netzhautbilder sich geschehn und sicherer geschieht als die von disparaten.

Man pflegt deshalb auch unwillkürlich Objecte, die wir genau und richtig sehen wollen, möglichst in den Horopter zu bringen. Wenn man in der bequemsten Haltung des Buches, in dem man liest, schwache, nahe Doppelbilder der verticalen Linien bildet, findet man sie einander

parallel, die verticale Horopterlinie fällt also in die Ebene des Papiers. Für solche Augen, die der Betrachtung ferner Objecte angepasst sind, stehen dann allerdings die horizontalen Linien des Papiers nicht im Horopter. Es mag das der Grund sein, warum in der Form der europäischen Buchstaben verticale Linien so auffallend bevorzugt sind gegen die horizontalen.

Die zweite Art der Vergleichung der beiderseitigen Sehfelder ist die, wobei wir die scheinbare Vertheilung der Objecte im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beachten und die Doppelbilder wahrzunehmen suchen. Ich habe schon oben angeführt, daß die Erkennung der Doppelbilder im Allgemeinen nur in der Mitte der Sehfelder gut geschieht und in deren peripherischen Theilen sehr grobe Ungenauigkeiten zeigt. Der wichtigste Umstand aber, welcher die Wahrnehmungen der verschiedenen Lage zweier Halbbilder eines und desselben Objects verhindert, ist die Vorstellung von der Einheit dieses ihres Objects. Wenn, wie wir wahrscheinlich zu machen gesucht haben, die Abmessungen der Sehfelder auf einer eingeübten Schätzung durch das Augenmaafs beruhen, so beruht auch die Wahrnehmung der Doppelbilder auf Augenmaafs und kann wie alle Schätzungen durch Augenmaafs außerordentlich weit irre geführt werden durch allerlei psychische Einflüsse, namentlich durch solche, welche uns die, sei es wahre, sei es falsche Vorstellung aufdrängen, daß die beiden Bilder einem und demselben Objecte angehören. Am schwersten bemerken wir daher die Verschiedenheit  
726 der beiden Bilder wirklicher körperlicher Objecte, wenn dieselbe nicht sehr groß und auffallend ist; daher denn auch die meisten Laien das Phänomen der Doppelbilder gar nicht kennen, obgleich sie solche fast fortdauernd in ihrem Gesichtsfelde gehabt haben müssen. Schwer trennen wir auch Doppelbilder von Linien gleicher Färbung und Helligkeit, wenn dieselben so gezogen sind, daß ihre Deutung als Bilder einer und derselben objectiven Linie sehr nahe liegt. Am meisten erschwert aber wird die Wahrnehmung der Doppelbilder durch die Augenbewegungen. Bei der Betrachtung eines Objectes fixiren wir nach einander verschiedene Punkte seiner Oberfläche, sodaß die Netzhautgruben fortdauernd von correspondirenden Bildern getroffen werden. Diese Theile der Bilder werden zugleich am deutlichsten wahrgenommen und fesseln unsere Aufmerksamkeit am meisten. So wie unsere Aufmerksamkeit sich einem seitlich gelegenen Punkte des Objects zuzuwenden beginnt, welcher vielleicht in Doppelbildern erscheint, so gleiten unsere Augen fast unwillkürlich zu seiner Fixation über, was wir nur durch besonders dahin gerichtete Aufmerksamkeit und Willensanstrengung hindern können.

Will man also Doppelbilder möglichst gut erkennen, so muß man erstens Augenbewegungen vermeiden und einen bestimmten, wohl bezeichneten Fixationspunkt festhalten. Zweitens ist es vortheilhaft, den zu unterscheidenden Bildern verschiedene Farbe oder Helligkeit zu geben, was ihre Deutung als Bilder desselben Objects erschwert oder unmöglich macht. Drittens kann man oft allerlei andere Ungleichheiten der Bilder durch theilweise Verdeckung, durch Hinzufügung ungleicher Merkzeichen hervorbringen, um die



merksamkeit des Beobachters auf ihre Verschiedenheit hinzulenken, und so die Unterscheidung der Doppelbilder zu einer ziemlich grossen Zeit treiben.

Methoden, mittels deren man den genannten Schwierigkeiten aus dem Wege gehen und möglichst genaue Vergleichen der scheinbar gleichenden Sehfeldern erhalten kann, sind oben bei der Aufzeichnung die Lage der correspondirenden Punkte und Linien zu suchen, beschrieben worden. Aber auch wenn man die besten Methoden anwendet, ist die Vergleichung correspondirender Raumgrößen der beiden Gesichtsfelder doch unvollkommener, als die entsprechender Raumgrößen in demselben

Um bestimmte Zahlen hierfür zu gewinnen, sind die oben beschriebenen Methoden von VOLKMANN sehr geeignet. Bei denen, welche nach dem Schema Fig. 245 angestellt und auf Seite 853 beschrieben sind, verglich er die Abstände zwischen je zwei Paaren von Horizontallinien, von denen ein Paar im rechten Sehfelde rechts von der Mittellinie, das andere im linken Sehfelde links von der Mittellinie lag. Im gemeinschaftlichen Sehfelde schienen beide Paare in der Mittellinie zusammenzustossen. Ein Paar der Linien hatte einen festen Abstand von 5,5 Millimeter voneinander. Im Mittel von je 30 Beobachtungen solcher Art, wobei VOLKMANN den Abstand des zweiten beweglichen Paares dem des andern gleich zu machen versuchte, gewann er zwar sehr gut stimmende Mittelwerte, die nur um 0,01 und 0,03 Millimeter von dem richtigen Werthe abwichen. Sieht man aber die einzelnen Beobachtungen an, so findet man, dass in der ersten Reihe (bewegliche Horizontale rechts) einmal den Abstand 6,0, und dann wieder 5,0 mit 5,5 für identisch hielt, und in der zweiten Reihe kommt wieder 5,0 und 5,85 unter den Einzelbeobachtungen vor, während in den anderen Reihen, wo die Linien vertical gezogen waren, kommt 4,75 vor als gleich mit 5,2, und dann wieder 5,55 und 4,85 als gleich mit 5,2. 727

Es würde nun allerdings ganz unmöglich sein, wenn man die beiden Sehfelder in demselben Sehfelde neben einander liegend und an einander anschauen erblickte, so grosse Fehler zu machen. Die Schwierigkeit bei der binocularen Vergleichung scheint mir hauptsächlich ihren Grund darin zu haben, dass die Fixation schwer ganz fest gehalten wird, und die beiden Sehfelder deshalb fortdauernde kleine Schwankungen in Bezug auf die Art, wie sie sich decken, zu machen pflegen. Um dies zu prüfen, habe ich auf ein Blatt zwei parallele Linien in 5,5 Millimeter Abstand gezeichnet, die zum Rande reichen, auf einem zweiten zwei schwach convergirende Linien, die an einem Ende 4,5, am andern 6,5 Millimeter von einander entfernt sind. Ich lege nun das erste Blatt auf das zweite gelegt, so dass das convergirende Linienpaar zum Theil sichtbar bleibt und als Fortsetzung des parallelen Paares erscheint. Während ich nun das obere Blatt fortdauernd ein wenig hin- und herbewegte und dadurch die Schwankungen der Sehfelder nach-

machte, suchte ich mit einem Auge zu ermitteln, ob die convergirenden Linien, wo sie am Rande des Papierblatts hervorkommen, gleich weit von einander abstanden, wie die parallelen. Hierbei wurden also beide Linienpaare in demselben Gesichtsfelde gesehen und durch die Bewegungen des einen Paares das Schwanken der Augenaxen bei der binocularen Betrachtung nachgemacht. Andererseits konnte ich das convergente Linienpaar mit einem weissen Papierblatt theilweise verdecken und es dann, soweit es sichtbar war, wie bei den Versuchen von VOLKMANN binocular zur Berührung mit dem Paar paralleler Linien bringen, so dafs im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beide Paare an einander stiefsen und das eine als Fortsetzung des andern erschien. Diese Methode ist noch etwas vortheilhafter, als VOLKMANN's, bei dem je eine Linie jedes Paares ganz ausgezogen war und sich mit der correspondirenden deckte, während bei meinen Versuchen, wie bei dem auf Seite 859 beschriebenen und nach dem Schema der *Fig. 247* angestellten Versuche, gar keine Deckung, sondern nur scheinbare Fortsetzung je zweier Linien vorkam. Abweichungen in den Abständen beider Linienpaare von  $\frac{1}{2}$  Millimeter wurden immer gleich erkannt, solche von  $\frac{1}{4}$  Millimeter kaum übersehen. Dabei stellte sich heraus, dafs ich die binoculare Vergleichung der correspondirenden Abstände ziemlich eben so gut vollzog, als die monoculare derselben Abstände in dem gleichen Sehfelde, wenn ich im letzteren Falle durch fortdauerndes Hin- und Herbewegen der einen Zeichnung das Schwanken der beiden Sehfelder gegen einander nachahmte.

Auffallend grofs sind auch die einzelnen Fehler in den Versuchen, wo VOLKMANN die Richtung einer Linie in einem Sehfelde mit der einer anderen im anderen Sehfelde verglich. Es kommen hierbei Abweichungen vom Mittel im Betrage eines halben Grades sehr häufig, solche bis zu einem Grade zuweilen vor. Zwei Linien aber, die im monocularen Sehfelde unter einem Winkel von 179 Grad zusammenstossen, für eine gerade Linie zu halten, 728 ist ganz unmöglich, und kaum wird man bei solchen, die unter  $179\frac{1}{2}$  Grad zusammenstossen, die Abweichung übersehen. Noch weniger wäre es möglich, im monocularen Felde zwei nahe neben einander hinlaufende gerade Linien, die eine Neigung von einem ganzen oder halben Grade gegen einander haben, für parallel zu halten. Dafs nun solche Abweichungen bei Vergleichung beider Sehfelder übersehen werden, scheint mir nur erklärlich zu sein aus den Schwankungen in der Gröfse der Raddrehungen beider Augen, die man, wie ich oben bemerkt habe, auch mittels der Nachbilder wahrnehmen kann. Dafs trotz dieser Schwankungen in den einzelnen Versuchen doch die Mittelzahlen vieler Versuche ein recht genaues Resultat geben können, braucht nicht aufzufallen.

Die sehr viel gröfsere Genauigkeit, welche bei der Beurtheilung der Tiefendimensionen wirklicher Objecte erreicht wird, möchte ich demnach wohl gröfstentheils aus dem Umstande erklären, dafs wir ausserordentlich viel besser eingeübt sind, an den Contouren eines binocular gesehenen Gegenstandes von bekannter Körperform mit den Blicklinien entlang zu laufen,

ne unveränderliche Fixation bei ungleichen Bildern beider Netzhäute halten.

Ich muß in dieser Beziehung auf eine Thatsache aufmerksam machen, die ich oft beobachtet habe. Wenn ich eine schwer zu combinirende stereoskopische Zeichnung vor Augen habe, so gelingt es nur mühsam zu einander passende Linien und Punkte zur Deckung zu bringen, und bei jeder Augenbewegung gleiten sie wieder aus einander. So wie ich aber ein lebhaftes Anschauungsbild von der dargestellten körperlichen Form gewonnen habe, tritt es wie durch einen glücklichen Einfall plötzlich auftritt, so gleite ich vollster Sicherheit mit beiden Augen über die Figur hin, ohne daß ihre Theile sich wieder trennen. Mit dem Anschauungsbilde der Körperform ist die Regel für die Art der Bewegung der Blicklinien bei der Betrachtung des Körpers gegeben, ja es kann, wie ich glaube, mit Recht die Frage vorgetragen werden, ob denn das Gesichtsanschauungsbild einer Körperform überhaupt einen anderen reellen Inhalt hat, als den, diese Regel für die Bewegung der Augen zu sein. Wenigstens müssen wir diese Frage verneinen, wenn wir die Ausmessung der Sehfelder aus den bei den Augenbewegungen gemachten Erfahrungen herleiten.

Wir wollen uns jetzt zur Untersuchung derjenigen Umstände wenden, welche die Genauigkeit in der Vergleichung beider Sehfelder beschränken. Es gibt also theils Bilder, die auf nicht correspondirenden Punkten beider Netzhäute abgebildet sind, zusammenfallen, theils solche, die auf correspondirenden Punkten abgebildet sind, verschiedene Stellung im Gesichtsfelde einzunehmen haben.

Der Hauptgrund für die Verschmelzung der Bilder disparater Netzhautstellen ist die Ähnlichkeit, welche sie mit den beiden perspectivischen Bildern eines und desselben Objects haben. Je vollkommener eine solche Ähnlichkeit ist, desto schwerer wird es uns, uns loszumachen von der Vorstellung des einen räumlichen Objects und die Anordnung und gegenseitige Beziehung der einzelnen gesehenen Linien und Punkte im Sehfelde unabhängig von jener Anschauung zu vergleichen.

Betrachten wir zum Beispiel die beiden senkrechten Linienpaare der Taf. IV, so daß wir die rechte Linie des rechten Paares mit dem 729

linken Auge fixiren, so fallen die rechte Linie des linken Paares mit dem linken Auge fixiren, so fallen in dem Gesamtbilde zwei Linien, von denen die rechte weiter zurückliegt, als die linke. Die beiden Bilder der linken Linie fallen dabei nicht auf correspondirende Netzhautstellen, weil die Linien des rechten Paares 3,5 Millimeter von einander entfernt sind, die des linken nur 2,7, also 0,8 Millimeter weniger. Dessen ungeachtet ist es fast unmöglich, zu erkennen, daß die eine oder andere der scheinbar schräg hinter einander stehenden Linien in einem Doppelscheinbild zu vereinigen. Nur bei sehr anhaltend strenger Fixation der einen Linie treten Andeutungen davon auf. Es wird vielleicht einzelne Beobachter geben, welche auch in diesem Falle die Doppelbilder leicht sehen,

andere, denen es gar nicht gelingt; denn es zeigen sich in dieser Beziehung sehr große individuelle Unterschiede.

Bei den beiden Linienpaaren *H* *Taf. IV* ist der Unterschied der Entfernungen größer (3,7 und 7 Millimeter, Unterschied 3,3 Millimeter). Bring ich sie zur Deckung, so gelingt es mir, auch diese als ein weit hinter einander liegendes Linienpaar zu sehen, aber die Doppelbilder der einen oder auch wohl beider Linien verschwinden mir dabei niemals ganz, weil der Abstand jetzt verhältnismäßig zu groß ist.

In der *Fig. J* haben die beiden senkrechten Linienpaare ebenfalls ziemlich verschiedene Abstände (6,7 und 9,2 Millimeter, Unterschied 2,5 Millimeter), doch ist der Unterschied ihrer Abstände geringer, als in den Linienpaaren *H*, und durch die oberen und unteren Begrenzungslinien, welche das perspektivische Bild einer rechteckigen Tafel herstellen, ist die Verschmelzung erleichtert. Bei dieser Figur ist für mich der Unterschied gerade hinreichend, daß ich leicht und vollständig die stereoskopische Vereinigung vollziehe, und andererseits doch auch mit geringer Anstrengung der Aufmerksamkeit die vorhandenen Doppelbilder erkennen kann. Fixire ich in letzteren Falle eine der senkrechten Linien, so erscheint mir die andere im Doppelbilde, und zwar sehe ich die kürzere rechte Linie des Gesamtbildes leichter doppelt als die längere linke. Fixire ich die rechte Linie des Gesamtbildes und vermehre ganz langsam die Convergenz der Augen, indem ich sehr vorsichtig und leise die betreffende Muskelanstrengung die ich aus langer Übung kenne, eintreten lasse, so kann ich die rechte Linie des Gesamtbildes in Doppelbilder von sehr geringem Abstand (etwa 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Millimeter) aus einander treiben, wobei auch die linke Verticale in Doppelbildern erscheinen muß, was mir auch für Augenblicke zu erkennen gelingt. Doch ist es sehr schwer, eine solche Augenstellung ohne bestimmtes Fixationsobject für einige Zeit festzuhalten, und das fortdauernde Schwanken der Blicklinien verräth sich durch das entsprechende Schwanken des Abstandes der beiden Doppelbilder der rechten Linie. Leichter gelingt es mir, an der *Fig. H* den Blick so festzuhalten, daß das linke Linienpaar ganz innerhalb des rechten erscheint und alle vier Linien einzeln gesehen werden.

Hat der Beobachter also seine Augenbewegungen hinreichend in seiner Gewalt, so kann er die beiden Bilder willkürlich in jeder beliebigen Lage zum Decken bringen und auch im Allgemeinen in jeder Lage die Doppel-  
730 bilder erkennen, vorausgesetzt, daß diese nicht allzu nahe neben einander liegen.

Ich bin mir auch wohl bewußt, welche Art von Willensintention ich anwenden muß, um die Doppelbilder entweder zu sehen, oder nicht zu sehen. Will ich sie nicht sehen, so suche ich durch den Blick abzumessen, wie viel die rechte Linie der *Fig. E, H* oder *J* mehr von mir entfernt ist, als die linke, ich wende also meine Aufmerksamkeit den Tiefendimensionen zu. Will ich die Doppelbilder sehen, so suche ich zu beurtheilen, welche Form das Gesamtbild als gezeichnete Figur in der Ebene des Papiers hat, wie

groß etwa der horizontale Abstand der verticalen Linien nach der Ebene des Papiers gemessen sei, und ähnliches. Es erscheint mir dies durchaus als ein ähnlicher Unterschied, wie er bei der Beurtheilung der Form der Flächen eines Cubus zum Beispiel vorkommt, den ich in irgend einer schrägen Stellung vor mir habe. Ich kann mir den Cubus einmal darauf ansehen, ob seine Flächen wirklich rechtwinkelig seien, und seine Kanten gleich lang, was sich bis zu einem gewissen Grade der Genauigkeit ja auch bei einer schiefen Ansicht desselben erkennen läßt. Oder ich kann den Cubus zeichnen wollen und mir seine Flächen darauf ansehen, wie sie als Parallelogramme im Sehfelde erscheinen. Dann werde ich darauf achten, um wie viel größer die stumpf erscheinenden Winkel aussehen, als die spitz erscheinenden, wie viel größer die eine Diagonale seiner Flächen erscheint als die andere, und so fort. Mit beiden Anschauungsweisen kann ich nach Willkür wechseln. Sind die Flächen perspectivisch sehr verzogen, so werde ich, während ich deutlich wahrnehme, daß die Winkel der Begrenzungsflächen alle gleich und alle Rechte sind, doch nicht ganz übersehen können, daß die drei um eine Ecke herum gelagerten Rechten im Bilde gleich vier Rechten erscheinen, und überhaupt, daß die verschiedenen rechten Winkel verschieden groß erscheinen. Wenn aber die Ansicht nur wenig schief ist, werde ich vielleicht auch bei der größten Aufmerksamkeit und Übung nicht erkennen können, daß die Winkel im Sehfelde verschieden groß erscheinen; so zum Beispiel, wenn mein Auge sich in der Verlängerung einer der Kanten befindet, und ich also überhaupt nur eine Fläche des Cubus und diese mit geringer Neigung gegen die Blicklinie vor mir habe. Überhaupt sind wir viel mehr geübt, die wahre körperliche Form, als die Erscheinung im Gesichtsfelde richtig abzuschätzen, worin eine Hauptschwierigkeit des Zeichnens nach Körpern besteht.

Genau so verhält es sich mit den Tiefenanschauungen im Gesichtsfelde und mit den Doppelbildern. Ich wende meine Aufmerksamkeit den Tiefendimensionen zu; dann sind die verschiedenen Entfernungen entsprechender Bildpunkte in den beiden Netzhautbildern das erfahrungsmäßige sinnliche Zeichen für ein und dieselbe räumliche Dimension des äußern Objects, und ihre Verschiedenheit drängt sich der Aufmerksamkeit des Beobachters nur dann auf, wenn sie sehr groß ist; wie die scheinbar rhomboidische Gestalt der Flächen des Würfels nicht ganz vergessen werden kann, trotz der richtigen gleichzeitigen Wahrnehmung ihrer wirklichen quadratischen Gestalt, wenn die perspectivischen Verziehungen sehr groß sind.

Dann aber wieder kann ich meine Aufmerksamkeit der Erscheinung im <sup>731</sup> Gesichtsfelde zuwenden, und werde nun Verschiedenheiten der beiden Bilder bemerken können, die ich vorher übersah; dabei wird sich aber die Wahrnehmung der Tiefendimension ebenso aufdrängen können und mich verleiten, sehr kleine Verschiedenheiten der beiden Ansichten des Körpers zu übersehen, wie die Wahrnehmung der wirklichen Gestalt des Würfels mich vollständig hindern kann, sehr kleine perspectivische Verziehungen seiner Flächen

zu erkennen. Im einen, wie im andern Falle handelt es sich darum, die Verschiedenheit gewisser Raumgrößen im Gesichtsfelde zu erkennen, welche wir erfahrungsmäßig als den sinnlichen Ausdruck gleicher Größen im objectiven Raume kennen, nur daß einmal die beiden zu vergleichenden Größen in den beiden verschiedenen Sehfeldern liegen, im andern Falle beide in demselben Gesichtsfelde.

Wenn ich übrigens in den *Fig. H* und *J* die Tiefendimensionen zur Anschauung zu bringen suche, so gelingt dies am besten, wenn ich den Blick vom einen zum anderen Ende der Tiefendistanz wandern lasse. Aber es gelingt auch, wenn gleich weniger lebhaft bei festgehaltenem Blicke, und zwar finde ich an den von Zeit zu Zeit auftauchenden Doppelbildern, daß ich dann so fixire, daß die Mitte der linken Figur auf die Mitte der rechten fällt und beide Verticallinien des Gesamtbildes in Doppelbildern erscheinen. Es ist dies die Stellung, welche die geringsten Distanzen sämtlicher Doppelbilder giebt.

Übrigens wird das Sehen der Doppelbilder erleichtert, wenn man irgend welche, oft selbst sehr unbedeutende Incongruenzen in den beiden zu vereinigenden Bildern anbringt, welche der Deutung, als gehörten sie beide ein und demselben räumlichen Objecte an, widersprechen. So braucht man, wie VOLKMANN gezeigt hat, in der *Fig. E* nur eine Hälfte einer der Linien mit einem weißen Blatte zu verdecken, oder zwei Horizontallinien in verschiedener Höhe in den Zwischenräumen der beiden Paare von Verticallinien zu ziehen, so daß sich Hähnliche Figuren bilden, deren Querstriche aber verschieden hoch liegen. Oder man mache, wie in *Fig. P*, *Taf. VI* das eine Linienpaar schwarz auf weißem Grunde, das andere weiß auf schwarzem Grunde, wodurch die stereoskopische Vereinigung erschwert, wenn auch nicht unmöglich gemacht wird. In *Fig. G*, *Taf. IV* sind die Linienpaare der *Fig. E* copirt und nur zwei Punkte hinzugefügt, welche gleiche Entfernung von der links liegenden Linie jedes Paares haben, wobei aber der eine innerhalb, der andere außerhalb der rechten Linie fällt. Vereinigt man die beiden Punkte, indem man sie fixirt, so erscheinen die daneben liegenden beiden Linien sogleich getrennt, denn da die eine rechts, die andere links von dem fixirten Punkte sich befindet, so ist dies ein viel auffallenderer Unterschied, als wenn sie beide an derselben Seite des Fixationspunktes, und nur verschieden weit entfernt lägen. Aber auch, wenn man nicht den Punkt, sondern die linke Linie des Gesamtbildes fixirt, erscheint der Punkt einfach, während die scheinbar hinter ihm durchgehende rechte Linie jetzt ziemlich leicht als doppelt erkannt wird. Es drängt sich hier die Wahrnehmung auf, daß die rechte Linie der linken ein Mal näher als der Punkt erscheint, und ein Mal ferner, und wir erkennen nun, daß der Punkt beide Male gleich weit von der linken Linie entfernt ist, die rechte Linie aber ungleich weit. Dabei tritt durch eine Art Contrastwirkung der Punkt, der in der Ebene des Papiers erscheinen sollte, vor dieselbe hinaus, als wäre er im rechten Bilde der linken Linie etwas näher, im linken ferner.

Die Verschmelzung kann auch erfolgen zwischen Punkten, die etwas niedere Höhe über oder unter dem Netzhauthorizonte haben, z. B. wenn die beiden Linienpaare der *Fig. F, Taf. IV* zum Decken bringt, von dem das linke 3, das rechte 3,7 Millimeter Abstand hat. Bei der Betrachtung reeller Objecte findet dieser Fall seine Analogie, wenn man zwei Verticalallinien, die seitlich von der Medianebene gelegen sind, vor Augen bringt. Diese sind dann dem einen Auge näher als dem anderen, und ihr Abstand erscheint ersterem größer als letzterem. Aber die Unterschiede in den verticalen Abständen, welche bei der Betrachtung reeller Objecte vorkommen, pflegen verhältnißmäßig klein zu sein gegen diejenigen, welche bei den horizontalen Abständen vorkommen. Damit scheint es zusammenzugehen, daß nur solche Bilder verschmelzen, deren verticale Dimensionen geringe Verschiedenheit haben. Auch löst sich die Verschmelzung der Linienpaare *F* sowohl, als auch selbst solcher, deren Abstände viel weniger verschieden sind, ziemlich bald bei anhaltender fester Betrachtung.

Es ist ferner hervorzuheben, daß nicht bloß auf den seitlich von der Netzhautgrube gelegenen Theilen der Netzhäute disparate Bilder verschmelzen können, sondern selbst solche, die dicht bei und auf dem Centrum der Netzhautgrube liegen. Wenn ich die beiden Kreuze der *Fig. L, Taf. V* zum Decken bringe und den Mittelpunkt des Gesamtbildes fixire, müssen die beiden nach rechts von den Kreuzen gelegenen Verticalallinien in eine scheinbar continuirlich fortlaufende Linie verschmelzen. Das ist auch der Fall, wenn ich sehr sorgfältig und genau die Mitte des Kreuzes fixire, aber es geschieht nicht immer, wenn ich auf das Fixiren nicht besonders achte; bald scheint die obere, bald die untere Verticallinie weiter vom Centrum entfernt zu sein, so daß der gegenseitige Abstand der beiden halben Verticalallinien wohl bis zu einem Millimeter oder selbst mehr beträgt, ohne dabei erkennbare Doppelbilder der Verticalen des Kreuzes auftreten zu lassen. Ich zuerst das Blatt selbst, also in Convergenzstellung, und treibe die Augen aus einander, bis die Kreuze auf einander fallen, so bleibt der rechte Theil der seitlichen Verticalen, der dem rechten Bilde angehört, sich der entferntere. Es bleibt also etwas zu viel Convergenz der Augenstellung bestehen. Aber ich kann absichtlich auch die Augen noch weiter aus einander treiben (was für mich immer noch Convergenzstellung ist, da der Abstand meiner Augen 66 Millimeter und der der Zeichnung nur 63,5 beträgt); dann tritt die obere Hälfte der Verticallinie dem rechten näher als die untere. In diesem Falle verrathen die Schwankungen der Augenstellung vergleichbaren seitlichen Verticalallinien, daß Schwankungen der Augenstellung da sind, die sich nicht durch Doppelbilder der scheinbar in einer Verticallinie des Kreuzes verrathen. Es ist dies ein Umstand, der bei der Untersuchung über Doppelbilder wohl zu beachten ist. Man darf nicht übersehen, daß bei gewöhnlicher, nicht sehr genauer Fixation eines Punktes immer auf genau correspondirenden Punkten der Netzhautcentren 733



abgebildet ist. So finde ich auch, daß ich die Figuren *E* und *F* immer so fixire, daß das engere Linienpaar ganz innerhalb des weiteren fällt. Um dies zu sehen, brauche ich nur von einem Ende her die Hälfte des einen Linienpaares mit einem weißen Blatte zu verdecken,

Ich hatte eine ähnliche Figur wie *L* erst gebrauchen wollen, um die Größe der correspondirenden Strecken auf der Horizontallinie zu bestimmen, fand sie aber für mich dazu ganz unbrauchbar, weil die Verticale des Kreuzes mir auch bei ziemlich großen Verschiebungen der seitlichen Verticalen immer noch einfach erschien. Dagegen gelang der Versuch viel besser, wenn ich auch von der Verticale des Kreuzes in der einen Figur die obere, in der andern die untere Hälfte wegließe.

Es kann auch eine Verticale des einen Bildes mit zwei ihr nahestehenden correspondirenden des andern verschmelzen. In *Fig. T, Taf. VII* sind links zwei, rechts drei Linien. Bringt man die rechts liegende Linie beider Gruppen zum genauen Decken, so fällt das Bild der einen linken Linie der linken Gruppe mitten zwischen die beiden linken Linien der rechten Gruppe hinein und verschmilzt mit diesen. Es entsteht dabei der Eindruck eines Gesamtbildes von drei Linien, deren äußerste linke dem Beobachter näher, die dicht daneben liegende zweite dem Beobachter ferner ist, als die rechte Linie. Die drei Linien scheinen ein rechtwinkeliges Prisma zu begrenzen; sie sind auch der richtige optische Ausdruck eines solchen, dessen eine Fläche verlängert durch das linke Auge des Beobachters geht. Um zu erkennen, wo das Bild der einfachen linken Linie liegt, ist deren Mitte mit einem stärkeren Punkte bezeichnet. Fixire ich die rechte Linie des Gesamtbildes, so fällt dieser Punkt bald auf die eine, bald auf die andere Linie des entsprechenden Linienpaares, bald mitten hinein. Das verräth Schwankungen der Convergenz.

So kann auch ein Kreis mit einem anderen verschmelzen, der etwas größer oder etwas kleiner ist, wie die Kreise der *Fig. R, Taf. VII*. Es entspricht das dem reellen Falle, wo der Beobachter einen seitlich von seiner Medianebene gelegenen Kreis (oder Kugel) betrachtet, der dem einen Auge näher ist, als dem anderen. Dabei sind die vertical verlaufenden Theile beider Kreise leicht und ziemlich dauernd zu verschmelzen, die horizontal verlaufenden Bogenstücke trennen sich dagegen leicht, wenn der Unterschied der Radien beider Kreise nicht relativ sehr klein ist. Der Fixationspunkt ist dabei im Centrum des Gesamtbildes angenommen. Zu beachten ist bei diesem Versuche, daß ich mich dabei ertappte, wie ich, ohne es zu wissen, den Kopf nach der Seite des größeren Kreises hingewendet hatte, wodurch die scheinbare Größe beider Kreise nahestehend gleich wurde. Da gelang natürlich die Verschmelzung sehr viel vollständiger. Wenn man dagegen einen Kreis mit zwei anderen zu verschmelzen sucht, von denen der eine etwas kleiner, der andere etwas größer ist, als jener, wie in *Fig. S, Taf. VII*, so findet die Verschmelzung an den nahe senkrecht verlaufenden Theilen der Kreise allerdings statt, und zwar meist so, daß der einfache Kreis an

einer Seite mit dem größeren, an der anderen Seite mit dem kleineren zusammenfällt. Oben und unten dagegen trennen sich die Kreise und man sieht Bogen des einfachen Kreises vom großen zum kleinen hinüberlaufen. Man sieht also im Gesamtbilde zwei Kreise, zwischen denen oben und unten allerdings in einer gewissen verwirrten und nicht recht deutlichen Weise noch je ein verbindender Bogen herüberläuft. Der innere Kreis erscheint rechts hinter, links vor dem äußeren zu liegen, vermöge einer ähnlichen stereoskopischen Wirkung wie bei den Verticalen der *Fig. T, Taf. VII.* Auch hier tritt die Verschmelzung ein, soweit in den combinirten Zeichnungen eine Ähnlichkeit mit reellen Objecten gefunden werden kann; wo diese fehlt, trennen sie sich.

VOLKMANN<sup>1</sup> hat eine Reihe von Messungen angestellt über die Grenzwerte der Differenzen, die beim stereoskopischen Sehen noch verschwinden können. Er blickte mittels eines Stereoskops nach zwei Paaren von je zwei schwarzen Linien auf weißem Grunde, die wir *ab* und *cd* nennen wollen. Eine dieser Linien *d* war ein Menschenhaar, in einem Schieber ausgespannt und mit diesem verschiebbar. Der Schieber wurde anfänglich so gestellt, daß die Linie *a* mit *c* und *b* mit *d* sich stereoskopisch vereinigte, dann wurde die bewegliche Linie *d* ihrer Nachbarin *c* so lange entweder genähert oder von ihr entfernt, bis sie sich von der mit ihr stereoskopisch vereinigten Linie *b* des andern Paares trennte. Der durch die Linsen des Stereoskops veränderte Gesichtswinkel war so groß, als würden die Linien aus 150 Millimeter Distanz betrachtet.

Wenn auch der Beobachter bei diesen Versuchen die Aufgabe hatte, die eine Linie des Gesamtbildes fest zu fixiren, so glaube ich nach meinen oben beschriebenen Erfahrungen doch annehmen zu dürfen, daß er in Wahrheit die Augen so gestellt hat, daß beide Linien in nahe gleich weit von einander entfernten Doppelbildern gesehen worden wären, falls er die letzteren hätte unterscheiden können, so daß die wahren Abstände der verschmelzenden Doppelbilder nur etwa halb so groß, oder etwas mehr als halb so groß sein möchten, als die Differenzen der beiden verglichenen Abstände.

Ich lasse hier (Anfang der folgenden Seite) eine Übersicht von VOLKMANN's Resultaten folgen, deren jedes einzelne das Mittel aus 15 Beobachtungen ist. Die Werthe der Distanz *cd* sind die äußersten, welche mit *ab* zu vereinigen waren, die Längen sind in Millimetern angegeben.

Es zeigt sich in diesen Beobachtungen eine beträchtliche individuelle Verschiedenheit für verschiedene Beobachter, und auch bei demselben Beobachter für verschiedene Grade der Übung.

Für Herrn VOLKMANN selbst wurden nämlich, wie die Zahlen ergeben, die Doppelbilder eher sichtbar, nachdem er zwei Monate lang ähnliche Versuche fortdauernd angestellt hatte. Daß für ihn überhaupt die Doppelbilder

<sup>1</sup> A. W. VOLKMANN, *Archiv für Ophthalmologie*. V, 2, S. 32—59.

Nr.	Beobachter	$ab$	$cd$	$ab - cd$	Bemerkungen.
1	VOLKMANN	5,3	3,46 7,57	+ 1,84 — 2,27	Linien vertical
2	"	5,3	4,52 6,62	+ 0,78 — 1,32	ebenso, zwei Monate später
3	"	1,5	0,91 3,25	+ 0,59 — 1,75	ebenso
4	"	8,0	5,91 10,99	+ 2,09 — 2,99	ebenso
5	"	5,3	4,88 6,05	+ 0,42 — 0,75	Linien horizontal
6	"	1,5	1,15 1,97	+ 0,45 — 0,47	ebenso
7	"	8,3	7,26 9,01	+ 1,04 — 0,71	ebenso
8	SOLGER	5,3	2,13 10,00	+ 3,17 — 4,70	Linien vertical
9	"	5,3	4,66 5,91	+ 0,64 — 0,61	Linien horizontal
10	KRAUSE	5,3	3,21 8,48	+ 2,09 — 3,18	Linien vertical
11	"	5,3	4,92 5,86	+ 0,38 — 0,56	Linien horizontal

bei kleineren Unterschieden der Bilder schon sichtbar wurden, als für die beiden anderen Beobachter, mag sich ebenfalls daraus erklären, daß er von Anfang in physiologisch-optischen Beobachtungen viel geübter war; doch ist auch wohl anzunehmen, daß überhaupt die Geschicklichkeit im Augenmaße bei verschiedenen Anwendungen desselben beträchtliche individuelle Verschiedenheiten zeigen wird. Die Zahlen zeigen ferner, daß, wie schon oben erwähnt worden ist, verticale Abweichungen in den beiden Gesichtsfeldern zwischen horizontalen Linien viel leichter erkannt werden, als horizontale; die letzteren zeigen auch eine geringere Breite individueller Abweichung. Wenn man dabei berücksichtigt, daß wahrscheinlich nur die halbe Breite der angegebenen Differenzen zu nehmen ist, daß davon noch die Breite der Linien selbst mit etwa  $\frac{1}{10}$  Millimeter abgeht, daß endlich der kleinste sichtbare Abstand in 150 Millimeter Entfernung etwa  $\frac{1}{30}$  Millimeter beträgt, so bleibt bei einigen von den Versuchen an den Horizontallinien für die Verschmelzung in der That wenig Breite übrig. Andere Versuchsreihen von VOLKMANN zeigen, daß überhaupt bei wachsendem Winkel zwischen den Linienpaaren und der Verticallinie die zu verschmelzenden Unterschiede ihrer Abstände

continuirlich kleiner werden und ihr Minimum bei horizontaler Richtung zeigen.

Weiter suchte VOLKMANN auch die größten Unterschiede der Richtung je zweier Linien auf, welche die stereoskopische Vereinigung derselben noch zuliefen. Beide Linien waren als Durchmesser auf drehbaren Scheiben gezogen, wurden erst mit einander parallel gestellt unter dem in der Tabelle bemerkten Winkel gegen die Verticale. Dann wurde die rechte Scheibe so weit bald nach rechts, bald nach links gedreht, bis die stereoskopische Vereinigung aufhörte, die Differenz in der Richtung beider Linien ist dann als Winkelabstand angegeben. Die Zahlen sind Mittelwerthe aus je 20 (VOLK-<sup>736</sup> MANN) oder 30 (SOLGER) Beobachtungen; die Länge der Linien ist mit *D* bezeichnet.

Winkel mit der Verticale	Winkelabstand		
	VOLKMANN <i>D</i> = 60 Mm.	<i>D</i> = 20 Mm.	SOLGER <i>D</i> = 60 Mm.
0°	5,5°	7,4°	17,5°
10°	5,1°	6,9°	15,5°
20°	4,4°	6,1°	14,0°
30°	3,8°	5,8°	11,5°
40°	3,7°	5,3°	10,2°
50°	3,4°	4,4°	8,9°
60°	2,7°	4,1°	6,2°
70°	2,4°	3,3°	4,5°
80°	1,9°	2,8°	3,9°
90°	1,5°	2,1°	2,9°

Es geht daraus hervor, wie nahehin verticale Linien bei viel größeren Unterschieden ihrer Richtung mit einander verschmelzen, als nahehin horizontale, und dafs auch hier beträchtliche individuelle Unterschiede vorkommen. Kürzere Linien verschmelzen leichter als längere.

WHEATSTONE, der Erfinder des Stereoskops, schlofs aus seinen Versuchen, dafs ebenso, wie disparate Bilder bei der stereoskopischen Projection in eines vereinigt werden könnten, so auch correspondirende Punkte zweier Netzhautbilder an zwei verschiedene Stellen des Raums verlegt und also doppelt gesehen werden könnten. Diese Folgerung ist vielfach bestritten worden. Wenn man sie aber nur in ihrem richtigen Sinne und ihrer nothwendigen Beschränkung auffafst, wird sie nicht wohl geleugnet werden können. Denn wenn einmal zugegeben wird, dafs unter gewissen Umständen und in gewissem Sinne disparate Bilder einfach gesehen werden, so folgt nothwendig, dafs unter denselben Umständen und in demselben Sinne auch correspondirende Bilder doppelt gesehen werden müssen. Es seien *AC* und *BD* Fig. 251 (S. 886) zwei Flächen, *A* und *B* grün, *C* und *D* roth. Sie mögen irgend welchen stereoskopischen Bildern angehören und für den Beschauer sich vereinigen in das einfache Bild einer gegen ihn geneigten Fläche, <sup>737</sup> wobei die Linie *ab* sich mit der Linie *cd* vereinigt, obgleich diese Linien

in ihrer Richtung nicht genau correspondiren. Die fixirten Punkte beider Zeichnungen mögen  $f$  und  $g$  sein und senkrecht über diesen die beiden correspondirenden Punkte  $h$  und  $i$  liegen. Die letzteren werden auf verschiedenen Seiten von  $ab$  und  $cd$  liegen können, weil diese Linien der Annahme nach nicht correspondirende sind. In der Figur sind die Punkte durch Kreuzchen bezeichnet, aber nur um ihre Lage anzudeuten; es wird angenommen, daß sie sich in den stereoskopischen Bildern von dem Grunde, auf dem sie liegen, durch nichts auszeichnen. Dann wird in dem gemeinsamen Bilde der scheinbar wahrgenommenen geneigten Fläche alles Grün links, alles Roth rechts von der binocular gesehenen Grenzlinie beider Flächen gesehen, also auch nothwendig der im Grün liegende Punkt  $h$  links; der im Roth liegende correspondirende Punkt  $i$  rechts von der Grenzlinie beider Farben. Die Ordnung der Punkte in jedem einzelnen Sehfeld wird offenbar durch den gemeinschaftlichen Sehsact nicht umgeändert werden




Fig. 251.

können. Die beiden Punkte  $h$  und  $i$  werden dann also auf zwei verschiedenen Punkten der scheinbar vorhandenen geneigten Fläche localisirt, nicht aber auf zwei Punkte des Sehfelds; denn auf dieses wird hierbei überhaupt nicht geachtet. Aber natürlich wird das eben nur so lange geschehen, als unter dem Einfluß des körperlichen Anschauungsbildes eine genaue Vergleichung der relativen Lage von  $ab$  und  $cd$  zu den Netzhaut-horizonten verhindert wird. Sobald wir unsere Aufmerksamkeit von dem scheinbar vorhandenen körperlichen Objecte ab und der Form der Bilder im Sehfeld zu lenken, wird es uns bei hinreichender Übung vielleicht gelingen, die Linien  $ac$  und  $cd$  von einander getrennt zu sehen, zwischen ihnen einen Streifen, auf dem sowohl Grün wie Roth liegt, und hier das Grün des Punktes  $h$  mit dem Roth des Punktes  $i$  zusammenfallend.

Ich bemerke hierbei noch, daß von den Vertheidigern der angeborenen Identität der Netzhautstellen angenommen wird, durch den sogenannten Wettstreit der Sehfelder würden in einem solchen Falle die Theile des andern Bildes, welche den Grenzen der farbigen Flächen entsprächen, ausgelöscht:

nittelbar neben jeder Contour würde das Grün und Roth, was ihr an-  
t, den correspondirenden gleichfarbigen rothen oder grünen Grund unter-  
cken. Aber auch dies zugegeben, so würde doch die Lage der Punkte  $h$   
 $i$  so gewählt werden können, daß auf ihnen Gleichgewicht des Wett-  
its stattfände, und dann würden alle unsere Einwände wieder gelten.

Die Punkte  $h$  und  $i$  dürfen übrigens nicht gleichartig bezeichnet sein in  
Zeichnung, weil sie sonst die Vorstellung eines Objects, welches hinter  
vereinigten Linie  $ab—cd$  läge, hervorbringen würden; dann würde also  
ler Raumanschauung das neben einander Liegen der Punkte und Linien  
it in Betracht kommen.

Will man solche Deckpunkte, deren Bilder getrennt erscheinen sollen,  
zeichnen, so muß man sie verschieden bezeichnen. Hierfür hat WHEAT-  
STONE einen viel besprochenen Versuch vorgeschlagen, bei dem in dem  
n Sehfelde eine starke schwarze Linie, in dem andern mit ihr corre-  
spondirend eine ganz feine steht. Diese wird aber unter einem kleinen  
kel von einer andern starken gekreuzt, und bei stereoskopischen Com-  
738  
tionen vereinigen sich scheinbar die beiden starken Linien zu einer  
n die Papierfläche geneigten Linie, während die schwache daneben in  
Papierfläche erscheint. In WHEATSTONE's Figur sind nun allerdings die  
ungsunterschiede der beiden zu vereinigenden Linien so groß, daß die  
ten Beobachter sie leicht in Doppelbildern sehen werden, wie dies  
von verschiedenen Seiten hervorgehoben ist. WHEATSTONE selbst gehört  
bar zu denjenigen Beobachtern, die sehr weit getrennte Doppelbilder  
übersehen können, und es muß jeder Beobachter die Neigungsunter-  
de der zu vereinigenden Linien seinen Augen anpassen. Ich finde die  
ung noch sicherer, wenn man jederseits eine starke und eine schwache  
zieht, die sich unter einem Winkel kreuzen, so daß eine starke der  
achen der andern Seite correspondirt, wie dies in *M*, *Taf. V*, für  
e Augen passend geschehen ist. Für Beobachter mit anderer Divergenz  
scheinbar verticalen Meridiane würde freilich eine etwas andere Stellung  
Figuren nöthig sein. In der genannten Figur hier vereinigt sich mir  
starke mit der starken, die schwache mit der schwachen Linie, und es  
t mir in keiner Weise zu sehen, daß die linke starke sich mit der  
n schwachen deckt. Nur wenn ich durch veränderte Divergenz der  
die Bilder aus einander schiebe, sehe ich, daß die genannten beiden  
einander vollkommen parallel erscheinen. Man muß auch nicht  
n, daß eines der Bilder beim Beschauen ganz verschwände und über-  
würde; dann könnte keine stereoskopische Wirkung da sein. Es er-  
t aber das gekreuzte Linienpaar deutlich mit dem oberen Ende dem  
uer genähert, wenn man seine Lage mit den daneben gezogenen  
a Verticallinien vergleicht. Eine solche stereoskopische Wirkung  
nicht eintreten können, wenn die rechte dünne Linie gar nicht ge-  
würde.

ine ähnliche Wirkung erhält man von der *Fig. N*, *Taf. V*, wo die

beiden äußeren Grenzlinien der oberen Hälfte des schwarzen Streifens correspondiren, und ebenso ihre Fortsetzungen, die inneren Grenzlinien, der unteren Hälfte. Im Gesamtbilde sieht man einen schwarzen Streifen, und an diesem erscheinen die beiden Grenzlinien, die sich correspondiren, an entgegengesetzten Seiten. Auch in dieser Figur wird die Neigung der schwarzen Dreiecke von solchen Beobachtern, die eine andere Divergenz der verticalen Meridiane haben, etwas geändert werden müssen.

In den Beispielen *M* und *N* werden es die meisten Beobachter unmöglich finden, zu sehen, daß die sich scheinbar vereinigenden Linien im gemeinsamen Gesichtsfelde sich wirklich nicht decken, und daß im Gegentheil die rechte dünne und linke dicke Linie der Figur *M*, die entgegengesetzten Ränder der Streifen in *N* aufeinanderfallen. Ich will indessen nicht leugnen, daß bei einem in der Beobachtung von Doppelbildern recht geübten Beschauer die Beobachtung gelingen könnte. Ich selbst bemerke wohl mitunter bei recht scharfer Fixirung der Mittelpunkte, daß ich die betreffenden Linien nicht eigentlich einfach sehe, aber ohne die Doppelbilder bestimmt trennen zu können. Noch leichter trennt man sie, wenn man, wie W. v. BEZOLD, die Figuren mit Tusche auf einer Glasplatte ausführt, so daß man  
 739 bei plötzlich geänderter Beleuchtung die eine hell auf dunklem Grunde, die andere dunkel auf hellem Grunde sehen kann. Dann schwindet das Streben zur Verschmelzung, und man erkennt leicht die disparate Lage der Bilder. Ich will hier nur hervorheben, und nur das kann ich als den wahren Sinn des WHEATSTONE'schen Versuchs betrachten, daß, so lange man in die körperliche Anschauung versenkt bleibt, selbst bei festgehaltenem Fixationspunkte, die Eindrücke correspondirender Punkte benutzt werden, um differente Theile des körperlichen Gesamtbildes auszufüllen. Wenn man sich unter Umständen versetzt, welche einen Irrthum in der Vergleichung der zwei verschiedenen Bilder beider Sehfelder möglichst begünstigen, werden Bilder disparater Punkte vereinigt und Bilder correspondirender Punkte getrennt. Das erstere kann, wie gezeigt wurde, sogar nicht ohne das andere vor sich gehen; das zweite ist eine logische Folge des ersten. Daraus folgt aber nicht, wenn man die Art der Beobachtung passend verändert, um die Vergleichung der Bilder beider Sehfelder möglichst ungestört vollziehen zu können, und sich die Bilder disparater Punkte in Folge dessen trennen, daß dann die Bilder correspondirender Punkte sich nicht wieder vereinigen sollten.

Hinzuzufügen ist noch, daß auch bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken die stereoskopische Combination der letzt beschriebenen Figuren *M* und *N* ganz vollkommen eintritt, und daß man dabei keine Spur von den Doppelbildern sieht, die im gemeinsamen Sehfelde erscheinen sollten, wenn die Bilder correspondirender Punkte einfach auf einander gelegt würden. Die Wirkung ist also durchaus nicht von Augenbewegungen abhängig.

Wir haben noch einige andere Umstände zu besprechen, die bei der Verschmelzung von zwei verschiedenen Netzhautbildern zu berücksichtigen sind.



Erstens ist zu bemerken, daß, so lange stereoskopische Tiefenwahrnehmung da ist, nicht, wie einige Anhänger der angeblichen Identität der Zhäute angenommen haben, das eine der beiden Doppelbilder etwa des- verschwindet, weil es vollständig übersehen wird und gar nicht zur pfindung kommt. Wenn letzteres der Fall wäre, würde keine binoculare fenwahrnehmung stattfinden können, die eben nur auf der Verschiedenheit Bilder und auf der Perception dieser Verschiedenheit beruht. Ja, die : große Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung zeigt sogar, daß die Ver- edenheit der Bilder auch mit großer Genauigkeit wahrgenommen wird, ich nicht als eine Verschiedenheit in der Ausfüllung der Sehfelder, lern nur als sinnlicher Ausdruck der verschiedenen Entfernung der ectpunkte. Wo keine Tiefenwahrnehmung zu Stande kommt, da kommt allerdings vor, daß einzelne Theile der Bilder zeitweise oder ganz ver- hen; wir werden diese Fälle im nächsten Paragraphen genauer zu be- chen haben.

Zweitens ist noch der Einfluß der Augenbewegungen auf die Verschmelzung Doppelbilder zu besprechen. In dieser Beziehung hat E. BRÜCKE die ung aufgestellt, daß wir eine Wahrnehmung der Tiefendimensionen des cts nur dadurch bekommen, daß wir fortdauernd mit den Blicklinien an verschiedenen Contouren des gesehenen Objects entlang laufen und hier- ach einander alle einzelnen Punkte dieser Contouren auf den identischen ren der Netzhautgrube abgebildet erhalten. Da nun unsere Aufmerk- eit der Regel nach auf die Bilder der am genauesten sehenden Stelle 740 Netzhaut concentrirt ist, so konnte mit Grund die Frage aufgeworfen en, ob nicht deshalb die Doppelbilder der übrigen Theile des Objects ehen werden, weil für gewöhnlich die am genauesten gesehenen und e Aufmerksamkeit am meisten fesselnden Theile der Bilder corre- irende sind. Es ist dieser Ansicht von BRÜCKE gegenüber zuzugeben, n der That die darin betonten Momente von großem Gewicht für die ung vollständiger Tiefenanschauungen sind, und daß die von ihm ene Beschreibung der Art, wie sie entstehen, den Verhältnissen des nlichen unbefangenen Sehens vollkommen entspricht. Eine Vereinigung ehr differenten Bildern gelingt in der That nur mittels der Augen- ungen, indem man nach einander die einzelnen Theile der Bilder ein- iekt und die Aufmerksamkeit ihren natürlichen Gang gehen läßt, wobei mer auf diejenigen Theile vorzugsweise gerichtet ist, welche fixirt 1. Auch wird durch dieses Herumführen des Blicks die Tiefenanschauung ieden genauer und lebendiger, als bei Fixation eines Punktes, was ich erklären möchte, daß nur die Tiefenunterschiede derjenigen Bild- : genau erkannt werden, die dem jedesmaligen Horopter sehr nahe : Dadurch also, daß man die Convergenz wechseln läßt und nach er alle Punkte des wirklichen oder scheinbaren Objects in den Horopter im mindestens sehr nahe bringt, erhält man nach einander eine genaue ung aller Tiefenunterschiede. Fixirt man den Blick längere Zeit

auf einen Punkt, so treten im Gegentheil die Doppelbilder leichter hervor und die Tiefenunterschiede namentlich derjenigen Punkte, welche in sehr disparaten Doppelbildern erscheinen, werden undeutlich. Ja, die Doppelbilder, welche man durch sehr anhaltende strenge Fixation eines Punktes nicht von einander lösen kann, liegen so nahe an der Grenze der Unterscheidungsfähigkeit der Augen, daß ich glaube annehmen zu dürfen, daß sie nur wegen der unvermeidbaren kleinen Augenbewegungen nicht auch aufgelöst werden. Indessen war die von BRÜCKE aufgestellte Theorie etwas zu ausschließlich, wenn er meinte, daß alle Tiefenwahrnehmungen nur durch Augenbewegungen gewonnen und alle Doppelbilder nur durch successives Einfachsehen der einzelnen Punkte beseitigt werden könnten. Es wurde nämlich von DOVE gezeigt, daß auch bei instantaner Beleuchtung durch einen elektrischen Funken stereoskopische Effecte erhalten und Doppelbilder verschmolzen werden können. Es kann dazu der auf Seite 710 beschriebene Apparat gebraucht werden. Nur muß man dafür sorgen, daß im Momente der elektrischen Beleuchtung die beiden Blicklinien auf correspondirende Theile des Bildes gerichtet seien. Zu dem Ende pflege ich zwei feine Nadelstiche durch correspondirende Punkte der zu vereinigenden Zeichnungen zu machen. Die Wand des dunkeln Kastens, in welchem das Bild angeheftet wird, ist hinter diesen Nadelstichen selbst durchbohrt und das Zimmer nicht ganz verdunkelt, so daß der Beobachter die beiden Nadelstiche mittels des schwachen hindurchfallenden Lichtes sehen kann. Er richtet auf sie die Blicklinien, so daß ihre Bilder im gemeinschaftlichen Sehfelde sich decken, und dann läßt er den Funken überschlagen. Dabei geben stereoskopische Zeichnungen von nicht zu großen Differenzen, wie *E*, *M* und *N*, *Taf. IV* und *V*, ganz deutliche und lebendige Tiefenanschauung ohne wahrnehmbare Doppelbilder; solche von größeren Differenzen, wie *H*, zerfallen aber in einzelne Linien und geben keine Tiefenanschauung. Auch alle über einander stehenden Horizontallinien, wie in *F*, trennen sich auffallend leicht. Hat man dabei einfache Zeichnungen von wenigen Linien vor sich, so übersieht man bei der instantanen Beleuchtung das Ganze auf einmal. Hat man dagegen complicirte stereoskopische Photographien vor sich mit vielen Einzelheiten, so gewinnt man nur von einem gewissen Theile des Ganzen einen deutlichen Eindruck und braucht mehrere Funken, um nach einander das Ganze zu übersehen. Dabei ist es sonderbar, daß während man die beiden Nadelstiche fest fixirt und in Deckung erhält, man willkürlich vor dem Funken die Aufmerksamkeit auf eine beliebige Stelle des dunklen Gesichtsfeldes richten kann, und dann während des Funkens einen Eindruck nur von den Objecten erhält, die in dieser Gegend des Sehfeldes erscheinen. Es ist in dieser Beziehung die Aufmerksamkeit ganz unabhängig von der Stellung und Accommodation des Auges, überhaupt von irgend einer der bekannten Veränderungen in und an diesem Organe, und demgemäß kann sie mit einer selbstbewußten und willkürlichen Anstrengung auf eine bestimmte Stelle in dem absolut dunklen und unterschiedslosen Gesichtsfelde hingerrichtet

werden. Es ist dies einer der auffallendsten Versuche für eine künftige Theorie der Aufmerksamkeit.

Die Versuche mit momentaner Beleuchtung sind auch noch insofern für die Rolle, welche die Aufmerksamkeit bei den Doppelbildern spielt, interessant, als es bei solchen Bildern, die wie *J* ohne große Anstrengung sowohl stereoskopisch einfach, als auch mit geringer Mühe als Doppelbilder gesehen werden können, leicht gelingt, beides auch beim Lichte des elektrischen Funkens zu sehen. Der erste Eindruck ist gewöhnlich der stereoskopisch einfache; wenn man aber in Pausen von etwa 10 Secunden, in denen die Nachbilder vollständig erlöschen können, die Beobachtung wiederholt, so fängt man an die Doppelbilder zu sehen, trotzdem man immer denselben Punkt fixirt und jede nachfolgende Lichteinwirkung der ersten absolut gleich ist. Ja, selbst bei solchen Figuren, wie *M*, wo es mir relativ schwer wird die Doppelbilder zu sehen, kann ich sie auch bei instantaner elektrischer Beleuchtung endlich sehen, wenn ich mir vorher lebhaft vorzustellen suche, wie sie aussehen müssen. Der Einfluß der Aufmerksamkeit ist hier reiner zu beobachten, weil jede Einwirkung der Augenbewegungen ausgeschlossen ist. Die gleichen Versuche können auch mit VOLKMANN's schon oben beschriebenem Tachistoskop ausgeführt werden.

Ferner ist zu bemerken, daß es verschiedenen zuverlässigen Beobachtern, wie WHEATSTONE<sup>1</sup>, ROGERS<sup>2</sup> und WUNDT<sup>3</sup>, gelungen ist, auch Nachbilder, welche nicht ganz genau correspondirende Lage hatten, zu einer stereoskopischen Tiefenwahrnehmung zu verschmelzen. ROGERS hat es sogar möglich gefunden, erst das Nachbild in dem einen, dann im andern Auge zu entwickeln und schließlich beide Nachbilder stereoskopisch zu combiniren. Dadurch ist der Einfluß, den die vorausgängige Anschauung der wirklichen 742 Bilder auf die Deutung der Nachbilder allenfalls haben könnte, vermieden. An positiven Nachbildern, die ich selbst durch momentanes Anschauen hell beleuchteter Gegenstände entwickelt hatte, habe ich übrigens auch deutliche Tiefenanschauung gehabt.

Auch diese Versuche zeigen, wie die mit dem elektrischen Funken, daß keine Bewegung der Augen nöthig ist, um Tiefenwahrnehmung zu vermitteln, denn bei jeder Bewegung verschieben sich die Nachbilder mit dem Auge und durch keine Augenbewegung können disparate Bilder zu correspondirenden gemacht werden. Übrigens gelingen die Versuche mit den Nachbildern schwer; diese müssen sehr scharf entwickelt sein, und selbst wenn sie es sind, besteht immer eine Neigung, sie auf die Fläche des reellen Hintergrunds, den man anschaut, zu projeciren und als bloße Flecke auf dessen Oberfläche anzusehen.

PANUM hat die Regel für das Verschmelzen der Doppelbilder in der Weise ausgesprochen, daß einander ähnliche Contouren, welche auf nahehin

<sup>1</sup> WHEATSTONE, *Phil. Transact.* 1838. T. II, p. 392—393.

<sup>2</sup> ROGERS, *Silliman's Journal* (2) XXX, November 1860.

<sup>3</sup> WUNDT, *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung*. S. 236—237.

correspondirenden Netzhautpunkten sich abbilden, mit einander verschmelzen sollen. Er bezeichnet dabei den Umfang derjenigen Punkte der andern Netzhaut, welche mit ein und demselben Punkte der ersten Netzhaut verschmelzen können, als den correspondirenden Empfindungskreis jenes Punktes. Diesen Empfindungskreisen schreibt er nach Maafsgabe der oben erörterten Thatsachen einen größeren horizontalen Durchmesser, einen kleineren verticalen zu. Ich habe dagegen in der hier gegebenen Darstellung das Verschmelzen der Doppelbilder davon abhängig gemacht, daß die Sicherheit und Genauigkeit der Abmessungen des Augenmaafses für die entsprechenden Dimensionen beider Bilder nicht groß genug sei, um nicht Irrthümer zu erlauben, und daß ein solcher Irrthum begünstigt werde durch die Anschauung des einen körperlich ausgedehnten Objects, welches man vor sich hat oder vor sich zu haben glaubt. Es hat schon VOLKMANN gegen PANUM's Fassung des Gesetzes solche Fälle, wie *G, Taf. IV*, geltend gemacht, wo durch Zusetzung eines Punktes oder anderer kleiner Incongruenzen beider Bilder die Verschmelzung gestört wird. PANUM hat dawider entgegnet, daß in diesen Fällen immer eine Unähnlichkeit der Contouren auftrete, welche auch nach seiner Fassung des Gesetzes die Verschmelzung hindern müßte. Gegen andere Versuche von VOLKMANN, aus denen hervorgeht, daß Linienpaare von kleinem Abstände bei gleicher Differenz des Abstandes nicht so leicht verschmelzen, als solche von größeren Abständen, hat er die Antwort gegeben, daß eng an einander stehende Linien sich bei der Fixation ganz nahe am Centrum der Netzhaut abbilden, und daß dort die correspondirenden Empfindungskreise kleiner seien und deshalb die Doppelbilder nicht verschmelzen könnten. VOLKMANN's letzterwähnte Beobachtung können wir aber in folgender Weise wiederholen. In *Fig. U, Taf. VII*, sind jederseits 5 Linien gezeichnet; die Paare 1 und 3, sowie 4 und 5 haben in der linken Gruppe den Abstand von 4 Millimeter, in der rechten von 5 Millimeter. In das Innere des Paares 1—3 ist jederseits noch die Linie 2 hineingesetzt worden, welche beiderseits von 1 den gleichen Abstand von 3 Millimeter hat und daher von der Linie 3 links nur 1, rechts aber 2 Millimeter absteht. Fixirt man nun die Linie 4 des Gesamtbildes, so erscheint 5 einfach und

743 etwas nach hinten liegend. Fixirt man dagegen fest und sicher 1, so erscheinen die beiden Linien 3 von einander getrennt, die Linie 2 dagegen natürlich einfach und mit 1 in gleichem Tiefenabstande. Nur bei Bewegungen des Blicks kann man auch 3 einfach sehen, wobei dann die ganze Gruppe als ein vierkantiges senkrecht Prisma erscheint, auf dessen vorderer Fläche noch eine Linie, nämlich 2, parallel mit den Kanten gezogen ist. Nun liegen aber bei der Fixation der Linie 1 des Gesamtbildes die beiden Linien 3 gerade so auf den Netzhäuten, wie bei Fixation von 4 die beiden Linien 5 liegen. Das Hinderniß der Vereinigung besteht offenbar in der Linie 2, die aber nicht zwischen beiden, sondern links von beiden liegt, und nach PANUM's Fassung des Gesetzes die Vereinigung nicht hindern sollte. Faßt man aber die Vereinigung der Doppelbilder als eine Täuschung des Augenmaafses, so

aus dem FECHNER'schen Gesetze klar, daß die Unterscheidung zwischen 2 und 3 Millimeter des Abstandes, wie ihn die Linien 2 und 3 haben, herab sein muß, als zwischen 4 und 5 Millimeter bei den Linien 4 und 5.

Auch bei den Versuchen mit Kreisen kommt Ähnliches vor. Wenn man zwei etwas ungleiche Kreise gezeichnet hat, die sich binocular vermelzen lassen, und man umgibt beide concentrisch mit einem andern Kreise, der auf beiden Seiten gleichen Radius hat, einen Radius wenig kleiner als der des größeren der beiden ersten Kreise, so trennen sich leicht die Bilder der beiden innern Kreise verhältnismäßig leicht.

Eine Frage endlich, die sich hier anschließt und die ebenfalls in theoretischer Beziehung Wichtigkeit hat, ist die, ob wir die Eindrücke des einen Auges von denen des andern unterscheiden. In dieser Beziehung ist zu bemerken, daß wir auch bei instantaner elektrischer Beleuchtung die Tiefenunterschiede stereoskopisch gesehener Liniengruppen immer richtig sehen, niemals verkehrt, und daß selbst, wenn ich mir möglichst deutlich das umgekehrte Relief der Figur vorzustellen suchte, um mit Absicht eine Verwechslung herbeizuführen, was mir bei der Umkehrung des Reliefs von vornen bei monocularer Betrachtung meist schnell gelingt, ich es unmöglich fand, das stereoskopische Relief zu ändern<sup>1</sup>. Eine solche Verwechslung der Reliefs würde aber nothwendig eintreten müssen, wenn man den Eindruck beider Netzhautbilder verwechseln könnte mit demjenigen Eindrucke, welcher bei Vertauschung der beiden Netzhautbilder unter einander eintritt. Daraus folgt also zunächst, daß der momentane Eindruck, den zwei Netzhautbilder machen, deutlich und bestimmt verschieden sein muß von demjenigen, welchen dieselben Netzhautbilder machen würden, wenn jedes auf die correspondirenden Punkte des andern Auges übertragen würde.

Etwas anderes ist es, daß wir für gewöhnlich kein bestimmtes Bewußtsein davon haben, mit welchem Auge wir das eine oder andere Bild sehen. Wir wissen wir nicht oder nur unvollkommen und nur durch nebensächliche Umstände zu beurtheilen, wie wir denn aus unseren Sinnesempfindungen herauszulesen wissen, was wir nicht durch oft wiederholte Beobachtungen als ihre Bedeutung kennen gelernt haben. Daß also zwei nahe an einander stehende Doppelbilder gewisser Art mit gewissen Localzeichen eintritt, welches ferner von uns ist als der Fixationspunkt, und nicht ein bestimmtes bedeuten, können wir vollkommen gelernt haben, ohne doch genügende Übung zu haben, um aus den Localzeichen der Bilder herauszulesen, welches von den beiden Halbbildern dem rechten oder linken Auge angehört. Um letzteres zu ermitteln, müssen wir erst das eine Auge schließen oder verdecken, was wir beim gewöhnlichen Sehen nicht thun, wobei wir, wie erwähnt, auf die Doppelbilder ja auch gar nicht zu achten pflegen.

<sup>1</sup> Dieselben Beobachtungen von AUBERT und MARRASCH in *Aubert, Physiologie der Netzhaut*. S. 315. 1865, mit vielfach abgeänderten Figuren. Neuerdings hat auch DONDER'S im Wesentlichen dieselben Resultate erhalten.

Wir wissen deshalb in der Regel auch ohne einen besonders darauf zielenden Versuch nicht anzugeben, welchem Auge das eine, welchem das andere Doppelbild angehört. Auch die Augenbewegungen helfen dabei nicht viel, weil wir bei Convergenzbewegungen — und auf solche käme es hier an — keine deutliche Vorstellung davon haben, nach welcher Richtung sich jedes einzelne Auge verschiebt.

Dagegen sehen wir fortdauernd die am weitesten rechts gelegenen Theile des gemeinsamen Gesichtsfeldes nur mit dem rechten Auge; dem linken werden sie durch die Nase verdeckt; und ebenso sehen wir die ganz links gelegenen Objecte nur mit dem linken Auge, und dem entsprechend urtheilen wir denn leicht, dafs, wenn jene Gegend des Gesichtsfeldes einem Auge ganz verdunkelt ist, wir die gesehenen Objecte mit dem andern Auge sehen. ROGERS hat einen Versuch mit auffallendem Erfolge angegeben, der hierher gehört. Man mache aus schwarzem Papier eine Röhre von etwa 2 Zoll Durchmesser, halte sie vor das rechte Auge und sehe damit nach dem Hintergrunde des Zimmers, am besten nach links hinüber, während man gleichzeitig einige Zoll vor dem linken Auge ein Quartblatt schwarzen Papiers hält, welches diesem den gesehenen Theil des Zimmerhintergrundes verdeckt. Dann tritt sehr energisch die Täuschung ein, als sähe man mit dem linken Auge durch eine Öffnung des Papiers nach dem Hintergrunde des Zimmers, während doch das Papier keine Öffnung hat, und nicht das linke, sondern das rechte Auge durch die Öffnung der Röhre blickt.

Übrigens mufs ich doch wiederum bemerken, dafs, wenn ich zwei stereoskopische Photographien vor mir habe, von denen eine einen dunklen oder verwaschenen Fleck hat, ich gewöhnlich den Eindruck habe, als wäre das Auge, womit ich den Fleck sehe, getrübt, und dafs ich unwillkürlich versuche, mit den Lidern dieses Auges die Trübung wegzuwischen, was doch ein Zeichen ist, dafs ich in einem solchen Falle empfinde, in welchem Auge die undeutliche Stelle abgebildet ist.

Was die Richtung betrifft, in der wir die Doppelbilder sehen, so ergiebt sich diese aus dem, was über die Richtung der monocular gesehenen Bilder oben schon gesagt worden ist. Wir sehen das Bild jedes Auges so, als hätte das von E. HERING angenommene imaginäre cyklopische Auge das entsprechende Netzhautbild erhalten, während es nach dem Fixationspunkte hingerrichtet ist. Wird also binocular gesehen, so kann man sich beide Netzhautbilder in das imaginäre cyklopische Auge sich gegenseitig deckend eingetragen denken, und dann entsprechend in den Raum projicirt. Ihre Entfernung vom Beobachter wird so weit richtig beurtheilt, als die bei  
 745 Doppelbildern unvollkommene stereoskopische Tiefenwahrnehmung und die Hilfsmittel der monocularen Beurtheilung der Entfernung dies möglich machen. Aus der angegebenen von E. HERING und J. TOWNE<sup>1</sup> gemachten Beobachtung

<sup>1</sup> Herr J. TOWNE hat die wichtigen Beobachtungen über die scheinbaren Schriktungen unabhängig von Herrn E. HERING gemacht. Er berichtet mir brieflich, dafs er die Versuche schon im Jahre 1859 gemacht habe. Seine Publicationen, so weit sie mir bekannt geworden sind, datiren aber erst von 1862 ab.





Meridiane entfernt sind. Sind die vorausgenannten Bedingungen bezüglich der Coefficienten in den Gleichungen 1) und 1 a) erfüllt, so sind die Bedingungen der Correspondenz:

$$\left. \begin{aligned} ax + by &= \alpha\xi + \beta v \\ cx + dy &= \gamma\xi + \delta v \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 1 c)$$

Eine gerade Linie des einen Feldes nennen wir correspondirend einer des anderen Feldes, wenn jeder Punkt der ersten einen correspondirenden Punkt in der andern findet.

Wenn wir beliebige Constanten mit  $l, m, n$  bezeichnen, so ist die Linie:

$$l(ax + by) + m(cx + dy) + n = 0 \dots\dots\dots 1 d)$$

correspondirend mit der Linie im andern Felde

$$l(\alpha\xi + \beta v) + m(\gamma\xi + \delta v) + n = 0 \dots\dots\dots 1 e)$$

Denn wenn wir für irgend welche constanten Werthe von  $(x, y)$  im zweiten Felde die Linie ziehen:

$$\alpha\xi + \beta v = ax + by \dots\dots\dots 1 f)$$

so ist für deren Schnittpunkt mit der Linie 1 e) auch

$$\gamma\xi + \delta v = cx + dy,$$

wie aus der Subtraction der Gleichungen 1 d) und 1 e) in diesem Falle folgt. Der Schnittpunkt von 1 e) und 1 f) ist also in diesem Falle correspondirend mit dem Punkte  $(x, y)$ .

Es wird sich die Gleichung jeder geraden Linie

$$fx + gy + h = 0 \dots\dots\dots 1 g)$$

leicht auf die Form 1 d) bringen lassen, indem man setzt

$$f = la + mc$$

$$g = lb + md$$

$$h = n$$

oder

$$l = \frac{df - gc}{ad - bc}$$

$$m = \frac{bf - ag}{bc - ad}$$

$$n = h,$$

wodurch die drei Coefficienten der Gleichung 1 d) eindeutig bestimmt sind. Indem man dann aus der Gleichung 1 d) die Gleichung 1 e) bildet, findet man die correspondirende Linie von 1 g).

Wenn wir die Gleichung 1 d) dividiren durch

$$k = \sqrt{(la + mc)^2 + (lb + md)^2},$$

so kommt die Gleichung auf die Normalform der Flächengleichungen, wobei die GröÙe  $\frac{n}{k}$  den Abstand zwischen der Fläche 1 d) und dem Nullpunkte der Coordi- 747 naten bezeichnet. Setzen wir

$$x = \sqrt{(l\alpha + m\gamma)^2 + (l\beta + m\delta)^2},$$

so bezeichnet  $\frac{n}{x}$  dieselbe Distanz für die Fläche 1 e). Beide Distanzen sind also nur dann gleich, wenn

$$k^2 = x^2.$$

Mit Berücksichtigung der Gleichung 1 b) wird dies:

$$2ml(ac + bd) - 2ml(\alpha\gamma + \beta\delta) = 0.$$

Wenn nun nicht

$$ac + bd = \alpha\gamma + \beta\delta$$

ist, das heißt, wenn die beiden Ebenenpaare 1) und 1 a) in jedem Auge nicht gleiche Winkel mit einander machen, so ist jene Bedingung nur zu erfüllen, wenn entweder  $m = 0$  oder  $l = 0$  ist, das heißt, wenn die Ebenen 1 d) und 1 e) entweder mit den Ebenen 1) oder mit den Ebenen 1 a) zusammenfallen. Diese beiden sind durch die angegebene Eigenschaft also vor allen anderen correspondirenden Ebenenpaaren, welche durch die Blicklinie gehen, ausgezeichnet. Wir können deshalb die genannten beiden Ebenen als Hauptmeridianebenen bezeichnen.

Berechnung correspondirender Strecken und Winkel in beiden Augen. Legen wir der Bequemlichkeit wegen die  $x$  und  $\xi$  Axe in den Netzhaut- horizont, so wird in den Gleichungen 1)

$$a = \alpha = 0, \quad b = \beta = 1$$

und setzen wir die Lage der scheinbar verticalen Meridiane, wie dies wenigstens in der Regel sehr nahehin der Fall ist, als symmetrisch voraus, so ist zu nehmen

$$\frac{d}{c} = - \frac{\delta}{\gamma} = - \tan \varepsilon,$$

wo  $\varepsilon$  die Abweichung zwischen dem scheinbar und wirklich verticalen Meridiane jedes Auges bezeichnet. Dann ist

$$\begin{aligned} c &= \cos \varepsilon & \gamma &= \cos \varepsilon \\ d &= - \sin \varepsilon & \delta &= \sin \varepsilon. \end{aligned}$$

Die Gleichungen der Netzhauthorizonte sind dann

$$y = 0 \text{ und } v = 0 \dots\dots\dots 1b),$$

die der scheinbar verticalen Linien

$$x \cos \varepsilon - y \sin \varepsilon = 0 \text{ und } \xi \cos \varepsilon + v \sin \varepsilon = 0 \dots\dots\dots 1i)$$

und die Gleichungen correspondirender Linien, welche durch die Blickpunkte gehen werden nach 1d) und 1e)

$$xm \cos \varepsilon + y (l - m \sin \varepsilon) = 0$$

$$\xi m \cos \varepsilon - v (l + m \sin \varepsilon) = 0.$$

746 Sind  $s$  und  $\sigma$  die Winkel, welche diese Linien mit den Axen der  $x$  und  $\xi$  machen, so ist

$$\text{tang } s = \frac{y}{x} = - \frac{m \cos \varepsilon}{l - m \sin \varepsilon}$$

$$\text{tang } \sigma = \frac{v}{\xi} = - \frac{m \cos \varepsilon}{l + m \sin \varepsilon},$$

woraus folgt:

$$\text{tang } (\sigma - s) = \frac{2m^2 \cos \varepsilon \sin \varepsilon}{l^2 + m^2 \cos (2\varepsilon)}$$

$$\text{tang } (\sigma + s) = - \frac{2ml \cos \varepsilon}{l^2 - m^2}.$$

Setzen wir nun

$$\frac{m}{l} = \text{tang } \beta,$$

so wird

$$\text{tang } (\sigma - s) = \frac{\text{tang}^2 \beta \cdot \sin (2\varepsilon)}{1 + \text{tang}^2 \beta \cos (2\varepsilon)}$$

$$\text{tang } (\sigma + s) = - \text{tang } (2\beta) \cos \varepsilon$$

oder da  $\varepsilon$  ein verhältnißmäßsig kleiner Winkel ist und deshalb  $\cos \varepsilon = \cos 2\varepsilon = 1$  und  $\sin (2\varepsilon) = 2\varepsilon$  gesetzt werden kann

$$\beta = - \frac{s + \sigma}{2}$$

$$\sigma - s = 2\varepsilon \sin^2 \beta.$$

Die Winkel  $s$  und  $\sigma$  sind von den Netzhauthorizonten ab gezählt. Sollen sie von der Visirebene ab gerechnet werden, so muß zu der Differenz noch der Winkel  $\gamma$  hinzukommen, den die Netzhauthorizonte machen, und wir erhalten dann die oben gebrauchte Formel für ihre Differenz

$$A = \gamma + 2\varepsilon \sin^2 \beta \dots\dots\dots 2).$$

Correspondirende Visirlinien und Ebenen. Ziehen wir durch jeden einzelnen eines Paares correspondirender Punkte und den Mittelpunkt der Visirlinien des zugehörigen Auges gerade Linien, so sind diese correspondirende Visirlinien. Punkte, die in solchen correspondirenden Visirlinien liegen, werden auf Deckstellen beider Netzhäute abgebildet.

Befindet sich in den bisher betrachteten Ebenen der  $(x, y)$  und  $(\xi, v)$  ein Paar correspondirender gerader Linien verzeichnet, so liegen deren Visirlinien alle in

ei durch die Mittelpunkte der Visirlinien gehenden Ebenen, welche correspondirende Ebenen genannt werden können.

Jedes Paar gerader Linien, welches in einem Paare correspondirender Ebenen liegen ist, bildet sich auf correspondirenden Linien beider Netzhäute ab.

Wenn zwei correspondirende Ebenen sich schneiden, so bildet sich die Schnittlinie auf correspondirenden Linien beider Netzhäute ab.

Die Coordinaten der Mittelpunkte der Visirlinien seien

$$\begin{aligned} x &= 0, & y &= 0, & z &= e \\ \xi &= 0, & v &= 0, & \zeta &= e. \end{aligned}$$

Nach bekannten Sätzen der analytischen Geometrie ist die Gleichung einer Ebene, welche durch den Punkt  $(x, y, z)$  geht, von der Form

$$fx + gy + \frac{h}{e}(e - z) = 0.$$

Setzen wir  $z = 0$ , so kommt die Gleichung unmittelbar auf die Form 1g) ist nach der dort angegebenen Methode die correspondirende Linie in der 1) Ebene, und danach die correspondirende Ebene zu finden.

Bilden wir die Gleichungen

$$\left. \begin{aligned} A &= ax + by & \mathfrak{A} &= \alpha\xi + \beta v \\ B &= cx + dy & \mathfrak{B} &= \gamma\xi + \delta v \\ C &= z - e & \mathfrak{C} &= \zeta - e \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 3),$$

und alle Ebenen, deren Gleichungen von der Form sind

$$\left. \begin{aligned} lA + mB + nC &= 0 \\ l\mathfrak{A} + m\mathfrak{B} + n\mathfrak{C} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 3a)$$

correspondirende Ebenen. Denn die Gleichungen sind von der Form derjenigen, welche durch die Mittelpunkte der Visirlinien gehen, und wenn wir  $z = 0$  und  $\zeta = e$  setzen, behalten wir nach dem in 1d) und 1e) ausgesprochenen Satze die entsprechenden Linien übrig, die in den  $xy$  und  $\xi v$  Ebenen liegen. Also sind die Ebenen correspondirend.

Correspondirende Visirlinien sind zu geben als Schnittlinien je zweier Paare correspondirender Ebenen.

Gleichungen für die einfach gesehenen Geraden. Bisher haben wir die Lage der correspondirenden Linien und Ebenen nur in Bezug auf die Lage des rechten Auges betrachtet, aber die Lage der Augen gegen einander und zu objecten des Raumes noch gar nicht berücksichtigt. Um das letztere zu thun, setzen wir uns die Lage aller Punkte und der Augen selbst auf ein gemeinsames dreiaxiges Coordinatensystem der  $\xi, \eta, \zeta$  bezogen. Wenn wir die  $x, y, z$  durch diese neuen Coordinaten ausdrücken, werden ihre Werthe bekannte Funktionen der  $\xi, \eta, \zeta$ , und ebenso auch die linear aus  $x, y, z$  bestehende  $A, B, C$  und  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ .

Durch jeden Raumpunkt geht im Allgemeinen eine einfach gesehene gerade Linie. Der Beweis hierfür ist zu führen, wie folgt. Die

---

Gleichungen correspondirender Ebenen sind nach 3a)

$$\left. \begin{aligned} lA + mB + nC &= 0 \\ l\mathfrak{A} + m\mathfrak{B} + n\mathfrak{C} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 3b).$$

Beide zusammengekommen geben die Lage ihrer Schnittlinie, welche, wie schon bemerkt wurde, einfach gesehen und also eine gerade Horopterlinie wird.

Wenn man in 3a) für  $\xi, \eta, \zeta$  die Coordinaten irgend eines beliebigen Punktes  $\xi_0, \eta_0, \zeta_0$  setzt, werden sich doch immer die Coefficienten  $l, m, n$  so bestimmen lassen, daß die beiden Gleichungen 3b) erfüllt sind. Da man durch Multiplication mit einem gemeinsamen Factor einem der Coefficienten einen beliebigen Werth geben kann, so sind nur zwei zu bestimmen, wozu die beiden Gleichungen im Allgemeinen ausreichen. Man erhält

750

$$\frac{l}{n} = \frac{B_0 \mathfrak{C}_0 - \mathfrak{B}_0 C_0}{A_0 \mathfrak{B}_0 - \mathfrak{A}_0 B_0}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{A_0 \mathfrak{C}_0 - \mathfrak{A}_0 C_0}{\mathfrak{A}_0 B_0 - A_0 \mathfrak{B}_0}$$

Dadurch sind Werthe der Verhältnisse von  $l, m, n$  bestimmt, welche den Gleichungen 3a) genügen, und zwar im Allgemeinen eindeutig, vorausgesetzt, daß die obigen Brüche nicht von der Form  $\frac{0}{0}$  werden, was geschieht, wenn

$$\left. \begin{aligned} A_0 \mathfrak{C}_0 &= \mathfrak{A}_0 C_0 \\ B_0 \mathfrak{C}_0 &= \mathfrak{B}_0 C_0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 3c).$$

woraus dann im Allgemeinen folgt, daß auch

$$A_0 \mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}_0 B_0$$

Wir werden später sehen, daß diese drei letzteren Gleichungen den Punkten der Horoptercurve entsprechen. Mit Ausnahme also dieser Punkte läßt sich durch jeden Punkt des Raumes eine und nur eine gerade und einfach gesehene Linie legen, durch die mittels der Gleichungen 3c) gegebenen Punkte aber beliebig viele.

Flächen zweiten Grades, auf denen die einfach gesehenen Linien liegen. Wenn man zwei Paare correspondirender Flächen hat

$$\left. \begin{aligned} l_0 A + m_0 B + n_0 C &= 0, & l_0 \mathfrak{A} + m_0 \mathfrak{B} + n_0 \mathfrak{C} &= 0 \\ l_1 A + m_1 B + n_1 C &= 0, & l_1 \mathfrak{A} + m_1 \mathfrak{B} + n_1 \mathfrak{C} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots 4),$$

so schneiden sich die beiden rechts stehenden Flächen in einer Visirlinie, die links stehenden in der correspondirenden Visirlinie. Multiplicirt man nun die unteren Gleichungen mit einem neuen Factor  $k$  und addirt sie zu den oberen, so erhält man

$$\left. \begin{aligned} (l_0 + kl_1) A + (m_0 + km_1) B + (n_0 + kn_1) C &= 0 \\ (l_0 + kl_1) \mathfrak{A} + (m_0 + km_1) \mathfrak{B} + (n_0 + kn_1) \mathfrak{C} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots 4a).$$

Es sind dies die Gleichungen eines dritten Paares correspondirender Flächen, welche aber ebenfalls durch dasselbe Paar Visirlinien gehen, wie die Flächen der

Gleichungen 4). Da nämlich für die Punkte der einen Visirlinie die beiden Gleichungen links unter 4) erfüllt sind, ist auch nothwendig die obere Gleichung 4a) für dieselben Punkte erfüllt, das heißt die Punkte jener Visirlinien liegen auch in der der letzteren Gleichung entsprechenden Fläche. Dasselbe gilt für die rechtsstehenden Gleichungen unter 4) und die untere unter 4a).

Die beiden Gleichungen 4a) geben zusammen eine einfach gesehene gerade Linie, da sie einzeln genommen correspondirenden Ebenen entsprechen. Lassen wir nun den Factor  $k$  sich continuirlich verändern, so wird im Allgemeinen auch die einfach gesehene gerade Linie ihre Lage verändern, und zwar in continuirlicher Weise. Alle diese geraden Linien, welche auf solche Weise durch continuirliche Änderung von  $k$  sich ergeben, werden sich zu einer Fläche zusammenschließen, deren Gleichung sich ergibt, wenn wir aus den beiden Gleichungen 4a) den Factor  $k$  eliminiren. So erhalten wir als Gleichung für die Fläche, in der die genannte Reihe einfach gesehener gerader Linien liegt:

$$[l_0 A + m_0 B + n_0 C] [l_1 \mathfrak{A} + m_1 \mathfrak{B} + n_1 \mathfrak{C}] \\ - [l_1 A + m_1 B + n_1 C] [l_0 \mathfrak{A} + m_0 \mathfrak{B} + n_0 \mathfrak{C}] = 0$$

oder wenn wir die Multiplication ausführen:

751

$$(l_0 m_1 - l_1 m_0) [A \mathfrak{B} - \mathfrak{A} B] + (l_1 n_0 - l_0 n_1) [\mathfrak{A} C + A \mathfrak{C}] \\ + (m_0 n_1 - m_1 n_0) [B \mathfrak{C} - \mathfrak{B} C] = 0 \dots\dots\dots 4b).$$

Da die Größen  $A, B, C$ , so wie  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$  lineare Functionen von  $x, y, z$  sind, so ist die Gleichung 4b) die einer Fläche zweiten Grades, und zwar einer solchen, in deren Oberfläche unendlich lange gerade Linien gezogen werden können. Unter den Flächen zweiten Grades lassen dies zu die Hyperboloide mit einer Mantelfläche, welche im Grenzfall in Kegel, Cylinder oder auch zwei sich schneidende Ebenen übergehen können.

Vergleichen wir nun die Gleichung 4b) mit den Gleichungen 3c), welche die Punkte geben, durch welche unendlich viele einfach gesehene gerade Linien gezogen werden können:

$$\left. \begin{aligned} A \mathfrak{C} - \mathfrak{A} C &= 0 \\ \mathfrak{B} C - B \mathfrak{C} &= 0 \\ \mathfrak{A} B - A \mathfrak{B} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 4c),$$

so sehen wir, daß auch dies Gleichungen von Hyperboloiden sind, und zwar derselben Art, wie die Fläche 4b), welche letztere bei bestimmten Werthen der Coefficienten  $l, m, n$  in je eine der Gleichungen 4c) übergehen kann.

Nehmen wir zwei von den letzteren, zum Beispiel

$$\left. \begin{aligned} A \mathfrak{C} - \mathfrak{A} C &= 0 \\ B \mathfrak{C} - \mathfrak{B} C &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 4d),$$

so werden dieselben sich in einer Curve schneiden müssen, da sie jedenfalls zwei Punkte gemein haben, nämlich die Mittelpunkte der Visirlinien, für deren einen

$$A = B = C = 0,$$

während für den andern

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{B} = \mathfrak{C} = 0$$

und jede dieser beiden Annahmen den beiden Flächengleichungen genügt. Außerdem ist leicht zu sehen, daß auch die Annahme

$$C = \mathfrak{C} = 0$$

den beiden Flächengleichungen genügt, das heißt, die gerade Schnittlinie der beiden Flächen  $C = 0$  und  $\mathfrak{C} = 0$  muß beiden Hyperboloiden angehören, also mit  $\pi$  ihrer gesamten Schnittlinie gehören. Diese Schnittlinie setzt sich also zusammen aus einer geraden Linie  $C = 0$ ,  $\mathfrak{C} = 0$ , und einem anderen Stück, welches in Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung sein wird.

Aus den beiden Gleichungen 4d) können wir  $\mathfrak{C}$  eliminieren, indem wir die obere mit  $B$ , die untere mit  $A$  multiplicieren und addieren. Wir erhalten

$$(AB - \mathfrak{A}B)C = 0.$$

Wenn also  $C$  nicht gleich Null ist, so folgt aus dieser Elimination die dritte der Gleichungen 4c)

$$\mathfrak{A}B - AB = 0 \dots\dots\dots 4e.$$

Sollte  $C$  gleich Null sein, so würde nach 4d) entweder auch  $\mathfrak{C} = 0$  sein müssen oder gleichzeitig  $A = B = 0$ . Nur im letzteren Falle würde die Gleichung 4e) 752 gültig sein; die Bedingungen  $A = B = C = 0$  gehören dem Mittelpunkt der Visirlinien des einen Auges an.

Daraus folgt, daß für die Punkte der Schnittlinie der Flächen 4d), welche nicht der geraden Linie  $C = \mathfrak{C} = 0$  angehören, auch die Gleichung 4e) erfüllt ist, daß also die drei Flächen 4e) sich in ein und derselben Curve doppelter Krümmung schneiden. Je zwei der Flächen haben immer noch eine gerade Schnittlinie, die aber im Allgemeinen nicht der dritten Fläche angehört.

Wenn man nun die Gleichungen dreier Flächen hat

$$X = 0 \quad Y = 0 \quad Z = 0,$$

die eine gemeinsame Schnittlinie besitzen, so wird auch jede Fläche, deren Gleichung von der Form ist

$$lX + mY + nZ = 0,$$

durch dieselbe Schnittlinie gehen. Da nämlich für die Punkte der Schnittlinie die ersteren drei Gleichungen erfüllt sind, ist für dieselben auch notwendig die letztere erfüllt.

Nun ist die Gleichung 4b) in der angegebenen Weise aus den drei Gleichungen 4c) zusammengesetzt. Folglich gehen alle die unendlich vielen Hyperboloide, auf denen die einfach gesehenen Linien liegen, durch die gemeinsame Schnittcurve der Gleichungen 4c).

Diese Curve ist eine sogenannte Curve dritten Grades, das heißt, sie kann von einer und derselben Ebene in drei Punkten geschnitten werden. Da nämlich die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades wie zum Beispiel der beiden Flächen 4d) im Allgemeinen vom vierten Grade ist und in vier oder zwei Punkten von einer Ebene geschnitten werden kann, einer dieser Schnittpunkte aber notwendig der geraden Linie angehört (Parallelismus wird als Schneidung im Unendlichen betrachtet), so bleiben nur drei Schnittpunkte oder einer für die Curve. So schneidet zum Beispiel die Visirebene die Horoptercurve im Fixationspunkte und in den

Mittelpunkten beider Augen. Denkt man sich die schneidende Ebene unendlich weit entfernt, so wird sie auch in ein oder drei Punkten schneiden müssen, was dann ein oder drei Paare nach entgegengesetzten Richtungen in das Unendliche auslaufender Zweige der Curve giebt.

Die Curve dritten Grades ist Horoptercurve, das heisst, in ihr schneiden sich correspondirende Visirlinien. Die drei Gleichungen 4c) können wir nämlich auch schreiben

$$\frac{A}{\mathfrak{A}} = \frac{B}{\mathfrak{B}} = \frac{C}{\mathfrak{C}} \dots\dots\dots 4f).$$

Nun sind die Gleichungen 4) die Gleichungen zweier correspondirender Visirlinien. Nehmen wir die der einen

$$\left. \begin{aligned} l_0 A + m_0 B + n_0 C &= 0 \\ l_1 A + m_1 B + n_1 C &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 4g)$$

und setzen voraus, dafs sie durch einen Punkt der Curve dritten Grades geht, in welchem dann die Gleichungen 4f) erfüllt sind, so folgt: wenn wir die beiden Gleichungen 4g) mit  $\frac{\mathfrak{A}}{A}$  multipliciren mit Berücksichtigung von 4f), dafs für denselben Punkt auch sei

$$\begin{aligned} l_0 \mathfrak{A} + m_0 \mathfrak{B} + n_0 \mathfrak{C} &= 0 \\ l_1 \mathfrak{A} + m_1 \mathfrak{B} + n_1 \mathfrak{C} &= 0, \end{aligned}$$

dafs also derselbe Punkt auch der correspondirenden Visirlinie angehört. Es schneiden sich also correspondirende Visirlinien in je einem Punkte der gemeinsamen Schnittlinie der Flächen 4c). Diese ist die Horoptercurve. Dafs nicht alle Stücke dieser Curve auch gleichzeitig Horopter sind, ist schon oben erwähnt worden.

Kegel zweiten Grades, welche durch die Horoptercurve gehen. Wenn die beiden correspondirenden Visirlinien der Gleichungen 4) sich in einem Punkte schneiden, der alsdann der Horoptercurve angehört, so gehen auch alle die durch die beiden Visirlinien gelegten Ebenen der Gleichungen 4a) durch denselben Punkt, folglich auch alle Schnittlinien dieser Ebenen, aus denen sich die Oberfläche zweiten Grades zusammensetzt. Eine Fläche zweiten Grades, in der ein System unendlich langer gerader Linien liegt, die alle durch einen und denselben Punkt gehen, ist ein Kegel zweiten Grades.

Jeder Punkt der Horoptercurve ist also die Spitze eines Kegels zweiten Grades, in dessen Mantel die ganze Horoptercurve liegt. Dieser Kegel kann in besonderen Fällen in einen Cylinder (Kegel mit unendlich entfernter Spitze) oder in ein Paar sich schneidender Ebenen (Kegel, dessen elliptische Basis eine unendlich lange Axe hat) übergehen.

Jede gerade Linie, welche zwei Punkte der Horoptercurve schneidet, gehört zwei solchen Kegeln an und wird also einfach gesehen.

Wenn sich einer der Kegel in ein Ebenenpaar verwandeln kann, so besteht die Horoptercurve aus einem ebenen Kegelschnitt und einer geraden Linie, die den Kegelschnitt in einem Punkte schneidet. Denn man denke sich zur Construction der Horoptercurve ausser dem einen Kegel, der durch die beiden Ebenen dargestellt



wird, noch einen zweiten, dessen Spitze in einer der beiden Ebenen liegen muß, so schneiden diese sich in zwei geraden Linien und einem Kegelschnitt. Die eine Gerade aber gehört nicht zur Horoptercurve.

Einzelne Fälle. Um nun die wirkliche Berechnung der Horoptercurve in einzelnen Fällen ausführen zu können, müssen wir die Ausdrücke  $A$ ,  $B$ ,  $C$  und  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  wirklich bilden als Functionen von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\delta$ . Wir nehmen an, daß der Fixationspunkt der Nullpunkt dieses letztern Systems sei, die Visirebene die Ebene der  $\xi$ ,  $\eta$ , die  $\delta$  positiv nach oben steigend. Die Halbierungslinie des Convergenzwinkels der beiden Gesichtslinien sei die Axe der  $\xi$ , der Convergenzwinkel selbst sei  $2\gamma$ , die Entfernung des Mittelpunkts der Visirlinien im rechten Auge vom Fixationspunkte sei  $a$ , die des linken  $a_1$ . Dann sind die Coordinaten für den Mittelpunkt der Visirlinien

$$\begin{aligned} \text{im rechten Auge:} \quad & \xi = a \cos \gamma, & \eta = a \sin \gamma, & \delta = 0 \\ \text{im linken Auge:} \quad & \xi = a_1 \cos \gamma, & \eta = -a_1 \sin \gamma, & \delta = 0. \end{aligned}$$

Nehmen wir nun ein zweites Coordinatensystem zu Hilfe:  $\xi_1$ ,  $\eta_1$ ,  $\delta_1$ , welches gegen das erste um die  $\delta$  Axe und den Winkel  $\gamma$  gedreht ist, so daß seine  $\xi_1$  Axe mit der Gesichtslinie des rechten Auges zusammenfällt, so haben wir

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \xi \cos \gamma + \eta \sin \gamma \\ \eta_1 &= -\xi \sin \gamma + \eta \cos \gamma \\ \delta_1 &= \delta, \end{aligned}$$

was den beiden Bedingungen genügt, daß

$$\xi_1^2 + \eta_1^2 = \xi^2 + \eta^2$$

und daß für  $\xi_1 = a$ ,  $\eta_1 = 0$ , die oben angegebenen Werthe der Coordinaten für den Mittelpunkt des rechten Auges sich finden.

754 In dem System ( $\xi_1$ ,  $\eta_1$ ,  $\delta_1$ ) fällt die Axe der  $\xi_1$  zusammen mit der Axe der  $z$  in dem oben in den Gleichungen 1) bis 1 i) gebrauchten System der  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , so daß

$$\xi_1 = a - z + e.$$

Das System der  $x y z$  ist gedreht gegen das erstere um den Winkel  $\vartheta$ , den der Netzhauthorizont mit der Visirebene macht; also ist

$$\begin{aligned} x &= \eta_1 \cos \vartheta - \delta_1 \sin \vartheta \\ y &= \eta_1 \sin \vartheta + \delta_1 \cos \vartheta, \end{aligned}$$

wobei der Winkel  $\vartheta$  positiv gerechnet ist für eine Drehung des oberen Endes des senkrechten Meridians nach rechts herum, also beim Blick nach links oben und rechts unten. Demgemäß ist

$$\left. \begin{aligned} x &= -\xi \sin \gamma \cos \vartheta + \eta \cos \gamma \cos \vartheta - \delta \sin \vartheta \\ y &= -\xi \sin \gamma \sin \vartheta + \eta \cos \gamma \sin \vartheta + \delta \cos \vartheta \\ z &= -\xi \cos \gamma - \eta \sin \gamma + a + e \end{aligned} \right\} \dots \dots 5).$$

Daraus bilden sich nun nach Gleichungen 3) mit Berücksichtigung von 1 h) und 1 i), sowie der dort vorausgeschickten Festsetzungen, die Ausdrücke:

$$\left. \begin{aligned} A &= y = -x \sin \gamma \sin \vartheta + y \cos \gamma \sin \vartheta + z \cos \vartheta \\ B &= x \cos \varepsilon - y \sin \varepsilon \\ &= -x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + y \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - z \sin (\vartheta + \varepsilon) \\ C &= z - e = a - x \cos \gamma - y \sin \gamma \end{aligned} \right\} \dots\dots 5a).$$

In ähnlicher Weise finden sich die Ausdrücke  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ , wenn  $\vartheta_1$  der Radhugswinkel für das linke Auge ist:

$$\left. \begin{aligned} \mathfrak{A} &= +x \sin \gamma \sin \vartheta_1 + y \cos \gamma \sin \vartheta_1 + z \cos \vartheta_1 \\ \mathfrak{B} &= x \sin \gamma \cos (\vartheta_1 - \varepsilon) + y \cos \gamma \cos (\vartheta_1 - \varepsilon) - z \sin (\vartheta_1 - \varepsilon) \\ \mathfrak{C} &= a_1 - x \cos \gamma + y \sin \gamma \end{aligned} \right\} \dots\dots 5b).$$

Vereinfachte Formen der Horoptercurve. Solche finden sich namentlich in den Fällen, wo ein Paar correspondirender Ebenen ganz in einander fällt.  $n$  schneidet sich nämlich nothwendig jede in dieser Ebene liegende Visirlinie eines Auges mit der correspondirenden des andern und giebt einen Punkt der Horoptercurve, der in der Ebene liegt. Sollten die Visirlinien parallel laufen, so sind sie unendlich entfernte Punkte dieser Curve. Dann ist also ein Theil der Horoptercurve eine ebene Curve oder eine gerade Linie. Ist das erstere der Fall, machen wir irgend einen Punkt dieser Curve zum Mittelpunkt eines durch die Horoptercurve gelegten Kegels, so wird ein Theil dieser Kegelfläche eine Ebene, Rest der Kegelfläche kann dann nur eine zweite Ebene sein. Denn nur der Fall, wo der Kegel in zwei sich schneidende Ebenen übergeht, erlaubt, daß ein Theil der Kegeloberfläche eben sei. Wenn diese anderen Ebenen, die nicht mit der dem Horopter angehörige ebene Curve gehen, eine gemeinsame Schnittlinie haben, so kann diese nur eine gerade Linie sein, die durch einen Punkt der beiden ebenen Curve gehen muß. Zugleich folgt, daß die Curve eine Curve zweiten Grades sein muß, denn nur unter dieser Bedingung können die Kegel, die ihre Spitze in der geraden Linie haben, Kegel zweiten Grades sein. Ist zweitens die Schnittcurve der correspondirenden Visirlinien eine gerade Linie, so folgt, daß jeder Kegel, der einen außerhalb dieser geraden Linie liegenden Theil der Horoptercurve zur Spitze hat, einen ebenen Theil hat, folglich aus zwei Ebenen besteht, und daß daher der Rest der Horoptercurve eine ebene Curve sein müsse.

Auch ist leicht einzusehen, daß, wenn die Horoptercurve aus einer geraden Linie und einem Kegelschnitt besteht, die Augenmittelpunkte in dem letzteren liegen müssen und die Ebene desselben ein correspondirendes und zusammenfallendes Paar beider Augen darstellt. Denn es kann nicht ein Auge in der Curve, sondern jedes in der geraden Linie liegen; sonst würde ein Bündel von Visirlinien existiren, welches nach den Punkten der Curve geht und daher in einer Ebene liegt, während die beiden in einer gekrümmten Kegeloberfläche liegen, was nicht angeht. Und wenn beide Augen in der geraden Linie liegen, so müßte diese ein Paar correspondirender Visirlinien vertreten, und giebt es dann außerhalb dieser geraden Linie noch irgend einen Punkt der Horoptercurve, z. B. den Fixationspunkt, so müßte die durch ihn und die Augen gelegte Ebene Vertreterin eines correspondirenden Paares und müßte eine Horoptercurve enthalten.

Die Bedingung für die Zusammensetzung der Horoptercurve aus einem ebenen Kegelschnitt und einer diesen schneidenden geraden Linie ist also, daß es Werte von  $l$ ,  $m$ ,  $n$  giebt, für welche die Gleichungen

$$lA + mB + nC = 0$$

$$l\mathfrak{A} + m\mathfrak{B} + n\mathfrak{C} = 0$$

identisch werden. Bringt man mittels der Gleichungen 5a) und 5b) diese Gleichungen auf die Form

$$f\xi + f_1\eta + f_2\zeta + f_3 = 0$$

$$g\xi + g_1\eta + g_2\zeta + g_3 = 0,$$

so muß sein

$$\frac{f}{g} = \frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_3}{g_3}.$$

Der letzte Bruch ist unabhängig von  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ; in den drei ersten sind Zähler und Nenner lineare Functionen von  $l$ ,  $m$ ,  $n$ . Indem man jeden der drei ersten Brüche dem letzten gleich setzt, erhält man drei lineare Gleichungen für  $l$ ,  $m$ ,  $n$  ohne constantes Glied, und daraus folgt, daß die Determinante der Coefficienten von  $l$ ,  $m$ ,  $n$  gleich Null sein muß. Dies giebt eine Gleichung zwischen den Größen  $a$ ,  $a_1$ ,  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{A}_1$  und  $\gamma$ , welche erfüllt sein muß, wenn die Horoptercurve die oben angegebene Gestalt erhalten soll. Es ist nicht nöthig, diese Rechnung hier durchzuführen, da uns nur diejenigen Stellungen der Augen näher interessiren, die nach dem LISTING'schen Gesetze möglich sind.

Geometrisch läßt sich die Bedingung hierfür folgendermaassen ausdrücken. Bezeichnen wir die Linie, welche die beiden Mittelpunkte der Visirlinien verbindet, mit  $F$ . Diese Linie kann sowohl als eine der Visirlinien des rechten Auges, wie als eine des linken betrachtet werden. Im ersteren Sinne muß es zu ihr eine correspondirende Visirlinie  $H$  im linken Auge geben, im zweiten Sinne eine correspondirende  $G$  im rechten Auge. Wenn  $G$  und  $H$  sich schneiden, so liegen sie mit  $F$  in einer Ebene, welche dann für beide Augen correspondirend liegt, da zwei Paar correspondirender Visirlinien in ihr liegen,  $F$  und  $G$  für das rechte,  $F$  und  $H$  für das linke Auge. Bei jeder Stellung der Augen wird es also möglich sein, durch Drehung des einen um seine Gesichtslinie eine Stellung herbeizuführen, welche der Horoptercurve die gewünschte einfache Gestalt giebt.

756 Für Augen, welche dem Gesetze von LISTING folgen, symmetrisch gebildet sind und deren Netzhauthorizonte bei parallelen Blicklinien in der Visirebene liegen, ist es klar, daß die genannte Bedingung erfüllt ist, erstens bei den symmetrischen Stellungen der Augen, wo die Linien  $G$  und  $H$  auch symmetrisch liegen und sich daher in der Medianebene schneiden müssen, zweitens wenn die Visirebene sich in ihrer Primärstellung befindet, weil dann die einander correspondirenden Netzhauthorizonte in ihr liegen. Es sind dies übrigens theoretisch nicht die einzigen Fälle der Art, sondern es würden für Augen, die dem LISTING'schen Gesetze genau folgen, in nach unten und seitlich gerichteten Stellungen noch gewisse sehr große Entfernungen des Fixationspunktes existiren, in denen die Visirebene für beide Augen correspondirend wäre und daher eine ebene Ellipse als Horoptercurve enthalten müßte. Von irgend welcher praktischer Wichtigkeit sind aber diese Fälle

nicht, da bei sehr großen Entfernungen des Fixationspunktes überhaupt die Beobachtungen über die Lage der einfach gesehenen Punkte zu unbestimmt werden. In Augen, wo die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane fehlt, rücken die erwähnten Lagen des Fixationspunktes in unendliche Entfernung hinaus.

Mit Auslassung kleiner Größen ist in solchen Fällen die Entfernung  $\varrho$  des Fixationspunktes von dem Mittelpunkt eines mitten zwischen den Augen gelegenen ideellen Auges, wenn  $\alpha$  der Erhebungswinkel,  $\gamma$  der Seitenwendungswinkel dieses Auges wäre,  $a$  der halbe Abstand der wirklichen Augen,  $\varepsilon$  die halbe Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane von einander

$$\varrho = \pm \frac{a \cos \gamma}{\sin \varepsilon \sin \beta \cos \beta}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}.$$

In der Nähe der Medianebene, wo  $\gamma = 0$  und in der Nähe der Primärlage der Visirebene, wo  $\alpha = 0$ , wird  $\beta = 0$  und  $\varrho$  unendlich lang. Positive Werthe hat es nur für ein negatives  $\alpha$ , also unterhalb der Visirebene.

Wir wollen jetzt die beiden erst erwähnten Fälle behandeln, in denen der Horopter aus einer geraden Linie und einer ebenen Curve besteht, Fälle, welche eine gewisse Wichtigkeit für die Beobachtungen haben.

A. Der Fixationspunkt liegt in der Medianebene in unendlicher Entfernung. Dann wird in den Gleichungen 5a) und 5b)

$$a = a_1 \quad \vartheta = -\vartheta_1$$

$$\left. \begin{aligned} A &= -x \sin \gamma \sin \vartheta + y \cos \gamma \sin \vartheta + z \cos \vartheta \\ B &= -x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + y \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - z \sin (\vartheta + \varepsilon) \\ C &= a - x \cos \gamma - y \sin \gamma \\ \mathfrak{A} &= -x \sin \gamma \sin \vartheta - y \cos \gamma \sin \vartheta + z \cos \vartheta \\ \mathfrak{B} &= x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + y \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + z \sin (\vartheta + \varepsilon) \\ \mathfrak{C} &= a - x \cos \gamma + y \sin \gamma \end{aligned} \right\} \dots 6).$$

Zusammenfallende correspondirende Ebenen finden sich, wenn wir setzen

$$A \sin \gamma + C \cos \gamma \sin \vartheta = 0$$

$$\mathfrak{A} \sin \gamma + \mathfrak{C} \cos \gamma \sin \vartheta = 0,$$

denn beide Gleichungen geben identisch, vorausgesetzt, daß nicht  $\sin \gamma$  und  $\sin \vartheta$  gleichzeitig gleich Null sind:

$$x \sin \vartheta - z \sin \gamma \cos \vartheta - a \cos \gamma \sin \vartheta = 0 \dots \dots \dots 6a).$$

Dies ist also die Ebene des Kegelschnitts. Ferner wird für

$$y = 0 \text{ und } x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) = -z \sin (\vartheta + \varepsilon) \dots \dots \dots 6b)$$

$$A = \mathfrak{A} = -x \sin \gamma \sin \vartheta + z \cos \vartheta$$

$$B = \mathfrak{B} = 0$$

$$C = \mathfrak{C} = a - x \cos \gamma.$$

Also sind die Punkte der durch die Gleichungen 6b) gegebenen geraden Linie für beide Augen correspondirend, und jene Linie ist die gerade Horopterlinie.

Ihr parallel müssen die Kanten des Cylinders sein, auf dem die Horopterlinie liegt, und diejenigen Ebenen, die sich in den Cylinderkanten schneiden. Bildet man die Gleichung der correspondirenden Ebenen:

$$A \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) - C \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$

$$\mathfrak{A} \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) - \mathfrak{C} \sin \gamma \cos \varepsilon = 0,$$

so reduciren sich diese für  $\eta = 0$  auf

$$\frac{a \tan \gamma \cos \varepsilon}{\cos \vartheta} - \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - \mathfrak{z} \sin (\vartheta + \varepsilon) = 0.$$

Ihre Schnittlinie ist also, wie man aus der Vergleichung mit 6b) sieht, der geraden Horopterlinie parallel und liegt wie diese in der Medianebene.

Andererseits schneiden sich in der geraden Horopterlinie gemäß 6b) die Ebenen

$$B = \mathfrak{B} = 0$$

und die correspondirenden Ebenen

$$A \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{x} B - C \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$

$$\mathfrak{A} \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{x} \mathfrak{B} - \mathfrak{C} \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$

schneiden sich also ebenfalls in Linien, die der geraden Horopterlinie parallel sind. Eliminirt man aus ihnen  $\mathfrak{x}$ , so erhält man

$$(A\mathfrak{B} - B\mathfrak{A}) \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) - (\mathfrak{B}C - B\mathfrak{C}) \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$

als Gleichung des Cylinders. Diese Gleichung reducirt giebt:

$$\left. \begin{aligned} \frac{a^2 \sin^2 \gamma \cos^2 \varepsilon}{4 \cos^2 \gamma \cos^2 \vartheta} &= \eta^2 \left[ \sin^2 \gamma \cos^2 (\vartheta + \varepsilon) + \frac{\sin \vartheta \cdot \sin 2(\vartheta + \varepsilon)}{2 \cos \vartheta} \right] \\ &+ \left[ \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{z} \sin (\vartheta + \varepsilon) - \frac{a \sin \gamma \cos \varepsilon}{2 \cos \gamma \cos \vartheta} \right]^2 \end{aligned} \right\} \quad . \quad 6c).$$

Es ist dies die Gleichung eines Cylinders, welcher die Ebenen  $\mathfrak{z} = \text{Const.}$  schneidet in Kegelschnitten, deren  $\mathfrak{x}$  Axe stets reell ist, nämlich

$$X = \frac{a \cos \varepsilon}{2 \cos \gamma \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon)}.$$

758 Die  $\eta$  Axe dagegen ist dies nicht nothwendig, ihr Quadrat ist

$$Y^2 = \frac{a^2 \tan^2 \gamma \cos^2 \varepsilon}{4 \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon) [\sin^2 \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) \cos \vartheta + \sin \vartheta \sin (\vartheta + \varepsilon)]}.$$

In diesem Ausdrucke werden  $\cos \vartheta$  und  $\cos (\vartheta + \varepsilon)$  für die ausführbaren Augenbewegungen immer positiv sein. Wenn aber  $\tan \vartheta \tan (\vartheta + \varepsilon)$  negativ wird und sein absoluter Werth dabei größer als der von  $\sin^2 \gamma$ , so wird  $Y$  imaginär und der Schnitt eine Hyperbel. Da  $\varepsilon$  der Regel nach einen kleinen positiven

Werth hat, so muß  $\vartheta$  zu diesem Zwecke noch kleinere negative Werthe haben, was nur bei abwärts gerichteten Gesichtslinien und weiter Entfernung des Fixationspunktes eintreten kann.

Die  $Y$  Axe dieses in der Visirebene liegenden Kegelschnitts fällt mit der ebenen Horoptercurve zusammen; um die mediane Axe der letzteren zu finden, setze man den Werth von  $\xi$  aus der Gleichung 6a) in 6c) und zugleich  $\eta = 0$ , so kann man für das eine und andere Ende der betreffenden Axe die Coordinaten  $\xi_0, \xi_1$  und  $\xi_0, \xi_1$  finden. Die Größe der stets reellen Axe  $X_1$  ist dann gegeben durch die Gleichung

$$X_1^2 = \frac{1}{4} (\xi_1 - \xi_0)^2 + \frac{1}{4} (\xi_1 - \xi_0)^2 \\ = \frac{a^2 \sin^2 \gamma \cos^2 \varepsilon (\sin^2 \gamma \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta)}{4 \cos^2 \gamma \cos^2 \vartheta [\sin^2 \gamma \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon) + \sin \vartheta \cdot \sin (\vartheta + \varepsilon)]^2}$$

und es findet sich

$$\frac{X_1^2}{Y^2} = \frac{\sin^2 \gamma + \tan^2 \vartheta}{\sin^2 \gamma + \tan \vartheta \cdot \tan (\vartheta + \varepsilon)}.$$

Man kann zur Construction der Horoptercurve statt des bisher betrachteten Cylinders auch den Kegel des Verticalhoroptars

$$B\mathcal{C} - \mathcal{B}C = 0$$

benutzen, oder

$$[\xi \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \xi \sin (\vartheta + \varepsilon)] [a - \xi \cos \gamma] - \eta^2 \cos \gamma \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) = 0$$

für  $\xi = 0$ , das heißt in der Visirebene, ist die Schnittlinie ein Kreis, gegeben durch folgende Gleichung:

$$\left( \xi - \frac{a}{2 \cos \gamma} \right)^2 + \eta^2 = \frac{a^2}{4 \cos^2 \gamma}.$$

Dieser Kreis geht durch die Punkte

$$\xi = 0 \quad \eta = 0$$

$$\xi = \frac{a}{\cos \gamma}, \quad \eta = 0$$

$$\xi = a \cos \gamma \quad \eta = a \sin \gamma$$

$$\xi = a \cos \gamma \quad \eta = -a \sin \gamma.$$

Die zwei ersten sind der Fixationspunkt und der ihm diametral gegenüber liegende Punkt, die beiden andern sind die Mittelpunkte beider Augen. Dadurch ist dieser Kreis gegeben.

Der Kegel schneidet die Medianebene,  $\eta = 0$ , in den beiden Linien

759

$$\xi \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) = -\xi \sin (\vartheta + \varepsilon)$$

$$\xi \cos \gamma = a.$$

Ersteres ist die gerade Horopterlinie, die zweite ist senkrecht zur Visirebene und schneidet diese in dem dem Fixationspunkt diametral gegenüberliegenden Punkte des Kreises. Die Ordinaten der Spitze des Kegels sind also

$$\xi = \frac{a}{\cos \gamma}$$

$$\zeta = -a \tan \gamma \cdot \cotang (\vartheta + \varepsilon).$$

Um die Lage der betreffenden Linien und Ebenen zu finden für Augen, welche dem Gesetze von LISTING folgen, setzen wir den Erhebungswinkel zwischen der Primärlage der Visirebene und ihrer actuellen Lage gleich  $\beta$ , und haben dann

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \gamma \sin \beta}{\cos \gamma + \cos \beta} \dots \dots \dots 7).$$

Die Gleichung 6 a) für die Ebene der Horoptercurve wird dann

$$(\xi - a \cos \gamma) - \zeta \frac{\cos \gamma + \cos \beta}{\sin \beta} = 0 \dots \dots \dots 7 a).$$

Die Gleichungen für die Primärrihtung der Gesichtslinien sind unter diesen Umständen:

$$\eta = \pm a \sin \gamma \text{ und } \zeta = (\xi - a \cos \gamma) \tan \beta \dots \dots \dots 7 b).$$

Die Gleichungen für die actuellen Lagen der Blicklinien sind

$$\zeta = 0 \text{ und } \eta = \pm \xi \tan \gamma \dots \dots \dots 7 c).$$

Der Fixationspunkt ist auf den letzteren Linien in der Entfernung  $a$  von den Mittelpunkten der Augen. Schneiden wir auch auf den Linien 7 b) einen Punkt in der Entfernung  $a$  vom Mittelpunkte des betreffenden Auges ab, so sind dessen Coordinaten

$$\xi = a (\cos \gamma - \cos \beta), \quad \eta = \pm a \sin \gamma, \quad \zeta = -a \sin \beta \dots \dots \dots 7 d).$$

Die Coordinaten eines Punktes dagegen, der in der Mitte zwischen diesem Punkte 7 d) und dem Fixationspunkte liegt, für welchen letzteren

$$\xi = 0 \quad \eta = 0 \quad \zeta = 0$$

sind halb so groß als die Coordinaten 7 d), also

$$\xi = \frac{1}{2} a (\cos \gamma - \cos \beta), \quad \eta = \pm \frac{1}{2} a \sin \gamma, \quad \zeta = -\frac{1}{2} a \sin \beta \dots \dots 7 e).$$

Diese letzteren Werthe erfüllen nun die Gleichung 7 a) und es liegen also die beiden Punkte 7 e) in der Ebene der Horoptercurve.

Die Ebene des Kegelschnitts, der der Horoptercurve angehört, wird also bei medianem Fixationspunkte gefunden, wenn man die Winkel, welche die primäre und

actuelle Lage jeder Blicklinie bilden, halbirt und durch die Halbierungslinie eine Ebene legt. Dieser Umstand ist bei der Construction auf Seite 865, *Fig. 249*, benutzt. Wenn man ferner durch den Mittelpunkt jedes Auges eine Ebene legt, senkrecht zu der Verbindungslinie desselben Punktes mit dem zugehörigen Punkte der Sehungen 7e), so ist deren Gleichung

$$-a \cos \gamma (\cos \gamma + \cos \beta) - (a \sin \gamma \mp \eta) \sin \gamma + \beta \sin \beta = 0 \dots \dots \dots 7f).$$

Nimmt man hierzu noch die Gleichung einer Ebene, welche in der Entfernung  $\epsilon \sin \gamma \cotang \epsilon$  unterhalb der Primärlage der Visirebene 7d) liegt und deren Gleichung ist:

$$\beta \cdot \cos \beta + a \cotang \epsilon \cdot \sin \gamma = (\xi - a \cos \gamma) \sin \beta \dots \dots \dots 7g),$$

ergiebt sich, daß die Ebenen, welche durch die gerade Horopterlinie gehen, sich

$$\xi \sin \gamma + \beta \tan (\vartheta + \epsilon) = 0, \quad \eta = 0$$

die beiden Ebenen 7f) und 7g) durch einen Punkt gehen, da die Werthe von  $\xi$  aus je drei dieser Gleichungen, mit Berücksichtigung von 7) in die vierte eingesetzt, diese identisch machen. Darauf beruht die Construction der geraden Horopterebenen in *Fig. 250*.

B. Fixationspunkt in der Mittelebene in unendlicher Entfernung. besondere Untersuchung verdient noch der Fall, wenn  $\sin \gamma$  und  $\sin \vartheta$  gleich Null sind, ein Fall, den wir oben bei der Gleichung 6a) von der Untersuchung ausschließen mußten. Es sind alsdann die Gesichtslinien einander parallel in die Ferne gerichtet. Die Entfernung  $a$  des Fixationspunktes und die innere  $\xi$  wird unendlich groß, aber die Größe  $a \sin \gamma$ , welche die halbe Entfernungsweite der Augen ist, bleibt constant, wir wollen sie mit  $b$  bezeichnen, und  $\xi - a$  mit  $\mathfrak{A}$ . Dann wird

$$\begin{aligned} A &= \beta & \mathfrak{A} &= \beta \\ B &= -b \cos \epsilon + \eta \cos \epsilon - \beta \sin \epsilon & \mathfrak{B} &= b \cos \epsilon + \eta \cos \epsilon + \beta \sin \epsilon \\ C &= -\xi & \mathfrak{C} &= -\xi. \end{aligned}$$

Dann sind also die Bedingungen der Correspondenz, daß

$$A = \mathfrak{A}, \quad B = \mathfrak{B}, \quad C = \mathfrak{C}$$

erfüllt für alle Punkte, für welche

$$b \cos \epsilon + \beta \sin \epsilon = 0.$$

Dies sind die Punkte einer Ebene, die in der Entfernung  $-b \cotang \epsilon$  unterhalb der Visirebene liegt. Diese bildet also in diesen Fällen den Horopter.

Der Fixationspunkt liegt in der Primärlage der Visirebene. Dem LISTING'schen Gesetze wird

$$\vartheta = \vartheta_1 = 0$$

so nach 5a) und 5b)



$$\left. \begin{aligned}
 A &= \mathfrak{z} \\
 B &= -\mathfrak{x} \sin \gamma \cos \varepsilon + \mathfrak{y} \cos \gamma \cos \varepsilon - \mathfrak{z} \sin \varepsilon \\
 C &= a - \mathfrak{x} \cos \gamma - \mathfrak{y} \sin \gamma \\
 \mathfrak{A} &= \mathfrak{z} \\
 \mathfrak{B} &= \mathfrak{x} \sin \gamma \cos \varepsilon + \mathfrak{y} \cos \gamma \cos \varepsilon + \mathfrak{z} \sin \varepsilon \\
 \mathfrak{C} &= a_1 - \mathfrak{x} \cos \gamma + \mathfrak{y} \sin \gamma
 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots$$

761 Der Kegel

$$A\mathfrak{C} - \mathfrak{A}C = 0$$

wird

$$\mathfrak{z} [a_1 - a + 2\mathfrak{y} \sin \gamma] = 0 \dots\dots\dots$$

und zerfällt also in die beiden Ebenen

$$\mathfrak{z} = 0 \text{ und } \mathfrak{y} = \frac{a - a_1}{2 \sin \gamma} \dots\dots\dots$$

Die Fläche

$$A\mathfrak{B} - \mathfrak{A}B = 0$$

wird

$$2\mathfrak{z} [\mathfrak{x} \sin \gamma \cos \varepsilon + \mathfrak{z} \sin \varepsilon] = 0$$

und zerfällt also in die beiden Ebenen

$$\mathfrak{z} = 0 \text{ und } \mathfrak{x} \sin \gamma + \mathfrak{z} \tan \varepsilon = 0 \dots\dots\dots$$

Die Fläche endlich

$$B\mathfrak{C} - \mathfrak{B}C = 0$$

wird

$$\begin{aligned}
 &-(\mathfrak{x} \sin \gamma \cos \varepsilon + \mathfrak{z} \sin \varepsilon)(a_1 + a - 2\mathfrak{x} \cos \gamma) + 2\mathfrak{y}^2 \cos \gamma \sin \gamma \cos \varepsilon \\
 &\quad + (a_1 - a)\mathfrak{y} \cos \gamma \cos \varepsilon = 0,
 \end{aligned}$$

was die Gleichung eines Hyperboloids ist. Die Schnittlinie desselben mit der Ebene  $\mathfrak{z} = 0$  ist

$$\left(\mathfrak{x} - \frac{a + a_1}{4 \cos \gamma}\right)^2 + \left(\mathfrak{y} + \frac{a_1 - a}{4 \sin \gamma}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{a^2 + a_1^2 - 2aa_1 \cos 2\gamma}{(\sin 2\gamma)^2}$$

ein Kreis, welcher durch die Punkte

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{x} &= 0 & \mathfrak{y} &= 0 \\
 \mathfrak{x} &= a \cos \gamma & \mathfrak{y} &= a \sin \gamma \\
 \mathfrak{x} &= a_1 \cos \gamma & \mathfrak{y} &= -a_1 \sin \gamma
 \end{aligned}$$

hindurchgeht, der MÜLLER'sche Horopterkreis.

Die gerade Linie des Horopters ist demgemäß die durch die beiden unter 8 b) und 8 c) aufgeführten Gleichungen gegebene Linie

$$\eta = \frac{a - a_1}{2 \sin \gamma} \text{ und } \xi \sin \gamma + \delta \tan \varepsilon = 0.$$

Ihr Schnittpunkt mit der Visirebene liegt auch im Horopterkreise, sie läuft der Medianebene  $\eta = 0$  parallel. Die Entfernung des Schnittpunktes von den beiden Augenmittelpunkten ist die gleiche, nämlich

$$\frac{\sqrt{a^2 - 2aa_1 \cos 2\gamma + a_1^2}}{2 \sin \gamma} = \frac{b}{\sin \gamma},$$

wenn wir die halbe Distanz der Augen von einander mit  $b$  bezeichnen. Macht man

$$\xi = \frac{b}{\sin \gamma},$$

so wird

$$\delta = - \frac{b}{\tan \varepsilon}.$$

Diese letztere Größe ist aber die Entfernung der Horopterfläche unter der 762 Visirebene, wenn beide Gesichtslinien der Medianebene parallel sind, und so ergibt sich die oben angegebene Construction der geraden Horopterlinie.

Geschichtliches. Die Frage über den Grund des Einfach- und Doppeltsehens ist schon sehr alt. Schon GALENUS<sup>1</sup> (geb. 113 p. C.) machte zur Erklärung des ersteren die Annahme, daß sich Sehnervenfasern im Chiasma der Sehnerven verbänden. Dieser anatomischen Hypothese schlossen sich später an I. NEWTON,<sup>2</sup> ROHAULT,<sup>3</sup> HARTLEY,<sup>4</sup> W. H. WOLLASTON,<sup>5</sup> JOH. MÜLLER.<sup>6</sup> Eine zweite Ansicht suchte die Schwierigkeit durch die Annahme zu beseitigen, daß wir immer nur mit einem Auge auf einmal sahen. Dieser Meinung war PORTA.<sup>7</sup> Ihm schlossen sich GASSENDI,<sup>8</sup> TACQUET, GALL und DU TOUR<sup>9</sup> an. Letzterer berief sich dabei namentlich auf die Phänomene des Wettstreits zwischen beiden Gesichtsfeldern und beschränkte die Annahme auch dahin, daß bald gleichzeitig mit beiden Augen, bald nur mit einem gesehen werden sollte.

Die dritte davon verschiedene Ansicht war die sogenannte Projectionstheorie, wobei das Einfachsehen für einen Act unseres Verständnisses der Gesichtsempfindungen erklärt wird. In ihrem Sinne äußert sich schon KEPLER;<sup>10</sup> mit ihm gleichzeitig stellte AGUILONIUS<sup>11</sup> die Theorie auf, daß wir die Gesichtsbilder immer auf eine gewisse durch den Fixationspunkt gehende Ebene projecirten, die er den Horopter nannte, und daß sie einfach oder doppelt erschienen, je nachdem ihre Projection einfach oder doppelt

<sup>1</sup> GALENUS, *De usu partium*. Lib. X. cap. 12.

<sup>2</sup> I. NEWTON, *Opticks*. 1717. p. 320. Query 15.

<sup>3</sup> ROHAULT, *Traité de physique*. Paris 1671 und 1682. Part. I, cap. 81.

<sup>4</sup> HARTLEY, *Observations on man*. I, 207.

<sup>5</sup> W. H. WOLLASTON, *Phil. Trans.* 1824. I, 222.

<sup>6</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1826.

<sup>7</sup> PORTA, *De refractione*. p. 142. 1593.

<sup>8</sup> GASSENDI, *Opera*. Vol. II, p. 395.

<sup>9</sup> TACQUET, GALL und DU TOUR, *Acta Paris*. 1743. p. 334. *Mém. des savants étrang.* III, 514. IV 499. V 677.

<sup>10</sup> KEPLER, *Dioptrice*. Propos. LXII.

<sup>11</sup> AGUILONIUS, *Opticorum Libri VI*. Antwerp. 1613.

v. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik*, 2. Aufl.

wäre. Näher an KEPLER's Ansicht schließt sich PORTERFIELD an, indem er meint, wir sähen die Objecte nicht doppelt, weil jedes Auge sie an ihren richtigen Platz verlegt, was später dann so formulirt wurde, daß wir sie in den Kreuzungspunkt der Visirlinien verlegen. In dieser Form ausgesprochen, würde das Gesetz mit der Existenz der Doppelbilder im Widerspruch sein. PORTERFIELD erwähnt wohl solche, die bei einer durch Druck oder Zerrung herbeigeführten Zwangsstellung des Auges eintreten, setzt hier aber voraus, daß ein Irrthum über die Stellung des Auges stattfindet.

Diese drei Ansichten liegen auch den neueren Theorien meist mehr oder weniger vermischt zu Grunde; ein wesentlicher Fortschritt geschah aber durch genauere Untersuchungen der thatsächlichen Verhältnisse.

Das Gesetz der Erscheinungen wurde zuerst genauer und im Wesentlichen richtig von J. MÜLLER<sup>1</sup> formulirt, indem er das Einfachsehen und Doppelsehen davon abhängig machte, ob sich die Bilder des betreffenden Punktes auf identische oder nicht identische Punkte beider Netzhäute entwerfen. Für die Lage der identischen Punkte gab er für die Hauptsache nach richtige Regel, daß sie von der Mitte der Netzhäute in gleicher Richtung gleich weit entfernt lägen. Er spricht sich dabei nicht mit Bestimmtheit für eine besondere anatomische Hypothese (Vereinigung der identischen Fasern im Chiasm der Sehnerven oder im Gehirn) aus, behauptet aber, der Grund der Identität müsse ein organischer sein.

Genauere Bestimmungen der Lage der identischen oder correspondirenden Punkte wurden später namentlich von VOLKMANN<sup>2</sup> gegeben. Mit der beobachteten Lage der identischen Punkte war aber die Annahme des AGUILONIUS, daß der Horopter eine Ebene sei, unverträglich. Schon VIETH<sup>3</sup> und JOH. MÜLLER hatten eingesehen, daß sein 763 Schnitt mit der Visirebene ein durch den Fixationspunkt und die beiden Augen gehender Kreis sein müsse. Später zeigten A. P. PREVOST<sup>4</sup> und BURCKHARDT, daß in den Augenstellungen ohne Raddrehung zu dem MÜLLER'schen Kreise noch eine gerade Linie komme, daß der Horopter also überhaupt im Allgemeinen keine Fläche sei. HERING<sup>5</sup> erwies, daß der Horopter im Allgemeinen immer eine Linie sein müsse; damit war seine Bedeutung im Sinne des AGUILONIUS aufgehoben. Die allgemeine Lösung des Horopterproblems, welche noch die Kenntniß des Augenbewegungsgesetzes erfordert und übrigens eine rein mathematische Aufgabe war, habe ich selbst und Herr E. HERING fast gleichzeitig gegeben.<sup>6</sup> Daran schließt sich dann noch eine Arbeit von

<sup>1</sup> J. MÜLLER, *Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig 1826. p. 71. *Lehrbuch der Physiologie*. 1840. II, 376—87.

<sup>2</sup> A. W. VOLKMANN, *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Zweites Heft. Leipzig 1864.

<sup>3</sup> VIETH, *Gilbert's Annalen*. LVIII, 233.

<sup>4</sup> A. P. PREVOST, *Essai sur la théorie de la vision binoculaire*. Genève 1843; und *Poggendorff's Annalen*. 1844. Bd. LXII, S. 548.

<sup>5</sup> HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Heft III, S. 196—199. Leipzig 1863. Heft IV, 1864.

<sup>6</sup> Meine erste Mittheilung wurde gemacht der naturhistorisch-medizinischen Gesellschaft zu Heidelberg am 24. October 1862, das Manuscript eingereicht am 8. November 1862. Darin sind zum ersten Male Gleichungen für die Form des Horopters im allgemeinen Falle gegeben, freilich noch nicht in ihrer einfachsten Form, indem er als Schnittlinie einer Fläche zweiten und einer vierten Grades ausgedrückt ist. Auch ist darin noch nicht die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane berücksichtigt. Die Gestalt des Horopters im allgemeinen Falle ist darin kurz beschrieben. Ehe diese nur als vorläufige betrachtete Mittheilung durch den Druck veröffentlicht war (Herbst 1863), erschien das 3. Heft der Beiträge zur Physiologie von Herrn E. HERING, worin der Nachweis geführt war, daß der Horopter jedenfalls immer mindestens eine Linie (wenn nicht Fläche) sein müsse, die Gestalt desselben aber nur für die schon früher behandelten einfacheren Fälle wirklich bestimmt war. Dann folgte mein Aufsatz über den Horopter im Archiv für Ophthalmologie X, 1, S. 1—60, dessen Correctur schon Mitte März 1864 vollendet war, worin der Horopter als Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades dargestellt und der Einfluß der Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane erörtert ist. Ohne Kenntniß dieser Arbeit zu haben, hat Herr E. HERING im Juni 1864 sein 4. Heft zum Druck gesendet, welches ebenfalls die Rückführung auf die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades enthält mit Benutzung der hienach sehr geeigneten STEINER'schen Geometrie. Die dabei gegen meine erste Arbeit gerichtete Kritik beruht wesentlich auf dem Mißverständnisse, daß ich von dem geredet habe, was ich oben Horopter, Herr HERING von dem, was ich die Horoptercurve genannt habe, und daß beides nicht ganz identisch ist, wie ich in Poggendorff's Annalen CXXIII S. 158—161 auseinandergesetzt habe. Endlich enthält das

H. HANKEL,<sup>1</sup> in welcher eine ausführlichere analytische Behandlung des Problems gegeben ist, aber ohne Berücksichtigung der hier sehr einflussreichen Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane.

Daneben ist dann seit WHEATSTONE's Erfindung des Stereoskops die Aufmerksamkeit der Forscher hauptsächlich mit der Verschmelzung der Doppelbilder beschäftigt gewesen, weil sich an diese namentlich die theoretischen Fragen anknüpfen über die Art des Zusammenwirkens beider Augen. Diese theoretischen Fragen können wir erst am Schlusse des nächsten Paragraphen besprechen. Den großen Einfluss, welchen die Bewegung der Augen auf die Verschmelzung der disparaten Bilder körperlicher Objecte und stereoskopischer Zeichnungen habe, zeigte zunächst BRÜCKE;<sup>2</sup> dass dagegen eine solche Verschmelzung auch bei absoluter Vermeidung aller Augenbewegungen doch auch vorkommen kann (wenn auch in viel geringerem Grade), bewies DOVE<sup>3</sup> durch Anwendung der elektrischen Beleuchtung, Beobachtungen, welche später durch VOLKMANN,<sup>4</sup> AUGUST,<sup>5</sup> RECKLINGHAUSEN<sup>6</sup> mit abgeänderten Methoden wiederholt und bestätigt wurden. Über die Grenze und die Bedingungen der Verschmelzung enthalten namentlich die Arbeiten von PANUM<sup>7</sup> und VOLKMANN<sup>8</sup> eine große Menge sorgfältig gemachter Beobachtungen und Messungen. Der viel bestrittene Versuch von WHEATSTONE, wonach die Eindrücke identischer Punkte zur Ausfüllung verschiedener Stellen des Anschauungsbildes von den wahrgenommenen körperlichen Objecten gebraucht werden können, wurde einerseits bestätigt durch NAGEL<sup>9</sup> und WUNDT.<sup>10</sup> Andererseits wurde dagegen hervorgehoben, dass man bei hinreichender Aufmerksamkeit und Anwendung passender Mittel, um die Doppelbilder leichter sichtbar zu machen, auch immer die Bilder getrennt sehen könne, von VOLKMANN,<sup>11</sup> E. HERING,<sup>12</sup> W. BEZOLD.<sup>13</sup> Dass beides nicht nothwendig im Widerspruch steht, habe ich oben erörtert. 764

### § 32. Wettstreit der Sehfelder.

In den beiden vorausgehenden Paragraphen haben wir gesehen, dass 766 wir beim unbefangenen zweiäugigen Sehen Bilder körperlicher Objecte in den Raum vor uns projiciren, dass wir aber auch andererseits, wenn wir auf das gemeinschaftliche Gesichtsfeld unserer Augen als solches achten, die

5. Heft von HERING's Beiträgen wieder eine Kritik meiner zweiten Arbeit, aus der ich nur einen Punkt (S. 350) erwähnen will, in welchem Herr HERING in der That Recht hat; dass nämlich auf S. 44 meiner Abhandlung der Winkel  $\eta$  allgemein gleich  $\eta_1$  gesetzt worden ist. Es ist das eine Flüchtigkeit, die mir bei der letzten, vor einer Reise sehr eilig gemachten Überarbeitung des Aufsatzes untergelaufen ist, in dem Streben die mathematische Abtheilung möglichst zusammensudrängen. Ich hatte vorher die beiden Fälle, in denen jene Behauptung richtig ist, einzeln behandelt und der Fehler hat also auch weiter keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Consequenzen. Die übrigen Ausstellungen, welche Herr HERING macht, haben theils nur persönliches Interesse, und werden von Lesern, die sich für dergleichen interessiren sollten, ohne weitere Erörterungen meinerseits leicht erledigt werden, theils können sie nur durch vielfach wiederholte Beobachtungen vieler Individuen entschieden werden. Was ich von solchen habe beibringen können, ist oben geschehen.

<sup>1</sup> H. HANKEL, *Poggendorff's Annalen*. CXXII, 575—588.

<sup>2</sup> BRÜCKE, *Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie*. 1841. S. 459.

<sup>3</sup> DOVE, *Monatsber. d. Berl. Akad.* 1841, 29. Juli.

<sup>4</sup> VOLKMANN, *Leips. Berichte*. 1859, S. 90—98.

<sup>5</sup> AUGUST, *Poggendorff's Annalen*. CX, 582—598.

<sup>6</sup> RECKLINGHAUSEN, *Ebenda*. CXIV, 170—178.

<sup>7</sup> PANUM, *Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen*. Kiel 1858; und in *Reichert und Du Bois-Reymond's Archiv*. 1861. 68—227.

<sup>8</sup> VOLKMANN, *Archiv für Ophthalmologie*. II, 2, 1—100; und *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Heft II.

<sup>9</sup> NAGEL, *Das Sehen mit zwei Augen*. Leipzig und Heidelberg 1861.

<sup>10</sup> WUNDT, *Heute und Pflüger's Zeitschr. für ration. Medicin*. (3) XII, 249.

<sup>11</sup> VOLKMANN, *Archiv für Ophthalmologie*. II, 2, S. 72—86.

<sup>12</sup> E. HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Heft II, S. 81—131.

<sup>13</sup> W. BEZOLD, *Sitzungsber. d. Bayerischen Akad. d. Wissensch. Math. Phys. Klasse*. 10. Dec. 1864.

beiden verschiedenen perspectivischen Projectionen, welche von den Objecten auf unseren Netzhäuten entworfen werden, als einander superponirt in der Fläche des gemeinsamen Gesichtsfeldes erblicken können. Die erste Art des Sehens tritt vorzugsweise ein beim Sehen körperlicher Objecte, wenn unsere Aufmerksamkeit den Gegenständen zugewendet ist. Wir wenden dann immer die Gesichtslinien beider Augen demjenigen Objecte zu, auf welches sich unsere Aufmerksamkeit zur Zeit richtet, und wir sehen dieses also immer einfach und deutlich, und die ferner oder näher liegenden Gegenstände, welche zur Zeit im mehr oder weniger indirecten Sehen doppelt erscheinen könnten, bleiben unbeachtet. Um Doppelbilder zu sehen, müssen wir auf unsere Gesichtseindrücke als solche achten und zu abstrahiren suchen von den wahrgenommenen Objecten. Am ungestörtesten werden die Doppelbilder und die entsprechenden Erscheinungen der Congruenz oder Incongruenz der einzelnen Punkte beider Sehfelder beobachtet, wenn man nicht nach wirklichen Objecten hinsieht, sondern nach zwei verschiedenen Zeichnungen mit verschiedenartig gefärbten oder erleuchteten Linien und Feldern, wie dergleichen von uns gebraucht wurden, um die correspondirenden Stellen der Gesichtsfelder zu finden.

In den bisherigen Fällen waren die Doppelbilder, welche gesehen wurden, mehr oder weniger ähnlich den Bildern, welche man gelegentlich von einem und demselben äußeren Objecte erhalten kann, und uns deshalb geläufig und bekannt als Zeichen eines nicht im Horopter liegenden Objectes, so daß wir mittels derselben sogar die Entfernung des ihnen entsprechenden Objectes noch annähernd richtig beurtheilen konnten.

767 Wir haben nun noch die Fälle zu untersuchen, wo beide Gesichtsfelder gefüllt sind mit ganz verschiedenartigen Formen, welche keine Combination zu dem Bilde eines Körpers zulassen. In solchen Fällen sieht man im Allgemeinen beide Bilder gleichzeitig und im Gesichtsfelde einander superponirt. Aber gewöhnlich herrscht in einzelnen Theilen des Gesichtsfeldes mehr das eine Bild vor, in anderen mehr das andere; und unter Umständen wechselt das auch, so daß, wo eine Zeit lang nur Theile des einen Bildes sichtbar waren, nun die Theile des anderen hervortreten und jene ersteren verdrängen. Diesen Wechsel, in welchem die Theile beider Bilder bald neben einander, bald nach einander sich gegenseitig verdrängen, pflegt man den Wettstreit der Sehfelder zu nennen.

Am einfachsten und regelmässigsten sind diejenigen Fälle, wo das eine Sehfeld in ganzer Ausdehnung gleichmäßig gefärbt oder erleuchtet ist; man bemerkt dann nur die Objecte, welche das andere Sehfeld enthält. Wenn man also zum Beispiel ein Auge schließt und mit dem anderen das bedruckte Blatt ansieht, so sieht man die Buchstaben und das weiße Papier im Sehfeld, ohne das Dunkel des anderen Sehfeldes zu bemerken. Dabei ist zu beachten, daß das Papier dabei nicht gerade entschieden dunkler aussieht, als wenn man es mit beiden Augen betrachtet. Das Schwarz des einen Feldes mischt sich also nicht mit dem Weiß des

deren, sondern hat eben weiter gar keinen Einfluß auf die Erscheinung des anderen Bildes.

Ebenso ist es nun, wenn man das bisher verschlossene Auge öffnet und ein Blatt weissen Papiers nahe davorhält, so daß das bisher dunkle Sehfeld gleichmässig weifs beleuchtet wird. Auch dann sieht man die Buchstaben in anderen Felde unverändert, und wenn das gleichmässig weisse Papier nicht heller ist als das bedruckte, so erscheint letzteres auch nicht heller, wenn das andere Sehfeld gleichmässig weifs, als wenn es gleichmässig schwarz ist. Wenn man sich aber so wendet, daß das weisse vor das eine Auge haltene Papier lebhaft von der Sonne beschienen wird, so erhält man allerdings beim Öffnen des betreffenden Auges den Eindruck, daß das bedruckte Papier heller wird, wenn das andere Sehfeld erleuchtet wird, als wenn es dunkel bleibt.

Ähnlich verhält es sich nun auch, wenn nur grössere Theile des einen Sehfeldes gleichmässig beleuchtet, in dem entsprechenden Theile des anderen aber Figuren enthalten sind. Betrachtet man zum Beispiel die folgenden Buchstaben

A B                      B C

daß die beiden *B* auf einander fallen und einfach gesehen werden, so scheinen sie wie

A B C

zwar so, daß das *A* und *C* nicht merklich dunkler sind, als das doppelgesehene *B*. In diesem Falle also ist links vom *B* nur das linke Sehfeld beachtet worden, welches das *A* enthält, und rechts vom *B* das *C* des rechten Sehfeldes hervor, während der gleichmässig weisse Grund des anderen Feldes sich nicht merklich geltend macht.

Wenn nun in beiden Sehfeldern breitere schwarz und weisse Figuren kommen, deren Grenzlinien in dem gemeinsamen Sehfelde sich gegenseitig durchschneiden, so ergibt sich im Allgemeinen die Regel, daß längs in der Nähe jeder Grenzlinie dasjenige Sehfeld prädominirt, dem diese Linie angehört. Bringt man also zum Beispiel die beiden schwarzen Linien der *Fig. V, Taf. VIII*, zum Decken, so daß die weissen Punkte in der Mitte zusammenfallen, so entsteht ein Gesamtbild, wie es *Fig. 252* darstellt. Die beiden Streifen erscheinen als Kreuz, dessen Mitte ganz schwarz ist, weil hier Schwarz und Schwarz sich decken. Der Grund erscheint weifs, weil auf ihm Weifs und Weifs sich decken. In den vier Ecken des Kreuzes deckt sich jedesmal Weifs des einen Feldes mit Schwarz des anderen; sie erscheinen aber keineswegs gleichmässig erhellt, sondern eine Mischung dieses Schwarz und Weifs. Vielmehr sind sie fast ganz schwarz an ihren Enden, wo sie an den weissen Grund stoßen, und

fast ganz weiß, wo sie an das mittlere schwarze Quadrat stoßen, und dazwischen sind Übergänge des Schwarz in Weiß, die aber keineswegs eine ruhige Beleuchtungsart behalten und sich deshalb auch durch keinerlei bildliche Darstellung vollkommen wiedergeben lassen, sondern mannigfach wechseln. Das Ende jedes Streifens fällt zusammen mit einem Theil des gleichmäßig weißen Grundes des andern Gesichtsfeldes, und verdrängt diesen, so daß es fast ganz schwarz erscheint. Nahe der Mitte jedes Streifens aber laufen über ihn die Grenzlinien des andern aus dem andern Sehfeld hin, und hier tritt also das Weiß des andern Feldes längs der Grenzlinie auf dem Schwarz des erstgenannten Streifens deutlich hervor.

In den bisher betrachteten Fällen standen sich immer gegenüber eine Figur mit bestimmten Contouren und ein ganz leeres gleichmäßiges Feld. Dabei zeigte sich, daß die Contouren sich immer sichtbar machen und den Eindruck des leeren Feldes verdrängen. Setzen wir nun statt des ganz





Fig. 252.

769 leeren Feldes ein solches, welches ein feines gleichmäßig wiederholtes Linienmuster enthält, richten wir zum Beispiel das linke Auge auf das schwarze Kreuz der *Fig. W, Taf. VIII*, und gleichzeitig das rechte auf das carrirte Feld, so überwiegt im ersten Augenblick auch hier in der Regel das Kreuz so, als ob wir es auf einen reinen Grund projecirten, und nur in seiner Mitte und jenseits seines Umfanges wird vielleicht das Linienmuster sichtbar. Betrachten wir es ohne bestimmte Richtung unserer Aufmerksamkeit längere Zeit in dieser Weise, so tritt zeitweilig das Linienmuster auch wohl über das ganze Feld hervor und verdeckt das ganze Kreuz oder wenigstens einzelne Theile desselben. Dagegen muß ich hervorheben, daß ich mich jeden Augenblick im Stande finde, meine Aufmerksamkeit jedem Theile des Linienmusters, auch denen, die gerade auf den Rand des Kreuzes fallen, willkürlich und ausschließlich zuzuwenden, und daß ich dann nur das Linienmuster sehe, während das Kreuz meist ganz schwindet. Ich brauche nur eine Reihe von Quadraten des Linienmusters zu zählen, oder die Quadrate zu vergleichen, ob sie gleich groß, ob sie rechtwinkelig sind und so weiter.

Während und so lange ich in dieser Weise meine Aufmerksamkeit fest auf die Quadrate fixire, bleiben sie mir auch im Gesicht. So wie ich im Gegentheil eine Ecke oder Seite des Kreuzes in ähnlicher Weise beobachte, verschwindet das Linienmuster mehr oder weniger vollständig, und ich sehe anhaltend das Kreuz.

Der Wettstreit wird noch auffallender, wenn die beiden sich deckenden Figuren gleich stark hervortretende Contouren haben. Bringt man zum Beispiel die beiden Linienpaare der *Fig. 253* zum Decken, so pflegen die meisten Beobachter im Anfang nur die senkrechten Linien an der Kreuzungsstelle zu sehen, während die horizontalen im Zwischenraum der Verticallinien oder auch selbst noch außerhalb dieses Zwischenraums verschwinden. Bei längerem Fixiren tauchen sie von Zeit zu Zeit auf, während dafür die verticalen verschwinden und umgekehrt. Aber auch hier kann ich beliebig das Bild des einen oder anderen Paares festhalten, wenn ich meine Auf-



*Fig. 253.*

merksamkeit darauf richte und etwa untersuche, ob irgend welche Unregelmäßigkeiten an den Linien des einen oder anderen Paares vorkommen.

In complicirter Weise zeigt sich derselbe Wettstreit an den mit verschieden gerichteten parallelen Linien bedeckten Feldern der *Fig. X, Taf. VIII*. Man sieht hier keine gleichmäßige Kreuzung der Linien in dem Gesamtbilde, wodurch ein ähnliches Linienmuster, wie das der *Fig. W* derselben Tafel, sich zusammensetzen würde; sondern man sieht meist eine ungleichmäßige Mischung beider Muster, so daß an einzelnen Stellen des Feldes das eine, an anderen das andere vorherrscht, wobei diese Stellen selbst übrigens einem fortdauernden Wechsel unterworfen sind. Die schwarzen Quadrate in der Mitte der Felder sollen als Fixationszeichen dienen, wenn der Beobachter eine unveränderte Lage beider Felder über einander zu erhalten wünscht. Ohne einzelne correspondirende und stark hervorstechende Theile der Figur ist dies sonst gar nicht möglich, vielmehr schwanken die Blicklinien dann fortdauernd zwischen verschiedenen Graden der Convergenz hin und her.

Zuweilen tritt auch wohl in ganzer Ausdehnung der Fläche das eine



System allein für kurze Zeit auf. Auch hier finde ich, daß ich vollkommen willkürlich im Stande bin, meine Aufmerksamkeit bald dem einen, bald dem anderen Liniensysteme zuzuwenden, und daß dann dieses System für einige Zeit allein gesehen wird und das andere vollkommen verschwindet. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ich versuche die Linien erst des einen und dann des anderen Systems zu zählen. Ich finde ferner, daß dieses Beachten des einen Liniensystems auch nicht von bestimmten Augenbewegungen abhängig ist; denn ich kann meinen Blick sowohl an den Linien, auf die ich achte und die ich sehe, entlang gleiten lassen, als auch rechtwinkelig gegen ihre Richtung und also parallel der Richtung des anderen Systems fortführen, so daß ich von einer Linie zur anderen gehe, ohne daß ich aufhöre, nur das System zu sehen, welches ich sehen will. Aber allerdings finde ich, wie WUNDT, daß es leichter ist, das Bild derjenigen Linien festzuhalten, deren Richtung man mit dem Blicke folgt; in der That ist dies auch die gewöhnliche Art unsere Aufmerksamkeit einer Linie zuzuwenden, daß wir den Blick an ihr entlang laufen lassen, und indem wir die Bewegung unserer Augen absichtlich nach der Linie richten, sind wir auch sicher, unsere Aufmerksamkeit an die Linie zu fesseln.

Es ist aber allerdings schwer, die Aufmerksamkeit längere Zeit an eines der Liniensysteme von *Fig. W, Taf. VIII*, zu fesseln, wenn man nicht damit irgend einen bestimmten Zweck verbindet, der eine fortdauernde active Thätigkeit der Aufmerksamkeit bedingt, wie eben das Zählen der Linien oder die Vergleichung ihrer Zwischenräume und so weiter ist. Ein anhaltender Ruhezustand der Aufmerksamkeit ist ja auch unter anderen Verhältnissen kaum für einige Zeit zu unterhalten. Der natürliche ungezwungene Zustand unserer Aufmerksamkeit ist herumzuschweifen zu immer neuen Dingen, und so wie das Interesse eines Objectes erschöpft ist, so wie wir nichts Neues mehr daran wahrzunehmen wissen, so geht sie wider unseren Willen auf anderes über. Wollen wir sie an ein Object fesseln, so müssen wir eben an diesem selbst immer Neues zu finden suchen, besonders wenn andere kräftige Sinnesindrücke sie abzulenken streben. Durch diese Eigenthümlichkeit unserer psychischen Thätigkeit erklären sich, wie mir scheint, die oben beschriebenen Thatsachen.

Die letztgenannten Versuche kann man vielfach variiren; wenn man zum Beispiel das quadratische Muster der *Fig. W, Taf. VIII*, mit einem 771 danebengelegten Blatte bedruckten Papiers zur Deckung bringt, kann man ohne Schwierigkeit die Buchstaben lesen oder andererseits das Linienmuster betrachten. Dasselbe ist der Fall, wenn man eine fein ausgeführte Landkarte oder eine Photographie mit einem bedruckten Blatte zum Decken bringt; es müssen nur nicht die Zeichnungen der einen Seite durch Helligkeit allzu hervorstechend sein gegen die der anderen Seite, und auch einander nicht zu ähnlich. Wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Druckblätter mit gleicher Art von Druck combinirt, so verbindet der Beobachter unwillkürlich Theile der einen Parthie von Buchstaben mit solchen der

anderen Seite doppeläugig, und dadurch mischen sich dann die Buchstaben beider Seiten leicht durch einander.

Ich will namentlich hier auch noch hervorheben, daß es mir gelingt, ganz schwache und zart gezeichnete Objecte des einen Sehfeldes zu sehen und dauernd zu beobachten, selbst wenn sie sich mit sehr kräftig gezeichneten Contouren des anderen Feldes decken. So kann ich die Faserung und die kleinen Fleckchen eines weißen Papierblattes verfolgen, während im anderen Felde stark gezeichnete schwarze Figuren stehen. Oder ich kann eine mit einem dünnen weißen Blatte zugedeckte und kaum erkennbare Druckschrift lesen, welche sich binocular etwa mit dem Gitter oder dem Kreuze der *Fig. W, Taf. VIII*, deckt. Oder ich kann mittels eines Spiegels, den ich vor das eine Auge halte, das helle Bild des Fensters zur binocularen Deckung mit einer verhältnißmäßig schwach erleuchteten Druckschrift bringen und diese lesen, ohne daß sie mir jemals durch das viel hellere Bild des Fensters verdrängt wird. Natürlich kann ich ebenso gut das Spiegelbild des Fensters betrachten, wobei mir die Druckschrift verschwindet. Daß man bei einem solchen Versuche sehr schwach beleuchtete Objecte des einen Feldes nicht immer erkennen kann, wenn das andere Auge auf ein sehr helles Feld gerichtet ist, findet seine Erklärung dadurch, daß die Pupillen beider Augen unter dem Einflusse des hellen Lichts sich verengern und das Netzhautbild des dunkleren Feldes also wirklich noch sehr viel dunkler wird, als es ist, wenn das helle Bild verdeckt wird.

Aus den beschriebenen Erfahrungen geht hervor, daß der Mensch die Fähigkeit hat, die Bilder jedes einzelnen Sehfeldes einzeln und für sich wahrzunehmen, ungestört von dem anderen Sehfelde, wenn es nur mittels eines der angegebenen Hilfsmittel gelingt, die Aufmerksamkeit ganz auf die Objecte dieses einen Feldes zu fesseln. Diese Thatsache ist wichtig, weil aus ihr hervorgeht, daß der Inhalt jedes einzelnen Sehfeldes, ohne durch organische Einrichtungen mit dem des anderen verschmolzen zu sein, zum Bewußtsein gelangt, und daß die Verschmelzung beider Sehfelder in ein gemeinsames Bild, wo sie vorkommt, also ein psychischer Act ist.

Um den Unterschied recht hervorzuheben, brauchen wir nur zu vergleichen die binoculare Verschmelzung der beiden schrägen und verschieden gerichteten Liniensysteme der *Fig. X, Taf. VIII*, mit der monocularen Vereinigung beider in dem Liniensysteme der *Fig. W*. Wir können auch in dem letzteren die Linien des einen Systems zählen oder ihre Abstände vergleichen, dabei werden aber niemals die Linien des anderen Systems aus dem Bilde verschwinden, wie dies bei der binocularen Vereinigung unter 772 diesen Bedingungen der Regel nach geschieht. Bei monocularer Betrachtung des combinirten Liniensystems der *Fig. W*. haben wir nur einen sinnlichen Eindruck, den wir durch keine Anstrengung der Aufmerksamkeit verändern können, wenn wir auch diese oder jene Züge desselben vorzugsweise beachten. Verschmolzen die beiden entsprechenden Bilder der *Fig. X* wirklich

zu einem einzigen und einfachen sinnlichen Eindrücke, so würde dieser durch Anstrengung der Aufmerksamkeit allein in keiner Weise in seine Bestandtheile zu zerlegen sein. Charakteristisch ist es auch, daß wenn man mittels einer unbelegten Glasplatte im monocularen Gesichtsfelde das Bild des hellen Himmels mit einem bedruckten Blatte zum Decken bringt, man bei gewissen Beleuchtungsgraden die Buchstaben nicht lesen kann, während man sie sehr wohl lesen kann, wenn man binocular den sehr viel stärkeren Reflex einer belegten Spiegelplatte mit ihnen zur Deckung bringt.

Der Wettstreit der Sehfelder, wie er sich bei binocularer Verschmelzung der obigen Bilder entwickelt, entspricht dem hin und herschwankenden Zustande der nicht angestregten und nicht interessirten Aufmerksamkeit, die von einem Eindruck zum anderen zu wandern pflegt und so allmählich eine Übersicht der vorliegenden Objecte gewinnt. Daß dieser Wechsel nicht auf einer organischen Einrichtung des Nervensystems beruht, wie PANUM und E. HERING es auffassen, wenigstens auf keiner anderen, als die unseren Seelenthätigkeiten zu Grunde liegt, scheint mir evident aus der Thatsache der Selbstbeobachtung hervorzugehen, daß wir durch die bekannten und oben genannten rein psychischen Mittel, die Aufmerksamkeit zu fesseln, das Schwanken sogleich anhalten können, ohne daß dabei irgend eine bemerkbare Änderung der äußeren Umstände, der Richtung oder Bewegung der Augen und so weiter, stattfindet. PANUM hat darin Recht, daß es nicht genügt, die Aufmerksamkeit auf das verschwindende oder verschwundene Bild richten zu wollen, wobei er die Aufmerksamkeit für eine dem bewußten Willen des Beobachters absolut unterthänige Thätigkeit erklärt. Das letztere ist nun doch nur in gewisser Beschränkung richtig. Wir bewegen unsere Augen auch willkürlich, aber ein Ungeübter kann die Absicht, sie convergiren zu lassen, nicht so unmittelbar ausführen. Wohl aber kann er in jedem Moment die Absicht ausführen, ein nahes Object anzublicken, wobei die Augen convergiren. Ebenso wenig können wir die Absicht unsere Aufmerksamkeit an einem bestimmten Objecte festzuhalten, wenn wir uns diese Absicht in dieser Form innerlich aussprechen, erreichen, sobald das Interesse an dem Objecte erschöpft ist; aber wir können uns neue Fragen in Bezug auf das Object stellen, so daß ein neues Interesse daran entsteht, und dann wird die Aufmerksamkeit gefesselt bleiben. Das Verhältniß ist also, wie bei dem oben genannten Beispiele; es ist keine unmittelbare, sondern eine mittelbare Willkür. Wir können durch unsern Willen Acte ausführen, bei denen das Auge oder die Aufmerksamkeit die Richtung erhält, die wir wünschen, obgleich wir nicht durch einen direct darauf gerichteten Willensact ohne Zwischenglieder die Richtung des Auges oder der Aufmerksamkeit bestimmen können. Dagegen trifft allerdings, wie ich wiederum gegen PANUM behaupten muß, die andere charakteristische Eigenschaft der

773 Aufmerksamkeit auch für den Wettstreit der Sehfelder zu, daß sie durch geeignete Methoden an die allerschwächsten Sinneseindrücke gefesselt werden kann, während die allerstärksten im anderen Sehfelde sie abzulenken streben.

Natürlich ist dabei desto größere Anstrengung nöthig, je ungünstiger das Verhältniß der Stärke für die beachteten Eindrücke ist.

Da wir nun übrigens, wie die oben beschriebenen Versuche mit momentaner Beleuchtung deutlich zeigen, im Stande sind gleichzeitig eine gewisse Anzahl von Gegenständen zu beachten und dadurch einen gewissen Theil des Sehfeldes auszufüllen, so wird auch hierbei im Allgemeinen zu erwarten sein, daß sich zunächst das Gesichtsfeld füllt mit denjenigen Objecten, die den stärkeren Eindruck machen, oder daß bei gleich starken Reizen in beiden Sehfeldern ein Schwanken eintritt, oder ein Suchen nach einem zusammenhängenden und verständlichen Eindrucke, wobei denn nicht nothwendig immer im ganzen Gesichtsfelde nur der Eindruck des einen Auges vorzuherrschen braucht. Charakteristisch für dieses Suchen nach einem verständlichen Eindrucke ist auch das fortdauernde Schwanken der Blicklinien. Es ist kaum möglich, die beiden Bilder in gleicher Lage dauernd in Deckung zu halten.

Etwas Anderes ist es, wenn sich die beiden verschiedenen Bilder als sinnliches Zeichen eines äußeren Objects betrachten lassen, dann wendet sich die Aufmerksamkeit sogleich der Wahrnehmung von diesem zu, ohne der Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder zugelenkt zu werden.

Was nun den merkwürdigen Einfluß der Contouren in dem Wettstreit der Sehfelder betrifft, so bin ich ebenfalls der Meinung, daß derselbe im Wesentlichen auf psychischer Gewöhnung beruht. Erwägen wir nämlich, in welcher Weise unser Auge das Gesichtsfeld zu durchmustern hat, um eine vollständige Kenntniß desselben zu erhalten, so ist klar, daß es ganz unnütze Mühe sein würde, dasselbe nach einander auf alle einzelnen Punkte einer ausgedehnten gleichmäßig beleuchteten Fläche richten zu wollen; wir würden dadurch nichts weiter erkennen. Es genügt vielmehr den Blick über die Grenze der Fläche hinzuführen und auf alle diejenigen einzelnen Punkte zu richten, die sich von der Fläche abheben. Sobald dies geschehen ist, haben wir eine so genaue Kenntniß von der Fläche, als das Auge uns geben kann. Es sind deshalb namentlich die im indirecten Sehen sichtbaren Contouren, denen wir bei der Durchmusterung des Gesichtsfeldes erst unsere Aufmerksamkeit und dann unsern Blick zuzuwenden haben. Es ist bekannt, wie schwer es ist, einen kleinen Gegenstand, der im indirecten Sehen nicht bemerkt wird, auf einer ausgedehnten hellen Fläche aufzufinden; bezeichnend nennt zum Beispiele ГОЯТНЯ die Lerche „im blauen Raum verloren“. Andererseits zieht ein etwas größerer und auch für das indirecte Sehen hinreichend scharf gezeichneter Gegenstand unmittelbar unseren Blick auf sich, und wenn man sich selbst bei der Betrachtung eines noch unbekannten Objects beachtet, wird man leicht bemerken, wie man mit dem Blicke den Contouren folgt. Gewöhnung und Übung müssen also nothwendig dahin wirken, unsere Aufmerksamkeit den Contouren zuzuwenden. Auch bei den Contrasterscheinungen habe ich darauf aufmerksam gemacht, wie die Contouren namentlich in das Gewicht fallen.

774 Man könnte auch daran denken, daß die Erregung der Netzhauttheile längs einer Grenze von Weiß und Schwarz lebhafter sei, so oft durch die Bewegungen des Auges Elemente der Netzhaut aus dem Schwarz in das Weiß rücken. Diese ausgeruhten Elemente würden allerdings stärker erregt werden, als die schon länger von Weiß getroffenen. Indessen glaube ich nicht, daß dieser Umstand hier wesentlich in Betracht kommt, weil wir bei den oben beschriebenen Versuchen die Richtung der Augenbewegungen ohne entscheidenden Einfluß gefunden haben, und weil die Contouren in den Doppelbildern sich auch gleich beim ersten Aufschlag der Augen geltend machen, wo noch keine Nachbilder entwickelt sein können.

PANUM'S Annahme dagegen, daß die Contouren an und für sich die Netzhaut stärker erregen, scheint mir durch keine einzige sichere Thatsache unterstützt und zur Erklärung der hier vorliegenden Erscheinungen gänzlich unnöthig zu sein. Bei den Contrasterscheinungen haben wir allerdings gesehen, daß der Unterschied der Beleuchtung oder Färbung zweier Felder längs einer Contour, wo beide zusammenstoßen, stärker hervortritt als wenn beide von einander getrennt sind, und sogar relativ zu groß erscheint. Wenn wir aber von den Nachbildern absehen, so lassen sich die Erscheinungen des simultanen Contrastes darauf zurückführen, daß wir besser geübt und sicherer sind in der Vergleichung der Beleuchtung zweier neben einander liegenden Netzhautpunkte, welche bei den Bewegungen des Auges viel häufiger unmittelbar hinter einander von derselben Beleuchtung getroffen werden, als dies bei entfernteren der Fall ist. Daß uns ein solcher Unterschied relativ zu groß erscheint und dadurch dann Irrthümer in der Beurtheilung der Färbungen entstehen, entspricht der allgemeinen Regel, daß wir überhaupt deutlich wahrnehmbare Unterschiede für größer zu halten geneigt sind, als undeutlich wahrnehmbare. Man könnte einen solchen deutlicher wahrnehmbaren Unterschied vielleicht als einen stärkeren psychischen Reiz bezeichnen, und es mag zum Theil darin begründet sein, daß er die Aufmerksamkeit stärker zu fesseln strebt. Einen stärkeren Nervenreiz dabei anzunehmen, vorausgesetzt, daß Nachbilder vermieden werden, sehe ich keinen Grund.

Ähnliche Erscheinungen des Wettstreits treten nun auch ein, wenn beiden Augen verschiedenfarbige oder verschieden erleuchtete Felder dargeboten werden. Wenn man durch zwei verschiedenfarbige Gläser von lebhaften Farben, zum Beispiel mit dem rechten Auge durch ein rothes, mit dem linken durch ein blaues Glas, welche ungefähr gleiche Helligkeit haben, nach den äußeren Objecten sieht, so erblickt man diese fleckig roth und blau und zwar so, daß die Farben oft wechseln. Der unruhige sonderbare Farbenwechsel ist anfangs meist am lebhaftesten, bald stumpft sich die Empfindlichkeit für die Farben ab und das Aussehen wird dann ein ruhigeres in einer unbestimmten mehr grauen Farbe, welche noch stellenweise und zeitweise zwischen einem röthlicheren oder blauerem Tone wechselt, und welche manche Beobachter für die Mischfarbe aus den beiden vereinigten, also in diesem Falle für Rosa erklären. Ich selbst muß sagen, daß ich

trotz vieler und mannigfach veränderter Versuche in keinem Falle die Mischfarbe mit einiger Evidenz habe sehen können. Zum Theil bestimmen <sup>775</sup> auch die Eigenthümlichkeiten der Objecte, ob man mehr die eine oder die andere Farbe sieht. Hellere Objecte erscheinen überwiegend roth, dunklere blau, wohl deshalb, weil überhaupt bei größerer Lichtstärke Roth, bei schwächerer Blau in der Empfindung überwiegt. Objectiv rothe Objecte erscheinen natürlich auch roth, blaue blau, weil ein jedes durch das gleichnamige Glas gesehen heller erscheint, als durch das anders gefärbte. Auch hier spielt wieder die Aufmerksamkeit auf das eine oder andere Feld eine merkliche Rolle. Obgleich es sehr schwer ist, die Aufmerksamkeit gerade nur der Farbe des einen Feldes zuzuwenden, wenn sie dabei nicht unterstützt ist durch Contouren, die diesem Felde angehören, so gelingt es doch einzelnen Beobachtern (FUNKE,<sup>1</sup> J. DINGLE, VÖLCKERS,<sup>2</sup> VOLKMANN,<sup>3</sup> E. A. WEBER,<sup>4</sup> WELCKER,<sup>5</sup> mir selbst), die Aufmerksamkeit auf das rechte Auge und was es sieht, und dann ebenso auf das linke zu fixiren, wobei denn auf den Objecten die Farbe des zugehörigen Glases zum Vorschein kommt. FECHNER,<sup>6</sup> dem der Wechsel durch willkürliche Anstrengung weniger gut gelang, glaubt diesen Wechsel von einer unwillkürlichen Bewegung oder Compression des Auges ableiten zu dürfen, welche nach seinen Beobachtungen nur überhaupt den Wechsel der Farbe begünstige, aber nicht gerade den Wechsel in der beabsichtigten Richtung. Sehr viel besser noch gelingt der Versuch, wenn man die Gläser so hält, daß Spiegelbilder schwach erleuchteter, seitwärts liegender Gegenstände von ihnen in das Auge geworfen werden. So wie man nun die Aufmerksamkeit einem dieser Spiegelbilder zuwendet, sei es ein noch so schwach sichtbares Schattenbild, so erscheint sogleich an der betreffenden Stelle des Sehfeldes die Farbe des betreffenden Glases. Und wenn in derselben Stelle des Gesichtsfeldes gleichzeitig ein Spiegelbild des andern Glases sichtbar ist und man wendet diesem die Aufmerksamkeit zu, so tritt auch die andere Farbe hervor.

Um diesen Versuch methodisch auszuführen, stellte ich eine blaue und rothe Glasplatte (*B* und *R* in Fig. 254) senkrecht auf einen Tisch; *C* ist ein dunkler Schirm, der an der nach *B* gekehrten Seite ein mit Buchstaben bedrucktes Blatt trägt, *D* ein eben solcher, an dessen innerer Seite irgend ein anderes mit den Buchstaben nicht leicht zu verwechselndes Muster, also etwa eine Zahlentabelle angebracht ist. Bei




Fig. 254.

<sup>1</sup> FUNKE, *Lehrbuch der Physiologie*. 1. Aufl. Bd. II, 875.

<sup>2</sup> VÖLCKERS, *Müllers Archiv*. 1838. p. 61 und 63.

<sup>3</sup> VOLKMANN, *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichts*. p. 97, 99.

<sup>4</sup> E. A. WEBER, *Programma*. Colleg. 118.

<sup>5</sup> WELCKER, *Über Irradiation*. 1852. p. 107.

<sup>6</sup> FECHNER, *Abhandlungen der Sächsischen Ges. d. Wiss.* VII. (1860) 399–408.

*A* befindet sich ein weißer Schirm, *O* und *O'* sind die Augen des Beobachters. Die Beleuchtung regelt man so, daß die Buchstaben und die Zahlen, welche der Beobachter in ihren von den Glasplatten entworfenen Spiegelbildern sieht, eben noch sichtbar sind, wenn der Bogen *A* stark beleuchtet ist. Scheinbar liegen für den Beobachter die Spiegelbilder der Buchstaben und Zahlen auf dem Bogen *A*. Ich sehe nun ganz regelmäßig, wenn ich den Buchstaben mit dem Auge zu folgen suche, den Grund blau, wenn ich den Zahlen folge, dagegen roth. Also die auf das Bild der einen Netzhaut gerichtete Aufmerksamkeit bringt auch den zugehörigen farbigen Grund zum Vorschein. Hierbei ist noch zu bemerken, daß die Contouren, welche in diesem Falle den einen Eindruck überwiegen machen, Grenzen von Weiß und Schwarz sind, ohne daß die Intensität der sichtbar werdenden Grundfarbe an ihnen eine Veränderung erleidet. Oder wenn man die ganze gemischte Beleuchtung zusammennimmt, so erscheinen die Buchstaben links reinblau auf weißlichem Blau, die Zahlen rechts reinroth auf weißlichem Roth. Bei den Contrasterscheinungen würde die Aufmerksamkeit nur dem Gegensatz von Schwarz und Weiß, nicht dem Blau oder Roth zugelenkt werden, was bei den hier beschriebenen binocularen Versuchen gerade im Gegentheil geschieht.

Noch einfacher gelingt mir dieser Versuch sehr leicht und gut, wenn ich nach dem Himmel blicke und vor das eine Auge ein rothes, vor das andere ein blaues Glas nehme, beide aber so gegen die Gesichtslinien neige, wie in *Fig. 254*, daß ich in jedem der Gläser schwache Spuren der Spiegelbilder seitlich gelegener Objecte sehe, und nun bald das eine, bald das andere Glas ein wenig bewege, so daß sich auch die von ihnen entworfenen Spiegelbilder ein wenig bewegen. Achtet man auf diese bewegten Bilder, die übrigens ganz verwaschen und lichtschwach sein dürfen, so tritt sogleich am Himmel die Farbe des entsprechenden Glases heraus. Es ist ein wunderliches Schauspiel, wenn so plötzlich, wie auf Commando, der blaue Himmel ganz roth, oder der rothe ganz blau wird.

Ob bei der binocularen Deckung verschiedenfarbiger Felder die Mischfarbe gesehen werde, oder nicht, darüber sind verschiedene Beobachter direct entgegengesetzter Meinung. Während H. MEYER, VOLKMANN, MEISSNER, FUNKE, denen ich mich selbst auch anschließen muß, niemals die Mischfarbe gesehen haben, erklären ebenso entschieden DOVE, REGNAULT, BRÜCKE, LUDWIG, PANUM, HERING, daß sie sie gesehen haben, und zwar nicht bloß bei matten und weißlichen Farben, sondern selbst bei gesättigten. Dove berichtet, daß er sie selbst an den allergesättigsten Farben, denen des prismatischen Spectrum gesehen habe, indem er ein objectiv auf die Wand geworfenes Spectrum gleichzeitig mit einem umkehrenden und einem nicht umkehrenden Fernrohr binocular betrachtete. Außerdem empfiehlt er als besonders geeignet Polarisationsfarben. Wenn man vor eine schwarze Glasplatte, die das Licht unter dem Polarisationswinkel reflectirt, dünne Glimmer oder Gypsblättchen in passender Lage anbringt, und vor das rechte

Auge ein NICOL'sches Prisma in der Lage hält, wo es das von der Glasplatte reflectirte Licht im Maximum durchläßt, vor das linke Auge ein ebensolches Prisma, um einen rechten Winkel gedreht, so daß es das reflectirte Licht nicht durchgehen läßt, so sieht man mit beiden Augen die Krystallblättchen farbig, und zwar zeigen sie für beide Augen genaue Complementärfarben. DOVE und REGNAULT haben nun in solchen Fällen diese Complementärfarben sich binocular zu Weiß vereinigen gesehen. Ich <sup>777</sup> habe diese Versuche wiederholt und mir sind sie regelmäsig und vollständig mislungen. Ich sehe sowohl mit spectralen als mit Polarisationsfarben genau denselben Wettstreit und Wechsel der verschiedenen einfachen Farben, ohne daß die Mischfarbe zum Vorschein kommt, wie bei Pigmentfarben und den Farben gefärbter Gläser. Ich habe auch senkrecht zur Axe geschnittene Quarzplatten zu diesen Versuchen sehr vortheilhaft gefunden. Wenn man die NICOL'schen Prismen vor den Augen dreht, kommen neue Farben zum Vorschein. Ich sehe aber immer beide Farben getrennt, und gleichsam eine durch die andere, und kann immer augenblicklich angeben, ohne ein Auge zu schliessen, welche Farben da sind. Zur Vergleichung mit den Farben hat man dabei den hellweißen Grund der spiegelnden Platte, der die Mischfarbe zeigt, welche zum Vorschein kommen sollte, und eben deshalb ist es leicht, bei diesen Versuchen den großen Unterschied zwischen der binocularen Vereinigung verschiedener Farben und ihrer wirklichen Vereinigung zu erkennen.

Ogleich ich einsehe, wie mißlich es ist, so vielen ausgezeichneten und zuverlässigen Beobachtern in einer Sache zu widersprechen, in der vielleicht außerordentlich große individuelle Unterschiede bestehen, so will ich hier doch einige Umstände anführen, welche bei meinen eigenen Versuchen zuweilen den Schein einer Mischfarbe hervorbrachten, während sich bei genauerer Untersuchung herausstellte, daß für mein Auge wenigstens eine solche nicht vorhanden war.

Zuerst ist folgendes zu bemerken: wenn man die binoculare Combination zweier Farben vor sich hat und außerdem auch noch beide Componenten einzeln, wenn man also z. B. mit parallelen Augenaxen nach einem blauen Felde blickt, welches seitwärts an ein rothes anstößt, so daß ein Doppelbild der Grenzlinie erscheint und auf der einen Seite sich Blau mit Blau, auf der andern Roth mit Roth, in der Mitte aber Roth mit Blau deckt, so unterscheidet sich das mittlere Blau von dem reinen Blau an seiner Seite allerdings dadurch, daß zu ihm im Gesichtsfelde auch noch mehr oder weniger Roth hinzukommt, und Jemand, der die Mischungsregeln der Farben kennt und gewöhnt ist, aus Blau und Roth sich Violett oder Purpur zusammensetzen zu sehen, könnte dies mit Roth zusammengesetzte Blau nun wohl für Violett erklären. Auch kommt es ja selbst im monoculareren Felde vor, daß wirklich bestehendes Violett vermittels des Contrastes gegen nebenstehendes Blau, oder weil das Blau einer über die Farben hingebreiteten Decke oder der Gesamtbeleuchtung des Feldes anzugehören scheint, vom Beobachter



in Blau und Roth aufgelöst wird. Wir haben Beispiele der Art § 24 besprochen. Es kann also wirklich monocular zu Violett vereinigt Roth und Blau unter Umständen so getrennt erscheinen, wie das binocular sich deckende für meine Augen immer erscheint, und dadurch kann ein solcher Beobachter vielleicht verleitet werden zu glauben, daß wo er Blau und Roth gleichzeitig sieht, daß da Violett oder Purpur sei. Wenn man nun aber die wirkliche Mischfarbe der beiden gesehenen Farben zur Erscheinung bringt, so tritt der Unterschied schlagend hervor. Die beste und 778 genaueste Methode die Mischfarbe hervorzubringen, ist folgende. Man legt zwei blaue und zwei rothe quadratische Felder wie die eines Schachbretts zusammen, so daß z. B. das rechte obere und linke untere blau, das linke obere und rechte untere roth sind. Dann bringt man vor jedes Auge ein doppeltbrechendes achromatisirtes Kalkspathprisma in derjenigen Stellung, daß es über einander liegende Doppelbilder giebt. Indem die Doppelbilder der farbigen Felder sich theilweis über einander schieben, entsteht für jedes Auge längs der horizontalen Trennungslinie der farbigen Felder ein aus Roth und Blau monocular gemischter, also rosarother Streifen. Jetzt blickt man mit parallelen Gesichtslinien nach den Feldern hin, so daß ihre Bilder sich binocular über einander schieben. Dann hat man oben rechtes Blau und linkes Roth sich deckend, in der Mitte Rosaroth mit Rosaroth, unten rechtes Roth mit linkem Blau. Unter diesen Umständen ist es für meine Augen ganz deutlich, daß in der binocularen Combination von Blau und Roth keine Spur von dem Rosenroth, wie es der mittlere Streifen zeigt, enthalten ist, sondern nur die beiden einzelnen Farben getrennt.

PANUM legt Gewicht darauf, daß die binocular zu mischenden Farben nicht zu lebhaft und nicht zu verschieden sein dürfen, weil sonst der Wettstreit der Sehfelder zu lebhaft und unruhig sei, und man dadurch verhindert werde, die Mischfarbe zu erkennen. Ich habe deshalb nach der bei den Contrasterscheinungen schon früher beschriebenen Methode von H. MEYER die zu combinirenden farbigen Felder mit feinem weißen Papier überdeckt, so daß durch das Papier die unterliegenden Farben nur schwach durchschimmerten. Als ich nun diese sehr weißlichen Farben zur Deckung brachte, glaubte ich in der That zuerst wirklich eine Mischfarbe zu sehen. Indessen wenn ich die wirkliche Mischfarbe der beiden Felder auch noch daneben brachte, erkannte ich wieder den Wettstreit der Sehfelder in den binocular gedeckten Feldern.

Zuweilen gelingt es, unter einer Auswahl farbiger und grauer Papiere einzelne zu finden, die genau die Mischfarbe zweier anderen, wie sie durch ein doppeltbrechendes Prisma hergestellt wird, darbieten; dann werden die Versuche noch leichter und schlagender. Ich legte neben einander ein Blatt von grünem und rosenrothem Glanzpapier, so daß ihre Grenzlinie vertical war. Quer darüber, also horizontal, legte ich einen Streifen grauen Papiers, welches der Mischfarbe von jenen beiden Farben entsprach. Das Ganze wurde mit feinem weißen Papier überdeckt. Wenn ich nun diese Felder

mit einem doppeltbrechenden Prisma so ansah, daß die Doppelbilder horizontal auseinander geschoben wurden, so deckte sich längs des horizontalen grauen Streifens Grau mit Grau, darüber und darunter in der Mitte Rosa mit Grün, welche ebenfalls Grau gaben, und dieses letztere Grau ging ununterscheidbar über in das Grau des horizontalen Streifens. Wenn ich aber nach Entfernung des doppeltbrechenden Prisma binoculare Doppelbilder erzeugte, so hob sich der Streifen, wo Grau auf Grau lag, sehr entschieden ab von dem, wo Rosa auf Grün lag, und im letzteren erschienen wieder die beiden Farben neben einander. Nahm ich aber den mittleren grauen Streifen fort, so erkannte ich den Wettstreit der Sehfelder nicht mehr deutlich und bemerkte dann in diesem Felde nur das Gemeinsame beider Farben, nämlich das Weiß.

In andern Fällen sind es Nachbilder, die eine scheinbare Mischung <sup>779</sup> hervorbringen. Dazu läßt sich sehr gut die eben beschriebene Anordnung benutzen: oben ein grauer Streifen, unten rechts grün, links rosenroth, welche beide letzteren Farben, durch das doppeltbrechende Prisma gemischt, das obere Grau geben. Ich bringe die beiden unteren Felder zur binocularen Deckung und sehe anfangs nur lebhaften Wettstreit zwischen ihnen. Wenn ich aber lange anhaltend fixire, fängt endlich das binocular gemischte Feld an, dem oberen Grau ähnlich zu werden, und nur wenig bald nach der Seite des Roth, bald nach der des Grün hin abzuweichen. Wenn ich aber nun das Roth mit Grün bedecke und dabei das eine oder andere Auge schliesse, so erscheint mir das Nachbild des Grün auf Grün, während in dem Theile des Feldes, wo vorher Rosa lag, jetzt das reine gesättigte Grün sichtbar wird. Da sieht man denn sehr deutlich, daß das durch Ermüdung veränderte Grün in der That dem Grau des oberen Streifens sehr ähnlich geworden ist. Dasselbe findet man am Rosaroth, wenn man das Grün verdeckt. Die scheinbare Mischung der Farben zu Weiß beruht also in diesem Falle darauf, daß die Farben selbst in der Empfindung in Folge der entstehenden complementären Nachbilder dem Grau viel ähnlicher geworden sind, und daß der Unterschied und Wettstreit der einander ähnlich gewordenen Farben zuletzt nicht mehr so auffällt, wie der der ursprünglichen lebhaften.

In gewissen Fällen kann die auf S. 554 erwähnte Induction der Farbe des Grundes über ein kleines andersfarbiges Feld scheinbare binoculare Mischung hervorbringen. Ich betrachtete einen blauen horizontalen Streifen auf rothem Grunde längere Zeit in Doppelbildern in starrer Fixation, indem ich ein schwarzes auf dem Blau angebrachtes Pünktchen mit einem eben solchen auf dem Roth binocular vereinigte. Anfangs sah ich nur den Wettstreit des Roth und Blau auf dem Theil des Feldes, wo sich Roth und Blau deckte. Endlich aber bemerkte ich, daß wirkliches Violett eintrat. Als ich aber nun das eine Auge schloß, erkannte ich das inducirte Roth auch monocular auf dem blauen Streifen.

Am auffallendsten endlich finde ich den Schein einer binocularen

Mischung in einem schon von H. MEYER und PANUM<sup>1</sup> besprochenen Falle. Es befinde sich rechts ein gelbes Feld, auf dem horizontal ein rosenrother Streifen liegt, links ein blaues mit einem verticalen Streifen von demselben Rosenroth. Man bringe das gelbe und blaue Feld zur binocularen Deckung, so daß die beiden rosenrothen Streifen sich scheinbar kreuzen, so erscheint der linke, welcher größtentheils auf das gelbe Feld fällt, allerdings viel gelblicher, als der rechte, der sich größtentheils mit dem blauen Felde deckt. In der Mitte, wo beide Felder sich kreuzen, sieht man reines Rosenroth, oder vielmehr, wie mir scheint, das gelbliche Rosenroth des einen geht hier unter dem bläulichen Rosenroth des anderen Streifens gleichsam unverschmolzen hindurch. PANUM betrachtet die gelbliche Färbung des einen Rosenroth, die bläuliche des anderen als Folge ihrer binocularen Mischung mit der Farbe des gegenüber stehenden Feldes. Zu beachten ist hierbei, daß die Veränderung der beiden rosenrothen Streifen am lebhaftesten wird, wenn man den Blick wandern läßt, weil dann der auf Gelb liegende das blaue Nachbild des Gelb bekommt, der auf Blau liegende das gelbe Nachbild des Blau. Aber in schwächerem Grade ist die Wirkung allerdings auch bei fest fixirendem Blick vorhanden. Doch kann man auch in diesem Falle sich überzeugen, daß man es hier zunächst mit einer Contrastwirkung zu thun hat. Die veränderte Färbung des Rosenroth bleibt nämlich auch bestehen, wenn man durch Schluß des anderen Auges die binoculare Mischung aufhebt. Man schliesse das rechte Auge, welches nach dem gelben Felde gerichtet ist, so bleibt der rosenrothe Streif auf dem noch übrigen blauen Felde so gelblich, wie er vorher war. Im Moment des Augenschlusses verschwindet freilich noch das ihn binocular deckende Gelb, wie eine Art gelben Nebels, durch welchen hin man ihn sah, aber die scheinbare Färbung des Rosenroth selbst bleibt dabei ganz unverändert. Ebenso erscheint der rosenrothe Streif auf dem Gelb unverändert bläulich roth, wenn man auch das nach dem Blau blickende linke Auge schließt. Daraus folgt also, daß die Veränderung des Rosa nicht oder wenigstens nicht allein, von binocularer Mischung herrührt, sondern eine Contrastwirkung ist. Schon von Anfang an, auch bei monocularer Betrachtung, erscheint das Rosa auf dem blauen Felde durch Contrast gelblicher, das auf dem gelben Felde bläulicher. Sobald man die beiden Felder zur Deckung bringt, wird die Contrastwirkung allerdings viel lebhafter; ist sie aber einmal so lebhaft entwickelt, so schwindet sie auch nicht wieder, wenn man selbst ein Auge schließt und somit die binoculare Deckung aufhebt. Bei jedem Contraste ist die Beurtheilung der Farbe, wie wir uns in § 24 zu zeigen bemühten, innerhalb eines gewissen Intervalls unsicher. Nebenumstände bewirken, daß man die gesehene Farbe eher nach der einen Seite dieses Intervalls, als nach der anderen verlegt. Bei dem hier besprochenen Versuche kann die binoculare Deckung mit der Complementärfarbe des Grundes, auf dem der rosenrothe Streifen liegt, wohl als ein solcher

<sup>1</sup> PANUM, *Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen*. Kiel 1858. S. 41, Fig. 27 und 29.

umstand betrachtet werden. Übrigens komme ich unten noch auf die Verhältnisse von den binocularen Contrasten wieder zurück.

Was die Theorie der binocularen Zusammensetzung der Farben betrifft, ist diese, wenn wir von TH. YOUNG's Farbentheorie ausgehen, von ihrer binocularen Mischung nur dadurch unterschieden, daß die den drei verschiedenen Grundfarben entsprechenden Nervenfasern, welche in verschiedenem Maße gereizt werden, dort auf beide, hier nur in einer Netzhaut vertheilt sind. Die drei verschiedenartigen Nervenfasern, welche demselben Punkte der Netzhaut angehören, haben entweder dasselbe Localzeichen, oder wenn verschiedene Localzeichen haben, so kann doch keine mögliche Erregung vorkommen, bei der sie durch Objecte, die in verschiedenen Theilen des Gesichtsfeldes liegen, erregt würden. Eine Veranlassung zu getrennter Localisation dieser Empfindungen in Bezug auf die Richtungen im Sehfeld kann also nicht vorkommen. Ihre verschiedenen Empfindungen verschmelzen in eine zusammengesetzte Empfindung, die Empfindung einer Mischfarbe, welche der Regel nach als das sinnliche Zeichen für eine bestimmte Bestimmtheit des örtlich einfachen Objects auftritt, das sich in jenem Theile des Sehfeldes befindet. Und doch haben wir gesehen, daß auch bei monocularer Mischung Fälle eintreten, wo wir eine der zusammengesetzten Farben hindurch die andere hindurch zu sehen glauben, wenn entweder die ungleiche Vertheilung des Lichts, oder die Bewegung eines örtlich begrenzten Lichtes, oder die Anwesenheit eines Theils der Farbe im ganzen Gesichtsfeld uns darauf hinleiten, eine farbige Beleuchtung oder eine farbige Decke einem farbigen Objecte zu trennen.

Bei ungleichartiger Beleuchtung correspondirender Theile beider Netzhäute ist nun der Eindruck ein solcher, wie er bei einer von allen Seiten gleichmäßigen Beleuchtung eines einfachen Objects niemals vorkommen kann. Auch versetzen wir (aber wahrscheinlich nicht in Folge einer angeborenen Beschaffenheit unseres Nervensystems, sondern nur in Folge von Einübung)

zwei Farben in eine und dieselbe Gegend des gemeinsamen Gesichtsfeldes. Sieht man also zwei Farben in dem gleichen Felde und empfindet jede anders als die andere. Am ähnlichsten ist dieses Gesichtsbild jedenfalls in jenen Fällen monocularer Mischung, wo wir zwei farbige Objecte hinter einander in der gleichen Stelle des Sehfeldes sehen oder zu sehen vermeinen, von einer Zahl der Beobachter, wozu ich mich selbst rechnen muß, die die Sache also auch jedenfalls nur so gesehen. Dabei tritt das Verlangen der Aufmerksamkeit ein, die sich entweder dem einen oder dem anderen Felde zuwendet, und giebt sich als Wettstreit zu erkennen. Etwas ähnliches, nur sehr viel schwächer entwickelt, kann man auch im monoculareren Felde sehen, wenn man mittels einer unebenen Glasplatte das Spiegelbild eines Objectes mit dem durch die Platte gesehenen anderen Objecte zum Decken bringt, vorausgesetzt, daß beide gleich hell und deutlich gezeichnet sind, aber ganz verschiedenes Localzeichen haben. Dann kann man entweder das eine oder andere Object

betrachten, das nicht beachtete tritt auch in diesem Falle mehr zurück wenn es auch nie so vollständig schwindet, wie bei binocularer Deckung. Durch kleine Bewegungen der reflectirenden Platte kann man sich nöthigenfalls die Trennung der beiden Bilder sehr erleichtern.

Da übrigens nach YOUNG's Theorie die Anschauung von Mischfarben doch immer nur darauf beruht, daß drei verschiedene Farbenempfindungen in dieselbe Stelle des Sehfeldes hinein projecirt werden, und es selbst bei monocularer Mischung nur auf einem je nach den Nebenumständen verschieden ausfallenden Acte des Urtheils beruht, ob dieselben als sinnliche Zeichen einer einfachen Qualität eines Objects oder zweier verschiedenen Qualitäten zweier Objecte angesehen werden, so erscheint es andererseits nicht unmöglich, daß bei der binocularen Deckung zweier Farben von der Verschiedenheit, welche zwischen dieser Art des Eindrucks und dem der monocularen Mischung stattfindet, abgesehen werde, und die Farben so vereinigt wie bei letzterer angesehen werden. Nach YOUNG's Farbentheorie ist die Mischfarbe ja auch weiter nichts als die Addition dreier verschiedenartiger, sich sonst gegenseitig nicht beeinflussender Eindrücke, welche dieselbe Localisation haben, und die Urtheilsacte, nach denen bald Vereinigung, bald Trennung eintritt, können bei verschiedenen Beobachtern je nach Einübung und verschiedener individueller Erfahrung natürlich sehr verschieden ausfallen. Daß dabei die Vereinigung sehr ähnlicher Farben, die also viel Gemeinsames und wenig Verschiedenes haben, leichter erfolgen kann, als die sehr verschiedener, ist an und für sich selbstverständlich. Dazu kommt auch noch, daß kleine Verschiedenheiten des Eindrucks auf beide Augen häufig auch bei Betrachtung desselben reellen Objects vorkommen können, wenn das eine Auge mehr ermüdet oder ausgeruht ist als das andere, oder wenn seitlich sehr helles oder farbiges Licht einfällt, welches in ihm zerstreut wird, und so weiter. Die Ausgleichung solcher kleinerer Verschiedenheiten kann also zur Sache der Gewohnheit werden und übersehen werden. Wenn man freilich ein Feld, welches einen solchen Eindruck darbietet, dicht neben ein anderes stellt, in welchem zwei gleiche Farben zur Deckung kommen, so erkennt man die Verschiedenheit und bemerkt den Wettstreit, der auch zwischen wenig differenten Eindrücken vor sich geht.

In ganz eigenthümlicher Weise endlich macht sich die binoculare Combination verschieden farbiger oder verschieden beleuchteter Felder geltend in stereoskopischen Zeichnungen. Macht man nämlich in dem einen von zwei zusammengehörigen Bildern eines Körpers eine Fläche weiß, die man in dem andern Bilde schwarz läßt, oder giebt man ihnen verschiedene, am besten nicht zu sehr verschiedene Farben, so erscheint eine solche Fläche in der stereoskopischen Combination glänzend, während alle diejenigen Theile des Körpers, die in beiden Zeichnungen gleiche Färbung und Beleuchtung haben, matt erscheinen. Übrigens ist dieser Schein des Glänzenden oder Matten durchaus unabhängig davon, ob die Flächen der Zeichnung wirklich matt oder glänzend sind, vorausgesetzt, daß sie im

Nebenumstand betrachtet werden. Übrigens komme ich unten noch auf die Lehre von den binocularen Contrasten wieder zurück.

Was die Theorie der binocularen Zusammensetzung der Farben betrifft, so ist diese, wenn wir von TH. YOUNG's Farbentheorie ausgehen, von ihrer monocularer Mischung nur dadurch unterschieden, daß die den drei verschiedenen Grundfarben entsprechenden Nervenfasern, welche in verschiedenem Grade gereizt werden, dort auf beide, hier nur in einer Netzhaut vertheilt sind. Die drei verschiedenartigen Nervenfasern, welche demselben Punkte einer Netzhaut angehören, haben entweder dasselbe Localzeichen, oder wenn sie verschiedene Localzeichen haben, so kann doch keine mögliche Erfahrung vorkommen, bei der sie durch Objecte, die in verschiedenen Theilen des Gesichtsfeldes lägen, erregt würden. Eine Veranlassung zu getrennter Localisation dieser Empfindungen in Bezug auf die Richtungen im Sehfeld kann also nicht vorkommen. Ihre verschiedenen Empfindungen verschmelzen also in eine zusammengesetzte Empfindung, die Empfindung einer Mischfarbe, welche der Regel nach als das sinnliche Zeichen für eine bestimmte Beschaffenheit des örtlich einfachen Objects auftritt, das sich in jenem Theile des Sehfeldes befindet. Und doch haben wir gesehen, daß auch bei monocularer Mischung Fälle eintreten, wo wir eine der zusammengesetzten Farben durch die andere hindurch zu sehen glauben, wenn entweder die ungleichmäßige Vertheilung des Lichts, oder die Bewegung eines örtlich begrenzten Bildes, oder die Anwesenheit eines Theils der Farbe im ganzen Gesichtsfelde uns darauf hinleiten, eine farbige Beleuchtung oder eine farbige Decke von einem farbigen Objecte zu trennen. 781

Bei ungleichartiger Beleuchtung correspondirender Theile beider Netzhäute ist nun der Eindruck ein solcher, wie er bei einer von allen Seiten gleichmäßigen Beleuchtung eines einfachen Objects niemals vorkommen kann. Dennoch versetzen wir (aber wahrscheinlich nicht in Folge einer angeborenen Einrichtung unseres Nervensystems, sondern nur in Folge von Einübung) beide Farben in eine und dieselbe Gegend des gemeinsamen Gesichtsfeldes. So sieht man also zwei Farben in dem gleichen Felde und empfindet jede getrennt von der andern. Am ähnlichsten ist dieses Gesichtsbild jedenfalls denjenigen Fällen monocularer Mischung, wo wir zwei farbige Objecte hinter einander in der gleichen Stelle des Sehfeldes sehen oder zu sehen vermeinen, und von einer Zahl der Beobachter, wozu ich mich selbst rechnen muß, wird die Sache also auch jedenfalls nur so gesehen. Dabei tritt das Schwanken der Aufmerksamkeit ein, die sich entweder dem einen oder anderen Felde zuwendet, und giebt sich als Wettstreit zu erkennen. Etwas dem Wettstreit ähnliches, nur sehr viel schwächer entwickelt, kann man übrigens auch im monocularer Felde sehen, wenn man mittels einer unbelegten Glasplatte das Spiegelbild eines Objectes mit dem durch die Platte gesehenen anderen Objecte zum Decken bringt, vorausgesetzt, daß beide nahehin gleich hell und deutlich gezeichnet sind, aber ganz verschiedenes Muster haben. Dann kann man entweder das eine oder andere Object

in der andern, so erregt uns das einen sinnlichen Eindruck, wie ihn glänzende Körper hervorbringen können. Da sich in der Regel die Farbe des glänzenden Körpers selbst mit der der beiden Reflexe mischt und letzteren selten ganz rein nur die eine Farbe reflectiren, so sind die Unterschiede in der Färbung solcher Reflexe glänzender Körper für beide Augen in der Regel nicht sehr groß, und dem entsprechend gelingt es besser Glanz hervorzubringen durch Verbindung von Farben, die nicht sehr verschieden sind, als durch sehr glänzende und sehr differente. Letztere lassen mehr Wettstreit als Glanz sehen.

Nach den Beobachtungen von WUNDT tritt der Glanz in der Combination zweier farbigen Felder am besten hervor, wenn beide ungefähr gleich stark mit dem Grunde, auf dem sie liegen, contrastiren, schwächer, wenn eine viel stärker contrastirt; dann überwiegt nämlich dasselbe im Wettstreite der Sehfelder zu sehr und unterdrückt das andere. Legt man zum Beispiel ein helles gelbes und ein dunkles blaues Quadrat von gleicher Größe auf weißen oder schwarzen Grund, und bringt sie zur binocularen Deckung, so unterscheidet sich im einen Falle das Gelb zu wenig vom weißen Grunde, in andern das Blau zu wenig vom schwarzen Grunde, und der Glanz ist viel schwächer, als wenn man beide Quadrate auf grauen Grund legt, der sich von beiden gleich stark unterscheidet.

Auch dadurch, daß man auf dem einen Quadrate Zeichnungen mit scharfen Contouren anbringt, kann man dieses im Wettstreit so begünstigen, daß die Erscheinung des Glanzes undeutlich wird.

784 Auch kann man binocularen Glanz hervorbringen, ohne gerade stereoskopische Zeichnungen zu benutzen, wenn man durch zwei verschieden gefärbte Gläser nach buntgefärbten Objecten hinsieht, zum Beispiel durch ein blaues und ein rothes Glas nach einem in Blau und Roth ausgeführten Muster. Durch jedes Glas erscheint die gleichnamige Farbe hell, die andere dunkel, und man sieht das Muster sehr auffallend glänzend. Wichtig ist dabei die Bemerkung von DOVE, daß, wenn im Wettstreit der Augen die eine oder andere Farbe sich ganz hervordrängt, der Glanz verschwindet, im Moment des Übergangs aber, wo beide neben einander sichtbar sind, der Glanz auftritt.

Der Metallglanz ist dadurch charakterisirt, daß das regelmäßig reflectirte Licht selbst schon gefärbt und nicht weiß ist, wie das der durchsichtigen Stoffe. Metallglanz kommt deshalb auch Körpern zu, welche die Farben dünner Blättchen geben, wie bunte Vogelfedern, und gewissen stark gefärbten und brechenden Stoffen, wie Indigo.

Die Erscheinung des stereoskopischen Glanzes ist für die Theorie der Thätigkeit beider Netzhäute deshalb von Interesse, weil daraus mit Sicherheit hervorgeht, was bei den verschiedenen Aussagen verschiedener Beobachter über die Erfolge der binocularen Deckung verschiedener Bilder vielleicht zweifelhaft bleiben könnte, daß zwei heterogene Lichtwirkungen auf correspondirende Netzhautstellen stets einen durchaus andern sinnlichen Ein-

ruck machen, als zwei gleichartige Einwirkungen auf dieselben Stellen. Wenn das eine Auge Schwarz sieht und das andere in dem correspondirenden Theile des Sehfeldes Weiß, so ist der sinnliche Eindruck der einer glänzenden reiflichen Fläche. Wenn wir aber das weiße Licht, was bisher auf die eine Seite allein fiel, auf beide Seiten gleichmäßig vertheilen, also Grau mit Grau combiniren, so giebt das den Eindruck von mattem Grau, welcher ganz bestimmt unterschieden ist von dem Eindruck des glänzenden Weiß, den die erste Combination machte.

Dasselbe gilt für den durch binoculare Vereinigung verschiedener Farben erzeugten Glanz.

Man kann zwar denselben Schluß schon aus der Thatsache ziehen, daß zwei stereoskopische Zeichnungen, binocular combinirt, nicht so erscheinen, als wären alle Linien auf dasselbe Blatt aufgetragen, sondern den Eindruck eines Körpers geben. Indessen ist hierbei allerdings der Einfluß der Augenbewegungen von Wichtigkeit, und nur bei momentaner Beleuchtung durch elektrischen Funken fällt dieser ganz weg.

Ich bemerke noch, daß ich auch solche Zeichnungen, welche stereoskopischen Glanz zeigen, bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken trachtet habe, und daß auch hierbei der Eindruck des Glanzes vollkommen zur Erscheinung kommt. Diese Thatsache ist wichtig, weil dadurch die Erleuchtung beseitigt wird, daß der Glanz auf dem Wechsel der Beleuchtung und Färbung beruht, den der Wettstreit verursacht. Den Wechsel im Wettstreit bei nicht angestrenzter Aufmerksamkeit habe ich nie schneller als in Sekunden von etwa 8 Sekunden, meist aber sehr viel langsamer vor sich gehen sehen. Wenn nun auch der Lichteindruck in der Netzhaut einen Bruchtheil einer Secunde dauert, so ist während dieser Zeit keine merkliche Änderung durch den Wettstreit der Sehfelder möglich. Man kann aber in dieser kurzen Zeit erkennen, daß man die beiden verschiedenen Eindrücke beider Sehfelder gleichzeitig und in derselben Stelle des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes sieht.

Den Eindruck des Glanzes können übrigens auch monocular gesehene 785 Bilder und Objecte hervorbringen, zum Beispiel dadurch, daß ihre Beleuchtung Bewegungen des Beobachters sich schnell verändert; dabei kommen die Eindrücke, aus denen sich der stereoskopische Glanz zusammensetzt, nicht gleichzeitig, aber schnell hinter einander zur Beobachtung. Ferner erscheinen bewegte Objecte glänzend, wenn die Beleuchtung ihrer einzelnen Theile schnell hinter einander sich verändert, wie es zum Beispiel bei einer bewegten Wasserfläche geschieht. Es genügt selbst, wenn nur die verschiedenartige Beleuchtung der Theile einer Fläche die bekannten Formen der Lichtreflexe vollkommen spiegelnder Körper nachahmt. WUNDT hat monocularen Glanz vorgebracht, indem er ein dunkles Quadrat auf andersfarbigem dunklen Grunde durch eine unbelegte Glasplatte betrachtete, deren Vorderseite gleichzeitig ein helleres Quadrat auf hellerem Grunde spiegelte, so daß die Spiegelbilder mit dem erstgenannten sich nahehin deckten. Der Glanz verschwand,



wenn das gespiegelte Quadrat scheinbar genau an demselben Orte sich befindet wie das wirklich dort vorhandene, dann sah man nur die Mischfarbe. Der Glanz kam aber zum Vorschein, wenn das gespiegelte scheinbar hinter dem wirklichen lag. Lag es vor ihm, so schien eher das gespiegelte zu glänzen. Es wurde hierbei also die Anschauung hervorgebracht, als sähe man hinter und durch das wirklich vorhandene Quadrat noch ein anderes, was dann als ein von ersterem entworfenes Spiegelbild erschien, und das gab den Anschein des Glanzes. Diese Versuche zeigen besonders gut, daß es hier nicht auf besondere Qualitäten der Färbung ankommt, sondern darauf, die Täuschung hervorzubringen, als reflectire eine gesehene Fläche noch ein anderes Bild.

Der Schein der Durchsichtigkeit tritt auch bei binocularer Deckung zweier verschiedenfarbiger Felder zuweilen ein, worauf WUNDT aufmerksam machte. Bringt man zum Beispiel ein helles gelbes und dunkleres blaues Quadrat auf weißem Grunde zu einer unvollständigen binocularen Deckung, so erscheint das Blau da, wo man die Grenze des Gelb und Weißs von ihm gedeckt sieht, durchsichtig. Dagegen fehlt dieser Schein, wo das Gelb die Grenze von Blau und Weißs deckt. Auf schwarzem Grunde erscheint dagegen das Gelb durchsichtig. Das stärker mit dem Grunde contrastirende Feld erscheint überhaupt der Regel nach als das durchsichtige, entsprechend dem objectiven Verhältniß, wonach etwas, was durch ein durchscheinendes Medium, dessen Substanz selbst deutlich wahrgenommen wird, gesehen wird, immer nur undeutlich gesehen wird, während die Grenzen dieses Mediums, unbedeckt von einem anderem durchscheinenden Medium, sich der Regel nach scharf markiren werden.

Es sind schliesslich noch einige Erscheinungen zu besprechen, welche als Contrast zwischen den Empfindungen beider Augen auszulegen sind, oder wenigstens ausgelegt werden können.

Zunächst hat namentlich FECHNER darauf aufmerksam gemacht, wie außerordentlich gut kleine Unterschiede der augenblicklichen Farbestimmung beider Augen, d. h. der Weise, in welcher die Augen die Farben empfinden, wahrgenommen werden, wenn man nach einem kleinen hellen Objecte auf schwarzem Grunde sieht und dessen binoculares Bild 786 durch veränderte Augenstellung in Doppelbilder auseinander schiebt. Ist das eine Auge zum Beispiel geschlossen gewesen und hat das andere während der Zeit helle weiße Flächen angesehen, so erscheint unmittelbar hinterher von den zwei Doppelbildern eines weißen Streifens auf schwarzem Grunde dasjenige, welches dem ermüdeten Auge angehört, dunkler und auch violetter als das andere, welches dem vorher ausgeruhten Auge angehört. Hat man dagegen mit dem freien Auge nach einer farbigen Fläche gesehen, so erscheint dessen Bild nachher in der Complementärfarbe, das andere der inducirenden Farbe gleichfarbig. Hierbei ist die Complementärfarbe in dem ermüdeten Auge in der Vergleichung der beiden Doppelbilder sehr viel länger sichtbar, als wenn man beide Augen nach derselben farbigen Fläche

druck machen, als zwei gleichartige Einwirkungen auf dieselben Stellen. Wenn das eine Auge Schwarz sieht und das andere in dem correspondirenden Theile des Sehfeldes Weiß, so ist der sinnliche Eindruck der einer glänzenden weißlichen Fläche. Wenn wir aber das weiße Licht, was bisher auf die eine Seite allein fiel, auf beide Seiten gleichmäßig vertheilen, also Grau mit Grau combiniren, so giebt das den Eindruck von mattem Grau, welcher ganz bestimmt unterschieden ist von dem Eindruck des glänzenden Weiß, den die erste Combination machte.

Dasselbe gilt für den durch binoculare Vereinigung verschiedener Farben erzeugten Glanz.

Man kann zwar denselben Schluss schon aus der Thatsache ziehen, daß zwei stereoskopische Zeichnungen, binocular combinirt, nicht so erscheinen, als wären alle Linien auf dasselbe Blatt aufgetragen, sondern den Eindruck eines Körpers geben. Indessen ist hierbei allerdings der Einfluß der Augenbewegungen von Wichtigkeit, und nur bei momentaner Beleuchtung durch den elektrischen Funken fällt dieser ganz weg.

Ich bemerke noch, daß ich auch solche Zeichnungen, welche stereoskopischen Glanz zeigen, bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken betrachtet habe, und daß auch hierbei der Eindruck des Glanzes vollkommen zur Erscheinung kommt. Diese Thatsache ist wichtig, weil dadurch die Erklärung beseitigt wird, daß der Glanz auf dem Wechsel der Beleuchtung und Färbung beruht, den der Wettstreit verursacht. Den Wechsel im Wettstreit bei nicht angestrenzter Aufmerksamkeit habe ich nie schneller als in Perioden von etwa 8 Secunden, meist aber sehr viel langsamer vor sich gehen sehen. Wenn nun auch der Lichteindruck in der Netzhaut einen kleinen Bruchtheil einer Secunde dauert, so ist während dieser Zeit keine merkliche Änderung durch den Wettstreit der Sehfelder möglich. Man kann aber in dieser kurzen Zeit erkennen, daß man die beiden verschiedenen Eindrücke beider Sehfelder gleichzeitig und in derselben Stelle des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes sieht.

Den Eindruck des Glanzes können übrigens auch monocular gesehene 785 Bilder und Objecte hervorbringen, zum Beispiel dadurch, daß ihre Beleuchtung bei Bewegungen des Beobachters sich schnell verändert; dabei kommen die Elemente, aus denen sich der stereoskopische Glanz zusammensetzt, nicht gleichzeitig, aber schnell hinter einander zur Beobachtung. Ferner erscheinen bewegte Objecte glänzend, wenn die Beleuchtung ihrer einzelnen Theile schnell hinter einander sich verändert, wie es zum Beispiel bei einer bewegten Wasserfläche geschieht. Es genügt selbst, wenn nur die verschiedenartige Beleuchtung der Theile einer Fläche die bekannten Formen der Lichtreflexe unvollkommen spiegelnder Körper nachahmt. Wundt hat monocularen Glanz hervorgebracht, indem er ein dunkles Quadrat auf andersfarbigem dunklen Grunde durch eine unbelegte Glasplatte betrachtete, deren Vorderseite gleichzeitig ein helleres Quadrat auf hellerem Grunde spiegelte, so daß die Spiegelbilder mit dem erstgenannten sich nahehin deckten. Der Glanz verschwand,

deutlichere Contrastwirkung hervorbringt, als eine sehr gesättigte. Grünliches Fensterglas oder gelbröthliches Bouteillenglas zeigt die complementäre Farbe auf dem jenseitigen Doppelbilde viel deutlicher, als wenn man durch sehr tief gefärbtes Glas blickt, selbst wenn man im letzteren Falle das Bild des anderen Auges durch passende graue Gläser auf dieselbe Lichtstärke herunterbringt, als das farbige Bild.

Ja es ist sogar ein Contrast möglich zwischen solchen Farben, die auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute liegen. Man lege einen schwarzen Streifen auf einen weißen Grund, schiebe sein Bild zu Doppelbildern auseinander und bringe dann vor das eine Auge ein blaues, vor das andere ein graues Glas, welche beide ungefähr gleich dunkel sind. Man sieht dann das eine Bild des schwarzen Streifen umgeben von hervortretendem Blau, das andere von hervortretendem Weiß, während im übrigen Grunde Blau und Weiß mehr oder weniger gleichmäßig über einander lagern. Dabei zeigt sich das Weiß, was längs der Contour des schwarzen Streifens hervortritt, entschieden gelblich. Nimmt man beide Gläser fort, so erscheint gelbliches Weiß, wo vorher Blau vorherrschte, und bläuliches Weiß, wo wir es vorher gelblich sahen.

Vertauschen wir bei diesem Versuche die blaue Glasplatte mit einer gelben, so wechselt auch in den Bildern überall Gelb mit Blau.

Es muß wohl als sehr auffallend betrachtet werden, daß unter dem Einfluß der Contouren des Schwarz unsere Aufmerksamkeit sich dem benachbarten Weiß so ausschließlich zuwendet und es von dem im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde überdeckenden Blau so vollständig trennt, daß dieses Weiß sogar gelblich aussehen kann. Dies gelbliche Weiß zeigt übrigens auch darin seinen Charakter als Contrastfarbe, daß es kurze Zeit stehen bleibt, selbst wenn wir das Auge hinter dem blauen Glase ganz schließen. Auch bei den farbigen Schatten (S. 551 und 552) fanden wir, daß das einmal über die Art der Farbe festgestellte Urtheil bestehen blieb, selbst nachdem die contrastirende Farbe, deren Anwesenheit zu dem Irrthume verleitet hatte, aus dem Gesichtsfelde entfernt war.

In den bisherigen Versuchen fand der Contrast statt in der Vergleichung zweier Farben, welche den entgegengesetzten Gesichtsfeldern angehören. Es kann nun aber auch die Wirkung monocularen Contrastes durch binoculare Vergleichung mit dem entgegengesetzten Contraste gesteigert werden. Man lege rechts einen Bogen rosarothern, links einen Bogen grünen Papiers, so daß beide in der Mitte an einander stoßen; ferner lege man nahe der Grenzlinie auf jede Seite einen Streifen weißen Papiers. Betrachtet man diese beiden Streifen mit freien Augen, so ist in der Regel gar keine Contrastfärbung an den beiden Papierstreifen zu bemerken, wenn nicht schon starke Nachbilder der beiden Farben entwickelt sind. Blickt man mit einem  
788 Auge durch eine schwarze Röhre nach einem dieser Streifen, während das andere Auge geschlossen ist, so bemerkt man allerdings eine schwache complementäre Contrastfärbung. Hält man aber zwei schwarze Röhren vor

beide Augen, so daß das rechte den einen Streifen mit einem Stück des rothen Grundes, das linke den anderen mit einem Stück des grünen Grundes sieht, ohne daß man übrigens die Streifen binocular zum Decken bringt, so treten die complementären Färbungen der beiden Streifen in einer sonst kaum beobachteten Stärke auf. Die Wirkung nimmt an Stärke immer mehr zu, wenn man den Versuch längere Zeit fortsetzt, ohne den Blick auf einen bestimmten Punkt festzuheften. Dabei entstehen natürlich immer stärkere Nachbilder des Grundes, und da das rechte Auge nur rothen, das andere nur grünen Grund sieht, so kann bei allen Bewegungen des Auges sich im rechten Auge immer nur Grün, im linken immer nur Roth als Grund entwickeln und die Contrastwirkung nur verstärken.

Dies wäre nun ein successiver Contrast, einer der auf Nachbildern beruht. Wenn man zu Anfang des Versuchs schnell die Augen auf die weißen Streifen hinwendet und sie möglichst schnell in der richtigen Lage fixirt, so sieht man ebenfalls, wenn auch viel schwächer die Contrastfarben. Indessen da unter den Umständen dieses Versuchs Nachbilder des Grundes durch die Vergleichung der Färbung in beiden Sehfeldern besonders leicht sichtbar werden, so hielt ich es für nöthig, eine Versuchsweise zu suchen, welche ganz sicher vor jeder Entstehung eines Nachbildes des Grundes schützte. Zu dem Ende befestigte ich auf einer Glasplatte zwei Papierstreifen, parallel zu einander in senkrechter Richtung, von denen der rechte oben schwarz und unten grau, der linke oben grau und unten schwarz war. Die Glastafel brachte ich über eine rechts mit rothem, links mit grünem Papier belegte Fläche, so daß der rechte Papierstreifen über rothem, der linke über grünem Grunde lag. Vor dem Beginn des Versuchs schob ich aber weißes Papier zwischen die Glastafel und die farbige Fläche, so daß die letztere ganz verdeckt war. Nun fixirte ich mit beiden Augen die grauschwarzen Streifen so, daß sie sich deckten, wobei sowohl die obere als untere Hälfte des Bildes aus der Deckung einer schwarzen und einer grauen Streifenhälfte besteht. In der Mitte jedes Streifens hatte ich einen weißen Punkt angebracht als Fixationspunkt. Indem ich die beiden weißen Punkte binocular vereinigte, war ich im Stande, das gemeinsame Bild der grauschwarzen Streifen ganz sicher festzuhalten. Wenn ich nun das weiße Papier entfernte, so daß die farbige Fläche dahinter zum Vorschein kam, so entstanden allerdings Spuren einer Contrastfärbung, die aber außerordentlich schwach waren. Das Grau, welches auf grünem Grunde lag, erschien röthlich, das auf rothem Grunde befindliche grünlich. Dagegen genügten wenige kurze Bewegungen des Blicks von rechts nach links und zurück, um die Contrastfarben gleich in voller Intensität zum Vorschein zu bringen. Die anfänglichen schwachen Contrastfärbungen waren schwächer, als sie beim monocularen Contrast zum Vorschein kommen. Noch schwächer war die Wirkung, wenn das Grau durch Weiß ersetzt wurde.

Die reinen Wirkungen des simultanen Contrastes auf den beiden grauen Streifen wurden also geschwächt durch die binoculare Vergleichung. Indem 789

das Grau des einen Sehfeldes dem des anderen binocular genähert wurde, wurde eine genauere Vergleichung zwischen den beiden Grau möglich, als vorher im monocularen Felde, wo die beiden Streifen durch weite Strecken Grün und Roth von einander getrennt waren. In dieser Beziehung verhalten sich also die Erscheinungen des successiven Contrastes, welche auf einer Veränderung der Empfindung durch Nachbilder beruhen, ganz anders, als die des simultanen Contrastes, welche wir als Irrthümer des Urtheils aufgefaßt haben. Erstere treten durch binoculare Vergleichung auffallender hervor, letztere werden im Gegentheil berichtigt.

Bei der bisher beschriebenen Form des Versuchs wurde eine binoculare Deckung der grauen Streifen mit farbigem Grunde vermieden, sie deckten sich vielmehr mit Schwarz. Nun kann man aber durch veränderte Convergenz der Augen ihre Bilder so weit aneinander schieben, daß sie sich nicht decken, sondern nur berühren. Bringt man sie in diese scheinbare Lage, während zunächst noch der weiße Bogen darunter liegt, überzeugt sich dabei von dem gleichen Aussehen des Grau an beiden Streifen und nimmt dann das weiße Papier fort, um den farbigen Grund sichtbar zu machen, so erscheint der von Roth umgebene Streifen, der sich binocular mit Grün deckt, entschieden grün, der andere, der von Grün umgeben ist und sich mit Roth deckt, ebenso entschieden roth. Man erhält ganz frappant den Eindruck, als fände eine binoculare Mischung des Grau mit den beiden Farben des Grundes statt. Schiebt man den weißen Bogen wieder unter die Glasplatte, so schwinden augenblicklich die Färbungen, wie es bei einer Mischung der Farben des Grundes mit dem Grau sein müßte.

Aber ein anderer Versuch zeigt, daß wir es hier nicht mit einer Mischung zu thun haben. Schließe ich das rechte Auge, wenn ich die Streifen complementär gefärbt vor mir sehe, so bleibt nur der von Grün umgebene Streif sichtbar, und obgleich eine Art rothen Schleiers sich von ihm zurückzieht, nämlich das ihn binocular deckende Roth, so bleibt seine Körperfarbe, das Grau, doch so röthlich, als es vorher war; das wäre nicht möglich, wenn das röthliche Aussehen des Grau nur auf einer (binocularen) Mischung mit Roth beruhte. So wie aus der Mischung das Roth fortfiel, müßte sich die ursprüngliche Farbe herstellen und eher durch den Contrast grünlich werden. Ich glaube vielmehr, daß der Erfolg dieser Versuche so zu erklären ist: Wir haben vorher gesehen, daß wenn in beiden Sehfeldern Grau enthalten ist und sich beides binocular mit Schwarz deckt, wir den Farbenton der beiden Grau sehr genau vergleichen können, und daß durch diese unmittelbare Vergleichung der beiden Grau Wirkungen monocularer Contrastes, die uns geneigt machen könnten, die beiden Grau für verschiedenartig zu halten, geschwächt werden. In dem letztbeschriebenen Versuche dagegen deckt sich Grau, welches von Roth umgeben ist, und welches wir deshalb geneigt sind, für grünlich zu halten, binocular mit Grün, und das andere durch Contrast mit der grünen Umgebung röthlich gefärbte Grau deckt sich binocular mit Roth. Hier kann diese binoculare Deckung der

beiden Flächen, welche zu vergleichen sind mit zwei verschiedenen und lebhaften Farben die Vergleichung sehr unsicher machen und daher den Contrast verstärken. 790

Schiebt man nachher eine weiße Fläche unter, an der die Augen ihr Urtheil über das Weiß wieder berichtigen können, so schwindet augenblicklich der Contrast. Auch wenn eine schwarze untergeschoben wird, so ist sogleich eine genaue und ungefälschte Vergleichung der beiden grauen Streifen möglich, welche den Contrast derselben schwinden macht. Wenn man dagegen nur ein Auge schließt, so treten keine Momente ein, die das Urtheil berichtigen könnten, und der Contrast bleibt bestehen.

Wir können das Resultat der bisher beschriebenen Versuche dahin zusammenfassen: Wenn im binocularen Felde das rechte Auge das Bild  $\alpha$ , das linke das Bild  $\beta$  dicht neben einander erblickt und  $\alpha$  sich mit dem Grunde  $b$ ,  $\beta$  mit dem Grunde  $a$  deckt, so ist die Vergleichung der objectiven oder durch Nachbilder veränderten Färbung von  $\alpha$  und  $\beta$  sehr genau, so oft der Grund  $a$  dieselbe Färbung wie  $b$  hat; sie ist dagegen sehr unsicher, so oft  $a$  und  $b$  verschiedene Farbe oder Beleuchtung haben. Ersteres zerstört monoculare Simultancontraste, letzteres begünstigt sie.

Bei einigen anderen Versuchen über binocularen Contrast kommt, wie bei vielen des monocularen Contrastes, in Betracht, daß wir die objectiven Farben der Körper von der Farbe einer weit verbreiteten Beleuchtung zu trennen geübt sind.

Dahin gehört zunächst FECHNER'S<sup>1</sup> sogenannter paradoxer Versuch. Man blicke nach einer weißen Fläche, schliesse und öffne abwechselnd das rechte Auge, so wird man finden, daß im Moment des Schlusses die weiße Fläche, welche nun nur noch vom linken Auge gesehen wird, ein wenig dunkler erscheint, als während der Öffnung beider Augen. Der Ausschluss des Lichtes von dem einen Auge bringt also, wie man erwarten mußte, eine Verdunkelung des Bildes hervor, freilich eine verhältnißmäßig außerordentlich schwache, für manche Augen kaum wahrnehmbare. Nun ändere man die Bedingungen des Versuchs dadurch ab, daß man vor das rechte Auge ein ziemlich stark verdunkelndes graues Glas nimmt. Wenn man jetzt das rechte Auge öffnet, erscheint die weiße Fläche im Gegentheil dunkler; wenn man es schließt, heller. Also wenn mehr Licht in die Augen fällt, haben wir scheinbare Verdunkelung, wenn weniger, Erhellung. Nimmt man immer hellere graue Gläser, so schwindet dieser negative Erfolg und geht endlich in den positiven über, den die freien Augen zeigen, nämlich Öffnung des geschlossenen Auges giebt Erhellung. Geht man im Gegentheil zu sehr dunkeln Gläsern über, so kommt man zuletzt an eine Grenze, wo es einerlei bleibt, ob das Auge hinter dem Glase offen oder geschlossen ist, indem das einfallende Licht keine in Betracht kommende Wirkung mehr ausübt. Eine mittlere Verdunkelung der Gläser giebt also ein Maximum des Erfolgs.

<sup>1</sup> FECHNER, *Abhandl. d. Sachs. Ges. d. Wiss.* VII, 416—463.

FECHEW selbst brauchte dazu Gläser, die zwischen 0,03 und 0,05 des einfallenden Lichts durchliefsen. Statt der grauen Gläser kann sehr zweckmäßig ALBERT's oben (S. 417) beschriebener Episkotister angewendet werden.

791 Dafs die Bewegung der Pupille hierbei ohne Einflufs ist, wurde controlirt, indem der Beobachter mit dem freien Auge durch eine enge Öffnung von geringerem Durchmesser als die Pupille blickte. Man kann auch überhaupt bei diesen Versuchen enge Öffnungen in schwarzen Papierblättern, statt der dunklen Gläser, zur Verdunkelung des Bildes anwenden.

Der Erfolg dieses paradoxen Versuchs könnte so ausgelegt werden, als wenn die Lichtempfindung in dem einen Auge unter Umständen die im anderen Auge herabsetzte, als wenn also ein antagonistisches Verhältnifs zwischen beiden Netzhäuten bestände; aber eine leichte Modification des Versuchs beweist, wie ich gefunden habe, dafs es sich hier um ganz etwas anderes handelt.

Man stelle sich so auf, dafs man vor sich im Gesichtsfelde einen wohl begrenzten und contourirten weissen Gegenstand hat, z. B. eine weisse, den Fenstern gegenüber gelegene Thür, und wähle ein dunkles Glas, mit dem der paradoxe Versuch gut gelingt, wenn man nach dieser Thür hinblickt. Dann schiebe man zwischen die Thür und das von dem dunklen Glase bedeckte Auge nahe vor diesem ein weisses Blatt Papier so ein, dafs es diesem Auge die Thür verdeckt und das ganze Gesichtsfeld dieses Auges einnimmt. Indem man das Blatt mehr oder weniger schräg gegen das Licht wendet, wird man ihm leicht eine solche Beleuchtung geben können, bei der es eben so hell ist, wie die dahinter liegende Thür. Jetzt wiederhole man den Versuch, er wird den umgekehrten Erfolg geben, wie vorher. Öffnung des geschlossenen Auges hinter dem dunklen Glase und dem Papier läfst die Thür ganz wenig heller werden, indem sich eine Art lichten Nebels über sie ergiefst: das ist nämlich das binocular deckende Bild des weissen Papiers. Nachdem man dies constatirt hat, ziehe man nun das weisse Blatt fort, während beide Augen geöffnet sind, so dafs man mit beiden Augen die Thür sieht. Jetzt erscheint die Thür beträchtlich verdunkelt, obgleich die Helligkeit jener Stellen der beiden Sehfelder, in denen sie erscheint, ganz unverändert geblieben ist.<sup>1</sup>

Diese Änderung des Versuchs zeigt, dafs es sich hierbei nicht um eine Änderung in der Empfindung des Lichts, sondern nur um eine Änderung unseres Urtheils über die Körperfarbe des weissen Objects handelt. Ist das eine Gesichtsfeld ausgefüllt mit Dunkel (bei geschlossenem Auge) oder mit gleichmäfsig vertheiltem schwachen Lichte (Bild des weissen Papiers durch das dunkle Glas gesehen), so rechnen wir diese gleichmäfsig und weit über die Grenzen des der Thür entsprechenden Gesichtsfeldes ausgedehnte Beleuchtung nicht der Körperfarbe der Thür zu, sondern bilden uns unser Urtheil über diese Farbe ganz allein nach der Aussage desjenigen Auges,

<sup>1</sup> Dafs es bei diesem Versuch darauf ankommt, ob man begrenzte oder unbegrenzte Flächen mit dem verdunkelten Auge sieht, hat auch Herr HERING beobachtet. (*Beiträge zur Physiologie*. S. 311–312.)

liches die Umrisse der Thür erkennt. Höchstens erscheinen die Abänderungen der Beleuchtung im anderen Auge als ein dunkler oder heller Bel, der sich vor die Thür und die übrigen Gegenstände hinlegt. Wenn r aber mit dem verdunkelten Auge ebenfalls die Umrisse der Thür kennen und diese in dunklem Grau erblicken, so erscheint uns dieses au der Körperfarbe der Thür eben so angehörig, wie das Weiß des 792 tgegengesetzten Auges, und die Thür selbst erscheint uns deshalb verunkelt. Sie erscheint dann wie ein grauer, mit weißem Licht erhellter d glänzender Körper. Natürlich aber muß diese Verdunkelung ausbleiben, nn entweder die Verdunkelung durch das Glas sehr gering ist und sich her das im zweiten Auge hinzukommende Licht nur als Licht merklich icht, oder wenn im Gegentheil die Verdunkelung so groß ist, daß die jecte kaum noch erkannt werden können.

Ähnliche Verhältnisse kommen auch monocular vor bei dem von SMITH d BRÜCKE<sup>1</sup> angegebenen Versuche, den FECHNER den seitlichen Fenster-such nennt. Man kann diesem Versuche eine andere Form geben, wie gefunden habe, bei der sich die Bedingungen des Erfolges noch sicherer rsehen lassen, als bei jener ersten Form. Ich habe eine planparallele tte Uranglas in zwei Hälften theilen lassen. Dieses Glas sieht im Kerzen- it ganz ungefärbt aus, weil es nur die violetten und einen Theil der uen Strahlen absorbiert, deren Menge im Kerzenlicht sehr unbedeutend bei Tage, wenn die Substanz des Glases selbst nicht stark erleuchtet erscheinen weißse Gegenstände durch das Glas schwach gelblich. Wird Masse des Glases selbst aber durch directes Sonnenlicht getroffen, so t intensiv grünes Fluorescenzlicht von allen seinen Theilen aus. Wenn vor jedes Auge eine solche Platte Uranglas nehme, beide so beschattet, nur das von dem Objecte kommende Licht sie trifft, und das Bild eines sen Feldes auf schwarzem Grunde in ein Doppelbild aus einander treibe, rerscheinen natürlich beide Bilder des weißen Feldes in gleicher gelblicher Farbe. Wenn ich nun aber das eine Glasstück von directen Sonnen- len treffen lasse, so füllt sich das Sehfeld des dahinter stehenden Auges dem grünen Lichte der Fluorescenz, und nun sieht nach wenigen Be- ingen des Auges das zugehörige Doppelbild des Weiß, welches noch mit grünem Licht übergossen ist, rosaroth aus, während das Doppel- des anderen Auges heller und grünlich erscheint, obgleich es objectiv weiß ist. Wir haben also hier in dem Auge, welches durch das fluores- de Glas sieht und dessen Grund deshalb gleichmäßig mit schwachem en Lichte bestrahlt wird, eine so vollständige Trennung des begrenzten s von dem unbegrenzt ausgegossenen Grün, daß an jenem Weiß sogar osenrothe Färbung zum Vorschein kommt, welche durch die Ermüdung Auges gegen Grün bedingt wird. Im Contrast dazu erscheint dann das e nicht grüne Bild grünlich.



Bei dem ursprünglichen Versuche von SMITH war es, wie wir oben gesehen haben, das rothe durch die Augenhäute eingedrungene Licht, welches das gleichseitige Bild dunkler und blaugrün, das andere roth erscheinen läßt. Dieses rothe Licht kann sichtbar gemacht werden, wenn man mit dem seitlich beleuchteten Auge schwarze Buchstaben auf weißem Grunde betrachtet; diese sehen hierbei oft leuchtend roth aus. Natürlich erscheint dann auch das dem seitlich beleuchteten Auge angehörige Halbbild eines in Doppelbilder aus einander geschobenen schwarzen Flecks auf weißem Grund röthlich 793 in Vergleich mit dem des anderen Auges. Concentriert man dagegen durch eine Linse grünes oder blaues Licht auf einen Punkt der Sclerotica, so ist das weiße Bild in diesem Auge rosenroth oder gelb. Da die Erklärung dieses Versuches bezweifelt worden ist,<sup>1</sup> so ist die Modification desselben mit den Uranglasplatten, wobei alle concurrirenden Umstände deutlicher zu übersehen sind, wohl überzeugender.

Die Erscheinungen des binoculars Contrastes erklären sich also von dem von uns eingehaltenen Standpunkte leicht. Faßt man dagegen, wie es früher meist geschah, die Contrastfarben als Veränderungen der Empfindung auf, welche durch die Reizung einer Netzhautstelle in den benachbarten hervorgerufen werden, so folgt auch für den binoculars Contrast mit Nothwendigkeit, daß er durch Einwirkung der Empfindungen der einen Netzhaut auf die der anderen entstehe, und man hat deshalb hierin mit einem Grund für die angeborene anatomische Verbindung correspondirender Nervenfasern gesucht.

Es ist hier noch die von DOVE, dem Entdecker des stereoskopischen Glanzes, aufgestellte Erklärung dieser Erscheinung zu erwähnen. DOVE unterscheidet an glänzenden Körpern das von der Oberfläche reflectirte weiße und das aus den oberflächlichen Schichten der Substanz hervordringende gefärbte Licht. Glanz entsteht nach ihm dadurch, daß man die beleuchtete Körpersubstanz hinter der beleuchteten Oberfläche sehe, also zwei Arten von Licht, das eine durch das andere durchscheinend. Er glaubt nun, daß, wenn wir zwei Farben, z. B. Roth im einen, Blau im anderen Felde combiniren, wir auf verschiedene Entfernung derselben vom Auge schließen, weil wir verschiedene Accommodation anwenden müssen, um sie scharf zu sehen. Ich habe diese Erklärung nicht beibehalten, weil die seit Aufstellung derselben angestellten Versuche über Beurtheilung der Entfernung mittels der Accommodation, namentlich in einem Falle, wo, wie hier, die Convergenz der Augen constant erhalten werden muß, es mir höchst unwahrscheinlich machen, daß eine solche Wahrnehmung scheinbar verschiedener Entfernung der Farben möglich sei. Außerdem tritt die Schwierigkeit ein, daß Weiß und Schwarz zusammen combinirt auch Glanz geben. Hierbei glaubt DOVE nun annehmen zu dürfen, daß, weil Weiß die Pupille zusammenziehen macht, was ebenfalls bei stärkerer Accommodationsanstrengung geschieht, Schwarz sie aber erweitert, die Betrachtung von Weiß und Schwarz verschiedene Accommodationsgefühle gebe. Dagegen ist zu bemerken, daß bei den vorliegenden Versuchen gleichzeitig ein Auge Weiß, das andere

<sup>1</sup> FECHNER über den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch. *Berichte der Kön. Sächsischen Ges. d. Wiss.* 1861. S. 27—56.

schwarz sieht und beide Pupillen dabei dieselbe mittlere Weite einnehmen, zweitens, daß alle Accommodation sich nicht auf die Mitte einer gleichfarbigen Fläche, sondern nur auf ihre Contoure beziehen kann, und nicht einzusehen ist, wie daraus Unterschied des Accommodationsgefühls entstehen könne, daß im einen Bilde rechts, Schwarz links von der Grenze, oder Weiß über, Schwarz unter der Grenze liegt, im anderen umgekehrt. Ich habe deshalb die oben gegebene Erklärung die einfachere der ursprünglichen des berühmten Entdeckers dieser Erscheinung substituiren mir erlaubt.

**Geschichtliches.** Der Wettstreit der Sehfelder erregte schon früh die Aufmerksamkeit der Beobachter. DU TOUR benutzte ihn schon, um seine Meinung, daß der Begerh nur ein Auge auf einmal sehe, und wir deshalb die Objecte einfach sähen trotz Anwesenheit zweier Augen, zu unterstützen. HALDAT wollte dagegen Mischung der oben gesehen haben, was er mit der von NEWTON und später von WOLLASTON und FÜLLER angenommenen Hypothese von der anatomischen Vereinigung correspondirender 794 Nervenfasern in Zusammenhang brachte. Ihm schlossen sich an MÖNNICH, JANIN, LITNER; während J. MÜLLER selbst, der die Lehre der Identität der Netzhautstellen ihrer Consequenzen hauptsächlich ausgebildet hat und der gewiß am meisten dabei resirt gewesen wäre, eine binoculare Farbenmischung zu sehen, keine solche erwähnt, lern nur den Wettstreit gesehen hat. Wie auch die späteren Beobachter verschieden theilt haben, ist oben schon erwähnt. Es scheinen in dieser Beziehung sehr große viduelle Unterschiede zu bestehen. So lange man die Empfindung einer Mischfarbe eine einfache Wirkung zweier combinirter Ursachen ansah, schien eine solche findung nur in einer und derselben Nervenfasern zu Stande kommen zu können, und Beobachtung wirklicher binocularer Farbenmischung schien deshalb den Beweis der omischen Verschmelzung je zweier correspondirender Fasern liefern zu können, und te andererseits bei Annahme einer solchen Hypothese auch nothwendig erwartet en. Der YOUNG'schen Farbentheorie gegenüber verliert freilich dieser Punkt sehr Vichtigkeit, wie schon oben hervorgehoben ist.

Ein wesentlicher Fortschritt war die Entdeckung der objectiven Bedeutung der ularen Vereinigung verschiedener Farben oder Helligkeiten in dem Phänomen des kopischen Glanzes durch DOVE. Der oben besprochenen Theorie dieses Phänomens, sich auch BRWSTER anschloß (dabei, wie es scheint durch ein Mißverständniß, 's eigene Theorie bekämpfend), stellte später zuerst J. J. OPPEL die oben vorgetragene here entgegen. Ohne von diesem zu wissen, kam ich selbst auf dieselbe Ansicht ache und hob die Wichtigkeit des Phänomens für die Theorie der Empfindungen pondirender Stellen hervor.

Die Phänomene des binocularen Contrastes wurden erst in den letzten Jahren t, namentlich durch FRECHNER in einer sehr ausgedehnten Arbeit; einzelne dahin ge Beobachtungen waren schon früher von E. BRÜCKE, H. MEYER, PANUM gemacht n.

### § 33. Kritik der Theorien.

Nachdem ich die Übersicht der Thatfachen, die sich bei der Unter- 796 ng der Gesichtswahrnehmungen ergeben, beendigt habe, wird es nützlich noch einmal einen Rückblick auf den Zusammenhang der theoretischen ellungen zu werfen und zu prüfen, welche den Thatfachen gegenüber lässig, welche als unzulässig oder unwahrscheinlich erscheinen. 's ist dabei von vorn herein zu bemerken, daß unsere Kenntniß der r gehörigen Erscheinungen noch nicht so vollständig ist, um nur eine e zu erlauben und jede andere auszuschließen. Bei der Wahl zwischen

den verschiedenen theoretischen Ansichten scheint mir unter diesen Umständen bisher mehr eine Neigung zu gewissen metaphysischen Betrachtungsweisen, als der Zwang der Thatsachen, ihren Einfluß auf die verschiedenen Forscher ausgeübt zu haben, namentlich da in dem psychologischen Gebiete noch principielle Fragen hinzukommen, die in dem Bereiche der unorganischen Naturerscheinungen längst vollständig beseitigt sind.

Manche Naturforscher sind in der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen wie mir scheint, allzu bereit gewesen, allerlei anatomische Structuren zu supponiren oder auch neue Qualitäten der Nervensubstanz vorauszusetzen, welche nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem haben, was wir sonst von den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Naturkörper im Allgemeinen oder den Nerven im Besonderen bestimmt wissen, Structuren und Eigenschaften, welche nur dazu dienen, für ein oder einige wenige Phänomene des Sehens Erklärungen herzustellen, die wenigstens den äußeren Anschein naturwissenschaftlicher Erklärungen haben sollten, und bei denen die ganz unzweifelhafte Einmischung psychischer Phänomene entweder ganz geleugnet oder als relativ unwichtig hingestellt wurde.

Ich gebe zu, daß wir noch weit entfernt von einem naturwissenschaftlichen Verständniß der psychischen Erscheinungen sind. Die Möglichkeit eines solchen Verständnisses entweder absolut zu leugnen, wie die Spiritualisten, oder andererseits absolut zu behaupten, wie die Materialisten, das kann wohl die Neigung zu dieser oder jener Richtung der Speculation treiben; dem Naturforscher, der sich an die factischen Verhältnisse zu halten und deren Gesetze zu suchen hat, ist dies eine Frage, für welche er keine Entscheidungsgründe besitzt. Man muß nicht vergessen, daß der Materialismus ebenso gut eine metaphysische Speculation oder Hypothese ist, wie der Spiritualismus, und ihm deshalb nicht das Recht einräumen, in der Naturwissenschaft über factische Verhältnisse oder factische Grundlage entscheiden zu wollen.

Welche Ansicht man aber auch von den psychischen Thätigkeiten haben und welche Schwierigkeit ihre Erklärung auch bieten mag, so sind sie jedenfalls factisch vorhanden und ihre Gesetze sind uns bis zu einer gewissen Grenze wohlbekannt aus der täglichen Erfahrung. Ich für mein Theil halte es für sicherer, die Erklärungen der Erscheinungen des Sehens anzuknüpfen an andere, freilich selbst noch weiterer Erklärung bedürftige, aber doch jedenfalls vorhandene und thatsächlich wirksame Vorgänge, wie es die einfacheren psychischen Thätigkeiten sind, als sie auf ganz unbekannte, nur *ad hoc* erfundene, durch keinerlei Analogie gestützte Hypothesen über die Einrichtung des Nervensystems und die Eigenschaften der Nervensubstanz zu gründen. Zu dem letzteren Schritte würde ich mich erst berechtigt glauben, wenn alle Versuche der Erklärung aus bekannten Verhältnissen gescheitert sein sollten.

Das letztere ist nun meines Erachtens aber bei der psychologischen Erklärung der Gesichtswahrnehmungen keineswegs der Fall; im Gegentheil

aufmerksamer ich die Erscheinungen studirt habe, desto gleichmäßiger übereinstimmender hat sich überall die Einwirkung der psychischen Vorgänge gezeigt, und desto consequenter und zusammenhängender stellte sich dieses ganze Gebiet von Erscheinungen dar.

Ich habe deshalb keinen Anstand genommen, in den vorausgehenden agraphen die Thatsachen durch Erklärungen, die wesentlich auf die einzelnen psychischen Vorgänge der Ideenassociation gestützt sind, in Verbindung und in Zusammenhang zu setzen. Dafs eine solche Ansicht nicht ist, habe ich in den geschichtlichen Übersichten schon erwähnt. Wenn der jüngsten Zeit die Ansichten einzelner Physiker und Physiologen, die die Richtung einschlugen, wie WHEATSTONE, VOLKMANN, H. MEYER, NAGEL, LASSEN, WUNDT, mehr Opposition als Anerkennung fanden, so glaube ich, dies, abgesehen von der Abneigung unseres Zeitalters gegen philosophische psychologische Untersuchungen, davon herrührt, dafs es an einer zusammenhängenden Darstellung aller Erscheinungen dieses Gebietes fehlte, deshalb von Seiten der unerledigten Erscheinungsgebiete immer wieder Zweifel aufstiegen gegen diejenigen, welche von den genannten Forschern gearbeitet waren. Ich habe deshalb die vorliegende Gelegenheit benutzt, das ganze Gebiet nach dieser Richtung hin durchzuarbeiten und eine Ansicht davon zu geben.

Ich erlaube mir einen kurzen Überblick der zur Erklärung von mir aufgestellten Principien zu geben. Der Hauptsatz der empiristischen Ansicht ist: Sinnesempfindungen sind für unser Bewusstsein Zeichen, deren Bedeutung verstehen zu lernen unserem Verstande überlassen ist. Was die für den Gesichtssinn erhaltenen Zeichen betrifft, so sind sie verschieden nach Intensität und Qualität, das heifst nach Helligkeit, Farbe, und außerdem mufs noch eine Verschiedenheit derselben bestehen, welche abhängig ist von der Stelle der gereizten Netzhaut, ein sogenanntes Localzeichen. Die Localzeichen der Empfindungen des rechten Auges sind durchgängig von denen des linken verschieden.

Wir fühlen außerdem den Grad der Innervation, die wir den muskulenerven zufliessen lassen. Die Anschauung der Raumverhältnisse aller Bewegung sind nicht nothwendig aus den Gesichtswahrnehmungen, wenigstens nicht aus diesen allein, herzuleiten, da sie bei Blinden ganz genau und vollständig auch unter Vermittelung des Tastsinns gewonnen werden, sie können also für unseren Zweck als gegeben angesehen werden.

Durch Erfahrung können wir offenbar lernen, welche anderen Empfindungen des Gesichts oder der anderen Sinne ein Object, welches wir sehen, verursachen wird, wenn wir die Augen oder unsern Körper fortbewegen und das Object von verschiedenen Seiten betrachten, betasten u. s. w. Der Begriff aller dieser möglichen Empfindungen in eine Gesamtvorstellung zusammengefaßt, ist unsere Vorstellung von dem Körper, welche wir Empfindung nennen, so lange sie durch gegenwärtige Empfindungen

unterstützt ist, Erinnerungsbild, wenn sie das nicht ist. In gewissem Sinne also, obgleich dem gewöhnlichen Sprachgebrauche widersprechend, ist auch eine solche Vorstellung von einem individuellen Objecte schon ein Begriff, weil sie alle die möglichen einzelnen Empfindungsaggregate umfaßt, welche dieses Object, von verschiedenen Seiten betrachtet, berührt oder sonst untersucht, in uns hervorrufen kann. Das ist der thatsächliche und reelle Inhalt einer solchen Vorstellung von einem bestimmten Objecte; einen anderen hat sie nicht, und dieser Inhalt kann ohne Zweifel unter Voraussetzung der oben genannten Data durch Erfahrung gewonnen werden.

Die einzige psychische Thätigkeit, die dazu gefordert wird, ist die gesetzmäßig wiederkehrende Association zweier Vorstellungen, die schon oft mit einander verbunden gewesen sind, welche Association desto fester und zwingender wird, je öfter die Wiederholung stattgefunden hat.

So weit also unsere durch Gesichtsbilder vermittelten Vorstellungen von den Objecten richtig sind, erklären sie sich einfach aus den vorangestellten Principien. Es fragt sich nun aber, wie ist es möglich, daß Sinnes-täuschungen vorkommen. Unter diesen müssen wir zwei Klassen unterscheiden. Erstens solche, bei denen die äußeren Umstände, unter denen die Einwirkung auf unsere Sinne geschieht, ungewöhnliche sind, wie bei der Betrachtung der optischen Bilder von Spiegeln, Linsen oder bei der Combination stereoskopischer Darstellungen. Hier wird der Eindruck, den bestimmte Objecte machen, unter ungewöhnlichen Bedingungen erzeugt. Obgleich wir dies wissen, ruft der Eindruck nach dem Gesetze der Vorstellungsassociationen doch die Vorstellung der der Regel nach mit ihm verbunden gewesen anderen Sinnesindrücke, das heißt die Vorstellung des betreffenden Objects hervor.

Die zweite Klasse von Sinnes-täuschungen ist diejenige, wobei wir wirkliche Objecte bei ungewöhnlichem Gebrauche unserer Sinnesorgane falsch sehen. Zu ihrer Erklärung ist zu beachten, daß, sobald eine bestimmte Art des Gebrauchs unserer Sinneswerkzeuge geeignet ist, uns deutlichere und sicherere Wahrnehmungen der Objecte zu geben, als jede andere, wir jene, die wir deshalb die normale genannt haben, möglichst viel oder ausschließlich anzuwenden uns einüben. Brauchen wir dann unsere Sinnesorgane in abweichender Weise, so rufen die gewonnenen Eindrücke uns naturgemäß die Vorstellungen solcher Objecte hervor, welche beim normalen Gebrauche der Organe dieselben oder möglichst ähnliche Eindrücke gegeben haben würden.

Beim normalen Gebrauche der Augen kommt in Betracht, erstens, daß in jedem Auge die Centralgrube der Netzhaut die deutlichste Unterscheidung nahe neben einander gelegener Bilder zuläßt, zweitens, daß  
799 wir deutliche Eindrücke nur behalten, wenn wir durch fortwährende Augenbewegungen die Ausbildung scharf gezeichneter Nachbilder vermeiden, drittens, daß wir an einer ausgedehnten Fläche von gleichmäßiger Beleuchtung alles deutlich gesehen haben, was an ihr deutlich zu sehen ist, wenn wir alle

Theile ihres Umfangs deutlich gesehen haben. Daraus ergibt sich, daß wir beim normalen Gebrauche der Augen beide Blicklinien auf den Punkt richten, der gerade unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, und die Augen für ihn accommodiren, dieselben aber niemals längere Zeit unbewegt lassen, was auch dem eigenthümlichen Bewegungstribe unserer Aufmerksamkeit nicht entsprechen würde, vielmehr den Blick namentlich an den Contouren der gesehenen Objecte entlang laufen lassen.

Daraus folgt die gewohnheitsmäßige Verbindung der Bewegungen beider Augen miteinander und mit der Accommodation; eine Gewohnheit, gegen die so schwer anzukämpfen ist und die doch jeden Augenblick durch willkürliche Anstrengung überwunden werden kann, wie oben gezeigt wurde, wenn man die Augen allmählig unter Bedingungen bringt, wo nur mittels ungewöhnlicher Verbindungen die Zwecke des Sehens erreicht werden können. Daraus folgt ferner die Schwierigkeit, den Blick längere Zeit gegen die eingeübte Gewohnheit auf einem Punkte festzuhalten, daraus der große Einfluß hervortretender Contouren auf unsere Aufmerksamkeit und auf die Bewegung unseres Blicks; daraus auch weiter, daß unsere Aufmerksamkeit so schwer zu einer genaueren Analyse der Erscheinungen des indirecten Sehens, des blinden Flecks, der Doppelbilder und so weiter, festzuhalten ist, indem wir gewohnheitsmäßig sogleich unseren Blick auf die die Aufmerksamkeit beschäftigenden Stellen hinzuwenden streben. Daher wir denn auch hauptsächlich wegen der gewohnheitsmäßig eintretenden Augenbewegungen selbst die stärker auseinander weichenden Doppelbilder der vor uns befindlichen Gegenstände nicht zu sehen pflegen und sie eben deshalb vielen, selbst erwachsenen Leuten unbekannt bleiben.

Daß die Verbindung zwischen der Raddrehung jedes einzelnen Auges und der Richtung der Gesichtslinie unter dieselbe Kategorie fällt, daß sie unter abgeänderten Bedingungen des Sehens zu Gunsten der optischen Zwecke selbst abgeändert werden kann, habe ich oben gezeigt und versucht die Sicherheit der Orientirung, vermöge deren wir die unveränderte Lage ruhender Gegenstände trotz der Verschiebungen ihres Bildes auf der Netzhaut erkennen, als denjenigen Zweck nachzuweisen, der durch die Erfüllung des Listing'schen Gesetzes für unsere Augenbewegungen so weit als möglich erreicht wird.

Da nachweisbar zu Gunsten von optischen Zwecken von allen diesen Gesetzen der Augenbewegungen Ausnahmen unter dem Einflusse willkürlicher Anstrengung eintreten können, so können diese Gesetze nicht auf mechanisch wirkende anatomische Einrichtungen begründet sein; andererseits halte ich es nicht für unmöglich, sondern sogar für wahrscheinlich, daß das Wachsthum der Muskeln und vielleicht selbst die Leitungsfähigkeit der Nervenbahnen sich den Forderungen, die an sie gemacht werden, im Laufe jedes individuellen Lebens und vielleicht selbst durch Vererbung im Laufe des Lebens der Gattung so anpaßt, daß die geforderten zweckmäßigsten Bewegungen auch die leichtesten werden. Jedenfalls ist dieser anatomische 800

Mechanismus, so weit ein solcher besteht, nur erleichternd, nicht zwingend.

Mittels der Augenbewegungen ist es ferner möglich, die Ordnung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde kennen zu lernen, das heisst, zu lernen, welche Localzeichen der Empfindungen den einander unmittelbar benachbarten Punkten entsprechen. Das specielle Gesetz der Augenbewegungen bestimmt dann weiter, welche Raumgrößen des Gesichtsfeldes ihrer Größe nach genau mit einander verglichen werden können, welche nicht. Genaue Vergleichen werden diejenigen, deren Bild durch bloße Bewegung des Auges auf denselben Punkten oder Linien der Netzhaut abgebildet werden kann. Das ist eine Regel, welche durch die Thatsachen durchaus bestätigt wird. Dagegen finden sich bei der Vergleichung solcher Raumgrößen, die nicht auf denselben Netzhauttheilen abgebildet werden können, theils constante, theils inconstante Fehler. Die constanten Fehler lassen sich zum Theil darauf zurückführen, daß wir (wenigstens als Kinder, während der Ausbildung unseres Auges) als häufigstes Gesichtsubject entferntere Gegenstände und den bis zu ihnen hin sich erstreckenden Fußboden vor Augen haben. Ich erinnere an die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane und an die falsche Zeichnung der Quadrate.

Endlich zeigt sich der Einfluß des Gesetzes der Augenbewegungen auch in der Führung der scheinbar geraden (oder kürzesten) Linien des Gesichtsfeldes. Verlegen wir die Blicklinie in ihre Primärlage, welche wir als ihre häufigste und wichtigste Stellung betrachten dürfen, so sind es diejenigen Linien, die nach dem Gesetze der Augenbewegungen sich in sich selbst verschieben können.

Ich habe die Ableitung dieser Gesetze auf gar keine bestimmte Annahme über die Art der Localzeichen begründet. Sie würde passen, auch wenn diese Zeichen ganz willkürlich über die Netzhaut ausgewürfelt wären, ohne daß irgend welche Ähnlichkeit der Localzeichen benachbarter Punkte vorausgesetzt würde. Es würde dadurch allerdings die Schwierigkeit der Einübung beträchtlich erhöht werden. Ich halte es dagegen nicht für unwahrscheinlich und der Analogie anderer organischer Einrichtungen gemäß, daß die Localzeichen benachbarter Punkte einander ähnlicher seien, als die entfernter Punkte, und daß somit die Art des Localzeichens eine continuirliche Function der Coordinaten der Netzhautpunkte sei. Indessen wie auch dieses System der Localzeichen, von welcher Art sie selbst sein mögen, so kann ihre besondere Einrichtung die Orientirung wohl erleichtern; aber auch hier fordern die Consequenzen der empiristischen Theorie, mit denen die Erscheinungen durchaus übereinstimmen, daß jede solche Einrichtung nur erleichternd für die Einübung des Augenmaaßes, nicht entscheidend für seine definitiven Resultate sei.

Zu diesen anatomischen Einrichtungen gehört dann auch die Zahl der empfindlichen Elemente zwischen je zwei Netzhautpunkten. Diese mag namentlich bei der Unterscheidung sehr kleiner Distanzen nicht unwichtig

in, nach dem Gesetze, daß deutlich unterscheidbare Größen beim Mangel derer Hilfsmittel der Beurtheilung uns größer erscheinen, als undeutlich unterscheidbare. Daß die Anzahl der empfindlichen Elemente bei der Schätzung der größeren Distanzen ohne allen Einfluß sei, ist oben gezeigt worden.

Für die empiristische Theorie ist es übrigens ganz gleichgültig, wie die Netzhaut gestaltet ist, wie das Bild auf ihr liegt und wie es verzerrt ist, wenn es nur scharf begrenzt ist; sie hat es nur und allein zu thun mit der Projection der Netzhaut, welche die optischen Medien nach außen werfen.

Die Richtung, in der die gesehenen Objecte sich zu unserem Körper finden, wird beurtheilt mit Hilfe der Innervationsgefühle der Augenmuskelnerven, aber fortdauernd controllirt nach dem Erfolge, das heißt nach der Verschiebung der Bilder, welche die Innervationen hervorbringen. Wenn wir durch Prismen und nehmen wir dabei Bewegungen mit unserem Körper und unseren im Gesichtsfelde erscheinenden Händen vor, so lernen wir bald, trotz der falschen Richtung der einfallenden Strahlen durch das Auge richtig sehen. Die Erscheinungen des Bewegungsschwindels zeigen uns also eine Veränderung in der Beurtheilung der Wirkung gewisser Innervationen an.

Wir beurtheilen den absoluten Grad der Convergenz unsicherer, als gleich gerichteten Bewegungen beider Augen, vielleicht weil für die Convergenz eine anhaltendere Ermüdung zu Stande kommen kann, welcher durch Ermüdung für Divergenz das Gleichgewicht gehalten wird, während eine längere Wendung der Augen nach rechts nicht leicht ohne wischenfallende Wendungen nach links vorkommen möchte, wobei die Ermüdung sich gleichmäßiger auf die antagonistischen Muskeln vertheilt.

Theils deshalb, theils aber auch, weil wir consequent die subjectiven Elemente in unseren Sinnesempfindungen unbeachtet lassen und also bei der Beurtheilung eines nahen Gegenstandes die ganze Summe von Gesichtseindrücken und Innervationsgefühlen nur als das sinnliche Zeichen für ein dort gelegenes Object betrachten, ohne zu analysiren, welche Eindrücke dem rechten oder dem linken Auge angehören, welche Stellung dieses oder jenes hat, beurtheilen wir die Richtung der Objecte gegen unseren Körper nach der gemeinsamen mittleren Richtung beider Augen, auch wenn wir nur mit einem Auge das Object wirklich sehen. Es entspricht dies der Regel, daß wir bei der Beurtheilung der Richtung, die wir unter ungewöhnlicher Art des Gebrauches der Organe (einäugigem Sehen) erhalten, nach der Ähnlichkeit mit den Eindrücken bei dem gewöhnlichen Gebrauch (doppelläugigem Sehen) urtheilen; daher die von J. TOWNSEND und E. HERING aufgefundene Regel für die Projection der Gesichtsbilder auf die Netzhaut, mit den Modificationen, die ich für die Raddrehungen bei verschiedenen Blickrichtungen habe anbringen müssen.

Wir kommen jetzt zum doppelläugigen Sehen. So lange wir im stereoskopischen Gebiete verweilen, beim Sehen von Körpern oder von stereo-



skopischen Bildern, sind die Erscheinungen einfach zu erklären und leicht verständlich nach der empiristischen Theorie; auch ist der Einfluß der Erfahrung in diesem Gebiete meistens selbst von den Anhängern nativistischer Theorien, mit Ausnahme einiger der neusten Arbeiten, anerkannt worden. Die Täuschungen, welche hier vorkommen, erklären sich aus der Unsicherheit der Schätzung der Convergenz. Wenn wir den Augen Bilder zeigen, welche von reellen Objecten nur bei einem bestimmten Grade der Convergenz gegeben sein könnten, so geben wir ihnen die entsprechende Deutung, auch wenn zur Zeit wirklich ein anderer Grad von Convergenz besteht. 802 Dazu kommt, daß wir wegen der mangelnden Sicherheit des Convergenzgefühls, auch keine Sicherheit in der Beurtheilung der Differenzen der Rotdrehungen haben, welche die convergenten Augen bei gehobener und gesenkter Blickenebene zeigen. Wenn daher die Abweichungen in den Linien der gesehenen Bilder uns nicht aufmerksam machen, daß Drehung vorhanden sei, so urtheilen wir so, als ob keine da wäre, und es treten dann die von RECKLINGHAUSEN und von HERING beschriebenen Täuschungen ein.

Wenn nun aber bei festgehaltenem Fixationspunkte die Aufmerksamkeit der flächenhaften Anordnung der Gegenstände im Gesichtsfelde zugeleitet wird, so sieht jedes Auge eine andere Anordnung derselben und die beiden Bilder können nicht ganz congruiren; wenn also einzelne Punkte derselben congruiren, so müssen andere Punkte der Bilder disparat sein und diese erscheinen dann an zwei verschiedenen Stellen des gemeinschaftlichen Sehfeldes, als Doppelbilder. Punkte der Netzhäute, beziehlich Punkte der beiden Sehfelder, deren Bilder im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde zusammenfallen, hat man identische oder correspondirende Punkte genannt.

In Bezug auf die Natur der correspondirenden Punkte ergeben nun die Thatsachen mit Entschiedenheit so viel:

1. Die Bilder correspondirender Punkte werden in der Regel in dieselbe, die Bilder nicht correspondirender Punkte in verschiedene Stellen des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes verlegt; doch kommen kleinere Abweichungen von beiden Theilen dieser Regel vor, wenn wir die beiden Bilder zur Anschauung eines körperlichen Objects vereinigen.

2. Die Empfindungen, welche durch die Erregung correspondirender Netzhautpunkte hervorgebracht werden, sind nicht identisch, sondern verschieden. Wir müssen dies nothwendig schliessen aus der Thatsache, daß wir auch beim Lichte des elektrischen Funkens von einer stereoskopischen Linienzeichnung immer das richtige Relief erhalten. Wären die Empfindungen correspondirender Punkte ununterscheidbar gleich, so müßte ebenso oft und ebenso leicht das umgekehrte Relief erscheinen.<sup>1</sup> Wir schliessen dasselbe zweitens daraus, daß verschiedene Beleuchtung oder Färbung entsprechender

<sup>1</sup> DONDERS giebt an (*Anomalies of accommodation and refraction*. London 1864, p. 162 und 166), daß bei unbewegtem Auge oft das pseudoskopische Bild statt des stereoskopischen erscheine. In einer später erschienenen Abhandlung im *Nederlandsch Archief* (1866), wo er ähnliche Vorsichtsmaßregeln angewandt hat, wie oben S. 890 angegeben sind, hat er aber im Wesentlichen dieselben Resultate, wie ARNOLD und ich erhalten.

Flächen in zwei stereoskopischen Bildern eine andere Anschauung, nämlich die des Glanzes, hervorbringt als jede, wie immer gewählte, gleichartige Färbung beider Flächen. Dafs hierbei Augenbewegungen und der Wettstreit der beiden Sehfelder keinen Einflufs haben, zeigt sich namentlich bei der Beleuchtung auch dieser Bilder mit dem elektrischen Funken.

3. Unter dem Einflufs habitueller abnormer Augenstellungen bei Schielenden ändert sich das Verhältnifs der Correspondenz der beiden Netzhäute.

Hieraus schliesse ich, dafs jede anatomische Hypothese unzulässig ist und unvereinbar mit den Thatsachen, welche eine vollständige Verschmelzung der beiderseitigen Empfindungen voraussetzt, also namentlich jede, welche eine Vereinigung der von correspondirenden Netzhautstellen kommenden Fasern zu einer Faser annimmt, die den beiderseitigen Eindruck ungetrennt 803 dem Gehirne zuleiten soll. Nur eine solche Form der anatomischen Hypothese würde mir zulässig erscheinen, wonach beide Eindrücke theils gesondert, theils aber auch mit einer gemeinsamen oder gleichen Wirkung im Gehirn zur Perception kommen; also etwa so, dafs die Faser *A* von dem rechten Auge sich spaltet in die Fasern *a* und  $\alpha$ , die correspondirende Faser *B* in die Fasern *b* und  $\beta$ , dafs *a* und *b* gesondert in das Centralorgan des Sehens eintreten und verschiedene Eindrücke hervorbringen,  $\alpha$  und  $\beta$  aber sich vereinigen, um einen beiden gemeinsamen dritten Eindruck zu machen.

Eine so modificirte Annahme würde mir zulässig, aber weder wahrscheinlich noch nothwendig erscheinen. Vielmehr ergeben die Consequenzen der bisher aufgestellten Erklärungen auch hier eine, wie mir scheint, vollständig genügende Erklärung ohne eine solche Annahme. Beim normalen Sehen sind immer die Blicklinien auf denselben objectiven Punkt gerichtet, dem gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit zugewendet ist; auf allen anderen Punkten der Netzhäute dagegen kommen bald gleiche, bald ungleiche Eindrücke vor; daher wird vor allen Dingen die Localisation der Eindrücke der Netzhautgruben eine übereinstimmende. Ist es dagegen wegen einer Erkrankung der Muskeln nicht möglich, die dazu gehörige Stellung der Augen herbeizuführen, und wird dafür eine andere Stellung habituell, so bestimmt diese auch, mit welchem Punkte der anderen Netzhaut die Netzhautgrube jedes Auges correspondent wird.

Die Identität der Meridiane bestimmt sich danach, wo sich am häufigsten Reihen derselben Punkte abbilden. Dies geschieht zunächst in der Primärstellung der Blickebene, die wir als mittlere und gewöhnlichste Stellung dieser Ebene betrachten dürfen, auf den Netzhauthorizonten. Demnächst scheinen bei vielen normalsichtigen Augen die nach dem Horizont hinlaufenden Linien des Fußbodens einen bestimmenden Einflufs auf die Lage der verticalen correspondirenden Meridiane auszuüben.

Sind diese beiden Paare correspondirender Meridiane bestimmt, so bestimmen sich die übrigen Abmessungen der Sehfelder und damit die Lage der congruirenden Punkte in beiden vollständig nach dem oben beschriebenen Verfahren mittels der Augenbewegungen.

Da hiernach die Vergleichung der Dimensionen beider Sehfelder und die Lage der congruenten Punkte in ihnen ein Ergebniss der Ausbildung des Augenmaasses ist, so sind kleine Irrungen in diesen Abmessungen möglich, wenn sich mit grofser Lebhaftigkeit die Anschauung körperlicher Einheit der beiden Bilder aufdrängt. Sind die Entfernungen der Doppelbilder von einander dagegen sehr auffallend, so kann eine annähernd richtige Deutung derselben mit der Wahrnehmung ihrer Trennung im Gesichtsfelde zusammen bestehen. Alles, was die Vereinigung der Doppelbilder zum körperlichen Anschauungsbilde erschwert oder die Vergleichung ihrer Lage im Gesichtsfelde erleichtert, Vermeidung aller Augenbewegungen und Übung in ihrer Beobachtung macht sie leichter sichtbar. Je nach der Richtung der Aufmerksamkeit kann man solche, die an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegen, auch beim Lichte des elektrischen Funkens, welches allen Einflufs 804 der Augenbewegungen aufhebt, bald sehen, bald nicht sehen. Alles dies sind Umstände, die mit der aufgestellten Erklärung sehr gut zusammenstimmen und aus ihr hergeleitet werden können.

Die Erscheinungen des Wettstreits endlich hängen von der Eigenthümlichkeit unseres Bewußtseins ab, dafs es entweder nur einen Eindruck auf ein Mal, oder nur ein solches Aggregat von Eindrücken aufnehmen kann, die sich zu einer einfachen Vorstellung verbinden. Abgesehen von den bekannten täglichen Erfahrungen zeigt sich diese Eigenthümlichkeit desselben sehr deutlich bei der bekannten Zeitdifferenz zwischen den Gesichts- und Gehörs- und Wahrnehmungen in der astronomischen Beobachtung der Sterndurchgänge, ferner in der kleinen Zahl von Gesichtsobjecten, die man beim Lichte des elektrischen Funkens und während der kurzen Nachdauer seines Eindrucks wahrnehmen kann. Die Form der Vereinigung der Eindrücke beider Sehfelder ist die Anschauung körperlicher Objecte. Wo diese wegen der Art der beiden Bilder mislingt, tritt das im Wettstreit der Sehfelder sich zeigende Schwanken der Aufmerksamkeit ein, wenn diese nicht durch scharf gezeichnete Contouren des einen Feldes gefesselt ist. Ich habe oben die Methoden beschrieben, nach denen es gelingt, die Aufmerksamkeit auf eines der Felder zu fesseln und dem Schwanken ein Ende zu machen. Dadurch besonders kann auch der Nachweis geführt werden, dafs dieser Wettstreit nur ein Phänomen der Aufmerksamkeit ist.

Aus dieser Übersicht der aufgestellten Erklärungen geht hervor, dafs dabei von den psychischen Vorgängen nur die unwillkürlich erfolgenden der Ideenassociation und des unwillkürlichen Flusses der Vorstellungen in Betracht kommen, welche nicht unter der directen Herrschaft unseres Selbstbewußtseins und unseres Willens stehen, wenn wir auch dadurch, dafs wir selbstbewufste Vorstellungen und Zwecke mit jenen in Concurrenz bringen, einen gewissen Einflufs auf deren Lauf haben können. Eben darin liegt es nun, dafs die Ergebnisse jenes Ablaufs der Vorstellungen uns entgegentreten als durch eine Macht gegeben, die wir nicht oder nur zum kleinen Theile beherrschen können, und die unserem Willen und Selbstbewußtsein daher

als eine fremde, objective Naturmacht entgegentritt, gerade wie die unmittelbar von außen gegebenen sinnlichen Empfindungen. Was also von Resultaten psychischer Vorgänge dieser Art sich mit den Sinnesempfindungen verbindet, erscheint uns ebenso durch äußeren Einfluß gegeben wie die unmittelbare Empfindung, und nicht durch selbstbewusste und freie Überlegung gefunden, nicht von uns erdacht. In dieser Beziehung hat die empiristische Ansicht vielfältiges Mißverständniß von Anhängern sowohl, als von Gegnern erfahren, und ich mache deshalb auf diesen Punkt noch besonders aufmerksam. Will man diese Vorgänge der Association und des natürlichen Flusses der Vorstellungen nicht zu den Seelenthätigkeiten rechnen, sondern sie der Nervensubstanz zuschreiben, so will ich um den Namen nicht streiten. Hier würde die empiristische Theorie mit derjenigen Form der nativistischen, wie sie PANUM zum Beispiel aufgestellt hat, sich vielleicht vereinigen lassen, nur daß er als natürlich gegeben ansieht, was wir nur durch die Erfahrung gewonnen zu sein scheint.

Was nun die verschiedenen nativistischen Theorien betrifft, so ist ihr Kernpunkt, daß sie die Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde von einer angeborenen Einrichtung ableiten, entweder so, daß die Seele eine directe Kenntniß der Ausdehnungen der Netzhaut haben soll, oder so, daß eine Folge der Reizung bestimmter Nervenfasern gewisse Raumvorstellungen ermittelt eines angeborenen, nicht weiter definirbaren Mechanismus entstehen. J. MÜLLER namentlich hat diese Ansicht in der ersten Form durchgeführt. Er sagt:<sup>1</sup> „Der Begriff des Raumes kann nicht erzogen werden, vielmehr ist die Anschauung des Raumes und der Zeit eine nothwendige Voraussetzung, selbst Anschauungsform für alle Empfindungen. Sobald empfunden wird, wird auch in jenen Anschauungsformen empfunden. Was über den erfüllten Raum betrifft, so empfinden wir überall nichts, als nur das selbst räumlich, wenn lediglich von Empfindung, von Sinn die Rede ist; und so viel unterscheiden wir von einem objectiven erfüllten Raum durch das Urtheil, als Raumtheile unserer selbst im Zustande der Affection sind, mit dem begleitenden Bewußtsein der äußeren Ursache der Sinneserregung. Die Netzhaut sieht in jedem Sehfelde nur sich selbst in ihrer räumlichen Ausdehnung im Zustande der Affection; sie empfindet sich selbst in der größten Nähe und Abgeschlossenheit des Auges räumlich dunkel.“

Diese Ansicht erweitert daher die von KANT aufgestellte Ansicht, daß Raum und Zeit ursprünglich gegebene Formen unserer Anschauungen seien, hin, daß auch die specielle Localisation jedes Eindrucks durch die mittelbare Anschauung gegeben sei. Die meisten deutschen Physiologen theilen dieser Ansicht von MÜLLER, und es wurden von ihnen mancherlei Erklärungen der Gesichterscheinungen auf die besonderen Eigenthümlichkeiten der Form der Netzhautbilder gebaut. So hat RECKLINGHAUSEN<sup>2</sup> die Abweichung der scheinbar rechten Winkel dadurch zu erklären versucht,

<sup>1</sup> J. MÜLLER, *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns* S. 64 ff.

<sup>2</sup> RECKLINGHAUSEN, *Netzhautfunctionen*, *Archiv für Ophthalmologie*. V. 2, S. 128—141.

dafs die Fläche der Netzhaut schief gegen die Gesichtslinie des Auges gerichtet sei und deshalb die optischen Bilder eines rechten Winkels in dem Netzhautbilde schiefwinklig werden könnten. Diese Beschaffenheit der Netzhautbilder sollte dann unmittelbar wahrgenommen werden können. E. HERING<sup>1</sup> und A. KUNDT<sup>2</sup> haben sogar angenommen, die Seele schaute die Entfernungen zwischen zwei Netzhautpunkten direct nicht nach dem Bogen auf der Netzhaut, sondern nach der Sehne an, und versuchten daraus die Erklärung der oben beschriebenen Täuschungen der monocularen Localisation im Gesichtsfelde herzuleiten. Dafs diese Hypothese zur Erklärung derjenigen Erscheinungen, zu deren Gunsten sie allein erfunden ist, keineswegs genügt, ist oben schon angeführt worden.

Die besprochene Annahme der nativistischen Theorien ist eigentlich eine Verzichtleistung auf jede Erklärung der Localisationsphänomene. Darüber läfst sich natürlich nicht weiter rechten, und namentlich kann es J. MÜLLER in keiner Weise zum Tadel gereichen, dafs er zu einer Zeit, wo noch alle Beobachtungen über das Gesetz der Augenbewegungen fehlten, und aus einem Versuche, diese für die Erklärung der Localisation zu gebrauchen, nichts als ganz vage Folgerungen gezogen werden konnten, in seinen Erklärungsversuchen nicht weiter zu gehen geneigt war. Dafs dagegen aus dem Gesetze der Augenbewegungen, soweit wir es bisher in seinen Grundzügen kennen, sich auch die Grundzüge des Augenmaafses herleiten lassen, die in der nativistischen Ansicht gar keine weitere Erklärung finden, habe ich oben zu zeigen mich bemüht.

Eine nothwendige Consequenz der erwähnten Ansicht, dafs die Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde ursprünglich gegeben sei, ist dann die, dafs auch ursprünglich gegeben sein mufs, welche Punkte der einen Netzhaut mit denen der anderen dieselbe Localisation geben, also correspondirend, oder, wie die nativistische Ansicht es bezeichnet hat, identisch sind. Hier in der Lehre von der angeborenen und anatomisch begründeten Identität, welche also als eine nothwendige Consequenz der nativistischen Ansicht betrachtet werden mufs, treten nun aber die schon oben bezeichneten wesentlichen Schwierigkeiten dieser Ansicht auf; daher dieses Gebiet auch immer der Haupttummelplatz der Streitigkeiten gewesen ist.

Erstens nämlich konnten die Beobachtungen der körperlich ausgedehnten Objecte schon lehren, und zeigte namentlich die Erfindung des Stereoskops durch WHEATSTONE, dafs wir keineswegs immer Doppelbilder sehen, wo nach der strengen Identitätstheorie dergleichen zu erwarten sind, und dafs dieselben unter dem Einflusse der Anschauung körperlicher Ausdehnung verschwinden. Nun wurde zwar von BRÜCKE mit Recht der grofse Einflufs der Augenbewegungen hierbei hervorgehoben; indessen auch wenn man diesen Einflufs eliminirt, bleibt doch immer die Thatsache bestehen, dafs auch der

<sup>1</sup> HERING, *Beiträge zur Physiologie*. Heft 1, S. 65–80.

<sup>2</sup> KUNDT, *Poggendorff's Annalen*. 1868. CXX, 118–158.

geübteste Beobachter gewisse einander nahe stehende ähnliche Doppelbilder mit einander untrennbar verschmilzt, während er einander eben so nahe stehende ähnliche Bilder im monocularen Felde, oder in der Färbung verschiedene Bilder im binocularen Felde mit der grössten Leichtigkeit von einander unterscheidet. Noch grösseren Anstoss haben die Anhänger der Identitätstheorie an der von WHEATSTONE behaupteten Thatsache genommen, dass unter Umständen auch die Eindrücke identischer Netzhautpunkte getrennt und an zwei verschiedene neben einander liegende Stellen des Objects verlegt werden könnten. Dass das letztere aber eine nothwendige Consequenz des ersteren sei und bei richtig angestellten Versuchen auch thatsächlich beobachtet werde, habe ich oben ausgeführt. Man muss nur nicht, wie es von den Gegnern der Behauptung WHEATSTONE's immer geschehen ist, verlangen, dass bei der Trennung identischer Eindrücke viel mehr geleistet werde, als bei der Vereinigung disparater Eindrücke unter gleichen Umständen geleistet werden kann.

Das wesentliche Gewicht der Thatsachen anerkennend, stellte PANUM eine Modification der Identitätstheorie auf, wonach jeder Punkt  $a$  der einen Netzhaut einem gewissen correspondirenden Empfindungskreise  $A$  in der andern identisch sein sollte, so dass das Bild des Punktes  $a$  verschmelzen könnte mit einem Bilde auf jedem einzelnen Punkte von  $A$ , welches ähnliche Contouren darböte. Dabei sollte aber eine verschiedene Tiefenwahrnehmung entstehen, wenn  $a$  mit verschiedenen Punkten des Kreises  $A$  verschmölze. Ob es mit diesem oder jenem verschmölze, sollte davon abhängen, wo sich im Empfindungskreise  $A$  eine Contour vorfände, die der durch  $a$  hinziehenden ähnlich sei. Aus den Wettstreitsercheinungen beweist 807 PANUM die dominirende Macht der Contouren im gemeinschaftlichen Gesichtsbilde beider Augen, wobei er freilich wohl den Sieg der Contouren als unbedingt und dauernd betrachtet hat. Wettstreit findet nach ihm hauptsächlich zwischen unähnlichen, aber nahe gleich starken Farben und Contouren statt. Ähnliche streben zu verschmelzen.

Wenn man die von PANUM aufgestellten Sätze bloß als zusammensenden Ausdruck der Thatsachen ansehen will, was er selbst auch als Wesentlichere und Wichtigere betont, so sind sie der Hauptsache nach richtig. Ich würde gegen seine Darstellung der Thatsachen nur einzuwenden haben, 1. dass ich mich von der wirklichen Existenz binocularer Mischfarben nicht in den von ihm beschriebenen Versuchen nicht habe überzeugen können, dass Herr PANUM keine genügenden Methoden die Aufmerksamkeit zu wecken, angewendet und daher die große Rolle, welche die Aufmerksamkeit in dem Wettstreite der Sehfelder und bei der Unterscheidung der Doppelbilder spielt, nicht genügend erkannt hat, 3. dass er die Augenbewegungen im Fixiren der Bilder für theilweis unwillkürliche Reflexbewegungen hält, während ich selbst bei mir wohl eine Neigung zu gewissen gewohnheitsförmigen Stellungen anerkennen kann, die aber nicht im geringsten die Willkür der Bewegung beeinflusst, wenn ich eine andere Stellung der Blick-

punkte hervorzubringen wünsche, 4. daß bei der Verschmelzung der Doppelbilder doch nicht bloß die Ähnlichkeit der Contouren und der Grad der Annäherung an eine correspondirende Lagerung entscheidet, sondern auch die Anwesenheit oder Abwesenheit anderer Vergleichungspunkte für die richtige Abmessung der scheinbaren Lage beider Contouren im gemeinsamen Gesichtsfelde. Das Letztere hatten schon BERGMANN's<sup>1</sup> Versuche gezeigt, und in ähnlicher Weise zeigt es der oben S. 892 beschriebene Versuch an *Fig. U*, selbst wenn man von VOLKMANN's Versuchen absehen wollte, gegen welche PANUM den Einwand erhoben hat, daß in ihnen kleine, wenn auch unbedeutende Veränderungen der Contouren durch zugesetzte Linien und Punkte angebracht sind, die an der Stelle das Verschmelzen hindern. Aber wie BERGMANN's und meine Versuche zeigen, hindern auch correspondirend gelegene Linien, welche beide auf der gleichen Seite von zwei disparaten liegen und die Ähnlichkeit von deren Contouren gar nicht beeinträchtigen, das Verschmelzen derselben, welches ohne die Anwesenheit jener correspondirenden Linien eintreten würde.

Die von Herrn PANUM aufgestellten Erklärungen sind nun nach den Verwahrungen und Erläuterungen derselben, die er in seiner zweiten Arbeit<sup>2</sup> dazu gegeben hat, kaum etwas mehr, als daß jede Klasse von Beobachtungen zu einem besonderen Vermögen der Nervenapparate erhoben wird. So schreibt er den beiden Augen oder ihren Nervenapparaten eine binoculare Energie der Farbenmischung zu, vermöge deren sich binocular gesehene Farben zur Mischfarbe vereinigen können. Daneben giebt es aber auch eine andere binoculare Synergie des Alternirens, vermöge deren binocular gesehene Farben sich auch nicht vereinigen, sondern in Wettstreit  
806 gerathen können. Die letztere soll überwiegen, wenn die beiderseitig einwirkenden Erregungen sehr intensiv, oder die Erregbarkeit des Sehorgans sehr groß ist. Disparate Bilder können vereinigt werden mittels einer dritten binocularen Synergie des Einfachsehens durch correspondirende Empfindungskreise. Die Tiefenwahrnehmung endlich kommt zu Stande mittels einer vierten specifischen Synergie der binocularen Parallaxe.

Die Contouren der Figuren werden als besonders starke Nervenreize betrachtet und die Augenstellungen im Wesentlichen als unwillkürlich eintretende Reflexbewegungen, und auch in Bezug auf die genannten Synergien betont es Herr PANUM besonders, daß sie als physiologische, nicht als psychische Kräfte zu betrachten seien.

Ich muß gestehen, daß ich nicht klar verstanden habe, in welcher Weise Herr PANUM sich denkt, daß neben der Verschmelzung disparater Punkte in correspondirenden Empfindungskreisen doch der Hauptsatz der Identitätslehre, wonach die Eindrücke identischer Stellen verschmelzen müssen, noch bestehen könne, auf welchen wirklichen oder anscheinenden Wider-

<sup>1</sup> BERGMANN, *Göttinger gelehrte Anzeigen*. 1859. S. 1066—1068.

<sup>2</sup> PANUM, *Reichert und du Bois-Reymond, Archiv für Anat. und Physiol.* 1861. S. 63—111.

sprach Herr VOLKMANNS aufmerksam gemacht hatte. Herr PANUM erklärt, seine Sätze behaupteten, daß die Eindrücke, welche correspondirenden Empfindungskreisen angehören, verschmelzen könnten, die aber auf identischen Stellen verschmelzen müßten. Daraus würde aber doch immer folgen, daß, so oft der Eindruck  $a$  einer Netzhaut mit dem einer disparaten Stelle  $\beta$  verschmilzt, nothwendig auch  $a$  mit dem der identischen Stelle  $\alpha$  der zweiten Netzhaut, folglich auch  $\alpha$  und  $\beta$ , zwei Stellen desselben Bildes mit einander verschmelzen müssen, wenn nicht eines von ihnen ausgelöscht wird, was jedenfalls in vielen Fällen, wie in den oben beschriebenen Versuchen, nicht der Fall ist. In Figuren wie *M* und *N* Taf. V sind beide identisch liegende, aber nicht verschmelzende Linien durch Contouren hervorgehoben; keine von ihnen verschwindet durch Wettstreit mit der andern, sonst könnte keine stereoskopische Tiefenwahrnehmung durch ihre Vereinigung mit einer disparaten Linie des andern Bildes auch in der Beleuchtung durch den elektrischen Funken zu Stande kommen. Ebenso müssen zwischen zwei verschmelzenden disparaten Grenzlinien verschieden gefärbter Flächen immer gewisse identische Punkte existiren, für welche der Wettstreit durch die benachbarten Contoure hervorgetriebenen Farben im Gleichgewicht ist und die also beide gesehen und dabei an verschiedene Punkte des angeschauten körperlichen Objects verlegt werden. Übrigens ist dieser Wettstreitpunkt, so viel ich einsehe, unerheblich für die Theorie; ich muß ihn außerdem nach dem Ergebniss meiner eignen Beobachtungen zu Gunsten von WHEATSTONE'S Behauptung als erledigt betrachten. Wenn man auch die Nothwendigkeit der Verschmelzung der Eindrücke auf identischen Stellen fallen läßt, so behalten dieselben doch immer die factische Bedeutung, daß ähnliche Eindrücke beider Netzhäute desto leichter verschmelzen, je näher sie an identische Stellen treffen. Das scheint mir auch die einzige richtige Beschreibung des Identitätsverhältnisses zu sein, was man übrigens auch als seinen Grund betrachten möge, und dadurch daß Herr PANUM dieses Verhältniß durch bezeichnende Ausdrücke scharf hervorgehoben hat, that er einen wesentlichen Fortschritt in der Lehre vom binocularen Sehen 809 wirkt, den ich gern anerkenne; auch würde ich gewiß der Letzte sein, der gegen seine Scheu und Vorsicht in der theoretischen Verallgemeinerung der beobachteten Thatsachen Einspruch erhöhe, und würde seine theoretischen Versuche, die er selbst als Nebensache zu betrachten auffordert, hier nicht kritisirt haben, wenn ich nicht überhaupt die möglichen Erklärungsformen des vorliegenden Gebiets zu besprechen genöthigt wäre, und wenn nicht ein Theil von PANUM'S theoretischen Ansichten auch die Grundlage der unten besprechenden neueren Theorie von E. HERING bildete.

Der Leser wird aus der gegebenen Übersicht entnehmen, daß die Erörterungen, welche Herr PANUM giebt, wenigstens so weit sie sich auf die Verschmelzung und den Wettstreit der Bilder beziehen, in der That nur der Form nach Erklärungen sind, indem die Thatsachen in einem abstracten Begriff zusammengefaßt werden, und nur in der Verwahrung gegen die Ein-



mischung psychischer Vorgänge, welche sich aber überall auf unvollständige Beobachtung der Thatsachen stützt, beziehen sie sich wenigstens negativ auf das ursächliche Verhältniß. Übrigens werden in ihnen der Nervensubstanz Formen der Thätigkeit beigelegt, die wir wohl aus dem Gebiete der niederen Seelenthätigkeiten kennen, aber denen Ähnliches im Gebiete der Körperwelt noch niemals aufgefunden ist.

In deutlicherer und fester ausgebildeter Gestalt kehren uns die Grundzüge der Theorie von PANUM in der von E. HERING aufgestellten Theorie des binocularen Sehens entgegen. Diese Theorie ist überhaupt unter den bis jetzt aufgestellten wohl die consequenteste Form, welche die nativistische Theorie erhalten hat, und verdient deshalb eine eingehendere Besprechung. Ein bedeutender Fortschritt der HERING'schen Theorie liegt darin, daß sie von einer richtigeren Kenntniß der scheinbaren Sehrichtung der angeschauten Objecte ausgeht, wodurch wesentliche Schwierigkeiten der früheren Theorien beseitigt werden.

Herr HERING nimmt an, daß die einzelnen Netzhautpunkte im erregten Zustande außer den Farbenempfindungen noch dreierlei verschiedene Arten von Raumgefühlen hervorrufen. Ein erstes entspricht dem Höhenwerth der betreffenden Netzhautstelle, das zweite dem Breitenwerth. Die Höhengefühle und Breitengefühle, welche zusammen das Richtungsgefühl für den Ort im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde ergeben, sind für correspondirende Netzhautpunkte gleich. Außerdem existirt ein drittes Raumgefühl besonderer Art, ein Tiefengefühl, welches in je zwei identischen Netzhautpunkten gleiche, aber entgegengesetzte Werthe, dagegen auf symmetrisch gleich gelegenen gleichen und gleichsinnige Werthe haben soll. Das Tiefengefühl der äußeren Netzhauthälften ist positiv, das heißt entspricht größerer Tiefe, das der inneren Netzhauthälften negativ, das heißt: entspricht größerer Annäherung.

Durch diese Annahme ist zunächst das oben schon von mir bezeichnete nothwendige Erforderniß einer mit den Thatsachen vereinbaren Identitätstheorie erfüllt, die Eindrücke correspondirender Netzhautstellen sind zwar theilweise gleich, nämlich betreffs ihres Richtungsgefühls, theilweise aber verschieden, nämlich durch ihr Tiefengefühl. Bis hierher würde ich die 810 Annahmen von HERING sogar für die von mir vertretene empiristische Theorie zwar nicht nothwendig, aber vortheilhaft finden, eine solche Annahme würde die Erklärung der Einübung des Augenmaafses in der Erziehung des Gesichtssinns wesentlich erleichtern. Nur wären dabei die „Raumgefühle“ als Localzeichen zu betrachten, deren räumliche Bedeutung erst durch Erfahrung zu lernen wäre. Gleiche Zeichen aber für das bezeichnete Gleiche zu haben, würde offenbar vortheilhaft sein.

Nur in einer Beziehung macht die Abweichung der scheinbar verticalen und identischen Meridiane eine Abweichung von den HERING'schen Annahmen nöthig für diejenigen Augen, die damit behaftet sind, nach den Versuchen, die ich selbst und Herr DASTICH angestellt haben. Die Höhen- und Breitenwerthe nämlich würden bei uns ebenfalls für identische Stellen

gleich zu nehmen sein, aber die positiven und negativen Tiefenwerthe würden nicht durch die correspondirenden scheinbar verticalen Meridiane, sondern durch die wirklich verticalen Meridiane zu scheiden sein. Wir sehen nämlich bei symmetrischer Augenstellung, wie ich schon oben bemerkt habe, eine Linie, die auf den beiden wirklich verticalen, aber nicht identischen Meridianen abgebildet ist, senkrecht zur Visirebene, dagegen eine solche, die auf den beiden scheinbar verticalen identischen Meridianen abgebildet ist, gegen den Beobachter geneigt, mit ihrem oberen Ende entfernter als mit dem untern. So viel ich sehe, hat diese Abweichung weiter keinen Einfluß auf die ferneren Consequenzen der Theorie.

Nun stoßen wir freilich auch bei HERING wieder auf das Mysterium der Identitätslehre: Auf Deckpunkte (d. h. correspondirende Punkte) fallende gleiche oder verschiedene Lichtreize lösen stets nur eine einfache Lichtempfindung aus. Sie müssen also nothwendig vereinigt werden, wie an vielen Stellen des Buches betont wird, während andererseits doch auch disparate Bilder correspondirender Empfindungskreise vereinigt werden können. Auch bei HERING scheint mir dieser Satz mehr eine Folge einer polemischen Stimmung gegen vielleicht zu eingreifende Gegner der Identitätstheorie zu sein, als ein nothwendiges Erforderniß der Theorie. Er könnte, so viel ich sehe, ohne Schaden für den Zusammenhang beseitigt werden, indem man dafür setzte, daß Bilder von ähnlichen Contouren und ähnlicher Färbung desto leichter verschmelzen, je näher sie identischen Stellen kommen.

Für dieses Einfachsehen mit disparaten Netzhautstellen nimmt nun Herr HERING nicht wie Herr PANUM einen organischen Grund an, sondern einen psychischen, indem er sich darauf stützt, daß zur Trennung zusammengesetzter Empfindungen Übung und eine gewisse Schulung der Aufmerksamkeit nothwendig sei, ein Satz, der durchaus richtig ist und eine viel grössere Zahl von den anscheinenden Widersprüchen in den Erscheinungen dieses Gebietes zu erklären im Stande ist, als Herr HERING daraus erklärt. Namentlich tritt für seine Theorie hier folgende Schwierigkeit ein. Wenn  $a$  und  $\alpha$  correspondirende Netzhautstellen sind,  $b$  eine dem  $a$  benachbarte in demselben Auge wie  $a$ , und gleiche Bilder auf  $b$  und  $\alpha$  entworfen werden, so verschmelzen sie nach Herrn HERING's Meinung, weil sie in Qualität gleich, im Richtungsgefühl sehr ähnlich und nur in Tiefengefühlen erheblich verschieden sind, und weil wir uns nicht die Zeit nehmen, diese Bilder getrennt zu betrachten, sondern, wenn wir auf sie aufmerksam werden, zur Fixation beider forteilen — was seiner Meinung zufolge freilich durch eine Art von Reflexbewegung geschehen soll —, und sie dann einfach sehen. Nun frage ich, warum unterscheiden wir denn aber so sehr viel eher und leichter, wenn zwei gleichartige Bilder auf die Netzhautstellen  $a$  und  $b$  fallen. Diese sind dann nämlich nicht bloß qualitativ gleich und haben in den Richtungsgefühlen denselben kleinen Unterschied, wie  $b$  und  $\alpha$ , sondern sie haben auch einen ebenso kleinen Unterschied im Tiefengefühl, während  $b$  und  $\alpha$

in diesem einen sehr großen Unterschied darbieten. Aus Herrn HERING's Darstellung würde also folgen, daß die Empfindungen *a* und *b* noch sehr viel leichter verschmelzen müßten, als die von *a* und *b*, was aber der Erfahrung geradezu widerspricht. Herr HERING kann nun darauf antworten, daß wenn wir *a* oder *b* zu fixiren suchen, nur eins fixirt werden kann, und daß wir daher gelernt haben *a* und *b* zu unterscheiden, nicht aber *a* und *b*. Damit würde er aber ganz auf dem Standpunkte der empiristischen Theorie angekommen sein, wonach wir die Empfindungen der Localzeichen zu unterscheiden und zu deuten lernen müssen.

Und gerade diese Gelegenheit, wo Herr HERING selbst gezwungen ist, in der psychischen Theorie Lösung der Schwierigkeiten zu suchen, die seine Ansicht hervorruft, benutzt er, um gegen VOLKMANN's und Anderer psychologische Erklärungen zu polemisiren. VOLKMANN's Fehler, wenn man es so nennen will, ist dabei aber im Wesentlichen nur der, daß er die psychischen Processe, auf die es hier ankommt, mit denjenigen Benennungen belegt hat, die wir ihnen geben, wenn sie in das Selbstbewußtsein erhoben werden. Zum Theil haben wir gar keine anderen bezeichnenden Benennungen als diese, weil wir Vorgänge nur benennen können, sofern wir von ihnen wissen. Wenn also diejenigen Vorgänge dieser Art, von denen wir nur aus ihren Resultaten wissen, als unbewußte Seelenvorgänge bezeichnet werden, so hat dies seinen guten Sinn und ist eben die einzige Bezeichnung, die wir dafür haben, wenn wir nicht bei jeder Gelegenheit weitläufige Umschreibungen machen wollen.

Bei der binocularen Verschmelzung zweier Eindrücke erhält nun nach HERING die Gesamtempfindung den mittleren Werth des Richtungsgefühls sowohl als des Tiefengefühls. Da die Tiefengefühle identischer Stellen gleich groß sind, aber von entgegengesetztem Zeichen, so wird der Mittelwerth des Tiefengefühls bei Verschmelzung identischer Eindrücke gleich Null. Bei gleichseitigen Doppelbildern fällt, wie leicht zu sehen ist, der Mittelwerth des Tiefengefühls positiv aus, das Object erscheint entfernter, bei ungleichseitigen Doppelbildern ist der Mittelwerth negativ, das Object erscheint näher, als die identisch abgebildeten Objecte.

Wenn jeder Netzhautindruck sich nothwendig mit dem der correspondirenden Stelle der andern Netzhaut stets in gleicher Stärke vereinigen müßte, so würde der mittlere Tiefenwerth dieser Vereinigung immer gleich Null sein. Nur dadurch, daß im Wettstreite der Eindruck desjenigen Sehfeldes, welches die Contour trägt, die Empfindung des andern unterdrückt, wird der Tiefenwerth der Contour frei und kann mit seinem eigenthümlichen Werthe in die Vereinigung mit der entsprechenden Contour im andern Sehfelde eintreten. Auch dieser Erklärung widersprechen die oben gegebenen Modificationen des WHEATSTONE'schen Versuches, bei denen unähnliche Contouren, die sich nicht vereinigen, auf Deckstellen liegen und selbst beim Lichte des elektrischen Funkens sich jede von beiden im stereoskopischen Bilde mit ihrem Tiefenwerthe geltend macht, zum Zeichen, daß keine von ihnen im Wettstreite untergeht.

Auf diese Annahme baut nun Herr HERING seine Raumconstruction. Er nimmt an, alle Bildpunkte, die den Tiefenwerth Null haben, erscheinen durch einen unmittelbaren Act der Empfindung in einer Ebene, der Kernfläche des Sehraums. Denken wir uns in dieser den Punkt, welcher den beiden Netzhautcentren entspricht, als Anfangspunkt eines rechtwinkligen Coordinatensystems, die den Tiefenwerthen entsprechenden Coordinaten senkrecht zur Kernfläche, so würden die drei Coordinaten jedes gesehenen Punktes proportional sein den Höhenwerthen, Breitenwerthen, Tiefenwerthen des zu dem binocularen Eindrucke gehörigen Raumgefühls, und es wäre nach HERING in dieser Weise eine Vertheilung der gesehenen Punkte im Sehraum gegeben, die wenigstens in der Anordnungsweise der Punkte der wirklichen Anordnung derselben entspräche, wenn auch die Verhältnisse der einzelnen linearen Distanzen nun noch vielfach nach der Erfahrung zu corrigiren wären. Da auch die Körpertheile des Beobachters mit in diesem so ausgefüllten Sehraume erscheinen, so wird dadurch auch die räumliche Beziehung der gesehenen Objecte zum Beobachter zugleich mit zur Anschauung gebracht.

Das sind die wesentlichen Grundzüge der Theorie von HERING. Die älteren nativistischen Theorien des Sehens hatten nur die Vertheilung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde für angeboren, die Wahrnehmung der Tiefendimensionen dagegen für einen Act des Urtheils gehalten. PANUM hatte zuerst die Hypothese aufgestellt, aber nicht in bestimmterer Form ausgeführt, daß die binoculare Parallaxe eine unmittelbare Empfindung der Tiefenverhältnisse geben könnte. Dies hat Herr HERING in der beschriebenen Weise bestimmter auszuführen gesucht und dadurch der nativistischen Theorie ein noch weiteres Feld eingeräumt, als ihr bisher gegeben war. Das von ihm aufgestellte System verräth einen klar und consequent denkenden Kopf, es berücksichtigt die bisher bekannt gewesenen Thatsachen vollständig und ich einige wichtige neue, die Herr HERING selbst hinzugefügt hat, und kann deshalb, wie ich glaube, als ein gutes Specimen dieser Klasse von Theorien angesehen werden, weshalb ich mir erlaube, meine Kritik speciell gegen die Theorie von Herrn Hering zu richten.

Der erste Einwand, den ich zu machen hätte und den ich allerdings als ganz unübersteiglich erscheint, ist, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie eine einzelne, unregelmäßige, unvollständige Führung eine fertige Raumvorstellung hervorzubringen vermag. Ich annehme an, daß dieser Einwand vielleicht auf einem Mangel an naturwissenschaftlichem Boden beruht, und daß er nur an für diejenigen Leser, die nicht mit der Natur der Sache halb sogleich zu den Gegengründen übergehen, sich erheben mag. Ich entnehme aus den Thesen, daß die Annahmen der Theorie von Hering, wenn sie sich auf die Einzelheiten der beiden Gesichtsfelder beziehen, schon in der Vorrede erwähnt sind. Ich erwähne hier nur, daß eine Uebereinstimmung zwischen den beiden Gesichtsfeldern, die der erfahrungs-

der mir für mein  
der, daß ich mir  
e vorausgegangene  
ann. Ich erkenne  
der Natur ist, um  
werke ihn deshalb  
Ich wende mich  
der erfahrungs-

er- 813  
be  
cke  
ang-

samer Schwankung bald der eine, bald der andere vorherrschen könne, wird widerlegt durch die Möglichkeit, stereoskopischen Glanz wahrzunehmen bei momentaner Beleuchtung. Die Annahme, daß in den Fällen, wo disparat Contouren verschmelzen, die identisch zu ihnen gehörigen Bilder der andern Netzhaut unterdrückt seien, wird widerlegt durch das Gelingen des WHEATSTONE'schen Versuchs, wenn er richtig ausgeführt wird, und namentlich durch ein Gelingen bei momentaner Beleuchtung, wobei die Augenbewegungen keinen Einfluss haben können.

Eine weitere Fundamentalthypothese der HERING'schen Theorie ist es, daß die Punkte, welche auf identischen Netzhautstellen sich abbilden (oder allgemeiner, die den Tiefenwerth Null haben), immer in einer Ebene zu liegen scheinen sollen, daß das Vortreten oder Zurücktreteten der binocular gesehenen Objectpunkte vor oder hinter diese Ebene (Kernfläche des Sehraums) nur davon abhängen solle, ob sie positive oder negative stereoskopische Parallaxe haben. Ich habe oben auf Seite 803 ff. eine Reihe von Versuchen beschrieben, aus denen hervorgeht, daß auch wenn alle anderweitigen Anhaltspunkte der Tiefenanschauung fehlen, einfache Liniensysteme, welche genau dieselbe binoculare Parallaxe darbieten, stereoskopisch combinirt, bald als gewölbte, bald als ebene Fläche erscheinen können, je nachdem durch die Querlinien mehr Ähnlichkeit mit den binocularen Bildern eines nahen und mit convergenten Blicklinien gesehenen Objects oder denen eines mit parallelen Gesichtslinien gesehenen fernen Objects entsteht.

Ich habe ferner gezeigt, daß wenn ein System von verticalen Fäden, die in der Cylinderfläche des Längshoropters liegen, Herrn HERING in einer Ebene zu liegen scheint, was, wie er andeutet, selbst für seine Augen nicht streng richtig ist, dies eine individuelle Eigenthümlichkeit seiner Augen ist, die bei keinem der von mir untersuchten Individuen, auch bei mir selbst nicht vorkam, und daß bei den meisten Beobachtern der Irrthum in der Beurtheilung der Convergenz der Augen, der dieser Erscheinung zu Grunde zu liegen scheint, viel kleiner ist, als daß der von Herrn HERING behauptete Erfolg zu Stande kommen könnte.

Eine Hauptschwierigkeit oder, wie mir scheint, Unmöglichkeit der HERING'schen Theorie sind die Tiefengefühle. So lange Eindrücke der einen Netzhaut mit correspondirenden oder disparaten der andern Netzhaut sich vereinigen, wo es sich nur um die Differenz der Tiefengefühle beider Stellen handelt, tritt, so viel ich sehe, keine wesentliche Schwierigkeit ein, außer den eben angeführten. Wenn aber das Bild einer Netzhaut, ohne zu verschmelzen, für sich stehen bleibt und im Wettstreite mit dem der andern Netzhaut dominirt, so nimmt Herr HERING an, und muß auch nothwendig annehmen, daß das Tiefengefühl des im Wettstreite siegenden Eindrucks ebenfalls unverschmolzen mit dem der correspondirenden Deckstelle der andern Netzhaut zur Herrschaft kommt.

Herr HERING<sup>1</sup> glaubt auch einige Versuche anführen zu können, in

<sup>1</sup> HERING, *Beiträge zur Physiologie*. 5. Heft. S. 338–342.

denen solche monoculare Bilder mit dem ihnen allein zugehörigen Tiefen- 814  
eindruck zur Erscheinung kämen.

a. Wenn man einen Punkt in der Medianebene fixirt und ein zweiter liegt vor oder hinter dem Fixationspunkte, so erscheint dieser in Doppelbildern, die ebenfalls vor oder hinter dem Fixationspunkte nahe dem wahren Orte ihres Objects erscheinen. Diese Beobachtung widerspricht der HERING'schen Theorie nicht, beweist aber auch nichts für sie, da wir eben hinreichende Übung haben, den Ort eines in nicht zu entfernten, aber erkennbaren Doppelbildern gesehenen Objects nahehin richtig zu beurtheilen. Dafs hier die Erfahrung und nicht die Tiefengefühle entscheiden, geht aus den weiteren Versuchen hervor, wo beide in Widerspruch kommen und wo die Erfahrung, wie mir scheint, immer oder wenigstens, wie Herr HERING zugiebt, in der Regel siegt.

b. Zwei Kügelchen werden neben einander an Fäden aufgehängt, die Sehlinien hinter ihnen gekreuzt, so dafs drei Kugeln erscheinen, eine mittlere binocular gesehene, zwei seitliche monocular, die rechte vom linken, die linke vom rechten Auge gesehen. Nach HERING sollen die seitlichen Kügelchen näher als das mittlere erscheinen. Ich habe den Versuch wiederholt und finde seinen Erfolg abhängig von der Kopfhaltung. Ist mein Kopf bei der Fixation der Kügelchen hinten über gebeugt, die Visirebene also unter ihre Primärlage geneigt, so erscheint mir der binocular gesehene mittlere Faden mit dem unteren Ende, welches das Kügelchen trägt, genähert, wie oben . 808 und 809 schon erörtert ist, und dann auch das mittlere Kügelchen näher als die seitlichen. Ist der Kopf vorn über gebeugt, so tritt der entgegengesetzte Anschein ein, der dann freilich dem von HERING's Theorie geforderten demme nach entspricht, aber offenbar einen ganz anderen Grund hat. Biegt man den Kopf bald nach vorn, bald nach hinten, so wechselt auch das Kügelchen seine Stellung.

c. Wenn man einen Stecknadelknopf fixirt, und daneben ist ein senkrechter Draht angebracht etwas nach links und etwas näher als die Stecknadel, so erscheint dieser in Doppelbildern, deren rechtes dem linken Auge gehört und einen negativen Tiefenwerth haben sollte, das linke gehört dem rechten Auge an und sollte einen positiven Tiefenwerth haben. Das rechte ist also viel näher, das linke viel ferner als die Stecknadel erscheinen. Herr HERING giebt zu, dafs eine solche Tiefenanschauung nur ausserordentlich wer und flüchtig gesehen werde, weil, wie er meint, die kleinste Schwankung der Convergenz das Urtheil über den Ort des Objectes berichtige. Um ihm nicht Unrecht zu thun, will ich lieber den Erfolg dieses Versuches mit seinen eigenen Worten beschreiben: „Ich sehe zunächst und überhaupt erst dann, wenn meine Augen sich irgendwie, wenn auch nur sehr wenig bewegen, die beiden Trugbilder des näheren Drahtes zwar gesondert, aber beide näher als die fixirte einfach erscheinende Stecknadel. Fixire ich dann anhaltend und fest und concentrirte meine ganze Aufmerksamkeit möglichst auf die fixirte Stecknadel, so tritt das eine, dem linken Auge

815 angehörige Trugbild plötzlich hinter die Stecknadel und erscheint mit solcher Energie jenseits derselben, daß ich diesen Eindruck durchaus dem zwingenden Eindrucke vergleichen muß, mit welchem Stereoskopenbilder sich plötzlich in die Tiefe ausbreiten. Die Erscheinung tritt gerade dann am sichersten ein, wenn ich am wenigsten daran denke. Die geringste Schwankung des Blickes aber, oder nur der Gedanke an das zweite näher erscheinende Trugbild versetzt das andere sogleich wieder vor die Kernfläche; denn es tritt dann die Beziehung beider Bilder auf ein und dasselbe Object ein und stört den rein sinnlichen Eindruck. Aber auch ganz von selbst schwindet die Erscheinung, sobald das Trugbild infolge der Ruhe des Auges in eine ungünstige Phase des Wettstreits eintritt, wie dies oben erörtert wurde. Daher denn mancherlei sich vereinigt, um den Versuch zu stören. Überhaupt kann ich ihn nur denjenigen empfehlen, die große Übung im indirecten Sehen haben und wirklich fest fixiren können, nicht bloß es zu können glauben. Man lernt das feinste Doppelsehen nicht in einem Jahre, auch nicht in zweien.“

Einige Seiten vorher bemerkt Herr HERING hierher gehörig noch, indem er die Störungen der Empfindung bei diesen Versuchen beschreibt: „Hierzu kommt nun noch, daß bei irgend ausgedehnten Trugbildern der Wettstreit nicht immer in allen Theilen des Trugbildes gleiche Phasen zeigt, daß vielmehr das Trugbild stückweise Sieger und Besiegter im Wettstreite ist, wodurch eine sichere und feste Localisation ganz unmöglich wird. Drängen sich auf diese Weise Stücke des auf der betreffenden Deckstelle der andern Netzhaut liegenden Bildes mit ihren entgegengesetzten Tiefenwerthen in das Trugbild derart hinein, daß sie gleichsam Bestandtheile desselben werden, so kann die Localisation sogar entgegengesetzt der *a priori* zu erwartenden ausfallen.“

Diesem letzteren Theile der Beschreibung entspricht nun vollkommen das, was ich selbst bei einer möglichst sorgfältigen und gewissenhaften Anstellung des Versuchs gesehen habe. Ich habe so fest und so lange die Stecknadel fixirt, daß mir schließlich die negativen Nachbilder alles auslöschten. Ich habe gesehen, daß zu der Zeit, wo nur noch einzelne Theile der Doppelbilder des Drahtes im Wettstreit mit dem correspondirenden Grunde und mit den Nachbildern zeitweilig nebelhaft auftauchen, sie bald fern, bald nah erscheinen, das eine ebenso oft und ebenso energisch, wie das andere; aber ich habe mich nicht überzeugen können, daß dies überwiegend in dem Sinne der HERING'schen Theorie geschieht, und würde es nie unternommen haben, aus einer an solchen halb erlöschenden Bildern gemachten Beobachtung das Fundament für eine neue Theorie des Sehens zu machen. Indessen gebe ich zu, daß ich ungeschickt gewesen sein mag; nur wird Herr HERING entschuldigen müssen, wenn ich durch diesen ihm selber so „zwingenden Beweis für die Richtigkeit der Theorie“ mich nicht für überzeugt erklären kann.

d. PANUM's Versuche über die stereoskopische Vereinigung zweier senk-

rechter Linien im einen Felde mit einer im andern finden leicht ihre Erklärung, wie oben Seite 882 schon bemerkt ist. Ein solches Bild ist der richtige optische Ausdruck eines Linienpaares im Raume, von denen eine für das eine Auge die andere deckt.

e. Wenn man nur ein Auge öffnet und mit dem anderen allein irgend eine zur Antlitzfläche senkrechte Ebene betrachtet, so müßte die schläfenwärts gekehrte Seite derselben positive Tiefenwerthe haben, die nasenwärts gekehrte negative, die Ebene sollte deshalb stark gegen die Gesichtslinie 816 geneigt erscheinen. Dafs sie es nicht thut, erklärt Herr HERING dadurch, dafs wir der Erfahrung zulieb, die uns lehrt, wie die gesehene Ebene gegen unseren Körper liegt, die Kernfläche des Sehraums in unserer Anschauung eine Achtelswendung machen lassen, wodurch die richtige Lage der gesehenen Fläche wieder hergestellt werde.

Wir können den Versuch aber so modificiren, dafs diese Ausflucht abgeschnitten ist. Man nehme vor die Mitte des Gesichts einen schwarzen Papierstreifen, dessen Breite der Distanz der Augen von einander gleichkommt. Dann sieht das rechte Auge nur die rechte Hälfte der vorliegenden Objecte, das linke nur die linke Hälfte. Das ganze Gesichtsfeld bis auf einen kleinen im Zerstreuungskreise der beiden Ränder des Papierstreifens liegenden mittleren Streifen wird monocular gesehen. Ein nennenswerther Wettstreit zwischen dem Schwarz des Papiers und den hellen Bildern des Zimmers tritt bei hin und wieder wechselnder Richtung des Blicks nicht ein; keinerlei Augenbewegungen sind im Stande, das Urtheil über die wahre Entfernung der gesehenen Objecte zu unterstützen. Eine Achtelswendung der Kernfläche würde in diesem Falle die Schwierigkeit ebenfalls nicht heben. Alle Bedingungen also bei diesem Versuche scheinen mir dazu angethan, die von Herrn HERING supponirten Tiefengefühle rein zur Erscheinung kommen zu lassen, und man sollte erwarten, nun die beiden Theile der Wand an der Stelle, wo die Grenze der beiden Sehfelder liegt, sich unter einem ziemlich kleinen spitzen Winkel (der HERING'schen Theorie zufolge müßte dieser Winkel dem Convergenzwinkel der Augen gleich sein) zusammenstoßen zu sehen, wie eine Messerschneide, die gegen den Beobachter gekehrt ist. Davon ist aber keine Spur zu sehen, die Wand erscheint ganz flach, gerade so, wie sie mit beiden Augen gesehen erscheint.

Die andern Täuschungen aber, die von der Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane, der etwa vorhandenen Raddrehungsdifferenz beider Augen und so weiter abhängen, sind bei diesem Versuche alle deutlich zu sehen. Soll nun die Erfahrung, dafs die Wand eben ist, die eine täuschende Empfindung beseitigen? Warum beseitigt dann die andere Erfahrung, dafs die horizontalen Linien der Wand alle gerade, ihre verticalen alle parallel sind, welche ich noch bis zu dem Augenblick, wo ich den Papierschirm vorschiebe, machen und fortsetzen kann, nicht auch die von der Raddrehung und der Abweichung der Meridiane abhängigen Täuschungen?

Auch selbst in Fällen, wo die Contouren der gesehenen Bilder vollkommen



denen eines objectiven Gegenstandes entsprechen, und also die Tiefengefühle mit den mittels der Augenbewegungen zu machenden Beobachtungen sich in vollkommener Übereinstimmung befinden, wie bei den pseudoskopischen Versuchen, kommen Tiefenwahrnehmungen nicht zu Stande, wenn die Schlagschatten widersprechen; und der Zusammenhang der Körperform mit dem Schlagschatten ist doch gewiß ein Erfahrungsmoment. Und selbst, wenn die Schlagschatten nicht widersprechen, sondern nur die Erinnerung an die vorher gesehene wahre Form des pseudoskopisch betrachteten Körpers. sind viele Leute, die auf die binoculare Parallaxe vielleicht wenig zu  
 817 achten gewöhnt sind, gar nicht, manche erst nach längerer Betrachtung bei wechselnder Blickrichtung im Stande, den pseudoskopischen Eindruck zu erhalten.

Aus allen diesen Thatsachen folgt, daß die HERING'schen Tiefengefühle nur wirken, wenn auch die durch die Erfahrung gegebenen Momente eine Tiefenwahrnehmung fordern, daß sie spurlos verschwinden, sobald die erfahrungsmäßige Auslegung der Gesichterscheinungen, oder auch nur die Erinnerung an die Form des individuellen Objects widerspricht. Muß man daraus nicht schließen, daß jene Tiefengefühle, wenn sie überhaupt existiren, mindestens so schwach und undeutlich sind, daß sie gar keinen nennenswerthen Einfluß den aus der Erfahrung genommenen Momenten gegenüber ausüben können, und daß daher die Tiefenanschauung ohne sie ganz eben so gut zu Stande kommen muß als mit ihnen, beziehlich wider sie, wie es nach HERING's Annahmen geschehen soll?

Schließlich führt uns dies auf eine letzte wesentliche Schwierigkeit, der noch keine nativistische Theorie der Raumanschauung entgangen ist, wenn sie sich nicht ganz auf allgemeine Andeutungen beschränkte. Es muß nämlich in diesen Theorien immer vorausgesetzt werden, daß wirklich vorhandene Empfindungen durch eine Erfahrung, die sie als unbegründet nachweist, aufgehoben werden können. Dafür ist aber nicht ein einziges wohl constatirtes Beispiel da. Bei allen Sinnestäuschungen, welche durch anomal erregte Empfindungen hervorgerufen werden, wird die täuschende Empfindung nie beseitigt durch die widersprechende bessere Erkenntniß des Objects und durch die Einsicht in die Ursache der Täuschung. Die Druckbilder, die feurigen Garben am Sehnerveneintritt, die Nachbilder u. s. w. bleiben an ihrem scheinbaren Orte im Gesichtsfelde bestehen, ebenso gut wie das von einem Spiegel entworfene Bild scheinbar hinter dem Spiegel fortfährt gesehen zu werden, obgleich wir von allen diesen Erscheinungen sehr wohl wissen, daß ihnen keine reelle Existenz zukommt. Es kann allerdings die Aufmerksamkeit abgelenkt sein und bleiben von Empfindungen, die zu den Objecten der Außenwelt in gar keiner Beziehung stehen, wie zum Beispiel von den Empfindungen der schwächeren Nachbilder, der entoptischen Objecte und andern. Es können ferner mächtig große Irrthümer in der Schätzung ihrer Intensität durch Contrast eintreten, oder wenn sie

als gemeinschaftliche Wirkung zweier Objecte angeschaut werden, können sie falsch an die beiden Objecte vertheilt werden, wie das bei den Contrasterscheinungen vorkommt. Einer der Haupteinwürfe gegen die früheren Formen der empiristischen Theorie ist es ja immer gewesen, so lange man bewusste Schlüsse und Inductionsschlüsse noch nicht genügend unterschied, daß die Sinnestäuschungen durch die Einsicht in ihren Mechanismus und durch die entgegenstehende Erfahrung nicht aufgehoben werden. Was sollte aus unseren Sinneswahrnehmungen werden, wenn wir die Fähigkeit hätten, einen Theil derselben, der uns gerade nicht in den Zusammenhang unserer Erfahrungen paßte, nicht nur nicht zu beachten, sondern in sein Gegentheil zu verkehren?

Denken wir zum Beispiel an den Fall zweier seitlich von der Medianebene liegenden Doppelbilder ein und desselben Objects. Das eine löst nach HERING's Theorie eine positive Tiefenempfindung aus, das andere eine negative, und zwar nicht etwa eine von geringer GröÙe, sondern wie es 818 seine Theorie der stereoskopischen Phänomene voraussetzt, von sehr beträchtlicher und sehr deutlich erkennbarer GröÙe. Aber weil wir wissen, daß die Doppelbilder zu einander gehören und Bilder eines Objects in einer uns mehr oder weniger gut bekannten Entfernung sind, sollen wir den Unterschied ihrer Tiefenempfindungen gewöhnlich nicht erkennen, selbst wenn wir darauf achten, ob das eine oder das andere etwa uns näher oder ferner erscheine. Nun erzeuge man einmal einen schwachen Farbenunterschied beider Bilder, indem man ein Auge vorher gegen eine Farbe ermüdet oder es von der Seite her beleuchtet, so haben wir einen wirklichen Unterschied der Empfindung beider Doppelbilder. Aber dieser Unterschied tritt hervor, auch wenn er zu den allerschwächsten gehört, und ohne Hilfe des binocularen Contrastes vielleicht gar nicht wahrnehmbar ist, trotzdem wir wohl wissen, daß die beiden Bilder Bilder desselben Objectes sind und also gleiche Farbe haben müssen, und trotzdem die Färbung keine objective, sondern eine subjective ist, und wir dies ebenfalls wissen.

Dann betrachte man das ganze System der Localisation, wie sie nach HERING durch unmittelbare Raumempfindung ursprünglich gegeben ist. Nach allen kleineren Verbesserungen, die man etwa noch daran anbringen könnte, um es der Wirklichkeit genauer anzupassen, würde es immer nur so viel leisten können, daß es eine richtige Localisation der Objecte für eine einzige Stellung der Blicklinien gäbe. In allen unendlich vielen anderen Fällen würde es mehr oder weniger falsch und durch Erfahrung zu verbessern sein. Die hypothetischen Annahmen von HERING machen also — vielleicht — die Erklärung der Gesichtswahrnehmungen in einem einzelnen Falle leichter, um sie in allen andern desto schwieriger zu machen; und jedenfalls muß man schließen: Wenn die der Erfahrung entnommenen Momente im Stande sind, die richtige Erkenntniß der räumlichen Verhältnisse selbst entgegenstehenden directen Raumempfindungen gegenüber herzustellen, so müssen sie noch viel eher und leichter im Stande sein, die-

selben richtig erkennen zu machen, wenn keine solche Hindernisse zu überwältigen sind.<sup>1</sup>

Sobald wir dagegen alle Anschauung der Raumverhältnisse auf Erfahrung zurückführen, wie dies in der empiristischen Theorie geschieht, so kämpft in den Sinnestäuschungen niemals Empfindung gegen Erfahrung, sondern nur die eine Induction, welche unter gewissen beschränkten Bedingungen gewonnen ist, gegen die andere, die unter andern Bedingungen gewonnen ist. Wir haben es dann mit einem Kampfe gleichartiger Mächte zu thun und verstehen, daß bald die eine Seite, bald die andere je nach den veränderten Umständen, oder auch beide wechselnd unter gleich bleibenden Umständen unterliegen können.

819 Ich erkenne aber durchaus an, daß die hier discutirten Fragen noch nicht vollkommen spruchreif sind. Ich habe meinen eigenen Standpunkt theils wegen der Einfachheit der Erklärungen, die sich aus ihm ergeben, so gewählt, theils aber auch besonders aus methodologischen Rücksichten, indem ich es nämlich stets für rathsam halte, die Erklärungen der Naturprocesse auf die möglichst geringste Zahl und auf möglichst bestimmt gefasste Hypothesen zu bauen. Andererseits aber muß ich doch auch sagen, daß, je mehr ich im Fortgang dieser Untersuchungen, die mich einen guten Theil meines Lebens hindurch beschäftigt haben, lernte, meine Augenbewegungen und meine Aufmerksamkeit mit freiem Willen zu beherrschen, es mir desto unzulässiger erschien, die wesentlichen Phänomene dieses Gebiets aus einem vorher schon gegebenen Nervenmechanismus erklären zu wollen.

Was die Unterschiede meiner hier gegebenen Darstellung, deren Wesentliches ich schon in einer populären Vorlesung im Jahre 1855 veröffentlicht habe, von anderen neueren Arbeiten betrifft, die auf der Grundlage einer empiristischen Theorie des Sehens fußen, so habe ich für die Abmessung der räumlichen Verhältnisse des Sehfeldes sowohl, als der Entfernung der gesehenen Objecte weniger Nachdruck auf die Muskelgefühle gelegt, als WUNDT, weil ich dieselben aus den oben angeführten Gründen glaube für ziemlich ungenau und veränderlich halten zu müssen. Ich habe vielmehr die hauptsächlichsten Abmessungen des Sehfeldes aus der Deckung verschiedener Bilder mit denselben Netzhauttheilen hergeleitet. WUNDT hat namentlich die hierher gehörigen psychischen Phänomene einer ausführlichen und sehr dankenswerthen Bearbeitung unterworfen. Einzelne Beobachtungen, in denen ich von ihm abweiche, sind oben notirt.

A. NAGEL erklärt die Entstehung der binocularen Doppelbilder aus der Annahme, daß beide Augen ihre Netzhautbilder auf zwei verschiedene Kugelflächen nach außen projecirten. Der Mittelpunkt dieser Kugelflächen wird im Kreuzungspunkt der Visirlinien des entsprechenden Auges angenommen, und beide Kugelflächen sollen sich im Fixationspunkte schneiden. Dabei muß also eigentlich jeder Punkt, der nicht in der

<sup>1</sup> Ich wünsche, daß man diese Kritik, die ich im Interesse der Sache gegen Herrn E. HERING's Ansichten zu richten gezwungen bin, nicht als einen Ausdruck persönlicher Gereiztheit wegen der Angriffe ansehen möge, die er gegen meine Arbeiten gerichtet hat. Ich glaube, daß der Standpunkt einer nativistischen Theorie des Sehens, auf den sich Herr HERING gestellt hat, einen consequent denkenden Kopf ziemlich nothwendig zu der Art von Hypothesen führen mußte, welche seiner Theorie zu Grunde liegen; und ich habe die Angriffe speciell gegen seine Ansichten gerichtet, weil sie mir die klarste und consequenteste Durchführung der nativistischen Theorie zu enthalten schienen, die zur Zeit noch möglich ist. Die Einwürfe, welche Herr HERING gegen meine Arbeiten gemacht hat, habe ich im Laufe dieser letzten Abtheilung zu beantworten gesucht, so weit sie sachliches Interesse haben. Die, welche nur persönliches Interesse haben, habe ich vorgezogen unerwähnt zu lassen, außer, wo ich anerkennen mußte, daß Herr HERING Recht gehabt hat.

chnittlinie beider Kugeln liegt, in Doppelbildern erscheinen. Diese Projectionen senkt sich NAGEL nun von dem Halbierungspunkt der Verbindungslinie beider Augmittelpunkte aus angesehen, und je nachdem sich dabei die Doppelbilder decken, oder kreuzt oder gleichseitig neben einander liegend erscheinen, sollen sie es auch im Gesichtsfelde thun.

NAGEL's Theorie kommt zwar der Wahrheit schon ziemlich nahe; aber einmal ist es etwas künstlich, da sie eine doppelte Projection voraussetzt, zweitens fehlt in Wirklichkeit die Anschauung einer verschiedenen Entfernung der beiden Doppelbilder, welche NAGEL's Theorie in den meisten Fällen fordert; endlich würde ihr zufolge die Lage der mehrfach gesehenen Bilder nicht immer genau mit der Wirklichkeit stimmen. Übrigens ist es wohl der einzige wesentliche Punkt, in welchem meine oben gegebene Theorie von NAGEL's abweicht.

Die richtige Theorie der Doppelbilder und ihrer Lage wurde dagegen von A. CLASSEN gegeben, wenn auch dabei mit Unrecht die factische Richtigkeit der von HERRING gegebenen Phänomene, welche sich auf das scheinbare Centrum der Richtungslinien zwischen beiden Augen beziehen, geleugnet ist. Ich selbst bin zwar, ebenso wie Herr CLASSEN, geneigt, diese Erscheinung zur Grundlage aller unserer Localisationen zu machen, und halte sie nur für eine nebenher gehende Sinnestäuschung, die mir selbst auch für das rechte und linke Auge in verschiedenem Grade stattfindet und durch geschärfte Aufmerksamkeit überwunden werden kann; aber es ist eine Täuschung, die wirklich besteht.

Eine wesentlichere Abweichung zwischen der von mir gegebenen Darstellung der Theorie und CLASSEN's ist, daß er den Ortssinn der Netzhaut und die Projection in das Gesichtsfeld als ursprünglich gegeben und nicht erworben betrachtet. Wenn aber die Lage einzelner Netzhautpunkte zu einander durch eine angeborene Empfindung gegeben 890 dann ist auch die Identität correspondirender Punkte angeboren, da deren Gleichheit gegen den Blickpunkt dann ebenfalls ursprünglich in der Empfindung gegeben sein muß. Es hat diese Abweichung indessen auf die Darstellung derjenigen Capital des Systems, die CLASSEN ausführlich behandelt, namentlich die Lehre vom Muskelsinn und vom Binocularsehen, keinen Einfluß, und es finden sich bei ihm eine große Menge interessanter Erläuterungen aus der pathologischen Beobachtung für die vorgetragenen physiologischen Lehren.

Die der empiristischen Theorie sich anschließenden Ansichten von H. MEYER, J. DERS, VOLKMANN, A. FICK, einzelne Theile der Theorie betreffend, sind jede an ihrer Stelle erwähnt worden.



# Sach- und Namenregister.

---



# Sach-Register.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

## A.

- Aberration, chromatische, in Linsen** 57, im Auge 156—169.  
**Aberration, sphärische, der gebrochenen Strahlen** 57, 169.  
**Abklingen, farbiges der Nachbilder** 521—533, nach momentanem Eindruck 521—524, nach längerem Eindruck 524—526, nach farbiger Beleuchtung 526—530, nach wiederholtem Eindruck von Weiß 530—533.  
**Ablenkung, Minimum derselben** 292.  
**Absolute Accommodationsbreite** 123.  
**Absorption** 51, der dunklen Wärme im Auge 282—283, der ultravioletten Strahlen im Auge 283—284.  
**Absorptionsfarben, ihr Zustandekommen** 313, ihre Mischung 313—315.  
**Abstand des Brennpunktes von der Netzhaut nach verschiedener Entfernung des Objects** 127—128, der Cardinalpunkte des Auges von einander 89—90. 140, der Cardinalpunkte der Krystalllinse 102.  
**Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane** 850—854, 863—864, der Gesichtslinie von der Augenaxe 91. 108—109, der Sehweiten für horizontale und verticale Linien 173—177, chromatische und sphärische siehe Aberration.  
**Accommodation** 113—156, ihr Mechanismus 130ff., beobachtet im Augenspiegel 228, ihre Breite 119—123, ihre Abhängigkeit von der Convergenz 632, für die Ferne ist der Ruhezustand des Auges 120, Theorien ihres Mechanismus 186—188, 150—156, als Mittel zur Beurtheilung der Entfernung 778.  
**Accommodationsbreite** 120—121, absolute, binoculare und relative 123.  
**Accommodationslinie** 114. 766.  
**Accommodationsphosphen** 239.  
**Achromasie** 57. 156.  
**Achromatopsia** 359, s. Farbenblindheit.  
**Achrupsia** 359, s. Farbenblindheit.  
**Adaptation** 114, s. Accommodation.  
**Addition, Begriff derselben** 335; der Farben 316.  
**Aderhaut** 4. 22, s. Chorioidea.  
**Ähnlichste Farben** 448 ff.  
**Aequatorialaxe des scheinbar verticalen Meridians** 857, des Netzhauthorizontes 857.  
**Aequatorialebene des Auges** 5.  
**Aequiluciente Lichteinheiten** 432.  
**Aeußerer gerader Muskel** 43.  
**Aeußere granulirte Schicht** 32.  
**Aeußere Körnerschicht** 32.  
**Aeußere Nervenzellen** 32.  
**Alternirendes Schielen** 846.  
**Ametropie** 120.  
**Anaglyptoskop** 772.  
**Andreaskreuzlinien, subjectiv sichtbar** 572.  
**Anerythroptia** 360.  
**Angeborene Ideen** 612.  
**Anordnung, flächenhafte der gesehenen Objecte** 673—675. 950.  
**Anorthoskop** 498. 749.  
**Ansatzpunkte der Augenmuskeln** 665 ff.  
**Anschauen, (Definition)** 600.  
**Anschauung, (Definition)** 609. Zusammenhang mit den Augenbewegungen 877, s. Wahrnehmung, innere 577, innere und äußere 587.  
**Antirheoskop** 764.  
**Aplanatische brechende Flächen** 57. 169.  
**Arteriae ciliares** 24—25, centrales retinae 36, s. Netzhautgefäße.  
**Assimilirung** 378.  
**Astigmatisches Strahlenbündel** 174.



Astigmatismus 162. 169. 173. 176.  
 Astrometer 474.  
 Asymmetrie des brechenden Apparates  
 im Auge 108—109, des scheinbar verti-  
 calen Meridians 687; s. Astigmatismus.  
 Atrope Linie 641.  
 Atrope Linie, zeitige 650.  
 Atropin, seine Wirkung auf das Auge  
 138.  
 Aufmerksamkeit 604—606. Mittel, sie  
 zu fesseln 922—924.  
 Augapfel, Dimensionen 9, Befestigung  
 42. 613.  
 Auge der wirbellosen Thiere 3.  
 Auge, reducirtes, von LISTING 90.  
 Auge, schematisches, von LISTING 89,  
 von HELMHOLTZ 140.  
 Augenaxe 5. 88. 91, ihre Lage 108 bis  
 109. Veränderung ihrer Länge bei der  
 Accommodation 139. 149.  
 Augenbewegungen 613 ff. 619 ff. Will-  
 kür derselben 628 ff.  
 Augenhöhle 42.  
 Augenkammer, hintere 30. 39; vordere  
 39.

Augenleuchten 202 ff.  
 Augenlider 43.  
 Augenmaafs 677—716, für lineare paral-  
 lele Längen 682—686, für Linienkrüm-  
 mung 686—687, für Parallelismus 687,  
 für Winkel 687—688, Theorie für das  
 Blickfeld 688—690. 960, im indirecten  
 Sehen 691—702, Täuschungen 705—716,  
 variable Fehler desselben 685. constante  
 Fehler desselben 684, s. auch Tiefenwahr-  
 nehmung.  
 Augenmodell 129.  
 Augenmuskeln, äußere 43, hypothetische  
 Wirkung bei der Accommodation 149.  
 Wirkung derselben bei den Augen-  
 bewegungen 626 ff. Ansatzpunkte und  
 Drehungsaxen 665 ff.  
 Augenpunkte der niedersten Thierfor-  
 men 3.  
 Augenspiegel 202 ff., binocularer 834.  
 Augenstellungen, geprüft mittels corre-  
 spondirender Bilder beider Augen 662 ff.  
 Aufsenglied der Stäbchen und Zapfen 33.  
 Axe des Auges 5, eines brechenden Systems  
 55, optische eines centrirten Systems 71.

## B.

Basallinie 617.  
 Begriff 591. 948.  
 Beleuchtung des Augengrundes 204. 219  
 bis 221, momentane 710. 890—891. 935,  
 farbige 551. 564, Mittel, ihre Farbe zu  
 erkennen 550—551, intermittirende er-  
 scheint continuirlich 481—486, zur Beob-  
 achtung bewegter Körper angewendet  
 486—488, farbiges Abklingen derselben  
 530—533.  
 Beleuchtungsgesetz 209.  
 Benannte Zahlen 335.  
 Beugung des Lichtes 51, an der Pu-  
 pille 180.  
 Bewegungen des Auges 613 ff., beider  
 Augen von einander abhängig 628 ff. 949.  
 des Blutes entoptisch sichtbar 533. 572 bis  
 574, des Kopfes giebt Tiefenwahrnehmung  
 779 ff., scheinbare bei Schwindel 746—749.  
 764, intermittirender Bilder 494, subject-  
 tiver Erscheinungen 242—243.  
 Biconcave Linsen 88.  
 Biconvexe Linsen 82.  
 Bilder, optische 55. 759, entworfen  
 durch eine Kugelfläche 66—67, ihre Größe  
 steht in Beziehung zur Convergenz der  
 Strahlen 70—71, auf der Netzhaut  
 85—86. 112—114. 228, gespiegelte der  
 Krystalllinse 132—133, von Prismen ent-  
 worfen 289 ff.  
 Bindehaut 7. 43.

Binoculare Accommodationsbreite  
 123.  
 Binocularer Augenspiegel 834.  
 Binocularer Contrast 944.  
 Binoculares Doppelsehen 841 ff.  
 Binoculare Farbenmischung 931. 945.  
 Binoculares Sehen 885 ff. 951 ff. Empi-  
 ristische Theorie desselben 951 ff. 970 ff.  
 Theorie von PANUM 957 ff., von HERING  
 960 ff.  
 Bioskop 836.  
 Blau 278.  
 Blaugrün 278.  
 Blendung 446; siehe auch Iris.  
 Blick, Erhebungswinkel desselben 617.  
 Seitenwendungswinkel desselben 618.  
 Blickebene 617; Primärlage derselben  
 678. 866.  
 Blickfeld 617. 677; Occipitalpunkt der-  
 selben 651.  
 Blicklinie 617. 679.  
 Blickpunkte 617. 629. 677; sind Deck-  
 punkte 844.  
 Blinder Fleck 250—254. 273—274; seine  
 Benutzung zur Prüfung des Drehungs-  
 gesetzes 660 ff.; seine Ausfüllung 716—727.  
 Blindgeborene, ihre Wahrnehmungen  
 nach der Operation 781—788.  
 Blinzeln 44.  
 Blutkörperchen, subjectiv sichtbar 533.  
 573—574.

Brachymetropie 120.  
 Braun als Farbe 322, 324.  
 Brechende Fläche 53.  
 Brechungscoefficient (Brechungsindex, Brechungsverhältniß, Brechungsvermögen) 54, der Augenmedien 89, 98, totaler und mittlerer der Krystalllinse 102, 106.  
 Brechung des Lichtes 53, an einer Kugelfläche 60 ff., in centrirten Systemen von Kugelflächen 71 ff., in Linsen 81 ff., im Auge 85 ff., in der Hornhaut 88, 92—98, in der Krystalllinse 93 ff., im Scheitel eines Ellipsoids 178, in Prismen 275 f. 289 ff..  
 Brechungswinkel 53.  
 Breitenwinkel 857.  
 Brennebene 59. 68.

Brenngläser 55.  
 Brennnlinien 61, auf der Iris sichtbar 135, nicht homocentrischer Strahlen 179.  
 Brennpunkte 57. 67. 74. 77. 78, des Auges 89, wechselnde Entfernung von der Netzhaut 128, für verticale und horizontale Linien verschieden 175. 181.  
 Brennweiten 58, verhalten sich in centrirten Systemen wie die Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mediums 75—76, der Linsen 84 f., des Auges 89, Aenderungen bei der Accommodation 140.  
 Brillen, Historisches über ihren Gebrauch 130, ihre stereoskopische Wirkung 820 bis 822.  
 BUSOLD'scher Farbenkreisel 493.

## C.

Camera obscura 56.  
 Canal godronné, oder Petiti 41.  
 Cardinalpunkte eines optischen Systems 57, ihr Gebrauch 59.  
 Cardinalpunkte des Auges 89. 106—108, des accommodirten Auges 140.  
 Causalgesetz 593.  
 Centrirung des Auges 108—109.  
 Centrirtes System 55.  
 Centrum, optisches einer Linse 82, der Richtungslinien 91, der Visirlinien 115, der Blicklinien 617, der Sehrichtungen 751.  
 Chiasma nervorum opticorum 42.  
 Chorioidea 4. 22, ihre Gefäße im Augenspiegel sichtbar 227, nicht ganz undurchscheinend 193.  
 Chromatische Abweichung s. Aberration.  
 Chromharmonische Scheibe 310.  
 Ciliarfortsätze 23, ihre Rolle bei der Accommodation 143.  
 Ciliarkörper 4.  
 Ciliarmuskel 23, Wirkung bei der Accommodation 136 ff.  
 Circuli arteriosi iridis 25.  
 Collective Flächen 66.  
 Colorimetrische Lichteinheiten 432.  
 Complementärfarben 316 ff., in den Nachbildern 516 ff., durch Contrast 537 ff., 930 ff.  
 Concavconvexe Linsen 83.  
 Concave Glaslinsen 55.  
 Concavlinsen 85.  
 Concavspiegel 65.  
 Concomitirendes Schielen 845.  
 Congruenzebene des Reliefs 807. 818.  
 Conjugirte Vereinigungspunkte 55. 64.

Conjunctiva 43.  
 Continuität der Empfindungsqualitäten 596.  
 Contrast 537 ff., bei starken Farbenunterschieden 548 ff., binocularer 936—938. 944, für Linienrichtungen 714, simultaner 939. 940, simultaner und successiver 538 ff., successiver 939. 940, scheinbare Umkehrung 554, auf kleinem Felde 557 ff., Theorie desselben 564 ff., Historisches 565 f. 1008.  
 Contrastphotometer 423.  
 Convergenz der Augenaxen, Mittel zur Beurtheilung der Entfernung 795 ff. 951, Einfluß auf Raddrehung der Augen 625, Einfluß auf Beurtheilung der Richtung 751 ff., Einfluß auf Accommodation 122 ff.  
 Convexe Glaslinsen 55.  
 Convexlinsen 85.  
 Convexspiegel 65.  
 Cornea 4.  
 Cornealmikroskop von DONDEBS 29.  
 Corpus vitreum 40.  
 Correspondirende Bilder beider Augen, ihre Vergleichung zur Prüfung der Augenstellungen 662 ff.  
 Correspondirender Empfindungskreis 892.  
 Correspondirende Linie 896.  
 Correspondirende Meridiane, Kreuzungswinkel derselben 860.  
 Correspondirende Punkte 844 ff. 952, verschieden in das Gesichtsfeld projectirt 885 ff., geometrische Bestimmung ihrer Lage 895 ff., Theorie ihres Ursprungs 914. 952.  
 Correspondirende Punkte und Linien, Gesetze derselben 895—903.

- Correspondirende Strecken und Winkel 897.  
 Correspondirende Visirlinien und -ebenen 898.  
 Cyanblau 278.  
 Cyclopedenauge, imaginäres 756.  
 Cylindrische Brillengläser 176. 183

## D.

- Dädaleum 495.  
 Daltonismus 360, s. Farbenblindheit.  
 Dauer der Lichtempfindung 480 ff. 488 ff.  
 Deckpunkte 844.  
 Descem's Membran 7.  
 Denken 600.  
 Descemet'sche Haut 7—8.  
 Dichromatische Farbensysteme 359. 371. 382. 458 ff.  
 Diffraction des Lichtes 51, in der Pupille 180.  
 Diffuse Reflexion 51.  
 Dilator pupillae 24.  
 Ding an sich 590 ff.  
 Dioptrie 122.  
 Diplopia monophthalmica 183.  
 Directes Sehen 86.  
 Directionskreise 651, erscheinen gerade 690 ff.  
 Disparate Punkte 844.  
 Dispersive Flächen 66.  
 Dissimilierung 378.  
 Divergenzgesetz bei spiegelnden Flächen 65, bei brechenden Flächen 66.  
 Divergenz, optische, der Strahlen 66, der Augen 632 ff., Einfluß auf die Tiefenwahrnehmung 799 f.  
 Donders' Gesetz der Augenbewegungen 619, theoretische Begründung 637.  
 Doppelbilder 844. 874, monoculare 171. 760, binoculare 843, gleichnamige und ungleichnamige 843, ihre scheinbare Entfernung 867, ihre Verschmelzung 874 ff.  
 Einfluß der Augenbewegungen darauf 888 ff., Richtung, in der sie projiziert werden 894 f.  
 Doppelbrechung 49.  
 Doppelspalt von HELMHOLTZ 853.  
 Doppeltsehen, binoculares 841 ff.  
 Drehpunkt des Auges 614 ff., Bestimmung nach DONDERS 656 ff.  
 Drehungen, allgemeine geometrische Betrachtung derselben 645 ff.  
 Drehungsachsen für die Augenmuskeln 627, 665 ff., Lage ihrer Ebenen nach LISTING'S Gesetz 624 f. 648 f.  
 Drehungscentrum des Augapfels 614 ff., 656 ff.  
 Drehungsgesetz der Augen 619, seine theoretische Begründung 637 ff., seine Prüfung mittels der Nachbilder 657 ff., mittels des blinden Fleckes 660 ff., durch binoculares Sehen 662 ff.  
 Druck im Auge 8, Einfluß auf den Blutlauf 238, subjective Erscheinungen, die er hervorruft 237. 758. 761.  
 Druckbild 236.  
 Ductus nasolacrymalis 44.  
 Dunkel 879.  
 Dunkelheit 322.  
 Dunkle Wärmestrahlen 281.  
 Durchsichtigkeit 51.

## E.

- Ebenen, correspondirende 899.  
 Ebene des Hintergrundes des Reliefs 807, gleichen Höhenwinkels 857, gleichen Breitenwinkels 857.  
 Eigenlicht der Netzhaut 242, Einfluß desselben auf die Unterschiedsschwellen 409. 1007, im dunklen Gesichtsfeld 502.  
 Eigenschaften der Objecte bestehen in ihren Wirkungen auf andere 588.  
 Einfache Farben 275 ff.  
 Einfallsebene 53.  
 Einfallslot 53.  
 Einfallswinkel 53.  
 Einheiten gleicher Helligkeit 432.  
 Elektrische Reizung des Auges 243 ff.  
 Elektrische Ströme des Sehnervenapparates 269.  
 Elementarerregungen 843.  
 Elementarfarben 454 ff.  
 Elemente der Empfindung 342.  
 Ellipsoid, Brechung an demselben 178.  
 Ellipticität der Hornhaut 17.  
 Emmetropie 120.  
 Empfindungen, subjective schwer zu beobachten 606 ff., zusammengesetzte zu analysiren 608, nicht durch Vorstellung zu beseitigen 611, ihre Bedeutung als Symbole äußerer Qualitäten 234, 586 ff., Modalität derselben 584, Qualitätenkreis derselben 584.  
 Empfindungskreis, correspondirender 892.  
 Empiristische Theorie der Sinneswahrnehmungen 608 f. 613.

Endstrecken im Spectrum 320.  
 Entfernung der Objecte, beurtheilt nach  
 scheinbarer Größe 767, nach der Deckung  
 der Objecte 768, nach der Luftperspective  
 774, nach der Accommodation 778 f.,  
 mittels Bewegung 779 f., binocular 781,  
 nach der Convergenz 795 ff.  
 Entoptische Erscheinungen 184.  
 Entoptische Parallaxe, relative 186.  
 Episkotister 417. 942.  
 Erfahrung, Einfluß auf die Wahrneh-  
 mungen 609 ff., s. Empiristische Theorie.

Erhebungswinkel des Blickes 617.  
 655.  
 Erinnerungsbild 948.  
 Ermüdung der Netzhaut durch Licht 508,  
 für Convergenz 802. 951.  
 Erregung der Netzhaut durch Licht  
 234 ff. 250 ff., mechanische 235, durch innere  
 Ursachen 241 ff., elektrische 243 ff.  
 Erscheinungen, pseudoskopische  
 778.  
 Erweiterer der Pupille 24.

## F.

Fadenapparat 33.  
 Farben, einfache 275 ff., Festsetzung ihrer  
 Namen 278. 287, Addition derselben 316,  
 ähnlichste 448 ff., complementäre 816 ff.,  
 gesättigte 816, inducirte und inducirende  
 538, kleiner Felder 874, warme und  
 kalte 366, verglichen mit den Tönen der  
 Scala 287 f., ihr Aussehen an der Grenze  
 des Gesichtsfeldes 372, primäre und rea-  
 gierende 502, der Nachbilder 511 ff.  
 Farbenbezeichnungen, Ursprung der-  
 selben 348, 588.  
 Farbenblindheit 359 ff. 367. 371. 382.  
 458 ff., der Netzhautperipherie 372.  
 Farbeinheiten 432.  
 Farbenharmonien 308 ff.  
 Farbenkegel 326.  
 Farbenklavier 309.  
 Farbenkreis 325.  
 Farbenkreisel 313. 351. 491 ff.  
 Farbenlinien, kürzeste 468 ff.  
 Farbenmischung 316, binoculare 981,  
 945.  
 Farbenmischungsgesetz 327 ff., Grenzen  
 der Genauigkeit desselben 375.  
 Farbenpyramide 310. 326.  
 Farbenscheiben, s. Farbenkreisel.  
 Farbensystem 321 ff., normales trichro-  
 matisches 357 f. 369 f. 456 ff., anomales  
 trichromatisches 359, dichromatisches  
 359 ff. 371. 382. 458 ff., monochroma-  
 tisches 359. 367.  
 Farbentafel 325. 340, Construction der-  
 selben 327 ff.  
 Farbentheorie von BREWSTER 304 f. 334,  
 von YOUNG 345 ff., von HEEING 376 ff., von  
 GÖTTE 306.  
 Farbenton 322. 324.  
 Farbenunterscheidung auf kleinen  
 Feldern 374.  
 Farbenunterschiede im Spectrum 449,  
 bei sehr schwacher Intensität 471.  
 Farbenwechsel im Nachbilde 504. 516.  
 521 ff.

Farbenwerth 342.  
 Farbenzerstreuung im Auge 156 f., im  
 Prisma 275 ff. 293 ff.  
 Farbige Nachbilder 516.  
 Farbige Abklingen der Nachbilder  
 516. 521.  
 Farbige Schatten 551 ff., ihr Einfluß  
 auf Erkennung der Form 773. 792 f. 968.  
 Farbstoffe, Mischung derselben 313 f.  
 Faserige Schicht der Hornhaut 6—7.  
 FECHNER's Gesetz 387 ff., als Ursache von  
 Täuschungen 394 ff., seine Abweichungen  
 für sehr geringe Lichtstärken 409 ff. 1007,  
 seine Abweichungen für hohe Lichtstärken  
 413 f., Erweiterung desselben 444 ff., be-  
 nutzt zur Bestimmung der Grundfarben  
 448 ff., s. Psychophysisches Gesetz.  
 Fensterversuch, seitlicher 943.  
 Fernpunkt 119.  
 Fernrohr, GALILEI'sches 85.  
 Feuchtigkeit, wässrige 4. 39.  
 Fixationspunkt 617. 677, primärer 678.  
 Fixiren 86. 617. 630 f. 670, bewegter Ob-  
 jecte 746 ff., Ungenauigkeit desselben  
 854. 881 f.  
 Flächen, brechende 53, aplanatische  
 169, collective und dispersive 66.  
 Flächenhafte Anordnung der gesehe-  
 nen Objecte 673.  
 Flatternde Herzen 533 f.  
 Fleck, MAXWELL'scher 569.  
 Fliegende Mücken 188.  
 Fluchtlinie 818.  
 Fluchtpunkt 819.  
 Fluorescenz 52. 279.  
 Foramen opticum 42.  
 Form der Hornhaut 17—20.  
 Fortpflanzungsgeschwindigkeit (der  
 Lichtwellen) 49.  
 Fovea centralis 32. 34—36.  
 FRAUNHOFER'sche Linien 277, ihre Wellen-  
 längen 287.  
 Frontalschnitte 616.  
 Fußboden als Horopterfläche 863. 870 ff.

## G.

GALILEI'sches Fernrohr 85.

Ganzbild 844.

Gegenfarben 377 ff.

Gelb 278.

Gelber Fleck der Netzhaut 31. 34—36, entoptisch sichtbar 193, subjectiv sichtbar 566 ff., im Augenspiegel sichtbar 227, bei elektrischer Durchströmung sichtbar 246, Stelle des genauesten Sehens 265, Correspondenz in beiden Augen 844 ff., 881.

Genauigkeit des Sehens kleiner Objecte 256 ff. 1008, deren peripherische Abnahme 260 ff., des Augenmaasses 682 ff., der Tiefenwahrnehmungen 787, der Trennung von Doppelbildern 883.

Geometrische Betrachtung der Drehungen 645 ff.

Gerade Muskeln, innere, äußere, obere und untere 43.

Gesättigte Farben 316.

Gesetz (Definition) 591.

Gesichtsaxe 91.

Gesichtsfeld 673. 677, seine Größe 87, monoculares 669.

Gesichtslinie 91. 617, ihre Lage 108 bis 109.

Gesichtspunkt in der Perspective 807. 817. 820.

Gesichtsschwindel 764.

Gesichtstäuschungen 602 ff. 948, ihre Klassen 757 ff.

Gesichtswahrnehmungen (Definition 576, s. Wahrnehmung.

Gesichtswinkel 127.

Glanz 932—936, monocularer 935, stereoskopischer 944.

Glasartige Lamelle der Hornhaut i. Glashaut 40.

Glaskörper 4. 39, die entoptisch darin gesehenen Körperchen 188.

Glaslinsen, convexe und concave 55.

Gleichnamige Doppelbilder 843.

Globulin 38.

Goldgelb 278.

Granulirte Schicht, innere u. äußere 32.

Grau 322. 324.

GRAVESAND'sche Schneiden 300.

Grün 278, aus Blau und Gelb nicht mischbar 312. 315. 320. 382.

Grünblindheit s. dichromatische Farbensysteme.

Grüngelb 278.

Grünwerth 342.

Grundempfindungen und Grundfarben 304. 333 f. 370. 376 ff. 382 f. 456 ff. 1007. 1008.

Grundlinie 617.

Guajakharz als lichtempfindliche Substanz 284.

## H.

Haarstrahlenkranz 170.

HÄRDINGER's Polarisationsbüschel 570 ff.

Halbbild 844.

Hauptblickpunkt 651. 678.

Hauptbrennweite 58. 63. 75.

Hauptbrennweiten des Auges 90.

Hauptebene 57. 68. 74, eines Prismas 290, der Reliefperspective 807. 817. 819.

Hauptfarben des Spectrums 288.

Hauptmeridianebenen 897.

Hauptpunkte 57. 68. 74. 77. 78. 89.

Hauptvisirlinie 679.

Helligkeit, Begriff derselben 439, in einem Zerstreuungskreise 164 ff., am Rande einer gleichmäßig erleuchteten Fläche 166, der optischen Bilder 209 ff., 1008, der Augenspiegelbilder 214 ff., der prismatischen Bilder 298, subjective und objective 384 ff., der Farben 428 ff., subjective mit der Zeit abnehmend 511, nach Hering's Farben-theorie 378 ff., intermittirenden Lichtes 482 ff.

Herzen, flatternde 533.

Heterochrome Photometrie 416. 428 ff.

Himmelblau 278.

Hintere Augenkammer 39.

Höhenwinkel 857.

Homocentrisches Licht 55, bei prismatischer Brechung 289 ff.

Homogenes Licht 49.

Horizontale Meridianebene des Blickfeldes 678.

Horizontaler Meridian des Sehfeldes 679.

Horizontalhoropter 864.

Horizontalschnitte 616.

Hornhaut 4. 6 f., Brechung in derselben 92 f., ihre Form 17—20, ihr Krümmungshalbmesser 89, unverändert bei der Accommodation 141, entoptisch gesehen 187, fluorescirend 284. 306.

Hornhautastigmatismus 177.

Hornhautkrümmung, bestimmt durch das Ophthalmometer 16 f.

Horopter 860—862. 903. 913. 914.

Horopterconstruction 864—867.

Horoptercurve 861. 862. 903. 905.

Horopterebene 862.

Horopterfläche 811.  
 Horopterkreis 862.  
 Humor aqueus 4. 39.

Humor vitreus 40.  
 Hyaloidea 40.  
 Hypermetropie 120.

## I.

Idealismus 594 f. 612.  
 Ideelle Netzhaut 681.  
 Ideelles Netzhautbild 681.  
 Ideen, angeborene 612.  
 Identische Punkte der Netzhäute 844. 860. 952, verschieden in das Gesichtsfeld projectirt 885 ff., geometrische Bestimmung ihrer Lage 895 ff., Theorie ihres Ursprungs 914. 952 f.  
 Indigblau 278.  
 Indirectes Sehen 87, seine Genauigkeit 260 ff., für Farben 372.  
 Inducirende Farbe 538.  
 Induciren von Lichtempfindungen 513.  
 Inducirte Farbe 538.  
 Inductionen, falsche 602 ff.  
 Inductionsschluss 578 ff. 602.  
 Innenglied der Stäbchen und Zapfen 33.  
 Innerer gerader Muskel 43.  
 Innere granulirte Schicht 32.

Innere Körnerschicht 32.  
 Innervation, Grad derselben 947.  
 Innervationsgefühl 951.  
 Intensität der Lichtempfindung 384 ff., verschiedenes Gesetz für verschiedene Farben 428 ff., des objectiven Lichts 384.  
 Interferenzspectrum, Abweichung vom prismatischen 281.  
 Intermittirende Beleuchtung, scheinbar continuirlich 481 f., zur Beobachtung bewegter Körper 486 ff., giebt Farbenercheinungen 530 ff.  
 Iris 4. 22 f., ihre Ansatzweise 147, Bei stimmung ihrer Form und Lage 25, bei der Accommodation 130. 134. 141. 147' entoptisch sichtbar 187.  
 Irradiation 394 ff. 478 ff., Einfluss auf Täuschungen des Augenmaasses 707 f.  
 Irregulärer Astigmatismus 162.  
 Isochromatische Photometrie 416 ff.

## K.

Kalte Farbe 366.  
 Karminroth 278.  
 Kaustische Linie 61—62.  
 Kernfläche des Sehraums (nach Hering) 963.  
 Keratoskop 177.  
 Klarheit 394.  
 Knotenebene 76.  
 Knotenpunkte 57 f. 68. 76. 79, des Auges 89. 138. 140.  
 Körnerschicht, innere und äußere 32.  
 Kraft (Definition) 592.  
 Kreuzspinnengewebefigur von Purkinje 575.  
 Kreuzungspunkt der Visirlinien 110.  
 115. 127. 727. 729, der Richtungslinien 91,

der Richtungsstrahlen und Richtungslinien 111.  
 Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane 860.  
 Krümmungshalbmesser der Hornhaut 89, der vorderen Linsenfläche 89, der hinteren Linsenfläche 89.  
 Krystallin 38.  
 Krystalllinse, anatomische Beschreibung 4. 38, Brechung in derselben 93. 99 ff., ihre Form an lebenden Augen 102—106, ihre Veränderung bei der Accommodation 132—135, entoptisch gesehen 172. 188, fluorescirend 284. 306.  
 Künstliches Auge 129.  
 Kürzeste Farbenlinien 463 ff.

## L.

Lamina cribrosa 36.  
 Lamprotometer 474.  
 Landschaft, ihre Farben 606 f. 873.  
 Lateral 617.  
 Latitudo der Blickrichtung 618. 655.  
 Lavendelgrau 285.  
 Leitungsfähigkeit der Nervenfasern 232.  
 Leukoskop 368. 372.  
 Licht, allgemeine Eigenschaften desselben

47 ff., intermittirendes 481 ff., primäres und reagirendes 502, homogenes 49. 275, polarisirtes 48, homocentrisches 55.  
 Lichtchaos des dunklen Gesichtsfeldes 242. 502.  
 Lichteinheiten, Äquivalente 432, colorimetrische 432.  
 Lichtempfindliche Elemente der Netzhaut 201 f.

- Lichtempfindung als spezifische Energie des Sehnerven 283, ihre Erregungsweisen 234 ff., Ort ihrer Entstehung 201 f., ihre Qualitäten 275 ff. 311 ff., Dauer 480 f. 488 ff., zeitlicher Verlauf 513 ff., Intensität 384 ff., ihre allmähliche Abnahme bei constanter Beleuchtung 511 f., ihre Nachdauer 501 ff., ihre objective Deutung 576 ff.
- Lichtpunkte, subjective 572 ff.
- Lichtschattenfigur von PURKINJE 532.
- Lichtstärke 824.
- Lichtstaub des dunklen Gesichtsfeldes 242. 502.
- Lichtstrahl, seine Selbständigkeit 50.
- Lichtstreifen, von den Lidern herführend 187, wandelnde im dunkeln Felde 242 f.
- Ligamentum iridis pectinatum 24, suspensorium lentis 41.
- Limitans hyaloidea oder interna 86.
- Linie, atrope 641, zeitige atrope 650, correspondirende 896.
- Linien, FRAUNHOFER'sche 277, von ZANTEDESCHI 298.
- Linienhoropter 864.
- Linsen 81 ff., ihre Gestalt und Cardinalpunkte 82 ff., biconvexe 82, planconcave, biconcave, planconvexe, concavconvexe 83, astigmatische 176, s. außerdem Krystalllinse.
- Linsenastigmatismus 177.
- Linsendicke 89.
- Linsenfläche, vordere und hintere, ihr Krümmungshalbmesser 89, vordere, ihre Entfernung von der vorderen Hornhautfläche 89.
- Linsenkapsel 88.
- Linsenstereoskop 880, verbessertes von HELMHOLTZ 829—830.
- Liquor MORGAGNI 89.
- LISTING's Gesetz der Augenbewegungen 628, seine theoretische Begründung 637 ff., geometrische Darstellung 647—656, Einfluß auf das Augenmaas 688 ff., auf die Form des Horopters 864 ff. 906 ff.
- Localisirung der subjectiven Erscheinungen 758 ff.
- Localzeichen 670. 947.
- LOEWY'scher Ring 567.
- Longitudo der Blickrichtung 618. 655.
- Loupe 85.
- Lücke im Sehfelde 717.
- Luftperspective 774.

## M.

- Macula lutea retinae 81.
- Mannigfaltigkeit (nach RIEMANN) 336.
- MAXWELL'scher Fleck 569.
- Mechanische Reizung des Sehnervenapparates 235.
- Medial 617.
- Medianebene 616.
- MEXIMOM'sche Drüsen 43.
- Membrana DEMOURSII 7—8, hyaloidea 40, limitans externa 32.
- Meridian, horizontaler des Sehfeldes 679.
- Meridiane, scheinbar verticale 687 f. 702 f. 850 ff., des Blickfeldes 678, correspondirende beider Augen 847 ff. 897 ff.
- Meridianebene, horizontale des Blickfeldes 678.
- Messen, Begriff desselben 335.
- Metallglanz 934.
- Meterlinse 122.
- Mikroskop, binoculares 882—884.
- Minimum der Ablenkung 292.
- Mischfarbe 316.
- Mischung von Farbstoffen 313 f., farbigen Lichts, Methode derselben 350 ff., auf dem Farbenkreisel 313 f. 332. 485 f., mit Weiss 470 f.
- Mischungsmethoden farbigen Lichtes 312 ff.
- Mittempfindung 241. 400.
- Mittelstrecke im Spectrum 320.
- Modalität der Empfindung 584.
- Mond am Horizont 774.
- Monochromatisches Farbensystem 359. 367.
- Monochromatische Abweichung 169.
- Monocularer Glanz 935.
- Monoculares Gesichtsfeld 669.
- MORGAGNI'sche Flüssigkeit 39.
- Motorische Nerven 231.
- Mouches volantes 188.
- Mücken, fliegende 188.
- MÜLLER'scher Horopterkreis 862. 866.
- Muskelgefühl 742.
- Muskeln, gerade und schiefe 48.
- Musculus Brückianus 23, contractor pupillae 24, sphincter et dilatator pupillae 24, compressor lentis 136, sphincter lentis 136, crystallinus 154, ciliaris s. tensor chorioideae 23, dessen Wirkung bei der Accommodation 136, rectus et obliquus s. Augenmuskeln.
- Myopie 120.

## N.

- Nachbilder 480 ff., positive und negative 481 ff. 503 ff., ihr Farbenwechsel 504. 521 ff., ihre Dauer 506, farbige 516 ff., Theorien darüber 584 ff., geben stereoskopische Tiefenwahrnehmung 891 f., verursachen den successiven Contrast 538 ff., im binocularen Contrast 986 f., verwendet zur Prüfung des Drehungsgesetzes 657 ff.  
 Nachwirkung des Lichteindrucks 480.  
 Nähepunkt 119.  
 Nativistische Theorie der Sinneswahrnehmung 609 f. 913. 955.  
 Nebelstreifen, wandelnde, GÖTTHE's 242.  
 Negative Nachbilder 481 ff. 503 ff.  
 Negative Schwankung des Nervenstromes 270.  
 Neigung, optische, eines Strahles 71.  
 Nerven, motorische und sensible 281.  
 Nervenenden in der Netzhaut 250. 254.  
 Nervenstrom, negative Schwankung 270, ruhender 270.  
 Netzhaut, anatomische Beschreibung 4. 30 ff., ihre Größenverhältnisse 37—38, ihre mechanische Reizung 235 ff., innere Reizung und Eigenlicht 241 ff. 409, elektrische Reizung 243 ff., Reizung durch Licht 234 ff., nur in den hinteren Schichten empfindlich 254 f., ideelle 681.  
 Netzhautbild 84, äußerlich sichtbar 86, im Augenspiegel sichtbar 228, ideelles 681.  
 Netzhautgefäße 36—37, entoptisch sichtbar 192 ff., im Augenspiegel sichtbar 227, durch Druck sichtbar 238, ihr Verschwinden 555.  
 Netzhautgrube 32 ff., als Fixationspunkt 86. 228, im Augenspiegel sichtbar 228, entoptisch sichtbar 105. 567 f., Abmessungen 567, bei elektrischer Reizung 247.  
 Netzhauthorizont 618 ff. 679. 752 f. 847 ff., correspondirend in beiden Augen 847, Äquatorialaxe desselben 867.  
 Netzhautperipherie, Farbenblindheit derselben 872.  
 Normale trichromatische Augen 357.  
 Normalfläche RECKLINGHAUSEN's 811. 823—829.

## O.

- Oberer gerader Muskel 43.  
 Oberer schiefer Muskel 43.  
 Objectives Spectrum 276.  
 Objectiv-Photometer 474.  
 Occipitalpunkt des Blickfeldes 651. 678.  
 Ophthalmometer von HELMHOLTZ 10—17, von COCCIVS 20, von JAVAL 176.  
 Ophthalmoskop von CRAMER 154.  
 Ophthalmotrop 628. 667.  
 Opticus-Ellipsoide 33.  
 Optische Axe eines centrirten Systems 71.  
 Optisches Bild 55.  
 Optische Cardinalpunkte 57.  
 Optisches Centrum einer Linse 82.  
 Optische Divergenz der Strahlen 66  
 Optische Neigung eines Strahles 71.  
 Optogramm auf der Netzhaut 266.  
 Optometer 128—129.  
 Orange 278.  
 Ora serrata retinae 31. 37.  
 Orbita 42.  
 Orientirung, leichteste 638.  
 Orientirung über verticale und horizontale Richtung, monocular 752 ff., binocular 808 ff.  
 Ort, scheinbarer und geometrischer im Blickfelde 678, im Sehfelde 679.  
 Orthoskop von CZERNIAK 25.

## P.

- Palpebrae 43.  
 Panoramen-Stereoskop 836.  
 Paradoxer Versuch FROEMER's 941.  
 Parallaxe, relative entoptische, nach LISTING 186, stereoskopische 783, des indirecten Sehens 680. 729  
 Pars ciliaris retinae 37.  
 Perception 596. 609.  
 Perimeter 88.  
 Perlschnüre, entoptisch sichtbar 190.  
 Perspective der Reliefbilder 807 f.  
 PERRIT'scher Canal 41.  
 Phänakistoskop 494.  
 Phosphen 236.  
 Phosphorescenz 52.  
 Phosphorescirende Wolken 472.  
 Photometer von BUNSEN 418, von LUMMER und BRODHUN 419—422, von BRÜCKE 422, von WEBER 423.  
 Photometrie 416 ff., 473 ff., heterochrome 428 ff.  
 Pigmentschicht 34.  
 Pigmentkörnchen, ihre Bewegung im Pigmentepithel 268.



- Planconcave Linsen 83.  
 Planconvexe Linsen 83.  
 Polarisationsbüschel von HAININGER 570.  
 Polarisirtes Licht 48.  
 Polyopia monocularis oder monophthalmica 172.  
 Potentielles oder virtuelles Bild 72.  
 Positive Nachbilder 481 ff. 503 ff.  
 Presbyopie 122.  
 Primärer Fixationspunkt 678.  
 Primäres Licht 502.  
 Primärstellung der Blicklinie 619 ff., ihre Auffindung 657 ff., der Blickebene 620. 678. 866.  
 Princip der leichtesten Orientirung 638 ff. 949 f.  
 Principallinie des Farbensystems 466.  
 Prismatisches Spectrum 276 ff.  
 Processus ciliaries 23.  
 Projection der Netzhautbilder 118 f. 739. 756, der subjectiven Erscheinungen 758 ff., stereoskopischer Bilder 812 ff.  
 Projectionstheorie 913.  
 Pseudoskop 791. 793. 830.  
 Pseudoskopische Erscheinungen 773.  
 Psychophysisches Gesetz 387. 740, für die Helligkeiten 387, für die Sterngrößen 388, für die Tiefenwahrnehmungen 873, für die Erkennung der Doppelbilder 893, Grenzen seiner Gültigkeit 388 ff. 402 ff., Verallgemeinerung desselben 446 ff. s. FESCHER'S Gesetz.  
 Punkte, correspondirende oder identische 844. 952, disparate 844.  
 Punkthoropter 862.  
 Pupille, 4. 22. Veränderung bei der Accommodation 130, Photographie derselben 441, ihre Bewegungen entoptisch sichtbar 186 f.  
 Pupillenfläche, Ort derselben 27—30.  
 PURKINJE'SCHE Bildchen bei der Accommodation 132 ff.  
 PURKINJE'SCHES Phänomen 429 ff.  
 Purpur und Purpurroth 278 f. 316.

## Q.

- Quadrate erscheinen im Sehfelde verzogen 397. 684. 706.  
 Qualität der Empfindung 584.  
 Qualitätenkreis 584. 587.  
 Quere Linien 616.  
 Querschnitte des Kopfes 616.

## R.

- Raddrehung des Auges 618 ff., willkürliche 633 ff., ihr Einfluß auf die Orientirung monocular 753 ff., binocular 808 ff., 823 ff.  
 Raddrehungswinkel 619 ff.  
 Baumwinkel (beim Sehen) nach AUERT 261.  
 Reagirende Farbe 538.  
 Reagirendes Licht 502.  
 Realismus 595. 613.  
 Reciprocität der optischen Bilder 206 ff.  
 RECKLINGHAUSEN'S Normalfläche 823 bis 829.  
 Reducirtes Auge 90, seine Dispersion 157. 163.  
 Reducirtes optisches System 82.  
 Reelles Bild 55.  
 Reflexe der Krystalllinse 132 f.  
 Reflexion des Lichtes, regelmäßige und diffuse 51.  
 Reflexionswinkel 53.  
 Refraction des Lichtes 51.  
 Refractions-Ophthalmoskop 227.  
 Refractionszustände des Auges und ihre Anomalien 120 ff.  
 Refractometer von ABBE 99.  
 Regenbogenhaut 4.  
 Reinheit des Spectrums 294.  
 Reiz 231 ff.  
 Reizbarkeit eines Nerven 231 ff., Veränderungen derselben 501 ff., durch elektrische Ströme 243 ff.  
 Reizschwelle, untere 389. 415.  
 Reizung eines Nerven 231 ff., mechanische des Sehnervenapparates 235, des Auges durch Licht 250 ff., elektrische des Auges 243 ff.  
 Reizungsströme der Netzhaut 275.  
 REISS'SCHE Scheiben 223. 227.  
 Relative Accommodationsbreite 123.  
 Reliefbild 806 ff.  
 Resultirende Farbe 538.  
 Retina, s. Netzhaut.  
 Reversionsprisma als Stereoskop 835, im Pseudoskop 831, um willkürliche Raddrehungen hervorzubringen 634.  
 Richtlinien des Blickfeldes 691.  
 Richtkreis 690. 691.  
 Richtung des Sehens 741 ff. 951, scheinbare der verticalen und horizontalen Linien, monocular 752 ff., binocular 808 ff.  
 Richtung und Richtungslinie 91. 742.

Richtungsstrahl 91.  
Ringmuskel der Pupille 24.  
Ruhender Nervenstrom 270.  
Rosenroth 278. 316.

Roth 278.  
Rothblindheit s. dichromatische Farbensysteme.  
Rothwerth 342.

## S.

Sättigung der Farben 321 ff. 457 ff., die größte durch Nachbilder zu erhalten 520.  
Sagittale Linien 616.  
Sagittalschnitte 616.  
Sammellinsen 55. 85.  
Sammelspiegel 65.  
Sanson'sche Bildchen 26, bei der Accommodation 182 ff.  
Santoninwirkung 361.  
Schatten, farbige 551 ff., ihr Einfluß auf Erkennung der Form 773. 792 f. 968.  
Scheibe, chromharmonische 310, stroboskopische 494.  
Scheinbarer Ort im Blickfelde 678, im Sehfelde 679, der subjectiven Erscheinungen 758 ff.  
Scheinbewegungen 746.  
SHEINER'scher Versuch 116. 151. 182. 760, zur Prüfung der Sehweiten 128, zur Farbenmischung 351.  
Schematisches Auge von LISTING 89, von HELMHOLTZ 140.  
Schicht, faserige, der Hornhaut 6 f., innere und äußere granulirte 32.  
Schief auffallende Strahlenbündel 179.  
Schiefe Muskeln, oberer und unterer 43.  
Schielen 953, concomitirendes 845, alterirendes 846.  
Schlagschatten als Mittel die Farben zu erkennen 773. 792 f. 968.  
SCHLEMMER'scher Kanal 8.  
Schlüsse, inductive 578 ff. 602, unbewusste 602.  
Schlufeschwankung des Nervenstromes nach KÜHN 271.  
Schwankung, negative, des Nervenstromes 270.  
Schwankungen der Anschauungsform 777.  
Schwarz als Körperfarbe 322 ff., unterschieden von dem Mangel der Empfindungsfähigkeit 720.  
Schwerpunktsconstruction für Mischfarben 327 ff.  
Schwindel 746.  
Schwingungsdauer 49.  
Sclerotica 4.  
Sehaxe 91.  
Sehfeld 678, horizontaler Meridian in demselben 679, seine äußere Grenze 716, seine Lücken 717, Verschiebung gegen

das Blickfeld 680, 727 ff., seine Ausmessung nach dem Augenmaasse 691 ff.  
Sehfelder, Wettstreit derselben 886. 915—945.  
Sehnenhaut 4—6.  
Sehnerv, seine Eintrittsstelle im Durchschnitt dargestellt 36, seine Reizung bei der Durchschneidung 240, unempfindlich gegen Licht 250.  
Sehnervenapparat 233, seine Erregung durch verschiedene Reize 234, durch mechanische Reizung 235 ff.  
Sehnerveneintritt, im Durchschnitt dargestellt 36, im Augenspiegel sichtbar 227, bei Bewegung sichtbar 238 f. 726 ff., bei elektrischer Reizung 247, gegen Licht unempfindlich 250, Ausfüllung der Lücke 717 ff.  
Sehproben 124.  
Sehpurpur 33. 265 ff.  
Sehraum, Kernfläche desselben 963.  
Sehroth 33. 265 ff.  
Sehschärfe 255 ff., 274. 425 ff., Maß derselben 264. 425.  
Sehsinnssubstanz 233.  
Sehs substanz nach Hering 377. 381.  
Seitenwendungen des Blickes 618.  
Seitenwendungswinkeldes Blickes 618. 655.  
Sensible Nerven 231.  
Simultaner Contrast 538 ff. 542 ff. 939. 940.  
Sinneseindrücke, richtige Deutung derselben 596 ff.  
Sinnesnerven, ihre specifischen Energien 233. 584.  
Sinnestäuschungen 602 ff. 948.  
Specifische Energie der Sinnesnerven 233. 584.  
Spectralfarben, ihre Reihenfolge 278. 288, ihre Brechungsverhältnisse und Wellenlängen 281, Veränderung ihres Aussehens mit der Intensität 284 f. 469 ff., Vergleich mit den Tönen der Scala 288, ihre verschiedene Sättigung 321 f. 457 f.  
Spectrometer 301.  
Spectrophotometer für Farbenmischung 355.  
Spectroskop 301.  
Spectrum, subjectives und objectives 276, prismatisches 276 ff., Helligkeit desselben

- 296—299, theoretische Bedingungen für seine Reinheit 294, seine Hauptfarben 278. 288, Methode der Darstellung 299, Einfluß der Trübung der Gläser 302f., seine Grenzen 279ff., Abweichung vom Interferenzspectrum 281.
- Sphärische Abweichung 57. 169.
- Sphincter pupillae 24.
- Spiegelstereoskop 830.
- Sprache als Beispiel eines erlernten Zeichensystems 596 ff.
- Stäbchen der Netzhaut 31—34. 205.
- Stäbchenschicht der Netzhaut 32, Reflexion des Lichtes darin 205, ihre Empfindlichkeit gegen das Licht 254f.
- Stereomonoskop 836.
- Stereophantaskop 836.
- Stereophoroskop 836.
- Stereoskope 784. 785. 835ff.
- Stereoskopbilder 837—838.
- Stereoskopische Bilder 782. 783, Differenz 814, Parallaxe 783, Projection 812 ff.
- Stereoskopischer Glanz 944.
- Stereoskopisches Mikroskop 832—834.
- Stereotrope 836.
- Sterne, Größenklassen derselben 387 f.
- Strahlen, überrothe 282, überviolette 283.
- Strahlenbündel, astigmatische 174, homocentrische 289 ff., schief auffallende 179.
- Strahlige Form kleiner Lichtbilder 170 ff.
- Strecken, correspondirende 897.
- Stroboskopische Erscheinungen 500, Scheiben 494.
- Subjective Lichterscheinungen 235 ff. 566ff., ihre Localisation 758 ff., s. auch Nachbild und Contrast.
- Subjectives Spectrum 276.
- Substantia propria corneae 6.
- Substanz (Definition) 591.
- Successiver Contrast 538 ff. 939. 940.
- System, centrirtes 55.

## T.

- Tachistoskop 710. 891.
- Täuschung über Neigung des Kopfes 762f., über Convergenz 800f., über Richtung binocularer Linien 808 ff., binocularer Kreise 811 f., mathematische Theorie beider 823 ff., des Augenmaasses 705 ff., über Farben s. Nachbild und Contrast.
- Tapetenbilder 798—800.
- Tapetum der Thieraugen 206. 228.
- Telestereoskop 793. 831, Theorie desselben 822—823.
- Tensor chorioideae 23, Wirkung bei der Accommodation 136 ff.
- Thaumatrope 493.
- Theorie, empiristische, der Sinneswahrnehmungen 608. 613, nativistische der Sinneswahrnehmungen 609 f. 613. 955.
- Thränenkanälchen 44.
- Thränenpunkte 44.
- Tiefendimensionen, Genauigkeit der Wahrnehmung 787 ff. 867 ff., Einfluß der Bewegung 889 ff., in Nachbildern 891 ff.
- Theorie derselben nach PANUM und HERING 957. 960 ff., des Gesichtsfeldes 766 ff., beurtheilt nach der scheinbaren Größe 767, nach der Deckung der Objecte 768, nach der perspectivischen Form 769, nach den Schlagschatten 773, binocular 781 ff.
- Tiefenwerthe HERING's 964.
- Totales Brechungsvermögen der Krystalllinse 102. 106.
- Tractus optici 42.
- Transcendental 584.
- Transversale Linien 616.
- Trichromatische Farbensysteme 357 f. 369 f. 456 ff.
- Trochlea 43.
- Trübung der Augenmedien 178, des Glases und der Luft, Einfluß auf das Spectrum 902f.

## U.

- Ueberrothe Strahlen 282.
- Ueberviolette Strahlen 283.
- Ultraviolette Licht 279f., dringt zur Netzhaut 283f., Farbenton 285, Beobachtungsweise 303 ff., gebraucht, um die Krystalllinse sichtbar zu machen 306.
- Umkehrung des Relief 770.
- Unbewußte Schlüsse 602.
- Unbewußte Seelenvorgänge 962.
- Undulationstheorie (des Lichtes) 48 ff.
- Unendlich dünne brechende Schicht ist einzuschalten erlaubt 81.
- Ungleichnamige Doppelbilder 843.
- Universal-Vibrations-Photometer 477.
- Unterer gerader Muskel 43.
- Untere Reizschwellen 415.
- Unterer schiefer Muskel 43.
- Unterscheidung der Bilder beider Augen 756. 893.

- Unterschiedsempfindlichkeit 385 ff.  
391.  
Unterschiedsschwelle 390, verschiedener Farben 402 ff.  
Urfarben 456. 1008.
- Urphänomen von GÖTTE 306.  
Ursache (Definition) 592.  
Urvalenzen 379. 381.  
Uvea, anatomische Beschreibung 4. 22 ff.

## V.

- Vasa vorticiosa 24.  
Vena centralis, Ort und Dicke derselben 197.  
Venae ciliares 24.  
Vereinigungspunkte, conjugirte 55. 64.  
Vergrößerung durch kleine Oeffnungen 118 f., im Augenspiegel 217 f.  
Verticale Linien 616.  
Verticale stereoskopische Differenzen 803 f.  
Verticaler scheinbarer Meridian, Aequatorialaxe desselben 857.  
Verticalhoropter 864. 909.  
Violett 279.
- Violette Gläser zur Prüfung der Dispersion 158.  
Violettblindheit 361.  
Violettsehen nach Santoningenuss 361.  
Violettwerth 342.  
Virtuelles oder potentielles Bild 55. 72.  
Visirebene 617.  
Visirlinie 115. 127. 617. 672.  
Visirlinien, Kreuzungspunkt derselben 727. 729, correspondirende 898.  
Vordere Augenkammer 39.  
Vorstellung 609. 947, Art ihrer Wahrheit 583 ff.

## W.

- Wässerige Feuchtigkeit 4. 39.  
Wärme strahlende, Unterschied vom Licht 235, dunkle 281, Grund ihrer Unsichtbarkeit 282 f.  
Wahrheit der Vorstellungen 583 ff.  
Wahrnehmung 576 ff. 947, aus Empfindung und Erfahrung combinirt 608 ff., der relativen Richtung 670 ff., der absoluten Richtung 741 f., der Tiefendimension 766 ff.  
Wahrnehmungstheorie, empiristische 608 f. 613, nativistische 609 f. 613. 955.  
Warme Farbe 366.  
Wasserblau 279.
- Wasserhaut 7.  
Weiß 316. 322. Mischungen damit 470 f.  
Weitsichtigkeit 122.  
Wellenfläche 50.  
Wellenlänge 49, der FRAUNHOFER'schen Linien 287, der sichtbaren Grenzen des Spectrums 282 f.  
Wettstreit der Sehfelder 886. 915—945. 954, der Contouren 916, der Farben 924 ff.  
Willkür der Augenbewegungen 628 ff.  
Wimpern 44.  
Winkel, correspondirende 897.  
Wirklichkeit 592.  
Wolken, phosphorescirende 472.

## Z.

- Zahlen, benannte 335.  
Zahlenwinkel (beim Sehen) nach AUBERT 261.  
ZANTEDESCHI's Linien 298.  
Zapfen der Netzhaut 31—34. 205, sind gegen Licht empfindlich 254 f., als räumliche Elemente des Sehens 256 f.  
Zapfenfaser 33.  
Zapfenkorn 33.  
Zapfenzählung 260.  
Zeitige atrophe Linie 650.  
Zerrbilder, anorthoskopische 749.
- Zerrung am Auge giebt Scheinbewegung 748.  
Zerstreuungsbilder 112 ff.  
Zerstreuungsgläser 55.  
Zerstreuungskreise 161, ihre Größe berechnet 125 ff., ihre farbigen Ränder 159, ihre Helligkeit 164 ff., ihre sternförmige Figur 170.  
Zerstreuungslinsen 85.  
Zerstreuungsspiegel 65.  
Zonula Zinnii 4. 31. 41. 136.  
Zwischenstrecken im Spectrum 320.

# Namen-Register.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

## A.

- ABAT, Optische Täuschung 840.  
ABBE, Refractometer 99.  
ABNEY, Messung der Wellenlänge der äußersten ultrarothten Strahlen 282. 288.  
ADAMS, G., Augenmodell 129.  
ADAMÜCK, Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 29; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
AEPINUS, Schatten der Iris 201; Nachbilder 537.  
AGUILONIUS, Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840; Horopter 913.  
AIMÉE, Polyopia monophthalmica 182.  
AIRY, G. B., Astigmatismus 183; gegen BREWSTERS Farbentheorie 308.  
ALBERT, E., Grenzen des Farbmischungsgesetzes 376.  
ALBERT, Photometer 474.  
D'ALEMBERT, J. L., Farbenzerstreuung im Auge 168; Richtung des Sehens 765.  
ALHAZEN, Gestalt des Himmelsgewölbes 838.  
D'ALMEIDA, J. C., Stereoskopie 835.  
ANGELUCCI, Bewegung der Pigmentkörnerchen unter dem Lichteinfluss 268.  
ANSCHÜTZ, O., Momentphotographien 495.  
APPEL, Augenmaafs 684.  
APPIA, Entoptische Erscheinungen 201.  
ARAGO, Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 386. 478; Photometer 475.  
D'ARCY, Dauer des Lichteindrucks 501.  
ARISTOTELIS, Theorie der Gesichtsempfindung 248; Druckbilder 249; Entstehung der Farben 306.  
ARMATUS, S. (Salvino degli Armati), Erfindung der Brillen 130.  
ARNOLD, Theorie der Accommodation 156.  
AUBERT, Kugelgestalt des mittleren Theiles der Hornhaut 20; Perimeter 88; Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99; Eigenschaft der Netzhaut 242—243; elektrische Reizung des Auges 245; Genauigkeit des peripheren Sehens 257. 260—263. 703; Farbenblindheit der Netzhautperipherie 373. 740; Farben kleiner Felder 374; Episkotister 417. 477; Nachbilder des elektrischen Funkens 504. 505; Dauer der Nachbilder 516; farbiges Abklingen der Nachbilder 522. 528. 530; Nachbilder 535. 537; Orientirung bei geneigtem Kopfe 644. 766; Ausfüllung des blinden Flecks 719; Täuschungen des Augenmaafses 741; Gesichtstäuschung 762; Unveränderlichkeit des stereoskopischen Reliefs 893.  
AUGUST, Tiefenwahrnehmung bei momentaner Beleuchtung 915.

## B.

- BABBAGE, Augenleuchten und Augenspiegel 229.  
BABINET, Photometer 476; psychophysisches Gesetz, angewendet auf die Sternklassen 388. 477.  
BABO, Mikrostereoskopie 838.  
BACO, ROGER, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774. 839.  
BACO VON VERULAM, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248.  
BAHR, C. R., Accommodationsvorgang 138 bis 139.

- BARTELS, Knotenpunkt des Auges und Kreuzungspunkt der Visirlinien 111; Projektionen im Sehfeld 739. 765.
- BAUDRIMONT, Diffractionerscheinungen des Auges 183.
- BAUM, Bestimmung des Linienhoropters 867.
- BECK, Stereoskop 836.
- BECKER, O., Anatomie der Krystalllinse 39; Liniensysteme zur Erkennung des Astigmatismus 176; Vereinigung stereoskopischer Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800.
- BECQUEREL, Brechungsverhältnisse der Augenmedien 96.
- BEER, Diffractionerscheinungen im Auge 180. 183; Photometer 476; Nachbilder 537.
- BEGUELIN, NIC. DE, Farbige Schatten 565.
- BEHR, Augenleuchten 229.
- BERGMANN, Grenze der Sehschärfe (Wellenfigur) 258. 259. 275; radiäre Fasern im gelben Fleck 571; Verschmelzung von Doppelbildern 958.
- BERKELEY, Theorie der Gesichtswahrnehmungen 612. 738; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839.
- BERNARD, Gegen BREWSTER's Farbentheorie 305—308; Photometer 475.
- BERNOULLI, D., Messung und Form des blinden Flecks 273.
- BERNSTEIN, Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801.
- BERTHOLD, Raddrehung des Auges 625. 660; Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801.
- BESIO, Theorie der Accommodation 151.
- BESSEL, F. W., Messung der Sternparallaxe 15; Theorie der optischen Systeme 111; Irradiation 479.
- BEZOLD, W. v., Farbenzerstreuung des Auges 162; Verschwinden der Uebergangsfarben im Spectrum 469; Farbmischungen mit Weiß 470; Trennung correspondirender Bilder 888. 915.
- BLDLOO, Theorie der Accommodation 153.
- BILLET SELIS siehe unter S.
- BOIT, Irradiation 479.
- BLOND, Ordnung des Farbensystems 383.
- DERHAVE, Theorie der Accommodation 155.
- BOIS-REYMOND, CL., Grenze der Sehschärfe 260; Photographie der Iris 441.
- BOIS-REYMOND, E., Elektrische Reizung des Auges 246; Nervenstrom 269. 270; elektromotorische Wirksamkeit des Muskels 272; flatternde Herzen 534.
- BOIS-REYMOND, P., Beobachtungen über den blinden Fleck 252. 274; Ausfüllung des blinden Flecks 741.
- LL, FR., Anzahl der Zapfen und Stäbchen, welche je einer Pigmentzelle entsprechen 4; Sehroth 265; Bewegung von Pigmentkörnern im Pigmentepithel der Netzhaut 268.
- BONACURSUS, Nachbilder 536.
- BONNET, Theorie der Accommodation 156.
- BOUGUER, P., Die kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Photometrie 416. 473; farbige Schatten 565; Größenschätzung 340.
- BOWMANN, Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39.
- BOYLE, Nachbilder 536.
- BRANDES, Irradiation 479; Contrasterscheinungen 566. 1008.
- BRAVAIS, Täuschung des Augenmaasses 706.
- BREWSTER, D., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 95. 98. 111; Theorie der Accommodation 153; Theorie der entoptischen Wahrnehmungen 200—201; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274; Farbentheorie 304—305. 308. 312. 334. 380; Photometrie 475; flatternde Herzen 534; Nachbilder 536. 537; Polarisationsbüschel 570. 572; Umkehrung des Reliefs 773; Stereoskopie 785. 830. 835. 837. 840. 841; Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 791; Beobachtung an Tapetenbildern 798; Pseudoskop 830; stereoskopischer Glanz 945.
- BREYSIG, J. A., Theorie der Reliefperspective 807. 817. 818.
- BROCKEDON, Nachbilder 537.
- BRODHUN, Grünblindheit 367; Leukoskop 368; Grenzen von NEWTON's Farbmischungsgesetz 375. 473; Messungen von Unterschiedsschwellen 392. 402—408. 414. 415. 439. 446. 449 ff.; untere Reizschwellen 415; Episkotister 493; Verbesserung des BUNSEN'schen Photometers 419—422; Contrastphotometer 423; Vertheilung der Helligkeit im Spectrum 426; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 429—433.
- BROWN, A., Altes Stereoskopbild 840.
- BRÜCKE, E., Messung des Augapfels 8. 10; Wirkung des Ciliarmuskels 23; Größeverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Epithelium der Linsenkapsel 38; Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39; Zonula Zinnii 41; Theorie der Accommodation 150; Astigmatismus 181; Reflexion des Lichtes in den stabförmigen Körperchen der Netzhaut 205; Augenleuchten 229; Bewegung von Pigmentkörnern 268; Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen 283. 284; Photometer 422; Verschwinden der Uebergangsfarben 469; Nachbilder 524. 527. 533. 535. 537; flatternde Herzen 534; inducirte und inducirende Farbe 538; gleichartige In-

- duction 1008; Beurtheilung der objectiven Farbe 562; seitlicher Fensterversuch 943; binoculare Farbmischung 926; Einfluss der Augenbewegungen auf die Tiefenwahrnehmungen 740. 889—890. 915. 956; binocularer Contrast 945.
- BUFFON, G. L. L., Theorie der Accommodation 155; Nachbilder 536; farbige Schatten 565.
- BUNSEN, R., Fettfleckphotometer 418. 473.
- BURCHARDT, M., Sehproben 124.
- BURCKHARDT, Vereinigung stereoskopischer Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800; Horopter 914.
- BURROW, A., Anhaften der Glashaut an der Netzhaut 40; Lage der Knotenpunkte im Auge 108; Bestimmung des Kreuzungspunktes der Richtungslinien 111; Theorie der Accommodation 152. 158; Wahrnehmung der Netzhautgefäße und Netzhautgrube 195; entoptische Erscheinung des gelben Flecks 202; Raddrehung des Auges 668; Drehpunkt des Auges 668.
- BUSOLT, Farbenkreisel 498. 501.

## C.

- CAHOURE, Brechungsverhältnisse der Augenmedien 96.
- CAMPBELL, Theorie des Sehens, Leugnung des Netzhautbildes 110.
- CAMPER, P., Theorie der Accommodation 154.
- CARDANUS, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit 249.
- CARION, STELLWAG VON, siehe unter S.
- CARTER, Perimeter 88.
- CARTESIUS, Theorie der Accommodation 154; Entstehung der Farben 308; Theorie der Irradiation 479; Gesichtswahrnehmungen 612; Aufrechtsehen 765; Tiefenwahrnehmung 889.
- CARY, Astigmatismus 183.
- CASTEL, Farbenklavier 309. 310.
- LE CAT, Entoptischer Versuch 201; Berechnung der Größe des blinden Flecks 273; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274.
- CAUCHY, Theoretische Dispersionsformel 281.
- CAVALLO, Dauer des Lichteindrucks 501.
- CHALLIS, J., Astigmatismus 183; Methode der Farbmischung 351.
- CHESELDEN, Beobachtungen an Blindgeborenen 731 ff.
- CHEVREUL, E., Vergleich von Farben und Tönen 311; simultaner und successiver Contrast 538; Contrastversuche 541. 1008.
- CHIMENTI, Altes Stereoskopbild 840.
- CHOSSEAT, Brechungsverhältnisse der Augenmedien 95. 98.
- CIMA, Absorption der dunklen Wärmestrahlen im Auge 283.
- CLARKE, C., Stereoskop 836.
- CLASSEN, Empiristische Theorie der Raumanschauung 613. 947. 971.
- CLAUDET, Verbesserung des Linsenstereoskops 829; Stereomonoskop 836; stereoskopische Bilder 838.
- CLAVEL, Theorie der Accommodation 156.
- COCCIIUS, A., Construction eines Ophthalmometers 20; Reflex an der Netzhautgrube 87; Augenspiegel 220. 226. 227; Beobachtung des Augengrundes 228; Beobachtungen über den blinden Fleck 252; Ansicht über die Unempfindlichkeit des blinden Flecks 274.
- COHN, Augenspiegel 227.
- CONRADI, Theorie der Accommodation 153.
- CORNELIUS, Raumanschauung 613.
- CORNU, Messungen der Wellenlänge ultravioletter Strahlen 288—289.
- CÔTE D'OR, PIEUR DE LA, siehe unter P.
- COURTIVRON, Sehschärfe 274.
- CRAHAY, Theorie der Accommodation 150.
- CRAMER, A., Berührung von Iris und Linse 30; Accommodationsmechanismus 134. 138. 139. 141. 148. 150. 153; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 154—155; Erklärung der Irradiation 480.
- CRANMORE, Polyopia monophthalmica 182.
- CUMMING, W., Augenleuchten 229.
- CZERMAK, J., Orthoskop 25; Faserverlauf in der Linse 39; Accommodationallinie 114; Anschwellung der Ciliarfortsätze bei der Accommodation 148; mechanische Reizungen der Netzhaut 239. 240; Farbmischung durch SCHWEINER's Versuch 351; Theorie der Sinneswahrnehmungen (Analogie mit dem Tastsinn) 740; Beurtheilung der Richtung des Sehens 745; Einfluss der Accommodationallinie auf die Wahrnehmung der Tiefendimension 766; Stereophoroskop 836.
- CZERNT, Bewegung von Pigmentkörnchen 268.

## D.

- DAGUERRE, Lichtbilder 477.
- DALTON, J., Farbenblindheit 859—860.
- DANCER, J. B., Stroboskopischer Apparat 496.
- DARWIN, E., Nachbilder 536.
- DASTICH, Raddrehung des Auges 626; Beurtheilung horizontaler und verticaler

- Richtungen 754; Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801; Lage der Netzhauthorizonte und scheinbar verticaler Decklinien 849—851. 960.
- DAVY, M., Sehschärfe 275; chemische Untersuchungen über Farbenmischungen 882.
- DECHALES, Theorie der fliegenden Mücken 201.
- DELAMBER, Bestreitung der Irradiation 479.
- DEMOKRIT, Theorie der Gesichtsempfindung 248.
- DESAGULIERS, Entfernungstäuschungen 839.
- DESCARTES, siehe CARTESIUS.
- DEWAR, Reizungsströme der Netzhaut 275.
- DIETERICH, C., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318. 319; Farbenmischungsversuche 320. 356; Construction einer Farbentafel 340; spectrale Vertheilung der Elementarempfindungen bei normalen und anomalen trichromatischen Augen 357—359; bei dichromatischen Augen 367; Erklärung der Dichromasie 368. 458. 461; Vertheilung und Wahl der Grundempfindungen im Spectrum 370. 432. 1008.
- DINGL, J., Binocularer Wettstreit der Farben 925.
- DOIJER, Drehpunkt des Auges 615. 668.
- DOLLOND, J., Farbenzerstreuung im Auge 168.
- DE DOMINIS, M. A., Farbentheorie 306.
- DONCAN, A., Verschiedene Formen der fliegenden Mücken 189; Bestimmung des Ortes entoptisch gesehener Objecte 200 bis 201.
- DONDERS, Ergebnisse von Messungen der Krümmung und Dimensionen der Hornhaut 19—20; Construction einer Spiegelvorkehrung für das Ophthalmometer 20—21; Wirkung des Ciliarmuskels 23; Cornealmikroskop 29; Gefäße der Netzhaut 37; Netzhautgrube ist Fixationspunkt 87; Verschiedenheiten des Refractionszustandes 119—122; Maas der Accommodationsbreite 121; die verschiedenen Accommodationsbreiten 123; Bestimmung des Nähepunktes 123; Unveränderlichkeit des Augapfels bei der Accommodation 138; Folge des Drucks auf den Augapfel 149; Theorie der Accommodation 152; Methode zur Beobachtung der Beschaffenheit der Linse 155; Einfluß der Krystalllinse auf die Form der Zerstreuungskreise 178; regulärer und irregulärer Astigmatismus 173; Astigmatismus 177. 183; verschiedene Formen der fliegenden Mücken 189; Bestimmung des Ortes entoptisch gesehener Objecte 200—201; Schwarze Farbe der Pupille von Albinos 203; Augenspiegel 226. 228; Beobachtung des Augenhintergrundes 228; Veränderung der Netzhautgefäße durch Druck 238; Identität des blinden Flecks mit der Eintrittsstelle des Sehnerven 251. 254; Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen 283. 284; Farbentheorie 344; anomale trichromatische Augen 359; warme und kalte Farben 366; Drehpunkt des Auges 615. 656 ff. 668; Raddrehung des Auges 619; verschiedene Erhebung beider Augen 632; Einfluß der Convergenz auf Raddrehungen des Auges 665; Raddrehung des Auges bei Kopfneigung 668—669; Stereoskopie durch Brillengläser 822; Beobachtungen an Schielenden 847; Unveränderlichkeit des stereoskopischen Reliefs 893; Untersuchungen über stereoskopische Bilder 952; empiristische Theorie der Raumwahrnehmung 971.
- DOR, Perimeter 88.
- DOVE, Methode der Farbenmischung 351; wechselndes Helligkeitsverhältniß der Farben (PURKINJE'S Phänomen) 429. 471. 478; Beobachtungen an Nachbildern 482; Beobachtungen an rotirenden Polarisationsapparaten 485; Versuche mit flimmernden rotirenden Scheiben 533; subjective Farben 537. 1008; Täuschung betreffs des Ortes optischer Bilder 769; Größentäuschung 780; Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 788; stereoskopischer Versuch 830. 831; Stereoskop 835; Stereoskopie bei momentaner Beleuchtung 890. 915; binoculare Farbenmischung 926. 927; Ursache des Glanzes 934. 944. 945.
- DRAPER, Gegen BREWSTER'S Farbentheorie 308; Lichtemission 472.
- DROBISCH, Vergleichung der Farben- und Tonskala 309. 311.
- DUBOSCQ, J., Stereoskopie 835. 836.
- DÜKE'S, Theorie der Accommodation 152.
- DUNN, Scheinbare Gestalt des Himmels gewölbes 839.
- DÜWE, Photometrie 475.

## E.

- EBBINGHAUS, H., Messungen von Helligkeitsstufen 392.
- EERNBOOTH, Centrirung des Auges 108.
- EISENLOHR, FR., Grenze des Ultraroth 282.
- ELLIOT, Stereoskopie 835. 840.
- EMPEDOKLES, Theorie der Gesichtsempfindung 248.
- ENSMANN, Verschmelzung von Lichtein-



drücken 488; stroboskopische Erscheinungen 500. 501.  
 ENGEL, J., Theorie der Accommodation 150.  
 ENGELMANN, TH. W., Absorption der ultrarother Strahlen im Auge 283.  
 ENGLEFIELD, Theorie der Accommodation 152.  
 EPIKUR, Theorie der Gesichtsempfindung 248; Irradiationserscheinungen 478.  
 EPKENS, Augenspiegel 226.  
 ERBACH, v., Erklärung von HÄDINGER's Polarisationbüschel 572.

ESMER, Augenleuchten 229.  
 EUKLID, Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840.  
 EULER, L., Farbenzerstreuung im Auge 168; die Farben nach der Undulationstheorie 308; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839.  
 EXNER, S., Zeitlicher Verlauf der Lichtwirkung 513.

## F.

FARADAY, Magnetische Drehung der Polarisationssebene 207; Erfindung des Phänakistokops 494; stroboskopische Erscheinungen 500.  
 DU FAY, Ordnung des Farbensystems 383.  
 FAYE, Stereoskopie 835.  
 FECHNER, Kleinste Helligkeitsunterschiede 386; psychophysisches Gesetz 387. 740; Vergleichung der Größenklasse der Sterne mit ihrer objectiven Lichtmenge 388; farbiges Abklingen der Nachbilder 521. 523. 528—530; Abweichung vom psychophysischen Gesetz bei sehr kleinen und sehr grossen Helligkeiten 388—390; Intensität des Eigenlichtes der Netzhaut 389; Definition der Reizschwelle und Unterschiedesschwelle 389. 390; Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 478; Irradiation 480; Theorie der Nachbilder 510. 534. 535. 537; Nachbild der Sonne 526; complementär gefärbte Nachbilder 527; Contrast 557; farbige Schatten 566; Contrastfarben 566. 1008; Augenmaass 682; das Augenmaass und das psychophysische Gesetz 683; Täuschung des Augenmaasses 706; disparate Punkte 844; binocularer Wettstreit der Farben 925; binocularer Contrast 936. 945; sog. paradoxer Versuch 941; seitlicher Fensterversuch 943. 944.  
 FICHTE, J. G., Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248; Qualitätskreise der Empfindungen 584; Nicht-Ich 592; Subjectivismus 595. 612.  
 FICK, L., Bedeutung der Ciliarfortsätze für die Accommodation 148; Aufrechtsehen 765.  
 FICK, A., Zerstreuungskreise im Auge 172; Betrag des Astigmatismus seiner Augen 175. 183; Polyopia monophthalmica 182; blinder Fleck 252. 274. 741; Irradiation 397. 398. 480; Richtung der Blicklinie 618; Princip für die Augenbewegungen

643—644; Longitudo und Latitudo 655; Prüfung des Drehungsgesetzes mittels des blinden Flecks 660 ff.; Drehungsaxen für die Augenmuskeln 665; Drehungsgesetz der Augen 669; Vergleichung horizontaler und verticaler Distanzen 741; empiristische Theorie der Raumwahrnehmung 971.  
 FISCHER, E. G., Astigmatismus 183; Farbenkreisel 501.  
 FLEISCHER, J., Farbentheorie 306.  
 FLEISCHER, S., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99.  
 FLIEDNER, C., Polyopia monophthalmica 182; Erklärung der Irradiation 480.  
 FÖRSTER, Perimeter 88; Veränderung des Augapfels bei der Accommodation 138; periphere Sehschärfe 257. 260—263; Sehschärfe 703.  
 FORBES, J. D., Annahme über das mittlere Brechungsverhältniss der Krystalllinse 110; Theorie der Accommodation 150. 154; Farbenzerstreuung im Auge 169; Ordnung des Farbensystems 383.  
 FRANKLIN, B., Elektrische Reizung des Auges 244.  
 FRANZ, R., Absorption der ultrarother Strahlen im Auge 283.  
 FRAUNHOFER, Achromasie des Auges 156 bis 157; Farbenzerstreuung im Auge 169; Bezeichnung der Spectrallinien 277; heterochrome photometrische Messungen 478.  
 FRESNEL, Interferenzprincip 308.  
 FREY, M. v., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318.  
 FRIES, Theorie der Accommodation 153.  
 FRISCH, Pigmentkörnchen der Netzhaut 34.  
 FUNKE, Augenmaass in der Nähe des blinden Flecks 723; Ausfüllung des blinden Flecks 741; binocularer Wettstreit der Farben 925. 926; Farbentheorie 306.

G.

- GALENUS, Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.
- GALILEI, Erklärung der Irradiation 479
- GALL, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.
- GASSENDI, Erklärung der Irradiation 479; scheinbare Größe des Mondes 839; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.
- GAUSS, Theorie der optischen Systeme 110—111; additive Verknüpfung nicht homogener Größen 835.
- VAN GENDEREN STORT, Zusammenziehung der Innenglieder der Zapfen unter Lichtwirkung 269.
- LE GENTIL, Erklärung der Irradiation 479.
- GERGONNE, Nachbilder 537.
- GERLING, C. L., Demonstration des Netzhautbildes 86; Theorie der Accommodation 150.
- GIRAUD-TEULON, Sehproben 124.
- GMELIN, Umkehrung des Reliefs 840.
- GODART, Nachbilder 536.
- GOETHE, Wahrnehmung von Phantasmen 242; Verhältniß der Empfindung zur Wahrnehmung 249; Farbentheorie 306 bis 307; Erkennung der Componenten in zusammengesetztem Licht 312; Begriff des Weiße 323; Zusammensetzung der Farben 380; Nachbilder 537; farbige Schatten 566; indirectes Sehen 923.
- GOUYE, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.
- GRAEFE, ALBR. v., Optometer 129; Bedeutung der Iris für die Accommodation 138; Schielen 744. 766. 847.
- GRAEFE, ALFR., Schielen 744. 847.
- GRAEFE, K. F. v., Theorie der Accommodation 154.
- GRANT, Beobachtungen an Blindgeborenen 738.
- GRASSMANN, H., Principien von NEWTON's Farbenmischungsgesetz 326—330. 383; Begriff der Addition 335. 337; Widerspruch mit HERING's Farbentheorie 380. 381; continuirliche Farbenreihe 596.
- GRIFFIN, Genaue Bestimmung des blinden Flecks 253.
- GRIMM, v., Theorie der Accommodation 156.
- GROTTHUSS, Farbige Schatten 566.
- GROVE, Nachbilder 537.
- GRUTHUISEN, F., Augenleuchten 229.
- GUDDEN, J., Theorie der entoptischen Erscheinungen 202.
- GUÉRARD, Polyopia monophthalmica 182.
- GUERICKE, O. v., Farbige Schatten 565.
- GUT, Theorie der Polyopia monophthalmica 183.

H.

- HAAN, VROESOM DE, Genauigkeit des Sehens 264.
- HAESLER, J. F., Theorie der Accommodation 155.
- HAIDINGER, LOEWE'scher Ring 567. 568; Polarisationsbüschel 570—572; subjective Andreaskreuzfiguren 572.
- HALDAT, C. N. A. DE, Theorie der Accommodation 150; binoculare Farbenmischung 945.
- HALL, Theorie der Accommodation 151.
- HALLER, A. v., Augenmodell 129; Theorie der Accommodation 151; Lehre von der Reizbarkeit der Nerven 249; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.
- HALSKE, J. G., Bewegliche stereoskopische Bilder 838. 869.
- HAMILTON, Astigmatismus 183; Lehre von den Quaternions 335.
- HANKEL, Horopterproblem 915.
- HANNOVER, Bau des Glaskörpers 40; Theorie der Accommodation 153; genaue Bestimmung des blinden Flecks 253. 274.
- HARDIE, Telestereoskopie 836.
- HARTLEY, Die Farben nach der Undulationstheorie und die Farben dünner Blättchen 308; Vergleichung von Farben und Tönen 309. 310; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.
- HASSENFRATZ, J. H., Polyopia monophthalmica 182; Irradiation 479.
- HASSENSTEIN, Augenleuchten 229.
- HAUSER, CASPAR, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit 249.
- HAY, D. R., Ordnung des Farbensystems 383.
- HEGEL, Auffassung der Naturerscheinungen 307; Realität der Welt 595; Idealismus 612.
- HEGELMAYER, Augenmaße 683. 741.
- HEINEKEN, Astigmatismus 183.
- HELMHOLTZ, H. v., Construction und Theorie des Ophthalmometers 10—17; Ellipticität der Hornhaut 17—18; Begrenzung und Orientirung der Hornhaut 19; Berührung von Iris und Linse 25—26; Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 27—29; Aenderung der Divergenz

der Strahlen 64; die Theorie der centrirten optischen Systeme mit Hilfe des Convergenzgesetzes der Strahlen entwickelt 70—81; Netzhautbild mit dem Augenspiegel zu untersuchen 86. 228; seine Aenderung bei der Accommodation beobachtet 115. 228; Brennweite der Hornhaut 93; Brennweite einer geschichteten Linse 94; Brechungsindices menschlicher Augenmedien 98; Bestimmung der Cardinalpunkte todter Krystallinsen 99—102; Form und Brennweite der Krystalllinse an lebenden Augen 102. 105; Brechungsverhältniß der Linse des Auges 106; Vortreten des Pupillarrandes bei der Accommodation 131. 141—142; Rückbewegung des Ansatzes der Iris 134; Mechanismus der Accommodation 136—138. 154; schematisches Auge 140; unvollkommene Centrirung des Auges 109; Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Aenderung der Linsenflächen bei der Accommodation 142—146; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 155; Achromasie des Auges 157—158; Astigmatismus 175. 177. 181; Helligkeit der Zerstreuungsebene berechnet 164—168; sternförmiger Zerstreuungskreis des eigenen Auges 170; diffuses Licht in den Augenmedien 178; Berechnung der Diffraction an der Pupille 180—181; Bewegung der entoptischen Objecte 191; Wahrnehmung der Netzhautgefäße und Netzhautgrube 195; Wahrnehmung des Blutlaufs in der Netzhaut 198—199; Construction eines Augenspiegels 223. 230; Theorie des Augenspiegels 206—219; Wahrnehmung von Druckbildern 236—238; mechanische Reizungen der Netzhaut 239. 240; Wahrnehmung von Phantasmen 242; elektrische Reizung des Auges 245. 246; elektrische Reizung einzelner Theile der Netzhaut 246; Form und Größe des eigenen blinden Flecks 252. 253. 274; Grenze der Sehschärfe (Wellenfigur) 256—259; Anordnung der Sehnervenfasern 264; Untersuchung der Fluorescenz der Netzhaut 285. 286; Festsetzung der Farbenbezeichnungen 278; Messung der Wellenlänge der äußersten rothen Strahlen 282; Theorie prismatischer Bilder 289; Herstellung ganz reiner Spectralfarben 303; gegen BREWSTER's Farbentheorie 305. 308; Vergleichung von Farben und Tönen 310. 311; Theorie der Mischung von Pigmentfarben 313—315; Wellenlängen complementärer Farbenpaare 316—317; Farbentafel 332; Begriff der Addition

335; Definition einer bestimmten Farbe 339. 340; Empfindungselemente 341—344; Zusätze zur YOUNG'schen Farbentheorie 349—350; Methoden der Mischung von Spectralfarben 351—357; Spectrophotometer (Farbenmischapparat) 356; Untersuchungen an einem Rothblinden 365; Theorie der Anomalien des Farbensehens 369; Farbenmischungsversuche 383; YOUNG's Farbentheorie 383; Messungen von Unterschiedsschwellen 391; Helligkeitsstufen in der Malerei 393; Klarheit (Definition) 394; Einwände gegen die Erklärung der Irradiation durch Mitempfindung 401; Theorie über die Größe der Unterschiedsschwellen 409—414; Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede 415; Mischungsversuche mit Spectralfarben 432; Vergleichung der Helligkeit wenig unterschiedener Farben 434 ff.; Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit 444 ff.; Ableitung der drei Grundfarben aus FECHNER's Gesetzes 449 ff.; Erklärung der Dichromasie und Verallgemeinerung ihrer Theorie 458 ff. 1007; Helligkeitsunterschiede und Farbenunterschiede 462. 1008; kürzeste Farbenlinien 463 ff.; verschiedene relative Helligkeit der Spectralfarben 478; Erklärung der Irradiation 480; Prüfung des TALBOT'schen Gesetzes 483. 484; Methode zur Beobachtung positiver Nachbilder 501 ff.; Lichtstärke negativer Nachbilder mit dem psychophysischen Gesetz in Beziehung gebracht 508—509; positive Nachbilder mittels elektrischer Reizung negativ gemacht 509. 510; Wechsel zwischen positiven und negativen Nachbildern 510. 511; Sättigung der Spectralfarben an Nachbildern geprüft 517 ff.; Nachbild der Sonnenscheibe 524 ff.; farbiges Abklingen der Nachbilder 526—532; Theorie der Nachbilder 534—536; Theorie des simultanen Contrastes 542—543. 549—551; Kritik der Fälle, wo die reagirende Farbe der inducirenden gleichnamig ist 553—557; Einfluß einer scheinbar vorhandenen farbigen Decke oder Beleuchtung auf den Contrast 558 ff.; Erklärung der Contrasterscheinungen 564—565. 1008; Erklärung der Polarisationsbüschel 570 ff.; Uebereinstimmung zwischen Vorstellung und Object 583 ff.; Modalität und Qualität der Sinnesempfindungen 584; Eigenschaften der Objecte der Aussenwelt 588 ff.; Begriff, Gesetz, Substanz 591; Ursache, Kraft 592; Beurtheilung des Idealismus und Realismus 594 ff.; Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinnesindrücke 596 ff.; die Erlernung der Sprache als Zeichensystem

597; Falsche Inductionen und Sinnestäuschungen 602 ff.; Aufmerksamkeit 604 ff.; Empirie der geometrischen Axiome 613; empiristische Theorie der Raumansehung 608. 613; Gesetz der Augenbewegungen geprüft 620—625. 657—661; Einfluss der Convergenz auf die Augenbewegungen 626; die Combinationen der Bewegungen beider Augen mit einander und mit der der Accommodation sind der Willkür unterworfen 629—633; Hypothese über den Ursprung des Gesetzes der Augenbewegungen 636—642; geometrische Darstellung des LISTING'schen Gesetzes 645—656; das flächenhafte Sehfeld 670—682. 688—690; Augenmaafs für die Geradheit von Linien 686; die scheinbar geraden Linien 689—701; Contrast beim Augenmaafs 705—706; Einfluss der Augenbewegungen auf die Täuschungen des Augenmaafses 710—716; Ausfüllung des blinden Flecks 718—720; Augenmaafs in der Nähe des blinden Flecks 722—723; Parallaxe des indirecten Sehens berechnet 727—730; wir empfinden als Muskelgefühl der Augen nur die Innervationsstärke 742—745 und controlliren nach den Bildern 745—749; Gesichtsschwindel 747. 764; Modification von HERING's Gesetz der Schrichtungen 751—758; Regel für die Richtungen des Sehens (Cyclopaenge) 756—762; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774—776; Einfluss der Bewegung auf die Tiefenanschauung 779—780; Beurtheilung der Entfernung durch Accommodation 779; Versuche über die Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 789—791; Telestereoskop 793—794. 822—823; Beurtheilung der Entfernung aus der Convergenz der Blicklinien 796; Beobachtung an Papetenbildern 799; Begründung der elieperspective 806—808. 816—820; Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801—806. 808—812. 823 bis 829; verbessertes Stereoskop 829—830; Theorie des stereoskopischen Mikroskops 833—834; Lage der correspondirenden Punkte 855—860. 895—902; Form des Horopters 860—867. 902—913; scheinbare Lage der Doppelbilder 868—869; Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung im Horopter am grössten 869—874; Veränderung der Farben der Landschaft bei veränderter Kopfhaltung 873; Bemerkungen über Verschmelzung der Doppelbilder 878—883; Versuch gegen MÜLLER's Theorie 892; stereoskopische Versuche bei momentaner Beleuchtung 893; Leitung der Aufmerksamkeit im

Wettstreit der Sehfelder 918—928; Kritik der binocularen Farbenmischung 927—932. 940—941; Theorie des Glanzes 932—936. 944—945; über FECHNER's paradoxen Versuch 941—944; Kritik der Theorien über die Gesichtswahrnehmungen 945—970.  
HENLE, J., Durchschnitt der Netzhautgrube 35; Linsenkapsel hat kein Epithelium 38; Structur der Zonula Zinnii 41; Theorie der Accommodation 156; Nomenclatur für anatomische Beschreibungen 616.  
HENSEN, V., Accommodationsmechanismus 139.  
HERBART, Raumansehung 613; Theorie der Sinneswahrnehmung 739. 740.  
HERING, E., Bezeichnung Rot für Purpurrot 278; Verwendung der inneren Beobachtung 342; Farbentheorie 344. 350. 376—382. 384; Prüfung von NEWTON's Gesetz 351; Einwände gegen YOUNG's Farbentheorie 379; Erklärung der Dichromasie 458; Mischung von Roth mit Weiss 471; Theorie der Nachbilder 512; farbige Nachbilder 517; nativistische Theorie der Raumansehung 613. 739. 956. 960—970; Kritik eines Versuches über Doppelbilder 633; Einfluss der Raddrehung auf die Beurtheilung der Lage der Objecte im Raume 638; Beurtheilung der Ruhe und Bewegung 639; Unsicherheit der Methode, die Nachbilder zur Prüfung der Augenstellungen zu benutzen 660; Einwände gegen HELMHOLTZ's Bestimmung der Augendrehungen 669; Täuschung des Augenmaafses 708. 715. 741; Gesetz der Schrichtungen 751. 753. 894; Beurtheilung horizontaler Richtungen 755; Regel für die Richtungen des Sehens (Cyclopaenge) 756. 757. 765. 766. 951; Täuschung in der Tiefenwahrnehmung wegen falscher Schätzung der Convergenz 801. 841; Ursache der scheinbaren Krümmung ebener Objecte 803; Beurtheilung von Linienrichtungen beim zweiäugigen Sehen 808—810; Winkel zwischen den scheinbaren verticalen Decklinien 853. 872; Lage correspondirender Linien 857; scheinbare Entfernung der Doppelbilder 868; Genauigkeit des Reliefs im Horopter 872—873; Horopterproblem 914; Trennung von Doppelbildern 915; Wettstreit der Sehfelder 922; binoculare Farbenmischung 926; Modification von FECHNER's sog. paradoxem Versuch 942; Kernfläche des Sehraumes 963.  
HERSCHEL, J., Rothblindheit 360; photometrische Messungen an Sternen 388; Photometer 473; Helligkeit der Sterne 474; Irradiation 479.

- Hess, C., Farbige Nachbilder 517.  
 HESSEMER, Stereokopenbilder 837.  
 HEVELIUS, Sehschärfe 274.  
 HILLEBRAND, F., Helligkeitswerth der Spectralfarben 471.  
 HIMLY, Theorie der Accommodation 155; Nachbilder 537.  
 DE LA HIRE, PH., SCHKINER'scher Versuch 103; Theorie der Accommodation 151; Polyopia monophthalmica 182; fliegende Mücken 201; Sichtbarkeit der Netzhautgefäße 230; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Entstehung der Farben 308; Nachbilder 537; Größenschätzung 840.  
 HIRSCHBERG, J., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99; Optometer 129.  
 HIRSCHMANN, Sehschärfe 259. 260.  
 HOBBS, Scheinbare Gestalt des Himmels gewölbes 839.  
 HOFBAUER, Beobachtungen an Blindgeborenen 738.  
 HOLMGREN, Versuche über elektrische Ströme in der Netzhaut 271. 275.  
 HOLTZMANN, Methode der Farbenmischung 351.  
 HOME, Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Theorie der Accommodation 152; Beobachtungen an Blindgeborenen 738.  
 HOOKE, Sehschärfe 256. 259. 274; Entstehung der Farben 308.  
 HORN, A., Theorie des Sehens 110.  
 HORNER, W. G., Dädaleum 495.  
 HORROCKES, Erklärung der Irradiation 473.  
 HUECK, A., Theorie der Accommodation 150—154; Raddrehung des Auges 619. 668. 669.  
 HUMBOLDT, A. v., Subjective Lichterscheinung 243; Astrometer 474.  
 HUME, Subjectivismus 612.  
 HUNTER, J., Theorie der Accommodation 154; Raddrehung des Auges 668.  
 HUYGHENS, C., Theorie des Sehens, Augenmodell 110. 129; Undulationstheorie des Lichtes 308.

## J.

- JABLOT, Umkehrung des Reliefs 840.  
 JACOBSON, Theorie der Accommodation 153.  
 JÄGER, Sehproben 124.  
 JAGO, J., Theorie der entoptischen Erscheinungen 201.  
 JAMIN, Erklärung von HAIDINGER's Polarisationbüschel 572.  
 JANIN, Binoculare Farbenmischung 945.  
 JANSSEN, J., Absorption der ultrarothern Strahlen im Auge 283.  
 JAVAL, E., Ophthalmometer 176. 177; Genauigkeit des Sehens 264.  
 JOHNSON, Photometrische Messungen an Sternen 388.  
 JONES, WH., Augenleuchten und Augenspiegel 229.  
 JOSLIN, Irradiation 398.  
 JUNGE, Drehpunkt des Auges 614. 668.  
 JURIN, J., Theorie der Zerstreuungskreise 130; Farbenzerstreuung im Auge 169; Polyopia monophthalmica 182; Sehschärfe 274; Theorie der Nachbilder 536; Contrasterscheinungen 566; Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738.

## K.

- KÄHEHL, Lage der Netzhauthorizonte 849.  
 KÄSTNER, Aufrechtsehen 765.  
 KANT, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248; Erkenntnisvermögen 249; innere Anschauung 577; transcendente Formen des Anschauens 583; Ursprung von Zeit und Raum 586. 587. 618. 955; das Ding an sich 590; Werth der Erfahrung 612.  
 KEPLER, J., Theorie des Sehens 109; Accommodation und Zerstreuungskreise 130; Theorie der Brillen 130; Theorie der Accommodation 153; Theorie des Sehens 249; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Erklärung der Irradiation 478; Aufrechtsehen 765; Tiefenwahrnehmung 839; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.  
 KILBARN, Stereoskop 836.  
 KIRCHER, Nachbilder 536.  
 KITAO, D., Leukoskop 368.  
 KLUG, Farbenblindheit der Netzhautperipherie 373.  
 KNAFF, H., Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 29; mangelnde Centrirung des Auges 109; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 146. 147; Hornhautastigmatismus 177; Augenspiegel 227; Ophthalmotrop 667.  
 KNOBLAUCH, Absorption der dunklen Wärmestrahlen im Auge 283.  
 KNOCHENHAUER, Unterscheidung zwischen Bichtungslinien und Visirlinien 111; Nachbilder 537; Drehpunkt des Auges 668.  
 KÖLLIKER, Beschaffenheit der Aderhaut 23;

- Fovea centralis 35; Stäbchen und Zapfen sind die lichtempfindenden Elemente 255; Radialfasern der Netzhaut 274; Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38. 197. 256. 567; Linsenkapsel hat kein Epithelium 38; Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39; Structur der Zonula Zinnii 41.
- KÖNIG, Accommodationserscheinung 154.
- KÖNIG, A., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318. 319; Farbmischungsversuche 320. 356; Construction einer Farbentafel 340; Blau ist Grundfarbe 348; spectrale Vertheilung der Elementarempfindungen bei normalen und anomalen trichromatischen Augen 357—359, bei dichromatischen Augen 367; Santonwirkung 361; Violettblindheit 362; Erklärung der Dichromasie 368. 372. 458. 461; Leukoskop 368; Vertheilung und Wahl der Grundempfindungen 370. 432. 1008; Abweichungen von Newton's Farbmischungsgesetz 375. 376. 473; Messungen von Unterschiedsschwellen 392. 402. 408. 413. 414. 439. 446. 449. 472; untere Reizschwellen 415. 472; Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425. 426; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Spectralfarben 431—433. 440. 471; subjective Gesichterscheinung 569.
- ÖHLRAUSCH, R. H., Krümmungsradius der Hornhaut 10; Theorie der Accommodation 150.
- KOLK, SCHRÖDER VAN DER, siehe unter S.
- KRANKE, Rothblindheit 367.
- KRAUSE, C., Aeußere Dimensionen des Auges 8—10; Entfernung der Pupillfläche von dem Scheitel der Hornhaut 27; Opticus-Ellipsoide 33; Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Dicke der Linse an lebenden Augen 106; Raddrehung des Auges 668; Trennung correspondirender Bilder 884.
- KRAUSE, W., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 92. 95. 96. 98. 106.
- KRIES, F. C., Augenmodell 129.
- KRIES, J. v., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318; Farbenblindheit der Netzhautperipherie 373.
- KÜHNE, W., Sehpurpur 265; Darstellung der Optogramme 266; Regeneration des Sehpurpurs 267; Bewegung von Pigmentkörnchen 268; elektrische Ströme in der Netzhaut 270. 273. 275; Fluorescenz des Sehroth und Sehweiß 286.
- KUNDT, A., Täuschungen des Augenmaasses 705. 715. 716. 741; unmittelbare Empfindung der Entfernungen auf der Netzhaut 956.
- KUSSMAUL, Sichtbarkeit der Netzhautgefäße 230.

## L.

- LAGRANGE, Gesetz von der Constanz des Productes aus der optischen Neigung eines Strahles mit der linearen Größe des demselben Medium angehörnden Bildes 71.
- IBLIN, Wahrnehmung von Druckbildern 238.
- MBERT, J. H., Vergleichung der Farben und Töne 308. 310; Farbenpyramide 326. 336. 337; Ordnung des Farbensystems 383; Photometrie 416. 473; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839.
- APADIUS, Photometer 474.
- OLDT, Perimeter 88; Augenspiegel 227.
- IGENBECK, M., Compressor oder sphincter mntis 136; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 154.
- IGLEY, Dunkle Wärmestrahlen 282. 288.
- BLOND siehe unter B.
- CAT siehe unter C.
- UWENHOEK, Musculus crystallinus als ame der Linse 154.
- GENTIL siehe unter G.
- OT, Theorie des Sehens 110; Nachlder 537.
- NITZ, Angeborene Ideen 612.
- LE MOINE siehe unter M.
- LÉPINAY, MACÉ DE, siehe unter M.
- LE ROY siehe unter R.
- LEYDIG, Sehpurpur 265.
- LICHTENBERG, Aufrechtsehen 765.
- LIEBREICH, Augenspiegel 226.
- DE LIMENCEY, Photometer 474.
- LINCKE, Subjective Gesichterscheinung 243.
- LISSAJOUS, Dauer der Nachbilder 486. 489.
- LISING, Schematisches Auge 89; reducirtes Auge 90; Brennweiten des Auges 106; Linse des schematischen Auges 106; Ort des Linsenscheitels 107; Bestimmung der Lage der Cardinalpunkte im Auge 112; Abstand der Iris von der vorderen Linsenfläche im schematischen Auge 126; Größe der Zerstreuungskreise 127—128; Theorie der Accommodation 156; Ort der schattengebenden Körperchen im Auge (relative entoptische Parallaxe) 186. 199. 201; Beschreibung einiger entoptischer Erscheinungen 188; genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253; Drehungsgesetz des Auges 623; Gesetz für die Augendrehtungen 669; Parallaxe bei directem und indirectem Sehen 729.

- LOBÉ, J. P., Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Theorie der Accommodation 152.  
 LOCKE, Nachbilder 536; Empirismus 584. 612; Theorie der Gesichtswahrnehmungen 788.  
 LOEWÉ, Entdeckung des LOEWESchen Rings 567.  
 LORING-WADSWORTH, Augenspiegel 227.  
 LOTZE, Raumanschauung 613. 740.  
 LUDWIG, Binoculare Farbenmischung 926.  
 LÜDICKER, Farbenkreisel 501.  
 LUMMER, O., Umänderung des BUNSEN'schen Photometers 419—422; Contrastphotometer 423; Benutzung des Episkotisters 493.

## M.

- MACÉ DE LÉPINAY, Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425. 431.  
 MACH, E., Augenmaass 687.  
 MACKENZIE, Beschreibung entoptischer Erscheinungen 201.  
 MAGENDIE, F., Theorie der Accommodation 150.  
 DE MAIRAN, Vergleichung der Farben und Töne 809. 810.  
 DE MAISTRE, Photometer 478.  
 MALBRANCHE, Größenschätzung 840.  
 MANDELSTAMM, Abstand der Gesichtslinie von der Hornhautaxe 21; Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 30; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 MARRACH, Unveränderlichkeit des stereoskopischen Reliefs 893.  
 MARIOTTE, Entdeckung des blinden Flecks 273; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274; Nachbilder 586.  
 MASKELYNE, N., Farbenzerstreuung im Auge 169.  
 MASSON, Die kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Erzeugung zarter Schatten mit rotirenden Scheiben 390.  
 MATTHIESSEN, A., Farbenzerstreuung im Auge 158. 169.  
 MATTHIESSEN, L., Kugelgestalt des mittleren Theiles der Hornhaut 20; Brennweite einer geschichteten Linse 94; Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99.  
 MAUROLYCUS, Theorie des Sehens 109; Theorie der Brillen 130; Farbentheorie 306.  
 MAXWELL, Quantitative Prüfung des NEWTON'schen Farbenmischungsgesetzes 332. 383; Blau als Grundfarbe 348; Farbentafel 349; Methode der Mischung von Spectralfarben 356; Nachweis, daß zwei Grundfarben zur Farbenmischung für Rothblinde genügen 360. 365; Untersuchung von Farbenblinden mit dem Farbenkreisel 371; Aufnahme der YOUNG'schen Farbentheorie 373; gelber Fleck 568; Polarisationsbüschel 570. 572.  
 MAYER, H., Theorie des Sehens 110; Theorie der Zerstreuungskreise 130; Theorie der Accommodation 150.  
 MAYER, TOB., Sehschärfe 257. 258. 259.  
 264. 274; Ordnung des Farbensystems 383; Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425.  
 MAYNARD, G., Erfindung des Stereoskops 840.  
 MAZAS, Farbige Schatten 565.  
 MECKEL, Theorie der Accommodation 155.  
 MEISSNER, Entoptische Erscheinungen und ihre Theorie 198. 198. 202; Wahrnehmung von Druckbildern 238; Augenbewegungen 618. 625. 661. 662. 669; Theorie der Sinneswahrnehmungen 740; Bestimmung des Linienhoropters 867; binocularer Wettstreit der Farben 926.  
 MELLONI, Versuche über dunkle Strahlen 282. 283; gegen BREWSTER's Farbentheorie 308.  
 MELVILLE, Farbige Schatten 565.  
 MERKEL, Dimensionen des Auges 9.  
 MEYER, J., Sichtbarkeit der Netzhautgefäße 230; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274.  
 MEYER, G. H., Ursprung der SANSON'schen Bildchen 26; Beurtheilung der Entfernung nach Convergenz 795; Beobachtung an Tapetenbildern 798; Spiegelstereoskop 837; binocularer Wettstreit der Farben 926. 930; binocularer Contrast 945; empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen 947. 971.  
 MEYER, M. H., Diffractionserscheinungen des Auges 188; Erklärung der Irradiation 490; Contrastversuche 547. 926. 1006.  
 MICHELL, Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274.  
 MILES, J., Theorie der Zerstreuungskreise 130; Theorie der Accommodation 152; Unterscheidung zwischen Richtungsstrahlen und Richtungslinien 111; Methode der Farbenmischung 851; Drehpunkt des Auges 668; Richtung des Sehens 765.  
 MILL, ST., Logische Schlüsse 581.  
 M'KENDRICK, Netzhautströme 375.  
 MÖNNICH, Binoculare Farbenmischung 945.  
 LE MOINE, Theorie der Accommodation 155.  
 MOLINETTI, Theorie der Accommodation 155.  
 MOLLWEIDE, K. E., Farbenzerstreuung im Auge 169.  
 MOLYNEUX, Theorie der Gesichtswahrneh-

- mungen 788; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.  
**MONRO**, Theorie der Accommodation 155.  
**MONTIGNY**, Nachbilder 482; Farbenmischung durch ein rotirendes Prisma 493.  
**MONTUCLA**, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774.  
**MORGAGNI**, Fliegende Mücken 201.  
**MORTON**, S. G., Theorie der Accommodation 151.  
**MOSER**, L. F., Annahme über das mittlere Brechungsverhältniß der Krystalllinse 110; Bestimmung der Cardinalpunkte des Auges 111; Theorie der Accommodation 153; Betrachtung der Sonne durch ein violettes Glas 285; stereoskopische Photographien 837.  
**DE LA MOTTE**, J., SCHEINER'scher Versuch 180.  
**MÜHLBACH**, N. TH., Theorie des Sehens, Leugnung des Netzhautbildes 110.  
**MÜLLER**, JOH. H. JAC., Stroboskopischer Apparat 495.  
**MÜLLER**, H., Verdünnung der inneren Körnerschicht in der Netzhautgrube 35; Wahrnehmung der Netzhautgefäße 193. 195; Bestimmung des Ortes entoptisch ge-  
 sehener Objecte 200—202. 254; Stäbchen und Zapfen sind die lichtempfindenden Elemente 255. 274; Zapfendicke 256  
 Sehpurpur 265; Durchmesser des gelben Flecks 567.  
**MÜLLER**, J., Theorie der Accommodation 158; entoptische Wahrnehmung 198; Augenleuchten 229; Sehsinnsstanz 233; Wahrnehmung von Phantasmen 242. 243; Lehre von den specifischen Sinnesenergien 249. 849. 584. 612; über den blinden Fleck 274; Erklärung der Irradiation 479; subjective bewegte Punkte 578; nativistische Theorie der Raumanschauung 613. 703. 738. 955; Drehpunkt des Auges 668; Raddrehung des Auges 668; identische Netzhautpunkte, Kreishoropter 865. 866. 914; Vereinigung correspondirender Sehnervenfasern (als Grund des Einfachsehens) 913. 945.  
**MUNCKE**, Knotenpunkt des Auges und Kreuzungspunkt der Visirlinien 111; Sehschärfe 274; Umkehrung des Reliefs 840.  
**MUSCHENBROEK**, Farbenkreisel 491. 501.  
**MUYBRIDGE**, Momentphotographien 495.

## N.

- NACHET**, Apparat zur Messung des Astigmatismus 176; stereoskopisches Mikroskop 832—834; binocularer Augenspiegel 834.  
**NAGEL**, A., Meterlinse (Dioptrie) 122; schematisches Auge 140; empiristische Theorie der Raumanschauung 613. 947. 970. 971; Schielen 744. 766. 847; Trennung von Doppelbildern 915.  
**NEBO**, Brillenglas 130.  
**NEUMANN**, Idee zu einem Photometer 476.  
**NEWTON**, J., Farbenzerstreuung im Auge 168; Erklärung der Druckbilder 249; Einteilung des Spectrums und Farbenbezeichnungen 276. 287; die Zusammensetzung des weißen Lichtes 308; Vergleichung der einfachen Farben mit den  
 Tönen 308. 310; Mischung pulveriger oder flüssiger Farbstoffe 313; Farbenkreis 325; Farbenmischungsgesetz 326; Schwerpunktsconstruction in der Farbentafel 332. 336; Versuche über Farbenmischung und -zerlegung 388; Dauer des Lichteindrucks 501; Nachbilder 536; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913. 945.  
**NICATI**, W., Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 431.  
**NIEDT**, Polyopia monophthalmica 182.  
**NUEL**, J. P., entoptische Wahrnehmung der gefäßlosen Stelle des Augengrundes 194.  
**NUETZ**, Farbentheorie 306.

## O.

- OERTLING**, Linsenstereoskop 829.  
**OLBERS**, H. W. M., Theorie der Accommodation 152. 155.  
**OPPEL**, J. J., Vergleich von Tönen und Farben 311; Schwindel 747. 766; Gesichtsschwindel (Antirrheoskop) 764; perspec-  
 tivische Umkehrung (Anaglyptoskop) 772; Telestereoskopie 882; stereoskopischer Glanz 945.  
**OBANN**, Nachbilder 587; Contrastversuche 552. 566.

## P.

- PANUM**, Verschmelzen von Doppelbildern 891. 915; Wettstreit der Contouren 922. 924; binocularer Farbenmischung 926. 928. 930; binocularer Contrast 945; Modifi-



- cation der Identitätstheorie der Gesichtswahrnehmungen 957—960.  
 PAPPENHEIM, Versuche über das Brechungsverhältnis des Glaskörpers 110; Theorie der Accommodation 153.  
 PARIS, Thaumatrope 493.  
 PARROT, G. F., Theorie der Accommodation 155; Dauer des Lichteindrucks 501.  
 v. PAULA SCHRANK, Farbige Schatten 566.  
 PÉCLET, J. E. C., Polyopia monophthalmica 182.  
 PECQUET, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.  
 PEIRESC, Nachbilder 536.  
 PEMBERTON, Theorie der Accommodation 154.  
 PERNOT, Photometer 473.  
 PERRAULT, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.  
 PERSIUS, Irradiationserscheinungen 478.  
 PETIT, Annahme der sog. hinteren Augenkammer 30; der nach ihm benannte Canal (Canal godronné) 41. 137.  
 PFAFF, Electriche Reizung des Auges 244.  
 PFLÜGER, W., Gesetze der electricen Reizbarkeit der Nerven 247.  
 PICARD, Blinder Fleck 273.  
 PICKFORD, Beobachtungen an Schielenden 847.  
 PITCAIRN, Fliegende Mücken 201.  
 PITZER, Photometer 474.  
 PLACIDO, Keratioskop 177.  
 PLÄGGE, Theorie des Sehens 110.  
 PLATEAU, Farbmischungsversuche am Farbkreis 383; Irradiation 395—398. 400. 401. 478—480; Helligkeit intermittirenden Lichts 477. 484; Verschmelzung von Lichteindrücken 488; Dauer der Nachbilder 489. 490; Phänakistioskop 494. 501; Anorthoskop 498. 501; stroboskopische Erscheinungen 500. 501; Dauer der Lichteindrücke 501; Theorie der Nachbilder 510. 512. 522. 523. 534. 535. 537; Contrasterscheinungen 566. 1008; Schwindel und Scheinbewegungen 747. 766.  
 PLATO, Theorie der Gesichtsempfindung 248.  
 PLATTNER, J. Z., Theorie der Accommodation 153.  
 PLEMPPIUS, Theorie der Accommodation 153.  
 PLINIUS, Gebrauch der Brillengläser 130; Farbmischung bei den griechischen Malern 382.  
 POGSON, Photometrische Messungen an Sternen 388.  
 POHLMANN, Farbige Schatten 566.  
 POPPE, J. H. M., Theorie der Accommodation 155.  
 PORTA, Theorie des Sehens 109; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774. 839; Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.  
 PORTERFIELD, W., Optometer 128; SCHWINKER's Versuch 130; Theorie der Accommodation 153; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Projectionen im Sehfeld 739. 765; Größenschätzung 840; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 914.  
 POTTER, Photometer 473. 475.  
 POUILLET, Photometrie 477.  
 POWELL, B., Minimum des Brechungsverhältnisses bei Flintglas 281.  
 PREVOST, A. P., Augenleuchten 229; Hoptopter 914.  
 PREYER, W., Wirkung von Santonin 362; YOUNG's Erklärung der Farbenblindheit 365; Grenzen des Farbmischungsgesetzes 375.  
 PRIESTLEY, Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738; Aufrechtsehen 765; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774.  
 PRIEUR DE LA CÔTE D'OR, Theorie der Nachbilder 537.  
 PTOLEMAEUS, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774; Tiefenschätzung 838.  
 PURKINJE, J. E., Linsen-Reflexbilder 26; Theorie der Accommodation 154; Polyopia monophthalmica 182; entoptische Erscheinungen 198. 202; mechanische Reizungen der Netzhaut 236—240. 249; Lichtempfindungen aus inneren Ursachen 241. 242; Erregung der Empfindungsnerven 249; electriche Reizung des Auges 246. 249; Grenze der Sehschärfe (Wellenfigur) 258; leichte Erkennbarkeit der blauen Farben bei schwachem Licht 429; verschiedene relative Helligkeit der Farben 478; Dauer der Nachbilder 516; complementär gefärbte Nachbilder 527; farbiges Abklingen der Nachbilder 529; Lichtschattenfigur 532; Nachbilder 537; subjective helle Punkte 573. 574; Kreuzspinnengewebefigur 575; Farbenempfindung der Netzhautperipherie 740.

## Q.

QUETLET, Photometrie 473. 475; Irradiation 479; Erfindung des Phänakistoscops 494.

## R.

- ROGONA SCINA, Contrastversuch 557. 1008.  
 RAMSDEN, Theorie der Accommodation 152.  
 RAYLEIGH, Anomale trichromatische Augen 359.

- READE, J., Theorie des Sehens 110.  
 RECKLINGHAUSEN, Scheinbar verticale Meridiane 789; scheinbar verticaler Meridian und Krümmung einer geraden, peripher gesehenen Linie 741; Perspective regelmäßiger Körper 769; Beurtheilung von Linienrichtungen 810—811; Theorie seiner Normalfläche 828—829; binoculare Localisation 841; Tiefenwahrnehmung bei momentaner Beleuchtung 915; Abweichung der scheinbar rechten Winkel 955.  
 REES, Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen 288.  
 REGNAULT, Binoculare Farbenmischung 926. 927.  
 REICH, Entfernung der Pupillenebene vom Scheitel der Hornhaut 90; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 REKÖSS, Modification des Augenspiegels von HELMHOLTZ 223.  
 REMAK, Netzhautgrube 85.  
 REUSS, A. v., Linsendicke an lebenden Augen 105.  
 RIEMANN, Mannigfaltigkeit verschiedener Dimensionen 336.  
 RITCHIE, Photometer 473.  
 RITTENHOUSE, Perspectivische Umkehrung 772. 840.  
 RITTER, J. W., Theorie der Accommodation 150; electriche Reizung des Auges 244—246. 249; starke Wirkung der Nachbilder 506.  
 RITTER, R., Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 431.  
 RITTERICH, Raddrehung des Auges 668.  
 ROBINSON, Irradiation 479.  
 ROGERS, Verschmelzung von Nachbildern zu stereoskopischer Tiefenwahrnehmung 891; Trennung der Empfindungen beider Augen 894.  
 ROGET, Stroboskopische Erscheinungen 500.  
 ROHAULT, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.  
 ROLLET, A., Vereinigung stereoskopischer Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800; binoculares Sehen 837.  
 ROLLMANN, Stereoskopie 885.  
 ROOD, O. N., Entoptische Wahrnehmung 198; subjective Farbenveränderungen 607; Herstellung stereoskopischer Zeichnungen 814.  
 ROSE, E., Santoninwirkung 361; Untersuchung der Dichromasie 372.  
 ROSOW, B., Linsendicke an lebenden Augen 105.  
 LE ROY, CH., Theorie der Accommodation 151; electriche Reizung des Auges 244.  
 RUDOLPH, Augenleuchten 229; Ansicht über die Unempfindlichkeit des blinden Fleckes 274; Aufrechtsehen 765.  
 RÜDORFF, FR., Photometer 423.  
 RUEBE, C. G. TH., Optometer 129; Theorie der Accommodation 153; Augenspiegel 220. 225. 230; Raddrehung 620. 668. 669; Drehungsaxe des Auges 627; Drehungsaxen für die Augenmuskeln 665; Ophthalmotrop 667.  
 RUMFORD, Photometer 473; subjective Natur der farbigen Schatten 565.

S.

- SAKAKY, H., Rothblindheit 367.  
 SALZER, F., Zapfenzählung der Netzhautgrube 260, auf den übrigen Theilen der Netzhaut 263.  
 SAMUEL, Stereoskop 836.  
 SANSON, Benutzt die Linsen-Reflexbilder zur Diagnose von Krankheiten 26.  
 SCHAPHÄUTL, Photometer 477.  
 SCHEINER, CHR., Theorie des Sehens 110; der SCHEINER'sche Versuch 116; Accommodation und Zerstreuungskreise 180; Theorie der Accommodation 151. 153; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Aufrechtsehen 765.  
 SCHELLING, Idealismus 612.  
 SCHELSKE, R., Messungen mit dem Spectrophotometer 856; Farbenblindheit der Netzhautperipherie 873. 740.  
 SCHERFFNER, Nachbilder 536.  
 SCHICKARD, Erklärung der Irradiation 479.  
 SCHIÖTZ, Ophthalmometer 177.  
 SCHORLER, Methode zur Bestimmung des Winkels  $\beta$  22; Entfernung der Pupillenebene vom Scheitel der Hornhaut 80; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 SCHOPENHAUER, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 249.  
 SCHRANK, VON PAULA, siehe unter P.  
 SCHROEDER, Perspectivische Umkehrung 770 bis 773.  
 SCHROEDER VAN DER KOLK, Theorie der Accommodation 156.  
 SCHULTZE, M., Netzhautdurchschnitt 31; Stäbchen und Zapfen der Netzhaut 32 bis 33; Fadenapparat 33; Bau der Zonula 137; Zapfendicke 256; Sehpurpur 265; radiäre Fasern im gelben Fleck 571.  
 SCHURMANN, J. B., Prüfung der Augenstellungen 666.  
 SCHUYDER, Astigmatismus 183.  
 SCHWALBE, Netzhautdurchschnitt 81.

- SCHWEIGER-SIDEL, Lage der Netzhaut-horizonte 849; Lage scheinbar verticaler Linien 852.
- SCHWEIZER, Perspectivische Umkehrung 773.
- SCHWERD, Lichtmessungen an Sternen 474.
- SCINA, RAGONA, Contrastversuch 557. 1008.
- SCORESEY, Nachbilder 537.
- SECCHI, Messungen von Sternhelligkeiten 477.
- SECRETAN, Photometer 474.
- SEEBECK, Nachweis zweier Klassen von dichromatischen Augen 359—361; Beobachtungen an Rothblinden 366; Methode der Untersuchung an Farbenblinden 371.
- SEGENER, Dauer des Lichteindrucks 501.
- SEGUIN, Farbige Abklängen der Nachbilder 521. 524; Nachbilder 537.
- SEILER, Möglichkeit objectiver Lichtentwicklung im Auge 249.
- SELLIS, BILLET, Stroboskopische Erscheinungen 500.
- SELL, Interpolationsrechnung 451.
- SENF, Krümmungshalbmesser und Ellipticität der Hornhaut 10. 20; totales Brechungsvermögen der Krystalllinse 102. 106; Krümmungsradius der Hornhaut 106; Hornhautkrümmung und Accommodation 141. 152.
- SERRE, Theorie der Accommodation 156.
- SERRES D'UZÈS, Beschreibung der Druckbilder 249.
- SETSCHENOW, Untersuchung der Fluorescenz der Netzhaut 285. 286.
- SHAW, Stereotrope 836.
- SILBERMANN, Polarisationsbüschel 570; Erklärung der Polarisationsbüschel 572.
- SINSTEDEN, Rotirende Scheiben 533; Nachbilder 537; perspectivische Umkehrung 770. 777.
- SMITH, R., Erfindung der Brillen 130; Sehschärfe 274; Beobachtungen an Blindgeborenen 731 ff.; Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839; stereoskopische Beobachtung 840.
- SMITH, TH., Theorie der Accommodation 154.
- SMITH (FOCHABERS), Beurtheilung der objectiven Farbe 562; seitlicher Fensterversuch 943.
- SMITH, Stereoskop 836.
- SNELLEN, Sehproben 124. 264; Prüfung der Sehschärfe 425.
- SOLGER, Trennung correspondirender Bilder 884. 885.
- DE SPINA, A., Erfindung der Brillen 130.
- SPLITTERBERG, Nachbilder 537.
- STAMM, Unterscheidung zwischen Richtungs- und Visirlinien 111; Drehpunkt des Auges 668.
- STAMPFER, Stroboskopische Scheiben 494. 501.
- STEIFENSAND, K. A., Beschreibung entoptischer Erscheinungen 201.
- STEINBACH, Wahrnehmung von Druckbildern 238.
- STEINBUCH, Subjective bewegte Punkte 573; Empirie der Raumanschauung 613.
- STEINHEIL, Photometrische Messungen an Sternen 388; Objectiv-Photometer 474; Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 478.
- STELLWAG VON CARION, Berührung von Iris und Linse 30; Theorie der Accommodation 154; Theorie der Polyopia monophthalmica 182; Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel 230.
- STEVALLY, Nachbilder 482.
- STOKES, Veränderliche Cylinderlinsen 176; Bezeichnung der Spectrallinien 277; Ausdehnung des Spectrums electrischen Kohlelichtes 280; ultraviolettes Licht 280; Polarisationsbüschel 571. 572.
- STRUVE, Photometrische Messungen an Sternen 388.
- STURM, J. K. F., Theorie der Accommodation 150—151.
- STURM, J. CHR., Theorie der Accommodation 153. 155.
- SUTTON, Stereoskopische Bilder 838.
- SZOKALSKY, Accommodationsbeobachtung 155; Theorie der Accommodation 156; Drehpunkt des Auges 668.

## T.

- TACQUET, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.
- TALBOT, Photometrie 477.
- THOMAS, Faserverlauf in der Linse 39.
- THOMSON, Genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253.
- TIBERIUS, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit 249.
- TIEDEMANN, F., Augenleuchten 229.
- TU TOUR, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913; Wettstreit der Sehfelder 945.
- TOURNAI, Farbenzerstreuung im Auge 169; Empfindungen bei Durchschneidung des Sehnerven 240; farbige Schatten 566; Raddrehung des Auges 668; Drehpunkt des Auges 668; Projectionen im Sehfeld 739.
- TOWNE, J., Binocular Localisation 841; Projection der Gesichtsbilder nach aussen 894. 951.
- TREVIRANUS, G. R., Theorie der Accommodation 150; Sehschärfe 274; vermuthet

die Stäbchenschicht (Nervenpapillen) als die lichtempfindliche 274.  
 VAN TRIGT, Schwarze Farbe der Pupille von Albinos 208; Augenspiegel 226.  
 TRINCINETTI, Beobachtungen an Blindgeborenen 738.

THOUSSART, C. R., Polyopia monophthalmica 182.  
 TROXLER, Nachbilder 537.  
 TYNDALL, J., Diffractionerscheinungen im Auge 180.

## U.

UCHATIUS, Stroboskopischer Apparat 495.  
 UEBERWEG, Theorie der Sinneswahrnehmungen 739.  
 UERTHOFF, W., Bestimmung der Winkel  $\beta$  und  $\alpha$  22; Sehschärfe und Beleuchtungs-

intensität 425. 426; Untersuchung über Farbenunterschiedsempfindlichkeit 452.  
 UNGER, Theorie der ästhetischen Farbenharmonie 310. 311.

## V.

VALENTIN, G. G., Theorie der Accommodation 152; Raddrehung des Auges 668; Drehpunkt des Auges 668.  
 VALLÉE, L. L., Brechungsverhältnisse des Glaskörpers 110; Theorie der Accommodation 153; Farbenzerstreuung im Auge 169.  
 VARIENON, Größenschätzung 840.  
 VIERORDT, K., Entoptische Erscheinung 198; Wahrnehmung von Druckbildern 288; Blutumlauf in der Netzhaut 583; Subjective helle Punkte 573.  
 VIETH, Kreishoropter 914.  
 VINTSCHGAU, VON, Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Anhaften der Glashaut an der Netzhaut 40.  
 VINCI, LEONARDO DA, Einfache Farben 382; Contrasterscheinungen 565; Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840.  
 VITELLO, Gestalt des Himmelsgewölbes 839.  
 VORLOCKERS, C., Accommodationsmechanismus 139; binocularer Wettstreit der Farben 925.  
 VOLOKMAN, A. W., Netzhautbild am lebenden Auge, äußerlich sichtbar 86; Lage der Knotenpunkte im Auge 107—108. 112; Kreuzungspunkt der Richtungstrahlen oder Richtungslinien 111; Erfindung der Brillen 180; Theorie der Accommodation 150; sphärische Aberration des Auges 183; Sehschärfe 257. 258. 259. 275; Methode der Farbenmischung 351; Farbenmischungsversuche an Zerstreuungsbildern 383; kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Intensität des Eigen-

lichtes der Netzhaut 389; Irradiationserscheinungen 398. 400; Contrasterscheinungen 560; Beurtheilung der objectiven Farbe 562; Einfluß der Convergenz auf die Raddrehung 619. 625. 626; Beobachtungsmethode für die Augenbewegungen 663—665; Drehpunkt des Auges und Kreuzungspunkt der Richtungslinien 668; Raddrehung des Auges 668; Augenmaafs für Längen und seine Fehler 682—684. 740; Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane 688. 863; Augenmaafs (Tachistoskop) 710. 891; Ausfüllung des blinden Flecks und Augenmaafs in seiner Nähe 719. 722—724. 741; Grund für die scheinbare Gröfse eines Gesichtswinkels 739; Projection in das Sehfeld 739. 765; Beurtheilung horizontaler und verticaler Richtungen 755. 810. 852; Lage der Netzhaut-horizonte 848; Deckpunkte in den verticalen Decklinien und den Netzhaut-horizonten 853. 854; Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane 860; Verschmelzung der Doppelbilder 875. 876. 892. 915. 958—959; Erleichterung der Wahrnehmung der Doppelbilder 880; Verschmelzung und Trennung correspondirender Bilder 883—885; Lage der correspondirenden Netzhauptpunkte 914; binocularer Wettstreit der Farben 925. 926; empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen 947. 962. 971.

VOLTA, Elektrische Reizung des Auges 249.  
 VROESOM DE HAAN siehe unter H.

## W.

WADSWORTH, LORING, siehe unter L.  
 WAITZ, Raumanschauung 618.  
 WALDEYER, W., Grünblindheit 367.

WALLACE, W. C., Theorie der Accommodation 153.

- WALLER, Classification der Farben und Farbstoffe 382.  
 WALLMARK, Diffractionerscheinungen des Auges 183.  
 WALTHER, Theorie der Accommodation 155; binoculare Farbenmischung 945.  
 WARDEP, Beobachtungen an Blindgeborenen 731—736.  
 WARE, J., Beobachtungen an Blindgeborenen 732—738.  
 WEBER, C., Theorie der Accommodation 153.  
 WEBER, L., Photometer 423.  
 WEBER, FR., Lichtemission 471.  
 WEBER, E. A., Binocularer Wettstreit der Farben 925.  
 WEBER, TH., Sehschärfe 259.  
 WEBER, E. H., Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Schatten der Vena centralis 197; genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253. 274; Sehschärfe 256—259. 275; Unterscheidung der Differenzen von Gewichten und Lineargrößen, psychophysisches Gesetz, 387. 740; das Augenmaass und das psychophysische Gesetz 683; Empfindungskreise der Haut und der Netzhaut 703; Ausfüllung des blinden Fleckes und das Augenmaass in der Nähe desselben 719. 722—723. 741.  
 WECKER, v., Perimeter 88; Augenspiegel 227.  
 WELCKER, H., Zapfendicke 256; Erklärung der Irradiation 480; Prüfung der Augenstellungen 665; Lage der Netzhauthorizonte 849; binocularer Wettstreit der Farben 925.  
 WELLER, Theorie der Accommodation 156.  
 WELLS, Stereoskopische Beobachtungen 840.  
 VAN DER WEYDE, Elementarempfindungscurven für dichromatische Augen 367; Grenzen des Farbenmischungsgesetzes 375.  
 WHEATSTONE, Nachbilder (Kaleidophon) 486; flatternde Herzen 534; Raumansehung 613; Stereoskop und Stereoskopie 784. 830. 835. 836. 840. 915; Pseudoskop 791; Beurtheilung der Entfernung aus der Convergenz der Blicklinien 795. 837; Trennung und Verschmelzung correspondirender Bilder 885—888; 915; stereoskopische Verschmelzung von Nachbildern 891; empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen 947. 959.  
 WHEWELL, Einführung des Namens „Astigmatismus“ 173.  
 WILCKE, Electricische Reizung des Auges 244.  
 WILD, Photometer 476. 477.  
 WILDE, E., Stereoskop 835.  
 WILSON, G., Farbenblindheit 372.  
 WITTICH, W. v., Ausfüllung des blinden Fleckes 719. 741; Augenmaass in der Nähe des blinden Fleckes 722—723.  
 WOINOW, Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 29; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 WOLF, C. v., Augenmodell 129.  
 WOLFFBERG, L., entoptische Wahrnehmung der gefäßlosen Stelle des Augengrundes 194.  
 WOLLASTON, W. H., Accommodation 154; Farbenzerstreuung im Auge 169; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913. 945.  
 WÜNSCH, Grundfarben 383.  
 WUNDT, W., Theorie der Gesichtsempfindung bei den Griechen 248; empiristische Theorie der Raumansehung 613. 740. 947. 970; Richtung der Blicklinie 618; Princip für die Augenbewegungen 643 bis 644; Benutzung der Nachbilder zur Bestimmung der Augenstellungen 660; Drehungsgesetz der Augen 669; Ophthalmotrop 667. 669; Augenmaass für Quadrate 684; Beurtheilung der Entfernung durch Accommodation 778; Beurtheilung der Entfernung aus der Convergenz der Blicklinien 795—798; stereoskopische Verschmelzung von Nachbildern 891; WHEATSTONE'S Versuch 915; Wettstreit der Contouren 920; Ursache des Glanzes 934—936.  
 genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253; Undulationstheorie, erwiesen durch Interferenz 308; Vergleichung von Farben und Tönen 309. 310; Farbertheorie 345 ff. 383. 714; Erklärung der Farbenblindheit 365. 458; Wahl der Grundfarben 383; Farbertheorie und Nachbilder 537.

## Y.

- YOUNG, TH., Optometer 128—129; Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Constanten der Augenaxe bei der Accommodation 149; Theorie der Accommodation 152. 154; Form der Zerstreuungskreise 173; Correctur des Astigmatismus 176; Astigmatismus 177. 181. 183; Polyopia monophthalmica 182; sphärische Aberration des Auges 183; Druckbilder 236. 249;

**Z.**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>ZEHENDER, W. v.</b>, Dimensionen des Auges 9;<br/>         Augenspiegel 220. 227.<br/> <b>ZINN</b>, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.<br/> <b>ZOELLNER</b>, Photometer 476; Täuschung des<br/>         Augenmaasses 708. 709. 741; Erklärung</p> | <p>einer optischen Täuschung durch Augen-<br/>         bewegung 714—715. 749; Schwindel und<br/>         Scheinbewegungen 766.<br/> <b>ZSCHOKKE</b>, Farbige Schatten 566.</p> |
|---|--|
-



## Berichtigungen.

Von Arthur König.

- S. 28, Z. 15 v. o. muß  $b$  statt  $\gamma$  stehen.  
 „ 76, „ 2 „ „ „  $tg \alpha_1$  statt  $tg \alpha_2$  stehen.  
 „ 78 muß in Gleichung 11b) im Zähler auf der rechten Seite  $(d - f_2)$  statt  $(d - f_1)$  stehen.  
 „ 213 muß die letzte Gleichung lauten:

$$J = \frac{n_2^2}{n_1^2} \cdot H \cdot \frac{Q}{R^2}$$

- „ 220, Z. 9 v. u. muß Convexspiegel statt Concavspiegel stehen.  
 „ 258, „ 1 „ „ „ Pfeuffer statt Pflüger stehen.  
 „ 260, „ 21 „ o. „ stehen  $2 \cdot s^2 \sqrt{s}$  statt  $2 \cdot 5^2 \sqrt{s}$ .  
 „ 318, „ 1 „ u. „ Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. IV. S. 241 1893 statt Wied. Ann. 33. 1887 stehen.  
 „ 410, Z. 7 v. u. muß statt  $\varphi \cdot (\alpha - J)^2$  stehen  $\varphi \cdot (\alpha - J)^2 \cdot \alpha$ .  
 „ „ „ 3 „ „ ist in dem unter dem Integralzeichen im Zähler stehenden Ausdrucke der Factor  $(\alpha - J)^2$  zu streichen. Bei der Herausgabe seiner gesammelten wissenschaftlichen Abhandlungen (Bd. III. S. 396) hat H. v. HELMHOLTZ die hier durchgeführte Rechnung beträchtlich umgestaltet, ohne jedoch zu einem wesentlich verschiedenen Resultate zu kommen.  
 „ 461, Z. 11 v. u. bis S. 462, Z. 4 v. o. muß nach einer Berichtigung, welche H. v. HELMHOLTZ (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. III. S. 517) im Jahre 1892 veröffentlicht hat, ersetzt werden durch Folgendes:  
 „während die dritte den beiden Klassen der Dichromaten und den normalen Trichromaten gemeinsame Grundempfindung  $\mathfrak{B} = V$  ist.

Um nun zu ermitteln, ob diese Grundfarben  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{G}$  außerhalb oder innerhalb des nach den Unterschiedsempfindlichkeiten berechneten neuen Farbendreiecks liegen, muß man die Werthe der  $x, y, z$  als Functionen der  $\mathfrak{R}, \mathfrak{G}, \mathfrak{B}$  ausdrücken. Wenn man zwei von diesen letzteren Größen gleich Null setzt und die dritte übrig bleibende dann negative Werthe einer der  $x, y, z$  ergibt, so liegt die betreffende Farbe außerhalb des Dreiecks  $[x, y, z]$ .

Aus den eben angeführten Werthen für  $\mathfrak{R}, \mathfrak{G}, \mathfrak{B}$  folgt

$$\begin{aligned} R &= 0.9157 \cdot \mathfrak{R} + 0.1807 \cdot \mathfrak{G} - 0.0963 \cdot \mathfrak{B} \\ G &= -0.2289 \cdot \mathfrak{R} + 1.2048 \cdot \mathfrak{G} + 0.0241 \cdot \mathfrak{B} \\ V &= \mathfrak{B} \end{aligned}$$

Setzt man diese Werthe in die obigen Gleichungen 9a ein, so ergibt sich

$$\begin{aligned} x &= 0.810 \cdot \mathfrak{R} - 0.280 \cdot \mathfrak{G} + 0.470 \cdot \mathfrak{B} \\ y &= 0.159 \cdot \mathfrak{R} + 0.466 \cdot \mathfrak{G} + 0.376 \cdot \mathfrak{B} \\ z &= 0.200 \cdot \mathfrak{R} + 0.196 \cdot \mathfrak{G} + 0.604 \cdot \mathfrak{B} \end{aligned}$$

Daraus geht hervor, daß, wenn  $\mathfrak{R} = \mathfrak{B} = 0$  und nur die Farbe  $\mathfrak{G}$  übrig bleibt, diese in der That einen negativen Werth des  $x$  hat, und außerhalb des Farben-





**Uebersicht**  
über die  
**gesammte physiologisch-optische Litteratur**  
bis zum Schlusse des Jahres 1894.

---

dreiecks  $[x, y, z]$ , jenseits seiner grün-blauen Seite liegt, während die beiden anderen Grundfarben  $R$  und  $B$  im Inneren des Dreiecks liegen. Das Roth indessen liegt der Grundfarbe  $x$  nahe genug, daß bei kleinen Aenderungen der zu Grunde liegenden Beobachtungszahlen es leicht an den Rand des Dreiecks oder in seine rothe Ecke rücken könnte, wie es die hier vorgetragene Theorie fordert.“

- S. 462. Die angegebene Uebereinstimmung der beiden aus zwei gänzlich verschiedenen Klassen von Beobachtungsdaten berechneten Werthe von  $dE$  ist hier nur, wie H. v. HELMHOLTZ noch selbst gefunden (*Wissenschaftl. Abhandl.* III S. 458—459), durch ein Versehen vorgetäuscht worden. Die beiden rechnungsmäßig richtigen Werthe sind 0.0300 und 0.0166.

Ich möchte hier noch bemerken, daß H. v. HELMHOLTZ die an dieser Stelle berechnete spectrale Vertheilung der Grundempfindungen nur als Beweis für die Brauchbarkeit der von ihm aufgestellten erweiterten Form des psychophysischen Gesetzes betrachtete und das specielle Resultat der Rechnung schon von vorne herein als sehr unsicher ansah. Er kam immer mehr zu der Ueberzeugung, daß man auf Grund besseren Beobachtungsmaterialies auch unter strenger Festhaltung des hier aufgestellten Principes zu Ergebnissen kommen würde, welche mit der in § 20 (auf Grund der von Hrn. C. DIETERICI und mir ausgeführten Messungen) angenommenen spectralen Vertheilung der Grundempfindungen im Wesentlichen übereinstimmen.

- „566 ist durch ein Versehen am Schluss des § 24 folgender Passus ausgefallen:

„Die Veränderungen der einzelnen Farben bei ihrer Zusammenstellung mit anderen beschrieb CHEVREUL<sup>1</sup> genau. Die complementären Spiegelbilder an gefärbten Glasplatten wurden von BRANDES<sup>2</sup> und OSANN beschrieben; die beste Form gab DOVE<sup>3</sup> diesem Versuch, welche später RAGONA SCINA<sup>4</sup> noch abänderte. Die Fälle, wo das inducirte Feld dem inducirenden gleich gefärbt wird, fanden FECHNER und BRÜCKE<sup>5</sup>. Daß ein schwacher Unterschied der Farben vortheilhafter sei als ein starker, zeigte H. MEYER.<sup>6</sup> Uebrigens schlossen sich die neueren Beobachter fast alle der Ansicht von PLATRAU an, daß der Contrast auf einer Veränderung der Empfindung beruhe. Ich selbst habe im vorliegenden Paragraphen die verschiedenen concurrirenden Ursachen vollständiger als bisher zu trennen gesucht und mich bemüht, zu zeigen, daß der reine simultane Contrast auf einer Veränderung der Empfindung, nicht der Beurtheilung beruhe.“

<sup>1</sup> CHEVREUL, *Mém. de l'Acad.* XI. 447—520.

<sup>2</sup> BRANDES, *Gehler's neues Wörterbuch.* Art.: Farbe. IV. 124.

<sup>3</sup> DOVE, *Pogg. Ann.* XLV. 185.

<sup>4</sup> RAGONA SCINA, *Racc. fisico-chimica.* II. 207.

<sup>5</sup> BRÜCKE, *Denkschr. d. Wien. Acad.* III. 1850. Oct. 3.

<sup>6</sup> H. MEYER, *Pogg. Ann.* XCV. 170.

- READE, J., Theorie des Sehens 110.  
 RECKLINGHAUSEN, Scheinbar verticale Meridiane 789; scheinbar verticaler Meridian und Krümmung einer geraden, peripher gesehenen Linie 741; Perspective regelmäßiger Körper 769; Beurtheilung von Linienrichtungen 810—811; Theorie seiner Normalfläche 825—829; binoculare Localisation 841; Tiefenwahrnehmung bei momentaner Beleuchtung 915; Abweichung der scheinbar rechten Winkel 955.  
 REES, Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen 283.  
 REGNAULT, Binoculare Farbmischung 926. 927.  
 REICH, Entfernung der Pupillenebene vom Scheitel der Hornhaut 80; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 REKOS, Modification des Augenspiegels von HELMHOLTZ 223.  
 REMAK, Netzhautgrube 85.  
 REUSS, A. v., Linsendicke an lebenden Augen 105.  
 RIEMANN, Mannigfaltigkeit verschiedener Dimensionen 336.  
 RITCHIE, Photometer 473.  
 LITTENHOUSE, Perspectivische Umkehrung 772. 840.  
 RITTER, J. W., Theorie der Accommodation 150; electriche Reizung des Auges 244—246. 249; starke Wirkung der Nachbilder 506.  
 RITTER, R., Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 431.  
 RITTERICH, Raddrehung des Auges 668.  
 ROBINSON, Irradiation 479.  
 ROGERS, Verschmelzung von Nachbildern zu stereoskopischer Tiefenwahrnehmung 891; Trennung der Empfindungen beider Augen 894.  
 ROGET, Stroboskopische Erscheinungen 500.  
 ROHAULT, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.  
 ROLLET, A., Vereinigung stereoskopischer Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800; binoculares Sehen 837.  
 ROLLMANN, Stereoskopie 885.  
 ROOD, O. N., Entoptische Wahrnehmung 198; subjective Farbenveränderungen 607; Herstellung stereoskopischer Zeichnungen 814.  
 ROSE, E., Santoninwirkung 361; Untersuchung der Dichromasie 372.  
 ROSOW, B., Linsendicke an lebenden Augen 105.  
 LE ROY, CH., Theorie der Accommodation 151; electriche Reizung des Auges 244.  
 RUDOLPHI, Augenleuchten 229; Ansicht über die Unempfindlichkeit des blinden Fleckes 274; Aufrechtsehen 765.  
 RÜDORF, FR., Photometer 423.  
 RUETE, C. G. TH., Optometer 129; Theorie der Accommodation 153; Augenspiegel 220. 225. 230; Raddrehung 620. 668. 669; Drehungsaxe des Auges 627; Drehungsaxen für die Augenmuskeln 665; Ophthalmotrop 667.  
 RUMFORD, Photometer 473; subjective Natur der farbigen Schatten 665.

S.

- SAKAKI, H., Rothblindheit 367.  
 SALZER, F., Zapfenzählung der Netzhautgrube 260, auf den übrigen Theilen der Netzhaut 263.  
 SAMUEL, Stereoskop 836.  
 SANSON, Benutzt die Linsen-Reflexbilder zur Diagnose von Krankheiten 26.  
 SAPHÄUTL, Photometer 477.  
 HEINER, CHR., Theorie des Sehens 110; der SCHEINER'sche Versuch 116; Accommodation und Zerstreuungskreise 130; Theorie der Accommodation 151. 153; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Aufrechtsehen 765.  
 HELLING, Idealismus 612.  
 HELSKE, R., Messungen mit dem Spectrophotometer 356; Farbenblindheit der Netzhautperipherie 373. 740.  
 HERFFER, Nachbilder 536.  
 HICKARD, Erklärung der Irradiation 479.  
 HÖTZ, Ophthalmometer 177.  
 SCHÖRLER, Methode zur Bestimmung des Winkels  $\beta$  22; Entfernung der Pupillenebene vom Scheitel der Hornhaut 80; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.  
 SCHOPENHAUER, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 249.  
 SCHRANK, VON PAULA, siehe unter P.  
 SCHROEDER, Perspectivische Umkehrung 770 bis 773.  
 SCHROEDER VAN DER KOLK, Theorie der Accommodation 156.  
 SCHULTZE, M., Netzhautdurchschnitt 31; Stäbchen und Zapfen der Netzhaut 32 bis 33; Fadenapparat 33; Bau der Zonula 137; Zapfendicke 256; Sehpurpur 265; radiäre Fasern im gelben Fleck 571.  
 SCHURMANN, J. B., Prüfung der Augenstellungen 665.  
 SCHUYDER, Astigmatismus 183.  
 SCHWALBE, Netzhautdurchschnitt 31.



## Vorbemerkung.

---

Bei der Benutzung der Litteratur-Uebersicht ist Folgendes zu beachten.

Wenn bei Zeitschriften die Bandzahl fehlt, so steht die citirte Abhandlung in dem Jahrgang, unter dem sie eingeordnet ist.


Wird eine in einem bestimmten Jahre erschienene Abhandlung gesucht, so muß stets das vorausgehende, wie auch das nachfolgende Jahr durchgesehen werden, da eine genaue Einordnung nicht immer möglich war, indem oftmals der Titel eines Zeitschriftbandes eine andere Jahreszahl trägt, als diejenige, unter der die einzelnen Hefte erschienen sind.

Die Grenze zwischen „älterer“ und „neuerer“ Litteratur, deren Trennung in manchen Paragraphen ausgeführt werden mußte, bildet in den meisten Fällen das Jahr 1866. Da, wo sie aus besonderen Gründen anders liegt, genügt zur schnellen Orientirung ein Blick auf die vorangestellten Jahreszahlen.

Die bei den Zeitschrifttiteln benutzten Abkürzungen sind zwar nicht gleichmäßig durchgeführt, aber stets so gewählt, daß für jeden auch nur einigermaßen Litteraturkundigen kein Zweifel möglich sein wird.

Die ausländische Litteratur liefs sich leider nicht so vollständig zusammenstellen wie die deutsche; die meisten Lücken werden sich in den Angaben fremdsprachlicher Uebersetzungen deutscher Werke finden.

Bei Werken, welche in zahlreichen Auflagen erschienen sind, war es nicht immer möglich, alle Auflagen anzuführen; doch ist fast ausnahmslos die erste und letzte Auflage angegeben.



# Inhaltsverzeichnis zur Litteraturübersicht.

	No.
<b>I. Werke, welche die gesammte physiologische Optik, größere Abschnitte oder allgemeine Principien derselben behandeln . . . .</b>	1—103
<b>II. Tractus opticus und Gehirnlocalisation, soweit sich diese auf den Gesichtssinn bezieht . . . . .</b>	104—311
<b>III. Specielle Litteratur zur physiologischen Optik</b>	
§ 1. <b>Formen des Sehorgans im Allgemeinen.</b>	
1. Historisches . . . . .	312—314
2. Entwicklungsgeschichte; allgemeine, specielle und vergleichende Anatomie der Thieraugen . . . . .	315—441
3. Allgemeine Anatomie des menschlichen Auges . . . . .	442—449
§ 2. <b>Sehnhaut und Hornhaut. Dimensionen des Auges. Ophthalmometrie. Intraocularer Druck . . . . .</b>	450—664
§ 3. <b>Die Uvea.</b>	
1. Anatomie und Physiologie der Iris und des Ciliarkörpers. — Das Tapetum lucidum . . . . .	665—805
2. Messung der Pupillenweite . . . . .	806—830
3. Vordere Kammer . . . . .	831—836
§ 4. <b>Die Netzhaut und der Sehnerv . . . . .</b>	837—1001
§ 5. <b>Die Krystalllinse . . . . .</b>	1002—1040
§ 6. <b>Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper . . . . .</b>	1041—1067
§ 7. <b>Umgebung des Auges . . . . .</b>	1068—1097
§ 9. <b>Gesetze der Brechung in Systemen kugelliger Flächen.</b>	
1. Aeltere Litteratur . . . . .	1098—1114
2. Neuere Litteratur . . . . .	1115—1143
§ 10. <b>Brechung der Strahlen im Auge.</b>	
1. Das optische System des Auges . . . . .	1144—1356
2. Messung der Brechungsverhältnisse . . . . .	1357—1385
3. Das Gesichtsfeld und die Perimeter . . . . .	1386—1499
§ 11. <b>Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.</b>	
1. Aeltere Litteratur . . . . .	1500—1529
2. Größe und Form der Zerstreuungskreise . . . . .	1530—1563
3. Allgemeines über Refraction und Accommodation . . . . .	1564—1649
4. Accommodationsbreite . . . . .	1650—1722
5. Optometrie, Optometer und Phakometer . . . . .	1723—1820



	No.
6. Massen-Untersuchungen in Bezug auf Refraction und Sehschärfe . . . . .	1821—1874
7. Brillen-Scalen und besondere Brillenformen . . . . .	1875—1926
8. Refraktionsanomalien, ihre Entstehung und Heilung . . . . .	1927—2105
9. Historisches . . . . .	2106—2117
§ 12. Mechanismus der Accommodation.	
1. Aenderung der Pupillenweite. (Siehe § 3, 1 u. 2.)	
2. Accommodation bei Aphakie . . . . .	2118—2132
3. Mechanismus der Accommodation . . . . .	2133—2367
§ 13. Von der Farbenzerstreuung im Auge . . . . .	2368—2405
§ 14. Monochromatische Abweichungen.	
1. Aeltere Litteratur . . . . .	2406—2458
2. Regulärer Astigmatismus . . . . .	2459—2674
3. Sphärische Aberration und mangelnde Centrirung des Auges . . . . .	2675—2694
4. Irregulärer Astigmatismus . . . . .	2695—2723
§ 15. Die entoptischen Erscheinungen . . . . .	2724—2804
§ 16. Das Augenleuchten und der Augenspiegel.	
1. Das Augenleuchten und der Augenspiegel . . . . .	2805—3155
2. Schattenprobe, Skiaskopie oder Retinoskopie . . . . .	3156—3259
3. Photographiren des Augenhintergrundes . . . . .	3260—3270
§ 17. Von der Reizung des Sehnervenapparates.	
1. Mitempfindungen . . . . .	3271—3328
2. Mechanische Reizung . . . . .	3329—3368
3. Elektrische Reizung . . . . .	3367—3390
§ 18. Von der Reizung durch Licht.	
1. Blinder Fleck und Ort der lichtempfindlichen Schicht . . . . .	3391—3453
2. Vorgänge in der Netzhaut und in dem Sehnerven bei einfallendem Lichte. — Sehpurpur . . . . .	3454—3618
3. Genauigkeit des Sehens. — Sehproben . . . . .	3619—3845
§ 19. Die einfachen Farben.	
1. Aeltere Litteratur (bis NEWTON) . . . . .	3846—3857
2. NEWTON und GOETHE . . . . .	3858—3932
3. Andere physikalische Farbentheorien . . . . .	3933—3950
4. Nuancenunterschiede und Grenzen des Spectrums . . . . .	3951—4007
5. Farbenharmonie und Vergleich mit den Tonintervallen . . . . .	4008—4031
6. Der Farbensinn bei Thieren und verschiedenen Völkerstämmen. — Die historische und individuelle Entwicklung des Farbensinnes . . . . .	4032—4180
§ 20. Die zusammengesetzten Farben.	
1. Aeltere Litteratur über normales Farbensehen und über Farben- theorien . . . . .	4181—4235
2. Aeltere Litteratur über Farbenblindheit . . . . .	4236—4297
3. Neuere Litteratur über normales Farbensehen und über Farben- blindheit	
a) Zusammenfassende Darstellungen der Farbenlehre . . . . .	4291—4322
b) Specielles über normales und anomales Farbensehen . . . . .	4323—4337
c) Neuere Theorien der Farbenempfindung . . . . .	4338—4358
d) Peripheres Farbensehen . . . . .	4359—5005
e) Methoden, Apparate, Farbenproben u. s. w. zur Untersuchung des Farbensinnes . . . . .	5006—5157

	No.
f) Zur Casuistik der Farbenblindheit . . . . .	5158—5223
g) Xantopsie (Santoninwirkung), Erythroopsie, Chloropsie und Kyanopsie . . . . .	5224—5304
h) Praktische Bedeutung und Verbreitung der Farbenblindheit .	5305—5385
<b>21. Von der Intensität der Lichtempfindung.</b>	
1. Psychophysisches Gesetz, Adaptation, untere Reizschwelle, Gröfse des Eigenlichtes . . . . .	5386—5564
2. Isochrome und heterochrome Photometrie . . . . .	5565—5675
3. Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtung . . . . .	5676—5703
4. Irradiation . . . . .	5704—5814
<b>22. Die Dauer der Lichtempfindung . . . . .</b>	<b>5815—6074</b>
<b>23. Die Veränderungen der Reizbarkeit . . . . .</b>	<b>6075—6322</b>
<b>24. Vom Contraste . . . . .</b>	<b>6323—6501</b>
<b>25. Verschiedene subjective Erscheinungen . . . . .</b>	<b>6502—6577</b>
<b>26. Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen . . . . .</b>	<b>6578—6638</b>
<b>27. Die Augenbewegungen . . . . .</b>	<b>6639—6959</b>
<b>28. Das monoculare Gesichtsfeld . . . . .</b>	<b>6860—6976</b>
<b>29. Die Richtung des Sehens . . . . .</b>	<b>6977—7101</b>
<b>30. Wahrnehmung der Tiefendimension.</b>	
1. Tiefenwahrnehmung ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder . . . . .	7102—7202
2. Stereoskopie und binoculare Tiefenwahrnehmungen . . . . .	7203—7437
<b>31. Das binoculare Doppeltsehen . . . . .</b>	<b>7438—7677</b>
<b>32. Wettstreit der Sehfelder . . . . .</b>	<b>7678—7752</b>
<b>33. Kritik der Theorien . . . . .</b>	<b>7753—7833</b>

.

.

.

.

.

• •

.

• • • • •

• • • • •

• • • • •

I.

Werke, welche die gesamte physiologische Optik,  
größere Abschnitte oder allgemeine Principien derselben  
behandeln.

---

1600.  
1. FABRICIUS AB AQUAPENDENTE *De visione*. Ven.  
1604.
2. J. KEPLER. *Paralipomena ad Vitellionem*. Frankf. Cap. 5.  
1618.
3. FRANCISCUS AGUILONIUS. *Opticorum libri sex*. Antwerpiae.  
1619.
4. SCHREINER. *Oculus sive fundamentum opticum, in quo radius visualis eruitur, sive visionis in oculo sedes cernitur et anguli visorii ingenium reperitur*. Oenip.  
1669.
5. F. A. JAN et W. KÜFFNER. *De visu*. Lipsiae.  
1686.
6. G. BRIGGS. *Ophthalmo-graphia, sive oculi ejusque partium descriptio anat., nec non, ejusdem nova visionis theoria*. Lugduni Batavorum.  
1687.
7. FABRICIUS AB AQUAPENDENTE. *Opera omnia anatomica et physiologica*. Lipsiae.  
S. 187—248.  
1788.
8. J. JURIN. *Essay upon distinct and indistinct vision*. In: R. Smith: A complete system of optics. Cambridge 1788. (Deutsch von Kästner. Altenburg 1755.)  
1740.
9. LE CAT. *Traité des sens*. Rouen. 1740. — Amsterdam 1744.  
1746.
10. P. CAMPER. *Dissert. de visu*. Lugd. Batav.  
1758.
11. J. T. C. GRIMM. *De visu*. Gottingae.  
1759.
12. PORTERFIELD. *Treatise on the eye, the manner and phaenomena of vision*. Edinb.  
1761.
13. A. KIRCHER. *Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta*. Amstellodami.  
1766.
14. A. HALLER. *Elementa physiologiae corporis humani*. Lausanne 1757—1766.  
1771.
15. J. F. HASELER. *Betrachtungen über das menschliche Auge*. Hamburg.  
1776.
16. PRIESTLEY. *Geschichte der Optik*. Aus dem Englischen übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen von KLÜGEL. Leipzig.

1778.  
17. A. HALLER. *De functionibus corporis humani praecipuarum partium.* Bern 1777 bis 1778.
1780.  
18. ELLIOT. *Observations on the senses.* 1780. Deutsche Übers.: *Beobachtungen über die Sinne.* Leipzig 1785.
1819.  
19. J. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne.* Bd. I. *Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht.* Prag. 1802.
1802.  
20. J. G. MARKWORT. *Beweis der Activität des Sinnes des Gesichts.* Leipzig. 1822.
1822.  
21. A. E. RÖDENBECK. *Quaedam ad theoriā visus pertinentia.* 1823.
1823.  
22. L. C. A. NILSON. *Katechismus der Licht- oder Seh-Lehre.* Leipzig. 1825.
1825.  
23. J. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne.* Bd. II. *Neue Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht.* Berlin.
24. LEBOT. *Nouvelle théorie de la vision.* Paris. 1826.
1826.  
25. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes.* Leipzig. 1827.
1827.  
26. TOURTUAL. *Die Sinne des Menschen.* Münster. 1828.
1828.  
27. MÜNCKE. Artikel: *Gesicht und Sehen* in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Leipzig. 1830.
1830.  
28. A. HURCK. *Das Sehen seinem äußeren Prozesse nach.* Dorpat u. Göttingen. 1831.
1831.  
29. D. BREWSTER. *A treatise on optics.* 1832.
1832.  
30. F. ARNOLD. *Anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge der Menschen.* Heidelberg und Leipzig. 1834.
1834.  
31. C. M. N. BARTELS. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes.* Berlin. 1836.
1836.  
32. A. W. VOLKMANN. *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns.* Leipzig. 1837.
1837.  
33. J. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie des Menschen.* Coblenz. Bd. II. S. 276—333. 1839.
1839.  
34. F. W. G. RADICKE. *Handbuch der Optik.* Bd. II. S. 211—281. 1842.
1842.  
35. BUROW. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges.* Berlin. 1844.
1844.  
36. MOSER. *Über das Auge.* Dove's Repertorium der Physik. Berlin. Bd. V. 1845.
1845.  
37. TH. RUETE. *Lehrbuch der Ophthalmologie.* 1846.
1846.  
38. A. W. VOLKMANN. Artikel: *Sehen* in R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiologie. Braunschweig. 1847.
1847.  
39. A. S. FIEDLER. *De sensu videndi.* 1847—53.
- 1847—53.  
40. E. BRÜCKE. *Berichte über physiologische Optik in: Fortschritte der Physik.* Berlin G. Reimer. Bd. I—V. 1852.
1852.  
41. C. LUDWIG. *Lehrbuch der Physiologie des Menschen.* Heidelberg. Bd. I. S. 192—263. 1853.
1853.  
42. C. STELLWAG VON CARION. *Die Ophthalmologie vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus.* 2 Bände. Erlangen 1853—1858.

- 1854.
43. TH. RUETE. *Lehrbuch der Ophthalmologie*. 2. Aufl.
44. L. L. VALLÉE. *Cours complet sur la vision de l'homme et des animaux*. Paris. 1856.
45. A. FICK. *Die medicinische Physik*. Braunschweig. 1861.
46. C. S. CORNELIUS. *Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens*. Halle. 1865.
47. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut*. Breslau.
48. H. SCHEFFLER. *Die physiologische Optik*. 2 Bde. Braunschweig. 1866.
49. A. FICK. *Die medicinische Physik*. 2. Aufl. Braunschweig. 1867.
50. A. v. GRAEFE. *Sehen und Sehorgan*. Berlin.
51. H. HELMHOLTZ. *Handbuch der physiologischen Optik*. Leipzig. (In Lieferungen erschienen während der Jahre 1856—1867.) 1868.
52. A. CLASSEN. *Gesammelte Abhandlungen über physiologische Optik*. Berlin.
53. H. HELMHOLTZ. *Optique physiologique traduit par Javal et Klein*. Paris.
54. — *Die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens*. Preussische Jahrbücher. XXI. S. 149—171., S. 263—290 u. S. 403—435. (Abgedruckt in: Vorträge und Reden. Bd. I. Braunschweig. 1884.)
- 1869.
55. F. COHN. *Licht und Leben*. Berlin.
56. H. GEROLD. *Die ophthalmologische Physik und ihre Anwendung auf die Praxis*. 2. Thle. Wien. (1869 u. 1870.)
57. A. RABUTEAU. *Des Phénomènes phys. de la Vision*. Paris. 1871.
58. J. BERNSTEIN. *Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- und Muskel-system*. 1872.
59. H. KAISER. *Compendium der physiologischen Optik für Mediciner und Physiker*. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 368 S. 1873.
60. GERSTENBERG. *Randglossen zur Theorie des Sehens*. Progr. d. Realschule zu Osnabrück. 1872/73.
61. J. v. HASNER. *Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges*. Prag. 1874.
62. WUNDT. *Grundsätze der physiologischen Psychologie*. Leipzig.
63. A. VULPIAN. *Note relative à l'influence de l'extirpation du ganglion cervical supérieur sur les mouvements de l'iris*. Arch. de physiol. S. 177. 1875.
64. J. BERNSTEIN. *Fünf Sinne des Menschen. II. Der Gesichtssinn*. S. 46—153. Internat. wiss. Biblioth. XII. Bd. Leipzig. Brockhaus.
65. J. DELBOEUF. *Théorie générale de la sensibilité*. Paris. 1876.
66. H. AUBERT. *Grundsätze der physiologischen Optik*. Gräfe-Sämisch, Handb. d. ges. Augenheilkde. II. Cap. 9. Leipzig. (Auch separat.)
67. A. CLASSEN. *Zur Physiologie des Gesichtssinnes*. (Sammlung physiologischer Abhandlungen, herausg. von W. PREYER. 1. Reihe. 1. Heft.) Jena.
68. — *Physiologie des Gesichtssinnes dargestellt auf Grundlage I. Kant's*. Braunschweig. 1876. Vieweg.
69. DELBOEUF. *Théorie générale de la sensibilité*. Bruxelles.
70. H. HARTSHORNE. *On some disputed points in physiological optics*.
71. H. HELMHOLTZ. *Optisches über Malerei*. Popul.-wissensch. Vorträge. III. S. 55—97. Abgedruckt in: Vorträge und Reden. Bd. II. Braunschweig. 1884.
72. J. L. S. JOLY. *Théorie physique de la vision*. Paris.
73. H. MAGNUS. *Das Auge in seinen ästhetischen und culturhistorischen Beziehungen*. Breslau. 1876. 158 S.

1877.  
74. M. EDWARDS. *Du sens de la vue.* Paris. Masselon. 1877.
1878.  
75. R. E. DUDGEON. *The human Eye.* London, Hardwicke u. Bogue. 92 S.  
76. GIRAUD-TEULON. *L'oeil, notions élémentaires etc.* 2. Aufl. Paris, Ballière. 173 S.
1879.  
77. A. FICK, W. KÜHN und E. HERING. *Physiologie des Gesichtssinnes.* Handb. d. Physiol. Herausg. v. L. Hermann. III. Bd. 1. Theil. Leipzig.  
78. A. v. GRAEFE. *Sehen und Sehorgan.* Vortrag. 2. Aufl. Berlin. Habel. 47 S.  
79. H. KNAPP. *Die geschichtliche Entwicklung der Lehre vom Sehen.* Wiesbaden. Bergmann.
1880.  
80. A. ALT. *Lectures on the human eye in its normal and pathological conditions.* New-York. Putnam's Son. 1880.  
81. J. BERNSTEIN. *Das Lichtbild und das Auge.* Natur u. Cultur. § 11. S. 168—194. Leipzig, Albrecht. 1880. 300 S.  
82. M. A. ISIGNOXIS. *Die Theorie des Sehens und der Sinne überhaupt bei Aristoteles.* Diss. Basel. 59 S.  
83. WUNDT. *Grundzüge der physiologischen Psychologie.* 2. Aufl. Leipzig.
1881.  
84. L. BESSER. *Was ist Empfindung?* Bonn.  
85. G. B. BONO. *Di un estremo d'ottica fisiologica; studio su un vecchio di 104 anni.* Arch. per l'antrop. XI. S. 133.  
86. H. P. BOWDITCH. *A comparison of sight and touch.* Journ. of Physiol. III. S. 232—245.  
87. A. GOLDSCHIEDER. *Die Lehre von den specifischen Energien der Sinnesorgane.*  
88. J. HOPPE. *Psychologisch-physiologische Optik in experimenteller psychophysischer Darstellung.* Leipzig. Wiegand. 371 S.  
89. SZOKALSKI. *Die Folgen der Sehnervenreizung.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 383.
1882.  
90. BOWDITCH und SOUCHARD. *A comparison of sight and touch.* Journ. of phys. III. 3. S. 1.
1883.  
91. J. LE CONTE. *Die Lehre vom Sehen.* Internat. wiss. Bibliot. LV. Leipzig. XII. S. 261.  
92. V. URBANTSCHITSCH. *Zur Lehre von den Sinnesempfindungen.* Wien. med. Wochenschr. XXXIII. S. 554.
1884.  
93. G. LÖCHERER. *Das Auge und das Sehen.* Nach Dr. CARTER's Eyesight. Berlin. 210 S.
1885.  
94. J. ROSENTHAL. *Die specifischen Energien der Nerven.* Biol. Centralbl. IV. No. 2—5.
1886.  
95. JAVAL. *Vision.* Nouv. dict. de méd. et chir. prat. Paris. XXXIX. S. 516.  
96. E. MACH. *Beiträge zur Analyse der Empfindungen.* Jena, Fischer. 168 S.
1887.  
97. W. WUNDT. *Grundzüge der physiologischen Psychologie.* 3. Aufl. Leipzig.
1888.  
98. GRANDCLÉMENT. *L'oeil et le sens de la vue.* Paris. Asselin et H. 1888.
1890.  
99. E. WIEDEMANN. *Zur Geschichte der Lehre vom Sehen.* Wiedemann's Ann. XXXIX. S. 470—474.
1891.  
100. G. HIRTH. *Aufgaben der Kunstphysiologie.* München. Hirth. 1891. In 2 Theilen. 611 S.
1893.  
101. W. WUNDT. *Grundzüge der physiologischen Psychologie.* 4. Aufl. Leipzig.

1894.

102. K. LASSWITZ. *Ueber psychophysische Energie und ihre Faktoren*. Arch. f. systemat. Philos. I. 1.  
 103. TH. YOUNG. *Oeuvres ophthalmologiques*. Französisch von TSCHERNING. Kopenhagen. Høst u. Søn. 248 S.

## II.

## Tractus opticus und Gehirnlocalisation, soweit sich diese auf den Gesichtssinn bezieht.

Hinsichtlich weiterer Litteraturangaben muß auf die Zusammenstellungen in den entsprechenden physiologischen Werken verwiesen werden.

1876.

104. F. GOLTZ u. E. GERGENS. *Ueber die Störungen des Sehvermögens nach Verstümmelung des Großhirns*. Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. 15—27. XIV. 416—420.  
 105. F. PLENK. *Ueber Hemipie und Sehnervenkreuzung*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 140—158.

1877.

106. M. DUVAL. *Relations de la sixième et de la troisième paire des nerfs crâniens*. Gaz. d. hôp. S. 1115.

1878.

107. L. LUCIANI u. A. TAMBURINI. *Sulle funzioni del cervello. Ric. speriment. sui centri psicomotori corticali*. Reggio-Emilia. 1878. S. 35.

1879.

08. CURSCHMANN. *Ueber die centralen Centren des Gesichtssinnes*. Centralbl. f. Augenheilkde. III. Juni. S. 181.  
 09. M. DUVAL. *Der wahre Ursprung der motorischen Nerven des Auges*. Gaz. hebdom. 1879. No. 27.  
 10. CL. GALLOPAIN. *Le Pli Courbe n'est ni le siège de la perception des impressions visuelles ni le centre des mouvements des yeux*. Ann. méd.-psychol. (6). II. 2. S. 177—188.  
 11. F. GOLTZ. *Ueber die Verrichtungen des Großhirns. 3. Abth.* Arch. f. d. ges. Physiol. XX. 1. S. 1—54.  
 12. L. LUCIANI u. A. TAMBURINI. *Sui centri psicosensori corticali*. Mailand.  
 13. MOELI. *Versuche an der Großhirnrinde des Kaninchens*. Virchow's Arch. LXXXVI. 3.  
 14. H. MUNK. *Physiologie der Sehsphäre der Großhirnrinde*. Arch. f. Anat. u. Physiol. III. S. 581—592. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 255—266.  
 5. J. STILLING. *Notiz über die Bedeutung der Occipitallappen des Gehirns für das Sehen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 33—34.

1880.

6. BLASCHKO. *Das Sehcentrum bei Fröschen*.  
 7. H. MUNK. *Ueber die Sehsphären der Großhirnrinde*. Mon.-Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 3. Juni. S. 485.  
 8. — *Ueber die Sehsphäre und die Riechosphäre der Großhirnrinde*. Arch. f. Anat. u. Physiol. IV. S. 149—156.  
 9. — *Weiteres zur Physiologie der Sehsphäre*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 28.  
 10. SCHNELLER. *Ueber den Sitz der Farbenempfindung*. Deutsch. med. Wochenschr. No. 42. — Tagebl. d. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Danzig. Ophthalm. Sect. S. 108 u. 254.



121. C. WERNICKE. *Die besonderen Verhältnisse der Projection, die, nach Munk's Thierversuchen zu schließen, für die Sehsphären des Menschen gelten müßten.* Verhandl. d. Berl. physiol. Ges. No. 2/3. S. 12. Arch. f. Anat. u. Physiol. Suppl.-Bd. 1880. S. 184—186.

## 1881.

122. F. C. DALTON. *Centres of vision in the cerebral hemispheres.* Med. Rec. XIX. 13. (No. 542.) S. 837.  
 123. S. EXNER. *Untersuchungen über die Localisation der Functionen in der Großhirnrinde des Menschen.* Wien. 1881. 180 S.  
 124. F. GOLTZ u. D. FERRIER. *On the localisation of function in the cortex cerebri.* Internat. med. Congr. in London. I. 218—243.  
 125. H. MUNK. *Zur Physiologie der Großhirnrinde.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 455—459. — Erlenmeyer's Centralbl. f. Nervenheilkde. S. 388.  
 126. — *Funktionen der Großhirnrinde.* Berlin, Hirschwald.  
 127. J. SAMELSON. *Zur Frage des Farbensinncentrums.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47. 50.  
 128. TAMBURINI. *On cerebral localisation and hallucinations.* Transact. of the intern. med. Congr. in London. Psychiatr. Sect. III. S. 631.  
 129. V. URBANTSCHITSCH. *Beobachtung von physiologischer Seelenblindheit.* Wien. med. Jahrb. S. 543.

## 1882.

130. N. E. BRILL. *A case of destructive lesion of the cuneus, accompanied by color-blindness.* Americ. Journ. Neurol. u. Psychiatr. New-York. I. S. 356.  
 131. — *Color-blindness from a cerebral lesion.* Chicago M. Rev. V. S. 162.  
 132. F. C. DALTON. *Centres of vision in the cerebral hemispheres.* Med. Rec. XIX. 13. S. 837.  
 133. DICKINSON. *Optic chiasma-visual centres.* The Alienist and Neurologist. S. 358.  
 134. DRESCHFELD. *A further contribution on the course of the optic nerve fibres in the brain.* Brain. V. S. 118.  
 135. J. GAD. *Ueber einige Beziehungen zwischen Nerv, Muskel und Centrum.* Festschrift zur dritten Säcularfeier der Alma Julia Maximiliana, gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. Bd. II. S. 43.  
 136. W. J. MICKLE. *Localisation of the visual centres of the central cortex.* Med. Times and Gaz. No. 1648. 16. Januar.  
 137. PARINAUD. *Du siège cérébral des images accidentelles ou consécutives.* Soc. de Biol. Sitzg. v. 22. April. Gaz. des Hôp. S. 459.  
 138. — *Des rapports croisés et directs des nerfs optiques avec les hémisphères cérébrales.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 10. S. 179.  
 139. SAMELSON. *Seelenblindheit beim Menschen.* Berl. klin. Wochenschr. No. 20.  
 140. SCHNELLER. *Zur Frage vom Farbensinncentrum.* Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 73.  
 141. V. URBANTSCHITSCH. *Ueber den Einfluß von Trigeminsreizen auf die Sinnesempfindungen, insbesondere auf den Gesichtssinn.* Arch. f. d. ges. Physiol. XXX. S. 129.

## 1883.

142. W. V. BECHTEREW. *Experimentelle Ergebnisse über den Verlauf der Sehnervfasern und ihrer Bahn von den Kniehöckern an den Vierhügeln.* Neurol. Centralbl. No. 12.  
 143. — *Ueber den Verlauf der die Pupille verengenden Nervenfasern und über die Localisation eines Centrums für die Iris und Contraction der Augenmuskeln.* Arch. f. d. ges. Physiol. XXXI. S. 60.  
 144. — *Ueber die Localisation des Centrums der Pupillenbewegung.* Wratsch. No. 15.  
 145. — *Ueber die Function der Sehhügel.* Wratsch. No. 4 u. 5. Neurol. Centralbl.  
 146. — *Zur Physiologie des Körpergleichgewichts. Die Function der centralen grauen Substanz des dritten Hirnventrikels.* Arch. f. d. ges. Physiol. XXXI. S. 479.  
 147. BELLONCI. *Les lobes optiques des oiseaux.* Arch. Ital. de Biol. IV. S. 21.  
 148. J. DELBOEUF. *Un nouveau centre de vision dans l'oeil humain.* Rev. Scientif. XXXII. S. 167.  
 149. C. V. MONAKOW. *Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der sog. Sehsphäre zu den infracorticalen Opticuscentren und zum Nervus opticus.* Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XIV. S. 699.

150. C. v. MONAKOW. *Des centres d'origines des nerfs optiques et de leur relation avec l'écorce cérébrale.* Soc. helvét. des sc. nat. Zürich. 1883. Arch. des sc. phys. et nat. 1883. S. 133.
151. H. MUNK. *Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbelthieren.* Sitzgs.-Ber. d. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin. XXXIV. 12. Juli.
152. A. NIEDEN. *Zur Lage des Sehcentrums beim Menschen.* Ber. d. XV. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 4.
153. L. RANNEY. *The corpora quadrigemina, with remarks concerning the diagnosis and localisation of lesions affecting sight.* New-York. 83 S. 1884.
154. ANAGLINO. *Riassunto delle attuali nostre cognizioni sui rapporti dell'apparecchio visivo coi centri nervosi.* Ann. di Ottalm. S. 3.
155. A. ANGELUCCI. *Sul decorso delle fibre nel chiasma dei mammiferi e sul centro visivo delle corteccie cerebrali.* Gaz. med. di Roma. X. 20.
156. W. v. BROETTEREW. *Ueber die nach Durchschneidung der Sehnervfasern im Innern der Großhirnhemisphären auftretenden Veränderungen.* Neurol. Centralbl. S. 1.
157. — *Ueber die Function der Vierhügel.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIII. S. 413.
158. BELLONCI. *La terminaison centrale du nerf optique chez les mammifères.* Arch. Ital. de Biol. S. 405.
159. BIANCHI. *Sur les compensations fonctionnelles de l'écorce cérébrale.* Arch. Ital. de Biol. S. 291.
160. P. BUNGE. *Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat.* Halle. 36 S. Habilit.-Schr.
161. S. M. BURNETT. *Are there separate centres for light, form- and color-perception.* Arch. of Med. New York. Vol. XII. No. 2. S. 97.
162. A. CHRISTIANI. *Zur Physiologie des Gehirns.* Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1883/84. No. 15 u. 16.
163. — *Zur Kenntnis der Functionen des Großhirns beim Kaninchen.* Berl. akad. Sitzgs.-Ber. XXVIII. S. 635.
164. FERRIER u. YEO. *On the effects of lesion of the cerebral hemispheres.* Proc. Roy. Soc. XXXVI. S. 229.
165. F. GOLTZ. *Zur Localisation im Großhirn.* Berl. klin. Wochenschr. XXI. No. 20.
166. — *Ueber die Verrichtungen des Großhirns.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIV. S. 450.
167. J. HAMILTON. *Destruction of occipital lobe accompanied by blindness.* Brain. XXV. 4. S. 89.
168. — *On the cortical connexions of the optic nerves.* Proc. Roy. Soc. London. XXXVII. S. 1.
169. J. LOEB. *Die Sehstörungen nach Verletzung der Großhirnrinde.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIV. S. 67, 115.
170. L. LUCIANI. *On the sensorial localisation in the cortex cerebri.* Brain. VII. S. 144.
171. H. MUNK. *Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören.* Berl. Akad. Sitzgs.-Ber. XXIV. S. 1.
172. SCHIFF. *Ueber die Functionen des Gehirns.* Pflüger's Arch. f. Physiol. XXXII. S. 417.
173. P. ZENNER. *Cerebral localisation; the centres for vision.* Med. Rec. New-York. XXVI. S. 146. 1885.
174. A. ANGELUCCI. *Sulla struttura del chiasma dei mammiferi e sul centro visivo della corteccia.* Bull. d. r. Acad. med. di Roma. XI. S. 17.
175. BELLONCI. *Sulla terminazione centrale del nervo ottico nei mammiferi.* Bologna Mem. (4.) VI. S. 199—204.
176. — *Intorno alla terminazione centrale dei nervi ottici nei mammiferi.* Rendic. d. sess. d. R. Acad. delle scienze di Bologna. S. 87.
177. O. BERGER. *Zur Localisation der corticalen Sehschärfe beim Menschen.* Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 1.
178. S. M. BURNETT. *Are there separate centres for light, form- and color-perception?* Washington Bull. Phil. Soc. VII. 72.
179. A. CHRISTIANI. *Zur Physiologie des Gehirns.* Berlin. Enslin. 1885. 176 S.

180. DEBENEDETTI. *Determinazione del centro del movimento del globo oculare.* Att della R. Acad. di Med. di Torino.
  181. ECKHARD. *Beiträge zur Geschichte der Experimentalphysiologie des Nervensystems Geschichte der Physiologie der motorischen Nerven des Auges.* Eckhard's Beitr. z Anat. u. Physiol. d. Auges. XI. S. 115.
  182. EDINGER. *Ueber den Verlauf der centralen Hirnnervenbahnen.* Arch. f. Psychiatr u. Nervenkrankh. XVI. S. 858.
  183. S. EXNER. *Kritischer Bericht über die neueren physiologischen Untersuchungen, die Großhirnrinde betreffend.* Biol. Centralbl. V. No. 1 u. 2.
  184. CH. FÉRET. *Trois autopsies pour servir à la localisation des troubles de la vision d'origine.* Arch. de Neurol. No. 26.
  185. D. FERRIER. *A record of experiments on the effects of lesion of different regions of the cerebral hemisphere.* Philos. Transact. of the Roy. Soc. of London. Vol. 175. Part II. S. 479.
  186. FILIA. *Contribuzione clinica allo studio della localizzazione cerebrale.* Rivist. internaz. di med. e chir. No. 4.
  187. v. GUDDEN. *Ueber die Frage der Localisation der Functionen der Großhirnrinde.* Neurol. Centralbl. S. 411.
  188. GÜNTHER. *Klinische Beiträge zur Localisation des Großhirnmantels.* Zeitschr. f. klin. Med. XI. S. 1.
  189. HÖGGER. *Ueber die Detailanordnung des centralen und centrifugalen Theiles der Augenbewegungen associirenden Nervenmechanismus.* Pest. med. chir. Pressa. XXI. S. 65. 86.
  190. P. KASCHANOWSKI. *Die oculo-pupillären Centren.* Wien. med. Jahrb. 4. S. 445.
  191. C. v. MONAKOW. *Ueber den Zusammenhang der Sehnerven mit den Sehsphären.* Verh. d. physiol. Ges. Berlin. 1885. 9. Arch. f. Psychiatr. XII. Heft 3. XIV. Heft 3. XVI. Heft 1.
  192. — *Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der sogenannten Sehsphäre zu den infracorticalen Opticuscentren und zum Nervus opticus.* Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVI. 1. S. 151—200. 319—363.
  193. — *Einiges über die Ursprungscentren des Nervus opticus und über die Verbindungen derselben mit der Sehsphäre.* Verh. d. physiol. Ges. in Berlin. No. 6, 7 u. 8. Arch. f. Physiol. S. 829.
  194. R. RICHTER. *Zur Frage der optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns.* Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVI. S. 639.
  195. — *Ueber die optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns.* Allgem. Zeitschr. f. Psychiatr. XLI. S. 636.
  196. WILBRAND. *Ueber concentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei functionellen Störungen der Großhirnrinde und über Incongruenz hemianopischer Gesichtsfelddefecte.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 73.
  197. WISING. *Ett bidrag till frågan om de cerebrala localisationerna.* Hygiea. XLVII. 4. S. 239.
- 1886.
198. W. v. BRUCHTEREW. *Ueber die Function der Sehhügel bei Thieren und den Menschen.* (Russisch.) Westnik klin. i sudebnoj Psychiatr. i Neuropath. III. 3.
  199. A. CHRISTIANI. *Zur Physiologie des Gehirns.* du Bois' Arch. f. Physiol. S. 559.
  200. — *Sehsphäre und Opticus.* Tagebl. d. 59. Vers. dtach. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 143.
  201. L. DARSCHEWITSCH. *Ueber die sogenannten primären Opticuscentren und ihre Beziehung zur Großhirnrinde.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abth. S. 249.
  202. S. EXNER. *Ueber neuere Forschungsergebnisse, die Localisation in der Hirnrinde betreffend.* Wien. med. Wochenschr. No. 49, 50 u. 51.
  203. S. EXNER und J. PANETH. *Ueber Sehstörungen nach Operationen im Bereich der Vorderhirns.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 62.
  204. v. GUDDEN. *Ueber die Frage der Localisation der Functionen der Großhirnrinde.* Zeitschr. f. Psychiatr. Bd. 42.
  205. HITZIG. *Sehsphäre und Opticus.* Tagebl. d. 59. Vers. dtach. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 142.
  206. PH. KNOLL. *Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns.* Sitzgs.-Ber. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 94. 3.

207. J. LOEB. *Beiträge zur Physiologie des Großhirns*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX. S. 265.
  208. LUCIANI u. SEPPILLI. *Die Functionslocalisation auf der Großhirnrinde*. Deutsch von O. FRÄNKEL. Leipzig. Denicke. 1886.
  209. H. MUNK. *Sehsphäre und Opticus*. Tagebl. d. 59. Vers. dtseh. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 142.
  210. — *Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbelthieren*. Sitzgs.-Ber. d. preuss. Akad. d. Wiss. Heft 7, 8 u. 9.
  211. — *Demonstration von Gehirnen mit exstirpirten Sehsphären*. Tagebl. d. 59. Vers. dtseh. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 415.
  212. C. REINHARD. *Zur Frage der Hirnlocalisation*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVII. S. 717. XVIII. S. 240.
- 1887.
213. W. v. BECHTEREW. *Die Bedeutung der Sehhügel auf Grund von experimentellen und pathologischen Daten*. Virchow's Arch. Bd. 110. S. 102—154, 322—365.
  214. L. BOUVERET. *Observation de cécité totale par lésion corticale*. Rev. gén. d'Ophth. S. 481.
  215. L. DARKSCHEWITSCH. *Ueber die Leitungsbahn des Lichtreizes von der Netzhaut des Auges auf den Nervus oculomotorius*. (Russisch.) Anatomisch-Physiologische Untersuchungen. Moskau. 1887. 146 S.
  216. — *Die Betheiligung des oberen Vierhügels bei der Uebertragung des Lichtreizes auf die Kerne des Nervus oculomotorius*. (Russisch.) Medizinskoje Obozrenje. XXXIII. 9. S. 907. — Abh. d. II. Congr. d. russ. Aerzte zu Moskau. II. S. 72.
  217. M. DUVAL. *Quelques exemples de dynamogénie sur les centres des organes des sens*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (S.) IV. S. 763.
  218. S. EXNER. *Ueber Sehstörungen nach Operationen im Bereich des Vorderhirns*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 62.
  219. S. EXNER und J. PANETH. *Das Rindenfeld des Facialis und seine Verbindungen bei Hund und Kaninchen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 349.
  220. PH. KNOLL. *Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns*. Wien, Gerold's Söhne. 1887.
  221. L'ANNEGRACE. *De l'influence de certaines lésions cérébrales sur l'appareil de la vision*. Soc. de méd. et de chir. de Montpellier. 1 Semester.
  222. J. NUSSBAUM. *Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprungsgebieten der Augenmuskelnerven*. Medic. Jahrb. S. 407.
  223. C. REINHARD. *Zur Frage der Hirnlocalisation*. Arch. f. Psychiatr. XVIII. S. 240 u. 449.
  224. SIEMERLING. *Casuistischer Beitrag zur Localisation im Großhirn*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVIII. 3. S. 877.
  225. A. VETTER. *Ueber den derzeitigen Stand der Frage von der Localisation am Gehirn*. Deutsch. Arch. f. klin. Medic. Bd. 40. S. 228.
  226. H. WILBRAND. *Die Seelenblindheit als Herderscheinung und ihre Beziehungen zur homogenen Hemianopsie, zur Alexie und Agraphie*. Wiesbaden. Bergmann. 1887. 182 S.
- 1888.
227. ARNDT. *Zur Frage von der Localisation der Functionen der Großhirnrinde*. Berl. klin. Wochenschr. No. 8.
  228. BELLONCI. *Ueber die centrale Endigung des Nervus opticus bei den Vertebraten*. Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVII. 1.
  229. S. BROWN. *The centres for sight and hearing*. Med. Rec. XXX. No. 3. S. 90.
  230. A. CHAUFFARD. *De la cécité subite par lésions combinées des deux lobes occipitaux (Anopsie corticale)*. Rev. de méd. No. 2.
  231. S. DANNILLO. *Ueber die Beziehung der Hinterhauptlappen der neugeborenen und jungen Thiere zu den Augenbewegungen*. (Russisch.) Wratsch. No. 48.
  232. C. S. FREUND. *Einige Grenzfälle zwischen Aphasie und Seelenblindheit*. Centralbl. f. Nervenheilkde. No. 8.
  233. FR. GOLTZ. *Ueber die Verrichtungen des Großhirns*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 419.
  234. M. JASTROWITZ. *Beiträge zur Localisation im Großhirn und über deren praktische Verwerthung*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 8.
- v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

235. LANNENGRACE. *Influence des lésions corticales sur la vue chez le chien*. Comp. rend. hebdom. des séances de la Soc. de Biol. V. No. 32. S. 708.
236. A. RICHTER. *Pathologisch-Anatomisches und Klinisches über die optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirnes*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XX. S. 304.
237. E. C. SPITZKA. *The oculo-motor centres and their co-ordinators*. Journ. of nerv. and ment. diseases. New-York. XV. S. 413.
238. A. N. VITZOU. *Contribution à l'étude du centre cerebro-sensitif visuel chez le chien*. Compt. rend. hebdom. de l'Acad. des sc. de Paris. Bd. XVII. No. 4. S. 276. 1889.
239. J. ANDERSON. *Homonymous hemianopsia: recovery: subsequent death and necropsy*. Brit. med. journ. No. 1508. S. 1155. — Lancet. No. 3456. S. 1062.
240. A. ANGELUCCI. *Qualità visive delle corteccie cerebrali nei vertebrati superiori*. Ann. di Ottalm. XVII. S. 551.
241. W. v. BECHTEREW. *Ueber die Leitungsbahn des Lichtreizes von der Netzhaut zu den N. oculomotorius*. (Russisch.) Arch. Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopat. XIII. 1. S. 1.
242. A. H. BENNETT und TH. LAVILL. *A case of permanent conjugate deviation of the eyes and head, the result of a lesion limited to the sixth nucleus etc.* Brain. S. 102.
243. G. FASOLA. *Effetti di scervellazioni parziali totali e negli uccelli, in ordine alla visione*. Riv. sperim. di Freniatria. XV. S. 317.
244. C. S. FREUND. *Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit*. Arch. f. Psychiatr. XX. S. 276—297, 371—416.
245. A. v. FRISCH. *Occipitalwunde mit Hemianopsie*. Mitth. d. Wien. med. Doctorcollegiums. XV. No. 9.
246. LANNENGRACE. *Influence des lésions corticales sur la vue*. Arch. de méd. expér. et anat. pathol. No. 1. S. 87.
247. H. LISSAUER. *Ein Fall von Seelenblindheit nebst einem Beitrag zur Theorie desselben*. Arch. f. Psychiatr. XXI. S. 222.
248. C. v. MONAKOW. *Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die optischen Centren und Bahnen*. (Neue Folge.) Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XX. 3. S. 714—787.
249. H. MUNK. *Ueber die centralen Organe für das Sehen und das Hören bei den Wirbelthieren*. Sitzgs.-Ber. d. preuss. Akad. d. Wiss. 20. Juni. 1889. S. 615.
250. P. OULMONT. *Cécité subite par ramolissement des deux lobes occipitaux*. Gaz. hebdom. de Méd. et de Chir. No. 38. S. 607.
251. A. PICK. *Kritischer Beitrag zur Lehre von der Localisation in der Großhirnrinde*. Zeitschr. f. Heilkde. X.
252. S. SHARKEY. *Case of cortical and subcortical disease of the occipito angular region producing hemianopsia*. Transact. of the ophthalm. soc. VIII. S. 304.
253. SIEMERLING. *Ein Fall von sogenannter Seelenblindheit nebst anderweitigen centralen Symptomen*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XXI. S. 284—299.
254. TOMASCHIEWSKI. *Zur Frage über die Veränderungen in der Gehirnrinde in einem Falle von in früher Kindheit erworbener Blindheit und Taubheit*. Centralbl. f. Nervenheilkde. XII. S. 21. 1890.
255. W. v. BECHTEREW. *Ueber die Sehfläche auf der Oberfläche der Hirnhemisphären*. (Russisch.) Arch. Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopat. XV. S. 1.
256. DE BONO. *Contributo allo studio delle localizzazioni cerebrali dai sintomi oculari*. Rendiconto del XII. Congresso della Associazione Ottalmologica Italiana. Pisa. S. 3.
257. J. DÉJÉRINE, P. SOLLIER et E. AUSCHER. *Deux cas d'hémianopsie homonyme, par lésions de l'écorce du lobe occipital*. Arch. de Physiol. (5.) II. S. 177—192.
258. DOMMARTIN. *Cécité subite consécutive à un traumatisme de la région occipitale*. Arch. de méd. et de pharm. milit. No. 3. S. 211.
259. D. FERRIER. *The Croonian lectures on cerebral localisation*. Brit. med. Journ. S. 1289—1294, 1349—1354, 1413—1418.
260. FORSTER. *Ueber Rindenblindheit*. Graefe's Arch. XXXVI. 1 Abth. S. 94—108.
261. M. KNIES. *Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln*. Arch. f. Augenheilkde. XXXII. S. 19—51.
262. C. MÖLL. *Veränderungen des Tractus opticus bei Erkrankungen des Occipitalhirns*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenheilkde. XXII. S. 72—120.

263. MOTT. *Report on bilateral associated movements and on the functional relations of the corpus callosum to the motor cortex.* Brit. med. journ. I. S. 1124.
264. — *Report on associated eye movements by unilateral and bilateral cortical faradization of the monkey's brain.* Brit. med. journ. I. S. 1419.
265. H. MUNK. *Sehsphäre und Augenbewegungen.* Sitzgs.-Ber. d. kgl. Akad. d. Wiss. in Berlin. S. 53—74.
266. — *Ueber die Functionen der Großhirnrinde.* 2. Aufl. Berlin. A. Hirschwald. 1890.
267. J. L. NUEL. *Localisation de quelques phénomènes morbides dans le cerveau à l'aide des troubles visuels.* Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège. S. 208.
268. OBREGIA. *Ueber Augenbewegungen auf Sehsphärenreizung.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 260—279.
269. PERLIA. *Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit congenitaler Amaurose.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (4.) S. 217—223.
270. CH. RICHT. *Un cas de cécité expérimentale double chez un chien, avec autopsie.* Rev. phil. XXIX. S. 554—557.
271. SCHMIDT-RIMPLER. *Cortical hemianopsia with secondary degeneration of the optic nerve.* Arch. of Ophthalm. XIX. H. 2 u. 3.
272. STOWELL. *Blindness following cerebro-spinal Meningitis, with recovery after two years.* New York. Med. Journ. 9. Aug.
273. THOMPSON und BROWN. *Experiments upon the cortical sight centre.* Researches of the Loomis Laboratory New York. I. S. 13.
274. H. WILBRAND. *Die hemianopischen Gesichtsfeldformen und das optische Wahrnehmungscentrum.* Wiesbaden. Bergmann. 1890.
275. ZERELITZKY. *Experimentelle Untersuchungen über die Function der Hirnrinde des Occipitallappens der Hemisphäre bei höheren Thieren.* (Diss. Petersburg. Russisch.) Refer. in Arch. Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopathol. XVI. 1. S. 151. — Oestreich-ungar. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 29. S. 546.
- 1891.
276. G. W. M'CASKEY. *Hemianopsie, ein diagnostisches Merkmal von Hirnerkrankung.* The Amer. Lancet. 1891. März.
277. M. v. GONZENBACH. *Zur Lehre von der einseitigen Amaurose. Intracranieller Opticus- und Chiasma-Tumor.* Diss. Basel. 52 S.
278. A. GROENOUW. *Ueber doppelseitige Hemianopsie centralen Ursprunges.* Arch. f. Psychiatr. Bd. 23. S. 339—367.
279. P. GROSCH. *Eine Herderkrankung des Gehirns mit Ophthalmoplegie und Opticus-Atrophie.* Diss. Jena. 29 S.
280. O. HAAB. *Der Hirnrindenreflex der Pupille.* Zürich, Müller. 8 S.
281. J. HIRSCHBERG. *Ueber Sehstörungen durch Gehirngeschwulst.* Neurol. Centralbl. X. S. 450—455.
282. S. KIRILZEW. *Zur Casuistik der Sehhügel-Affectionen.* (Russisch.) Medicinskoje Oboszenije. No. 4.
283. J. P. MORAT und M. DOYON. *Le grand sympathique nerf accomodateur.* Arch. de Physiol. (5.) III. S. 507—522.
284. MOTT u. SCHAEFER. *On associated eye-movements produced by cortical faradisation of the monkey's brain.* Brain. XIII. S. 165.
285. H. MUNK. *Sehsphäre und Raumvorstellungen.* Intern. Beitr. z. wiss. Med. (Virchow-Festschrift). Bd. I. S. 355—366. Berlin, Hirschwald.
286. H. D. NOYES. *Hemianopsia.* N. Y. Med. Record. 4. April.
287. CH. A. OLIVER. *Ein Fall von intracranieller Neubildung, localisirt durch oculare Symptome.* (Uebersetzt von A. Weiland.) Knapp u. Schweigger Arch. f. Augenheilkde. Bd. XXIV. S. 157—160.
288. PERLIA. *Ueber die Beziehungen des Opticus zum Centralnervensystem.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 191—202.
- 1892.
89. CH. ST. BULL. *Contribution to the subject of intracranial lesions, with defects in the visual fields. Five cases with autopsies.* Transact. of Americ. ophthalm. soc. XXVIII. S. 268.
90. A. CHAUVEAU. *Sur l'existence de centres nerveux distincts pour la perception des couleurs fondamentales du spectre.* France Médicale. No. 50. S. 787. Compt. Rend. Bd. 115. S. 908.

291. FR. MÜLLER. *Ein Beitrag zur Kenntniss der Seelenblindheit.* Arch. f. Psychiat. XXIV. 3. S. 856—918.
292. CH. RICHTER. *Cécité psychique expérimentale chez le chien.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) IV. 7. S. 146—148.
293. — *Des lésions cérébrales dans la cécité psychique expérimentale chez le chien.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 237.
294. G. SEPPILLI. *Sui rapporti della cecità bilaterale colle affezioni dei lobi occipitali.* Riv. Sperim. di Freniatria. XVIII. S. 245—261.
295. A. N. VITZOU. *I centri cerebro-visivi nel cane e nella scimmia.* Congr. Intern. di fisiol. Liegi, August 1892.

## 1893.

296. BRISSAUD. *La fonction visuelle et le cuneus.* Ann. d'Ocul. Bd. 110. S. 321. 1893.
297. G. F. W. EWENS. *A theory of cortical visual representation.* Brain. No. 64. S. 475 bis 492.
298. S. E. HENSEN. *On the visual path and centre.* Upsala. — Brain. No. 61/62. 8. 170 bis 181.
299. O. v. LEONOVA. *Ueber das Verhalten der Neuroblasten des Occipitallappens bei Anophthalmie und Bulbusatrophie und seine Beziehungen zum Sehact.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 308—318.
300. SCHMIDT-RIMPLEY. *Doppelseitige Hemianopsie mit Sectionsbefund.* Arch. f. Augenheilkde. S. 181.
301. J. TURNER. *A case of left homonymous hemianopsia.* Brain. No. 64. S. 562—568.
302. VIALET. *Les centres cérébraux de la vision et l'appareil nerveux visuel intra-cérébral.* Paris, F. Alcan. 355 S.
303. A. N. VITZOU. *Effets de l'ablation totale des lobes occipitaux sur la vision, chez le chien.* Arch. de Physiol. (5.) V. S. 689—699.

## 1894.

304. A. ANGELUCCI. *Untersuchungen über die Sehtätigkeit der Netzhaut und des Gehirns.* Unters. z. Naturlehre d. Menschen u. d. Thiere. Herausg. von Moleschott. XIV. 3.
305. DEJERET u. VIALET. *Ueber einen Fall von Rindenblindheit intra vitam diagnosticirt und durch Autopsie bestätigt.* Allgem. med. Centr.-Ztg. No. 8. S. 93.
306. S. E. HENSEN. *Sur les centres optiques cérébraux.* Rev. gén. d'Ophthalm. XIII. S. 337—352.
307. JOUSLAIN. *Surdité unilatérale et perte d'un oeil par suite de contusion et d'émotion.* Bull. et mém. de la soc. de laryngol. etc. de Paris. 5.
308. H. MAGNUS. *Ein Fall von Rindenblindheit.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 4. S. 73.
309. H. BABUS. *Zur Kenntniss der sogenannten Seelenblindheit.* Diss. Erlangen. 40 S.
310. VIALET. *Les centres cérébraux de la vision et l'appareil nerveux visuel intra-cérébral.* Ann. d'oculist. Bd. 111. S. 161—199.
311. — *Considérations sur le centre visuel cortical à propos de deux nouveaux cas d'hémianopsie corticale suivis d'autopsie.* Arch. d'Ophtalm. XIV. S. 422—426.

## III.

## Specielle Litteratur zur physiologischen Optik.

## § 1.

## Formen des Sehorgans im Allgemeinen.

## 1. Historisches.

1877.  
312. H. MAGNUS. *Historische Tafeln zur Anatomie des Auges*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV. Beilage-Heft. 17 S.
1878.  
313. H. MAGNUS. *Die Anatomie des Auges bei den Griechen und Römern*. Leipzig. Veit & Co. 1878. 67 S.
314. SZOKALSKI. *Die Kenntnisse des Baues und der Functionen des menschlichen Auges im Altertum und Mittelalter*. Medycyna. 1878. S. 107.

## 2. Entwicklungsgeschichte; allgemeine, specielle und vergleichende Anatomie der Thieraugen.

1715.  
315. G. BIDLOO. *De oculis et visu variorum animalium observationes physico-anatomicae*. Lugduni Bat.
1808.  
316. J. A. ALBERS. *Ueber den Bau der Augen verschiedener Thiere*. Münch. Acad.
1826.  
317. M. DE SERRES. *Ueber die Augen der Insekten*. Aus d. Französ. v. DIEFFENBACH. Berlin.
318. J. MÜLLER. *Zur Physiologie des Gesichtssinnes*. Leipzig. S. 315.
1835.  
319. R. WAGNER. *Lehrbuch der vergleichenden Anatomie*.
1840.  
320. J. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie des Menschen*. Coblenz. Bd. II. S. 305.
321. F. WILL. *Beiträge zur Anatomie der zusammengesetzten Augen mit facettirter Hornhaut*. Erlangen.
1843.  
322. R. WAGNER. *Lehrbuch der speciellen Physiologie*. S. 383.
1848.  
323. v. SIEBOLD u. STANNIUS. *Lehrbuch der vergleichenden Anatomie*. Berlin.
1852.  
324. BERGMANN u. LEUCKART. *Anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreichs*. Stuttgart.
1856.  
325. F. DUJARDIN. *Remarques sur certaines dispositions de l'appareil de la vision chez les insectes*. Compt. Rend. XLII. 941. Inst. 194.
1866.  
326. F. PLATEAU. *Sur la vision des poissons et des amphibies*. Mondes. (2.) XII. 158—162. Arch. sc. phys. XXVII. 191—193. Compt. Rend. II. S. 449.



1867.

327. F. DUJARDIN. *Sur la vision des poissons et des amphibiés.* Ann. des sc. nat. VII. S. 15.

328. POLEMANN. *Sur un travail de F. Plateau relatif à la vision des poissons.* Bull. d. Brux. (2.) XXII. 3—5.

1871.

329. F. BOLL. *Beiträge zur physiologischen Optik. I. Das Sehen mit zusammengesetzten Augen und der Leuwenhoecksche Versuch.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 530—548.

330. F. HOLMGREN. *Ueber die Blutgefäße der Hyaloiden des Froschauges.* Upsal. Läkaref. Förh. VII. S. 127—130.

1872.

331. EMMERT. *Die Organe des Sehens in den verschiedenen Thierkreisen.* (Zwei Vorträge in der Aula zu Bern.)

332. R. J. LEE. *Remarks on the sense of sight in birds.* Proc. of the Roy. Soc. XI. 351—360.

1875.

333. S. EXNER. *Ueber das Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammengesetzten Auges.* Wien. Akad. Ber. (3.) 72. S. 156—190.

1877.

334. L. KESSLER. *Zur Entwicklung des Auges der Wirbeltiere.* Leipzig. 1877.

335. W. KÜHNE. *Eine Beobachtung über das Leuchten der Insectenaugen.* Unters. u. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. Bd. I. S. 242—247.

1878.

336. W. CROOKES. *The senses of the lower animals.* The quart. Journ. of Sc. LI. July. S. 289—315.

1879.

337. TH. v. EWETSKY. *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Auges.* Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 241.

1880.

338. J. CHATIN. *Contribution à l'étude des phénomènes de la vision chez les Gastropodes pulmonés.* Gaz. hebdom. No. 2. S. 27.

339. J. NOTTHAFT. *Ueber die Gesichtswahrnehmungen vermittelt des Facettenauges.* Abh. d. Senkenberg. naturf. Ges. XII. Frankfurt a. M. Winter, 1880. 91 S.

1881.

340. S. EXNER. *Die Frage von der Funktionsweise der Facettenaugen.* Biol. Centralbl. No. 9. S. 272.

1882.

341. E. BERGER. *Beiträge zur Anatomie des Sehorgans der Fische.*

342. BERLIN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Pferdeauges.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. S. 17—36.

343. DABESTE. *Sur une anomalie de l'oeil.* Compt. Rend. Bd. 95. S. 44—45.

344. L. DESFOSSES. *De l'oeil du Protée.* Compt. Rend. Bd. 94. No. 26. S. 1729—1731.

345. S. J. HICKSON. *The Eye of Spondylus.* The quarterl. Journ. of microsc. Sc. S. 362—364.

346. PUFÄHL. *Die Augen der Vögel.* Zeitschr. d. Verb. d. ornithol. Vereine Pommerns u. Mecklenburgs. No. 5, 6 u. 7.

347. C. RITTER. *Das Auge eines Acranius histologisch untersucht.* Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 215—218.

348. H. VIRCHOW. *Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Auges.* Habilit.-Schr. Berlin. 99 S.

1883.

349. E. RAY LANCASTER u. A. G. BOURNE. *The minute structure of the lateral and the central eyes of Scorpio and of Limulus.* The quarterl. Journ. of microsc. Sc. S. 177—212.

350. H. VIRCHOW. *Augengefäße der Ringelnatter.* Sitzgs.-Ber. d. physiol. med. Ges. zu Würzburg. S. 132—134.

1884.

351. O. BUTSCHLI. *Nachschrift zu Beiträgen des Gastropodenauges von Hilger.* Morphol. Jahrb. X. S. 372—375.

352. J. CARRIÈRE. *On the eyes of some invertebrata*. The quaterl. Journ. of microsc. Sc. XXIV. S. 678.
353. G. V. CIACCIO. *Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della Talpa illuminata (T. europaea) e a quelli della Talpa cieca (T. coeca)*. Mem. d. Acad. Reale delle scienze. Bologna. (4.) VI. S. 31–35.
354. R. HILBERT. *Ueber die nach der Geburt eintretenden entwicklungsgeschichtlichen Veränderungen der brechenden Medien und des Augenhintergrundes der Katze*. Graefe's Arch. f. Ophth. XXX. 3. S. 245.
355. C. HILGER. *Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges*. Morphol. Jahrb. X. S. 351–371.
356. H. GRENACHER. *Abhandlungen zur vergleichenden Anatomie des Auges. I. Die Retina der Cephalopoden*. Halle. Niemeyer. 1884. 50 S.
357. POUCHET. *Organes visuels des êtres unicellulaires*. (Soc. de Biol. 27. Oct.) Gaz. hebdom. S. 726.
- 1885.
358. J. CARRIÈRE. *Die Sehorgane der Thiere*. München. Oldenbourg. 1885. 147 Abb. u. 1 Taf.
359. S. J. HICKSON. *The retina of insects*. Nature. London. XXXI. S. 341.
360. — *The eye and optic tract of insects*. The quarterl. Journ. of microsc. Sc. April. S. 215–251.
361. E. B. LANKASTER. *Mr. Lowne on the morphology of insects' eyes*. Nature. XXXI. S. 504 u. 578.
362. B. T. LOWNE u. S. J. HICKSON. *The compound vision and morphology of the eye in insects*. Nature. XXXI. S. 433.
363. F. PLATEAU. *Recherches expérimentales sur la vision chez les insectes*. Brüssel. F. Hayez. 1885.
364. — *Können die Insekten die Formen der Objekte erkennen?* Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique. (3.) X. S. 231.
365. E. A. SCHAFER. *Mr. Lowne on the morphology of insects' eyes*. Nature. XXXII. S. 3–4.
366. H. VIRCHOW. *Mittheilungen zur vergleichenden Anatomie des Wirbelthierauges*. 58. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Straßburg. Tageblatt.
- 1886.
367. PH. BERTKAU. *Beiträge zur Kenntniss der Sinnesorgane der Spinnen*. Arch. f. mikrosk. Anat. XXVII. S. 589–631.
368. W. B. CANFIELD. *Vergleichend anatomische Studien über den Accommodationsapparat des Vogelauges*. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 28. S. 121–170.
369. J. CARRIÈRE. *Kurze Mittheilungen aus fortgesetzten Untersuchungen über die Sehorgane*. Zool. Anz. No. 217, 220, 229, 230. S. 141–147, 220–223, 479–481, 496–500.
370. G. V. CIACCIO. *Sur la fine structure des yeux des diptères*. Journ. de micrographie. No. 3, 5, 9 u. 10.
371. A. FOREL. *Expériences et remarques critiques sur les sensations des insectes. I. Theil*. Rec. zool. suisse. IV. S. 1–50.
372. — *Les fourmis perçoivent-elles l'ultraviolet avec leurs yeux ou avec leur peau?* Compt. Rend. de la soc. helvét. des sc. nat. S. 128.
373. H. GRENACHER. *Das Auge der Heteropoden*. Abh. der naturf. Ges. zu Halle. 65 S.
374. W. PATTEN. *Eyes of molluscs and arthropods*. Mitth. a. d. zool. Stat. zu Neapel. VI. S. 542–756.
375. F. PLATEAU. *Recherches sur la perception de la lumière par les Myriopodes aveugles*. Journ. de l'Anat. et de Physiol. S. 431.
- 1887.
376. F. E. BEDDARD. *Note on a new type of compound eye*. Ann. and mag. of nat. hist. XX. No. 117. S. 233–236.
377. E. L. MARK. *Simple eyes in arthropods*. Bull. of the Museum of comp. zool. at Harvard College. XIII. No. 3.
378. W. PATTEN. *On the eyes of molluscs and arthropods*. Zool. Anz. No. 251. S. 256–261.
379. P. SCHIEFFERDECKER. *Ueber das Fischeauge*. Verh. d. 1. Vers. d. anat. Ges. zu Leipzig. S. 381.

## 1888.

380. S. EXNER. *Functionsweise des facettirten Insectenauges*. Klin. Wochenschr. S. 897.  
 381. C. HESS. *Beschreibung des Auges von Talpa europaea und Proteus anguineus*. Arch. f. Ophthalm. XXXV. 1. S. 1—19.  
 382. W. PATTEN. *Studies on the eyes of arthropods*. Journ. of morphol. II. S. 97—110.  
 383. F. PLATEAU. *Vision chez les Chénilles*. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. (3.) XV. No. 1.  
 384. — *Vision chez les Arachnides*. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. (3.) XIV. No. 11. S. 545.  
 385. — *Experimental-Untersuchungen über das Sehen bei den Arthropoden*. Bull. Belg. (3.) XVI. S. 395.

## 1889.

386. J. CARRIÈRE. *Bau und Entwicklung des Auges der zehnfüssigen Crustaceen und der Arachnoiden*. Biol. Centralbl. IX. No. 8. S. 225—234.  
 387. — *Ueber Molluskenaugen*. Arch. f. mikrosk. Anat. XXXIII. S. 378—402.  
 388. G. V. CIACCIO. *Sur la forme et la structure des facettes de la cornée et sur les milieux réfringents des yeux composés des Muscides*. Journ. de microgr. No. 3. S. 80.  
 389. G. DENISENKO. *Zur Frage über den Bau des Auges der Knorpelfische*. (Russisch.) Westnik ophth. VI. S. 133 u. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 260—262.  
 390. R. DUBOIS. *Sur l'action des agents modificateurs de la contraction photodermaïque chez le Pholas dactylus*. Compt. Rend. Bd. 109. S. 320—322.  
 391. — *Sur le mécanisme des fonctions photodermaïque et photogénique dans le siphon du Pholas dactylus*. Compt. Rend. Bd. 109. S. 233—235.  
 392. M. DUVAL. *Le troisième oeil des vertébrés*. Journ. de microgr. No. 1. S. 16—20.  
 393. — u. KALT. *Des yeux pinéaux multiples chez l'orvet*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. No. 6. S. 85—86.  
 394. S. EXNER. *Das Netzhautbild des Insectenauges*. Exner's Rep. XXV. S. 539—562, 621—642 u. Wien. Ber. XCVIII. Abth. 3. S. 13—65.  
 395. F. H. HERRICK. *The development of the compound eye of Alpheus*. Zool. Anz. XII. S. 164.  
 396. C. HESS. *Beschreibung des Auges von Talpa europaea und von Proteus anguineus*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.)  
 397. J. v. KENNEL. *Einfache Augen der Anneliden*. Sitzgs.-Ber. d. Naturf. Ges. zu Dorpat. VIII. (3.) S. 405.  
 398. C. KOHL. *Einige Notizen über das Auge von Talpa europaea und Proteus anguineus*. Zool. Anz. XII. No. 312. S. 383—386. No. 313. S. 405—408.  
 399. W. KRAUSE. *Die Retina der Torpedineen*. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. 6. S. 206.  
 400. W. SCHEWIAKOFF. *Beiträge zur Kenntniss des Acalephenauges*. Morphol. Jahrb. XV. S. 21—60.  
 401. S. TORNATOLA. *Ricerche sull'occhio della testuggine marina*. Messina. 1889.  
 402. S. WATASE. *On the structure and development of the eyes of the limulus*. J. Hopkin's Univ. Circ. Baltimore. VIII. 34.

## 1890.

403. M. BEAUDOUIN. *Encore le troisième oeil des vertébrés*. Progr. méd. No. 11. S. 330.  
 404. E. BÉRANECK. *L'œil primitif des vertébrés*. Arch. d. sc. phys. et nat. XXIV. S. 361.  
 405. F. MAZZA. *Sull'occhio della Cephaloptera giorna Cuv.* Ann. d. Mus. civ. di stor. nat. di Genova. (2.) IX. S. 455—475.  
 406. O. PANKRATH. *Das Auge der Raupen und Phryganidenlarven*. Dissert. Halle. 21 S. — Zeitschr. f. wiss. Zool. IL. S. 690—708.  
 407. G. H. PARKER. *The histology and development of the eye in the lobster*. Bull. of the Mus. of Comp. Zool. at Harvard Coll. XX. No. 1. S. 60.  
 408. W. DE SZAWINSKA. *Contribution à l'étude des yeux de quelques crustacés. — Recherches expérimentales sur les mouvements du pigment granuleux et des cellules pigmentaires sous l'influence de la lumière et d'obscurité*. Rec. d'Ophth. S. 569—577.  
 409. E. SCHÖBEL. *Zur postembryonalen Entwicklung des Auges der Amphibien*. Zool. Jahrb. f. Syst. u. Ontog. IV. S. 297—347. — Dissert. Leipzig. 51 S.

## 1891.

410. C. CLAY'S. *Das Medianauge der Crustaceen*. Wien. A. Hölder. 42 S. — Arb. aus d. Wien. Zool. Institut. Bd. IX. S. 225—262.

411. S. EXNER. *Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insecten.* Leipzig u. Wien. 1891. 206 S. 7 Taf. u. 23 Holzschn.
412. HIRSCHBERG. *Ueber das Auge des Kätschens.* (Verh. d. Physiol. Ges.) Du Bois' Arch. S. 351—357.
413. P. MARTIN. *Die Entwicklung der Netzhaut bei der Katze.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 25—41.
414. K. W. SCHLAMPP. *Beiträge zur Anatomie des Auges vom Grottenolme.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 73—76.
415. H. VIALLANES. *Sur la structure de l'oeil composé des crustacés macroures.* Compt. Rend. CXII. S. 1017—1020.

## 1892.

416. E. A. ANDREWS. *On the eyes of Polychaetous Annelids.* Journ. of Morphol. VII. 2. S. 169.
417. C. CLAUS. *Ueber die Gattung Miracia Dana mit besonderer Berücksichtigung ihres Augen-Baues.* Wien. Hölder. 18 S.
418. S. FUCHS. *Ueber einige neuere Fortschritte in der Anatomie und Physiologie der Arthropodenaugen.* Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 351—378.
419. E. GOEPPERT. *Untersuchungen über das Sehorgan der Salpen.* Morphol. Jahrb. XIX. II. S. 250.
420. C. KOHL. *Das Auge von Petromyzon Planeri und von Myxine Glutinosa.* Dissert. Leipzig. 57 S.
421. — *Rudimentäre Wirbelthieraugen.* Bibliotheca zoologica. Heft 13. Kassel. Fischer. 141 S.
422. W. A. NAGEL. *Die niederen Sinne der Insekten.* A. Moser (Franz Pietzcker). Tübingen. 68 S.
423. F. PURCELL. *Ueber den Bau und die Entwicklung der Phalangidenaugen.* Zool. Anz. XV. No. 408. S. 461.
424. K. W. SCHLAMPP. *Das Auge des Grottenolmes.* Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 53. 4. S. 537—558.
425. O. SCHULTZE. *Zur Entwicklungsgeschichte des Gefäßsystems im Säugethier-Auge.* Festschr. f. KÖLLIKER. Leipzig. Engelmann. 41 S.

## 1893.

26. TH. ADENSAMER. *Ueber das Auge von Sentigera coleoptrata.* Verh. d. Zool. Bot.-Ges. in Wien. 1893. 1. Sitzgs.-Ber. S. 8.
27. E. BÉRANECK. *L'individualité de l'oeil pariétal.* Anat. Anz. VIII. S. 669—677.
28. C. CHUN. *Leuchtorgan und Facettenauge. Ein Beitrag zur Theorie des Sehens in großen Meerestiefen.* Biol. Centralbl. XIII. S. 544—571.
29. L. JOUBIN. *Note sur une adaptation particulière de certains chromatophores chez un céphalopode (l'oeil thermoscopique de Chiroteuthis Bomplandi Vérany?).* Bull. de la soc. zool. de France. Tome XVIII. 1893.
30. A. KLINCKOWSTRÖM. *Beiträge zur Kenntniss der Augen von Anableps tetraphthalmus.* Skand. Arch. f. Physiol. V. S. 67—70.
31. C. KOHL. *Rudimentäre Wirbelthieraugen.* Bibl. zool. v. Leuckart u. Chun. 18. u. 14. Heft. 1. Lfrg. Stuttgart. Nägele.
2. L. MATTHIESSEN. *Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäfers.* Nach der Exner'schen Theorie des aufrechten Netzhautbildes. Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. 46. (2.) S. 100—104.
3. — *Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäfers.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 186—191.

## 1894.

1. A. KIESEL. *Untersuchungen zur Physiologie des facettirten Auges.* (Aus Sitzgs.-Ber. d. Kgl. Akad. d. Wiss.) Diss. Marburg. 1894. 43 S. Wien. F. Tempaky. 43 S.
2. A. KLINCKOWSTRÖM. *Beiträge zur Kenntniss des Parietalauges.* Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. VII. 2. S. 249.
3. M. v. LENHOSSEK. *Zur Kenntniss der Netzhaut der Cephalopoden.* Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. S. 636—661. Vorl. Mittheilung: Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. 1894. S. 110—114.

437. A. MALLOCK. *Insect sight and defining power of composite eyes.* Proc. Roy. Soc. LV. No. 332. S. 85.  
 438. H. B. MERRILL. *Preliminary note on the eye of the Leach.* Zool. Anz. XVII. 454. S. 286.  
 439. FR. PURCELL. *Ueber den Bau der Phalangidenaugen.* Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. S. 1—53.  
 440. G. J. STONEY. *On the limits of vision: with special reference to the vision of insects.* Philos. Mag. Bd. 37. No. 226. S. 316—331.  
 441. C. ZIEM. *Geschichtliche Notiz über den Fächer im Auge der Vögel.* Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 474.

### 3. Allgemeine Anatomie des menschlichen Auges.

Ältere Darstellungen sind:

1788.  
 442. J. TAYLOR. *Le mécanisme, ou le nouveau traité de l'anatomie du globe de l'oeil, avec l'usage de ses différentes parties, et de celles qui lui sont contigues.* Paris. 1780.  
 443. J. G. ZINN. *Descriptio anatomica oculi humani iconibus ill., nunc altera vice edita et necessario supplemento, novisque tab. acuta ab H. A. Wrisberg.* Gottingae. 1801.  
 444. TH. SÖMMERING. *Abbildungen des menschlichen Auges.* Frankfurt a. M. 1801. 1804.  
 445. TH. SÖMMERING. *Jcones oculi humani.* Francof. 1842.  
 446. C. F. TH. KRAUSE. *Handbuch der menschlichen Anatomie.* Hannover 1842. Bd. I. Thl. II. S. 511—551. (Enthält auch eine Zusammenstellung der älteren Litteratur.) 1847.  
 447. E. BRÜCKE. *Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels.* Berlin 1847. 1849.  
 448. W. BOWMAN. *Lectures on the parts concerned in the operations on the eye and on the structure of the retina and the vitreous humour.* London. 1854.  
 449. A. KÖLLIKER. *Mikroskopische Anatomie oder Gewebelehre des Menschen.* Leipzig 1854. Bd. II. S. 606.  
 Zusammenstellungen der gesamten Litteratur finden sich u. a. in den verschiedenen Jahresberichten; sowie in:  
 GRÄFE-SIMISCH. *Handbuch der gesamten Augenheilkunde.* Leipzig 1876 Bd. I. S. 144—168, 264—264, 318—320, 327—328, 352—353, 451—457 und 477—479.  
 SCHWALBE. *Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane.* Erlangen 1883.

## § 2.

### Sehnhaut und Hornhaut. Dimensionen des Auges. Ophthalmometrie. Intraocularer Druck.

Wegen der speciell anatomischen Litteratur der Sehnhaut und Hornhaut siehe § 1, s. Hinsichtlich der Verschiedenheit der Hornhautkrümmung nach verschiedenen Richtungen ist auch die Litteratur in § 14, s. zu beachten.

1723.  
 450. F. P. DU PETIT. *Mémoire sur les yeux gelés, dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse.* Mém. de l'Acad. des sciences de Paris. S. 54.  
 1725.  
 451. F. P. DU PETIT. *Mémoire de l'Acad. d. sc. de Paris.* S. 48.

- 1726.
452. F. P. DU PETIT. *Mémoire sur plusieurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des animaux à quatre pieds etc.* Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 375.
- 1728.
453. F. P. DU PETIT. *Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme.* Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 408.
- 1780.
454. F. P. DU PETIT. *Mémoire sur le cristallin de l'oeil de l'homme, des animaux à quatre pieds etc.* Mém. de l'Acad. d. Sciences. S. 4.
- 1788.
455. JURIN. *Essay upon distinct and indistinct vision.* S. 141 in SMITH's Complete System of Optics.
- 1789.
456. HELSHAM. *A Course of Lectures on Natural Philosophy.* London 1739.
- 1740.
457. WINTRINGHAM. *Experimental inquiry on some parts of the animal structure.* London 1740.
- 1801.
458. TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye.* Philos. Transact. S. 23.
- 1818.
459. D. W. SOEMMERING. *De oculorum hominis animaliumque sectione horizontali.* Göttingen 1818. S. 79\*.
- 1819.
460. CHOSSAT. *Sur la courbure des milieux réfringents de l'oeil chez le boeuf.* Ann. de chim. et phys. X.
461. D. BREWSTER. *Edinburgh Philosoph. Journal.* 1819. No. I. S. 47.
- 1823.
462. PURKINJE. *De examine physiologico organi visus et systematis cutanei.* Vratislaviae. 1823.
463. G. R. TREVIRANUS. *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge.* Bremen. 1828. Heft I. S. 20\*. — Hier sind auch die Resultate der älteren Beobachter zusammengestellt.
- 1832.
464. C. KRAUSE. *Bemerkungen über den Bau und die Dimensionen des menschlichen Auges.* Meckel's Arch. f. Anat. u. Physiol. Bd. VI. S. 86\*. (Beschreibung der Methode und Messungen an zwei Augen.) Auszug davon in Pogg. Ann. Bd. XXXI. S. 93\*.
- 1836.
465. C. KRAUSE. *Ueber die Gestalt und Dimensionen des Auges.* Poggd. Ann. Bd. XXXIX. S. 529\* (Messungen an acht menschlichen Augen).
- 1840.
466. R. H. KOHLRAUSCH. *Ueber die Messung des Radius der Vorderfläche der Hornhaut am lebenden menschlichen Auge.* Oken's Isis. Jahrg. 1840. S. 886\*.
- 1841.
467. R. H. KOHLRAUSCH. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges.* Berlin. S. 16—93.
- 1846.
468. SENFF. R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiol. Bd. III. Abth. 1. Art.: Sehen. S. 271\*.
- 1847.
469. E. BRÜCKE. *Beschreibung des menschlichen Augapfels.* S. 4 u. 45\*.
- 1855.
470. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Accommodation des Auges.* Graefe's Arch. f. Ophthalm I (2.) S. 3.
- 1856.
471. W. ZEHENDER. *Anleitung zur Dioptrik des Auges.* Erlangen.
- 1857.
472. F. ABLT. *Zur Anatomie des Auges.* Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 87.
- 1858.
473. NUNNELEY. *On the organs of vision.* London. S. 129.

1859.

474. J. H. KNAPP. *Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges.* Habilit.-Schr. Heidelberg. Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 1—52.

1860.

475. MEYERSTEIN. *Beschreibung eines Ophthalmometers nach Helmholtz.* Pogg. Ann. CXI. 415—425. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. XI. 185—192.

1861.

476. v. JÄGER. *Ueber die Einstellung des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge.* Wien.

1863.

477. F. C. DONDERS. *Ueber einen Spannungsmesser des Auges. (Ophthalmotonometer.)* Graefe's Arch. IX. (2.) S. 215.

1864.

478. B. SCHELSKE. *Ueber das Verhältniß des intraocularen Drucks zur Hornhautkrümmung.* Arch. f. Ophthalm. X. 2. S. 1—46.

1865.

479. H. DOR. *Ueber ein verbessertes Tonometer.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 351.

480. L. MANDELSTAMM. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. 2. S. 259.

481. B. ROSOW. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. 2. S. 129.

1867.

482. A. WEBER. *Einige Worte über Tonometrie.* Graefe's Arch. XIII. S. 201.

1868.

483. E. ADAMÜCK. *Noch einige Bemerkungen über den Intraoculardruck.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 386.

484. H. DOR. *Ueber Ophthalmotonometrie.* Graefe's Arch. XIV. (1.) S. 13. — Compt. Rend. du Congr. d'Ophthalm. Paris.

1869.

485. H. GEROLD. *Ophthalmologische Optik.* Wien.

486. L. MAUTHNER. *Ueber den Winkel  $\alpha$ .* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. VII. S. 481. Wien. med. Presse. No. 34—37.

487. A. J. W. MONNIK. *Tonometers and Tonometrie.* Verslag v. het Ned. Gasth. voor ooglijders. No. X. S. 55.

488. STRAWBRIDGE. *Ophthalmometrische Messungen.* Sitzgs.-Ber. d. ophthalm. Ges. Klin. Mon.-Bl. S. 480.

489. REUSS und WOINOW. *Ophthalmometrische Studien.* Wien.

490. WOINOW. *Ueber den Winkel  $\alpha$ .* Klin. Monatsbl. VII. S. 482.

491. — *Neuer Apparat zu ophthalmometrischen Messungen.* Med. C. Bl. 1869. S. 497—498.

1870.

492. F. HOLMGREN. *Om ophthalmometran. (Ueber Ophthalmometer).* Upsala Läkaref. Förh. VI. S. 169—208.

493. A. J. W. MONNIK. *Een nieuwe tonometer en zyn gebruik.* Ned. Arch. voor Genees- en Natuurk. V. S. 66. — Onderz., gedaan in het Physiol. Labor. der Utrechtsche Hoogeschool. III. S. 20.

494. — *Ein neues Tonometer und sein Gebrauch.* Graefe's Arch. XVI. (1.) S. 49.

495. M. WOINOW. *Ueber Ophthalmometrie.* (Russisch.) Milit. Med. Zeitschr. St. Petersburg.

496. — *Weitere Beiträge zur Kenntniß des Winkels  $\alpha$ .* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 225.

1871.

497. F. HOLMGREN. *En ophthalmometer. (Ein Ophthalmometer.)* Upsala Läkaref. Förh. VII. S. 171—172.

498. E. PFLÜGER. *Beiträge zur Ophthalmotonometrie.* Diss. Bern.

499. WOINOW. *Ophthalmometrie.* Wien.

500. — *Analyse critique de la méthode ophthalmométrique de l'investigation des éléments dioptriques de l'oeil.* Diss. inaug. Moscou.

1872.

501. A. COCCIUS. *Ophthalmometrie und Spannungsmessung am kranken Auge.* Leipzig. 55 S.

502. K. HÄLLSTÉN. *Lärobok i Ophthalmometrie.* Helsingfors. 1872.

503. WOINOW. *Ophthalmometrische Messungen an Kinderaugen.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 280.  
1873.
504. C. L. FERGE. *Ein neues Instrument zur Bestimmung des Durchmessers der Hornhautbasis und der Pupillengröße.* Leipzig.
505. A. v. REUSS. *Ophthalmometrische Messungen bei Keratoconus.* Wiener Med. Presse.  
1874.
506. BAUER. *Ueber den scheinbaren Ort eines in einem dichteren durchsichtigen Medium befindlichen, sowie eines durch eine sogenannte planparallele Platte beobachteten Lichtpunktes.* Pogg. Ann. Bd. 153. S. 572
507. HIRSCHBERG. *Zur ophthalmometrischen Rechnung (Ableitung der Grundformel für den Krümmungsradius eines beliebigen Ellipsenpunktes).* Arch. f. Augen- und Ohrenheilkde. III. 2. S. 160.
508. M. REICH. *Resultate einiger ophthalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen.* Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 207.
509. SNELLEN und LANDOLT. *Ophthalmometrie in Graefe-Sämisch,* Handb. d. ges. Augenheilkde. Bd. III. S. 204.  
1875.
510. MÖNNICH. *Untersuchungen über die scheinbare Ortsveränderung eines leuchtenden Punktes durch ein von zwei parallelen Ebenen begrenztes lichtbrechendes Medium.* Rostock.  
1876.
511. O. E. SHAKESPEARE. *Description of a new ophthalmoscope and ophthalmometer.* Americ. Journ. of med. Sc. Bd. 141. S. 45.  
1877.
512. E. LANDOLT. *Ophthalmometer.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. I. S. 233.
513. W. RÖDER. *Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsveränderungen der menschlichen Hornhaut.* Arch. f. Ophthalm. XXIII. 4. S. 29—56.  
1878.
514. J. G. DITLEVSEN. *Die Nerven der Hornhaut.* (Dänisch.) Nord.med. Arch. X. No. 5.
515. E. LANDOLT. *L'ophthalmomètre.* Compt. Rend. et mém. du congr. intern. de Genève. S. 772.  
1880.
516. M. BLIX. *Oftalmometrisk Studier I.* Acad. Afh. Upsala. XVI. 6. S. 349—420.
517. E. v. FLEISCHL. *Ueber eine optische Eigenschaft der Cornea.* Wien. Ber. Bd. 82. Abth. 3.
518. E. JAVAL. *Ophthalmometer.* Ann. di Ottalm. IX. 3/4. S. 372. Ann. univ. di med. e chir. Parte rivista. Vol. 254. S. 353.
519. LOBING. *The Keratometer.* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. XVI. ann. meet. S. 136—141. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 349.
520. A. PLACIDO. *Nouvel instrument pour la recherche rapide des irrégularités de courbure de la cornée: l'astigmatoscope explorateur.* Period. de Oftalm. prat., rev. bimens. Lissabon. Sept.-Nov. 1880.
521. A. v. REUSS. *Ophthalmometrische Mittheilungen.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. 1.
522. SCZELKOW. *Zur Frage über die Veränderungen der Hornhautkrümmungen bei zunehmendem Alter.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XVIII. No. 44. S. 819.  
1881.
523. M. BLIX. *Ophthalmometer.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. S. 381.
524. E. JAVAL. *Mesure du rayon de courbure de la cornée.* Séances de la soc. de phys. S. 59.
525. JAVAL und SCHIÖTZ. *Un ophthalmomètre pratique.* Transact. of the internat. med. Congr. VIII. session. London. III. S. 30. Ann. d'Oculist. Bd. 86. S. 5—21.
526. A. v. REUSS. *Untersuchungen über den Einfluß des Lebensalters auf die Krümmung der Hornhaut nebst einigen Bemerkungen über die Dimensionen der Lidspalte.* Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 27.
527. SCHIÖTZ. *Ophthalmométrie.* Dict. encycl. dirig. par Dechambre. XVI. 1. S. 75—82.  
1882.
528. G. ALBERTOTTI. *Graduazione dell' oftalmometro di Helmholtz.* Atti della R. Accad. delle Sc. di Tor. XVII.



529. M. BLIX. *Nya bidrag till oftalmometricus utveckling*. Upsala Läkaref. Förh. XVII. S. 96.  
 530. FRAENKEL. *Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Aerzte. S. 89.  
 531. GAVARRET. *Astigmatisme et ophthalmométrie*. Rev. Scientif. XXX. S. 74.  
 532. HASNER. *Ueber Dr. Placido's Keratoscop*. Prag. med. Wochenschr. S. 121.  
 533. HIRSCHBERG. *Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Augenhkde. S. 59.  
 534. E. JAVAL. *Contribution à l'ophthalmométrie*. Ann. d'Oculist. Bd. 87. S. 213.  
 535. — *Deuxième contribution à l'ophthalmométrie*. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 33.  
 536. G. MAYERHAUSEN. *Notis sur klinischen Veranschaulichung des Winkels  $\gamma$* . Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Jahrg. VI. S. 123.  
 537. F. R. PEREZ-CABALLERO. *La oftalmometrologia, sus procedimientos y aplicaciones*. Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. I. S. 16, 129, 321.  
 1888.  
 538. DÖRFFEL. *Das stabile Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 30.  
 539. HOLTZE. *Experimentelle Untersuchungen über den Druck in der Augenkammer*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (2.) S. 1.  
 540. E. JAVAL. *Ophthalmomètre*. Bull. et mém. de la Soc. franç. d'Ophthalm. S. 31.  
 541. — *Troisième contribution à l'ophthalmométrie. Description de quelques images këratoscopiques*. Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 5.  
 542. — *Quatrième contribution à l'ophthalmométrie*. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 105.  
 543. — *Sur l'ophthalmométrie. (Influenc de la taille et de la race sur les dimensions de la cornée.)* Bull. de la soc. d'anthrop. 5 juill. S. 621.  
 544. A. KÖNIG. *Das Ophthalmometer, seine Construction und seine Theorie*. Zeitschr. f. Instr.-Kde. III. S. 153—158.  
 545. LANDSBERG. *The keratroscope*. Phil. Med. Times. VIII. S. 784.  
 546. LAQUEUR. *Ophthalmometrische Untersuchungen über Verhältnisse der Hornhautkrümmung im normalen Zustand und unter pathologischen Bedingungen*. Ber. d. XV. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 17.  
 547. H. SCHIÖTZ. *Om nogle optiske Egenskaber ved Cornea*. Nord. med. Arch. XIV. No. 28.  
 548. WECKER und MASSELON. *La këratoscopie clinique*. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 165.  
 1884.  
 549. HUBERT et J. M. PROUFF. *Këratoscopie, nouveau këratoscope*. Rev. clin. d'ocul. Mai. S. 110.  
 550. E. JAVAL. *Variation de courbure de la cornée en synchronisme avec les pulsations cardiaques*. Progr. méd. No. 43.  
 551. — *Variations rythmiques de la courbure de la cornée*. Compt. Rend. Soc. de Biol. 18. Oct. S. 581.  
 552. LAQUEUR. *Ueber die Hornhautkrümmung im normalen Zustande und unter pathologischen Verhältnissen*. Graefe's Arch. Bd. 30. (1.) S. 99.  
 553. A. LEAHY. *On keratotomy as a means of diagnosing errors of refraction*. Indian med. Gaz. XIX. S. 184.  
 554. F. R. PEREZ-CABALLERO. *La oftalmometrologia, sus procedimientos y aplicaciones*. Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. VIII. S. 237.  
 555. J. M. PROUFF. *De la sclérotoscopie*. Rev. d'ocul. de Sud-Ouest. Febr. 1884.  
 556. UNTHOFF. *Ueber eine neue Methode, den Winkel  $\alpha$ , resp.  $\gamma$  zu bestimmen*. Sitzg.-Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg.  
 557. WECKER und MASSELON. *Këratoscopie clinique*. Paris. 1884.  
 558. — *L'arc këratoscopique, son emploi comme këratoconomètre, pupillomètre et strabomètre*. Rev. clin. d'ocul. S. 201.  
 559. — *La këratoconométrie*. Rev. clin. d'ocul. IV. S. 5.  
 560. — *La queratocopia clinica*. Oftalm. pract. III. S. 25.  
 561. H. WESTIEN. *Mittheilungen aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock (über den Gang der Lichtstrahlen in der accommodirten und ruhenden Linse und durch die Ophthalmometerplatten)*. Zeitschr. f. Instr.-Kkde. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 217.  
 1885.  
 562. H. AUBERT. *Nähert sich die Hornhautkrümmung am meisten der Ellipse?* Pflüger's Arch. XXXV. 597—621.  
 563. S. M. BURNETT. *Ophthalmometry with the ophthalmometer of Javal and Schiötz*. Arch. of Ophthalm. XIV. No. 2/3. S. 169.

564. HÖLTZKE. *Experimentelle Untersuchungen über den intraocularen Druck*. Verh. d. Physiol. Ges. zu Berlin, 22. Mai 1885.
565. E. JAVAL. *Mensuration de la courbure de la cornée*. Gaz. d. Hôp. S. 1011.
566. L. ISSEKUTS. *Ophthalmometrie-Tafeln*. Szemészet. S. 87.
567. PROUFF. *Kératoscope*. Arch. d'Ophthalm. S. 182.
568. — *Sclérotoscopie*. Arch. d'Ophthalm. 1885. S. 165.
569. SCHIÖTZ. *Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen*. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 37.
- 1886.
570. G. ALBERTOTTI. *Determinazione pratica dell'angolo  $\alpha$* . Rasseg. di sc. med. I. S. 253.
571. L. BELLARMINOW. *Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung des intraocularen Drucks*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 39. S. 449—472.
572. J. BORDEKER. *Vergleichende Druckmessung in der vorderen Kammer und dem Glaskörper des Auges*.
573. BOURGEOIS und TSCHERNING. *Recherches sur les relations qui existent entre la courbure de la cornée, la circonférence de la tête et de la taille*. Ann. d'Ocul. Bd. 96. S. 203.
574. F. DENTI. *Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo*. Gazz. med. Ital. Lomb.
575. LEROY. *Sur l'ophthalmomètre de précision*. Ann. d'Ocul. Bd. 95. S. 209.
576. PR. SMITH. *A keratometer*. Ophthalm. Rev. S. 316.
577. M. TSCHERNING. *Ueber die Abhängigkeit zwischen der Krümmung der Cornea, der Körperhöhe und dem Umfang des Kopfes*. Kopenhagen. Hosp. tid. No. 48.
578. W. UETHOFF. *Ueber eine neue Bestimmungsmethode des Winkels  $\gamma$  zwischen der Blicklinie und der durch den Hornhautmittelpunkt gehenden Senkrechten*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXIV. 304—309.
579. WEISS. *Ueber den Einfluß der Spannung der Augenlider auf die Krümmung der Hornhaut und damit auf die Refraction des Auges*. Ber. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1886. S. 72.
580. W. ZEHENDER. *Eine binoculäre Cornealoupe*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 504.
- 1887.
581. L. BELLARMINOW. *Verbessert Apparat zur graphischen Untersuchung des intraocularen Drucks und der Pupillenbewegung*. Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 126. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 181.
582. CUIGNET. *Des images kératoscopiques*. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 229. Und: Rec. d'Ophthalm. S. 262.
583. F. DENTI. *Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo*. Ann. di Ottalm. XV. 5/6. S. 588.
584. E. JAVAL. *Sur l'ophthalmométrie pratique*. Soc. franç.
585. M. TSCHERNING. *Ophthalmométrie*. Soc. franç. d'Ophthalm. S. 199.
586. — *Contribution à l'ophthalmométrie pratique*. Soc. franç. d'ophthalm. S. 11.
587. H. WESTIEN. *Ophthalmometerplattenmodell nach Prof. Aubert*. Zeitschr. f. Instrum.-Kde. VII. S. 52.
588. W. ZEHENDER. *Beschreibung der binocularen Cornealoupe*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 496.
- 1888.
589. L. BELLARMINOW. *Vervollkommener Apparat für die graphische Untersuchung des intraocularen Druckes und der Pupillenbewegung*. (Russisch.) Westnik. ophthalm. V. 2. S. 142.
590. M. S. BURNETT. *An analysis of 576 cases of the refraction of healthy human corneae, examined with the ophthalmometer of Javal and Schiöts*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 199.
591. E. DESJARDINS. *De la kératoscopie comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme*. Gaz. méd. de Montréal. II. S. 214.
592. W. EISSEN. *Hornhautkrümmung bei erhöhtem intraocularem Druck*. Inaug.-Diss. Bern. 1888. — Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. 2. S. 1.
593. E. JAVAL. *Ueber Ophthalmometrie*. Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 26.
594. — *Ophthalmometer*. Rec. d'Ophthalm. S. 315.
595. — *Un perfectionnement à l'ophthalmomètre*. Compt. Rend. de la soc. franç. d'ophthalm. S. 237.

596. C. J. A. LEROY. *Nouvel ophthalmomètre*. Arch. d'Ophthalm.
597. — *Sur la forme de la cornée humaine normale*. Compt. Rend. Bd. 107. S. 64.
598. A. LEROY und R. DUBOIS. *Nouvel ophthalmomètre*. Rev. gén. d'Ophthalm. [12] Ann. d'Oculist. Bd. 99. S. 123.
599. G. SECONDI. *Variabilità dell'angolo  $\alpha$  nelle diverse direzioni dello sguardo*. Giorn. d. R. Accad. di med. di Torino. S. 494.
600. TSCHERNING. *Ophthalmometer*. Rec. d'Ophthalm. S. 315. 1889.
601. G. ALBERTOTTI. *Considerazioni riguardanti l'oftalmometro di Leroy e Dubois*. Rasseg. di sc. med. S. 382.
602. H. FERRER. *Javal'sches Ophthalmometer*. Ber. üb. d. 20. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 170.
603. C. J. A. LEROY. *Quelques perfectionnements de l'ophthalmomètre Leroy et Dubois*. Rev. gén. d'Ophthalm. VIII. S. 111.
604. — *Recherches sur l'influence exercée par les muscles de l'oeil sur la forme normale de la cornée humaine*. Arch. de physiol. janv.
605. E. MEYER. *De la forme de l'hémisphère antérieure de l'oeil déterminée par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 529.
606. SCHNELLER. *Ueber Formveränderungen des Auges durch Muskeldruck*. Gruch. Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 76—112.
607. P. SMITH. *On the size of the cornea in relation to age, sex, refraction and primary glaucoma*. Transact. of the Ophthalm. Soc. X. 1889/90. S. 68. Ophthalm. Rev. S. 30. 1890.
608. BAJARDI. *Alcune osservazioni sulla forma della cornea*. XII. Congresso dell'Associazione Oftalmologica Ital. Pisa. 1890. Ann. di Ottalm. XIX.
609. C. DU BOIS-REYMOND. *Keratoskop zur Messung des Hornhaut-Astigmatismus*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XIV. S. 257—259.
610. S. BOSS. *Ueber Veränderungen des Hornhautradius unter dem Einflusse von Atropin, Homatropin, Physostigmin und Cocain*. Dissert. Straßburg 1890.
611. E. MEYER. *Hémisphère antérieure de l'œil déterminé par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique*. Ann. d'Ocul. Bd. 103. S. 32.
612. PFISTER u. STREIT. *Ophthalmometer nach Javal und Schiötz in modificirter Construction ausgeführt*. Bern. 1890.
613. PFLÜGER. *Ophthalmometer und Oculo-Curvimeter*. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerz. XX.
614. J. ROTH. *Ueber Astigmatismus und Ophthalmometrie*. Dissert. Zürich. Wiesbaden. Bergmann. 1890. 67 S.
615. SCHMIDT-RIMPLER. *Demonstration der Westien-Zehender'schen binocular Cornealoupe*. Berl. klin. Wochenschr. No. 3.
616. SCIMENI. *Sulla modificazione della curvatura della cornea in seguito ad estrazione di cataratta*. Ann. di Ottalm. XIX. S. 209.
617. SPEAKMAN. *Description of Javal's new ophthalmometer, model of 1889*. Arch. opth. New-York. XIX. S. 76.
618. D. E. SULZER. *Méthode pour déterminer le pôle d'un ellipsoïde à trois axes inégaux par l'observation de ses images catoptriques*. Compt. Rend. Bd. 110. S. 568.
619. TSCHERNING. *Une nouvelle méthode pour mesurer les rayons de courbure du corallin*. Rév. gén. d'Opht. S. 218. 1891.
620. H. AUBERT. *Die Genauigkeit der Ophthalmometer-Messungen*. Pflüger's Arch. XLII S. 626—638.
621. P. BAJARDI. *Alcune osservazioni sulla forma della cornea*. Ann. di Ottalm. XX. S. 285.
622. — *Eine Modification des Ophthalmometers zur gleichzeitigen Messung der zwei Hauptmeridiane der Cornea*. Giorn. dell' Accad. di Med. di Torino Fasc. 1-2.
623. BECCARIA. *Ophthalmometrische Beobachtungen bei Gehirncompression*. Ann. di Ottalm. Fasc. 1 et 2.
624. S. M. BURNETT. *Contributions to keratometry*. Ophth. Rev. Aug. u. Sept. 1891. (Americ. med. Assoc. Section of Ophthalm. Jahrescongrès zu Washington. Mai 1891.)
625. E. JAVAL. *Mémoires d'ophthalmométrie*. Paris. G. Masson. 626 S.
626. F. OSTWALT. *Quelques remarques sur l'ophthalmomètre de Javal et de Schiötz*. Rev. gén. d'Ophthalm. 1891. S. 100.

627. J. B. STORY. *The ophthalmometer in practice*. Ophthalm. Rev. No. 117. S. 198.
628. D. E. SULZER. *La forme de la cornée et son influence sur la vision*. Arch. d'Ophthalm. Tome XI. S. 419—435.
629. — *La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision*. Progr. méd. No. 19—20. — Rec. d'ophthalm. No. 5. S. 282.
630. TSCHERNING. *Théorie mathématique de l'ophtalmométrie de la cornée*. Enthalten in Javal, Mém. d'ophtalmométrie. S. 573—618. 1892.
631. E. J. BISSELL. *Observations with Javal's ophthalmometre*. Journ. of Ophthalm. Oct. 1892.
632. A. E. DAVIS. *Javal's ophthalmometre and atropine in determining errors of refraction with an incidental notice on eye strain and graduated tenotomie*. New York med. Journ. Vol. LVI. No. 15. S. 896.
633. H. DERBY. *Recent added facilities for the examination of the eye. I. The Ophthalmometer of Javal-Schiöts. II. The Phorometer of Stevens. III. The Arc-Light adapted for the Ophthalmoscope*. Boston med. and surg. Journ. of June 9. 1892.
634. F. B. EATON. *Some practical uses of the ophthalmometer of Javal-Schiöts*. Med. Rec. 12. Nov.
635. R. GREEFF. *Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike*. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abt. Jahrg. 1892. S. 113—136.
636. HIGHER. *L'ophtalmomètre de poche du Dr. Reid*. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 174—176.
637. MAKLAKOFF. *Contribution à l'ophtalmotonométrie*. Arch. d'ophthalm. XII. S. 321 bis 349.
638. SULZER. *Der Einfluss des Winkels  $\alpha$  auf die Resultate der Ophthalmometrie und dessen Bestimmung vermittelt des Ophthalmometers*. Verh. des X. internat. Congr. Bd. IV. S. 138.
639. — *La forme de la cornée et son influence sur la vision*. Paris. Steinheil. 1892.
640. — *La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision*. 2. Partie: *Influence de la cornée sur la vision*. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 32—50.
641. C. M. THOMAS. *A few observations on the use of Javal's ophthalmometre*. Journ. of ophthalm. Oct. 1892.
642. W. WALDEYER. *Ueber die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Kunst*. Sitzgs.-Ber. d. Berl. Acad. S. 45—46.
643. J. H. WOODWARD. *The Ophthalmometer of Javal and Schiöts and the diagnosis of astigmatism*. New York med. Journ. Vol. LVI. No. 3. S. 66. 1898.
644. BECCARIA. *Änderung der Hornhautkrümmung bei Vortreibung des Augapfels nach vorn*. Ann. di Ottalm. XXII. 1.
645. H. BERTIN-SANS. *Les variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin*. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 240—244.
646. B. BURBO. *Recherches sur la relation entre la courbure de la sclérotique et celle de la cornée dans le méridien horizontal*. Diss. Clermont. 1893. — Rev. gén. d'Ophthalm. XII. S. 49—65.
647. S. M. BURNETT. *Ophthalmometry in the United States and its championship*. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. X. S. 5.
648. H. C. CHAPMAN & A. P. BRUBAKER. *The radius of curvatures of the cornea*. Proc. Acad. of Nat. Sc. Philad. Sept. 26.
649. J. H. CLAIBORNE. *A hand ophthalmometer and retinoscope combined*. New York med. Journ. Vol. LVIII. S. 378.
650. ERIKSEN. *Hornhinde maolinger (Messung der Hornhaut)*. Diss. Aarhus. 1893. — Nord. med. Arch. XXV. 4.
651. D. W. HUNTER. *The Ophthalmometer*. New York med. Journ. Vol. LVII. S. 49.
652. L. J. LAUTENBACH. *A few thoughts about ophthalmometry, as to what the Javal instrument will do and what it will not do*. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. X. No. 9. S. 278. — Ophthalm. Rec. Vol. III. S. 201.
653. — *The value of ophthalmometer in the determination of the axis and the amount of astigmatism*. New York med. Journ. No. 766. S. 156.

654. TH. REID. *On a portable ophthalmometer*. Proc. of the Roy. Soc. LIII. S. 1—6.  
 655. F. SCHANZ. *Ein Hornhautmikroskop*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 99—103.  
 656. C. WEILAND. *History and principles of keratometry; its value and limitation in the correction of astigmatism*. Arch. of Ophthalm. Bd. XXII. S. 37—61.  
 1894.  
 657. G. ABLSTRÖM. *Oftalmometriska Studier*. (*Ophthalmometrische Studien*.) Göteborgs Läkarsällskaps Forhandlingar. 1894. Heft 1.  
 658. WM. S. DENNET. *Illumination of the Javal and Schiötz Ophthalmometer*. New York eye and ear infirmity Reports. II. S. 27.  
 659. L. FERRY. *Determinazione dell'angolo  $\alpha$  col perimetro*. Ann. di Ottalm. XXIII. S. 175.  
 660. G. W. GROVE. *Die Graduierung des Bogens am Javal'schen Ophthalmometer und die Graduierung auf einem geraden Arm*. Ann. of Ophthalm. a. Otol.  
 661. MOAURO. *Réfractométrie et Ophthalmométrie*. Ann. d'Oculist. CXI. S. 350—371.  
 662. NICATI. *Le problème de la tension intra-oculaire et ses applications*. Rev. gén. d'Ophthalm. XIII. S. 165—167.  
 663. F. ÖSTWALT. *Ophthalmotonometrische Studie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5) S. 22—49.  
 664. P. SGRosso. *Communications cliniques d'optométrie, ophthalmométrie, skiascopie, etc.* Arch. di Ottalm. II. 1/2.

## § 3.

## Die Uvea.

Wegen der speciell anatomischen Litteratur siehe auch § 1, a.

### 1. Anatomie und Physiologie der Iris und des Oiliarkörpers. — Das Tapetum lucidum.

1728.  
 665. F. P. DU PETIT. *Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme*. Mém. de l'Acad. Roy. des sciences. S. 206 u. 289.  
 1821.  
 666. E. H. WEBER. *Tractatus de motu iridis*. Lipsiae.  
 1850.  
 667. C. STELLWAG VON CARION. *Zeitschr. d. Wien. Aerzte*. 3. S. 125.  
 1851.  
 668. E. H. WEBER. *Summa doctrinae de motu iridis*. Lipsiae.  
 1852.  
 669. A. CRAMER in *Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot bevord. der Geneeskunst*. 1852. Jan.  
 1853.  
 670. A. CRAMER. *Het Accommodatievermogen der Oogen*. Haarlem. bl. 61.\*  
 1855.  
 671. J. BUDGE. *Ueber die Bewegung der Iris*. Braunschweig. S. 5—10. (Giebt auch die ältere Litteratur der Streitfrage.)  
 672. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Accommodation des Auges*. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. I. Abth. 2. S. 30.  
 673. A. KUSSMAUL. *Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegung der Iris und auf andere Theile des Kopfes ausübt*. Würzburg. Dissert.

674. VAN BEEKEN. *Ontleedkundig onderzoek van den toestel voor accommodatie van het Oog*. Onderzoekingen gedaan in het Physiol. Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VII. 248—586.
675. H. ROUGET *Gaz. méd.* No. 50.
- 1856.
676. H. MÜLLER. *Réclamation de priorité*. *Compt. Rend.* XLII. S. 1218—1219.
677. C. ROUGET. *Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles. Appareil de l'adaptation de l'oeuil*. *Compt. Rend.* XLII. S. 937—941. — *Inst.* S. 193—194. — *Cosmos*. VIII. S. 559—560.
678. — *Réponse à une réclamation de priorité adressée par M. Müller*. *Compt. Rend.* XLII. S. 1255—1256. — *Inst.* S. 245. — *Cosmos*. IX. 9.
- 1857.
679. F. ABLT. *Zur Anatomie des Auges*. *Arch. f. Ophthalm.* III. (2.)
680. H. MÜLLER. *Ueber einen ringsförmigen Muskel am Ciliarkörper*. *Arch. f. Ophthalm.* III. (1.)
- 1858.
681. H. MÜLLER. *Einige Bemerkungen über die Binnenmuskeln des Auges*. *Arch. f. Ophthalm.* IV. (2.) S. 277—285.
- 1860.
682. W. HENKE. *Der Mechanismus der Accommodation für Nähe und Ferne*. *Arch. f. Ophthalm.* VI. (2.) S. 53—72.
- 1866.
683. O. BRÜCKE. *Lage und Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge*. *Wien. med. Jahrb.* S. 159.
- 1865.
684. F. C. DONDEERS. *Reflexie-beweging der beide pupillen bij het invallen von licht aan éene zijde*. *Nederl. Arch. voor Gen.-en Natuurk.* II.
685. A. GRÜNHAGEN. *Ueber Irisbewegung*. *Virchow's Arch.* XXX. S. 481—524.
686. — *Bemerkungen, die Bewegung der Iris betreffend*. *Berl. klin. Wochenschr.* No. 23 u. 24.
687. FR. HOLMGREN. *Undersökning, betröffand den Bewegingsmekanismus der Iris mit Hilfe von Kalabar und Atropin*. Drei Abhandlungen. *Upsala Läkaref. Förh.* I. S. 64—76. S. 160—177. II. S. 148—160. (1865—1866.)
- 1866.
688. F. C. DONDEERS u. D. DOIJER. *Reflexie-beweging der beide pupillen, bij het invallen von licht aan éene zijde*. Amsterdam.
689. A. GRÜNHAGEN. *Ueber das Vorkommen eines Dilatator pupillae in der Iris des Menschen und der Säugethiere*. *Zeitschr. f. rat. Med.* Bd. 25. S. 176.
- 1867.
690. F. E. SCHULZE. *Der Ciliarmuskel des Menschen*. *Arch. f. mikr. Anat.* 1867. Bd. III. (4.) S. 477.
- 1868.
691. A. EULENBURG u. H. SCHMIDT. *Untersuchungen über den Einfluss bestimmter Galvanisationsweisen auf die Pupille etc.* *Centralbl. f. d. med. Wiss.* S. 321. 338.
692. M. SCHIFF. *Sui movimenti dell' iride etc.* *Giorn. d. sc. nat. e. econ.* Palermo. IV. S. 40.
693. S. SCHUR. *Einfluss des Lichts, der Wärme und einiger anderer Agentien auf die Weite der Pupille*. *Zeitschr. f. rat. Med.* XXXI. (3.) S. 373.
- 1869.
694. F. ABLT jun. *Beitrag zur Kenntniss der Zeitverhältnisse bei den Bewegungen der Iris*. *Arch. f. Ophthalm.* XV. (1.) S. 294—301.
695. J. DOGIEL. *Ueber den M. dilatator pupillae bei Säugethieren, Menschen und Vögeln*. *Arch. f. mikrosk. Anat.* VI. (1.) S. 89.
696. G. ENGELHARDT. *Beiträge zur Lehre von den Bewegungen der Iris*. Leipzig. (Unters. a. d. physiol. Labor. zu Würzburg. 4. Heft. S. 297.)
697. A. GRÜNHAGEN. *Ueber den vermeintlichen Dilatator pupillae der Kaninchen-Iris*. *Zeitschr. f. rat. Med.* XXXVI. (1.) S. 40.
698. A. IWANOFF u. A. ROLLETT. *Bemerkungen zur Anatomie des Iris-Anheftung und des Annulus ciliaris*. *Arch. f. Ophthalm.* XV. Abth. 1. S. 17.
699. H. SCHÖRLER. *Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Irisbewegung*. Dissert. Dorpat.

1870.  
700. A. GRÜNHAGEN. *Zur Irisbewegung*. Pflüger's Arch. f. Phys. III. S. 440.  
1874.  
701. P. FRANCIEL. *Sur les mouvements de l'iris*. Paris.  
702. A. SCHLESINGER. *Eine Innervationserscheinung der Iris*. Pest. med. - chir. Presse X. S. 13—14.  
703. A. VULPIAN. *Note relative à l'influence de l'exstirpation du ganglion cervical supérieur sur les mouvements de l'iris*. Arch. de physiol. S. 177.  
1875.  
704. ALBINI. *Rapporti fra i movimenti dell' iride e la funzione visiva*. Rendic. d. Nap XIV. No. 12. S. 216.  
705. DEBOVEY. *Considérations sur les mouvements de l'iris*. Paris. Delahaye. 1875.  
1876.  
706. FR. HOLMGREN. *Untersuchung über die Irisbewegungen*. Upsala Läkaref. Förh. XI S. 476—481.  
1877.  
707. S. REMBOLD. *Ueber Pupillarbewegung*. Tübingen.  
1878.  
708. ARGYROPULOS. *Beiträge zur Physiologie der Pupillarnerven*. Inaug.-Dissert. Gießen. 1878.  
709. H. F. FORMAD. *Die Vertheilung der Nerven in der Iris*. Americ. Journ. of med. Sc. Jan. 1878.  
710. HURWITZ. *Ueber Reflexdilatation der Pupille*. Inaug.-Diss. Erlangen. 1878.  
711. A. MEYER. *Ueber Nervenendigungen der Iris*. Centralbl. f. med. Wiss. 1878. No. 7.  
712. NACHTEL. *Dilatation de la pupille*. Progr. méd. No. 24.  
713. PICARD. *Ueber die Bewegungen der Pupille*. Gaz. des Hôp. No. 93. Gaz. hebdom. S. 314.  
714. E. RÄHLMANN u. L. WITKOWSKI. *Ueber das Verhalten der Pupillen im Schlaf nebst Bemerkungen zur Innervation der Iris*. du Bois' Arch. f. Physiol. Jahrg. 1878.  
1879.  
715. F. J. C. ACKROYD. *Ueber Irisbewegung*. Journ. of physiol. XIII. S. 146.  
716. E. GYSI. *Beiträge zur Physiologie der Iris*. Berner Diss. Aarau. 39 S.  
1880.  
717. HEDDAEUS. *Klinische Studien über die Beziehungen zwischen Pupillarreaktion und Sehevermögen*. Inaug.-Diss. Berlin. 1880.  
718. B. LUCHSINGER. *Ueber den Einfluss des Lichtes und der Wärme auf die Iris einiger Kaltblüter*. Mitth. d. naturf. Ges. Bern. Abth. 102.  
1881.  
719. F. FRANCK. *Recherches sur les nerfs dilatateurs de la pupille*. Trav. du laborat. de Marey. S. 1.  
720. G. JORISSENNE. *Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique*. Paris. Delahaye. Ann. et Bull. de la soc. de méd. de Gand. Juli u. Aug. 1881.  
721. J. LEESER. *Beitrag zur Physiologie der Pupillarbewegung*. Halle.  
722. — *Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung*. Wiesbaden. 124 S.  
723. P. LUTZE. *Warum muß vom physiologischen Standpunkte aus ein musculus dilatator pupillae gefordert werden?* Diss. Leipzig. 20 S.  
724. MORIGGIA. *Sul meccanismo dei movimenti dell' iride*. R. Accad. dei Lincei. 3. IV. S. 219—224.  
725. M. v. VINTSCHGAU. *Zeitbestimmungen der Bewegungen der eigenen Iris*. Pflüger's Arch. Bd. 26. S. 324.  
1882.  
726. BRAILEY. *On some points in the anatomy of the ciliary body*. Brit. med. Journ II. S. 577.  
727. O. EVERBUSCH. *Vergleichende Studien über den feineren Bau der Iris*. Zeitsch. f. vergl. Augenheilkde. S. 49.  
728. FÉRÉ. *Mouvements de la pupille*. Journ. de Thérap. No. 2. — Progr. méd. II (81.) 53. — Soc. de Biol. 17. Dec. 1881.  
729. B. LUCHSINGER. *Ueber die Wirkung von Kälte und Wärme auf die Iris der Frösche*. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern. 1882. S. 74.

730. MORIGGIA. *Die Bewegungen der Iris und ihr Mechanismus.* Moleschott's Unters. z. Naturl. d. Menschen u. d. Thiere. XIII. 1. S. 1.
731. H. MUNK. *Ueber das Tapetum der Säugethiere.* Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1882/83. S. 2.
732. PARINAUD. *De l'exagération des réflexes pupillaires.* Gaz. des Hôp. Rec. d'Ophth. S. 688.
733. PARROT. *Sur un phénomène pupillaire observé dans quelques états pathologiques de la première enfance.* Rev. de méd. S. 809.
734. M. PREUSSE. *Ueber das Tapetum des Haussäugethiere.* Arch. f. Thierheilkde. VIII. S. 264—280.
735. SCHADOW. *Beiträge zur Physiologie der Irisbewegung.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 183.
736. M. v. VINTSCHGAU. *Weitere Beobachtungen über die Bewegung der eigenen Iris.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXVII. S. 184—197.  
1888.
737. W. v. BECHTEREW. *Ueber den Verlauf der die Pupille verengenden Nervenfasern und über die Lokalisation eines Centrums für die Iris und Contraction der Augenmuskeln.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXI. S. 60.
738. A. GRÜNHAGEN. *Die Nerven der Ciliarfortsätze des Kaninchens.* Arch. f. mikrosk. Anat. XXII. S. 369.
739. MERCANTI. *Recherches sur le muscle ciliaire des reptiles.* Arch. Ital. de Biol. IV. S. 197.
740. P. J. MÖBIUS. *Notiz über das Verhalten der Pupille bei alten Leuten.* Centralbl. f. Nervenheilkde. No. 15.
741. MOELI. *Bemerkungen zur Untersuchung der Pupillenreaction.* Berl. klin. Wochenschr. No. 6.
742. H. MUNK. *Ueber das Tapetum der Säugethiere.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 125.  
1884.
743. A. GRÜNHAGEN u. R. COHN. *Ueber den Ursprung der pupillen-dilatirenden Nerven.* Centralbl. f. Augenheilkde. S. 165.
744. S. MAYER u. F. PRIEBRAM. *Studien über die Pupille.* Prag. Zeitschr. f. Heilkde. V. S. 15.
745. SHEGLINSKY. *Die Bewegungen der Pupille.* Diss. Kasan.  
1885.
746. J. AITKEN. *The pupil of the Eyes during Emotion.* Nat. XXXI. 553.
747. L. BELLARMINOW. *Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung der Pupillenbewegung.* Photochoreograph. Pflüger's Arch. Bd. 37. S. 107—122.
748. A. BERTILLON. *La couleur de l'iris.* Rev. scient. XXXVI. S. 65.
749. F. BOÉ. *Quelques recherches sur la couche pigmentaire de l'iris et sur le soi-disant muscle dilatateur de la pupille.* Arch. d'ophth. V. S. 311.
750. FERRIER. *Dilatatornerves of the iris.* Proc. of the Roy. Soc. XXXV. S. 229.
751. J. JEGOROW. *Wirkung der langen Ciliarnerven auf die Erweiterung der Pupille.* Gaz. lek. Warszawa. (2.) V. S. 409. Diss. Kasan.
752. JESSOP. *Pupillary movements associated with extrinsic movements.* Ophth. rev. Lancet. II. S. 996.
753. P. KASCHANOWSKI. *Einwirkung der Cervicalportion des Nervus sympathicus auf die Pupille.* Med. pribav. k. morak. sborniku. St. Petersburg. Aug.-Sept. S. 119, 161.
754. N. KOVALEWSKY. *Influence du système nerveux sur la dilatation de la pupille.* Arch. slav. de Biol. I. S. 92, 575.
755. SCHMEICHLER. *Klinische Pupillenstudien.* Wien. med. Wochenschr. S. 1179, 1209, 1246, 1275.
756. S. WILKS. *The pupil of the eyes during emotion.* Nat. XXXI. 458.
757. N. ZEGLINSKI. *Experimentelle Untersuchung über die Irisbewegung.* du Bois' Arch. Jahrg. 1885. 1—37.  
1886.
758. W. v. BECHTEREW. *Rétrécissement réflexe de la pupille par la lumière.* Arch. slav. de biol. I. S. 356.
759. J. DOGIEL. *Neue Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel der Säugethiere und Vögel.* Arch. f. mikrosk. Anat. XXVII. S. 403.



760. A. DOSTORWSKI. *Zur Frage über die Existenz eines pupillenerweiternden Muskels beim Menschen und Säugethieren.* (Russisch.) Wratsch. S. 641.
761. HAAB. *Neuer Pupillarreflex.* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. No. 6.
762. E. HEDDARUS. *Die Pupillarreaktion auf Licht, ihre Prüfung, Messung und klinische Bedeutung.* Wiesbaden. Bergmann. 1886. 79 S.
763. J. JEGOROW. *Ueber den Einfluss der langen Ciliarnerven auf die Erregung der Pupille.* du Bois' Arch. f. Physiol. S. 149.
764. H. LEE. *On the tapetum lucidum.* Lancet. I. S. 203.
765. NETTER. *Sur les mouvements de l'iris, dits volontaires.* Rev. méd. de l'est. Nancy. XVIII. S. 55.
766. J. PZYBYLSKI. *Nerves dilatateurs de la pupille chez le chat.* Arch. slaw. de biol. S. 400.
767. — *Zur Frage über die pupillenerweiternden Nerven bei der Katze.* Diss. Warschau.
768. K. SCHIPILOFF. *Ueber den Einfluss der Nerven auf die Erweiterung der Pupille.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXVIII. S. 219.
- 1887.
769. DOGIEL. *Neue Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel bei Säugethieren und Vögeln.* Arch. f. mikrosk. Anat. XXVI. S. 4.
770. M. GUMO. *Pupillary contraction in lateral movements.* Ophthalm. Rev. S. 85.
771. J. JEGOROW. *Ueber den Einfluss des Sympathicus auf die Vogelpupille.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 41. S. 326—349.
772. IWANOW. *Zur Frage von der Ungleichheit der Pupillen bei gesunden Leuten.* Wratsch. No. 7. — Centr.-Bl. f. klin. Med. S. 614.
773. H. LEE. *On the tapetum lucidum and the functions of the fourth pair of nerves.* London. J. u. A. Churchill. 1887. 15 S.
774. N. MISLAWSKI. *De l'influence de l'écorce grise sur la dilatation de la pupille.* Soc. de Biol. No. 13.
775. SALGO. *Die unregelmäßige Reaction der Pupillen.* Wien. med. Wochenschr. No. 45 u. 46.
776. STEINACH. *Vergleichend-physiologische Studien über Pupillarreaction.* Centralbl. f. Physiol. S. 106.
777. G. ZWJAGINZEW. *Ueber normale relative Weite der Pupillen bei gesunden Leuten.* (Russisch.) Russakja Medicina No. 28.
- 1888.
778. ABADIE. *Les mouvements de la pupille.* Réc. d'Ophthalm. S. 307.
779. A. CHAUVEAU. *Sur le mécanisme des mouvements de l'iris.* Journ. de l'anat. et physiol. XXIV. S. 193.
780. HEDDARUS. *Ueber Pupillarreaction.* Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 456.
781. — *Reflexempfindlichkeit, Reflextaubheit und reflectorische Pupillenstarre.* Berl. klin. Wochenschr. No. 17.
782. — *Eine Bemerkung zur Pupillarreaction.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 410.
783. G. IORISSENNE. *Remarque sur les mouvements de l'iris et sur la dynamogénie sensorielle.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. No. 19.
784. H. LEE. *On the use of the tapetum lucidum.* Med. Press and Circ. London. (n. s.) XLVI. S. 489.
785. PICOQUÉ. *Des mouvements de la pupille.* Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 249.
- 1889.
786. PICOQUÉ. *Étude expérimentale sur les mouvements de la pupille.* Arch. d'Ophthalm. IX. S. 469.
787. A. RAGGI. *Osservazioni di un caso eseczionale non ancora descritto di movimento sinergico irideo.* Rend. Lomb. (2.) XXII. S. 798.
- 1890.
788. R. V. GARNIER. *Ueber Veränderungen des Musculus ciliaris unter dem Einfluss des Wachstums und der Refraction.* Wjestnik Oftalm. März-April. — Petersb. med. Wochenschr.
- 1891.
789. R. HILBERT. *Pupillenbeobachtungen mittelst der subjectiven Methode.* Betz' Memorialien. 1891. Heft 5.

1892.

790. A. GRÜNHAGEN. *Ueber die Mechanik der Irisbewegung*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 53. S. 348—360.
791. J. N. LANGLEY u. H. K. ANDERSON. *Dilatation of the pupil*. Proc. of the Physiol. Soc. Mai. 1892.
792. — *On the mechanism of the movements of the iris*. Journ. of Physiol. XIII. S. 513—553.
793. PH. LIMBOURG. *Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Irisbewegungen und über den Einfluss von Giften auf dieselben, besonders des Cocain*. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmacol. Bd. XXX. S. 93—125.
794. L. LITTAUER. *Du mouvement de l'iris*. Thèse de Paris. 1892.
795. E. STEINACH. *I. Untersuchungen zur vergleichenden Physiologie der Iris. — II. Mittheilung über die directe motorische Wirkung des Lichtes auf den Sphincter pupillae bei Amphibien und Fischen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 52. S. 495—525.

1893.

796. P. BAJARDI. *Contribution à l'histologie comparée de l'iris*. Arch. Ital. de Biol. XIX. S. 210—213.
797. E. P. BRAUNSTEIN. *Beitrag zum Studium der Innervation der Pupillenbewegungen*. (Russisch.) Charkow.
798. G. DURAND. *Disposition et développement des muscles dans l'iris des oiseaux*. Journ. de l'Anat. et de la Physiol. XXIX. S. 604—636.
799. G. RETZIUS. *Zur Kenntniss vom Bau der Iris*. Biol. Unters. (N. F.) V. No. 7.
800. F. SPALITTA u. M. CONSIGLIO. *Ricerche sopra nervi costrittori della pupilla*. Arch. d'Ottalm. I. S. 19.
801. — *Recherches sur les nerfs constricteurs de la pupille*. Arch. Ital. de Biol. XX. S. 26—31.
802. ZIEM. *Das Tapetum lucidum bei Durchleuchtung des Auges*. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 101—103.

1894.

803. E. P. BRAUNSTEIN. *Zur Lehre von der Innervation der Pupillenbewegung*. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 1894. 142 S.
804. J. DOGIEL. *Die Betheiligung der Nerven an den Schwankungen in der Pupillenweite*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 56. S. 500—521.
805. HEDDAEUS. *Die centripetalen Pupillenfasern und ihre Function*. Festschr. z. Feier d. 50jähr. Jubil. d. Ver. d. Aerzte d. Reg.-Bez. Düsseldorf. S. 312—326.

## 2. Messung der Pupillenweite.

1852.

806. S. STAMPFER. *Methode, den Durchmesser der Pupille sowohl bei Tage als bei Nacht am eigenen Auge zu messen*.

1855.

807. DUBRUNFAUT. *Note sur la vision*. Compt. Rend. Bd. 41. S. 1087.

1864.

808. F. OBERNIER. *Ueber ein einfaches Instrument, Pupillenunterschiede zu ermitteln*. Berlin.

1866.

809. HOUDIN. *Iridoskope*. Intern. Obs. IX. S. 315. — Mondes. X. S. 587—589. — Compt. Rend. LXIII. S. 865—868.

1869.

810. F. C. DONDEERS. *Periodiske veranderingen van de middellijn der pupillen, zonder wijzigingen van refractie of accommodatie*. Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 187.

1875.

811. E. LANDOLT. *Ein Pupillometer*. Centralbl. f. d. med. Wiss. XIII. S. 563—564. — Gaz. méd. de Paris. S. 600.

1876.

812. BADAL. *Mesure du diamètre de la pupille*. Gaz. méd. de Paris. No. 23. — Gaz. des hôpitaux. No. 57.

1877.  
813. BADAL. *Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion*. Bull. mens. de la clinique du Br. Badal. Paris. Delahaye. S. 28—31.
1878.  
814. BADAL. *Pupillomètre*. Arch. d'Ophthalm. Tome. 80. S. 42.
1879.  
815. C. W. EVANS. *Measurement of the Pupil*. Brit. med. Journ. S. 662.
1884.  
816. GORHAM. *The Pupil-Photometer*. Proc. of the Roy. Soc. London. Bd. 37. S. 425.
1885.  
817. L. BELLARMINOW. *Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung der Pupillenbewegung. Photochoreograph*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXVII. S. 107 bis 122. — Roussk. med. No. 11—13.
1886.  
818. L. BELLARMINOW. *Versuch einer Anwendung der graphischen Methode zur Untersuchung der Pupillenbewegung und des intraocularen Druckes*. Dissert. 120 S. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol.
819. CUIGNET. *Kératoscopie, Rétinoscopie, Pupilloscopie, Dioptriscopie et Réfraction*. Rec. d'Ophthalm. S. 705. — Mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 295.
820. W. H. JESSOP. *Pupillometer*. Opth. Rev. S. 113 u. 320.
1887.  
821. JACKSON. *Determination of the size of the pupil*. Med. a. Surg. Rep. LVI. Philadelphia. S. 516.
822. — *Determination of the size of the pupil*. Proc. Philad. med. Soc. VIII. S. 104.
1888.  
823. D. AXENFELD. *Percezione subbietiva dei movimenti dell' iride*. Bull. d. R. Accad. med. di Roma. 1887/88. IX. S. 122.
824. CL. DU BOIS-REYMOND. *Ueber das Photographiren der Augen bei Magnesiumblitz*. Centrbl. f. prakt. Augenheilkde. Jahrg. 1888. S. 68.
1891.  
825. R. HILBERT. *Pupillenbeobachtungen mittelst der subjectiven Methode*. Betz Memorialien. Heft 5.
1892.  
826. M. SACHS. *Ueber den Einfluß farbiger Lichter auf die Weite der Pupille*. Pflüger's Arch. Bd. 52. S. 79—86.
1893.  
827. C. HESS. *Demonstration eines Instrumentes zur Messung von Pupillendurchmesser und Pupillendistanz*. Bericht d. 23. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 235.
828. M. SACHS. *Eine Methode der objectiven Prüfung des Farbensinnes*. Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 3. S. 106—125.
829. SCHLÖSSER. *Demonstration eines Pupillometers*. Bericht d. 23. Versamml. d. Ophthalm. Ges. S. 234.
1894.  
830. O. SCHIRMER. *Untersuchungen zur Physiologie der Pupillenweite*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. S. 8—21.

### 3. Vordere Augenkammer.

1868.  
831. G. CALDERINI. *Del contatto dell' iride colla lente cristallina nell' occhio umano*. Torino
1871.  
832. F. C. DONDERS. *Sur la distance entre la surface antérieure de la cornée et celle du cristallin dans l'œil de l'homme vivant*. Acad. d'Amsterd. 30. Sept. 1871.
1878.  
833. HORSTMANN. *Ueber die Tiefe der vorderen Augenkammer*. Onderzoek. 1878. — Centrbl. f. Augenheilkde. 1878. S. XLV. — Zehender's klin. Monatsbl. 3. Beilageheft. S. 165.
1879.  
834. HORSTMANN. *Ueber die Tiefe der vorderen Augenkammer*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXV. 1. S. 79—98.

1880.  
835. J. E. ADAMS. *Neuer Apparat zur Beleuchtung und Vergrößerung der vorderen Augenpartieen.* Illustr. Vierteljahrsschr. d. ärztl. Polytechnik. 3. Heft.  
1892.  
836. A. ROCHON-DUVIGNEAU. *Recherches sur l'angle de la chambre antérieure et le canal de Schlemm.* Thèse de Paris. 1892.

## § 4.

## Die Netzhaut und der Sehnerv.

Wegen weiterer Litteratur-Nachweise siehe § 1. s.

1880.  
837. F. A. AMMON. *De genesi et usu maculae luteae in retina oculi humani obviae.* Viennae.  
1845.  
838. F. PACINI. *Nuovi Annali delle sc. nat. di Bologna.*  
1850.  
839. CORTI. J. Müller's Arch. Jahrg. 1850. S. 274. — Zeitschr. f. wiss. Zool. V.  
840. J. HENLE. Zeitschr. f. rat. Med. N. F. II. 304 u. 309.  
1851.  
841. H. MÜLLER. Siebold u. Kölliker's Zeitschr. f. wiss. Zool. S. 294. — Verh. der Würzburger med. Ges. 1852. S. 216. Ibid. III. 336 u. IV. 96.  
1852.  
842. A. KÖLLIKER. Verh. der Würzburger med. Ges. III. S. 316.  
1853.  
843. A. KÖLLIKER u. H. MÜLLER. Compt Rend. de l'Acad. des sc. Sept. 23.  
844. — Die Retinatafel in Ecker's Icones physiologicae.  
845. R. REMAK. Compt. Rend. de l'Acad. des sc. 1853. Oct. 31. — Allg. med. Centralz. 1854 No. 1. — Prag. Vierteljahrsschr. XLIII. S. 103.  
846. M. v. VINTSCHGAU. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. XI. S. 943.  
1854.  
847. A. KÖLLIKER. *Mikroskopische Anatomie.* Leipzig. 1854. II. S. 648—703.  
1855.  
848. R. BLESSIG. *De retinae textura.* Diss. Dorpat.  
1856.  
849. H. MÜLLER. *Anatomische Beiträge zur Ophthalmologie.* Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 1. III. (1.) S. 1. — IV. (1.) S. 269.  
850. — *Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Retina bei Menschen und Wirbelthieren.* Siebold u. Kölliker's Zeitschr. für wiss. Zool. VIII. 1. — Compt. Rend. XLIII. Oct. 20.  
1857.  
851. C. BERGMANN. *Anatomisches und Physiologisches über die Netzhaut des Auges.* Zeitschr. f. rat. Med. (3.) II. 83.  
1858.  
852. NUNNELEY. *On the structure of the retina.* The quarterly Journ. of microsc. science 1858. Juli. S. 217.  
1859.  
853. RITTER. *Ueber den Bau der Stäbchen und äußeren Endigungen der Radialfasern an der Netzhaut des Frosches.* Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 101.  
854. M. SCHULTZE. *De retinae structura penitiori.* Bonn.  
855. E. v. WAHL. *De retinae textura in monstro anencephalo.* Diss. Dorpat.

1860.

856. W. MANZ. *Ueber den Bau der Retina des Frosches*. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) X. S. 301.  
 857. G. BRAUN. *Eine Notiz zur Anatomie und Bedeutung der Stäbchenschichte der Netzhaut*. Wien. Sitzgs.-Ber. XLII. S. 15—18.  
 858. W. KRAUSE. *Ueber den Bau der Retinastäbchen beim Menschen*. Göttinger Nachr. 1861. No. 2. — Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XI. S. 175.

1861.

859. M. SCHULTZE. Sitzgs.-Ber. der niederrh. Ges. S. 97. — Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 785.  
 860. RITTER. Arch. f. Ophthalm. VIII. S. 1.

1862.

861. H. MÜLLER. *Bemerkungen über die Zapfen am gelben Fleck des Menschen*. Würzburger naturwiss. Zeitschr. II. S. 218.  
 862. — *Ueber das Auge des Chamäleon*. Würzburger naturwiss. Zeitschr. III. S. 10.

1863.

863. SCHIESS. *Beitrag zur Anatomie der Retinastäbchen*. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XVIII. S. 129.  
 864. H. WELOCKER. *Untersuchung der Retinazapfen bei einem Hingerichteten*. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XX. S. 173.  
 865. W. KRAUSE. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XX. S. 7.

1865.

866. M. SCHULTZE. *Ueber den gelben Fleck der Retina, seinen Einfluss auf normales Sehen und auf Farbenblindheit*. Bonn. 1865. 16 S.

1866.

867. C. HASSE. *Vorläufige Mittheilung über den Bau der Retina*. Göttinger Nachr. No. 8.  
 868. J. HENLE. *Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen*. II. S. 636—670.  
 869. M. SCHULTZE. *Zur Anatomie und Physiologie der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. II. S. 175—286.  
 870. W. STEINLIN. *Beitrag zur Anatomie der Retina*. Aus d. Verh. d. St. Gallischen naturw. Ges. 1865 u. 1866.

1867.

871. C. HASSE. *Beiträge zur Anatomie der menschlichen Retina*. Zeitschr. f. rat. Med. XXIX. S. 238.  
 872. J. W. HULKE. *On the anatomy of the fovea centralis of the human retina*. Philos. transact. Vol. 157. Theil 1. S. 109.  
 873. M. SCHULTZE. *Bemerkungen über Bau und Entwicklung der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. III. S. 371—382.  
 874. W. KRAUSE. *Zur Anatomie und Physiologie der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. II. S. 165—286.  
 875. — *Ueber Stäbchen und Zapfen der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. III. S. 215 bis 247.

1868.

876. V. HENSEN. *Bemerkungen zu W. Krause: Die Membrana fenestrata der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. (3.) S. 347.  
 877. W. KRAUSE. *Ueber die Endigung des Nervus opticus*. Arch. f. Anat. S. 243. und S. 643.  
 878. M. SCHULTZE. *Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. W. Steinlin: Ueber Stäbchen und Zapfen der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. IV. (2.) S. 22.  
 879. W. STEINLIN. *Ueber Zapfen und Stäbchen der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. IV. (1.) S. 10.  
 880. G. WAGENER. *Ueber die Structur der Retina*. Marb. Sitzgs.-Ber. No. 5.

1869.

881. M. SCHULTZE. *Ueber die Nervenendigung in der Netzhaut des Auges bei Menschen und Thieren*. Arch. f. mikrosk. Anat. V. (4.) S. 379—403. — Sitzgs.-Ber. d. niederrh. Ges. f. Naturkde. u. Heilkde. Bonn. 3. Mai.  
 882. — *Die Stäbchen in der Retina der Cephalopoden und Heteropoden*. Arch. f. mikrosk. Anat. V. (1.) S. 1—24.

## 1870.

883. E. LANDOLT. *Beitrag zur Anatomie der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. VII. S. 81.  
 884. F. MERKEL. *Zur Kenntniss der Stäbchenschichte der Retina*. Arch. f. Anat. S. 642.  
 885. — *Ueber die Macula lutea des Menschen und die Ora serrata einiger Wirbelthiere*. Leipzig.  
 886. H. MEYER. *Eine historische Notiz über eine Varietät des Nervus opticus*. Arch. f. Anat. S. 523.

## 1871.

887. W. DOBROWOLSKY. *Zur Anatomie der Retina*. Arch. f. Anat. v. Reichert u. du Bois-Reymond. S. 221—236.  
 888. — *Die Doppelsapfen*. Arch. f. Anat. v. Reichert u. du Bois-Reymond. S. 208 bis 220.  
 889. G. RETZIUS. *Om membrana limitans retina interna*. Nord. med. arch. III. Heft 1. No. 2.  
 890. M. SCHULTZE. *Neue Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Retina des Menschen*. Arch. f. mikrosk. Anat. VII. S. 244.  
 891. — *Die Retina*. Stricker's Handb. S. 977.

## 1872.

892. M. DUVAL. *Structure et usages de la rétine*. Thèse p. l. conc. d'agrégat. Paris. 150 S. Auszug im Journ. de l'Anat. u. Physiol. 1873. 3. S. 308—316.  
 893. ISAACSOHN. *Beitrag zur Anatomie der Retina*. Diss. Berlin.

## 1874.

894. J. C. EWART. *On the minute structure of the retina and vitreous humor*. Journ. of anat. and physiol. XIV. S. 353—357.  
 895. GUDDEN. *Ueber die Kreuzung von Fasern im Chiasma nervorum opticorum*. Arch. f. Ophthalm. XX. 2. 248 S.  
 896. H. SCHMIDT. *Die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen*. Med. Centralbl. No. 57. S. 900—902. — Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. z. Marburg. No. 7.

## 1875.

897. J. C. EWART. *On the minute structure of the Retina and Vitreous humor*. Journ. of Anat. and Physiol. (2.) XV. 166.  
 898. J. MICHEL. *Ueber die Ausstrahlungsweise der Opticusfasern in der menschlichen Retina*. Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe an Carl Ludwig. Leipzig. 1875. S. 56.  
 899. W. NICATI. *Recherches sur le mode de distribution des fibres nerveuses dans le nerf optique et dans la rétine*. Arch. de physiol. Ser. II. T. II. No. 5. S. 521—530.  
 900. H. SCHMIDT. *Weitere Mittheilung über die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen*. Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. z. Marburg. 24. März 1875.  
 901. H. SCHMIDT-RIMPLEB. *Die Macula lutea, anatomisch und ophthalmoskopisch*. Arch. f. Ophthalm. XXI. (3.) S. 17—28.

## 1876.

902. J. C. EWART und G. THIN. *On the structure of the retina*. Journ. of Anat. a. Physiol. XI. S. 96—108.  
 903. W. KRAUSE. *Die Nervenendigung in der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. XII. S. 742—790.  
 904. F. MERKEL. *Ueber die menschliche Retina*. Arch. f. Ophthalm. Bd. 22. (4.) S. 1—25.  
 905. WOINOW. *Ueber die Kreuzung der Sehnerven*. Kl. Monatsbl. f. Augenheilkde. XII. S. 424.

## 1877.

906. F. MERKEL. *Die menschliche Retina*. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 205—226.

## 1878.

907. A. ANGELUCCI. *Ricerche istologiche del epitelio retinico dei vertebrati*. Atti dei Lincei. Ser. III. Memorie fisiche. Vol. II. S. 1081.  
 908. — *Histologische Untersuchungen über das retinale Pigmentepithel der Wirbelthiere*. du Bois-Reymond's Arch. f. Physiol. 1878. S. 353.  
 909. KÜHN. *Die farbigen Kugeln der Zapfen in der Vogel-Retina*. Centralbl. f. med. Wiss. 1878. No. 1 u. 2.

910. L. LOWE. *Zur Anatomie des Auges. Zur mikroskopischen Histogenese der Binn.* Arch. f. mikrosk. Anat. XV. 4.  
1879.
911. G. DENISSENKO. *Einige Worte über den Bau der Molecularschicht der Netzhaut.* Med. Uebersicht. Juni 1879.
912. — *Ueber die innere Körnerschicht der Retina.* Med. Uebersicht. August 1879.  
1880.
913. G. V. CIACCIO. *Notizia sulla forma della fovea centrale ch'è nella macchia della retina umana.* Rend. d. acad. d. sc. d. istit. di Bologna. 24. Mai.
914. G. DENISSENKO. *Vorläufige Bemerkungen zur Lehre über den Bau der Netzhaut.* Schenk's Mittheil. a. d. embryol. Inst. d. Univ. in Wien. S. 61—63.
915. — *Untersuchungen über den Bau der inneren Körnerschicht und der Molecularschicht der Netzhaut.* Schenk's Mittheil. a. d. embryol. Inst. d. Univ. in Wien. S. 11—24.
916. — *Einige Bemerkungen über den Bau der Netzhaut.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 52.
917. — *Einige Beobachtungen über die Gefäße in der Fovea centralis der Netzhaut des Menschen.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47.
918. W. KRAUSE. *Ueber die Fasern des Sehnerven.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2).
919. SALZER. *Ueber die Anzahl der Sehnervenfaseru und der Retinalzapfen im Auge des Menschen.* Wien. Ber. Bd. 81. 3.  
1881.
920. O. BECKER. *Die Gefäße der menschlichen Macula lutea.* Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1). S. 1.
921. CL. DU BOIS-REYMOND. *Zahl der Empfindungskreise in der Netzhautgrube.* Beitr. Diss. 31 S.
922. G. COLASANTI. *Alcune esperienze sull'epitelio retinico dei Laboroidi.* Bull. d. Acc. med. di Roma. VII. S. 298.
923. W. KRAUSE. *Ueber die Retinalzapfen der nächtlichen Thiere.* Arch. f. mikrosk. Anat. S. 309—314.
924. KUENT. *Ueber den Bau der Fovea centralis des Menschen.* Ber. üb. d. 13. Verh. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 141—146.
925. J. MICHEL. *Ueber die Nervenfaserschicht der Netzhaut.* Verh. d. physik.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. XV. 34.
926. G. RETZIUS. *Beiträge zur Kenntniss der inneren Schichten der Netzhaut des Auges.* Biol. Untere. S. 89—104.
927. O. F. WADSWORTH. *The Fovea centralis in Man.* Beitr. z. Ophthalm. als Festschr. Prof. Horner gewidmet. Wiesbaden. Bergmann.
928. G. WÄELCHLI. *Mikrospectroskopische Untersuchungen der gefärbten Kugeln in der Retina von Vögeln.* Arch. f. Ophthalm. Bd. 27. (2.) S. 303—319.  
1882.
929. E. BERGER. *Zur Kenntniss vom feineren Baue des menschlichen Sehnerven.* Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 314.
930. L. BRUNS. *Vergleichend anatomische Studien über das Blutgefäß-System der Netzhaut.* Diss. München. — Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Heft 2. S. 77—101.
931. J. CHATIN. *Sur l'existence des cônes dans la rétine de la souris.* Bull. Soc. philomat. de Paris. (7.) VI. S. 128.
932. G. COLASANTI. *Studi sulla retina delle scorpene.* Bull. d. r. Acc. med. di Roma. S. 344.
933. G. DENISSENKO. *Ueber den Bau der Netzhaut bei der Quappe (Lota vulgaris) und bei Ophidium barbatum.* Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (1.) S. 125—138.
934. — *Ueber den Bau der Netzhaut des Aales.* Arch. f. mikrosk. Anat. XXI. S. 1—20.
935. L. DESFOSSES. *Anatomie de la rétine.* Arch. f. Ophthalm. S. 97.
936. S. GAUSER. *Zur Anatomie der Katzenretina.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Heft 2. S. 139—140.
937. GUDDEN. *Ueber die verschiedenen Nervenfasersysteme in der Retina und im Nerve opticus.* Tagebl. d. 55. Vers. d. Naturf. u. Aerzte. Eisenach. No. 7. S. 307.
938. K. MAYS. *Ueber das braune Pigment des Auges.* Heidelb. Untere. II. S. 324—337.
939. H. VIRCHOW. *Ueber die Glaskörper- und Netzhautgefäße des Aales.* Morphol. Jahrb. VII. S. 573—590.

## 1888.

940. W. v. BECHTEREW. *Experimentaluntersuchung über die Kreuzung der Sehnervfasern im Chiasma nervorum opticorum*. Klinitscheskaja Gazeta. No. 2, 3. — Neurol. Centralbl. S. 53.
941. BELLONCI. *Contribuzione all' istogenesi ed istologia dello strato molecolare interno della retina*. Mem. d. Acad. de sc. di Bol. (4.) III. 4.
942. M. BORYSIEWICZ. *Stäbchenorgan der Retina*. Anz. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. No. 23.
943. F. BURDACH. *Zur Faserkreuzung im Chiasma und in dem Tractus nervorum opti-*  
*corum*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 135.
944. A. DOGIEL. *Die Retina der Ganoiden*. Arch. f. mikrosk. Anat. XXII. S. 419—472.
945. E. v. FLEISCHL. *Die Verteilung der Sehnervfasern über die Zapfen der menschlichen Netzhaut*. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. Bd. 87. 3. Abth. (Sitzung v. 10. Mai.)
946. — *Zur Anatomie und Physiologie der Retina*. Biol. Centralbl. III. S. 309 u. 331.
947. J. OGNEFF. *Ueber die moleculäre Schicht und die sog. reticuläre Substanz der Retina*. Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 45. S. 801—804.
948. G. SZABÓ. *Untersuchung über das Pigmentepithel der Netzhaut bei Säugethieren*. Szemészet. No. 5 u. 6.
949. — *Ueber die Farbe des Netzhautepithels bei Vertebraten*. Szemészet. Budapest. 1883. S. 113. 1884. S. 9.
950. A. TAFANI. *Andamento e terminazione del nervo ottico nella retina dei crocodilli (Champsia Lucius)*. Boll. d'ocul. Firenze. V. S. 318. 333. (1882/83). — VI. S. 14. (1883/84).
951. G. WÄELCHLI. *Zur Topographie der gefärbten Kugeln der Vogelnethaut*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 205.

## 1884.

952. L. BRUNS. *Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Blutgefäßsystem der Netzhaut*. Biol. Centralbl. IV. S. 244.
953. A. DOGIEL. *Zur Frage über den Bau der Retina bei Triton cristatus*. Arch. f. mikrosk. Anat. XXIV. S. 451—467.
954. — *Ueber die Retina des Menschen*. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histiol. S. 143 u. S. 161.
955. E. v. FLEISCHL. *Zur Physiologie der Retina*. Wien. med. Wochenschr. No. 10 u. 11. S. 273 u. 308.
956. A. KOLLIKER. *Ueber markhaltige Nervenfasern der Netzhaut*. Diss.
957. KOGANÉI. *Histiogenese der Netzhaut*. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 4 u. 5. — Arch. f. mikrosk. Anat. XXIII. S. 335. Arch. f. Physiol. S. 172.
958. W. KRAUSE. *Die Retina*. Intern. Mon.-Schr. für Anat. u. Histol. I. S. 225—254.
959. RAMPOLDI. *Materiali da servire allo studio istologico della retina dei mammiferi*. Ann. di Ottalm. S. 439.
960. G. SACCHI. *Nuovi indagini relative alla tessitura della nevroglia nella retina dei vertebrati*. Sperimentale. Firenze. LIII. S. 620.
961. P. SCHIEFFERDECKER. *Beiträge zur Kenntniss des Stützfasergerwebes der Netzhaut*. Göttinger Anz. No. 7.
962. TAFANI. *Parcours et terminaisons du nerf optique dans la rétine des crocodiles (Champsia Lucius)*. Arch. Ital. de Biol. IV. S. 110.

## 1885.

963. ST. BERNHEIMER. *Zur Kenntniss der Nervenfaserschicht der menschlichen Netzhaut*. Sitzgs.-Ber. d. k. k. Acad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 90. S. 1—2.

## 1886.

964. J. W. BARRET. *The distribution of blood-vessels in the retina of mammals*. Journ. of Physiol. VII. S. 230.
965. G. CUCCATI. *Contributo all' anatomia microscopica della retina del bue e del cavallo*. Rend. d. R. Accad. di Bologna. 1885—86. S. 44.
966. G. DENISSENKO. *Ueber den Bau der Retina bei Trigonum pastinaca*. (Russisch.) Westn. Ophthalm. III. 3. S. 193.
967. W. KRAUSE. *Die Retina II. Die Retina der Fische*. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histiol. III. 1. S. 8—38. 2. S. 41—73.
968. P. SCHIEFFERDECKER. *Studien zur vergleichenden Histiologie der Retina*. Arch. f. mikrosk. Anat. XXVIII. S. 305—396.



1887.

969. M. BORYSIEWICZ. *Untersuchungen über den feineren Bau der Retina.* Wien. Töplitz u. Deuticke. 70 S.  
 970. F. FALCHI. *Sull' istogenesi della retina e del nervo ottico.* Ann. di ottalm. XV. 5/6.  
 971. F. TARTUFERI. *Sull' anatomia della retina.* Arch. per le sc. med. XI. 3. S. 335—358. — Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. IV. S. 421.  
 972. — *Sur la structure intime de la rétine.* Arch. Ital. de Biol. IX. 1. S. 10—11.

1888.

973. A. DOGIEL. *Ueber das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der Ganoiden, Reptilien, Vögel und Säugethiere.* Anat. Anz. 4/5. S. 133—143.  
 974. — *Ueber die nervösen Elemente in der Retina der Amphibien und Vögel.* Anat. Anz. S. 342—347.  
 975. W. KRAUSE. *Die Retina der Fische.* Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histol. V. S. 132—148.  
 976. PH. STÖHR. *Neues über die Netzhaut.* Sitzgs.-Ber. d. physik.-med. Ges. No. 8. S. 124—128 u. No. 9. S. 129—132.

1889.

977. S. RAMON Y CAJAL. *Sur la morphologie et les connections des éléments de la rétine des oiseaux.* Anat. Anz. IV. 4. S. 111—121.  
 978. J. H. CHIEVITZ. *Untersuchungen über die Area centralis retinae.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 139.  
 979. R. DUBOIS u. J. RENAUT. *Sur la continuité de l'épithélium pigmenté de la rétine avec les segments externes des cônes et des bâtonnets et la valeur morphologique de cette disposition chez les vertébrés.* Compt. Rend. Bd. 109. S. 747—749.  
 980. W. KRAUSE. *Die Retina der Fische.* Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histol. VI. S. 206—223, 250—269.  
 981. — *Historische Notiz (Ueber die Zapfen des Mauwurfs).* Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 279.  
 982. KUENT. *Histologische Studien an der menschlichen Netzhaut.* Jenaische Zeitschr. f. Wiss. XXIV. S. 177.  
 983. B. SOLGER. *Demonstration von Schnitten durch die menschliche Retina (Gegend der Macula lutea).* Verh. d. anat. Ges. a. d. 3. Vers. in Berlin. 10—12. Oct. 1889. S. 138—139.

1890.

984. G. BIAGI. *La fovea centrale della retina nei lofobranchi.* R. Ist. Lomb. (2.) XXIII. 662.

1891.

985. M. SACHS. *Ueber die specifische Lichtabsorption des gelben Fleckes der Netzhaut.* Pflüger's Arch. Bd. 50. S. 574—587.

1892.

986. A. S. DOGIEL. *Ueber die nervösen Elemente in der Retina des Menschen.* (Zweite Mitth.) Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 40. S. 29—38.

1893.

987. S. RAMÓN Y CAJAL. *La rétine des vertébrés.* La Cellule. IX. 1. S. 119.  
 988. DOGIEL. *Neuroglia der Retina des Menschen.* Arch. f. mikrosk. Anat. S. 41.

1894.

989. M. BORYSIEWICZ. *Weitere Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut.* Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 64 S.  
 990. — *Erwiderung auf Dimmer's Angriff gegen meine Arbeiten: „Ueber den feineren Bau der Netzhaut.“* Wien. med. Bl. S. 303.  
 991. — *Antwort auf die Entgegnung des Herrn Docenten Dr. Dimmer in Wien.* Wien. med. Bl. S. 351.  
 992. S. RAMÓN Y CAJAL (u. R. GREEFF). *Die Retina der Wirbelthiere.* In Verbindung mit dem Verfasser zusammengestellt, übersetzt und mit Einleitung versehen von R. Greeff. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 179 S.  
 993. FR. DIMMER. *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Macula lutea des Menschen.* Wien. F. Deuticke. 133 S.  
 994. — *Entgegnung an Herrn Prof. Borysiewicz.* Wien. med. Bl. S. 319.  
 995. R. GREEFF. *Die Spinnzellen (Neurogliazellen) im Sehnerv und in der Retina.* Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 324—339.

996. CH. L. GREEN. *Ueber die Bedeutung der Bechersellen der Conjunctiva*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 1—21.  
 997. E. KALLIUS. *Untersuchungen über die Netzhaut der Säugethiere*. Anat. Hefte. Heft 3. S. 527.  
 998. W. KRAUSE. *Die Retina der Vögel*. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. XI. S. 1—66, 69—123.  
 999. F. LEYDIG. *Einiges zum Bau der Netzhaut des Auges*. Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. VII. 2. S. 309.  
 1000. W. MANZ. *Ueber markhaltige Nervenfasern in der menschlichen Netzhaut*. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 220—233.  
 1001. W. F. NORRIS u. J. WALLACE. *A contribution to the anatomy of the human retina, with a special consideration of the terminal loops of the rods and cones*. University med. mag. March. (Philadelphia.)

## § 5.

## Die Krystalllinse.

Wegen weiterer speciell anatomischer Litteratur siehe auch § 1. 1.  
 Litteratur über die Art der Schichtung in der Krystalllinse siehe § 10. 1 und 2.

1845.  
 1002. A. HANNOVER. Müller's Archiv. 1845. S. 478\*.  
 1846.  
 1003. HARTING. van de Hoeven en de Vriese Tijdschrift. XII. S. 1.  
 1847.  
 1004. E. BRÜCKE. *Beschreibung des menschlichen Augapfels*. Berlin. S. 27—30\*.  
 1849.  
 1005. W. BOWMAN. *Lectures on the parts concerned in the oper. on the eye*. London.  
 1851.  
 1006. H. MEYER. J. Müller's Archiv. 1851. 202\*.  
 1852.  
 1007. GROS in Compt. Rend. de l'Acad. d. Sciences. 1852. Avril.  
 1008. D. BREWSTER. *On the development and extinction of regular doubly refracting structures in the cristalline lenses of animals after death*. Phil. Mag. (4.) III. S. 192—198.  
 1854.  
 1009. A. KÖLLIKER. *Mikroskopische Anatomie*. Leipzig. II. 703—713\*.  
 1010. THOMAS in Prager med. Vierteljahrschr. 1854. Bd. 1. Aufserord. Beil. S. 1\*.  
 1855.  
 1011. J. CZERMAK. *Ueber das Wesen der von Dr. C. Thomas auf Linsenschliffen entdeckten Curvensysteme*. Zeitschr. f. wiss. Zool. VII. Heft 3.  
 1859.  
 1012. G. VALENTIN. *Neue Untersuchungen über die Polarisationserscheinungen der Krystallinsen des Menschen und der Thiere*. Arch. f. Ophthalm. IV. (1.) S. 227—268.  
 1013. D. BREWSTER. *On certain abnormal structures in the crystalline lenses of animals and in the human crystalline*. Rep. of Brit. Ass. 1858. 2. S. 7.  
 1868.  
 1014. F. J. v. BECKER. *Ueber den Bau der Linse bei dem Menschen und den Wirbelthieren*. Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 1—42.  
 1869.  
 1015. M. WOINOW. *Ueber die Entstehung der bipolaren Anordnung der Linsenfasern*. Wien. Ber. LX. 2. S. 151—154.

1871.  
1016. BABUCHIN. *Die Linse*. Stricker's Handb. S. 1080.  
1017. ROBINSKI. *Untersuchungen über die Augenlinse*. Reichert u. Du-Bois' Arch. S. 385  
1872.  
1018. J. HENLE. *Zur Anatomie der Krystalllinse*. Göttingen.  
1019. ROBINSKI. *Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Augenlinse des Menschen und der Wirbelthiere*. Reichert u. Du-Bois' Arch. S. 178—205.  
1878.  
1020. S. FUBINI. *Beiträge zum Studium der Krystalllinse*. Moleschott's Untera. z. Natur. XI. S. 291—299.  
1876.  
1021. A. H. JACOB. *The physiological function and anatomy of the crystalline lens*. Med. Presse and Circular. 19. u. 26. Juli.  
1877.  
1022. K. RITTER. *Zur Histologie der Linse*. 4. Ueber die allgemeine Anordnung der Vogellinse nebst Bemerkungen über das Zustandekommen der Accomodationsbewegung in der Linse. Arch. f. Ophthalm. XXIII. (2.) S. 44—61.  
1023. K. RUMSCHWITZ. *Ueber die Entwicklung der Linse und des Glaskörpers*. Schr. d. Naturf. zu Kiew. V. 2.  
1878.  
1024. J. HENLE. *Zur Anatomie der Krystalllinse*. Abhandl. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Auch separat. Göttingen. Dietrich. S. 62.  
1025. M. KNIES. *Zur Chemie der Altersveränderung der Linse*. Heidelb. Untera. I. S. 114—119.  
1026. K. RITTER. *Zur Histologie der Linse*. Arch. f. Ophthalm. XXIV. (2.) S. 1—36.  
1882.  
1027. O. BECKER. *Ueber die Structur der Krystalllinse*. Ber. über d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1882. Beil.-Heft zu d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XX. S. 174.  
1028. E. BERGER. *Bemerkungen über die LinsenkapSEL*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar.  
1029. ROBINSKI. *Sind die Augenlinsenröhren ein- oder mehrkörnig?* Centralbl. f. d. med. Wissensch. S. 498.  
1030. — *Structur der Augenlinsenröhren*. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 28.  
1031. — *Untersuchungen zur Kenntniss der Länge und Anordnung der Augenlinsenfasern*. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 21.  
1032. — *Untersuchungen über die sog. Augenfasern*. Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 46.  
1883.  
1033. O. BECKER. *Ueber den Wirbel und den Kernbogen in der menschlichen Linse*. Arch. f. Augenheilkde. XII. S. 127.  
1034. — *Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse*. Wiesbaden. Bergmann. 1885. 218 S.  
1035. HEITZMANN. *Ueber den feineren Bau der Linse und des Glaskörpers*. Ber. d. ophthalm. Ges. S. 33. Beil.-Heft z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI. S. 33 bis 38.  
1036. S. ROBINSKI. *Zur Kenntniss der Augenlinse und deren Untersuchungsmethoden*. Berlin. 1883. 60 S.  
1884.  
1037. O. BECKER. *Zur Structur der Linse*. Ber. d. XVI. Versamml. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 78.  
1886.  
1038. GOTTSCHAU. *Bau der Krystalllinse*. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. October.  
1888.  
1039. L. MATTHIESSEN. *Ueber die Thomas'schen Bipolarcurven auf angeschliffenen Krystallinsen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLII.  
1891.  
1040. P. H. FRIDENBERG. *Ueber die Sternfigur der Krystalllinse*. Diss. Straßburg. 22.

## § 6.

## Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper.

Wegen weiterer speciell anatomischer Litteratur siehe auf § 1. s.

1842.  
1041. PAPPENHEIM. *Specielle Gewebelehre des Auges*. S. 181.
1843.  
1042. E. BRÜCKE. *Ueber den inneren Bau des Glaskörpers*. J. Müller's Arch. S. 345.
1845.  
1043. A. HANNOVER. J. Müller's Arch. S. 467.
1846.  
1044. E. BRÜCKE. *Ueber den inneren Bau des Glaskörpers*. J. Müllers Arch. S. 180.
1847.  
1045. F. C. DONDERS en JANSEN. *Nederlandsch Lancet*. II. S. 454.
1848.  
1046. E. BRÜCKE. *Beschreibung des menschlichen Augapfels*. Berlin.
1851.  
1047. W. BOWMAN. *Dublin Quarterly Journ. of Med. Science*. Aug.; auch in *Lectures on the Parts conc. in the oper. on the eye*. London. S. 94.
1852.  
1048. R. VIRCHOW. *Verh. d. Würzburger phys. med. Ges.* II. — *Arch. f. pathol. Anat.* IV. S. 468 u. V. S. 278.
1852.  
1049. A. \*KÖLLIKER. *Mikrosk. Anatomie*. II. S. 713.
1854.  
1050. A. HANNOVER. *Das Auge*. Leipzig.
1854.  
1051. \*A. DONCAN. *De corporis vitrei structura*. Diss. Utrecht. 1854. — *Onderzoekingen ged. in het physiol. Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool*. Jaar VI. S. 172.
1865.  
1052. H. HEIBERG. *Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii*. *Arch. f. Ophthalm.* XI. (3.) S. 168.
1869.  
1053. D. SMITH. *Structure of the adult human vitreous humor*. *Lancet*. 8. Mai.
1874.  
1054. J. STILLING. *Eine Studie über den Bau des Glaskörpers*. *Arch. f. Ophthalm.* XV. (3.) S. 299.
1874.  
1055. J. C. EWART. *On the minute structure of the retina and vitreous humor*. *Journ. of anat. and physiol.* XIV. S. 353—357.
1877.  
1056. K. RUMSCHWITZ. *Ueber die Entwicklung der Linse und des Glaskörpers*. *Schr. d. Naturf. zu Kiew*. V. 2.
1878.  
1057. ALBINI. *Die Functionen des Corpus vitreum*. *Ausz. a. Rendic. Real. Acc. sc. fig. e. mat. di Napoli*. October.
1882.  
1058. E. BERGER. *Beiträge zur Anatomie der Zonula Zinnii*. *Arch. f. Ophthalm.* XXVIII. (2.) S. 111—124.
1882.  
1059. P. HAENSEL. *Ueber den Bau des Glaskörpers*. *Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg*. Beil.-Heft zu d. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XX. S. 103—110.
1882.  
1060. H. VIRCHOW. *Ueber die Glaskörper- und Netzhautgefäße des Aales*. *Morphol. Jahrb.* VII. S. 573—590.
1888.  
1061. DESSAUER. *Zur Zonulafrage*. *Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde.* XXI. S. 89—99.
1888.  
1062. HEITZMANN. *Ueber den feineren Bau der Linse und des Glaskörpers*. *Ber. d. ophthalm. Ges.* S. 33. Beil.-H. z d. klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXI. S. 33—38.
- V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik*, 2. Aufl.

1887.  
1063. KUHN. *Zur Chemie des Humor aqueus.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 41. S. 200—202.
1888.  
1064. P. HÄNSEL. *Recherches sur la structure et l'histogénese du corps vitré normal et pathologique.* Thèse de Paris. 40 S.
1891.  
1065. R. v. GARNIER. *Ueber den normalen und pathologischen Zustand der Zonula Zinnii.* Arch. f. Augenheilkde. XXIV. S. 32—41.  
1066. W. SCHOEN. *Noch einmal: Die Concavität des vorderen Zonulablattes.* Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 422—426.
1894.  
1067. W. PAUTZ. *Beiträge zum Chemismus des Glaskörpers und des Humor aqueus.* Zeitschr. f. Biol. XXXI. S. 212—243.

## § 7.

## Umgebung des Auges.

1867.  
1068. H. COHN. *Messungen der Prominenz der Augen, mittelst eines neuen Instrumentes, des Exophthalmometers.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. V. S. 339.
1868.  
1069. H. COHN. *Présentation d'un instrument destiné à déterminer avec précision le degré de saillie du globe oculaire dans l'exophthalmus.* Compt. Rend. du Congrès d'Ophthalm. S. 21.
1870.  
1070. E. EMMERT. *Ueber Exophthalmometer nebst Beschreibung eines eigenen.* Bern. Mitth. No. 711—714. S. 208—222.  
1071. P. KEYSER. *Ueber das Messen der Prominenz des Auges.* Arch. f. Augen- und Ohrenheilkde. I. S. 183—186.  
1072. W. ZEHENDER. *Noch ein Exophthalmometer.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. VIII. S. 42.
1872.  
1073. A. KREUKHOFF. *Appareil pour définir la distance entre les centres des pupilles.* Compt. Rend. de la soc. des méd. russ. à Moscou. No. 17.
1878.  
1074. FR. HOLMGREN. *Ueber den Augenabstand der Farbenblinden.* Graefe's Arch. f. Ophthalm.
1879.  
1075. H. COHN. *Ein Brief betreffend die Pupillendistanz Farbenblinder.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 537—538.  
1076. E. HERING. *Ueber Muskelgeräusche des Auges.* Wien. Ber. LXXIX. S. 137.  
1077. F. HOLMGREN. *Ueber den Pupillenabstand bei den Farbenblinden.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 73—91.
1881.  
1078. E. LANDOLT. *Relations between the conformation of the cranium and that of the eye.* Brit. med. Journ. 2. April.  
1079. H. VIRCHOW. *Ueber die Gefäße im Auge und in der Umgebung des Auges beim Frosche.* Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 35. S. 247—281.
1888.  
1080. KOSCHEL. *Ueber Form, Lage und Größenverhältnisse der Orbita, des Bulbus und der Krystalllinse unserer Haustiere.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. II. S. 33.

1081. MOTAIS. *Contribution à l'étude de l'anatomie comparée des muscles de l'œil et de la capsule Ténon.* Paris.
1082. STÖTTING. *Vorschlag zu einigen Veränderungen an dem von Herrn Prof. Zehender angegebenen Exophthalmometer.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 355.  
1884.
1083. MOTAIS. *Recherches sur les muscles de l'œil chez l'homme et dans la série animale.* Bull. de la Soc. franç. d'ophthalm. S. 172.
1084. — *Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil.* Arch. d'Ophthalm. IV. S. 512.  
1885.
1085. MOTAIS. *Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil.* Arch. d'Ophthalm. V. S. 28, 143, 419 u. 524.  
1886.
1086. MOTAIS. *Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil.* Arch. d'Ophthalm. VI. S. 157.  
1887.
1087. MOTAIS. *Anatomie de l'appareil moteur de l'œil de l'homme et des vertébrés.* Paris, Delahaye u. Lecornier. 303 S.  
1889.
1088. R. DREWS. *Ueber das Mongolenaugen.* Arch. f. Anthrop. XVIII. 3. S. 223—233.
1089. L. WEISS. *Ueber directe Messung des Neigungswinkels des Orbitaeinganges.* Arch. f. Augenheilkde. XXI. S. 1.
1090. — *Zur Anatomie der Orbita.* Ber. üb. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 78.  
1891.
1091. E. CURTIUS. *Das menschliche Auge in der griechischen Plastik.* Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akademie v. 9. Juli 1891.
1092. W. WALDEYER. *Bemerkungen zu der vorstehenden Mittheilung des Herrn Curtius.* Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akademie v. 9. Juli 1891.  
1892.
1093. R. GREEFF. *Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike.* Arch. f. Anat. Jahrg. 1892. S. 113—136.
1094. SCHMIDT-RIMPLER. *Das Auge und seine Darstellung in Sculptur und Malerei.* Nord und Süd. LXII. No. 186.  
1894.
1095. A. ANTONELLI. *L'ophthalmomètre Javal employé pour l'exophthalmométrie et l'ophthalmostatométrie.* Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 529—542.
1096. L. WEISS. *Ueber das Verhalten von M. rectus externus und rectus internus bei wachsender Divergenz der Orbita.* Arch. f. Augenheilkde. Bd. XXIX. S. 298.
1097. WICKERKIEWICZ. *Ein neuer Orbitalmesser.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 365—367.

## § 9.

## Gesetze der Brechung in Systemen kugelliger Flächen.

## 1. Aeltere Litteratur.

098. COTES in Smith a complete system of optics. II. S. 76. Cambridge.  
1788.
099. L. EULER. *Règles générales pour la construction des télescopes et microscopes de quelque nombre de verres qu'ils soient composés.* Histoire de l'Acad. roy. de Berlin pour 1757. S. 283.  
1757.

1100. L. EULER. Histoire de l'Acad. roy. de Berlin pour 1761. S. 201.  
1761.  
1765.
1101. L. EULER. *Précis d'une théorie générale de la dioptrique*. Hist. de l'acad. roy. des sc. de Paris. 1765. S. 555.  
1778.
1102. LAGRANGE. Nouv. Mém. de l'acad. roy. de Berlin pour 1778. S. 162.  
1780.
1103. LAGRANGE. *Sur la théorie des lunettes*. Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 162.  
1803.
1104. LAGRANGE. Nouv. Mém. de l'acad. roy. de Berlin pour 1803. S. 1.  
1822.
1105. PIOLA. *Sulla theoria de'cannocchiali*. Effemeridi astron. di Milano per 1822.  
1830.
1106. MÖBIUS. *Kurze Darstellung der Haupteigenschaften eines Systems von Linsengläsern*. Crelle's Journ. f. Mathematik. Bd. V. S. 113.  
1841.
1107. \*BESSEL. *Ueber die Grundformeln der Dioptrik*. Astronom. Nachr. Bd. XVIII. S. 97.
1108. \*GAUSS. *Dioptrische Untersuchungen*. Göttingen. — Abdruck aus Abh. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Th. I. von den Jahren 1838—43.  
1844.
1109. ECKER. *De formulis dioptriciis*. Programm. Berlin.
1110. MOSER. *Ueber das Auge*. Dove's Repert. d. Phys. Bd. V. S. 289.
1111. — *Methode die Brennweite und optischen Hauptpunkte von Linsen zu bestimmen*. Pogg. Ann. Bd. LXIII. S. 39.  
1847.
1112. MINDING. *Neue Ausdrücke für die Hauptgesetze der Dioptrik*. Pogg. Ann. Bd. 70.  
1851.
1113. LISTING. *Dioptrik des Auges*. R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiol. Bd. IV. S. 451.
1114. A. F. MÖBIUS. *Entwicklung der Lehre von dioptrischen Bildern mit Hilfe der Collinationsverwandtschaft*. Ber. d. Leipziger Ges. d. Wiss. S. 8.

## 2. Neuere Litteratur.

Hinsichtlich der neueren Litteratur muß im allgemeinen auf die physikalischen Lehrbücher verwiesen werden. Hier folgt Einiges, was näheren Bezug auf die Dioptrik des Auges hat. — Wegen der Brechung in nicht-kugelförmigen Flächen siehe § 14.

1115. W. ZEHENDER. *Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges*. Erlangen.  
1856.
1116. F. C. DONDEES. *Bepaling van den brandpuntsafstand van lensen*. Vers. Ned. G. v. Oogk. No. 4. S. 99.  
1863.
1117. A. WÜLLNER. *Einleitung in die Dioptrik des Auges*. Leipzig.  
1870.
1118. F. E. REUSCH. *Constructionen zur Lehre von den Haupt- und Brennpunkten eines Linsensystems*. Teubner. Leipzig.  
1871.
1119. HOCK. *Untersuchungen über die Größe der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme*. Arch. f. Ophthalm. XVII. 2. S. 131.
1120. V. LANG. *Zur Dioptrik eines Systems centrirter Kugelflächen*. Wien. Acad.  
1875.
1121. J. HIRSCHBERG. *Zur Dioptrik des Auges. I. Die Brechung homocentrischer paraxiale Strahlenbündel in einem beliebigen centrirten System kugelförmiger Flächen*. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 769.

1876.

1122. J. HIRSCHBERG. *Dioptrik der Kugelflächen und des Auges*. Reichert's u. du Bois' Arch. S. 587.

1877.

1123. L. MATTHIESSEN. *Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme*. Leipzig. 276 S. 1878.

1124. J. HIRSCHBERG. *Elementare Darstellung der Gauss'schen Dioptrik kugeligter Flächen*. Beitr. z. prakt. Augenheilkde. 3. Heft. S. 30—35.

1125. L. MATTHIESSEN. *Ueber eine Methode der Berechnung der 6 Cardinalpunkte eines centrirten Systems sphärischer Linsen*. Schlömilch's Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. 22. 1880.

1126. E. ABBE. *Ueber die Grenzen der geometrischen Optik. Mit Vorbemerkungen über die Abhandlung: „Zur Theorie der Bilderzeugung“ von Dr. R. Altmann*. Sitzgs.-Ber. d. Jenaischen Ges. f. Med. u. Naturw. 23. Juli. 48 S.

1127. R. ALTMANN. *Ueber die Vorbemerkungen des Herrn Prof. Abbe zu seinen „Grenzen der geometrischen Optik“*. Arch. f. Anat. IV. S. 354—363.

1128. — *Zur Theorie der Bilderzeugung*. Arch. f. Anat. (u. Physiol.) IV. 2. S. 111—184.

1129. HÄLLSTÉN. *Die dioptrische Fähigkeit in centrirtten Systemen mit besonderer Rücksicht auf die dioptrische Fähigkeit und die Accommodationsbreite des Auges*. Arch. f. Anat. u. Physiol. Phys. Abth. Heft 1 u. 2. 1881.

1130. K. MOSER. *Die Grundformeln der Dioptrik*. Sitzgs.-Ber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. 1. April 1881. Prag.

1885.

1131. W. v. ZEHENDER. *Demonstration der Wirkung schief stehender sphärischer Linsen*. Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 232.

1132. — *Ueber den Gang der Lichtstrahlen bei schräger Incidenz. Ueber aplanatische Brillengläser*. Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 29 u. 36. 1886.

1133. S. EXNER. *Ueber Cylinder, welche optische Bilder entwerfen*. Pfüger's Arch. XXXVIII. S. 217. Nachtrag. XXXIX. S. 244.

1134. L. MATTHIESSEN. *Ueber den Strahlendurchgang durch coaxial-continuirlich geschichtete Kreiscylinder für paraxiale Objecte (Facettenauge der Käfer)*. Exner's Rep. d. Phys. XII.

1887.

1135. H. BROCKMANN. *Beiträge zur Dioptrik centrirtter sphärischer Flächen*. Diss. Rostock.

1136. S. M. BURNETT. *On some of the optical properties of spherical and cylindrical lenses placed obliquely to the incident pencils of light*. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. IV. S. 15 bis 20.

1137. C. NEUMANN. *Die Brillen, das dioptrische Fernrohr und das Mikroskop*. Wien. Hartleben. 1887. 95 Abb.

1888.

1138. G. FÜRCHTEBAUER. *Einige Eigenschaften der optischen Linse in Bezug auf Centralstrahlen*. Nürnberg. Ballhorn.

1139. A. HACHEK. *Optometer und Apparat zum Messen der Brennweiten und zum Centriren optischer Linsen*. Breslau. Aerztl. Zeitschr. X. S. 139.

1140. L. MATTHIESSEN. *Ueber ein merkwürdiges optisches Problem von Maxwell*. Exner's Rep. XXIV.

1891.

1141. S. FINSTERWALDER. *Die von optischen Systemen größerer Oeffnung und größeren Gesichtsfeldes erzeugten Bilder. Auf Grund der Seidel'schen Formeln untersucht*. Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München. 71 S.

1892.

1142. EJGIL SCHMIDT. *En Fremstilling af Theorien for centrerede optiske Systemer*. (Eine Darstellung der Theorie der centrirtten optischen Systeme.) Nord. ophthalm. Tidsskr. V. S. 1.

1893.

1143. S. CZAPSKI. *Theorie der optischen Instrumente nach Abbe*. (S.-A. a. d. Handb. d. Physik v. A. Winkelmann.) Breslau. E. Trewendt. 292 S.



## § 10.

## Brechung der Strahlen im Auge.

## 1. Das optische System des Auges.

Hier ist auch die in §§ 2, 3, und 5 angegebene Litteratur zu beachten.

- 1575.
1144. FR. MAUROLICUS. *Photismi de lumine et umbra ad Perspectivam et radiorum incidentiam facientes Venetiis 1575.* Messinde 1613. — Eine spätere Gesammtausgabe seiner optischen Abhandlungen führt den Titel: FR. MAUROLICUS, *Theorema de lumine et umbra, ad Perspectivam et radiorum incidentiam facientia; Diaphanorum partes seu libri tres, in quorum primo de perspicuis corporibus, in secundo de Iride, in tertio de organi visualis structura et conspiciendorum formis agitur: Problemata ad Perspectivam et Iridem pertinentia.* His accesserunt Christoph. Clavii e. S. J. notae. Lugduni. 1613.
- 1582.
1145. JO. BAPT. PORTA. *De refractione Optices parte libri novem.* Neapoli. Liber III—VIII. 1602.
1146. \*JO. KEPLER. *Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur.* Francofurti. 1604. Kap. V.
- 1611.
1147. KEPLER. *Dioptrice, seu demonstratio eorum, quae visui et visibilibus, propter conspicienda non ita pridem inventa, accidunt.* Augustae Vindelicorum 1611.
- 1619.
1148. C. SCHEINER. *Oculus, sive fundamentum opticum.* Innsbruck. 1619. London. 1652.
- 1695.
1149. HUYGENS († 1695). *Opera posthuma. Dioptrica.* Lugduni. 1704. S. 112.
- 1759.
1150. W. PORTERFIELD. *A treatise on the eye.* Edinburg. Vol. I. Book 3. Chapt. 2<sup>e</sup>.
- 1776.
1151. J. PRIESTLEY. *Geschichte der Optik; übers. von G. S. Klügel.* Leipzig. (*Aeltere Geschichte; Berechnung der Brennweite.* S. 465)\*.
1152. RUMBALL. *Ann. of Philos.* II. 376.
- 1813.
1153. ANDREW HORN. *The seat of vision determined.* London.
- 1816.
1154. N. TH. MÜHLBACH. *Inquisitio de visus sensu.* Vindobonae.
1155. MAGENDIE. *Précis élémentaire de Physiologie.* Paris. I. S. 59.
- 1817.
1156. CAMPBELL. *Ann. of Philos.* X. S. 17. — *Dtsch. Arch.* IX. S. 110.
1157. J. READ. *Ann. of Philos.* XV. S. 260.
- 1823.
1158. PURKINJE. *Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei.* Vratislaviae.
- 1825.
1159. C. J. LEHOT. *Nouvelle Théorie de Vision.* Paris.
- 1828.
1160. G. R. TREVIRANUS. *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge.* Bremen. 1828. Kap. I<sup>e</sup>.
1161. MÜNCKE. *Art. Gesicht.* Gehler's physikalisches Wörterbuch; neu bearbeitet. Leipzig. IV. 2. S. 1364\*.
- 1830.
1162. A. HUECK. *Das Sehen seinem äusseren Prozesse nach entwickelt.* Riga.
1163. PLAGGE. *Hecker's Annalen.* S. 404.

- 1834.
1164. C. M. N. BARTELS. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns*. Berlin. 1834. S. 61.
- 1836.
1165. A. W. VOLKMANN. *Untersuchung über den Stand des Netzhautbildchens*. Pogg. Ann. XXXVII. 342\*.
1166. — *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig. Kap. IV.
- 1837.
1167. JOH. MÜLLER. *Ueber die Richtungslinien des Sehens*. Pogg. Ann. XLII. S. 37 u. 235\*
- 1838.
1168. VOLKMANN. *Theorie zur Berechnung der Zerstreuungskreise des Lichts bei fehlerhafter Accommodation des Auges*. Pogg. Ann. XLV. S. 207\*. (Erwiderung gegen den Vorigen.)
- 1839.
1169. GERLING. *Ueber die Beobachtung von Netzhautbildern*. Pogg. Ann. XLVI. S. 243\*.
1170. KNOCHENHAUER. *Ueber die Richtungsstrahlen oder Richtungslinien beim Sehen*. Pogg. Ann. XLVI. S. 248\*.
- 1841.
1171. A. BUROW. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges*. Berlin. S. 16—93\*.
- 1842.
1172. L. L. VALLÉE. *Compt. Rend.* XIV. S. 481.
1173. W. STAMM. *Ueber Volkmann's Richtungslinien des Sehens*. Pogg. Ann. LVII. S. 346\*.
- 1843.
1174. A. W. VOLKMANN. *J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol.* S. 9 (gegen Burow).
- 1844.
1175. \*L. MOSER. *Ueber das Auge*. *Dove's Repert. d. Physik.* S. 337—349\*.
- 1845.
1176. J. B. LISTING. *Beitrag zur physiologischen Optik*. Göttingen (abgedr. aus d. Göttinger Studien). S. 7—21\*.
1177. L. L. VALLÉE. *Compt. Rend.* XX. S. 1338. — *Institut*. No. 393. S. 166.
- 1846.
1178. \*A. W. VOLKMANN. *Art. Sehen* in R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. 1. S. 281—290\*.
- 1847.
1179. F. C. DONDEERS. *Holländische Beiträge zu den anat. u. physiol. Wissensch.* I. S. 107—112\*.
- 1849.
1180. J. D. FORBES. *Note respecting the dimensions and refracting power of the eye*. *Proc. Edinb. Roy. Soc.* Decbr. 3. S. 251 — *Silliman Journ.* (2.) XIII. S. 413.
- 1851.
1181. \*J. B. LISTING. *Art. Dioptrik des Auges* in R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol. IV. S. 451—504\*.
- 1852—1861.
1182. L. L. VALLÉE. *Théorie de l'œil*. *Compt. Rend.* XXXIV. S. 321—323, 718—720, 720—722, 789—792, 872—876; — XXXV. S. 679—681; — LI. S. 678—680; — LII. S. 702—703, 1020—1021. *Mém. des savants étrangers*. XII. S. 204—264; XV. S. 98—118, 119 bis 140.
- 1855.
1183. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Accommodation des Auges*. *Graefe's Arch. f. Ophthalm.* I. 2. S. 1—74\*.
- 1856.
1184. W. ZEHENDER. *Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges*. Erlangen.
- 1858.
1185. N. LUBIMOFF. *Recherches sur la grandeur apparente des objets*. *Compt. Rend.* XLVII. S. 24—27. — *Ann. de chim.* (3.) LIV. S. 13—27.
- 1859.
1186. J. H. KNAPP. *Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges*. Habilitationsschrift. Heidelberg. — *Arch. f. Ophthalm.* VI. (2.) S. 1—52.

1860.

1187. BRETON. *Note sur une propriété du cristallin de l'œil humain.* Compt. Rend. L. S. 498—499.

1861.

1188. V. JÄGER. *Ueber die Einstellung des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge.* Wien.

1864.

1189. GIRAUD-TEULON. *Nouvelle étude de la marche des rayons lumineux dans l'œil. Rôle de chacun des milieux dioptriques.* Ann. d'Ocul. LI. S. 145.

1190. F. C. DONDERS. *On the anomalies of accommodation and refraction of the eye.* London. S. 38—71.

1865.

1191. L. MANDELSTAMM. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 259.

1192. B. ROSOW. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 129.

1866.

1193. J. F. B. POLAILLON. *Des milieux réfringens de l'œil.* Paris.

1868.

1194. GIRAUD-TEULON. *Desiderata existant encore dans les éléments de construction de l'œil schématique.* Ann. d'Ocul. LX. S. 97.

1869.

1195. BERLIN. *Ueber den Einfluss starker Convergläser auf das excentrische Sehen.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 361.

1196. E. v. BRÜCKE. *Ueber asymmetrische Strahlenbrechung im menschlichen Auge.* Wied. Ber. LVIII. 2. S. 321—329.

1197. REUSS u. WOINOW. *Ophthalmometrische Studien.* Wien.

1198. WOINOW. *Ophthalmometrie. Messungen der Linse.* Klin. Mon.-Bl. VII. S. 476

1870.

1199. R. E. DUDGEON. *Contribution to the Dioptrics of vision.* Nature. Decbr. 15.

1200. H. KNAPP. *Ueber den Einfluss der Brillen auf die optischen Constanten und die Sehschärfe des Auges.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 152.

1201. M. WOINOW. *Kritische Analyse der ophthalmometrischen Methode der Bestimmung der dioptrischen Elemente des Auges.* Inaug.-Diss. Moskau. (Russisch.) 1871 in Moskau französisch erschienen.

1202. H. ZINKEN-SOMMER. *Untersuchungen über die Dioptrik des Linsensystems.* Braunschweig.

1871.

1203. L. HERMANN. *Notizen für Vorlesungen und andere Versuche. II. Zur Demonstration des Netzhautbildes am albinotischen Kaninchenaugen.* Pflüger's Arch. Bd. 4 S. 210.

1872.

1204. G. BOREL. *Des lunettes après l'opération de la cataracte.* Rouen.

1205. GIRAUD-TEULON. *Nécessité, préalable à toute observation optique, d'une détermination exacte des constances dioptriques dans notre propre œil.* Ann. d'Ocul. LXVIII. S. 56.

1206. HEUSE. *Ueber die Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 236.

1207. GAMA LOBO. *Neue Methode zur Messung des Abstandes der hinteren Linsen- von der vorderen Hornhautfläche.* Klin. Mon.-Bl. X. S. 288.

1208. L. MANDELSTAMM u. H. SCHÖLER. *Eine neue Methode zur Bestimmung der optischen Constanten des Auges.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. S. 155.

1209. L. MATTHNER. *Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. I. Theil.* Wien Braumüller.

1210. WOINOW. *Zur Lehre über den Einfluss der optischen Gläser auf die Sehschärfe.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 349.

1873.

1211. H. KIESSLING. *Die Brechung der Lichtstrahlen im Auge.* Hamburg. 33 S.

1212. E. LANDOLT. *Axenlänge und Krümmungsradius des Auges.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XI. S. 473—481.

1213. LANDOLT u. NÜEL. *Versuch einer Bestimmung des Knotenpunktes für excentrisch in das Auge fallende Lichtstrahlen.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 301.

1874.

1214. O. BECKER. *Demonstration und Erklärung einiger Instrumente.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XII. S. 408—422.
1215. L. HERMANN. *Ueber schiefen Durchgang von Strahlenbündeln durch Linsen und eine darauf bezügliche Eigenschaft der Krystalllinse.* Gratulationsschrift von C. Ludwig. Zürich. — Pogg. Ann. Bd. 153. S. 470.
1216. J. HIRSCHBERG. *Ueber Prof. Laqueur's Ophthalmomikrometer und über eine objective Methode zur Messung des totalen Brechungsvermögens der Krystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 49.
1217. — *Ueber eine objective Methode zur Messung der Hauptbrennweiten der Krystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges.* Wien. med. Presse. XV. No. 45.
1218. LANDOLT en NUËL. *Proeven ter bepaling van het knooppunt voor excentrisch in het oog vallende Lichtstrahlen.* Onderzoekingen in het Physiol. Laborator. te Utrecht. Derde Reeks. III. S. 1.
1219. L. MAUTHNER. *Das schematische Auge.* Wien. med. Wochenschr. S. 173.
1220. M. REICH. *Resultate einiger ophthalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen.* Graefe's Arch. XX. (1.) S. 207.
1221. W. STAMMESHAUS. *Ueber die Lage der Netzhautschale zur Brennfläche des dioptrischen Systems des menschlichen Auges.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 147—170.

1876.

1222. J. BERNSTEIN. *Ueber die Ermittlung des Knotenpunktes im Auge des lebenden Menschen.* Berl. Akad. Ber. 7. Aug. 1876. S. 509.
1223. BOETTCHER. *Ueber Dioptrik des Auges.* Diss. Berlin.
1224. J. HIRSCHBERG. *Zur Dioptrik des Auges. II. Die Länge des emmetropischen Auges.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XIV. S. 40.
1225. — *Optische Notizen.* Arch. f. Anat. u. Physiol. u. wiss. Med. Jahrg. 1876. S. 622 bis 629.
1226. L. MATTHIESSEN. *Ueber den Aplanatismus der Hornhaut.* Graefe's Arch. Bd. 22.
1227. — *Formeln zur Berechnung der Cardinalpunkte des Auges.* Physiol. Optik von Aubert. S. 404—406. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXI.
1228. — *Ueber die Berechnung des absoluten Brechungsvermögens des Kerncentrums der Krystalllinse.* Graefe's Arch. Bd. 22.
1229. L. MAUTHNER. *Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. II. Teil.* Wien. Braumüller.
1230. J. F. SCHROETER. *Zur Dioptrik des menschlichen Auges.* Diss. Berlin.
1231. W. STAMMESHAUS. *Darstellung der Dioptrik des normalen menschlichen Auges.* Oberhausen. Spaarmann. 240 S.
1232. G. J. WITKOWSKI. *Appareil de la vision.* Paris.

1877.

1233. BADAL. *Distance du centre optique de l'oeil au sommet de la cornée.* Soc. de biol. 21. April. — Gaz. d. hôp. S. 374. — Gaz. Méd. de Paris. S. 225.
1234. L. HAPPE. *Das dioptrische System des Auges in elementarer Darstellung.* Berlin.
1235. J. v. HASNER. *Zur Dioptrik des Auges.* Centralbl. f. pr. Augenheilkde. S. 37—39.
1236. LEVI. *Ueber den Einfluss der Entfernung der Convexlinsen vom Auge.* Ann. di Ottalm. 1877.
1237. L. MATTHIESSEN. *Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme.* Leipzig. 276 S.
1238. A. v. REUSS. *Untersuchungen über die optischen Constanten ametropischer Augen.* Graefe's Arch. Bd. XXIII. (4.) S. 183—268.
1239. W. RÖDER. *Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsveränderungen der menschlichen Hornhaut.* Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 29—56.

1878.

1240. BADAL. *Un oeil artificiel pour essais optométriques et ophthalmoscopiques.* Gaz. Méd. de Paris. No. 10. S. 123.
1241. L. HAPPE. *Das reducirte Auge.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 182—184.
1242. J. v. HASNER. *Das reducirte Auge.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 31.
1243. — *Erwiderung auf den Artikel: Das reducirte Auge, von Herrn Happe.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 182—184.
1244. — *Ueber das reducirte Auge.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. VII. S. 1—9.
1245. — *Die Gröswenwerthe des Auges.* Prag. med. Wochenschr. 1878. No. 9.

1246. L. HERMANN. *Ueber Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges.* Arch. f. d. ges. Physiol. XVIII. S. 443—454.  
 1247. A. NAGEL. *Die Bestimmung der Sehaxenlänge am lebenden Auge.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 100—102, 121—123.  
 1248. L. MANDELSTAMM. *Ectopia lentis mit berechneter Länge der Augenaxe.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVI. S. 123.  
 1249. M. PESCHEL. *Ueber den Astigmatismus des indirecten Sehens.* Pflüger's Arch. Bd. 18. S. 504.  
 1250. PFLÜGER. *Phakometer. Chiasmometer.* Beil. z. Augusth. d. Centr.-Bl. f. prakt. Augenheilkde. S. 10—12. — Beil. z. Zehender's klin. Mon.-Bl. S. 46—53.  
 1251. L. WEISS. *Beitrag zur Dioptrik des Auges.* Berlin.

## 1879.

1252. A. FICK. *Dioptrik des Auges.* Handb. d. Physiol., herg. v. L. Hermann. III. 1. S. 3—138.  
 1253. — *Zur Periscopie des Auges.* Pflüger's Arch. Bd. 19. S. 145.  
 1254. V. HASNER. *Das mittlere Auge in seinen physiologischen und pathologischen Beziehungen.* Prag. Calve. 117 S.  
 1255. L. HERMANN. *Ueber Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges.* Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 370—387.  
 1256. L. MATTHIESSEN. *Die Differentialgleichungen der Dioptrik continuirlich geschichteter Linsen und ihre Anwendung auf die Dioptrik der Krystalllinse.* Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. Bd. 24. 5. S. 304—315.  
 1257. — *Die Differentialgleichungen der Dioptrik der geschichteten Krystalllinse.* Pflüger's Arch. Bd. 19. S. 480—562.  
 1258. — *Ueber die geometrische Gestalt der theoretischen Retina des periskopischen schematischen Auges.* Arch. f. Ophthalm. XXV. (2) u. (4).  
 1259. L. MAUTHNER. *Fernpunkt, Brillenlehre, Nahepunkt und Accommodationsbreite, Binocularsehen, Optische Fehler (Astigmatismus).* Wiesbaden. Bergmann.  
 1260. M. PESCHEL. *Experimentelle Untersuchungen über die Periskopie der Krystalllinse.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 338—353.  
 1261. — *Berechnung der Cardinalpunkte des Auges.* Centralbl. f. Augenheilkde. III. S. 201—202.  
 1262. RASMUS u. WAUER. *Mathematische Theorie der Periskopie des menschlichen Auges.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 264—282.  
 1263. SCHÖN. *Bemerkungen über die Dioptrik der Krystalllinse und die Periskopie des Auges.* du Bois-Reymond's Arch. f. Physiol. 1879. Suppl.-Bd. S. 136—166.  
 1264. G. WEISKER. *Die optischen Fehler des Auges.* I. Schulprogr. Rathenow.

## 1880.

1265. CROUILLEBOIS. *Sur la grandeur et les variations des images de Purkinje.* Compt. Rend. Bd. 92. S. 73—76.  
 1266. A. v. REUSS. *Ophthalmometrische Mittheilungen.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. 1.

## 1881.

1267. L. MATTHIESSEN. *Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 21. S. 287.  
 1268. — *Neue Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 25. S. 193.  
 1269. — *Zur Integration der Differentialgleichungen in der Dioptrik der continuirlich geschichteten kugelförmigen Krystalllinse der Fische.* Schlömilch's Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. 26.  
 1270. S. MORTON. *Refraction of the eye.* London. Lewis.  
 1271. PERRIN. *Optométrie ou dioptrique de l'oeil.* Dict. encycl. de sc. méd. Paris. XVI. S. 449.  
 1272. W. SCHÖN. *Brechung schiefer Strahlenbündel in thierischen Linsen.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 64.  
 1273. — *Der Aplanatismus der Hornhaut.* Horner-Festschrift. Wiesbaden. S. 125—131.  
 1274. F. TARTUFERI u. G. ALBERTOTTI. *Sulle variazioni del valore di refrazione conseguenti alle evacuazioni dell' umor aqueo. Note sperim.* Ann. di ottalm. X. 3. S. 238—248.

## 1882.

1275. L. FORBES. *Eine neue Form des schematischen Auges*. Arch. f. Augenheilkde. S. 328.  
 1276. L. HERMANN. *Ueber Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges*. Arch. f. d. ges. Physiol. XXVII. S. 291.  
 1277. J. HIRSCHBERG. *Refraction*. Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde.  
 1278. — *Zur Dioptrik und Ophthalmoskopie der Fisch- und Amphibienaugen*. du Bois' Arch. S. 493.  
 1279. L. MATTHIESSEN. *Die zwanzig Cardinalpunkte des menschlichen Auges*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 154.  
 1280. — *Ueber die Beziehungen, welche zwischen dem Brechungsindex des Kerncentrums der Krystalllinse und den Dimensionen des Auges bestehen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 27. S. 510.  
 1281. PARENT. *Comment sont réfractés les rayons tombant obliquement sur l'œil?* Rec. d'Ophthalm. S. 220.

## 1883.

1282. L. MATTHIESSEN. *Ueber den schiefen Durchgang unendlich dünner Strahlenbündel durch die Krystalllinse des Auges*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 32. S. 97.  
 1283. — *Differentialgleichungen in der Dioptrik der continuirlich geschichteten kugelförmigen Krystalllinse der Fische*. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. Bd. 28.  
 1284. — *Ueber die Form astigmatischer Bilder sehr kleiner gerader Linien bei schiefer Incidenz der Strahlen in ein unendlich kleines Segment einer brechenden sphärischen Fläche*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 147.  
 1285. P. MOENNICH. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Rindsauges*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. II. S. 1—30. — Sep. Leipzig.  
 1286. H. F. NEWALL. *Internal reflexions in the eye*. Proc. Roy. Soc. XXXIV. S. 473—480.  
 1287. G. WEISKER. *Die optischen Fehler des Auges. II*. Progr. d. höher. Bürgerschule Rathenow. 18 S.

## 1884.

1288. G. HARTRIDGE. *The Refraction of the eye*. London. 1884. 212 S.  
 1289. L. MATTHIESSEN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Löwenauges*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 35. S. 68.  
 1290. — *Ueber die radiale Ausdehnung des Sehfeldes und die Allometropie des Auges bei indirectem Sehen*. Graefe's Arch. Bd. 30. (1.) S. 91.  
 1291. H. SCHÖLER. *Bestimmung des physikalischen Baues des Auges*. Graefe's Arch. Bd. XXX. (3.) S. 301.  
 1292. W. SCHÖN. *Beiträge zur Dioptrik des Auges*. Leipzig. 1884. 114 S.  
 1293. H. WESTIEN. *Mittheilungen aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock (über den Gang der Lichtstrahlen in der accommodirten und ruhenden Linse und durch die Ophthalmometerplatten)*. Zeitschr. f. Instrumentenkde. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 217.

## 1885.

1294. L. HOWE. *Arrangement for the demonstration of refraction and accommodation*. Americ. ophthalm. Soc. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 149.  
 1295. L. MATTHIESSEN. *Ueber Begriff und Auswerthung des sog. Totalindex der Krystalllinse*. Pflüger's Arch. Bd. 36. S. 72.  
 1296. — *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Vögel*. Pflüger's Arch. Bd. 38. S. 104.

## 1886.

1297. J. EGOROW. *Ueber den Knotenpunkt des Auges*. (Russisch.) Diss. Kasan.  
 1298. G. HARTRIDGE. *The refraction of the eye*. 2. Aufl. London. A. Churchill.  
 1299. L. HOWE. *An apparatus for the demonstration of accommodation and refraction*. Arch. of Ophthalm. XV. No. 3.  
 1300. C. LANDSBERG. *Zur Dioptrik des Auges und der Augengläser*. Centralztg. f. Opt. u. Mech. VII. S. 241—245, 253—257, 270—272, 277—282.  
 1301. W. LANG u. BARRETT. *The refractive character of the eyes of mammalia*. Ophthalm. hosp. Rep. XI. Juli.  
 1302. L. MATTHIESSEN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Cetaceen und der Fische*. Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 512—528. XXXIX. S. 204.  
 1303. — *Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. IV. S. 1.

## 1887.

1304. A. G. HEYL. *The visual axis*. Transact. of the IX. Internat. med. Congr. at Washington. III. — Amer. Journ. of Ophthalm. S. 269.  
 1305. L. MATTHIESSEN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges von Cervus alpes mas*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 40. S. 314.  
 1306. — *Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V. S. 21 u. 97.  
 1307. P. MOENNICH. *Neue Untersuchungen über das Lichtbrechungsvermögen der geschichteten Krystalllinse der Vertebraten*. Habilit.-Schr. — Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 397.

## 1888.

1308. J. B. EMERSON. *A schematic eye for students of ophthalmoscopy*. Post Graduate New-York 1888/89. S. 46.  
 1309. A. KLINGSBERG. *Ueber den physikalischen Bau des Auges der Hauskatze*. Arch. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. Güstrow. Opitz.  
 1310. PEDRAZZOLI. *Presentazione di un apparecchio schematico per la dimostrazione della refrazione statica*. Ann. di Ottalm. XVII. S. 252.  
 1311. J. OSCROFT-TANSLEY. *A new instrument for demonstrating refraction of the eye*. Amer. Journ. of Ophthalm. S. 311.  
 1312. TSCHERNING. *Bidrag til det menneskelige øjesdioptrik*. (Beiträge zur Dioptrik des menschlichen Auges.) Nord. oftalm. Tidsskr. I. S. 53.  
 1313. — *Étude sur la position du cristallin de l'œil humain*. Compt. Rend. Bd. 106. No. 16. S. 1185.

## 1889.

1314. G. HARTRIDGE. *The refraction of the eye*. London. 3. ed.  
 1315. A. KURZ. *Das Auge und die allgemeine Linse*. Exner's Rep. XXV. S. 755—764.  
 1316. — *Das schematische Auge des Menschen*. Exner's Rep. XXV. S. 587—593.  
 1317. L. MATTHIESSEN. *Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. Kap. II. Die periphere Dioptrik für paraxiale Objecte*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VI. S. 118.  
 1318. TSCHERNING. *Position du cristallin dans l'œil humain*. Compt. Rend. de la VII. réun. de la Soc. franç. d'Ophthalm. Rév. gén. S. 350.

## 1890.

1319. G. HARTRIDGE. *The refraction of the eye*. Fourth edition. Philadelphia. Blakiston.  
 1320. J. HIRSCHBERG. *Diabetische Kurzsichtigkeit*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 7—8.  
 1321. J. KIESSLING. *Zur Erklärung des Sehens mit bewaffnetem Auge*. Festschr. d. Hamb. mathem. Ges. z. 200jähr. Jubelfest. S. 125—128.  
 1322. C. KOLLEB. *Elimination of the cornea and its effect upon the refraction of the eye*. Americ. Journ. of Ophthalm. Juli.  
 1323. L. MATTHIESSEN. *Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. 3. Folge*. Wiesbaden. Bergmann.  
 1324. P. PIERINI. *Saggio di appunti critici di ottica fisiologica*. Giorn. d. Reale Accad. di Med. No. 11 u. 12.

## 1891.

1325. F. VAN FLEET. *The normal refraction of the eye*. Med. Rec. (New-York) 15. Decbr. S. 682—684.  
 1326. L. MATTHIESSEN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der norwegischen Barten- oder Fincaie*. Pflüger's Arch. XLIX. S. 549—562.  
 1327. — *Die neueren Fortschritte in unserer Kenntnis von dem optischen Bau des Auges der Wirbelthiere*. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Helmholtz-Festschr. S. 49—112. (Auch separat erschienen. Hamburg, L. Voss.)  
 1328. A. MORTON. *Refraction of the eye*. 4. ed. London. Lewis.  
 1329. J. MUSGROVE. *De la force réfringente de la cornée, de l'ophtalmométrie et du cylindre correcteur de l'astigmatisme cornéen*. Rev. gén. d'ophtalm. X S. 193—219.  
 1330. F. OSTWALT. *Einige Worte über Gläsercorrection bei Aphakie*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 283.  
 1331. — *De la force réfringente de la cornée, de l'ophtalmométrie et du cylindre correcteur de l'astigmatisme cornéen*. Rev. gén. d'ophtalm. No. 5 u. 6.  
 1332. M. TSCHERNING. *Recherches sur la quatrième image de Purkinje*. Arch. de Physiol. 5. sér. T. III. S. 96—107.

1333. — *Théorie des images de Purkinje et description d'une nouvelle image.* Arch. de Physiol. 5. sér. T. III. S. 357—372.  
 1334. — *Sur une image à la fois catoptrique et dioptrique de l'œil humain et une nouvelle méthode pour déterminer la direction de l'axe optique de l'œil.* Bull. de la Soc. Française de l'ophthal. S. 203.

## 1892.

1335. SW. M. BURNETT. *The general form of the human cornea and its relation to the refraction of the eye and visual acuteness.* Americ. Journ. of Ophthalm. August. Transact. of the Americ. ophthalm. soc. S. 316.  
 1336. KNOEFFLER. *Contribution clinique à l'étude de la position du cristallin dans l'œil humain à l'état de repos et d'activité de l'accommodation.* Rev. méd. de l'Est. 15. Juni.  
 1337. G. MARTIN. *Valeur réfractaire du cristallin chez les myopes.* Rev. gén. d'ophthalm. XI. S. 22—23.  
 1338. L. MATTHIESSEN. *Die zweiten Purkinje'schen Bilder im schematischen und im wirklichen Auge.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 280—296.  
 1339. F. OSTWALT. *Auch noch einmal die Gläsercorrection bei Aphakie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXX. S. 178—181.  
 1340. M. TSCHERNING. *Beiträge zur Dioptrik des Auges.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 429—492.  
 1341. — *Les images catoptriques de l'œil humain.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 23. Juli. S. 688.

## 1893.

1342. E. BAQUIS. *Sopra il fenomeno endoptico di Heuse. Appunti critici e nuova interpretazione.* Ann. di Ottalm. Anno XXII. S. 471.  
 1343. A. KLINGBERG. *Beiträge zur Dioptrik der Augen einiger Haustiere.* 3. Theil. Progr. Güstrow. 18 S.  
 1344. L. MATTHIESSEN. *Ueber den physikalisch-optischen Bau der Augen vom Knôhwal (Megaptera boops. Fabr.) und Finnwal (Balaenoptera musculus Comp.)* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 77—102.  
 1345. — *Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse.* (Vierte Folge.) Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 102—189.  
 1346. H. PARENT. *Exposé élémentaire de la dioptrique oculaire.* Arch. d'Ophthalm. XIII. S. S. 145—167.  
 1347. TSCHERNING. *Les sept images de l'œil humain.* Journ. de phys. (3.) Bd. II. S. 118—126.  
 1348. E. VITALI. *Occhio diottrico.* Ann. di Ottalm. XXII. S. 219.

## 1894.

1349. H. BORDIER. *Modifications de la grandeur des images rétiniennees par les verres correcteurs dans les différentes amétropies.* Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 279—297.  
 1350. G. HARTRIDGE. *The refraction of the eye.* London. Churchill.  
 1351. F. LAGRANGE. *De l'égalité des images rétiniennees dans l'amétropie axiale corrigée et dans l'emmétropie; nouvelle démonstration élémentaire.* Ann. d'Ocul. CXI. S. 81.  
 1352. — *De l'égalité des images rétiniennees dans l'amétropie axiale corrigée et dans l'emmétropie.* (Note complémentaire.) Ann. d'Oculist. Bd. CXI. S. 279.  
 1353. F. SMITH. *The refractive character of the eyes of horses.* London. Roy. Soc. Bd. 55. No. 334. S. 414.  
 1354. A. STRIGER. *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction.* Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 98—111.  
 1355. — *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraktion.* 1. Theil. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 135 S.  
 1356. M. TSCHERNING. *Un reflet intra-oculaire.* Arch. de Physiol. (5.) VI. S. 158—163.

## 2. Messung der Brechungsverhältnisse.

Die meisten dieser Bestimmungen sind in den im unmittelbar vorhergehenden Abschnitt dieses Paragraphen angeführten Abhandlungen enthalten. Ferner finden sich solche in:

## 1710.

1357. HAWKSBER. *Apparatus for making experiments on the refraction of fluids.* Philos Transact. 1710. S. 204.

## 1785.

1358. A. MONRO. *On the structure and physiology of fishes.* S. 60.



1801.  
1359. TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye.* Philos. Transact. 1801. I. 40\*.
1818.  
1360. D. BREWSTER. *A Treatise on new philosophical Instruments.* Edinburgh. S. 243.
1818.  
1361. CHOSSAT. *Sur le pouvoir réfringent des milieux de l'oeil.* Ann. de chim. et de phys. VIII. S. 217. — Bulletin des sc. par la Soc. philomat. de Paris. Juin. S. 294.
1819.  
1362. D. BREWSTER. Edinb. Philos. Journ. No. 1. S. 47.
1840.  
1363. CAHOURS et BECQUEREL. *Sur le pouvoir réfringent des liquides.* Ann. de chim. et phys. XI. — Institut. S. 399.
1847.  
1364. S. PAPPENHEIM. Compt. Rend. XXV. 901. — Arch. d. sc. phys. et nat. VII. S. 78.
1847.  
1365. QUESNEL. Rev. scientif. XXXII. S. 144.
1849.  
1366. BERTIN. *Sur la mesure des indices de réfraction des lames transparents et des liquides à l'aide du microscope ordinaire.* Ann. de chim. et de phys. XXVI. S. 288. — Compt. Rend. XXVIII. S. 447. — Institut. No. 796. S. 105. — Arch. d. sc. phys. et nat. XII. S. 45. — Pogg. Ann. LXXVI. S. 611.
1850.  
1367. ENGEL. *Zur Physik des Auges.* Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. I. S. 152.
1852.  
1368. H. MAYER. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. IV. Beilage u. 1851. IV. S. 92.
1852.  
1369. RYBA. *Prüfung des Brechungsverhältnisses durchsichtiger Körper.* Prag. Vierteljahrsschr. II. S. 95.
1855.  
1370. W. KRAUSE. *Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges.* Hannover. 1855\*.
1857.  
1371. W. ZEHENDER. *Ueber die Brewster'sche Methode zur Bestimmung der Brechungsexponenten flüssiger und festweicher Substanzen.* Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 99.
1869.  
1372. E. v. CYON. *Die Brechungsquotienten des Glaskörpers und des Humor aqueus.* Wien. Ber. LIX. 2. S. 101—103. (Aufgenommen in: Gesammelte Abhdlg. Berlin. 1868. S. 245.) — Arch. de physiol. 1869. S. 555.
1872.  
1373. S. FLEISCHER. *Neue Bestimmung der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges.* Inaug.-Diss. Jena.
1873.  
1374. E. LANDOLT. *Axenlänge und Krümmungsradius des Auges.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XI. S. 473—481.
1874.  
1375. E. ABBE. *Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs- und Zerstreuungsvermögens fester und flüssiger Körper.* Jena.
1376. E. v. CYON. *Ueber den Brechungsindex der flüssigen Augenmedien.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 50. S. 785.
1377. J. HIRSCHBERG. *Ueber Bestimmung der Brechungsindices der flüssigen Medien des menschlichen Auges.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 13.
1378. — *Zur Brechung und Dispersion der flüssigen Augenmedien.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 52.
1379. — *Ueber das Brechungsverhältniß der flüssigen Medien des menschlichen Auges.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. IV. S. 45.
1380. WOINOW. *Ueber die Brechungscoefficienten der verschiedenen Linsenschichten.* Briefl. Mitth. in Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Jahrg. XII. S. 407.
1877.  
1381. W. ZEHENDER und L. MATTHIESSEN. *Ueber die Brechungscoefficienten cataractöser Linsensubstanz.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV. S. 239—257.

1879.

1382. VALENTIN. *Ein Beitrag zur Kenntniss der Brechungsverhältnisse der Thiergewebe.* Arch. f. Physiol. XIX. S. 78—105. XX. S. 283—314.  
 1383. W. ZEHNENDER, L. MATTHIESSEN und O. JACOBSEN. *Ueber die Brechungscoefficienten und die chemische Beschaffenheit cataractöser Linsensubstanz.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVII. 307—317. — Ber. üb. d. XII. Vers. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 189.

1885.

1384. L. MATTHIESSEN. *Ueber das Gesetz der Zunahme der Brechungsindices innerhalb der Krystalllinse der Säugethiere und Fische.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. (2.) S. 31—34.

1891.

1385. H. BERTIN-SANS. *Influence de l'âge sur les indices de réfraction des différentes couches du cristallin.* Arch. d'ophthalm. XI. S. 289.

### 3. Das Gesichtsfeld und die Perimeter.

Man beachte auch die in § 28 angegebene Litteratur.

1855.

1386. A. v. GRAEFE. *Ueber die Untersuchung des Gesichtsfeldes bei ambliopischen Affectionen.* Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 258.

1861.

1387. M. KORN. *De retinae vi sentiendi ejusque finibus.*

1867.

1388. FÖRSTER. *Ueber Gesichtsfeldmessungen.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. V. S. 293.  
 1389. WECKER. *Ein neuer Gesichtsfeldmesser.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. V. S. 275.  
 1390. — *Le mensurateur du champ de la vision.* Rev. méd. I. S. 362.  
 1391. — *Horatometer oder Gesichtsfeldmesser.* Bull. de l'Acad. de méd. XXII. S. 546.

1868.

1392. FÖRSTER. *Mensurations du champ visuel monoculaire.* Ann. d'Ocul. LIX. S. 5.

1869.

1393. FÖRSTER. *Das Perimeter.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 411.

1394. MÖSER. *Das Perimeter und seine Anwendung.* Inaug.-Diss. Breslau.

1870.

1395. HEYMANN. *Ueber einige neue Methoden der Gesichtsfeldprüfung.* Jahresber. d. Ges. f. Natur. u. Heilkde. in Dresden. Juni 1869 bis Mai 1870. S. 66.  
 1396. USCHAKOFF. *Ueber die GröÙe des Gesichtsfeldes bei Augen mit verschiedener Refraction.* Arch. f. Anat. S. 454.

1871.

1397. LANDOLT. *Il Perimetro e la sua applicazione.* Ann. d'Ottalm. I. S. 1.

1398. REICH. *Matériaux servant à définir les limites du champ visuel etc.* Inaug.-Diss. St. Petersburg.

1872.

1399. B. CARTER. *Ein neues Perimeter.* Klin. Mon.-Bl. X. S. 282.

1400. W. DOBROWOLSKY. *Zur Lehre von der GröÙe des Gesichtsfeldes.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 159—163.

1401. SCHERK. *Ein neuer Apparat zur Messung des Gesichtsfeldes.* Klin. Mon.-Bl. S. 151.

1873.

1402. W. SCHÖN. *Die Lehre vom Gesichtsfelde.* Klin. Mon.-Bl. 1873. S. 171.

1874.

1403. A. SCHENKL. *Ein Beitrag zur Sehfeldbestimmung.* Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. CXXIII. (XXXI. 3.) S. 77.

1404. SCHÖN. *Die Lehre vom Gesichtsfeld und seine Anomalien.* Berlin. 150 S.

1405. P. SCHRÖTER. *Zur Gesichtsfeldmessung.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XII. S. 39—43.

1875.

1406. J. HIRSCHBERG. *Zur Gesichtsfeldmessung.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. IV. 2. S. 268—272.

1407. F. PAULI. *Beiträge zur Lehre vom Gesichtsfelde.* München.

## 1877.

1408. BADAL. *Perimètre portatif et Schémographe*. Bull. mens. de la clinique du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 11—14.
1409. F. C. DONDEERS. *Die Grenzen des Gesichtsfeldes in Beziehung zu denen der Netzhaut*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (2.) S. 255—280. — XVIII. j. verl. Nederl. gasth. etc. S. 1—26. — Utrecht'sche Onderzoek. 3 reeks. IV. S. 325—350.
1410. — *Over de grenzen van het gezichtsveld, in verband met die van het netvies*. K. Akad. van Wet. te Amsterdam. Afd. Naturkde. 27. April. S. 3.
1411. DOUCET. *Der l'exploration du champ visuel*. Thèse de Paris.
1412. R. FÖRSTER. *Gesichtsfeldmessung bei Anästhesie der Netzhaut*. Beil. z. d. kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 162—166. — Beil. z. Septemberhft. d. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 28.
1413. GROSSMANN und MAYERHAUSEN. *Beitrag zur Lehre vom Gesichtsfelde bei Säugthieren*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (3.) S. 217—240.
1414. — *Bepaling betrekkelijk het gezichtsveld bij eenige zoogdieren*. XVIII. j. versl. Nederl. gasth. etc. S. 27—50. Onderzoek. 3. reeks. IV. S. 351—374.
1415. H. LIÉVIN. *Ueber die Grösse und Begrenzung des normalen Gesichtsfeldes*.
1416. J. STILLING. *Notiz über einen neuen Perimeter*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 105—107.

## 1879.

1417. H. WILBRAND. *Das Verhalten der Gesichtsfelder beim angeborenen Nystagmus und dem Nystagmus der Bergeleute*. Zehender's kl. Mon.-Bl. April 1879.

## 1880.

1418. A. CRITCHETT. *Chart for Measuring the Field of Vision*. Pickard and Cuny, London.
1419. D. DE LA VIGERIE. *Le champ visuel et sa valeur clinique*. Thèse de Paris.

## 1881.

1420. A. CRITCHETT. *Chart for measuring the field of vision*. Brit. med. Journ. 1. Jan. S. 9.
1421. MC. HARDY. *An improved self-registering perimeter*. Ophthalm. Rev. I. S. 107. — Lancet. (1882) I. No. 4.
1422. WERNICKE. *Ueber eine grössere Anzahl von Gesichtsfeldaufnahmen*. Du Bois-Reymond's Arch. S. 171.

## 1882.

1423. M. BLIX. *Ein selbst registrierendes Perimeter*. Zeitschr. f. Instr.-Kde. April.
1424. E. EMMERT. *Die Grösse des Gesichtsfeldes in Beziehung zur Accommodation*. Arch. f. Augenheilkde. XI.
1425. HOSCH. *Ueber Gesichtsfeldmessung*. Corresp.-Bl. f. schweiz. Aerzte. 8.
1426. W. L. C. STEVENS. *Description of a registering perimeter*. Transact. internat. med. Congr. 7. Sess. London. 1881. III. S. 123.
1427. STORY. *Demonstration eines Perimeters*. Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 172.
1428. *Perimetrie*. Eulenburg's Realencycl. d. ges. Heilkde. S. 476.

## 1883.

1429. J. B. EMERSON. *A new instrument for testing the field of vision*. Med. Rec. New York. XXIII. S. 251.
1430. FÖRSTER. *Das Kartennetz zur Eintragung der Gesichtsfelder*. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 131.
1431. R. HILBERT. *The representation of the limits of the visual field*. Arch. of Ophthalm. XII. S. 303.
1432. — *Die Darstellung der Gesichtsfeldgrenzen*. Arch. f. Augenheilkde. XII. S. 436.
1433. KAZAUROW. *Ueber den Einfluss der Accommodation des Auges auf Veränderung der Grenzen des Gesichtsfeldes*. Wratsch. No. 2.
1434. J. L. MINOR. *The field of vision*. Americ. Journ. of med. sc. S. 77.
1435. STÖBER. *Du champ visuel simple ou achromatique et de ses anomalies*. Arch. d'Ophthalm. S. 56, 138 u. 252.

## 1884.

1436. J. ALBERTOTTI. *Ein autometrisches, selbstregistrirendes Perimeter*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 465.

1437. J. ALBERTOTTI. *Autoperimetro registratore*. Clinic. oftalm. di Torino. Ann. d'Ocul. Bd. 92. S. 198.
1438. O. BAER. *Ueber Gesichtsfeldmessung und deren allgemeine diagnostische Bedeutung*. Leipzig. Volkmann's Sammlg. klin. Vortr. No. 246.
1439. CL. DU BOIS-REYMOND. *Ein Perimeter*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 188.
1440. P. BUNGE. *Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat*. Habil.-Schr. Halle. 36 S.
1441. E. DYER. *A new perimeter*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 686.
1442. FERRI. *La périmétrie et les périmètres enregistreurs*. Arch. ital. de Biol. 2. S. 142.
1443. GALEZOWSKI. *Nouveau modèle de périmètre*. Rec. d'Ophthalm. S. 649.
1444. GAZEPEY. *Campimètre portatif*. Rec. d'Ophthalm. S. 455. Union méd. No. 94.
1445. G. GRASELLI. *Due notevoli perimetrie*. Gaz. med. ital. lomb. IV. S. 163.
1446. MAKRAKOFF. *Le périmètre de précision*. Arch. d'Ophthalm. S. 83.
1447. G. MAYERHAUSEN. *Ein neues selbstregistrirendes Perimeter*. Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 207.
1448. — *Selbstregistrierender Perimeter*. Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 132.
1449. B. A. RANDALL. *A new perimeter for measuring the visual field*. Med. News Philos. XLV. S. 419.
- 1885.
1450. W. EHRHARDT. *Ueber den Einfluss electrischer Ströme auf das Gesichtsfeld*. Diss. München. — Centralbl. f. d. med. Wiss. 1886. No. 10.
1451. FERRI. *La perimetria ed i perimetri registratori*. Ann. di Ottalm. S. 53.
1452. GALEZOWSKY. *Perimetro del dott. Galezowsky*. Ann. di Ottalm. S. 182. — Bull. et mém. Soc. franç. d'Ophthalm. III. S. 320. — Arch. d'Ophthalm. S. 181.
1453. G. DE GRANDMONT. *De la nécessité d'une numération commune en périoptométrie*. Rec. d'Ophthalm. S. 134. — Rec. clin. d'Ocul. II. S. 26.
1454. — *Périmètre enregistreur et numérateur*. Arch. d'Ophthalm. S. 181.
1455. A. HILL GRIFFITH. *The field of vision*. Med. Chron. Nov. 1885. S. 89.
1456. E. KONRAD und J. WAGNER. *Ueber den Werth der Engelskjön'schen electrodiagnostischen Gesichtsfelduntersuchung*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkr. XVI. 1. S. 101.
1457. G. MAYERHAUSEN. *Verbesserung an meinem selbstregistrirenden Perimeter*. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 306.
1458. — *A new self-registering perimeter*. Arch. of Ophthalm. XIV. No. 1.
1459. MEILLO. *Note sur un nouvel instrument destiné à la mensuration du champ visuel et de la diplopie*. Arch. d'Ophthalm. S. 276.
1460. A. NIEDEN. *Demonstration eines selbstregistrirenden Perimeters*. Ber. üb. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 241.
1461. H. SCHIÖTZ. *Ein selbstregistrirendes Perimeter*. Arch. f. Augenheilkde. XVI. 1. S. 13.
1462. H. WILBRAND. *Ueber concentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei functionellen Störungen der Großhirnrinde und über Incongruens hemianopischer Gesichtsfelddefecte*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 73.
- 1886.
1463. B. CARTER. *Two perimeters*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 506 u. Ophthalm. Rev. S. 118.
1464. W. S. DENNET. *Dyer's Perimeter*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 359.
1465. E. DYER. *The hemispherical wire perimeter*. Ophthalm. Rev. S. 273.
1466. K. KOLLER. *Ueber das Gesichtsfeld*. Wien. med. Wochenschr. No. 9.
1467. CH. LEEGARD. *Ueber die electro-diagnostische Gesichtsfelduntersuchung*. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 38. S. 525.
1468. J. L. MINOR. *Reference chart of the field of vision*. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 38. S. 287.
1469. TH. REID. *Perimeter*. Ophthalm. Rev.
- 1887.
1470. A. NIEDEN. *Gesichtsfeld-Schema zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrirende Perimeter*. 2. Aufl. Wiesbaden. Bergmann.
- 1888.
1471. J. B. EMERSON. *A new instrument for testing the field of vision*. Post Graduate. New-York. 1888 89. S. 46.

1472. G. DE GRANDMONT. *Périoptométrie et chromatopsie; périmètre et chromatoptomètre*. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 208.
1473. L. OZOULAY. *Campimètre de poche*. Progr. méd. No. 46. S. 426.
1474. PEDRAZZOLI. *Nuovo perimetro*. Ann. di Ottalm. XVII. S. 217.
1475. C. SCHWEIGGER. *Ein handliches Perimeter*. Arch. f. Augenheilkde. S. 469.  
1889.
1476. J. BJERRUM. *Ueber Untersuchung des Gesichtsfeldes*. Med. selsk. forhandl. S. 219.
1477. DEEREN. *Quelques critiques sur les périmètres*. Rec. d'Ophthalm. S. 474—479 u. 519—523.
1478. A. GROENOUW. *Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes?* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 29.
1479. SCHWEIGGER. *A handy perimeter*. Arch. Ophthalm. XVIII. S. 187. New-York.  
1890.
1480. J. BJERRUM. *Ueber eine Ergänzung der gewöhnlichen Gesichtsfelduntersuchung, sowie über das Gesichtsfeld bei Glaukom*. Nord. ophthalm. Tidsskr. II. S. 3.
1481. J. HIRSCHBERG. *Geschichtliche Bemerkung zur Gesichtsfeldmessung*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 350—351.
1482. O. KÖNIG. *Beobachtungen über Gesichtsfeld-Einengung nach dem Förster'schen Typus*. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 264—286.
1483. JOCQS. *Un périmètre modifié*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 228.
1484. LAGRANGE. *Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation, suivies de l'examen du sens chromatique et du champ visuel*. Paris, Steinheil. 1890.
1485. DE LAPERRONNE. *Un nouveau périmètre pratique*. Ann. d'Ocul. Bd. 103. S. 29—32.
1486. A. NIEDEN. *Gesichtsfeld-Schema*. 3. Aufl. Wiesbaden, Bergmann.
1487. PEDRAZZOLI. *Nouveau périmètre*. Verona.
1488. REYMOND. *Studio sulle alterazioni dei campi visivi nella cura dello strabismo*. XII. Congr. dell' Assoc. Oftalm. Ital. Pisa. 1890. — Ann. di Ottalm. XIX.  
1891.
1489. P. BRAUNSCHWEIG. *Eine neue Form des Perimeters*. Zeitschr. f. Instrumentenkde. S. 58—60.  
1893.
1490. A. ANTONELLI. *Scotometro*. Ann. di Ottalm. XXII. S. 19. — Ann. d'Oculist. T. 110 S. 31.
1491. BAGOT. *Nouveau périmètre de poche*. Ann. d'Oculist. Bd. 110. S. 100.
1492. T. E. GILES. *A new perimeter*. Arch. of Ophthalm. XXII. S. 28—30.
1493. C. J. A. LEROY. *Champ optique, champ visuel absolu et relatif de l'œil humain*. Compt. Rend. Bd. 116. S. 377—379.  
1894.
1494. D. AXENFELD. *Eine einfache Methode, Hemianopsie zu constatiren*. Neurol. Centralbl. XIII. S. 437—438.
1495. GROENOUW. *Beiträge zur Kenntniss der concentrischen Gesichtsfeldverengung*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (2.) S. 172—223.
1496. G. T. LADD. *Direct control of the retinal field*. The Psychol. Rev. I. S. 351—362.
1497. H. SALOMONSON. *Ueber die sog. pathologische Netzhautermüdung*. (Mit Benutzung eines Vortrages, gehalten in der Berliner ophthalm. Gesellschaft am 18. Januar.) Berl. Klin. Heft 70. — Sep. Berlin, Fischer. 21 S.
1498. R. SIMON. *Ueber die Entstehung der sog. Ermüdungseinschränkungen des Gesichtsfeldes*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (4.) S. 276—307.
1499. F. M. WILSON. *A portable perimeter with its apology for existence*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. XXX. ann. meeting. S. 226. Washington.

## § 11.

## Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.

## 1. Aeltere Litteratur.

Hier ist auch die Litteratur im § 18. s. zu beachten.

1500. FR. MAUROLYCUS. *De lumine et umbra*. Lib. III.  
1588.
1501. J. B. PORTA. *De refractione*. Lib. VIII.  
1604.
1502. J. KEPLER. *Paralipomena ad Vitellionem*. S. 200.  
1619.
1503. SCHEINER. *Oculus*. S. 32—49.  
1685.
1504. DE LA HIRE. *Journ. des Sçavans*. Ann. 1685.  
1698.
1505. DE LA HIRE. *Sur différents accidents de la vue*. Anc. Mém. Par. X.  
1709.
1506. DE LA HIRE. *Explications de quelques faits d'optique et de la manière dont se fait la vision*. Mém. de l'Acad. de Paris. S. 95. (Sehen im Wasser.)
1507. DE LA MOTTE. *Versuche und Abhandlungen der Gesellschaft in Dansig*. Bd. II. S. 290. (Theorie des Scheiner'schen Versuchs.)  
1788.
1508. JURIN. *Essay on distinct and indistinct vision* in SMITH System of Optics. Cambridge.  
1759.
1509. PORTERFIELD. *On the eye*. S. 389—428\*. (Theorie des Scheiner'schen Versuchs.)  
1792.
1510. G. ADAMS. *An essay on vision*. London. 2d. ed., übersetzt von F. Kries. Gotha. 1794. (Ausführlich über Brillen.)  
1800.
1511. J. BISCHOFF. *Praktische Abhandlung der Dioptrik*. Stuttgart. 2. Aufl. (Ueber Brillen.)  
1801.
1512. TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye*. Philos. Transact. P. I. S. 34. (Optometer.)  
1810.
1513. GILBERT in seinen Annalen d. Physik. XXXIV. S. 34 u. XXXVI. S. 375. (Sehen im Wasser.)
1514. WOLLASTON. *Improved periscopic spectacles*. Phil. Mag. XVII. — Nicholson's Journ. VII. S. 143, 241.
1515. JONES. *On Wollaston's spectacles*. Nicholson's Journ. VII. S. 192 u. VIII. S. 38.  
1821.
1516. G. TAUBER. *Anweisung für auswärtige Personen, wie dieselben aus dem optisch-oculistischen Institute zu Leipzig Augengläser bekommen können*. Leipzig. 3. Aufl.  
1824.
1517. MUNCKE. *Ueber Sehen unter Wasser*. Pogg. Ann. II. S. 257.  
1825.
1518. PURKINJE. *Zur Physiologie der Sinne*. II. S. 128\*.  
1828.
1519. MUNCKE. *Art. Gesicht*. Gehler's phys. Wörterbuch, neu bearb. Leipzig. S. 1383 bis 1386\* und S. 1403—1410.  
1830.
1520. HOLKE. *Disquisitio de acie oculi dextri et sinistri in mille ducentis hominibus*. Lipsiae.

1837.  
1521. J. MILE. Pogg. Ann. XLII. S. 51\*.  
1840.  
1522. HENLE. J. Müller's Lehrb. d. Physiol. Bd. II. S. 339—341\*.  
1845.  
1523. O. Youngs Optometer. Phil. Mag. XXVI. S. 436.  
1848.  
1524. F. C. DONDEERS. Een woord over de aanwendingswijze der proef van Sanson. Ned. Lancet. S. 211. 1848/1849.  
1850.  
1525. J. CZERMAK. Verh. d. Würzburger phys. Ges. Bd. I. S. 184.  
1851.  
1526. PEYTAL. Nouvel instrument à l'usage de la vue myope. Institut. No. 841. S. 53. No. 857. S. 180.  
1527. H. MAYER. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkd. XXXII. S. 92\*.  
1528. v. HASNER. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkd. XXXII. S. 166. (Optometer.)  
1852.  
1529. TH. RUETE. Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen. S. 28\*.

## 2. GröÙe und Form der Zerstreuungskreise.

Hier ist auch ein Theil der Litteratur von § 13. s. zu beachten.

1854.  
1530. J. CZERMAK. Ueber die Wirkung punktförmiger Diaphragmen auf das Sehen. Wien. Ber. XII. S. 333.  
1531. — Eine Modification des Scheiner'schen Versuches. Wien. Ber. XII. S. 366.  
1532. H. VON WYNGAARDEN. Ueber die Anwendung der von Donders entdeckten stenopäischen Brillen zur Verbesserung des Sehvermögens bei Trübungen der Hornhaut. Arch. f. Ophthalm. (I.) 1. S. 251.  
1855.  
1533. J. CZERMAK. Ueber die Wirkung punktförmiger Diaphragmen auf das Sehen. Wien. Ber. XV. S. 428.  
1534. — Eine Modification eines Scheiner'schen Versuches. Wien. Ber. XV. S. 457.  
1872.  
1535. WOINOW. Zur Lehre über den Einfluß der optischen Gläser auf die Sehschärfe. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 349.  
1874.  
1536. A. SCHMITHAUSEN. Ueber das Sehen der Myopen mittelst Zerstreuungskreise. Greifswald.  
1876.  
1537. BADAL. Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion. Gaz. des Hôp. No. 57.  
1538. — Contribution à l'étude de l'accommodation de l'oeil aux distances. Mesure des cercles de diffusion. Gaz. méd. de Paris. No. 20.  
1877.  
1539. BADAL. Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion. Bull. mens. de la clin. du Dr. Badal. Paris. Delahaye. S. 28—31.  
1878.  
1540. FANO. Rôle de la rétine dans la vision des objets rapprochés ou éloignés. Compt. Rend. Bd. 86. S. 689.  
1880.  
1541. BADAL. Études d'optique-physiologique; influence du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion sur l'acuité visuelle. Ann. d'Ocul. Bd. 83. S. 21—40. S. 103—126. S. 205—214. — Mém. de la Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux. (2.) IV. 1.  
1882.  
1542. PROMPT. De l'expérience de Scheiner. Ass. franç. pour l'avanc. des sc. Rec. d'Ophthalm. S. 630.  
1543. V. SCHULEK. Die optischen Verhältnisse bei Doppelpupillen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 128.

- 1888.
1544. C. J. A. LEROY. *Quelques considérations sur les variations du diamètre de l'image sensible d'un point lumineux.* Arch. d'Ophthalm. S. 245.
- 1884.
1545. J. W. BARRET. *A new method of demonstrating Scheiner's experiment.* Journ. of anat. a. physiol. XIX. S. 97.
1546. BERTRAND. *Expériences sur la myopie et la pupille artificielle.* Ann. d'Ocul. Bd. 91. S. 32.
- 1885.
1547. D. KOKEMÜLLER. *Ueber eine interessante optische Erscheinung.* Wochenschr. f. Astron. Meteorol. u. Geogr. 28. Jahrg. S. 305. (Lecat'scher Versuch.)
1548. WEIDLICH. *Die quantitativen Beziehungen zwischen der Pupillenverengung und der scheinbaren Abnahme der Kurzsichtigkeit.* Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 175.
- 1888.
1549. D. AXENFELD. *Percezione subbietiva dei movimenti dell' iride.* Bull. d. r. Accad. med. di Roma. 1887/88. IX. S. 122.
- 1889.
1550. R. HILBERT. *Eine Modification des Scheiner'schen Versuches.* Betz' Memorabilien. Heft 5.
1551. LAQUEUR. *Ueber eine eigenthümliche Art von Gesichtswahrnehmungen.* Centralbl. f. med. Wiss. No. 42.
- 1890.
1552. L. LAQUEUR. *Ueber pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. Abth. 1. S. 62—82.
1553. G. WALLENBERG. *Der „Le Cat'sche Versuch“ und die Erzeugung farbiger Schatten auf der Netzhaut.* Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 48. S. 537—543.
- 1891.
1554. L. CHABRY. *Des images diffuses résultantes de la vision non accommodée. Diplopie monoculaire.* Compt. Rend. de la Soc. Biol. (9.) III. 2. S. 36—37.
1555. R. HILBERT. *Pupillenbeobachtungen mittels der subjectiven Methode.* Betz' Memorabilien. H. 5.
- 1892.
1556. A. SZILI. *Optische Verwerthung von Brillenglasreflexen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. (4.) S. 12—13.
- 1893.
1557. A. ROTH. *Ueber eine neue stenopäische Brille (Siebbrille).* Vorläuf. Mitth. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 120—112.
1558. M. SALZMANN. *Das Sehen in Zerstreuungskreisen. I. Th.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 2. S. 83—129.
- 1894.
1559. J. HIRSCHBERG. *Ein Fall von einäugigem Doppelsehen durch Doppelpupille.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. S. 355—357.
1560. R. KATZ. *Des cercles de diffusion et du trou sténopéique.* Wiestn. ophthalm. Mai-Juni 1894.
1561. O. LANDMANN. *Monocular polyopia. Two cases.* Ann. of Ophthalm. and Otol. Vol. III. S. 18.
1562. M. SALZMANN. *Das Sehen in Zerstreuungskreisen. II. Th.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 102—159.
1563. H. TRIEPEL. *Ueber Schleistung bei Myopie.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 50—101.

### 3. Allgemeines über Refraction und Accommodation.

- 1854.
1564. A. SMEE. *The eye in health and disease.* London.
- 1860.
1565. F. C. DONDERS. *Ametropie en hare gevolgen.* Verslag Ned. Gasth. v. Oogl. No. 1. S. 68.



1861.  
 1566. F. C. DONDEBS. *Het lichtbrekend stelsel van het menschelijk oog in gezonden en siekelijken toestand.* Verslag ned. Gasth. No. 2. S. 25.  
 1863.  
 1567. F. C. DONDEBS. *Kort begrip der refractie-anomalien en hare gevolgen.* Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 4 S. 53.  
 1864.  
 1568. F. C. DONDEBS. *Het zien bij verschil in refractie der beide oogen en de hulpmiddelen daarbij aan te wenden.* Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 5. S. 167. 1866. — Ned. Arch. v. Gen. en Natark. II. S. 112.  
 1569. — *Die Refraktionsanomalien und ihre Folgen.* Arch. f. d. holl. Beitr. zur Nat.- u. Heilkde. III. S. 827.  
 1865.  
 1570. GIRAUD-TEULON. *Applications de la règle à calcul de E. Javal aux opérations à exécuter sur la réfraction.* Ann. d'Ocul. LIV. S. 181.  
 1866.  
 1571. F. C. DONDEBS. *Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges.* Deutsch von O. Becker. Wien.  
 1572. A. NAGEL. *Die Refraktions- und Accommodationsanomalien des Auges.* Tübingen.  
 1573. B. SCHIRMER. *Die Lehre von den Refraktions- und Accommodationsstörungen des Auges.* Berlin.  
 1574. W. ZEHENDER. *Die Accommodations- und Refraktionsanomalien.* Klin. Mon.-Bl. IV. S. 279.  
 1867.  
 1575. H. KAISER. *Die nächsten Ursachen der Anisometropie in optischer Hinsicht.* Arch. f. Ophthalm. XIII. 2. S. 361.  
 1868.  
 1576. W. DOBROWOLSKY. *Myopie, ihre Complication mit Accommodationskrampf.* Klin. Monatsbl. f. Augenhk. Ausserordentl. Beilageh. S. 1—93.  
 1577. J. Z. LAURENCE. *Die optischen Fehler des Auges mit ihren Folgen Asthenopie und Strabismus.* Aus d. Engl. übersetzt u. mit Zusätzen versehen v. A. Karst. Kreuznach.  
 1578. H. SCHEFFLER. *Theorie der Augenfehler und der Brille.* Wien.  
 1869.  
 1579. GIRAUD-TEULON. *De l'influence des lentilles.* Ann. d'Ocul. LXII. S. 93.  
 1580. E. GREYER. *Kurse praktische Bemerkungen über Accommodations- und Refraktionsanomalien.* Würzburg.  
 1581. LAQUEUR. *Sur les changements brusques de la réfraction de l'œil.* Ann. d'Ocul. LXI. S. 205.  
 1582. ED. MEYER. *Leçons sur la réfraction et l'accommodation.* Paris.  
 1583. A. SCHUMANN. *Experimentaluntersuchung über die Baufehler und Accommodationsstörungen des menschlichen Auges.* Leipzig.  
 1872.  
 1584. F. C. DONDEBS. *Praktische opmerkingen over den invloed van hulplinsen op de gezichtsscherpte.* Onderzoek. ged. in het Phys. Labor. Utrecht.  
 1585. — *Praktische Bemerkungen über den Einfluss von Hülfsinsen auf die Sehschärfe.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 245.  
 1586. H. SCHMIDT. *Kurse Anleitung zur Untersuchung der Refraction, Accommodation und Sehschärfe.* Marburg.  
 1873.  
 1587. C. S. FENNER. *A treatise on the diseases of refraction and accommodation.* Louisville.  
 1874.  
 1588. H. SNELLEN u. E. LANDOLT. *Ophthalmometrologie. Die Functionsprüfungen des Auges.* Aus v. Graefe u. Sämisch's Handb. d. ges. Augenheilkde. III. Bd. 1. S. 1—249.  
 1875.  
 1589. J. STILLING. *Ueber typischen Accommodationskrampf.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 5—30.  
 1876.  
 1590. E. EMMERT. *Ueber Refraktions- und Accommodationsverhältnisse des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen.* Bern. Haller.

1877.

1591. E. ADAMUK. *Anomalien der Refraction und Accommodation*. Ophthalm. Beob. d. Kl. d. Univ. Kasan. II. 1. 112 S.  
 1592. R. B. CARTER. *On defects of vision which are remediable by optical appliances*. Med. Times and Gaz. II. No. 1410—1421.  
 1593. — *On Defects of Vision*. London. 145 S.  
 1594. J. GAED. *De la réfraction oculaire et de l'anisométrie*. Paris, Delahaye.  
 1595. CH. HIGGENS. *Lectures on the Anomalies of Refraction and Accommodation etc.* Med. Times and Gaz. 16. u. 23. Decbr. 1876, 27. Jan., 10. Febr. 1877.

1878.

1596. BADAL. *Conférences d'optométrie. (Réfraction, Accommodation, Acuité visuelle etc.)* Gaz. des Hôp. No. 15, 19, 53, 73, 89, 105.  
 1597. — *Études d'optique physiologique*. Ann. d'Ocul. T. 80. S. 42—56.  
 1598. L. WEISS. *Ueber die Refraktionsveränderung, welche bei Accommodationslähmung beobachtet wird*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIV. 2. S. 190—212.

1879.

1599. E. JAVAL. *Les maladies de l'œil et l'emploi des lunettes*. Rev. Scient. (2.) IX. No. 13. S. 306—310.  
 1600. E. LANDOLT. *A Manual of Examination of the Eyes*. Englisch v. Burnett. London. Baillière. Philadelphia. Brinton.  
 1601. L. MAUTHNER. *Die Funktionsprüfungen des Auges*. (Heft 3, 4 u. 5 d. Vortr. a. d. Gesamtgeb. d. Augenheilkde.) Wiesbaden. Bergmann.  
 1602. E. NETOLICZKA. *Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit*. I. 28. Jahresbericht d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.  
 1603. G. SOUS. *Traité d'optique considérée dans ses rapports avec l'examen de l'œil*. Paris. Doin. 362 S.

1880.

1604. BADAL. *Étude d'optique physiologique*. Arch. d'Ophthalm. I. S. 58. — Ann. d'Ocul. Bd. 84. S. 217.  
 1605. EMMERT. *Auge und Schädel; Untersuchungen über Refraction, Accommodation der Augen und Bewegungs-Mechanismus des Auges*. Berlin. Hirschwald.  
 1606. A. NAGEL. *Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges*. Graefe's u. Saemisch's Handb. d. ges. Augenheilkde. VI. Kap. X. S. 258—503.  
 1607. E. NETOLICZKA. *Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit*. II. 29. Jahresber. d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.  
 1608. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Emmetropie*. Eulenburg's Real-Encycl. f. d. ges. Heilkde. IV. S. 507.  
 1609. SOZELKOW. *Zur Frage über die Veränderungen der Hornhautkrümmungen bei zunehmendem Alter*. Centralbl. f. d. med. Wiss. XVIII. No. 44. S. 819.  
 1610. H. SNELLEN u. E. LANDOLT. *Ophthalmométrie. Traité complet d'ophtalmologie par L. de Wecker et E. Landolt*. I. 2. Theil. Paris. Delahaye. 1892. 292 S.

1881.

1611. A. CHARPENTIER. *Examen de la vision au point de la médecine générale*. Bibl. biol. internat. IV. 137 S. Paris. Doin.  
 1612. GIRAUD-TEULON. *La vision et ses anomalies*. Paris. Baillière. 936 S.  
 1613. A. v. REUSS. *Untersuchungen über den Einfluss des Lebensalters auf die Krümmung der Hornhaut nebst einigen Bemerkungen über die Dimensionen der Lidspalte*. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 27.  
 1614. G. SOUS. *Traité d'optique considérée dans ses rapports avec l'examen de l'œil*. 2. édit. Paris. Doin. 512 S.

1882.

1615. H. CULBERTSON. *Refraction of the eye, as distinguished from accommodation and estimated as an equivalent, from the index of refraction*. Cinc. Lancet u. Clinic. VIII S. 451.  
 1616. E. H. FRAVEL. *Anomalies of refraction*. Gaillard's Med. Journ. New-York. XXXII. S. 442.  
 1617. A. LEROY. *Clinique ophtalmologique de la faculté de médecine de Lyon. Optique physiologique, vision centrale, irradiation et acuité visuelle*. Arch. d'ophtalm. S. 22, 345, 441.  
 1618. J. MASSELON. *Examen fonctionnel de l'œil*. Paris. Doin.

1619. F. G. PEREZ. *Anomalías de la refracción visual*. Gac. de sanid. mil. Madrid. VIII. S. 349, 410.
1620. ROBERTS. *Examen de la vision practicado en las escuelas de la Ciudad de Buenos-Aires*. Buenos-Aires. 1888.
1621. CHAUVEL. *Précis théorique et pratique de l'examen de l'œil et de la vision*. Paris. 481 S.
1622. E. CHEUVREUL. *Précis historique et pratique de l'examen de l'œil et de la vision*. Paris. Masson. 150 S.
1623. L. KÖNIGSTEIN. *Die Anomalien der Refraction und Accommodation*. Wien. 69 S.
1624. LEDUC. *Contribution à l'étude de l'anisometropie*. Paris. 42 S.
1625. J. NEUSCHÜLER. *Occhio ed occhiali*. Turin. 104 S. 1884.
1626. J. ALBERTOTTI. *Preliminari di studi sperimentali diretti a stabilire sopra nuovo principio l'esame funzionale dell'occhio*. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino. 3. s. XXXII. S. 162.
1627. CULBERTSON. *A comparison of total and manifest hypermetropia as determined by the presoptometer with and without the use of mydriatics*. New York. med. Journ. 22 march.
1628. FUCHS. *Beiträge zu den Anomalien der Refraction und Accommodation*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 14.
1629. R. MADDOX. *On distant vision*. Proc. of the Royal Soc. of London. 21. Januar. XII. S. 483. 1886.
1630. C. M. CULVER. *The refraction and accommodation of the eye and their anomalies by Landolt*. Edinburgh. 597 S.
1631. E. H. FRAVEL. *Anomalies of refraction*. Cinc. Lancet u. Clinic. XVII. S. 179.
1632. G. T. HELM. *Short sight, long sight and astigmatism*. London, Churchill. 1887.
1633. A. IMBERT. *Les anomalies de la vision*. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier. IX. S. 78, 92, 118, 126. 1888.
1634. A. IMBERT. *Les anomalies de la vision. Avec une introduction par E. Javal*. Paris. Baillière et fils. 1889.
1635. P. SMITH. *On the size of the cornea in relation to age, sex, refraction and primary glaucoma*. Opt. Rev. S. 380. — Trans. of the Ophthalm. Soc. X. S. 68.
1636. F. VALK. *Lectures on the errors of refraction and their correction with glasses*. New-York. 1890.
1637. LAGRANGE. *Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation, suivies de l'examen du sens chromatique et du champ visuel*. Paris. Steinheil.
1638. J. MASSELON. *Examen fonctionnel de l'œil*. Paris. Doin. 2. édit.
1639. A. RANDALL. *Some disputed points in the correction of refraction errors*. Journ. of the Americ. med. Assoc. — Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. No. 1. S. 38. glaucoma. Trans. of the Ophthalm. Soc. X. 1889/90. S. 68. 1891.
1640. K. HOOR. *Gemeinschaftliche Darstellung der Refraktions-Anomalien*. Gekr. Preisschr. Wien. Hölder. 86 S.
1641. J. SCHIÖTZ. *Øjets refractionssituarnde, en vejledning for medicinske studerende. (De Refraktionszustände des Auges, ein Leitfaden für Studierende.)* Christiania. 1892.
1642. HERRNHIEBER. *Die Refraktionsentwicklung des menschlichen Auges*. Prag. med. Wochenschr. No. 19 u. 20. — Sep. Berlin. Fischer. 36 S. — Zeitschr. f. Heilkde. XIII. S. 342. 1893.
1643. H. BERTIN-SANS. *Les variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin*. Arch. d'Ophtalm. XIII. S. 240—244.
1644. H. SCHIESS. *Kurzer Leitfaden der Refraktions- und Accommodationsanomalien*. Wiesbaden. Bergmann. 69 S. mit 30 Abbild.

1894.

1645. CL. DU BOIS-REYMOND. *Über die latente Hypermetropie.* Zeitschr. f. Psychol. VIII. S. 34—43.  
 1646. CHAUVEL. *Études ophtalmoscopiques. Hypermétropie.* Rec. d'Ophthalm. S. 573.  
 1647. A. GRAEFE. *Accommodation und Convergens.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 247—252.  
 1648. L. KÖNIGSTEIN. *Die Anomalien der Refraction und Accommodation.* 2. Aufl. Wien. W. Braumüller. 102 S.  
 1649. TH. YOUNG. *Oeuvres ophtalmologiques.* Französisch von Tscherning. Kopenhagen, Höst u. Søn. 248 S.

## 4. Accommodationsbreite.

1854.

1650. J. CZERMAK. *Von den Accommodationslinien.* Wien. Ber. Bd. XII. S. 322.  
 1651. — *Ueber den Zusammenhang zwischen der Convergens der Augenaxen und dem Accommodationszustand der Augen.* Wien. Ber. Bd. XII. S. 339.

1855.

1652. STELLWAG v. CARION. *Die Accommodationsfehler des Auges.* Wien. Sitzgs.-Ber. XVI. S. 187.  
 1653. J. CZERMAK. *Accommodationslinien.* Wien. Ber. Bd. XV. S. 425, 457.  
 1654. — *Ueber den Zusammenhang zwischen der Convergens der Augenaxen und der Accommodation.* Wien. Ber. Bd. XV. S. 498.

1856.

1655. A. v. GRAEFE. *Ueber Myopia in distans nebst Betrachtungen über das Sehen jenseits der Grenzen unserer Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. II. 1. S. 158—186.

1857.

1656. J. J. OPPEL. *Ueber das Sehen durch kleine Oeffnungen und das Gerham'sche Diaskop.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1856—1857 S. 37—42.

1858.

1657. F. C. DONDERS. *Winke, betr. den Gebrauch und die Wahl der Brillen.* Arch. f. Ophthalm. IV. 1. S. 286—300.

1658. TH. H. MAC-GILLAVRY. *De oculi accommodationis quantitate disquisitiones.* Utrecht. 1859.

1659. M. MAC-GILLAVRY. *Onderzoekingen over de hoegrootheid der accommodatie.* Diss. Utrecht. 1858. — Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. (3.) VI. S. 612—613.

1860.

1660. F. C. DONDERS. *Beiträge zur Kenntniss der Refractions- und Accommodationsanomalien.* Arch. f. Ophthalm. VI. 1. S. 62—105. VI. 2. S. 210—283. VII. 1. S. 155—204. — Verslagen en Mededeelingen der K. Acad. Amsterdam. 1861. S. 159 bis 201. — Jaarlijksch Verslag betrekkelijk het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. I. S. 63—205. II. S. 25—68. IV. S. 1—118.

1661. C. LANDSBERG. *Beschreibung eines neuen Optometers und Ophthalmodiastometers.* Pogg. Ann. CX. S. 435—452. — Polytechn. Centralbl. S. 405—406.

1662. A. BUROW. *Ueber den Einfluss peripherischer Netzhautparthien auf die Regelung der accommodativen Bewegungen des Auges.* Arch. f. Ophthalm. VI. (1.) S. 106—110. 1861.

1663. CH. AEBY. *Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. (3.) XI. S. 300—304.

1664. GIRAUD-TEULON. *Des mouvements de décentration latérale de l'appareil cristallin.* Compt. Rend. LII. S. 383—385. — Institut. S. 82. — Cosmos. XVIII. S. 284—286.

1665. H. DOR. *Des différences individuelles de la réfraction de l'œil.* Journ. de la physiol. XI. XII. — Arch. d. sc. phys. (2.) X. S. 82—85.

1666. H. DE BRIEDER. *De stoornissen der accommodatie van het oog.* Diss. Utrecht. — Jaarlijksch Verslag betr. het Nederl. Gasthuis. II. S. 69—142.

1667. V. JÄGER jun. *Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge.* Wien. 1861.

1668. STELLWAG v. CARION. *Zur Litteratur der Refractions- und Accommodationsanomalien.* Zeitschr. d. K. K. Ges. d. Aerzte. 1861.

- 1863.
1669. F. C. DONDEES. *De formule der accommodatiebreedte, getoetst aan de inwendige veranderingen van het oog.* Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 4. S. 105.
- 1867.
1670. H. KAISER. *Die nächsten Ursachen der Anisometropie in optischer Hinsicht.* Arch. f. Ophthalm. XIII. 2. S. 361.
1671. E. G. LORING. *Sur l'accommodation relative.* Compt. Rend. 4 et 5. Sess. annuelle. New York. Juni.
- 1868.
1672. H. DOB. *Ueber einen aussergewöhnlichen Fall von Lähmung der Accommodation.* Bern. Mitth. S. 24—25.
- 1869.
1673. R. SCHIRMER. *Ueber das Accommodationsverhältniß bei verschiedenen Blickhöhen.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. VII. S. 405.
- 1870.
1674. E. ADAMÜCK und M. WOJNOW. *Zur Frage über die Accommodation der Presbyopen.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 144.
1675. SCHNELLER. *Beiträge zur Lehre von der Accommodation und Refraction.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 176.
- 1875.
1676. J. v. HASNER. *Ueber die Accommodationseinheit.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 1—4 u. 88—90. — Aerstl. Corresp.-Bl. f. Böhmen. II. S. 419.
1677. — *Die Accommodationshyperbel.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 289—293.
1678. — *Ueber die Grenzen der Accommodation des Auges.* Prag. Calve. 32 S.
- 1876.
1679. W. DOERINKEL. *Ueber die Abnahme der Accommodationsbreite in verschiedenen Stadien der Presbyopie.* Marburg.
- 1877.
1680. L. HAPPE. *Ueber v. Hasner's Accommodationseinheit und den Ort des Punktes Null für maximale ( $\infty$ ) Accommodation.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 77—99 u. S. 101—105.
1681. — *Ueber das Maass der Accommodation.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 198—200.
1682. v. HASNER. *Ueber die Grenzen der Accommodation.* Prag. med. Wochenschr. 1877. No. 8.
1683. — *Ueber den Accommodationsaufwand.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 146 bis 148.
1684. — *Schlusswort zur Accommodationseinheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 200 bis 201.
1685. TH. RUMPF. *Zur Lehre von der binocularen Accommodation.* Inaug.-Diss. Heidelberg. Beil.-Hft. z. d. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV.
- 1879.
1686. SZOKALSKI. *Das Verschwinden der Presbyopie im hohen Alter.* Medycyna. 1879.
- 1880.
1687. H. BIESINGER. *Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Accommodation und Convergenz der Blicklinien.* Mitth. a. d. ophthalm. Klinik z. Tübingen. 1880. Heft 1. — Inaug.-Diss. Tübingen. 1879.
1688. HÄLLSTÉN. *Die dioptrische Fähigkeit in centrirtten Systemen mit besonderer Rücksicht auf die dioptrische Fähigkeit und die Accommodationsbreite des Auges.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1880. Heft 1 u. 2.
- 1883.
1689. LEDUC. *Contribution à l'étude de l'anisometropie.* Paris. 1883. 42 S.
- 1884.
1690. O. BESSELIN. *Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateral wirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5—18 Jahren.* Diss. Heidelberg. — Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 132.
1691. C. REYMOND. *Modificazione all' esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l'accommodazione e la convergenza oculare.* Ann. di Ottalm. XIII. 2. S. 136. — Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. XII. S. 69.

1885.

1692. IMBERT. *Sur le choix des verres de lunette et sur la variation du pouvoir accommodatif avec l'âge.* Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier. VII. S. 197.  
 1693. C. REYMOND. *Sui rapporti dell'accommodamento colla convergenza.* Atti d. r. Accad. di med. di Torino. VI.

1886.

1694. GIOVANNI. *Accommodation und Convergens.* Ann. di Ottalm.  
 1695. E. MADDOX. *Investigation in the relation between convergence and accommodation.* Journ. of anat. XX. u. XXI., u. Ophthalm. Rev. S. 341.  
 1696. CH. A. OLIVER. *A new series of metric test-letters and words for determining the amount and range of accommodation.* Transact. of the americ. ophthalm. soc. 22 Meeting. S. 217.  
 1697. — *Metric test types for determining the amount of accommodation.* Ophthalm. Rev. S. 272.  
 1698. G. SECONDI. *Osservazioni sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenza.* Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. XXXIV. S. 714.

1887.

1699. A. E. FICK. *Ueber binoculare Accommodation.* Corresp.-Bl. f. schweiz. Aerzte. XVII.  
 1700. G. SECONDI. *Osservazioni sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenza.* Ann. di Ottalm. XV. S. 485.

1888.

1701. A. E. FICK. *Ueber ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen.* Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 123.  
 1702. — *Ueber die Accommodation der Anisometropen.* Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. z. Heidelberg. S. 451.  
 1703. J. RAMIS. *Consideraciones de dióptrica fisiológica sobre el punto próximo, el punto remoto y la amplitud de la acomodación.* Rev. méd. de México. I. S. 44.  
 1704. SCHNELLE. *Ueber Veränderungen der Formen des Auges bei Convergenz der Sehachsen und gesenkter Blickenebene.* Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 528.  
 1705. G. SECONDI. *Sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenza.* R. Accad. Med. di Roma. XIII.

1889.

1706. R. und A. ABBENS. *Neue Versuche über anisomorphe Accommodation.* Bevorwortet von W. v. Zehender. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXVII. S. 291.  
 1707. C. HESS. *Versuche über die angebliche ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 157—171.  
 1708. PERELES, (nach Untersuchungen von F. Halsch und H. Pereles). *Ueber die relative Accommodationsbreite.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 84—115.  
 1709. A. RANDALL. *Model to demonstrate the relations of accommodation and convergence.* Ophthalm. Rev. S. 134—137.

1891.

1710. BERRY. *On some points with reference to the connection between accommodation and convergence.* Brit. med. Journ. No. 1571. S. 287.  
 1711. R. GREIFF. *Zur Vergleichung der Accommodationsleistung beider Augen.* Arch. f. Augenheilkde. XXIII. S. 371—386.  
 1712. G. SECONDI. *Ueber die synergische Verbindung von Accommodation und Convergens.* Ann. di Ottalm. Fac. 1 u. 2.

1892.

1713. G. VAN ELJSELSSTEIJN. *Over de accommodatie en convergentie bij zijdelingschen Blick.* Diss. Utrecht 1891. — Versl. Ned. Gasth. voor Oogl. 1892.  
 1714. A. E. FICK. *Noch einmal die ungleiche Accommodation.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 204—220.  
 1715. C. HESS und F. NEUMANN. *Messende Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation beim Gesunden.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 184—190.  
 1716. C. HESS. *Kritik der neueren Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 169—183.  
 1717. A. PERCIVAL. *The relation of convergence to accommodation and its practical bearing.* Ophthalm. Rev. No. 133. S. 313.

1718. H. SNELLEN. *Ueber Beschränkung der Convergents und der Accommodation bei seitlichem Blick.* Ber. üb. d. XXI. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 113.  
1898.
1719. K. FISCHER. *Ueber die Beziehungen zwischen der Accommodation und der Convergents der Blicklinien.* Diss. Halle. 1893. 99 S.
1720. OLIVER. *A new series of test words for the determination of the power of accommodation.* Arch. of Ophthalm. XXII. S. 347—348.
1721. SAVAGE. *Relationship between the centres of accommodation and convergence.* Ophthalm. Record. Mai.  
1894.
1722. J. KAUFMANN. *Die absolute und relative Accommodationsbreite in den verschiedensten Lebensaltern.* Diss. Göttingen. 29 S.

### 5. Optometrie, Optometer und Phakometer.

Hier ist auch die Litteratur von § 18. zu beachten.

- 1862.
1723. DE HAAS. *Geschiedkundig onderzoek omtrent de Hypermetropia en hare gevolgen.* Diss. Utrecht. — Jaarl. Versl. betr. het Nederl. Gasth. voor Oog. III. S. 157—208.  
1868.
1724. A. BUROW. *Vorläufige Notiz über die Construction eines neuen Optometers.* Arch. f. Ophthalm. IX. (2) S., 228—231.
1725. — *Ein neues Optometer.* Berlin. 1863.
1726. A. v. GRAEFE. *Ein Optometer.* Dtsch. Klin. 1863. S. 10.  
1864.
1727. A. BUROW. *Ueber die Reihenfolge der Brillenbrennweiten.* Berlin.
1728. F. C. DONDEES. *On the anomalies of accommodation and refraction of the eye.* London.  
1866.
1729. J. W. VERSCHOOR. *Optometers en Optometrie.* Zesde Jaarl. Verslag van het Nederl. Gasthuis. voor Oogl. S. 97—160.  
1867.
1730. A. BUROW. *Ein vereinfachtes Verfahren bei Bestimmung der Brillen.* Berl. Klin. Wochenschr. VII. 10. März.  
1869.
1731. J. C. DOUGLAS. *On shadow optometers.* Phil. Mag. (4.) XXXVII. S. 340—343.
1732. M. PERRIN et MASCART. *Mémoire sur un nouvel optomètre destiné à faire reconnaître et à mesurer tous les vices de la refraction de l'oeil.* Ann. d'Ocul. Bd. 61. S. 5—16.  
1870.
1733. J. C. DOUGLAS. *Reply to Mr. Templeton's remarks suggested by Mr. Douglas' account of a new Optometer.* Phil. Mag. Vol. 40. S. 340—344.
1734. R. TEMPLETON. *Remarks suggested by Mr. Douglas' account of a new optometer.* Phil. Mag. Vol. 39. S. 9.
1735. W. M. THOMSON. *An additional method to determine the degree of Anisotropia.* Amer. Journ. of the med. sc. Januar.  
1878.
1736. LAIDLAW PURVES. *Eine Methode zur Bestimmung der Refractionsanomalien.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 89—100.  
1874.
1737. H. SNELLEN u. E. LANDOLT. *Die Funktionsprüfungen des Auges.* Gräfe-Sämisch Handb. d. ges. Augenheilkde. III. Cap. I. Leipzig.  
1875.
1738. CH. JEAFFRESON. *On Laidlaw Purves' Optometer.* Brit. med. Journ. 30. Jan.
1739. W. L. PURVES. *On determination of the refraction of the eye.* Brit. med. Journ. 26. Januar.
1740. — *On a new optometer.* Brit. med. Journ. 27. Februar.
1741. RISLEY. *New optometer for measuring the anomalies of refraction and the field of vision.* Amer. Journ. of the med. sc. Bd. 140. S. 449.
1742. L. v. WECKER. *Optometer und Optometerspiegel.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilk. XIII. S. 458—465.

## 1876.

1743. BADAL. *Nouvel optomètre donnant, à la fois et dans une seule opération, la mesure de la réfraction oculaire et celle de l'acuité visuelle.* Ann. d'Ocul. LXXV. S. 5—13. — Gaz. hebdom. S. 137—138. — Gaz. méd. de Paris. S. 547—549.
1744. GORDICKE. *Neues Optometer.* Dtsch. milit.-ärztl. Zeitschr. No. 8 u. 9.
1745. H. SNELLEN. *Das Phakometer zur Bestimmung von Focus und Centrum der Brillengläser.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 363—366. — Maandbl. voor Natuurw. VII. S. 23—27. — XVII jaarl. Vers. van het Nederl. Gasthuis etc. S. 204—211.
1746. C. W. ZENGER. *Neues Optometer mit doppelbrechender Linse von Kalkspath, welches doppelte Leseproben giebt und größere Präcision in Bestimmung der Sehdistanz gewährt.* Catal. of the Spec. Loan Coll. of Scient. Appar. London. 1876. I. S. 131. No. 894.

## 1877.

1747. BADAL. *Leçons pratiques d'optométrie.* Bull. mens. de la clin. du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 65—71, 76—79, 83—95.
1748. — *Optomètre métrique international.* Bull. mens. de la clinique du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 17—23.
1749. M. BURCHARDT. *Ueber objective Bestimmung der Sehweite in Centimetern und in Dioptrien.* Dtsch. med. Wochenschr. 1877. No. 13.
1750. — *Ueber subjective Bestimmung der Sehweite durch Linsen, welche sich im Brennpunktsabstände von dem Auge befinden.* Dtsch. med. Wochenschr. III. No. 21.
1751. — *Ueber Bestimmung der Sehweite und der Sehschärfe durch Linsen, die sich im Brennpunktsabstände vor dem Auge befinden.* Dtsch. med. Wochenschr. 1877. No. 45.
1752. F. C. DONDERS. *Ein pankratisches Fernrohr.* (Nebst einer Nachschrift.) Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 269—281. — XVIII. j. Versl. Nederl. gasth. etc. S. 51—62, 87—90. — Utrecht'sche Onderzoek. 3 recks. V. S. 1—12, 67—72. — K. Acad. v. Wetensch. te Amsterdam. Proc.-verb. 1877/78. No. 2. S. 3—7. — Centr.-Bl. f. pract. Augenheilkde. Beilageh. S. 24. — D. Zeitschr. f. pract. Med. S. 428. — Beil. z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenhkde. XV. S. 143—145.
1753. E. DUBOIS. *Note sur l'emploi et la choix des lunettes destinées à corriger les mauvaises vues.* Journ. de phys. VI. S. 28—29.
1754. J. HIRSCHBERG. *Ueber Refractionsmessung und über ein neues Optometer.* Berl klin. Wochenschr. XIV. S. 151. — Hirschberg's Beitr. z. prakt. Augenheilkde. II. Heft S. 4—24.

## 1878.

1755. H. ARMAIGNAC. *Traité élément. d'Ophthalmoscopie, d'Optometrie et de Refraction oculaire.* Paris, Delahaye. 463 S.
1756. BADAL. *Phacomètre.* Ann. d'Ocul. Bd. 79. S. 20—32.
1757. LOISEAU. *Optomètre métrique et phacomètre.* Arch. méd. belg. Mai. — Bull. de l'acad. Roy. de Méd. Belg. (3.) XII. 8. S. 736—752. — Ann. d'Ocul. Bd. 80. S. 5.
1758. J. A. C. OUDEMANS. *Théorie de la lunette pancratique de M. Donders.* Arch. Néerl. XIII. S. 110—140.
1759. RÜPPEL. *Eine Bemerkung über das Badal-Burchardt'sche Optometer.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 53.
1760. E. WARLOMONT. *Sur l'optomètre métrique et phacomètre du docteur Loiseau.* Bull. de l'acad. roy. de Méd. de Belg. (3.) XII. S. 672—686. — Presse Méd. XXX. No. 37, 38.

## 1879.

1761. LOISEAU. *Note sur un nouveau modèle de l'optomètre métrique et du phacomètre portatif.* Ann. d'Ocul. Jan.-Febr.
1762. PROMPT. *Procédé optométrique.* Soc. de Biol. 26. April.
1763. THOMSON. *A practical and rapid method, with an instrument for the diagnosis of the refraction.* Transact. of the Americ. ophth. Soc.
1764. WARLOMONT. *Rapports sur les communications de M. Loiseau ayant pour objet un phacomètre et un optomètre métriques.* Bull. de l'acad. roy. de Méd. de Belg. (3.) XIII. 1. S. 38—63. — Ann. d'Ocul. Bd. 81. S. 47—60.

## 1880.

1765. M. BURGL. *Patentbrillenbestimmer zur schnellen Ermittlung der passenden Brillennummer für Kurzsichtige und Weitsichtige.* Passau. Bucher. 1880. 11 S.



1766. M. HILDEBRAND. *Ueber die Augenuntersuchung der dienstpflchtigen Mannschaft*. Diss. Berlin. 29 S.
1767. LOISEAU. *Optomètre métrique*. Bruxelles. 68 S.
1768. MARÉCHAL. *Appareil pour la détermination de l'acuité visuelle et de la vision des couleurs*. Compt. Rend. du 6. congr. périod. intern. d'ophth. à Milan. 1880. S. 244.
1769. G. SOUS. *Phacomètre et optomètre*. Mém. de la Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux. (2.) IV. 1.
1770. E. WEISE. *Ueber das Verhältniß des Grades der Hypermetropie zur Sehschärfe*. Inaug.-Diss. Berlin. 1880.
- 1881.
1771. LOISEAU. *La question des optomètres*. Ann. d'Ocul. Bd. 85. S. 5—37.
1772. FERRIN. *Optométrie ou dioptrique de l'oeil*. Dict. encycl. d. sc. méd. Paris. XVI. S. 449.
- 1882.
1773. V. GIUDICI. *Ancora due parole sulla misurazione della miopia e della ipermetropia*. Rom. 1882.
1774. G. LEONHARD. *Eine neue optometrische Methode und ihre Anwendung auf die Praxis*, Leopoldina. Amtl. Org. d. k. Leop.-Carol. Ak. Heft 28.
1775. G. MOYNE. *Ottometro modificato*. Boll. d'ocul. V. 4. S. 100.
1776. SEGGER. *Ein doppelröhriges metrisches Optometer*. Ärtzl. Intelligenz-Bl.
- 1883.
1777. D. AXENFELD. *Eine optische Erscheinung, welche zur Construction eines Optometers verwerthet werden kann*. Pflüg. Arch. Bd. 30. S. 288.
1778. H. KATSCHE. *Doppelröhriges Optometer*. Zeitschr. f. Instr.-Kde. III. S. 78.
1779. MOYNE. *Ottometro-modificato*. Neapel. 1883.
- 1884.
1780. H. COHN. *Das Dioptrie-Lineal zur Brillenprobe*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 44.
1781. H. CULBERTSON. *On the value of the prisoptometer in determining the degree of myopia, with table*. Amer. Journ. of Ophth. 15. April. I. S. 10.
1782. G. MOYNE. *Ottometro-modificato*. Ann. di Ottalm. XIII. S. 588.
1783. PLEHN. *Neu construiertes Optometer*. Ber. d. XVI. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 135.
- 1885.
1784. L. A. BORTELING. *Compound optometer for correcting errors of refraction*. San Francisco. 1885. 18 S.
1785. L. DAHLERUP. *Dr. Plehn's apparat til bestemmelse af refraction og synstyrke*. Ugekr. for læger. 4 R. XII.
1786. EMMERT. *Mesures anciennes et nouvelles*. Rev. méd. de la Suisse romande. No. 8. S. 474.
1787. GAZEPEY. *Optomètre et astigmomètre binoculaire*. Arch. d'Ophthalm. S. 182. Rec. d'Ophthalm. S. 138.
1788. V. GIUDICI. *Sulla misurazione obiettiva della miopia e della ipermetropia*. Giorn. di med. mil. di Roma. XXXIII. S. 128.
1789. A. MARULA. *De la lunette de Galilée en optométrie*. Thèse de Paris. 49 S.
1790. PLEHN. *Ein Apparat zur Ermittlung der Refractionsverhältnisse und der Sehschärfe des Auges*. Zeitschr. f. Instrkde. V. S. 53—57. — Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 269.
1791. L. WOLFFBERG. *Apparat zur Augenuntersuchung auf dem Assentplatz*. Dtsch. milit.-ärztl. Zeitschr. XIV. S. 149.
- 1886.
1792. A. R. BAKER. *The prisoptometer; an instrument for the ready detection and correction of myopia etc*. Cleveland med. Gaz. I. S. 314.
1793. H. CULBERTSON. *On a mode of determining, with the prisoptometer, the degree of latent hypermetropia without mydriatics*. Amer. Journ. of Ophth. S. 220.
1794. — *A mode of determining the absolute myopia through the aid of glasses with the prisoptometer*. Amer. Journ. of Ophth. S. 325.
1795. DEEREN. *Etude des liens qui doivent exister entre l'acuité visuelle et la réfraction dans l'œil emmétrope et amétrope*. Rec. d'Ophth. S. 75.
1796. C. E. FITZGERALD. *Optometer*. Ophth. Rev. S. 62.

1797. J. TWEEDY. *On a improved optometer for estimating the degree of astigmatism and other errors of refraction.* Lancet. I. S. 777.  
1887.
1798. G. J. BULL. *Ein Optometer.* Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 192. Beil.-Heft zu Kl. Mon.-Bl. f. Augenhkde. S. 3—18.
1799. CHISOLM. *A simple and valuable optometer.* Transact. med. a. chir. Toso. Maryland. Baltimore. S. 126.
1800. — *The ten inch optometer.* Maryland. Med. Journ. Baltimore. XVII. S. 141.
1801. C. E. FITZGERALD. *Demonstration eines Apparates zur schnellen Bestimmung der Refraction.* Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 204.
1802. F. HÉMENT. *L'optomètre Bull.* La Nature. XV. 2. S. 187—188.
1803. W. A. HOLDEN. *An instrument for testing refraction and its errors etc.* Arch. Ophth. New-York. S. 295.  
1888.
1804. S. M. BURNETT. *Apparatus for diagnosis of refraction.* Amer. Journ. of Ophth. S. 312.
1805. H. CULBERTSON. *An alleged defect of the prisoptometer.* Amer. Journ. of Ophth. S. 317.
1806. A. L. BOE. *A new method of testing the refraction of the eye.* Lancet. I. S. 417.
1807. A. H. WARD. *A new optometer for determining all errors of refraction.* Ber. d. 7. intern. Ophth.-Congr. zu Heidelberg. S. 439.
1808. *Anweisung für den Gebrauch des von Dr. Engelhard construirten und patentirten monoculären und binoculären Optometers.* Schulz u. Bartels, opt. Industrie-Anst. zu Rathenow.  
1889.
1809. D. AXENFELD. *Un phénomène optique qui peut servir pour base à la construction d'un optomètre.* Arch. Ital. de Biol. XII. S. 1—3.  
1890.
1810. CHIBRET. *Un optomètre de poche fondé sur une propriété des progressions.* Soc. d'Ophth. 4. Febr. 1890. Rec. d'Ophth. S. 116.
1811. NIMIER. *Quelques remarques sur l'acuité visuelle et le strabisme chez les hypermétropes.* Rec. d'Ophthalm. No. 4. S. 229.  
1891.
1812. A. CARL. *Ein Apparat zur Prüfung der Sehschärfe.* Arch. f. Augenheilkde. XXIV. S. 41—47.  
1892.
1813. G. E. MERGIER. *Optomètre portatif pour la détermination rapide des amétropies et la mesure de l'acuité visuelle.* Ann. d'Ocul. T. 108. S. 351—363.  
1898.
1814. G. BITZOS. *Un nouveau phacomètre pratique à faire.* Ann. d'Ocul. T. CIX. S. 187.
1815. G. E. MERGIER. *Optomètre portatif pour la détermination rapide des amétropies et la mesure de l'acuité visuelle.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) V. 20. S. 582.
1816. MOON. *A portable and combined optometer and ophthalmoscope.* Medic. and Surgic. Reporter 11. Februar.  
1894.
1817. H. BORDIER. *Détermination de l'acuité visuelle des yeux amétropes par l'optomètre du professeur Badal.* Arch. d'Ophth. XIV. 9. S. 562—580.
1818. E. CONSTENTIN. *Optométrie objective.* Genf. Eggimann & Co. 1894. 172 S.
1819. P. SGROSSO. *Communications cliniques d'optométrie, ophthalmometrie, skiascopie etc.* Arch. di Ottalm. III. 1/2.
1820. M. TSCHERNING. *L'optomètre de Young et son emploi.* Arch. de Phys. (5.) VI. S. 909—919.

## 6. Massen-Untersuchungen in Bezug auf Refraction und Sehschärfe.

Weitere Litteratur ist in § 18. angegeben. Ebenfalls ist ein Theil der in § 11. angegebenen Litteratur zu beachten.

1880.

1821. F. A. HÖLKE. *De acie oculi dextri et sinistri in 1200 hominibus sexu, aetate et vitae ratione diversis examinata.*
1822. H. COHN. *Die Kurzsichtigkeit unter den Schulkindern und ihre Beziehungen zu Schultisch und Helligkeit der Schulzimmer. Nach Untersuchungen an 7568 Schülern.* Vorl. Mitth. Deutsch. Klin. No. 7.

1867.  
 1823. H. COHN. *Untersuchungen der Augen von 10060 Schulkindern*. Leipzig. Fleischer.  
 1871.  
 1824. H. COHN. *Die Refraction von 240 atropinisirten Dorfschulkindern*. Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 305.  
 1874.  
 1825. H. COHN. *Die Augen der Greise*. Tagebl. d. Naturf.-Vers. zu Breslau.  
 1876.  
 1826. M. REICH. *Quelques mots sur l'acuité visuelle des soldats*. Brochure adjointe au protocole de la séance de la Soc. imp. de méd. du Caucase.  
 1877.  
 1827. H. COHN. *Die Augen der Uhrmacher, Goldarbeiter, Juweliere und Lithographen*. Centralbl. f. Augenheilkde. April.  
 1828. M. REICH. *Untersuchungen der Sehschärfe bei 4613 Rekruten*. Milit.-med. Monatsschr. Nov. 1877. Petersb. med. Wochenschr. No. 41. S. 349—351.  
 1878.  
 1829. F. C. DONDEES. *Rapport aangaande het onderzoek van het Gesichtsvermogen van h- Personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen*. Utrecht, Drukkerij v. Co. 44 S. — XIX. j. versl. Nederl. gash. etc. S. 1—42.  
 1830. M. REICH. *Die Refraction der Augen von 1259 Schülern und Schülerinnen in Tifl*. Petersb. med. Wochenschr. No. 31.  
 1879.  
 1831. H. COHN. *Die Augen der Frauen*. Breslau. Morgenstern. 44 S.  
 1832. HORSTMANN. *Ueber Refraktionsverhältnisse von Kindern*. Ber. üb. d. 12. Vers. d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 239—248.  
 1880.  
 1833. ELY. *Beobachtungen mit dem Augenspiegel bezüglich der Refraction der Augen Neugeborener*. Arch. f. Augenheilkde. IX. 4. S. 431.  
 1834. HORSTMANN. *Ueber Refraktionsbestimmungen bei Neugeborenen*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 495. Dtsch. med. Wochenschr. No. 42. S. 566.  
 1881.  
 1835. A. C. COLLARD. *De Oogen der Studenten aan de Rijks-universiteit te Utrecht*. 22. jaarl. Verl. betr. het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 73—152.  
 1836. L. KÖNIGSTEIN. *Untersuchungen an den Augen neugeborener Kinder*. Wien. med. Jahrb. 1. S. 47—70.  
 1837. M. REICH. *Die Sehschärfe in den Lehranstalten Rußlands*. Wratschebnija Weimosti. No. 44. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 100.  
 1882.  
 1838. J. ALBRECHT. *Statistische Beiträge zur Lehre von der Myopie*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 342.  
 1839. E. DÜRR. *Tabellarische Zusammenstellung der Refraction einer Schule*. Ber. d. 14. Vers. d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 66.  
 1840. B. LYDER. *Refraktions- und Farbenblindheits-Untersuchungen von 550 Schulkindern*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 406.  
 1883.  
 1841. E. DÜRR. *Die Refraction von 414 Schülern nach Anwendung von Homatropin*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 103.  
 1842. W. HANSEN. *Untersuchungen der Augen von 808 Schulkindern im Alter von 10—15 Jahren*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 196.  
 1843. W. MANZ. *Ueber die Augen der Freiburger Schuljugend*. Freiburg u. Tübingen. 36 S.  
 1844. A. v. REUSS. *Untersuchungen der Augen von Eisenbahn-Bediensteten auf Farbsinn und Refraction*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (2.) S. 229.  
 1845. M. REICH. *Refraktionsveränderungen im Laufe von 6 Jahren an 85 Schülern beobachtet*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (2.) S. 303.  
 1884.  
 1846. J. BJERRUM. *Ueber die Refraction bei Neugeborenen*. Dtsch. med. Wochenschr. S. 72.  
 1847. W. HANSEN. *Untersuchungen über die Refraktionsverhältnisse im 10.—15. Lebensjahre und das Wachsthum der Augen in diesen Jahren*. Kiel. Diss.

1848. C. HORSTMANN. *Die Refraktionsverhältnisse des menschlichen Auges bis zum 6. Lebensjahre.* Ber. d. 16. Vers. d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 79.  
1885.
1849. B. CARTER. *Eyesight in schools.* Med. Times and Gaz. I. S. 535, 569.
1850. TH. GERMANN. *Beiträge zur Kenntniss der Refraktionsverhältnisse der Kinder im Säuglingsalter, sowie im vorschulpflichtigen Alter.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXI. (2.) S. 122—146.
1851. RANDALL, *Augenuntersuchungen in den Schulen.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 500.
1852. — *A study of the eyes of medical students.* Transact. Pennsylvania State med. soc. 18 S.
1853. CH. ROBERTS. *Statistics of eyesight in elementary schools.* Med. Times and Gaz. I. S. 598.
1854. SCHIÖTZ. *Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen.* Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 37.  
1886.
1855. H. COHN. *Ueber neue Untersuchungen der Augen der Uhrmacher.* Berl. klin. Wochenschr. S. 391.
1856. L. SIESMANN. *Resultate der Sehprüfung der Schüler der Schule für Militärärzter zu Irkutsk.* (Russisch.) Westnik ophth. II. 6. S. 464.
1857. FR. STEFFAN. *Die Myopie am Frankfurter Gymnasium.* v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (2.) S. 301.
1858. J. WIDMARK. *Refraktionsundersökningar, utförda vid några skolor i Stockholm (Untersuchung der Refraction in einigen Schulen Stockholms).* Nord. med. arkiv. Heft 4.  
1887.
1859. JACKMANN. *Eyesight of school children.* Ophth. Rev. S. 23.
1860. H. W. WILLIAM. *The importance of re-examinations as to the accuracy of vision of railroad employes and mariners.* Boston med. and surg. Journ. Bd. 117. S. 373.  
1888.
1861. B. A. RANDALL u. G. E. DE SCHWEINITZ. *An analysis of the statistics of the refraction of the human eye.* Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 511.  
1889.
1862. BARTHÉLEMY. *L'examen de la vision devant les conseils — marine et armée.* Paris. Baillière.
1863. W. FEILCHENFELD. *Statistischer Beitrag zur Kenntniss der Refraktionsänderungen bei jugendlichen und erwachsenen Personen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 113—136.
1864. *Colour-blindness and defective far sight among the seamen of the mercantile marine.* Nature. S. 438.  
1890.
1865. J. ARMINSKI. *Das Verhältniss zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen.* Wien. med. Blätter. No. 40 u. 41. Verh. d. X. internat. med. Kongr. Bd. IV. S. 86.
1866. T. AXENFELD. *Untersuchungen mehrerer Marburger Schulen auf Kurzsichtigkeit.* Inaug.-Diss. Marburg. 30 S.
1867. H. COHN. *Die Augen der Zöglinge der Breslauer Taubstummen-Anstalt.* Jahresbericht d. Taubstummen-Anstalt für 1890.
1868. G. MACKAY. *Colour-Blindness and defective sight in relation to public duty.* Brit. Med. Journ. No. 1568. S. 123.
1869. J. RHEINSTERN. *Die Veränderungen der Schüleraugen in Bezug auf Refraction und Augenspiegelbefund, festgestellt durch in Zwischenräumen von mehreren Jahren wiederholte Untersuchung derselben Schüler.* Inaug.-Diss. Würzburg. 24 S.  
1894.
1870. M. GIRLS. *Die Augen der indianischen Schulkinder.* Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. 10. S. 569.
1871. L. KOTELMANN. *Die Sehschärfe der Schüler des Gymnasium Christianeum in Altona.* Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. 2. S. 74.
1872. H. S. MILES. *Refraktionsstörungen bei 4000 Augen.* The Refractionist. Octbr.  
v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

1873. K. FISCHL. *Bericht über die Untersuchungen der Augen von 1900 Schulkindern der öffentlichen Schulen von San Francisco.* Journ. Amer. med. Assoc.  
 1874. RICHI. *Anomalies de la vision relevées sur 45000 sujets.* Ann. d'Ocul. Bd. 111. S. 350—371.

### 7. Brillen-Scalen und besondere Brillenformen.

1864.  
 1875. A. BUROW. *Ueber die Reihenfolge der Brillenbrennweiten.* Berlin.  
 1866.  
 1876. H. GEROLD. *Die zwiefache Planconvex-Brille. Ein Doppelocular von verschiedener Focaldistanz mit der Gesamtbrennweite eines einfachen Aequivalents, berechnet und construiert für eine bestimmte Hypermetropie.* Arch. f. Ophthalm. XII. (1.) S. 31—33. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XXXV. S. 215.  
 1877. A. STEINHEIL. *Ueber Brillengläserscalen und Accommodationsvergleichen.* Zeitschr. f. Biol. II. S. 366—376. — Zeitschr. f. Naturwiss. XXXV. S. 215.  
 1867.  
 1878. E. JAVAL. *Eine einheitliche Maßbestimmung der Brillen-Brennweiten.* Klin. Mon.-Bl. V. S. 297.  
 1868.  
 1879. A. BUROW. *Sur les séries des verres et sur l'emploi du système métrique pour le numérotage des lunettes.* Ann. d'Ocul. LX. S. 5.  
 1870.  
 1880. A. BUROW. *Ueber die Reihenfolge von Brillennummern.* Zeitschr. f. Naturwiss. XXXV. S. 215.  
 1871.  
 1881. P. BRAHAM. *Description of a set of lenses for the accurate correction of visual defect.* Rep. Brit. Ass. S. 37.  
 1872.  
 1882. E. JAVAL. *Das metrische System für optische Focallängen.* Klin. Mon.-Bl. X. S. 294.  
 1873.  
 1883. A. BUROW. *Das Meter-Maß zur Bezeichnung der Brillen-Brennweite.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 145.  
 1884. — *De l'emploi du système métrique pour désigner les longueurs focales des verres de lunettes.* Ann. d'Ocul. LXX. S. 52.  
 1885. GIRAUD-TEULON. *De la substitution du mètre au pied dans le numérotage des verres de lunettes.* Ann. d'Ocul. LXIX. S. 235.  
 1886. KÖNIGSBERG. *Entgegnung auf Giraud-Teulon's letzte Arbeit über Brillen-Numerotage.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 303.  
 1887. F. MONOYER. *Sur l'introduction du système métrique dans le numérotage des verres de lunettes etc.* Ann. d'Ocul. LXIX. S. 97.  
 1888. A. NAGEL. *Zur Brillen-Numerirungs-Frage.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 93.  
 1889. E. WARLOMONT. *De la substitution du mètre au pied dans le numérotage des verres de lunettes.* Ann. d'Ocul. LXIX. S. 5 u. 193.  
 1890. W. ZEHENDER. *Ueber die Einführung des metrischen Systems in die Lehre von den Refraktionsanomalien des menschlichen Auges.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 1.  
 1891. — *Giraud-Teulon's Vorschlag, betreffend die Numerotage der Brillengläser.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 223.  
 1892. — *Zur Frage der Einführung des französischen Maasses in die Dioptrik.* Klin. Mon.-Bl. XI. S. 267.  
 1874.  
 1893. NAGEL. *Einheit der Brillengläser.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 362.  
 1894. — *Ueber die Benutzung des Metermaasses zur Numerirung der Brillen.* Stuttgart.  
 1876.  
 1895. BADAL. *Optomètre métrique international.* Ann. d'Ocul. LXXV. S. 101—107.  
 1896. F. C. DONDEERS. *Ueber das Metermaass mit Bezug auf Numerirung der Brillengläser und Bezeichnung der verschiedenen Grade der Ametropie.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 465—477.  
 1897. J. v. HASNER. *Die Donders'sche Meterscala für Brillen.* Prag. med. Wochenschr. S. 959.

1898. E. LANDOLT. *Die Einführung des Metersystems in die Ophthalmologie*. Stuttgart. Enke. 30 S. — Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 223—250. — Ann. d'Ocul. Bd. 75. S. 207—234.  
1877.
1899. BADAL. *Optomètre métrique international*. Bull. mens. de la clin. du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 17—23.
1900. LANDOLT. *Ueber das Verhältniß der alten zur neuen Einheit der Brillengläser*. Ann. d'Ocul. Bd. 78. S. 44—47. — Klin. Mon.-Bl. XV. S. 333—336.  
1878.
1901. C. M. GABRIEL. *Sur le numérotage des verres de lunettes*. Journ. de phys. VII. S. 127—130.
1902. v. HASNER. *Ueber die Dioptrie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 75—77.
1903. C. HORSTMANN. *Zur Numerirung der Brillengläser*. Cassel.  
1880.
1904. A. NAGEL. *Ueber die Bezeichnung dioptrischer Werthe aus dem Betrage symmetrischer Convergencbewegungen nach metrischen Maaßeinheiten*. Mitth. a. d. ophthalm. Klin. in Tübingen. Heft 1.  
1881.
1905. A. NAGEL. *Ueber die neuen nach metrischem Maaße bezeichneten Brillengläser*. Zeitschr. f. Instr.-Kde. I. S. 161—164.  
1882.
1906. JUDA. *De benaming der brillenglazen in dioptrieën*. Neederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amsterdam. XVIII. S. 687.
1907. E. RAHELMANN. *Ueber die optische Wirkung der hyperbolischen Linsen, sowie über die Anwendung derselben als Brillen*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 111.  
1883.
1908. BADAL. *Verres périscopiques et cônes de Steinheil*. Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 19.
1909. A. IMBERT. *De l'interprétation et de l'emploi du pouvoir dioptrique et de la dioptrie métrique en ophthalmologie*. Lyon, Thèse de doctor. Paris, Baillière et fils.
1910. A. ANGELUCCI. *Sulla refrazione e correzione delle cornee coniche ed ectatiche*. Ann. di Ottalm. XIII. S. 35.  
1885.
1911. R. M. FERGUSON. *The dioptric system and its relation to the old system of numbering lenses*. Louisville. Med. News. XIX. S. 353.  
1886.
1912. BURNETT. *The metre-lens, its English name and equivalent*. New-York. med. Journ. Bd. 44. S. 183.
1913. — *The dioptry again*. New-York. med. Journ. Bd. 44. S. 380.
1914. KNAPP. *Dioptry or dioptric*. New-York. Med. Journ. XLIV. S. 377.  
1888.
1915. D. DOIJER. *De brillinkwestie*. Feestbundel. Donder's Jubiléum. Amsterdam. S. 60.
1916. A. E. FICK. *Eine Contactbrille*. Arch. f. Augenheilkde. XVIII. S. 279.
1917. J. WALLACE. *The correction of conical cornea*. Univ. med. Mag. Philadelphia. 1888/89. S. 231.
1918. W. v. ZEHENDER. *Zwei Bemerkungen zur Brillenfrage*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 393.  
1890.
1919. E. BERGER. *Appareil destiné à remplacer la boîte de verres d'essai*. New York Med. Journ. Vol. LII. No. 10. S. 30.
1920. E. LANDOLT. *Le numérotage rationnel des verres prismatiques employés en ophthalmologie*. Arch. d'Ophthalm. X. 5. S. 401.  
1892.
1921. A. E. FICK. *Einige Bemerkungen über die Contactbrille*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXX. S. 306—310.  
1898.
922. PFLUGER. *Tori- und Doppelfocus-Gläser*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 1—18.
923. ROMANO. *Die torischen Gläser*. Arch. di Ottalm. I. 1/2.
924. STEIGER. *Zur Benennung torisch geschliffener Brillengläser*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Bd. XXXI. S. 103.

1925. W. v. ZEHENDER. *Zur Benennung torisch geschliffener Brillengläser.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Bd. XXXI. S. 103.

1894.

1926. J. BJERRUM. *Om Kontaktglas.* Med. Aarskrift. Kopenhagen.

### 8. Refraktionsanomalien, ihre Entstehung und Heilung.

Hier ist auch die in § 11, a angegebene Litteratur zu beachten.

1852.

1927. L. TUELLMANN. *De Myopia.*

1853.

1928. J. C. BRAUNECK. *De myopia et presbyopia.* Berlin.

1865.

1929. F. W. HERRLING. *De Myopia.* Berlin.

1866.

1930. H. COHN. *Die Kurzsichtigkeit unter den Schulkindern und ihre Beziehungen zu Schultisch und Helligkeit der Schulzimmer.* Nach Untersuchungen an 7568 Schülern. Vorl. Mitth. Dtsche. Klin. No. 7.

1931. E. REYMOND. *Annotazioni sulla Miopia.* Torino.

1868.

1932. H. COHN. *Myopie und simulierte Myopie.* (Russisch.) Russ. Arch. f. öffentl. Gesdhtspfge. No. 1. St. Petersburg.

1933. W. DOBBOWOLSKY. *Myopie. Ihre Complication mit Accommodationskrampf.* K. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Auserord. Beilageft. S. 1—93.

1869.

1934. W. DOBBOWOLSKY. *Scheinbare und falsche Kurzsichtigkeit in Folge von Contractur der Accommodationsmuskeln.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Auserord. Beilageft. S. 141—200.

1873.

1935. H. BORGMANN. *Ueber die Verwendung decentrirter Brillen bei Myopie.* Berlin.

1874.

1936. J. SCHNABEL. *Zur Lehre von den Ursachen der Kurzsichtigkeit.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 1—70.

1875.

1937. A. E. BRAUNS. *Ueber die Sehschärfe bei Myopie ohne Correction.* Marburg.

1876.

1938. F. v. ARLT. *Ursachen und Entstehung der Kurzsichtigkeit.* Wien.

1939. L. WEISS. *Beiträge zur Entwicklung der Myopie. — Ueber eine leicht auszuführende Messung des Augenspiegelbildes und die Bedeutung dieser Messungen für die Beurtheilung des dioptrischen Apparates des Auges.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. (3.) S. 1—124.

1877.

1940. E. LANDOLT. *Bemerkungen zu dem Artikel: Beiträge zur Entwicklung der Myopie.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (1.) S. 263—264.

1941. — *Sur les causes des anomalies de la réfraction.* Gaz. hebdom. 2. S. XIV. 3. S. 618.

1878.

1942. SWAN M. BURNETT. *Die Sehschärfe bei hochgradiger Ametropie.* Americ. Journ. of ment. sc. S. 362—370.

1943. SCHÖN. *Die Ueberbürdung des Auges und die Zunahme der Kurzsichtigkeit.* Fränk. Zeitschr. f. prakt. Med. No. 21.

1879.

1944. FICK. *Ueber den Zusammenhang zwischen Myopie und Divergensschielen.* Bresl. Aerztl. Zeitschr. I. No. 5.

1945. O. JUST. *Beiträge zur Statistik der Myopie und des Farbensinnes.* Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 191—201.

1946. E. LANDOLT. *Ueber Myopie.* The Roy. Lond. Ophthalm. Hosp. Rep. IX. 3.

1880.

1947. HORSTMANN. *Ueber Myopie.* Arch. f. Augenheilkde. IX. 2.

1948. JAVAL. *Les livres scolaires et la myopie*. Bullet. de l'Acad. de Méd. (2.) IX. 12. S. 221. Gaz. méd. de Paris. No. 13. S. 161.
1949. S. SMITH. *Short-Sight in relation to education*. Birmingham and Leicester. 1880. 1881.
1950. H. BERTIN-SANS. *Le problème de la myopie scolaire*. Ann. d'hygiène publ. IV. 1. 2.
1951. G. B. BONO. *Del rapporto tra la forma del cranio e la refrazione oculare*. Giorn. d. Soc. ital. d'ig. Milano. III. S. 641.
1952. E. LANDOLT. *Relations between the conformation of the cranium and that of the eye*. Brit. Med. Journ. 2. April.
1953. E. MEYER. *De la myopie dans les écoles des différentes nations*. Rev. méd. franç. et étrang. No. 9.
1954. SORMANNI. *Miopia*. Geogr. nosolog. dell' Italia. Roma 1881. Cap. 21. S. 266. 1882.
1955. J. ALBRECHT. *Statistische Beiträge zur Lehre von der Myopie*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 342.
1956. AMADEI. *Sulla craniologia delle Anomalie die Refrazione dell' occhio*. Ann. di Ottalm. XI. S. 1.
1957. E. BERTIN-SANS. *Le problème de la myopie scolaire*. Ann. d'hyg. Paris. VII. S. 46. u. 186.
1958. W. E. MITTENDORF. *Myopia and the necessity of correcting it by glasses*. Philadelphia. M. Times. XIII. S. 60.
1959. SCHLEICH. *Klinisch-casustische Beiträge zur Lehre von der Myopie*. Mitth. a. d. Klin. in Tübingen. S. 1.
1960. TSCHERNING. *Studier oven myopiens aetiologi*. Kopenhagen. Myhres. 1882.
1961. L. WEISS. *Beiträge zur Anatomie des myopischen Auges*. Nagel's Tübing. Mitth. Heft 3. S. 63—117. 1888.
1962. O. BECKER. *Ueber zunehmende und überhandnehmende Kurzsichtigkeit*. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 77.
1963. G. B. BONO. *Indice cefalico e refrazione oculare*. Giorn. d. R. Accad. d. Med. di Torino. No. 1.
1964. J. CHASANOW. *Ueber die Progression der Myopie*. Diss. Königsberg.
1965. DANIEL. *Ueber den Einfluss des Lebensalters auf das Verhältniß der manifesten zur totalen Hypermetropie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Juli-Aug.
1966. M. DOBROWOLSKY. *Die Sehschärfe und Kurzsichtigkeit bei den Schülern des Ural-schen Gymnasiums*. Wratsch. No. 6.
1967. FÖRSTER. *Ueber die Entstehungsweise der Myopie*. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 119.
1968. FULDA. *Zur Frage der Schulkurzsichtigkeit*. Blätt. f. Handel, Gewerbe u. sociales Leben. (Beibl. z. Magdeburg. Ztg.) No. 10 u. 11.
1969. D. HUNT. *On the causation of myopia*. New-York. med. Journ. No. 10.
1970. W. J. MITTENDORF. *Der Einfluss der Civilisation auf das menschliche Auge, besonders auf die Entwicklung der Myopie*. Verh. d. dtsoh. Ges. u. wiss. Ver. i. New-York. V. S. 30.
1971. J. MOROSIN. *Determinazione di V et di R. Miopia, ipermetropia, astigmatisme*. Sassari. 1883. 80 S.
1972. PAULSEN. *Die Entstehung und Behandlung der Kurzsichtigkeit*. Berlin. 41 S.
1973. PFLÜGER. *Myopische Anisometropie*. Ber. d. Univ.-Augenkl. in Bern f. 1881. Bern. 1888. S. 51.
1974. M. REICH. *Refractionsveränderungen im Laufe von 6 Jahren an 85 Schülern beobachtet*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. 2. S. 303.
1975. E. RITZMANN. *Hygienische Rathschläge gegen das Ueberhandnehmen der Kurzsichtigkeit bei der Schuljugend*. Beil. z. Osterprogr. d. Schulen d. Stadt Schaffhausen. 30 S.
976. PH. STEFFAN. *Zur Schulkurzsichtigkeitsfrage*. Dtsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Schulgesdhtspfge.
977. TIPTON. *Some facts concerning the eyesight in school children*. Transact. med. assoc. Alabama, Montgomery. S. 447.
978. M. TSCHERNING. *Studien über die Aetiologie der Myopie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. 1. S. 201.



1884.

1979. E. DÜRR. *Die Entwicklung der Kurzsichtigkeit während der Schuljahre.* Braunschweig.
1980. FÖRSTER. *Ueber den Einfluss der Concaugläser und der Axenconvergenz auf die Weiterentwicklung der Myopie.* Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 295.
1981. C. HORSTMANN. *Beiträge zur Entwicklung der Refraktionsverhältnisse des menschlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre.* Arch. f. Augenheilkde. XIV S. 328.
1982. MANOLESCU. *Myopie in der Schule.* Wien. med. Wochenschr. No. 47.
1983. SNELL. *Influence of school life on eyesight.* London. 16 S.

1885.

1984. W. DOBROWOLSKY. *Zur Frage über die Entstehungsweise der Myopie.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 157.
1985. A. NAGEL. *Wie ist die Entwicklung der Kurzsichtigkeit zu verhüten?* Besond. Beil. d. Staatsanz. f. Württemberg. No. 6. Stuttgart.
1986. A. v. REUSS. *Ueber den Einfluss der Schule auf das Entstehen und Wachsen der Kurzsichtigkeit.* Österr. ärztl. Vereinsztg.
1987. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur Frage der Schulmyopie.* Ber. über d. 16. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 146.
1988. SEELY. *Weiteres über die Entstehungsweise der Myopie.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 278.
1989. STILLING. *Eine Studie zur Kurzsichtigkeitsfrage.* Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 133.
1990. ULRICH. *Untersuchungen über den Zusammenhang von Convergenz und erworbenener Myopie.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 433.
1991. L. WEISS. *Ueber die ersten Veränderungen des kurzsichtigen, bezw. kurzsichtig werdenden Auges.* Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 138.
1992. — *Ueber den an der Innenseite der Papille sichtbaren Reflexbogenstreif und seine Beziehung zur beginnenden Kurzsichtigkeit.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. S. 239.
1993. — *Ueber Länge und Krümmung des Orbitalstückes des Sehnerven und deren Einfluss auf die Entstehung der Kurzsichtigkeit.* Tagebl. d. 58. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Straßburg. S. 498.

1886.

1994. E. ADAMÜCK. *Zur Frage über die Myopie in den Schulen.* (Russisch.) Ophthalm. Bote. III. S. 269—321 u. 429—449.
1995. BROWNE. *The genesis of short sight.* Liverpool. med.-chir. Journ. Juli. S. 269.
1996. DEEREN. *Étiologie et prophylaxie de la myopie axiale chez les écoliers.* Rev. d'Ophthalm. S. 449.
1997. FÖRSTER. *On the influence of concav glasses and convergence of the ocular axes in the disease of myopia.* Arch. d'Ophthalm. XV. S. 399.
1998. M. KNIES. *Ueber Wesen und Therapie der Myopie.* Ber. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 26.
1999. SCHIESS. *Ueber Schule und Kurzsichtigkeit.* Allg. Schweiz. Ztg.
2000. SCHNELLE. *Ueber Entstehung und Entwicklung der Kurzsichtigkeit.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (3.) S. 245.
2001. W. SCHÖN. *Ueberanstrengung der Accommodation und deren Folgestände.* Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 1. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 385.
2002. PR. SMITH. *On means for the prevention of myopia.* Ophthalm. Rev. S. 153.
2003. PH. STEFFAN. *Die Myopie am Frankfurter Gymnasium.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (2.) S. 301.
2004. — *Unsere neuen Schulgebäude (Schulpaläste) und ihr Einfluss auf die sog. Schulkurzsichtigkeit.* Centralbl. f. allg. Gesdhtspfge. V. S. 6.
2005. STILLING. *Contribution to the study of myopia.* Arch. Ophthalm. New-York. XI S. 296.
2006. — *Ueber Entstehung der Myopie.* Ber. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 14.
2007. A. SZILL. *Seltene Fälle von erworbener Myopie.* Szémeszet. S. 25.

1887.

2008. JAVAL. *Sur la myopie scolaire.* Bull. Ac. de méd. Paris. (2.) XXVIII. S. 443.
2009. J. MANNHARDT. *Senile Myopie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXV. S. 217 u. 45.

2010. E. F. W. PFLÜGER. *Kurzsichtigkeit und Erziehung.*  
 2011. J. STILLING. *Untersuchungen über die Entstehung der Kurzsichtigkeit.* Wiesbaden. Bergmann. 216 S.  
 2012. STRAUMANN. *Ueber ophthalmoskopischen Befund und Hereditärverhältnisse bei der Myopie.* Diss. Basel.  
 2013. K. K. VESELY. *Zur Genese der Myopie.* Wien. med. Wochenschr. Bd. 37. S. 1119—23, 1150—54, 1173—76.
- 1888.
2014. N. A. BAER. *Ueber das Verhalten des Orbita-Index bei den verschiedenen Refraktionszuständen vom 10.—19. Lebensjahre.* Diss. München.  
 2015. CEVESETO. *La retina del miope è l'unico oggetto che l'ipermetrope possa vedere senza correggere la sua ametropia.* Ann. di Ottalm. S. 385.  
 2016. PETRINI. *Esame dell'occhio miope ad immagine dritta.* Boll. d'Osp. di S. Casa di Loreto. 1887/88. S. 448.  
 2017. SCHNELLER. *Ueber die Entstehung und Behandlung der Kurzsichtigkeit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. April. S. 109.  
 2018. J. STILLING. *Schädelbau und Kurzsichtigkeit.* Wiesbaden. J. F. Bergmann. 124 S.  
 2019. — *Ueber Schädelbau und Refraction.* Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 97.  
 2020. L. WEISS. *Zur Beziehung der Form des Orbitaeinganges zur Myopie.* Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 349.
- 1889.
2021. W. DE JOUG. *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Myopie.* Diss. Freiburg.  
 2022. NUEL et LEPLAT. *Les vaisseaux rétiniens dans la myopie congénitale.* Ann. d'Ocul. CI. S. 154.  
 2023. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Kurzsichtigkeit und Augenhöhlenbau.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 200—219.  
 2024. — *Noch einmal die Orbital-Messungen bei verschiedenen Refractionen.* Fortschr. d. Med. VII. 20. S. 769.  
 2025. — *Bemerkungen zu Stilling's Aufsatz: Ueber Orbital-Messungen bei verschiedenen Refractionen.* Fortschr. d. Med. VII. 15. S. 573.  
 2026. — *Zur Frage der Schulmyopie.* 2. Theil. Mit 4 Fig. im Text. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 249—286.  
 2027. J. STILLING. *Ueber Orbital-Messungen bei verschiedener Refraction.* Fortschr. d. Med. S. 444.  
 2028. — *Ueber neue Orbital-Messungen an Kurz- und Normalsichtigen.* Fortschr. d. Med. VII. 17. S. 647.  
 2029. — *Auch noch einmal Myopie und Orbitalbau.* Fortschr. d. Med. VII. 22. S. 861.
- 1890.
2030. J. ARMINSKI. *Das Verhältniß zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen.* Wien. med. Blätter. No. 40. u. 41.  
 2031. BERRY. *On Myopia: a criticism of the discussion at Birmingham.* Ophthalm. Rev. No. 109. S. 327.  
 2032. H. COHN. *Ueber den Einfluß hygienischer Maßregeln auf die Schulmyopie.* Zeitschr. f. Schulgesundhpflege. No. 1 u. 2.  
 2033. — *Kurze Replik auf die Entgegnung des Professors v. Hippel betreffs seiner Schrift über Schulmyopie.* Zeitschr. f. Schulgesundhpflege. No. 4.  
 2034. V. FUKALA. *Treatment of high degrees of myopia bei removal of the lens.* Americ. Journ. of Ophthalm.  
 2035. GALEZOWSKY. *Etude sur quelques variétés graves de myopie et sur les moyens de les guérir.* Rec. d'Ophthalm. S. 513—521 u. 577—586.  
 2036. J. HIRSCHBERG. *Diabetische Kurzsichtigkeit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 7—8.  
 2037. A. KROTOSCHIN. *Anatomischer Beitrag zur Entstehung der Myopie.* Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 393.  
 2038. KÜHNEN. *Beschreibung einiger Modelle und Apparate (u. a. auch zur Demonstration der Myopie etc.)* Zeitschr. f. Biol. (N. F.) IX. S. 418—432.  
 2039. NUEL. *Une curiosité physiologique de l'œil myope.* Ann. d'Ocul. Juillet-Août. S. 43.  
 2040. — *Diagnostic de la prédisposition à la myopie.* Rev. gén. de l'Ophthalm. S. 215

2041. B. A. RANDALL. *Can Hypermetropia be healthfully outgrown?* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc.
2042. ROTAND. *De la myopie et quelques considérations sur son étiologie et sa prophylaxie.* Thèse de doctor.
2043. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Bemerkung zu Stilling's letzter Erwiderung.* Fortschr. d. Med. S. 58.
2044. — *Die Schulkurzsichtigkeit und ihre Bekämpfung.* Leipzig. Engelmann. 115 S.
2045. SEGGER. *Ueber die Abhängigkeit der Myopie vom Orbitalbau und die Beziehungen des Conus zur Refraction.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (2.) S. 1—65.
2046. PRIESTLEY SMITH. *On Myopia: a reply to Dr. Berry's criticism.* Ophthalm. Rev. S. 345—351.
2047. — *A discussion on the causes, prevention and treatment of myopia.* Ophthalm. Rev. S. 252—253.
2048. PRIESTLEY SMITH u. GROSS. *Myopia: its causes, prevention and treatment.* Ophthalm. Rev. 1890. No. 109. S. 313.
2049. STILLING. *Ueber das Wachsthum der Orbita und dessen Beziehungen zur Refraction.* Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 47.
2050. H. WINGERATH. *Kurzsichtigkeit und Schule.* Berlin. Friedländer u. Modl. 1891.
2051. DEEREN. *Quelques remarques sur la myopie.* Rec. d'ophthalm.
2052. V. FUKALA. *On the injurious influence of the accommodation upon the increase of myopia of the highest degree.* Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. No. 3. S. 81.
2053. — *Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit durch Beseitigung der Linse.* Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 31 S.
2054. — *Ueber die Ursache der Verbesserung der Sehschärfe bei höchstgradig myopisch gewesenen Aphaken.* Arch. f. Augenheilkde. Bd. 24. 2. S. 161—168.
2055. KEYSER. *Hypermetropia.* Times and Reg. XII. S. 133.
2056. A. KROTOSCHIN. *Anatomischer Beitrag zur Entstehung der Myopie.* Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 393—421.
2057. NIMIER. *Myopia in schools.* New-York. med. Journ. LIV. No. 16. S. 435.
2058. — *De la myopie chez les candidats aux écoles militaires.* Ann. d'Ocul. CVI. S. 15.
2059. J. P. NUEL. *D'une apparence ophtalmoscopique de l'œil myope. — Contribution à la connaissance de la prédisposition héréditaire à la myopie.* Arch. d'Ophthalm. XI. S. 56—73.
2060. F. OTT. *Ueber die hochgradige Myopie.* Inaug.-Dis. Straßburg. 57 S.
2061. TH. PROSKAUER. *Ein Beitrag zur Myopiestatistik.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (2.) S. 199—219.
2062. A. B. RANDALL. *Nimmt Hypermetropie durch normales Wachsthum ab?* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 57—62.
2063. TH. v. SCHRÖDER. *Die operative Behandlung der hochgradigen Myopie mittelst Entfernung des Linse.* St. Petersburg. med. Wochenschr. No. 29. S. 251.
2064. SCHRÖTER. *Einfluß der Schuljahre auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit.* Leipzig.
2065. THEOBALD. *Inherited monocular myopia.* Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. S. 251.
- 1892.
2066. J. ARMINSKI. *Das Verhältniß zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen.* Verhandl. d. X. internat. med. Kongresses. Bd. IV. S. 86.
2067. R. D. BATTEN. *Myopia the result constitutional disease.* Ophthalm. Rev. XI. 1.
2068. BELLIARD. *Rapport sur la myopie scolaire.* Bullet. de la soc. d'ophthalm. de Paris. S. 121.
2069. A. BOCK. *Untersuchungen über die Erbllichkeit der Myopie.* Diss. Kiel. 17 S.
2070. V. FUKALA. *Der schädliche Einfluß der Accommodation auf die Zunahme der höchstgradigen Myopie.* Berl. klin. Wochenschr. No. 23. S. 558.
2071. O. GERLOFF. *Beitrag zur Arbeitsmyopie.* Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 172—180.
2072. A. KROTOSCHIN. *Anatomischer Beitrag zum Studium der Entwicklung der Myopie.* Arch. of ophthalm. XXI. 1. S. 33—38.
2073. P. LANDSBERG. *Eigenartiger Gebrauch des Converglases bei excessiver Hypermetropie.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXX. S. 187—192. 292 u. 361.

2074. NIMIER. *Remarques sur la répartition géographique de la myopie en France*. Bullet. de la Soc. d'Ophthalm. de Paris. S. 1.
2075. OSTWALT. *Réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphakie avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'œil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphaque*. Rev. gén. d'ophthalm. XI. S. 1—21.
2076. PFLÜGER. *Bemerkungen zur operativen Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit*. Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 118—123.
2077. F. POELLER. *Experimental - Beiträge zur Myopie - Hygiene*. Arch. f. Hyg. XIII. S. 335—343.
2078. RYMSZA. *Vergleichende Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Refraktionszustande der Augen und dem Schädelbau*. Diss. Dorpat. 65 S.
2079. SCHWEIGGER. *Correction der Myopie durch Aphakie*. Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 115—118.
2080. S. STEPHENSON. *A note upon the relative frequency of myopia among Christians and Jews*. Ophthalm. Rev. XI. S. 110—112.
2081. J. STILLING. *Zur Kurzsichtigkeitsfrage*. Berl. med. Wochenschr. No. 16. S. 398.
2082. VALUDE. *Myopie forte. Extraction du cristallin transparent*. Bullet. de la Soc. d'ophthalm. de Paris. S. 30.
- 1898.
2083. K. L. BAAS. *Zur Anatomie und Pathogenese der Myopie*. Knapp u. Schweigger's Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 33—56.
2084. E. GELLSUHN. *Ueber einen Fall von höchstgradiger Uebersichtigkeit mit besonderer Berücksichtigung der Diagnostik*. Diss. Berlin. 29 S.
2085. HAUVEL. *De la myopie, ses rapports avec l'astigmatisme*. Paris. Steinheil.
2086. B. JANKOWSKI. *Beitrag zur Myopiefrage*. Mitth. a. klin. u. med. Inst. d. Schweiz. I. Reihe. 2. Heft. Basel. C. Sallmann. 57 S. — Diss. Bonn.
2087. H. OHLEMAN. *Beitrag zur Schulmyopie*. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 168—180.
2088. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur Myopiefrage*. Ztschr. f. Schulgesundheitspflege. VI.
2089. W. SCHOEN. *Erworbene Brechungsänderungen des Auges*. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 268—293.
2090. SCHWEIGGER. *Operative Beseitigung hochgradiger Myopie*. Vortr. i. d. Berl. med. Ges. Dtsch. med. Wochenschr. No. 20.
2091. SULZER. *Quelques faits relatifs au développement de la myopie*. Ann. d'Ocul. Juli.
2092. THIER. *Die operative Correction höchstgradiger Myopie durch Discision der Linse*. Dtsch. med. Wochenschr. XIX. No. 30. S. 717—720.
- 1894.
2093. J. ASHER. *Geschichtlicher und experimenteller Beitrag zum Studium der Entstehung der Myopie*. Deutschmann's Beitr. z. Augenheilkde. XVI. S. 19.
2094. M. HORI. *Beitrag zur operativen Behandlung der hochgradigen Myopie*. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 142—161.
2095. H. J. KESSLER. *Myopia acquisita ten gevolge van aandening der lens*. Weekblad. No. 6. S. 167.
2096. M. NIEBUHR. *Beitrag zur Lehre von der operativen Behandlung der Myopie*. Diss. Halle. 40 S.
2097. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur Myopiefrage*. Ztschr. f. Schulgesundheitspflege. No. 1 u. 4.
2098. TH. v. SCHRÖDER. *Des résultats du traitement des hauts degrés de myopie par l'extraction du cristallin transparent*. Wiestn. Ophthalm. März-April.
2099. — *Ueber die bisherigen Resultate der operativen Behandlung der hochgradigen Myopie nebst Bemerkungen über die Antiseptik bei Augenoperationen*. St. Petersburg. med. Wochenschr. No. 4.
2100. J. STILLING. *Zur Myopiefrage*. Ztschr. f. Schulgesundheitspflege. No. 3.
2101. — *Beruhet die hochgradige Myopie auf Inzucht?* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 164—165.
2102. — *Myopie und Orbitalbau*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. 1. S. 81.
2103. THIER. *Zur operativen Correction der höchstgradigen Myopie durch Discision der Linse*. Wien. klin. Wochenschr. S. 399.
2104. C. VELHAGEN. *Entsteht hochgradige Myopie durch Inzucht?* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 80—87.
2105. P. VOYBURG. *Verwydering der Lens by myopie*. Weekblad. II. S. 181.

## 9. Historisches.

1866.

2106. A. NAGEL. *Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus.* Arch. f. Ophthalm. XIII. (1.) S. 25—30.

1869.

2107. R. SCHIRMER. *Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermetropie.* Ann. d'Ocul. LXII. S. 202.

1879.

2108. H. MAGNUS. *Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Optik und der Ophthalmotherapie der Alten. 1. Die Accommodation. 2. Die Myotica.* Klin. Mon.-Bl. XVII. S. 223—232.

1880.

2109. G. GOVI. *Nuovo documento relativo alla invenzione dei cannocchiali binocoli.* Bull. di Bibliogr. e di Storia dei sc. mat. e fis. XIII. S. 471—480. — Compt. Rend. Bd. 93. No. 6. S. 301. (1881.)

2110. — *Sur l'inventeur des lunettes binoculaires.* Compt. Rend. Bd. 91. No. 13. S. 547.

1881.

2111. A. FAVARO. *Sulla invenzione dei cannocchiali binoculari.* Atti d. R. Accad. d. Sc. Torino. XVI.

1884.

2112. R. SCHIRMER. *Bemerkungen zur Geschichte der Hypermetropie.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. 2. S. 185—190.

1885.

2113. F. HORNER. *Ueber Brillen aus alter und neuer Zeit.* Neujahrsbl. z. Besten des Waisenhauses in Zürich.

1890.

2114. L. WEBSTER-FOX. *A history of spectacles.* Med. and Surg. Rep. 3. Mai.

1892.

2115. G. ALBERTOTTI. *Manoscritto francese del secolo decimosettimo riguardante l'uso degli occhiali.* Modena.

2116. TH. v. FRIMMEL. *Lionardo da Vinci's Auge.* Repertorium f. Kunstwiss. XV. 4. u. 5. Heft.

1893.

2117. RJÄSAN. *Zur Geschichte der Brillen in Rußland. (Die Brillen der Patriarchen.)* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 217—220.

## § 12.

## Mechanismus der Accommodation.

## 1. Aenderung der Pupillenweite.

(Siehe § 3. 1 und 2.)

## 2. Accommodation bei Aphakie.

1872.

2118. F. C. DONDEES. *Over schijnbare accomodatie bij aphakie.* Onderz. ged. in het phys. Lab. d. Utr. hooges. 3. reeks. II. 5. S. 125.

2119. FÖRSTER. *Accommodationsvermögen bei Aphakie.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. X. S. 39.

1873.

2120. J. COERT. *De schijnbare accomodatie bij aphakie.* Diss. Utrecht. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 89.

2121. F. C. DONDEBS. *Ueber scheinbare Accommodation bei Aphakie*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 56.  
 2122. F. MANNHARDT. *Accommodationsvermögen bei Aphakie*. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 87.  
 2123. WOJNOW. *Das Accommodationsvermögen bei Aphakie*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 107.  
 1875.  
 2124. H. SCHÖLER. *Jahresbericht über die Wirksamkeit der Augenkl. Berlin*. 35 S. 1888.  
 2125. C. AMAT. *Théorie de la vision chez les opérés de cataractes*. Journ. de méd. et pharm. de l'Algérie. VIII. S. 50.  
 1885.  
 2126. A. FROST. *Supposed power of accommodation in aphakic eye*. Lancet. I. S. 756.  
 1888.  
 2127. E. SCHMEL. *Un caso di ectopia della lente et della pupilla a contribuzione del potere accomodativo nell' afachia*. Boll. d'ocul. IX. No. 19. Rev. clin. d'Ocul. S. 265.  
 2128. P. SILEX. *Zur Frage der Accommodation des aphakischen Auges*. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 102.  
 1889.  
 2129. P. SILEX. *On the question of accomodation of the aphakial eye*. Arch. of Ophthalm. XVIII. S. 274.  
 1893.  
 2130. H. HOFHAMMER. *Ueber Accommodation bei Aphakischen*. Diss. München.  
 2131. SCHLOSSER. *Ueber Accommodation aphakischer Augen*. Sitzgs.-Ber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol. München. VIII. S. 131.  
 1894.  
 2132. H. SÄTTLER. *Untersuchungen über die Frage nach dem Vorkommen einer äusseren Accommodation durch Muskeldruck*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (3) S. 239—282.

### 3. Mechanismus der Accommodation.

Hier ist auch die Literatur von § 3. 1 und 2 zu beachten.

1611.  
 2133. KEPLER. *Dioptrice*. Propos. 26.  
 1619.  
 2134. SCHREINER. *Oculus*. Oeniponti. Lib. III. S. 163.  
 1637.  
 2135. CARTESIUS. *Dioptrice*. Lugd. Batav.  
 1648.  
 2136. V. F. PLEMPUS. *Ophthalmographia*. Lovanii. B. III.  
 1685.  
 2137. DE LA HIRE. Journ. d. Sçavans S. 398.  
 1693.  
 2138. STURM. *Dissertatio visionem ex obscurae camerae tenebris illustrans*. Altdorfii. S. 172.  
 1697.  
 2139. STURM. *Dissertatio de presbyopia et myopia*. Altdorfii.  
 1712.  
 2140. A. F. WALTHER. *Dissertatio de lente crystallina oculi humani*. Lipsiae. — Auch in Haller's Disput. anat. Vol. IV.  
 1715.  
 2141. G. BIDLOO. *Observationes de oculis et visu variorum animalium*. Lugd. Batav.  
 1719.  
 2142. PEMBERTON. *Dissertatio de facultate oculi, qua ad diversas distantias se accomodat*. Lugd. Batav.  
 1738.  
 2143. J. J. PLATNER. *De motu ligamenti ciliaris in oculo*. Lipsiae. S. 5.

1742.  
 2144. J. P. LOBÉ (ALBINUS). *Dissertatio de oculo humano*. Lugd. Batav. S. 119. — Auch in Haller's Disput. anat. Vol. VII.  
 1743.  
 2145. A. HALLER. *Elementa Physiologiae*. T. V. S. 516.  
 2146. LE MOINE. *Quaestio an obliqui musculi retinam a crystallino removeant*. Paris.  
 1748.  
 2147. P. CAMPER. *Dissertatio physiologica de quibusdam oculi partibus*. Lugd. Batav. S. 23. — Auch in Haller's Disput. anat. Vol. IV.  
 1749.  
 2148. BUFFON. *Histoire naturelle*. Paris. T. III. S. 331.  
 1755.  
 2149. LE ROY. *Memoir. de l'Acad. de Paris*. S. 594.  
 2150. BOERHAVE. *Praelectiones academicae, edit. et not. add. Alb. a Haller*. Taurini Vol. III. S. 121.  
 1758.  
 2151. v. GRIMM. *Dissertatio de visu*. Gottingae.  
 1759.  
 2152. PORTERFIELD. *On the eye*. Edinburgh. Vol. I. S. 450. — Edinb. med. Essays. IV. S. 124.  
 1763.  
 2153. MOLINETTI in Hallers *Elementa physiologiae*. V. S. 511.  
 1771.  
 2154. LE ROY. *Mémoire sur le mécanisme par lequel l'oeil s'accommode aux différentes distances des objets*. Paris.  
 1783.  
 2155. OLBERS. *Dissertatio de oculi mutationibus internis*. Gottingae.  
 1793.  
 2156. TH. YOUNG. *Observations on vision*. Philos. Trans. P. II. S. 169.  
 1794.  
 2157. J. HUNTER. *On the crystalline humour of the eye*. Philos. Transact. S. 21.  
 1795.  
 2158. HOME. Philos. Transact. P. I. S. 1. (Accommodation nach Staaroperation.)  
 1796.  
 2159. HOME. Philos. Transact. P. I. S. 1.  
 1797.  
 2160. KLÜGEL. Reil's Arch. II. S. 51. (Gegen Home.)  
 1800.  
 2161. TH. YOUNG. *De corporis humani viribus conservatricibus*. Gottingae. — Philos. Transact. for 1800. S. 146.  
 1801.  
 2162. MONRO. *Altenburger Ann. f. d. Jahr 1801*. S. 97.  
 2163. HIMLY. *Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen*. Bremen.  
 2164. \*TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye*. Philos. Transact. P. I. S. 23\*. (Eine Arbeit von bewunderungswürdigem Scharfsinn und Erfindungskraft, welche vollständig geeignet war, schon zu ihrer Zeit den Streit über die Accommodation zu entscheiden, aber durch ihre Kürze oft schwer verständlich wird und ausserdem die vollständigste Kenntniss der mathematischen Optik voraussetzt.)  
 1802.  
 2165. HOME. Philos. Transact. P. I. S. 1. (Adaptation bei Staaroperirten.)  
 2166. J. A. ALBERS. *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere*. Heft 1. Bremen.  
 1804.  
 2167. GRAEFE. Reil's Arch. f. Physiol. IX. S. 231.  
 1809.  
 2168. CUVIER. *Vorlesungen über die vergleichende Anatomie*. — Uebers. v. Meckel. Leipzig. II. S. 369.  
 1811.  
 2169. WELLS. Philos. Transact. P. II. — Gilberts Ann. XLIII. S. 129 u. 141.

1816.  
2170. MAGENDIE. *Précis élémentaire de Physiologie*. I. S. 73. Paris. Uebers. v. Elsässer. Tübingen. 1834. I. S. 54.
1820.  
2171. G. PARROT. *Entretiens sur la physique*. Dorpat. III. S. 434.
1821.  
2172. JACOBSON. *Suppl. ad Ophthalm.* Kopenhagen.  
2173. C. H. WELLER. *Diätetik für gesunde und schwache Augen*. Berlin. S. 225.
1828.  
2174. J. POPPE. *Die ganze Lehre vom Sehen*. Tübingen. S. 153.  
2175. RUDOLPHI. *Grundriss der Physiologie*. Berlin. II. Abth. 1. S. 9.  
2176. LEHOT. *Nouvelle théorie de la vision*. Paris.  
2177. PURKINJE. *De examine physiologico organi visus et systematis cutanei*. Vratislaviae. (Entdeckung der Linsenreflexe.)
1824.  
2178. D. BREWSTER. *Edinb. Journ. of Sc.* I. S. 77. — *Pogg. Ann.* II. S. 271.  
2179. SIMONOFF. *Magendie's Journal d. Phys.* T. IV.
1826.  
2180. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche sur Physiologie der Sinne*. Berlin. S. 128\*.
1826.  
2181. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig. S. 212.  
2182. HUECK. *Dissertatio de mutationibus oculi internis*. Dorpati.  
2183. MILE. *Magendie's Journal d. Phys.* VI. S. 166.
1828.  
2184. TREVIRANUS. *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere*. Heft I.
1831.  
2185. MORTON. *Americ. Journ. of med. sc.* Novbr.
1832.  
2186. RITTER. *Grasfe u. Walther's Journ.* VIII. S. 347.  
2187. FR. ARNOLD. *Untersuchungen über das Auge des Menschen*. Heidelberg. S. 88.  
2188. G. J. LUCHTMAN. *Dissertatio de mutatione axis oculi secundum diversam distantiam objecti ejusque causa*. Traject. ad Rhenum.
1833.  
2189. TH. SMITH. *Philos. Mag.* V. 3. No. 13. — *Schmidt's Jahrb. d. Med.* 1834. I. S. 6.
1834.  
2190. DUGÈS Institut. No. 73.
1835.  
2191. SERRE. *Bullet. de Thérap.* T. VIII. L. 4.
1836.  
2192. VOLKMANN. *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns*. S. 109.  
2193. R. H. KOHLRAUSCH. *Ueber Treviranus' Ansichten vom deutlichen Sehen in der Nähe und Ferne*. Rinteln.
1837.  
2194. SANSON. *Leçons sur les maladies des yeux, publiées par Bardinot et Pigne*. Paris. (Ueber die Reflexe der Krystalllinse.)  
2195. MILE. *Pogg. Ann.* XLII. S. 37 u. 235.
1838.  
2196. PASQUET, *Froriep's Notizen*. Bd. VI. No. 2.
1839.  
2197. J. F. FRIES. *Ueber den optischen Mittelpunkt im menschlichen Auge, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Theorie des Sehens*. Jena. S. 27.
1840.  
2198. NEUBER. *Osann's Zeitschr.* Heft 7—12. S. 42.
1841.  
2199. HUECK. *Die Bewegung der Krystalllinse*. Leipzig.  
2200. BONNET. *Froriep's Neue Notizen*. S. 233.
1842.  
2201. DE HALDAT. *Compt. Rend.* 1842.  
2202. ADDA. *Ann. de Chim. et de Phys.* Ser. III. T. XII. S. 94.



2203. A. BUROW. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges.* S. 94 bis 177\*.
2204. S. PAPPENHEIM. *Die specielle Gewebelehre des Auges.* Breslau.
2205. THALHEIM. *De oculi mechanismo, imprimis vi objectis se accommodandi.* Inaug.-Diss. Halle.  
1844.
2206. MOSER. *Repert. d. Phys.* V. S. 364.  
1845.
2207. STURM. *Sur la théorie de la vision.* *Compt. Rend.* XX. S. 554, 761 u. 1238. — *Pogg. Ann.* LXV. S. 116.
2208. FORBES. *Compt. Rend.* XX. S. 61. — *Institut.* No. 576. S. 15. No. 578. S. 32.
2209. DE HALDAT. *Compt. Rend.* XX. S. 458 u. 1561. — *Institut.* No. 596. S. 90 (gegen Forbes).  
1846.
2210. E. BRÜCKE. *Ueber den Musculus Cramptonianus und den Spannmuskel der Chorioidea.* *Berl. Ber.* 29. Mai. *Müllers Arch.* S. 370.
2211. F. C. DONDERS. *Ruete Leerb. d. Ophthalm.* S. 110.
2212. H. MEYER. *Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med.* Bd. V. (Ursprung der Linsenreflexe.)
2213. SENFF in *R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol.* Art.: Sehen von Volkmann. S. 303.
2214. BESIO. *Giorn. Arcad.* CV. 3. *Institut.* No. 666. S. 338.
2215. J. G. CRAHAY. *Bullet. de Bruxelles.* XII. 2. S. 311. — *Institut.* No. 644. S. 151.  
1847.
2216. L. L. VALLÉE. *Compt. Rend.* XXV. S. 501.  
1848.
2217. VALENTIN. *Lehrbuch der Physiologie.* II. Abth. 2. S. 122.
2218. SZOKALSKY in *Griesinger's Arch. f. physiol. Heilkde.* VII. S. 694.  
1849.
2219. M. LANGENBECK. *Klinische Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Ophthalmologie.* Göttingen.
2220. F. C. DONDERS. *Nederl. Lancet.* S. 146.  
1850.
2221. F. C. DONDERS. *Reflectieproef van Purkinje en Sanson en accommodatie van het oog, naar Max Langenbeck.* *Nederl. Lancet.* S. 132.
2222. JOS. ENGEL. *Prag. Vierteljahresschr.* XXV. S. 167 u. 208.
2223. H. MAYER. *Prag. Vierteljahresschr.* XXVIII. *Außerordentl. Beil. u. XXXII.* S. 92\*.
2224. HENLE. *Canstatt's Jahresber. f. 1849.* Erlangen. S. 71.
2225. W. C. WALLACE. *The accommodation of the eye to distances.* New-York.
2226. C. WEBER. *Nonnullae disquisitiones quae ad facultatem oculum rebus longinquis et propinquis accommodandi spectant.* Marburgi.
2227. C. STELLWAG VON CARION. *Wien. Zeitschr. d. Ges. d. Ärzte.* VI. S. 125 u. 138.
2228. A. HANNOVER. *Bidrag til Oiets Anatomie, Physiologie og Pathologie.* Kjöbenhavn. S. III.  
1851.
2229. F. C. DONDERS. *Ophthalmologische aantekingen. Accommodatievermogen.* *Nederl. Lancet.* S. 600.
2230. H. HELMHOLTZ. *Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge.* Berlin. S. 37\*.
2231. LISTING. Art.: *Dioptrik des Auges* in *R. Wagners Handwörterbuch d. Physiol.* IV. S. 498\*.
2232. A. CRAMER. *Tidschr. d. Maatschappy vor Geneeskunde.* W. 11. S. 115. *Nederl. Lancet.* Ser. 2. W. 1. S. 529.
2233. CLAVEL. *Compt. Rend.* XXXIII. S. 259. — *Arch. des sc. phys. et natur.* XIX. S. 76.  
1852.
2234. F. C. DONDERS. *Nederl. Lancet.* Febr. S. 529.  
1853.
2235. H. HELMHOLTZ. *Ueber eine bisher unbekannte Veränderung am menschlichen Auge bei veränderter Accommodation.* *Mon.-Ber. d. Akad. zu Berlin.* 3. Febr. S. 137—139.

2236. \*A. CRAMER. *Het Accommodatievermogen der Oogen physiologisch toegelicht*. Haarlem.  
 2237. L. u. A. FIOCK in J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 449\*.

## 1854.

2238. F. C. DONDERS. Onderz. ged. in het Physiol. Laborat. der Utrecht'sche Hoogeschool, Jaar VI. S. 61.  
 2239. J. CZERMAK. Prag. Vierteljahresschr. XLIII. S. 109.  
 2240. A. HASENPAT. *De accommodandi facultate*. Berolini.

## 1855.

2241. A. CRAMER. *Physiologische Abhandlung über das Accommodationsvermögen der Augen*. Aus d. Holland. übersetzt v. Doden, eingeführt durch Stellwag v. Carion. (Preisschr.) Leer.  
 2242. \*H. HELMHOLTZ. *Ueber die Accommodation des Auges*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 1. (2.) S. 1—74.  
 2243. RUETE. *De Irideremia congenita*. Progr. acad. Leipzig. — Virchow's Arch. XII. S. 342.  
 2244. VAN REEKEN. *Ontleedkundig Onderzoek van den toestel voor accommodatie van het oog*. Onderzoekingen gedaan in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. Jaar VII. S. 248—286.

## 1856.

2245. J. P. MAUNOIR. *Mémoire sur l'ajustement de l'œil aux différentes distances*. Arch. d. sc. phys. XXXI. S. 909—816.  
 2246. BRETON. *Adaptation de la vue aux différentes distances, obtenue par une compression mécanique, exercée sur le globe oculaire*. Compt. Rend. XLIII. S. 1161—1162. — Inst. S. 455. — Cosmos. IX. S. 690. X. S. 29—30.  
 2247. GOODSIR. *Notice respecting recent discoveries on the adjustment of the eye to distinct vision*. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 343—345. — Edinb. Journ. (2.) III. S. 339—342.

## 1857.

2248. STOLTZ. *Accommodation artificielle ou mécanique de l'œil à toutes les distances*. Compt. Rend. XLIV. S. 988—390, 618—620. — Arch. d. sc. phys. XXXV. S. 139. — Cimento. VI. S. 154—155. — Cosmos. X. S. 320—321.  
 2249. BAHR. *De oculi accommodatione experimenta nova*. Diss. Berlin.  
 2250. TH. H. BERGER. *De oculi humani functione accommodativa*. Berlin.  
 2251. H. MÜLLER. *Ueber einen ringförmigen Muskel am Ciliarkörper*. Arch. f. Ophthalm. III. (1.) IV. (2.) S. 277—285.

## 1858.

2252. W. MANZ. *Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Accommodation des Fisches*. Diss. Freiburg.

## 1859.

2253. J. MANNHARDT. *Bemerkungen über den Accommodationsmuskel und die Accommodation*. Arch. f. Ophthalm. IV. (1.) S. 269—285.  
 2254. CH. ARCHER. *On the adaptation of the human eye to varying distances*. Phil. Mag. (4.) XVII. S. 224—225.  
 2255. RESPIGHI. *Sull'accommodamento dell'occhio umano per la visione distinta*. Mem. di Bologna. VIII. 355—389. — Zeitschr. f. Chem. S. 10—18.  
 2256. MAGNI. *Dell'adattamento dell'occhio umano alla visione distinta*. Cimento. X. S. 12—20.

## 1860.

2257. J. H. KNAPP. *Über die Lage und Krümmung der Oberflächen der menschlichen Krystalllinse und den Einfluss ihrer Veränderungen bei der Accommodation auf die Dioptrik des Auges*. Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 1—52. VII. (2.) S. 136—138.  
 2258. W. HENKE. *Der Mechanismus der Accommodation für Nähe und Ferne*. Arch. f. Ophthalm. VI. 2. S. 53—72.  
 2259. L. HAPPE. *Die Bestimmungen des Sehbereichs und dessen Correction, nebst Erläuterungen über den Mechanismus der Accommodation*. Braunschweig.

## 1861.

2260. A. v. GRAEFE. *Fall von acquirirter Aniridie als Beitrag zur Accommodationslehre*. Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 150—161.

1868.

2261. O. BECKER. *Lage und Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge.* Wien. Med. Jahrb.

2262. WITTER. *Ueber den Grund der accommodatorischen Formveränderung der Linse.* Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 207.

1864.

2263. E. FÖRSTER. *Zur Kenntniß des Accommodationsmechanismus.* Sitzgs.-Ber. d. Ophthalm. Ges. Erlangen. S. 75—86. — Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Septbr. bis Decbr.

1865.

2264. B. ROSOW. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 129—134.

2265. L. MANDELSTAMM. *Zur Ophthalmometrie.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 259—265.

2266. HEIBERG. *Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii.* Arch. f. Ophthalm. XI. 8. S. 168.

2267. F. C. DONDEERS. *Pupil-beweging bij accommodatie.* Nederl. Arch. voor Genees- en Naturk. II.

1866.

2268. v. TRAUTVETTER. *Ueber den Nerv der Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. XII. (1.) S. 95.

2269. C. VÖLKERS u. V. HENSEN. *Studien über die Accommodation.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 46.

1868.

2270. A. COCCIIUS. *Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges nach Beobachtungen im Leben.* Leipzig.

2271. H. DOR. *Ueber einen außergewöhnlichen Fall von Lähmung der Accommodation.* Bern. Mitth. 8. 24—25.

2272. V. HENSEN u. C. VÖLKERS. *Experimentalmuntersuchung über den Mechanismus der Accommodation.* Kiel.

2273. H. KAISER. *Die Mechanik der Accommodation des Auges.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 350.

2274. A. PLIQUÉ. *Étude sur le mécanisme des mouvements intraoculaires et théorie de l'accommodation.* Paris.

2275. SCHUMANN. *Ueber den Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges.* Dresden.

1869.

2276. M. WOINOW. *Zur Frage über die Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 167—172.

1870.

2277. E. ADAMÜCK. *Bijdrage tot het mechanisme der accommodatie.* Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 165. — Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. V. S. 453.

2278. — *Zur Frage über den Mechanismus der Accommodation.* Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 292.

2279. — *Bijdrage tot de physiologie van den N. oculomotorius.* Ond. i. h. physiol. Lab. te Utrecht II. 3. S. 398. — Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 65.

2280. H. HEIBERG. *Die Peripherie der Descemet'schen Haut und ihr Einfluss auf die Accommodation.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 80.

2281. M. LANGENBECK. *Zur Lehre von der Accommodation.* Memorabilien. S. 197.

2282. J. O. MACDONALD. *On the minute anatomy of some parts concerned in the function of accommodation to distance, with physiologic notes.* The quarterl. Journ. of med. sc. July. S. 230.

2283. J. MANNHARDT. *Bemerkungen über den Accommodationsmuskel und die Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. S. 269.

2284. R. SCHIRMER. *Beitrag zur Lehre von der Accommodation.* Berl. klin. Wochenschr. S. 232.

1871.

2285. E. ADAMÜCK. *Bijdrage tot het mechanisme der accommodatie.* Onderz. in het physiol. Lab. te Utrecht II. 3. S. 403.

2286. E. ADAMÜCK u. M. WOINOW. *Ueber die Pupillen-Veränderungen bei der Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 158.

2287. X. GALEZOWSKI. *Quelques aperçus sur l'accommodation de l'œil.* Gaz. hebdom. No. 20.

1872.

2288. J. FRÄNKEL. *Der Accommodationsapparat des menschlichen Auges*. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkde.  
 2289. F. P. LE ROUX. *Sur la multiplicité des images oculaires et la théorie de l'accommodation*. Compt. Rend. Bd. 75. S. 1268—71. — Mondes. (2.) XXIX. S. 549.

1878.

2290. V. HENSEN u. C. VÖLCKERS. *Ueber die Accommodationsbewegung der Chorioidea im Auge des Menschen, des Affen und der Katze*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 156.  
 2291. A. NORTON. *On the accommodation of vision and the anatomy of the ciliary body*. Proc. of the Roy. Soc. of London. XXI. S. 423—425.  
 2292. — *The mechanism of the accommodation of the eye*. Brit. med. Journ. 6. Decbr.  
 2293. PR. SMITH. *The mechanism of the accommodation of the eye*. Brit. med. Journ. 6. Decbr.

1874.

2294. DUWEE. *Du mécanisme de l'accommodation*. Ann. d'Ocul. LXXI. S. 136.  
 2295. W. KRENCHEL. *Ueber die Wirkung des Muscarins auf Accommodation und Pupille*. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 127—134.

1875.

2296. DUFOUR. *Rupture du ligament suspenseur du cristallin et mécanisme de l'accommodation*. Bull. de la Soc. méd. de la Suisse romande.  
 2297. J. GUÉRIN. *La doctrine de l'accommodation*. Gaz. des hôp. S. 1150.  
 2298. G. REULING. *Angeborener Mangel der Iris auf beiden Augen mit vollständiger Accommodationsfähigkeit*. Americ. Journ. of Nat. Sc. Bd. 137. S. 143.  
 2299. WARLOMONT u. NUEL. *De la fonction du muscle ciliaire*. Ann. d'Ocul. LXXIV. Mai u. Juni.

1876.

2300. BÄUERLEIN. *Zur Accommodation des menschlichen Auges*. Würzburg.  
 2301. A. DROUIN. *Note pour démontrer qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'état de l'accommodation de l'œil et le diamètre de la pupille*. Gaz. méd. de Paris. No. 28. S. 329.  
 2302. HJORT. *Die Ciliarfortsätze während der Accommodation*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 205—222.  
 2303. L. V. POULAIN. *Étude sur l'accommodation de l'œil*. Paris. Masson. 31 S.

1877.

2304. E. LANDOLT. *Sur l'accommodation*. Progr. Med. No. 6.

1878.

2305. E. ADAMÜCK. *Einige Bemerkungen in Beziehung der Arbeit von Hensen und Völckers „Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven“*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 229—233.  
 2306. DOMEQ. *Die Accommodationstheorie Rosset's*. Americ. Journ. Octbr.  
 2307. V. HENSEN u. C. VÖLCKERS. *Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven*. Arch. f. Ophthalm. XXIV. S. 1—28.  
 2308. J. HOCK. *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der meridionalen (Längs-) Fasern des Ciliarmuskels*. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 43.  
 2309. ROSSET. *Der Accommodationsmuskel und seine Wirkungsweise*. Americ. Journ. N. S. CLII. S. 349. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 1879. S. 115.

1879.

2310. BOUCHARD. *Ueber Accommodation des Auges*. Rec. de mém. de méd. milit. XXXIV.  
 2311. COULON. *Étude sur le mécanisme de l'accommodation*. Thèse de Paris.  
 2312. DOMEQ. *Der Accommodationsmuskel und seine Wirkungsweise*. Rec. d'Ophthalm.  
 2313. D. HUNT. *A criticism of Dr. de Rosset's theory of the action of the muscle of accommodation*. New-York. med. Journ. No. 1.  
 2314. G. VILMAIN. *Essai sur la physiologie de l'accommodation*. Thèse de Paris. 80 S.

1880.

2315. A. ANGELUCCI. *Sulla durata degli atti accomodativi della lente comparati coi tempi impiegati dell'accommodazione subiettiva e dai movimenti dell'iride*. Arch. d'Ottalm. IX. S. 304—320.  
 2316. ANGELUCCI u. AUBERT. *Beobachtungen über die zur Accommodation des Auges und die zur accommodativen Krümmungsveränderung der vorderen Linsenfläche erforderlichen Zeiten*. Pflüger's Arch. XXII. S. 69—86.

2317. W. E. BRIGGS. *Notiz über die Bedeutung des Ligamentum iridis pectinatum*. Wien. Ber. LXXIX. (3.)  
 2318. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Accommodation*. Real-Encycl. d. ges. Heilkde. Herausg. von A. Eulenburg. I. S. 572—578.  
 2319. — *Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges*. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.) S. 108—114. — Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg. No. 6. Aug. 1879.

1881.

2320. E. EMMERT. *Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges*. Arch. f. Augenheilkde. X. S. 342—365 u. 407—429.

1882.

2321. C. AYRES. *The physiology of accommodation*. New-York. med. Journ. XXXV. S. 483.  
 2322. E. EMMERT. *Die Größe des Gesichtsfeldes in Beziehung zur Accommodation*. Arch. f. Augenheilkde. XI.  
 2323. S. EXNER. *Ueber die Function des Musculus Cramptonianus*. Wien. Akad. Ber. 85. 3. S. 1—10.  
 2324. E. JAVAL. *Théorie de l'accommodation*. Soc. de biol. 6. Mai. Gaz. d. hôp. S. 451.

1883.

2325. H. COHN. *Ein Modell des Accommodationsmechanismus*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. April.  
 2326. DESSAUER. *Zur Zonulafrage*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI. S. 89—99.  
 2327. HOCQUARD u. A. MASSON. *Étude sur les rapports, la forme et le mode de suspension du cristallin à l'état physiologique*. Arch. d'Ophthalm. III. S. 97.  
 2328. E. JAVAL. *Déformation cristallienne et cornéenne dans l'accommodation*. Soc. de biol. 2.  
 2329. KAZAUROW. *Ueber den Einfluss der Accommodation des Auges auf Veränderung der Grenzen des Gesichtsfeldes*. Wratsch No. 2.

1884.

2330. A. HOFFMANN. *Ueber Beziehungen der Refraction zu den Muskelverhältnissen des Auges*. Straßburg. 71 S. — Arch. f. Ophthalm. XXX. 3. S. 301.

1885.

2331. J. W. BARRET. *The velocity of accommodation*. Journ. of Phys. VI. S. 46.  
 2332. DEEREN. *Étude sur le mécanisme de l'accommodation*. Rec. d'Ophthalm. S. 611.  
 2333. H. VIRCHOW. *Die Accommodation bei den Thieren*. Arch. f. Phys. S. 571.  
 2334. WEIDLICH. *Accommodation und Pupillenspiel*. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 164.

1886.

2335. W. B. CANFIELD. *Vergleichend anatomische Studien über den Accommodationsapparat des Vogelauges*. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 28. S. 121—170.  
 2336. E. E. FURNEY. *A theory of the mechanism of accommodation*. Americ. Journ. of Ophthalm. III. S. 9.  
 2337. GIRAUD-TEULON. *Rapport sur un mémoire du docteur Zimmermann, relatif à une nouvelle théorie de l'accommodation de l'œil aux distances*. Bull. Acad. de méd. XV. S. 440.  
 2338. RANDALL. *The mechanism of accommodation and a model for its demonstration*. Americ. Journ. of Ophthalm. III. S. 91.  
 2339. SCHNELLER. *Accommodation durch Axenverlängerung des Auges*. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 390.  
 2340. W. SCHÖN. *Vorrichtung zur Veranschaulichung der Accommodation*. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 415.  
 2341. — *Ueberanstrengung der Accommodation und deren Folgezustände*. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 1. — Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 385.  
 2342. ZIMMERMANN. *Nouveaux éléments à la théorie musculaire de l'accommodation*. Leçon méd. V. S. 60.

1887.

2343. W. J. COLLINS. *An argument in favor of meridional accommodation*. Ophthalm. Hosp. Reports. XI. S. 343.  
 2344. SÄTTLER. *Anatomische und physiologische Beiträge zur Accommodation*. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 3.

2345. W. SCHÖN. a) *Accommodationsmodell*. b) *Ueber die Veränderungen des Auges in Folge der Accommodation bei fortschreitendem Lebensalter*. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 162.
2346. — *Der Accommodationsmechanismus*. Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 224. 1888.
2347. H. AUBERT. *Über die Schön'sche Theorie des Mechanismus der Accommodation*. Rostocker Ztg. No. 281.
2348. A. CHARPENTIER. *Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contractions des muscles de l'œil*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 596.
2349. — *Influences diverses sur la contraction des muscles de l'œil*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 621.
2350. W. H. JESSOP. *The pupil and accommodation*. Ophthalm. Rev. S. 161—225. 1889.
2351. GALLENGA. *Della misura del tempo nelle determinasione dell' accomodamento*. Parma. L. Battei.
2352. HOQUART. *Physiologie, anatomie et pathologie de l'appareil accommodateur*. Arch. d'Ophthalm. IX. S. 358. 1890.
2353. C. DECKER. *Accommodationskrampf, hervorgerufen durch einen Fremdkörper, der seit sechs Jahren im Glaskörper liegt, ohne weitere Reizerscheinungen zu verursachen*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXVIII. S. 500—501.
2354. G. C. HARLAN. *A case of traumatic dislocation of the lens illustrating the theory of visual accommodation*. Med. News. Philadelphia. VI. S. 354.
2355. J. P. MORAT und M. DOYON. *Le grand sympathique nerf de l'accommodation pour la vision des objets éloignés*. Compt. Rend. CXII. S. 1327—1329. 1892.
2356. TH. BEER. *Studien über die Accommodation des Vogelauges*. Pflüger's Arch. Bd. 53. S. 175—237.
2357. C. NICOLAI. *Over het mechanisme der accommodatie*. Erste Vergadering van het Nederlandsch Oogheelkundig Gezelschap Rotterdam. Weekblad. No. 26. S. 911.
2358. C. E. SEASHORE. *On monocular accommodation-time*. Studies from the Yale psychol. Labor. 1892/93. S. 56.
2359. M. TSCHERNING. *Note sur un changement jusqu'à présent inconnu, que subit le cristallin, pendant l'accommodation*. Arch. de Phys. norm. et pathol. Série V. T. 4. S. 158—164. — Arch. d'ophthalm. XII. S. 168—174. 1893.
2360. TH. GUILLOZ. *Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif*. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 676.
2361. A. MICHEL. *Beitrag zur Frage der Accommodation*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 223—251, 267—296.
2362. M. TSCHERNING. *Le mécanisme de l'accommodation*. Extrait d. Ann. de la Poliol. de Paris. 1894.
2363. TH. BEER. *Die Accommodation des Fischeauges*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 58. S. 523—650.
2364. J. BJERRUM. *Accommodationsmechanismen*. Med. Aarskrift. Kopenhagen.
2365. O. LANGE. *Zur Lehre von der Accommodationswirkung auf das Auge*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 94—96.
2366. C. NICOLAI. *Ueber den Mechanismus der Accommodation*. Diss. Nymwegen u. Heidelberg. 29 S.
2367. M. TSCHERNING. *Etude sur le mécanisme de l'accommodation*. Arch. de Phys. (5.) VI. S. 40—53.
- 2367a. — *La déformation de la cristalloïde antérieure pendant l'accommodation*. Compt. Rend. de la Soc. fr. d'Ophthalm.

## § 13.

## Von der Farbenzerstreuung im Auge.

1704.  
2368. J. NEWTON. *Optics*. B. I. P. II. Prop. VIII\*.  
1747.  
2369. L. EULER. *Sur la perfection des verres objectifs des lunettes*. Mém. de Berlin. S. 285  
1753.  
2370. L. EULER. *Examen d'une controverse sur la loi de réfraction des rayons de différentes couleurs par rapport à la diversité des milieux transparents par lesquels ils sont transmis*. Mém. de Berlin. 1753. S. 249.  
1754.  
2371. L. EULER. *Recherches physiques sur la diverse réfrangibilité des rayons de lumière*. Mém. de Berlin. 1754. S. 260.  
1767.  
2372. D'ALEMBERT. *Novv. recherches sur les verres optiques*. Mém. de l'Acad. de Paris. S. 81\*.  
1789.  
2373. MASKELYNE. *Phil. Transact.* LXXIX. S. 256\*.  
1798.  
2374. COMPAGNON. *Observationes de coloribus apparentibus*. Patavini.  
1801.  
2375. TH. YOUNG. *Phil. Transact.* P. I. S. 50\*.  
1805.  
2376. MOLLWEIDE. *Gilbert's Ann.* XVII. S. 328 u. XXX. S. 220.  
1814.  
2377. \*J. FRAUNHOFER. *Gilbert's Ann.* LVI. S. 304. — *Schumacher's astronom. Abh.* Altona. 1823. Heft II. S. 39.  
1826.  
2378. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. Leipzig. S. 195 u. 414\*  
1830.  
2379. \*TOURNAI. *Ueber Chromasie des Auges*. *Meckel's Arch.* S. 129\*.  
1837.  
2380. MILE. *Pogg. Ann.* XLII. S. 64.  
1842.  
2381. A. NIEDT. *De dioptrici oculi coloribus ejusque polyopia*. Diss. Berlin.  
1847.  
2382. A. MATTHIESSEN. *Compt. Rend.* XXIV. S. 875; — *Institut.* No. 698. S. 162; — *Pogg. Ann.* LXXI. S. 578\*; — *Friedr.'s Notizen.* III. S. 341; — *Arch. d. sc. phys. et nat.* V. S. 221; — *Berl. Ber.* S. 183\*.  
2383. L. L. VALLÉE. *Compt. Rend.* XXIV. S. 1096; — *Berl. Ber.* S. 184\*.  
1849.  
2384. J. D. FORBES. *Proc. Edinb. Roy. Soc.* Decbr. 3. S. 251; — *Silliman's Journ.* 2. XIII. S. 413; *Berl. Ber.* 1850. S. 492\*.  
1852.  
2385. L. L. VALLÉE. *Compt. Rend.* XXXIV. S. 321; — *Berl. Ber.* S. 308\*.  
1853.  
2386. L. L. VALLÉE. *Sur l'achromatisme de l'œil*. *Compt. Rend.* XXXVI. S. 142—144  
480—482.  
1855.  
2387. CZERMAK. *Zur Chromasie des Auges*. *Wien. Sitzgs.-Ber.* XVII. S. 563.  
1856.  
2388. A. FICK. *Einige Versuche über die chromatische Abweichung des menschlichen Auges*. *Arch. f. Ophthalm.* II. 2. S. 70—76.

1858.  
2389. F. LASER. *De achromasia oculi humani*. Regiomani.  
1862.  
2390. F. P. LE-ROUX. *Expériences destinées à mettre en évidence le défaut d'achromatisme de l'œil*. Ann. de chimie. (3.) LXVI. S. 173—182. — Cosmos. XX. S. 638—639.  
2391. TROUSSART. *Défaut d'achromatisme de l'œil*. Presse scientifique. S. 72—74.  
1868.  
2392. B. A. POPE. *Das Farbenspectrum als Mittel zur Messung der Accommodation und der chromatischen Abweichung des Auges*. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 41.  
1867.  
2393. TROUSSART. *Achromatisme de l'œil*. Mondes. (2.) XIV. S. 591—595.  
1868.  
2394. W. v. BEZOLD. *Ueber Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut*. Arch. f. Ophthalm. XIV. (2.) S. 1.  
1869.  
2395. W. v. BEZOLD. *Ueber objective Darstellung von Zerstreuungsbildern*. Arch. f. Ophthalm. XV. (3.) S. 281—283.  
2396. — *Versuche über Zerstreuungsbilder*. Pogg. Ann. Bd. 138. S. 554—560.  
1870.  
2397. W. v. BEZOLD. *Sur les images de diffusion*. Ann. de chim. (4.) XX. S. 225.  
1875.  
2398. M' LEOD. *Some observations on the defects of the human eye as regards achromatism*. Chem. News. XXXI. S. 170. Phys. Soc. April 1875.  
1877.  
2399. S. P. THOMPSON. *On the chromatic aberration of the eye in relation to the perception of distance*. Philos. Mag. Juli 1877.  
1880.  
2400. PROMPT. *Note sur le défaut de l'achromatisme de l'œil*. Arch. de physiol. Jan.—Febr. 1881.  
2401. PROVENZALI. *Sull' acromatismo dell' occhio*. Atti dell' Acc. pont. de Nuovi Lincei. XXXIV. Sess. I—III. Roma.  
1882.  
2402. PROVENZALI. *Sull' acromatismo dell' occhio*. Riv. scientif. ind. XIII. No. 21—22.  
— 1887.  
2403. O. TUMLITZ. *Ueber ein einfaches Verfahren, die Farbenerstreuung des Auges direct zu sehen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 594.  
2404. M. WOLF. *Ein Versuch zur Berechnung der chromatischen Längenabweichung des menschlichen Auges*. Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 39.  
1888.  
2405. M. WOLF. *Ueber die Farbenerstreuung im Auge*. Wiedem. Ann. Bd. XXXIII. S. 548.

## § 14.

## Monochromatische Abweichungen.

## 1. Aeltere Litteratur.

1694.  
2406. DE LA HIRE. *Accidens de la vue*. Mém. de l'Acad. de Paris. S. 400.  
1738.  
2407. JURIN. *Essay on distinct and indistinct vision*. Smith's Optics. S. 156.  
1789.  
2408. HELSHAM. *A course of lectures in natural philosophy*. London.



1740.  
2409. WINTRINGHAM. *Experimental inquiry on some parts of the animal structure.* 1801.  
2410. TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye.* Philos. Transact. for 1801. I. S. 43\*. 1809.  
2411. HASSENFRATZ. *Sur la forme apparente des étoiles et des lumières, vues à une très-grande distance et sous un très-petit diamètre.* Ann. de Chimie. T. LXXII. S. 5. 1810.  
2412. G. H. GERSON. *De forma corneae oculi humani deque singulari visus phenomeno.* Gottingae. 1818.  
2413. FISCHER. *Über gewisse Gesichterscheinerungen.* Berliner Denkschriften für 1818 u. 1819. S. 46. 1819.  
2414. PURKINJE. *Beiträge zur Kenntniss des Sehens.* Prag. S. 113—119\*. 1824.  
2415. PÉCLET. Ann. d. Chimie et d. Phys. LIV. S. 379; Pogg. Ann. XXXIV. S. 557.  
2416. AIMÉE. Ann. d. Chimie et d. Phys. LVI. S. 108. 1825.  
2417. G. B. AIRY. Transact. of the Cambridge Phil. Soc. Vol. II. S. 267—271.  
2418. PURKINJE. *Neue Beiträge zur Kenntniss des Sehens.* Berlin. S. 139—146, 173\*.  
2419. D. BREWSTER. Edinb. Journ. of Sc. XIV. S. 322. (Ueber Airy's Auge.) 1830.  
2420. F. SZOKÁLSKI. *Sur la diplopie uniloculaire ou double vision d'un œil.* Diss. Paris 1842.  
2421. A. NIEDT. *De dioptrici oculi coloribus ejusque Polyopia.* Diss. Berolini. 1845.  
2422. GUÉBARD. Institut. No. 581. S. 64.  
2423. STURM. *Mémoire sur la théorie de la vision.* Compt. Rend. T. XX. S. 554, 761 u. 1238. 1846.  
2424. VOLKMANN. Art.: *Sehen*, in R. Wagner's Handwörterb. f. Physiologie. 1847.  
2425. CHALLIS. Phil. Mag. (3.) XXX. S. 366; — Transact. of the Cambr. Phil. Soc. II. 1848.  
2426. H. MEYER. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. V. S. 368.  
2427. HEINEKEN. Phil. Mag. (3.) XXXII. S. 318.  
2428. HAMILTON. Forriep's Notizen. VII. S. 219.  
2429. SEHNYDER. Verh. d. schweiz. nat. Ges. S. 15. 1849.  
2430. WALLMARK. Oefvers. af Akad. förhandlingar. S. 41; — Pogg. Ann. LXXXII. S. 129. 1850.  
2431. CRANMORE. Phil. Mag. (3.) XXXVI. S. 485.  
2432. BAUDRIMONT. Compt. Rend. de l'Acad. d. sc. XXXIII. S. 496; Institut. No. 931; — Phil. Mag. (4.) II. S. 575. 1851.  
2433. A. BEER. *Über den Hof um Kerzenflammen.* Pogg. Ann. LXXXIV. S. 518.  
2434. A. FICK. *De errore optico quodam asymmetria bulbi oculi effecto.* Marburg. Ausz. in Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. Neue Folge. II. S. 83. 1852.  
2435. \*FLIEDNER. *Beobachtungen über Zerstreuungsbilder im Auge, sowie über die Theorie des Sehens.* Pogg. Ann. LXXXV. S. 321\*, 460\*. LXXXVI. 336\*; Moigno Cosmos. I. S. 333.  
2436. TROUSSART. Compt. Rend. d. l'Acad. d. sc. XXXV. S. 134—136, 398; — Arch. de Genève. XX. S. 305; — Institut. S. 304.  
2437. STELLWAG VON CARION. *Ueber doppelte Brechung und davon abhängige Polarisation des Lichtes im menschlichen Auge.* Wien. Sitzgs.-Ber. VIII. S. 82; — Denkschr. d. k. k. Acad. in Wien. V. 2. S. 172; — Zeitschr. d. Aerzte zu Wien. 1853. Heft 10 u. 11; — Fechner's Centr.-Bl. 1854. S. 281—292.

2438. A. MÜLLER. *Ueber das Beschauen der Landschaften mit normaler und abgeänderter Augenstellung.* (Angeblich von Astigmatismus herrührend.) Pogg. Ann. LXXXVI. S. 147—152. — *Cosmos*. I. S. 336.
2439. A. BEER. *Ueber den optischen Versuch des Herrn Libri.* Pogg. Ann. LXXXVII. S. 115—120.
2440. J. HIPPLESLEY. *Phenomena of light.* Athen. S. 1069—1070 u. 1368.
2441. R. W. H. HARDY. *Phenomena of light.* Athen. S. 1306.  
1858.
2442. G. Th. FECHNER. *Ueber einige Verschiedenheiten des Sehens in verticalem und horizontalem Sinne nach verschiedenen Beobachtungen.* Fechner's Centralbl. S. 73—85, 96—99, 374—379 u. 558—561.
2443. L. L. VALÉE. *Théorie de l'œil.* Compt. Rend. XXXVI. S. 769—778 u. 865—867.
2444. FLIEDNER. *Zur Theorie des Sehens.* Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 29—44.
2445. H. MEYER. *Ueber die sphärische Abweichung des menschlichen Auges.* Pogg. Ann. LXXXIX. S. 429 u. 540—568.
2446. A. BEER. *Ueber den Hof um Kerzenflammen.* Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 595—597.
2447. POWELL. *On a peculiarity of vision.* Report of the Brit. Ass. 1852. 2. S. 11.  
1854.
2448. J. P. DEPIGNY. (Hof um Kerzenflammen.) Arch. d. sc. phys. XXVI. S. 166—172.
2449. A. FICK. *Henle u. Pfeuffer's Zeitschr.* N. F. V. S. 277.
2450. J. GUT. *Ueber Doppeltsehen mit einem Auge.* Diss. Zürich. — *Henle und Pfeuffer's Zeitschr.* (2.) IV. S. 395—400.  
1855.
2451. *Ueber den Gang der Lichtstrahlen im Auge.* Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 269—282. Arch. d. sc. phys. XXXII. S. 145—146.
2452. H. MEYER. *Ueber den die Flamme eines Lichts umgebenden Hof u. s. w.* Pogg. Ann. XCVI. S. 235—262, 603—607 u. 607—609.  
1856.
2453. H. MEYER. *Ueber die Strahlen, die ein leuchtender Punkt im Auge erzeugt.* Pogg. Ann. XCVII. S. 233—260. XCVIII. S. 214—242.  
1857.
2454. VAN DER WILLIGEN. *Eine Lichterscheinung im Auge.* Pogg. Ann. CII. S. 175 bis 176.
2455. J. TYNDALL. *Philos. Mag.* (4.) XI. S. 332. (Ein Fall, wo Interferenzringe im Gesichtsfelde erschienen, ähnlich denen eines mit Lycopodium bepulverten Glases.)  
1858.
2456. G. M. CAVALLIERI. *Sulla cagione del vedere le stelle e i punti luminosi affetti da raggi.* Cimento. VIII. S. 321—360.  
1859.
2457. KNAPP. *Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges.* Heidelberg.  
1860.
2458. F. ZÖLLNER. *Beiträge zur Kenntniß der chromatischen und monochromatischen Abweichung des menschlichen Auges.* Pogg. Ann. CXI. S. 329—336. — *Ann. de chim.* (3.) LX. S. 506—509.

## 2. Regulärer Astigmatismus.

Weitere Litteratur über Hornhautastigmatismus ist in § 2 angegeben.

2459. WHARTON JONES. *Analysis of my sight, with a view to ascertain the focal power of my eyes for horizontal and for vertical rays, and to determine whether they possess a power of adjustment for different distances.* Proc. of Roy. Soc. X. S. 380—385. *Phil. Mag.* (4.) XX. S. 480—483.  
1861.
2460. F. C. DONDERS. *Beiträge zur Kenntniß der Refractions- und Accommodationsanomalien.* Arch. f. Ophthalm. VII. (1.) S. 155—204.  
1862.
2461. FÖRSTER. *Ophthalmologische Beiträge.* Berlin, Enslin.

2462. J. H. KNAPP. *Ueber die Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianen*. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 186—241.
2463. GIRAUD-TEULON. *Causes et mécanisme de certains phénomènes de polyopie monoculaire*. Compt. Rend. LIV. S. 904—906 u. 1130—1131. — Institut 1862. S. 138—139 u. 173.
2464. F. C. DONDERS. *Astigmatismus und cylindrische Gläser*. Berlin.
2465. — *Astigmatisme en cylindrische glazen*. Utrecht. 1863.
2466. BUMSTEAD. *Sur l'astigmatisme*. Améric. med. Times. N. S. VII. S. 18.
2467. B. A. POPE. *Beiträge zur Optik des Auges*. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 41—63.
2468. C. KUGEL. *Ueber die Wirkung schief vor das Auge gestellter sphärischer Brillengläser beim regelmäßigen Astigmatismus*. Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 89—96.
2469. — *Ueber Schiefsehen bei Astigmatismus*. Wien. med. Wochenschr. No. 27, 28 u. 29.
2470. MIDDELBURG. *De Zidplaats van het Astigmatisme*. Utrecht. Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 4. S. 146.
2471. — *Der Sitz des Astigmatismus*. Graefe's Arch. X. (2.) S. 83.
2472. PH. H. KNAUTH. *Ueber Astigmatismus*. Diss. Leipzig.
2473. DERBY HASKET. *Quatre cas d'astigmatisme*. Améric. med. Times. N. S. VII. 24.
2474. ROTEMUND. *Ueber Weit- und Uebersichtigkeit und über Astigmatismus*. Bayr. ärztl. Intelligenzbl. No. 19.
2475. SCHWEIGGER. *Ueber die Diagnose und Correction des Astigmatismus*. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 178.
- 1864.
2476. F. C. DONDERS. *Der Sitz des Astigmatismus (nach Middelburg's Resultaten) und die Excursionen der Bewegungen des emmetropischen und ametropischen Auges (nach Schuurmann)*. Arch. f. Ophthalm. X. (2.) S. 83—108. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. II. S. 92—245. III. S. 27.
2477. — *Anomalies of accommodation and refraction*. London. S. 449—556.
2478. J. H. KNAPP. *Ueber die Diagnose des irregulären Astigmatismus*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 304—316.
- 1865.
2479. BUSINELLI. *Un cas d'astigmatisme*. Giorn. d'Oftalm. Ital. VII. S. 10. — Ann. d'ocul. LIII. S. 258.
2480. A. CLASSEN. *Ueber Metamorphopsie*. Arch. f. Ophthalm. X. (2.) S. 155. — Schmidt's Jahrb. CXXV. S. 228.
2481. L. KUGEL. *Ueber die Sehschärfe bei Astigmatikern*. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 106—113.
2482. H. KAISER. *Zur Theorie des Astigmatismus*. Arch. f. Ophthalm. XI. 3. S. 186—229.
2483. X. GALEZOWSKI. *Étude sur la diplopie monophthalmique*. Ann. d'Ocul. LIV. S. 199—208.
2484. — *Tableau synoptique de la réfraction de l'œil, choix des lunettes*. Paris, Leclerc.
2485. E. JAVAL. *Note sur le choix des verres cylindriques*. Ann. d'Ocul. LIII. S. 50.
2486. — *Ueber ein neues Instrument zur Prüfung des Astigmatismus*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 336.
2487. — *Nouvelles règles à calcul*. Ann. d'ocul. LIII. S. 181.
2488. — *De la neutralisation dans l'acte de la vision*. Ann. d'ocul. LIV. S. 9.
2489. HASNER v. ARTHA. *Klinische Vorträge über Augenheilkunde*. 2. Abth.: *Krankheiten der Hornhaut etc.* Prag, Credner. S. 141—145.
- 1866.
2490. A. BUROW. *Ueber Javal's règle à calcul*. Arch. f. Ophthalm. XII. 2. S. 308.
2491. JOHN GREEN. *Toetslynen tot bepaling van astigmatisme*. Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 7. S. 155. Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. II.
2492. E. JAVAL. *Sur le choix des verres cylindriques*. Ann. d'Ocul. LV. S. 5—29.
2493. — *Histoire et bibliographie de l'astigmatisme*. Ann. d'Ocul. LV. S. 105—127.
2494. LAURENT. *Étude sur l'histoire de l'art ophtalmologique*. Thèse de Paris. S. 74 u. 75.
2495. A. NAGEL. *Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus*. Arch. f. Ophthalm. XIII. 1. S. 25—30.
- 1867.
2496. J. GREEN. *Ueber die Auffindung und Messung von Astigmatismus*. Americ. Journ. of med. Sc. Jan.

2497. E. JAVAL. *De l'astigmatisme*. Rev. méd. II. S. 52.  
 2498. — *Nouvel instrument pour la détermination de l'astigmatisme*. Ann. d'oculist. T. 57. S. 89.
- 1868.
2499. O. BECKER. *Tafeln zur Bestimmung des Astigmatismus*. Wien.  
 2500. W. DOBROWOLSKY. *Ueber verschiedene Veränderungen des Astigmatismus unter dem Einfluß der Accommodation*. Arch. f. Ophthalm. XIV. (3.) S. 51—105.  
 2501. F. E. REUSCH. *Theorie der Cylinderlinsen*. Leipzig. Teubner.
- 1869.
2502. E. BRÜCKE. *Ueber asymmetrische Strahlenbrechung im menschlichen Auge*. Wien. Ber. LVIII. 2. S. 821—829.  
 2503. JOHN GREEN. *On a new System for Tests for the Detection and Measurement of Astigmatism with an Analysis of sixty four Cases of refractive Anomalies observed by the aid of this Method*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 131.  
 2504. — *On a colour Test for Astigmatism*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 130.  
 2505. E. JAVAL. *De la lentille de Stokes*. Ann. d'oculist. T. 61. S. 73.  
 2506. H. D. NOTES. *Observations in Astigmatism*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. IV. V.  
 2507. O. M. PRAY. *Test Type for Astigmatism*. Arch. f. Ophthalm. and Otol. I. II. S. 17.  
 2508. — *Probebuchstaben zur Prüfung des Astigmatismus*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. (1.) S. 147.  
 2509. R. SCHIRMER. *Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermetropie*. Ann. d'Ocul. LXII. S. 202.  
 2510. H. SNELLEN. *De richting der hoofdmeridianen van het astigmatische oog*. Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 151. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 191—207.
- 1870.
2511. HEYMANN. *Astigmatismus-Tafeln nach Dr. Pray*. Leipzig. Engelmann.  
 2512. H. SNELLEN. *De richting der hoofdmeridianen van het astigmatische oog*. Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. V. S. 43.
- 1871.
2513. E. BERLIN. *Zur Berechnung des Astigmatismus der Hornhaut*. Klin. Mon.-Bl. IX. S. 217.  
 2514. G. HAY. *Ueber Knapp's allgemeine Formeln für astigmatische Strahlen und deren Special-Anwendung auf das Auge*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. II. (1.) S. 187.  
 2515. STRAWBRIDGE. *An additional method for the determination of Astigmatism*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 100—105.
- 1872.
2516. E. JAVAL. *Des variations de l'astigmatisme*. Compt. Rend. de la soc. de Biol. 5 juill. S. 270.  
 2517. — *Divers appareils pour la mesure de l'astigmatisme*. Compt. Rend. de la soc. de Biol. 5 juill. S. 303.  
 2518. — *Appareil pour la mesure de l'astigmatisme*. Gaz. med. de Paris.  
 2519. H. SNELLEN. *Die Stokes'sche Linse mit constanter Axe*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 78—88.
- 1874.
2520. H. SNELLEN u. E. LANDOLT. *Die Functionsprüfungen des Auges*. Gräfe-Sämisch Handbuch d. ges. Augenheilkde. Bd. III. Cap. I. Leipzig.
- 1876.
2521. L. MAUTHNER. *Die optischen Fehler des Auges*. Wien. S. 43 u. 564.  
 2522. J. TWEDDY. *On an improved Optometer for estimating the degree of abnormal regular Astigmatism*. Lancet. 28. Octbr.
- 1877.
2523. G. HAY. *Ueber die analytischen Bedingungen derjenigen Form des astigmatischen Strahlenbüschels, in welcher die beiden Brennpunkte auf einander und jede auf der Axe des Strahlenbüschels senkrecht stehen, und über die Correction eines solchen Strahlenbüschels durch eine planocylindrische Linse*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. VI. S. 48.

## 1878.

2524. BRAILEY. *Ueber Astigmatismus*. Guy's Hosp. Rep. f. 1878.  
 2525. MAIMONIDE LEVI. *Praktischer Nachweis des Astigmatismus und eine leichte Methode selbigen zu corrigiren*. Ann. di Ottalm. 2/3. S. 232.  
 2526. E. JAVAL. *Lentille de Stokes modifiée*. Ann. d'oculist. T. 80. S. 201.  
 2527. M. PESCHEL. *Ueber den Astigmatismus des indirecten Sehens*. Pflügers Arch. Bd. 18. S. 504.

## 1879.

2528. GRADLE. *Die Wirkung des Ciliarmuskels bei Astigmatismus*. Americ. Journ. of med. sc. Bd. 153. Jan.  
 2529. VAN HAAFTEN. *Het bepalen van Astigmatisme*. Diss. Utrecht. XIX. J. Veral. betr. het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 63—88.  
 2530. E. JAVAL. *Sur l'astigmatisme*. Soc. de Biol. 22. Febr.

## 1880.

2531. T. ANDERSON. *Improved apparatus to the objective estimation of astigmatism*. Rep. Brit. Assoc. S. 463—465.  
 2532. E. JAVAL. *Mesure subjective rapide de l'astigmatisme*. Séances de la soc. de Physique. S. 138.  
 2533. C. J. A. LEROY. *Sur l'astigmatisme*. Compt. Rend. XC. No. 22. S. 1277—1279.  
 2534. A. PLACIDO. *Nouvel instrument pour la recherche rapide des irrégularités de courbure de la cornée: l'astigmatoscope explorateur*. Period. de Oftalm. prat., revisa bimens. L sabon. Sept.-Nov.

## 1881.

2535. E. JAVAL. *De la mesure subjective et objective de l'astigmatisme*. Ann. o'oculist. T. 86. S. 64.  
 2536. A. LEROY. *Théorie de l'astigmatisme*. Arch. d'Ophthalm. I. 3. S. 220—260. I 4. S. 335—370.

## 1882.

2537. E. BERGER. *Zur Diagnostik der Krümmungsanomalien der Hornhaut mit dem Keratoscop*. Berl. klin. Wochenschr. No. 50.  
 2538. — *Ein modificirtes Keratoscop*. Wien. med. Presse. No. 46.  
 2539. BERGMEISTER. *Demonstration des Keratoscops von Placido*. Anz. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. No. 2.  
 2540. L. DA FONSECA. *Astigmatoscope*. Arch. ophthalm. de Lisboa. Jan.—Febr.  
 2541. FRAENKEL. *Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Augenheilk. S. 89.  
 2542. GAVARRET. *Astigmatisme et ophthalmométrie*. Rev. Scientif. XXX. S. 74.  
 2543. HASNER. *Ueber Dr. Placido's Keratoscop*. Prager med. Wochenschr. S. 121.  
 2544. HIRSCHBERG. *Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 59.  
 2545. E. JAVAL. *Contribution à l'ophthalmométrie*. Ann. d'oculist. T. 87. S. 213.  
 2546. — *Deuxième contribution à l'ophthalmométrie*. Ann. d'oculist. T. 88. S. 33.  
 2547. LEROY. *Sur la théorie de l'astigmatisme*. Rev. gén. d'ophthalm. I. S. 129.  
 2548. L. DE WEAVER u. MASSELOU. *Astigmomètre*. Centralbl. f. prakt. Aerzte. VI. S. 44.  
 2549. WOLFSKEHL. *Ueber Astigmatismus in Thieraugen und die Bedeutung der spaltförmigen Pupille*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. S. 7.

## 1883.

2550. A. ANGELUCCI. *Ricerche ottalmometriche per determinare lo astigmatismo irregolare della cornea conica*. Ann. di Ottalm. XII. S. 48.  
 2551. BONO. *Dell' astigmatismo negli operati di cataratta per estrazione*. Giorn. Acc. di med. di Torino. XLVI. No. 3.  
 2552. SW. M. BURNETT. *Refraction in the principal meridians of a triaxial ellipsoid, with remarks on the correction of astigmatism by cylindrical glasses and an historical note on corneal astigmatism. With a communication of the monochromatic aberration of the human eye in Aphakia by W. M. Harkness*. Arch. of Ophthalm. XII. 1. S. 1.  
 2553. — *Character of the focal lines in astigmatism*. Arch. of Ophthalm. XII. S. 310.  
 2554. DÖRFFEL. *Das stabile Keratoscop*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 30.  
 2555. W. HARKNESS. *On the monochromatic aberration of the human eye in Aphakia*. Arch. of Ophthalm. XII. No. 1.  
 2556. G. HAY. *Some additional remarks on the theory of the astigmatic pencil*. Transac. of the Amer. Ophthalm. Soc. for 1883. S. 549.

2557. A. v. HIPPEL. *Ueber verschiedene Methoden zur Bestimmung der Refraction, speciell des Astigmatismus.* Berl. klin. Wochenschr. No. 25.
2558. A. JAVAL. *Troisième contribution à l'ophtalmométrie.* Ann. d'oculist. T. 89. S. 5.
2559. A. IMBERT. *De l'astigmatisme.* Paris. 107 S.
2560. LANDESBERG. *Auftreten von regelmäßigem Astigmatismus bei gewissen Refraktions- und Accommodationsanomalien.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Decbr.
2561. L. MATTHIESSEN. *Ueber die Form der unendlich dünnen astigmatischen Strahlenbündel und über die Form der Kummer'schen Modelle.* Sitzgs.-Ber. d. Bayer. Akad. u. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 10.
2562. E. NORDENSON. *Recherches ophtalmométriques sur l'astigmatisme de la cornée chez des écovieux de 7 à 20 ans.* Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 110.
2563. C. A. OLIVER. *Description of a revolving, astigmatic disk.* Med. news. 6. Okt.
2564. G. PRIVAT. *Considérations sur l'astigmatisme.* Montpellier. 69 S.
2565. WECKER u. MASSELOU. *Modification apportée à l'astigmomètre.* Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 138.
2566. — *La kératoscopie clinique.* Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 165.
2567. W. ZEHENDER. *Zur Astigmatometrie.* Ber. d. XV. Vers. d. ophtalm. Ges. S. 29 u. 176.
- 1884.
2568. G. B. AIRY. *Continuation of observations on the state of an eye affected with astigmatism.* Proc. Cambridge Philos. Soc. V. S. 132.
2569. E. BERGER. *Der Hornhautspiegel (Keratoskop) und seine praktische Anwendung.* Dtsch. Med.-Ztg. Heft 6.
2570. E. JAVAL. *Sur l'astigmatisme statique du cristallin.* Bull. soc. phil. (7.) VIII. S. 132.
2571. A. LEAHY. *On keratotomy as a means of diagnosing errors of refraction.* Indian med. Gaz. XIX. S. 184.
- 1885.
2572. E. H. BENNET. *Note on a ready method of demonstrating the alternation of the sectors of the crystalline lens.* Transact. of the Acad. of med. in Ireland. III. S. 435.
2573. A. J. BLANCH. *El astigmatismo; juicio crítico sobre los procedimientos de su determinación.* Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. IX. S. 3, 97, 145, 241.
2574. S. M. BURNETT. *The action of cylindrical glasses in the correction of regular astigmatism.* Americ. Journ. of Ophthalm. II. S. 275.
2575. H. CULBERTSON. *On the application of cylindrical glasses in spasmodic myopic astigmatism.* Americ. Journ. of Ophthalm. August.
2576. W. S. DENNET. *The Stokes' lens for measuring astigmatism.* Transact. of the Americ. ophtalm. soc. 21. meeting. S. 106.
2577. GAZEPPY. *Optomètre et astigmomètre binoculaire.* Arch. d'Ophthalm. S. 182. — Rec. d'Ophthalm. S. 138.
2578. G. PFALZ. *Ophthalmometrische Untersuchungen über Cornealastigmatismus, mit dem Ophthalmometer von Javal und Schiötz.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. (1.) S. 201—228.
2579. O. PURTSCHER. *Ein Vorschlag hinsichtlich der Gläsercorrection gewisser Krümmungsfehler der Cornea.* Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 68.
2580. S. THEOBALD. *Notes of three cases of progressive astigmatism.* Americ. Journ. of Ophthalm. Juli.
2581. VENNEMANN. *Détermination de l'astigmatisme d'après un procédé nouveau.* Bull. et mém. Soc. franç. d'ophtalm. III. S. 335.
2582. W. v. ZEHENDER. *Demonstration der Wirkung schief stehender sphärischer Linsen.* Ber. üb. d. 17. Vers. d. ophtalm. Ges. in Heidelberg. S. 232.
- 1886.
2583. BERLIN. *Über die Vermehrung der Perception am Thierauge durch Linsenastigmatismus.* Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 387.
2584. CHAUVEL. *De la constatation objective de l'astigmatisme par les images cornéennes au conseil de revision.* Arch. de méd. et de pharm. milit. 16. Mai.
2585. CULBERTSON. *On the use of cylindrical glasses in compound astigmatism.* Amer. Journ. of Ophth. S. 14.
2586. F. DENTI. *Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo.* Gazz. med. Ital. Lomb.
2587. A. KELSCH. *The cause of regular astigmatism.* Med. Record. 17. Juli.

2588. LEMAIRE. *Nouvel optomètre astigmomètre*. Rec. d'Ophth. S. 611.  
 2589. NOYES. *Measurement of astigmatism by the ophthalmometer of Javal and Schiötz*.  
 2590. O. PURTSCHER. *A suggestion concerning the correction by glasses of certain anomalies of the curvatura of the cornea*. Arch. of Ophth. S. 264.  
 2591. H. R. SWANZY. *On uniformity in the designation of the meridian in astigmatism*. Ophth. Rev. S. 208.  
 2592. J. TWEEDY. *On a improved optometer for estimating the degree of astigmatism and other errors of refraction*. Lancet. I. S. 777.  
 1887.  
 2593. R. BERLIN. *Ueber ablenkenden Linsenastigmatismus und seinen Einfluss auf das Empfinden von Bewegung*. Wiesbaden, Bergmann. 20 S. — Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V.  
 2594. BETTREMIEUX. *Notes cliniques sur l'astigmatisme*. Arch. d'Ophth. VII. S. 543.  
 2595. S. M. BURNETT. *On some of the optical properties of spherical and cylindrical lenses placed obliquely to the incident pencils of light*. Americ. Journ. of Ophthalm. IV. S. 15—20.  
 2596. — *A theoretical and practical treatise on astigmatism*. St. Louis.  
 2597. BOEHM. *Die Diagnose des Astigmatismus durch die quantitative Farbensinnprüfung*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 429.  
 2598. E. JAVAL. *De l'astigmatisme*. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 223.  
 2599. — *Sur les variétés de l'astigmatisme régulier*. Soc. franç. d'ophthalm. S. 3.  
 2600. E. JAVAL et MARTIN. *Sur l'astigmatisme*. Rev. gén. d'Ophth. VI.  
 2601. PARENT. *Notation de l'astigmatisme*. Soc. franç. d'ophthalm. S. 228.  
 2602. REYMOND u. P. BAJARDI. *Sulla visione nell'astigmatismo*. Ann. di Ottalm. S. 498.  
 1888.  
 2603. H. CULBERTSON. *Binocular astigmatism*. Journ. of the Amer. med. Assoc. XI. 18. S. 622.  
 2604. D. DESJARDINS. *De la kératoscopie comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme*. Gaz. med. de Montréal. II. S. 214.  
 2605. G. FRAENKEL. *Die Wirkung der Cylinderlinsen veranschaulicht durch stereoskopische Darstellung des Strahlenganges*. Wiesbaden, Bergmann.  
 2606. JACKSON. *Meridional astigmatism*. Amer. Journ. of Ophth. S. 310.  
 2607. C. J. A. LEROY. *Méthode pour déterminer par l'ophthalmomètre l'astigmatisme cornéen*. Rev. gén. d'Ophth. S. 150.  
 2608. G. MARTIN. *Étude sur les contractions astigmatismes du muscle ciliaire*.  
 2609. SUAREZ DE MENDOZA. *Sur la notation de l'astigmatisme*. Rec. d'Ophth. S. 539.  
 2610. NOYES. *On astigmatism*. Amer. Journ. of Ophth. S. 200.  
 2611. RICHHEY. *Binocular astigmatism*. Chicago med. Journ. and Examiner. Juli. 1889.  
 2612. P. BAJARDI. *Della visione negli astigmatici*. Ann. d'Ottalm. XVIII. S. 138.  
 2613. BULL. *Variations de l'astigmatisme avec l'âge*. Compt. Rend. de la VII. réun. de la Soc. franç. d'Ophth. Rev. gén. S. 352.  
 2614. S. M. BURNETT. *Lenticular regular astigmatism*. Philad. Med. News. LV. 11. S. 279.  
 2615. E. GRIMAL. *Étude sur les différents procédés employés dans la détermination de l'astigmatisme*. Montpellier. S. 82.  
 2616. A. GULLSTRAND. *Eine praktische Methode zur Bestimmung des Astigmatismus der Hornhaut mittelst der sog. Denivellirung der ophthalmometrischen Bilder*. Svenska läkarsläsk. förh. S. 128. — Nord. ophth. Tidskr. II. S. 93.  
 2617. C. HINTZI. *Proposition d'un nouveau procédé d'astignométrie*. Arch. de méd. et pharm. mil. S. 201.  
 2618. C. J. A. LEROY. *Influence des muscles de l'œil sur la forme normale de la cornée humaine*. Arch. de Phys. norm. et path. XXI. No. 1.  
 2619. LOISEAU. *Contribution à l'astignométrie et notation l'astigmatisme*. Ann. d'Oc. Bd. 101. S. 99—102.  
 2620. v. D. SPILL. *Die Bestimmung des Astigmatismus mittelst des Ophthalmometers von Javal-Schiötz (mit Prisma von Kagenaar)*. Nederl. Tijdschr. voor Geneeskde. S. 385.  
 1890.  
 2621. C. DU BOIS-REYMOND. *Keratoskop zur Messung des Hornhaut-Astigmatismus*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XIV. S. 257—259.

2622. BULL. *Remarques sur l'examen ophthalmométrique et optométrique d'un certain nombre d'yeux astigmatés.* Rev. gén. S. 301.
2623. CHIBRET. *Astigmatisme selon et contre la règle. Résultats comparés de l'examen objectif (kératométrie, skiascopie) et de l'examen subjectif.* Arch. d'Ophth. X. S. 357—362, 404.
2624. H. DRAPER-SPEAKMAN. *On the degree and demonstration of astigmatism as determined by Javal's Ophthalmometer.* Med. Rec. 5. April.
2625. GALEZOWSKI. *Du diagnostic de l'astigmatisme irrégulier et de sa correction à l'aide des verres cylindro-coniques.* Progr. méd. No. 49. S. 460.
2626. — *Des verres coniques ou cylindro-coniques et de leur emploi dans la correction de la vision dans un astigmatisme irrégulier.* Rec. d'Ophth. No. 8. S. 449.
2627. P. GÉZA. *Ein neues Instrument zur Bestimmung des Astigmatismus.* Szemészet. S. 37.
2628. A. GULLSTRAND. *Bidrag til Astigmatismens Teori.* Nord. med. Ark. XXI. S. 1—64. XXII. S. 288.
2629. — *Contribution à la théorie de l'astigmatisme.* Stockholm.
2630. — *Beitrag zur Theorie des Astigmatismus.* Skand. Arch. f. Physiol. II. S. 269 bis 359.
2631. — *Om Brännlinien vid Astigmatism.* Nord. ophth. Tidskr. III. No. 1.
2632. G. HEINRICH. *Untersuchung über die Wirkung schräggestellter sphärischer Brillengläser an emmetropischen und ametropischen Augen und Vergleichung dieser Wirkung mit der Wirkung cylindrischer Gläser.* Diss. Rostock. Adler's Erben.
2633. F. C. HORT. *A simple and quick method of detecting astigmatism.* Americ. Journ. of Ophth. S. 270—278.
2634. — *A simple and reliable astigmometer.* Journ. americ. med. assoc. XIV. S. 420.
2635. C. JACKSON. *Progressive hyperopic astigmatism.* Transact. of the Americ. Ophth. Soc. XXVI. S. 676.
2636. C. KOLLER. *On the determination of astigmatismus with the ophthalmometer.* Journ. americ. med. assoc. S. 380.
2637. — *Elimination of the cornea and its effect upon the refraction of the eye.* Americ. Journ. of Ophth. Juli.
2638. KUGEL. *Ueber die pathologische Wirkung der Contouren beim monocularen Sehen der Astigmatiker und über Blendung als Ursache des Nystagmus.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (2.) S. 129—162.
2639. L. LEPLAT. *Un instrument pour contrôler l'orientation des verres cylindriques.* Arch. d'Ophth. X. S. 26—36.
2640. J. RÖT. *Ueber Astigmatismus und Ophthalmometrie.* Diss. Zürich. Wiesbaden, Bergmann. 67 S.
2641. SPEAKMAN. *On the degree and demonstration of astigmatism as determined without the use of mydriatics by Javal's ophthalmometer, model of 1889.* Med. Rec. New-York. XXXVII. S. 378.
- 1891.
2642. S. M. BURNETT. *Contributions to keratometry.* Ophthalm. Review. — Americ. med. Assoc. Section of Ophthalm. Jahreskongress zu Washington. Mai.
2643. CHIBRET. *Contribution à l'étude des astigmatismes cornéens et totaux.* Rev. gén. d'Ophth. X. 7. S. 289—292.
2644. GALEZOWSKI. *Du diagnostic de l'astigmatisme irrégulier et de sa correction à l'aide des verres coniques.* Soc. d'ophth. de Paris. III. S. 200.
2645. E. JAVAL. *L'Ophthalmométrie clinique.* In Beiträge zur Psychologie u. Physiologie der Sinnesorgane. Hamburg. L. Voss. Helmholtz-Festschrift. S. 37—48. Auch separat erschienen.
2646. — *Mémoires d'ophtalmométrie.* Paris G. Masson. 626 S. et 135 fig.
2647. G. MARTIN. *Instabilité et étiologie de l'astigmatisme cornéen.* Progr. méd. No. 19—20. Rec. d'Ophth. No. 5. S. 282.
2648. — *De la correction astigmatique.* Ann. d'Oculist. S. 189.
2649. OSTWALT. *De la force réfringente de la cornée, de l'ophtalmométrie et du cylindre correcteur de l'astigmatisme cornéen.* Rev. gén. d'Ophth. No. 5—6.
2650. C. REYMOND. *Annotation sur la vision astigmatique et sur la correction dynamique.* Arch. Ital. de Biolog. Bd. 16. S. 118—125. — Heidelberger Helmholtz-Festschrift. S. 81—85.



2651. R. SIMON. *Beiträge zur Lehre vom Astigmatismus, besonders in Hinsicht auf die Sehschärfe.* Diss. Straßburg. S. 37. (Magdeburg. R. Walper.)  
1892.
2652. BULL. *L'asthénopie des astigmates.* Progr. méd. No. 23—25.
2653. PFLÜGER. *Einige Resultate klinischer Ophthalmometrie.* Verh. d. X. intern. Congr. Bd. IV. S. 140.
2654. D. R. ROOSA. *The prevalence of corneal astigmatism in eyes with normal acuity of vision and without asthenopia.* Med. Rec. 26. Novbr.
2655. G. E. SCHWEINITZ. *Some notes on the corneal astigmatism in 200 eyes measured with the ophthalmometre of Javal in comparison with the total subjective astigmatism after complete mydriasis.* The Times and Register. 19. Novbr. 1892.
2656. H. V. WÜRDEMAN. *What may be considered normal corneal astigmatism? From keratometric measurements of 300 eyes.* Journ. of the Americ. med. Assoc. Apr. 1893.
2657. TH. GUILLOZ. *Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif.* Arch. d'Ophthalm. T. XIII. S. 676.
2658. E. JACKSON. *The crossed cylinder.* Ophthalm. Rec. Vol. 2. No. 6 u. 12.
2659. — *The best form of cylinder test and variable prism with a new phorometer.* Ophthalm. Rec. Vol. III. No. 2 u. 3.
2660. F. OSTWALT. *Recherches expérimentales sur l'influence que l'éloignement de l'œil exerce sur la force réfringente du cylindre correcteur dans les différentes formes d'astigmatisme.* Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 548—555.
2661. C. REYMOND. *Annotazione sulla visione astigmatica e la sua correzione dinamica.* Ann. d'Ottalm. XXII. S. 521.
2662. RISLEY. *The relative importance of astigmatism in the production of asthenopia.* Ann. of Ophthalm. and Otol. Jan.
2663. A. BOTH. *Ueber eine neue stenopäische Brille (Siebbrille).* Vorläuf. Mitth. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 110—112.
2664. C. WEILAND. *History and principles of keratometry; its value and limitation as the correction of astigmatism.* Arch. of Ophthalm. Bd. XXII. S. 37—64.  
1894.
2665. N. ANDOGSKY u. W. DOLGANOW. *Sur l'astigmatisme et sa correction, dans les rapports avec l'usage de l'ophthalmomètre de Javal et Schiöts.* Ann. d'Ocul. Bd. 112. S. 296.
2666. F. VAN FLEET. *Astigmatismus und das Ophthalmometer.* Arch. of Ophthalm. XII. S. 50—60. Dtsch. Auszug von R. Greeff im Arch. f. Augenheilkde. XXX. S. 62.
2667. F. C. HOTZ. *On some modifications of my Astigmometer, and on its efficiency in the examination for Astigmatism.* Ann. of Ophthalm. III. 1.
2668. L. HOWE. *Note on lid pressure as a cause of astigmatism.* Americ. Journ. of Ophthalm. Juli 1894.
2669. E. JACKSON. *Value of the ophthalmometer in practical refraction work.* Ann. of Ophthalm. and Otol. S. 368.
2670. S. MITCHELL. *A case of astigmatism where the contour of the corneae indicates the axes.* Ann. of Ophthalm. and Otol. Vol. III. S. 146.
2671. C. WEILAND. *Description of a new optometer for the correction of astigmatism in distant tests.* Ann. of Ophthalm. and Otol. III. S. 29.
2672. H. WILSON. *Bemerkungen über die Wirkung der schiefen Augenmuskeln bei Astigmatismus.* Arch. of Ophthalm. XXIII. S. 276—282.
2673. A. STEIGER. *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction.* Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 98—111.
2674. — *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction.* 1. Theil. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 135 S.

### 3. Sphärische Aberration und mangelnde Centrirung des Auges.

1869.

2675. A. HOLOWINSKI. *Études expérimentales sur les aberrations de l'œil.* Thèse. Dorpat.  
1876.
2676. L. MATTHIESSEN. *Ueber den Aplanatismus der Hornhaut.* Gräfe's Arch. Bd. 22.

- 1881.
2677. L. MATTHIESSEN. *Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische*. Pflüg. Arch. Bd. 21. S. 287 u. Bd. 26. S. 193.
2678. W. SCHÖN. *Der Aplanatismus der Hornhaut*. Horner-Festschrift Wiesbaden. S. 125–131.
- 1883.
2679. E. JAVAL. *Les yeux décentrés*. Gaz. des Hôp. S. 486.
- 1884.
2680. M. EHRENBROOTH. *Zur Frage über die Lage der Gesichtslinie und die Centrirung der brechenden Flächen im Auge*. Pflüger's Arch. XXXV. S. 390.
- 1885.
2681. ZEHENDER. *Ueber den Gang der Lichtstrahlen bei schräger Incidenz. Ueber aplanatische Brillengläser*. Ber. üb. d. 17. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. S. 29 u. 36.
- 1886.
2682. A. SEELIGER. *Ueber den Einfluss dioptrischer Fehler des Auges auf das Resultat astronomischer Messungen*. Abh. d. math.-phys. Klass. d. Acad. d. Wiss. zu München. S. 665.
- 1888.
2683. JACKSON. *Symmetrical aberration of the eye*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 141.
2684. TSCHERNING. *Le centrage de l'œil humain*. Compt. Rend. Bd. 106. S. 1689.
2685. — *Étude sur la position du cristallin de l'œil humain*. C. R. de l'acad. des sc. 16 avril 1888.
- 1890.
2686. TSCHERNING. *De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfraction de l'œil. Réponse à l'article du Dr. Chibret: Astigmatisme selon et contre la règle*. Arch. d'Ophthalm. X. 5. S. 445.
- 1891.
2687. S. FINSTERWALDER. *Die von optischen Systemen größerer Oeffnung und größeren Gesichtsfeldes erzeugten Bilder. Auf Grund der Seidel'schen Formeln untersucht*. Abhandlg. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München, 1891. 71 S.
2688. SULZER. *La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision*. Arch. d'ophthalm. XI. S. 419–435. — Progr. méd. No. 19–20. — Recueil d'ophthalm. No. 5. S. 282.
- 1892.
2689. SULZER. *La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. 2<sup>e</sup> Partie: Influence de la cornée sur la vision*. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 32–50.
2690. — *La forme de la cornée et son influence sur la vision*. Paris. Steinheil.
- 1893.
2691. LEROY. *Méthode pour mesurer objectivement l'aberration sphérique de l'œil vivant*. Rev. gén. d'Ophthalm. XII. S. 112–115.
2692. — *Sur l'aberration sphérique de l'œil humain; mesure du sénilisme cristallinien*. Compt. Rend. Bd. 116. S. 636–639.
2693. M. TSCHERNING. *L'aberroscope*. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 615–623.
- 1894.
2694. M. TSCHERNING. *Die monochromatischen Aberrationen des menschlichen Auges*. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 456–471.

#### 4. Irregulärer Astigmatismus.

- 1867.
2695. E. SANG. *On some phenomena of indistinct vision*. Proc. Edinb. Soc. VI. S. 58–59.
- 1868.
2696. W. v. BEZOLD. *Über Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut*. Arch. f. Ophthalm. XIV. (2.) S. 1.
- 1869.
2697. W. v. BEZOLD. *Über objektive Darstellung von Zerstreuungsbildern*. Arch. f. Ophthalm. XV. (3.) S. 281–283.
2698. — *Versuche über Zerstreuungsbilder*. Pogg. Ann. Bd. 138. S. 554–560.

1872.  
 2699. G. B. AIRY. *Further Observations on the state of an eye affected with a peculiar malformation.* Nature. V. S. 416. — Cambrid. Philos. Soc. 12. Febr.  
 1875.  
 2700. L. WEISS. *Polyopia monocularis an einem Auge, dessen Hornhaut abnorm gekrümmt ist.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. (2.) S. 187—204.  
 1876.  
 2701. T. W. BACKHOUSE. *Visual phenomena.* Nature XIV. S. 474.  
 2702. WARD. *Visual phenomena.* Nature. XIV. 423.  
 1877.  
 2703. CADIAT. *Polyopie monoculaire.* Gaz. des hôp. No. 6. S. 45.  
 1881.  
 2704. ABERCROMBIE, ADAMS, ORD, NETTLESHIP. *Unicocular diplopia.* Transact. of the Ophthalm. Soc. of the Unit. Kingdom. I. 13. Oct. — Lancet. II. No. 17. — Ophthalm. Rev. Novbr.  
 1882.  
 2705. CHARPENTIER, A. *Sur quelques usages du trou sténopéique.* Ann. d'ophthalm. S. 195.  
 2706. V. SCHULEK. *Die optischen Verhältnisse bei Doppelpupillen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (8.) S. 128.  
 1883.  
 2707. A. ANGELUCCI. *Ricerche oftalmometriche per determinare lo astigmatismo irregolare delle cornee coniche.* Ann. di Ottalm. XII. S. 48.  
 1884.  
 2708. A. ANGELUCCI. *Sulla refrazione e correzione delle cornee coniche sed ectatiche.* Ann. di Ottalm. XIII.  
 1887.  
 2709. A. WILHELM. *Ein Fall von monoculärer Triplopia.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 277.  
 1888.  
 2710. D. AXENFELD. *Il diaframma perforata nell'ottica fisiologica.* Bull. d. r. Acad. med. di Roma. 1888/89. S. 200.  
 2711. H. P. BARRAT. *De la polyopie monoculaire.* Rochefort sur-Mer. 1888. 68 S.  
 2712. S. EXNER. *Ueber den normalen irregulären Astigmatismus.* Graefe's Arch. XXXI. (1.) S. 1.  
 1889.  
 2713. BRUNSWIG. *Diplopia monoculaire.* Rec. d'Ophthalm. S. 468—474.  
 2714. J. C. MC. COMELL. *Coronae round a light produced by a peculiar structure in the eye.* Nature. XL. S. 342.  
 2715. C. J. A. LEROY. *Polyopie monoculaire.* Compt. Rend. de la VII. réun. de la Soc. franç. d'Ophthalm. Rév. génér. S. 350.  
 2716. — *Diplopia monoculaire.* Compt. Rend. de l'acad. des sciences. CVIII. S. 127.  
 2717. G. SANTESON. *Fälle von monoculärer Polyopie.* Svenska läkars. förh. S. 16.  
 2718. — *Monoculare Polyopie.* Hygiea. S. 168.  
 2719. W. SCHÖN. *Eine Verserrungserscheinung am kurzsichtigen Auge.* Arch. f. Augenheilkde. XXI. S. 103.  
 1890.  
 2720. C. LUCANUS. *Ein Fall von monocularem Doppelsehen.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXVIII. S. 282—287.  
 1891.  
 2721. BULL. *De la polyopie monoculaire.* Progr. méd. No. 19—20. — Rec. d'ophthal. No. 5. S. 282.  
 2722. J. H. THOMPSON. *Double monocular diplopia.* Ophthalm. Rev. Aug. u. Sept. (Americ. Med Assoc. Sect. of Ophthalm. Jahrescongr. zu Washington. Mai 1891)  
 1893.  
 2723. TH. AXENFELD. *Über eine eigenthümliche Form von unregelmäßigem Hornhautastigmatismus (corrigirbare partielle Hyperopie), complicirt mit hochgradiger Störung der relativen Accommodation auf dem befallenen Auge.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 33.

## . § 15.

## Die entoptischen Erscheinungen.

Außer den hier aufgeführten Abhandlungen ist auch ein Theil der in § 25 angegebenen Litteratur zu berücksichtigen.

1690.  
2724. M. DECHALES. *Cursus seu mundus mathematicus*. Lugduni. III. S. 402.  
1694.  
2725. DE LA HIRE. *Accidens de la vue*. Mém. de l'Acad. d. sc. S. 358.  
2726. PITCAIRN. *Opera*. Lugd. Bat. S. 203 u. 206.  
1722.  
2727. MORGAGNI. *Adversaria anatomica*. VI. Anim. LXXV. S. 94. Lugd. Bat.  
1740.  
2728. LE CAT. *Traité des sens*. Rouen. S. 289.  
2729. AEPHINUS. *Novi Comment.* Petrop. VII. S. 303.  
1760.  
2730. *Histoire de l'Acad. d. sc. pour l'an 1760*. S. 57.  
1795.  
2731. G. C. BRIDGES et J. H. CH. VOGLER. *De maculis ante oculos volitantibus*. Helmstadt.  
1819.  
2732. PURKINJE. *Beiträge zur Kenntnis des Sehens*. S. 89.\*  
1825.  
2733. PURKINJE. *Neue Beiträge*. S. 115 u. 117.\*  
1834.  
2734. D. BREWSTER. *Observations on the supposed vision of the blood-vessels of the eye*. The London and Edinburgh Philos. Mag. IV. S. 115—120.  
2735. M. GRIFFITH. *Observations on the vision of the retina*. Philos. Magaz. IV. S. 43 bis 46.  
2736. T. W. W. *Observations on the visibility of the retina; with remarks upon its probable cause*. Philos. Mag. IV. S. 354—360.  
1842.  
2737. STEIFENSAND. Pogg. Ann. LV. S. 134.\* v. Ammon's Monatschr. f. Med. I. S. 103.  
2738. SOTTEAU. *Recherches sur les apparences visuelles sans object extérieur, connues sous le nom vulgaire de mouches volantes*. Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gand. XI. Septbr.  
1845.  
2739. \*LISTING. *Beitrag zur physiologischen Optik*. Göttingen.\*  
2740. D. BREWSTER. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XV. S. 377.  
2741. MACKENZIE. Edinb. Med. and Surg. Journ. July.  
1846.  
2742. F. C. DONDERS. *Over entoptische gezichtsverschijnselen en derzelver toepassing voor de herkenning van ooggebreken*. Nederl. Lancet. 1846—47. 2<sup>e</sup> Ser. D. II. bl. 345, 432 u. 537.  
1848.  
2743. D. BREWSTER. *Observations on the supposed vision of the blood-vessels of the eye*. Phil. Mag. XXXII. 1; — Arch. d. sc. phys. et natur. de Genève. VIII. S. 299.  
1849.  
2744. GUDDEN. J. Müller's Arch. S. 522.\*  
1850.  
2745. F. C. DONDERS. *Het entoptisch onderzoek tot herkenning van oogsiecten*. Nederl. Lancet. 1850—51. S. 521.  
1853.  
2746. APPIA. *De l'oeil vu par lui même*. Genève.  
2747. TROUSSART. *Suite des recherches concernant la vision*. Compt. Rend. XXXVI. S. 144—146.

1854.

2748. \*A. DONCAN. *De corporis vitrei structura*. Diss. Trajecti ad Rhenum; — Onderz. ged. in het Physiol. Laborat. d. Utrechtsche Hoogeschool. Jaar. VI. S. 171.  
 2749. BUROW. J. Müller's Arch. S. 166.  
 2750. MEISSNER. *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans*. Leipzig. S. 78.  
 2751. RUETE. *Physikalische Untersuchung des Auges*. Leipzig. S. 24.

1855.

2752. J. JAGO. Proc. Roy. Soc. 18. Jan.  
 2753. H. MÜLLER. *Ueber die entoptische Wahrnehmung der Netzhautgefäße insbesondere als Beweismittel für die Lichtperception durch die nach hinten gelegenen Netzhaut-elemente*. Verh. d. physik.-med. Ges. in Würzburg. Auch sep. Würzburg. Stahel.  
 1856.  
 2754. VIERORDT. *Wahrnehmung des Blutlaufs in den Netzhautgefäßen*. Arch. f. physiol. Heilkde. Heft II.  
 2755. MEISSNER. Henle u. Pfeuffer, Zeitschr. (3.) I. S. 565—566.  
 2756. A. E. LAIBLIN. *Die Wahrnehmung der Choroidealgefäße des eigenen Auges*. Diss. Tübingen.

1857.

2757. J. JAGO. *Ocular spectres, structures and functions as mutual exponents*. Proc. Roy. Soc. VIII. S. 603—610. — Phil. Mag. (4.) XV. S. 545—550.  
 2758. E. C. A. WELLER. *Nonnulla de muscis volitantibus*.

1860.

2759. O. N. ROOD. *On a probable means of rendering visible the circulation in the eye*. Silliman J. (2.) XXX. S. 264—265 u. 385—386.

1861.

2760. L. REUBEN. *On normal quasi-vision of the moving blood-corpuscles within the retina of the human eye*. Silliman J. (2.) XXXI. S. 325—388 u. 417.

1862.

2761. TJEPCO LYCKLAMA & NYCHOLT. *Over sommige entoptische gezichtsverschijnselen*. Leiden.

1863.

2762. L. MAUTHNER. *Zur Lehre vom entommatischen Sehen*. Wien. Ber. Bd. 47.  
 2763. GIRAUD-TEULON. *Physiologie de la vision*. Ann. d'ocul. T. 49. S. 9.

1864.

2764. CZERMAK. *Entoptische Phänomene*. Wien. Sitzgs.-Ber. Bd. 43.  
 2765. A. FICK. *Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane*. S. 251.

1868.

2766. R. HOUDIN. *Nouveau moyen d'exploration de la rétine par les phosphènes. — Images subjectives de la macula lutea et de la fovea centralis*. Mondes. (2.) XVI. S. 764—767. — Compt. Rend. LXVI. S. 630—633.  
 2767. C. NÄGELI. *Ueber selbstbeobachtete Gesichterscheinungen*. Münch. Ber. I. S. 503 bis 532.

1869.

2768. B. A. POPE. *Entoptische Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Blutlauf*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. Bd. I. S. 72—78 u. 459.

1870.

2769. B. A. POPE. *Beiträge zur physiologischen Optik (entoptische Erscheinungen)*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. (2.) S. 197—199.  
 2770. J. L. TUPPER. *On an optical illusion*. Philos. Mag. (4.) Vol. 39. S. 423—428.

1871.

2771. DUBRUNFAUT. *Sur quelques particularités des perceptions visuelles objectives et subjectives*. Mondes. XXVI. S. 77. Compt. Rend. Bd. 73. S. 752.  
 2772. — *Vision*. Institut. S. 102.  
 2773. J. LE CONTE. *On an optical illusion*. Philos. Mag. (4.) XII. S. 266—269.

1872.

2774. O. BECKER. *Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegungen in der menschlichen Netzhaut*. Berlin.  
 2775. HEUSE. *Ueber die Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. 2. S. 236.

1876.

2776. T. W. BACKHOUSE. *Visual phenomena*. Nature. XIV. S. 423.

1878.

2777. BADAL. *Nouveau procédé pour déterminer la situation des objets qui flottent dans le corps vitré*. Gaz. d. Hôpit. S. 237.

1880.

2778. D. P. JOHANNIDES. *Die gefäßlose Stelle der menschlichen Retina und deren Verwertung zur Bestimmung der Ausdehnung der Macula lutea*. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 111.  
 2779. TH. LEBER. *Nachträgliche Notiz über die Gefäße der Macula lutea*. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 271.  
 2780. — *Bemerkungen über das Gefäßsystem der Netzhaut in der Gegend der Macula lutea*. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 127.  
 2781. M. PESCHEL. *Ueber ein neues entoptisches Phänomen an der Macula lutea*. Pflüger's Arch. XXI. S. 399.

1881.

2782. E. v. FLEISCHL. *Physiologisch-optische Notizen*. II. u. III. Mittheilung. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. LXXXIII. 3. Abth.  
 2783. E. FUCHS. *Ueber eine entoptische Erscheinung bei Bewegung des Augapfels*. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. 43—46.  
 2784. L. GERLACH. *Über die Gefäße der Macula lutea*. Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen. 1. Aug. 1881. 1 S.  
 2785. A. v. REUSS. *Notiz über die Netzhautgefäße im Bereiche der Macula lutea*. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 21—26.

1882.

2786. MEUGIN. *Note sur un phénomène subjectif produit par un astigmatisme myopique composé*. Rec. d'Ophthalm. S. 7.

1883.

2787. G. MAYERHAUSEN. *Noch einmal der gefäßlose Bezirk der menschlichen Retina*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 150.

1884.

2788. E. v. FLEISCHL. *Zur Physiologie der Retina*. Wien. med. Wochenschr. N. 10, 11. S. 273, 308.  
 2789. O. W. MAHER. *Spectrum of retinal vessels and yellow spot*. Austral. med. Gaz. November.  
 2790. J. P. NUËL. *De la vision entoptique de la fovea centralis et de l'unité physiologique de la rétine*. Ann. d'Ocul. Bd. 91. S. 95. Arch. de Biol. IV.

1885.

2791. DEEREN. *Contribution à l'étude des images entoptiques*. Rec. d'Ophthalm. S. 282, 539 u. 678.  
 2792. O. W. MAHER. *A method, by which one can see the shadows of ones own retinal vessels and yellow spot*. Austral. med. Gaz. IV. S. 38.  
 2793. D. C. L. OWEN. *The clinical import of entoptic phenomena*. Birmingham med. Rev. XVII. S. 107.  
 2794. L. WOLFFBERG. *Die entoptische Wahrnehmung der Fovea centralis und ihrer Zapfenmosaik*. Arch. f. Augenhkde. XVI. S. 1.

1886.

2795. D. KOKERMÜLLER. *Ueber eine interessante optische Erscheinung*. C. Z. f. Opt. u. Mech. VII. 2—5.

1887.

2796. G. MESLIN. *Sur une expérience relative à la vision*. Journ. de physique. (2 sér.) T. VI.

1888.

2797. J. COLASANTI und G. MENGARINI. *Das physiologische Spektralphänomen*. Moleschott's Unters. z. Naturl. XIII. S. 451.  
 2798. GROSSMANN. *Entoptic Perception of retinal vessels*. Ophthalm. Rev. S. 335.  
 2799. B. LINDSAY. *Optical illusions of motion conflicting theories referred to the test of certain hitherto undescribed entoptical phenomena*. Rep. of the 57. meeting of the Brit. assoc. for the avancem. of sc. held at Manchester 1887. London. S. 781.

2800. B. LINDSAY. *The normal phenomena of entoptic vision distinguished by mechanical causes.* Rep. of the 57. meeting of the Brit. the advancem. of sc. held at Manchester 1887. London. S. 779.  
1891.
2801. P. H. FRIDENBERG. *Ueber die Sternfigur der Krystalllinse.* Dissert. Strahl.
2802. M. TSCHERNING. *Un nouveau phénomène entoptique.* Ann. de la Polid. Décembre.  
1892.
2803. G. L. JOHNSON. *Bemerkungen über die Macula lutea.* Arch. f. Augenhl. S. 157—175.  
1894.
2804. F. DUMMER. *Ueber entoptische Versuche.* Vortrag, gehalten in der Sitzung logischen Klubs in Wien am 24. April 1864. Wien. klin. Wochenschr.

## § 16.

## Das Augenleuchten und der Augenspiegel.

## 1. Das Augenleuchten und der Augenspiegel.

Wegen der Litteratur über binocular Ophthalmoskopie siehe § 30.

- 1704.
2805. MÉRY. *Annales de l'Académie des sciences.*  
1709.
2806. DE LA HIRE. *Annales de l'Académie des sciences.*  
1810.
2807. PREVOST. *Bibliothèque britannique.* XLV.
2808. GRUTHFISEN. *Beiträge zur Physiognosie und Eantognosie.* S. 199.
2809. RUDOLPH. *Physiologie.* I. S. 197.  
1826.
2810. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes.* Leipzig.
2811. ESSER. *Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre.* VIII. S. 399.  
1836.
2812. HASSENSTEIN. *De luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque lucido.* Jenae.  
1839.
2813. BEHR. *Hecker's Annalen.* Bd. I. S. 373.  
1844.
2814. E. BRÜCKE. *Ueber die physiologische Bedeutung der stabförmigen I.* J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 444.  
1845.
2815. E. BRÜCKE. *Anatomische Untersuchungen über die sogenannten leuchten bei den Wirbelthieren.* J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 387.
2816. A. KUSSMAUL. *Die Farbenercheinungen im Grunde des menschlichen Auges.* I.  
1846.
2817. W. CUMMING. *On a luminous appearance of the human eye, and its app the detection of disease of the retina and posterior part of the eye.* Medical Transactions. XXIX. S. 284—296.  
1847.
2818. E. BRÜCKE. *Ueber das Leuchten der menschlichen Augen.* J. Müll. S. 225 u. 479.

## 1851.

2819. H. HELMHOLTZ. *Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge.* Berlin.

## 1852.

2820. TH. RUETE. *Der Augenspiegel und das Optometer.* Göttingen.  
 2821. H. HELMHOLTZ. *Ueber eine neue einfachste Form des Augenspiegels.* Vierordt's Arch. f. physiol. Heilkde. XI. S. 827.  
 2822. F. C. DONDEERS. *De oogspiegel van Helmholtz.* Nederl. Lancet, (ser. 3). Jahrg. I. S. 248.  
 2823. E. FOLLIN. Archives générales de Médecine. Juli.  
 2824. A. COCCIUS. *Ueber die Ernährungsweise der Hornhaut.* Leipzig.  
 2825. FROEBELIUS. Medic. Zeitung Rufelands. No. 46.

## 1853.

2826. A. COCCIUS. *Ueber die Anwendung des Augenspiegels nebst Angabe eines neuen Instruments.* Leipzig.  
 2827. A. C. VAN TRIGT. *Dissertatio de Speculo oculi.* Utrecht; Nederl. Lancet. Ser. 3. Dl. II. S. 430. Deutsch mit Zusätzen von SCHAUENBURG. Lahr 1854.  
 2828. H. A. O. SAEMANN. *De speculo oculi.* Regiomonti.  
 2829. R. ULRICH. *Beschreibung eines neuen Augenspiegels.* Henle u. Pfeuffer Zeitschr. f. ration. Med. Neue Folge. IV. S. 175\*.  
 2830. MEYERSTEIN. *Beschreibung eines neuen Augenspiegels.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rational. Medicin. Neue Folge. IV. S. 310.  
 2831. E. FOLLIN et NACHET. Mém. de la Société de Chirurgie. III.  
 2832. MARESSAL DE MARSILLY. *Notice sur l'ophthalmoscope de Follin et Nachet.* Ann. d'ocul. XXVII. S. 55.  
 2833. F. C. DONDEERS. *Nadere waarnemingen met den oogspiegel.* Nederl. Lancet, (ser. 3). Jahrg. III. S. 486 u. 520.  
 2834. SPENCER WELLS. Medical Times. Septbr.

## 1854.

2835. F. C. DONDEERS. *Verbeteringen van den oogspiegel.* Onderzoekingen gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. bl. 131\* u. 153\*.  
 2836. — *Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge.* Arch. f. Ophthalm. I. (2.) S. 75. — Nederl. Lancet, (ser. 3.) Jahrg. IV. S. 253.  
 2837. ANAGNOSTAKIS. *Essai sur l'exploration de la rétine et des milieux de l'ocul sur le vivant un moyen d'un nouvel ophthalmoscope.* Paris. (Ein durchbohrter Hohlspiegel.) — Ann. d'ocul. Février et Mars.  
 2838. STELLWAG VON CARION. *Optische Theorie der Augenspiegel.* Wien.\*  
 2839. G. A. LEONHARD. *De variis oculorum speculis illorumque usu.* Leipzig.  
 2840. TH. RUETE. *Bildliche Darstellung der Krankheiten des menschlichen Auges.* Leipzig. Lieferung 1 u. 2 auch unter dem Titel: *Physikalische Untersuchung des Auges.* S. 23—37\*.  
 2841. C. H. SCHAUENBURG. *Der Augenspiegel, seine Anwendung und Modificationen, nebst Beiträgen zur Diagnostik innerer Krankheiten.* Nach dem Holländischen des Dr. van Trigt mit Zusätzen. Lahr.  
 2842. W. ZEHENDER. *Ueber die Beleuchtung des inneren Auges mit specieller Berücksichtigung eines nach eigener Angabe construirten Augenspiegels.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. I. (1.) S. 121\*.  
 2843. R. LIEBREICH. *Ophthalmoskopische Notizen.* Arch. f. Ophthalm. I (2.) S. 333.

## 1855.

2844. STELLWAG VON CARION. Zeitschr. d. Aerzte z. Wien. XI. S. 65\*.  
 2845. v. HASNER. *Ueber den Augenspiegel.* Prag. Vierteljahrsschr. XII. S. 133.  
 2846. — *Ueber die Benutzung föhrter Glaslinsen.* Prag.  
 2847. E. JAEGER. *Beiträge zur Pathologie des Auges mit Abbildungen in Farbendruck.* Wien.  
 2848. — *Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel.* Wien. Ber. XV. S. 319—344.

## 1856.

2849. CASTERANI. *Ophthalmoscope.* Cosmos. VIII. S. 612.  
 2850. E. JÄGER. *Ueber die Anwendung des Ophthalmoskopes als Optometer.* Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkde. No. 10.  
 2851. DE LA CALLE. *De l'ophthalmoscope.* Diss. Paris.



2852. W. ZEHENDER. *Ueber die Beleuchtung des inneren Auges durch heterocentrische Glasspiegel.* Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 103—130.

1857.

2853. J. PORRO. *La lunette panfocale, employée comme ophthalmoscope.* Compt. Rend. XLV. S. 103—104. — Cosmos. XI. S. 96—97.

2854. A. BUROW. *Ueber Construction heterocentrischer Augenspiegel und deren Anwendung.* Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 68—80.

2855. SCHNELLER. *Ein Mikrometer am Augenspiegel.* Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 121—126.

2856. R. LIEBREICH. *De l'examen de l'oeil au moyen de l'ophthalmoscope.* Bruxelles (Extrait de la traduction du Traité pratique des maladies des yeux par Mackenzie. II. S. 1—62.)

1858.

2857. R. LIEBREICH. *Histologisch-ophthalmoskopische Notizen.* Arch. f. Ophthalm. IV. (2.) S. 286.

1859.

2858. C. H. SCHAUENBURG. *Der Augenspiegel, seine Anwendung und Modificationen, nebst Beiträgen zur Diagnostik innerer Augenkrankheiten.* 2. Aufl. Lehr.

2859. A. ZANDER. *Der Augenspiegel, seine Formen und sein Gebrauch.* Leipzig und Heidelberg.

2860. E. FOLLIN. *Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies de l'oeil.*

2861. GIRAUD-TEULON. *Théorie de l'ophthalmoscope avec les déductions pratiques qui en découlent etc.* Gaz. méd. de Paris No. 7 u. 8.

1860.

2862. R. LIEBREICH. *Methode, dem umgekehrten Bilde bei kurzsichtigen Augen eine starke Vergrößerung zu geben.* Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 130.

2863. — *Veränderungen an meinem Augenspiegel, Mikrometer.* Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 134.

1861.

2864. ARGILAGOS. *Sur un nouveau moyen de corriger l'influence fâcheuse que la lumière exerce sur les yeux soumis à l'examen avec l'ophthalmoscope.* Gaz. d. Hôpit. S. 357.

2865. JANSSEN et FOLLIN. *Considérations physiologiques sur l'éclairage et ses applications à l'ophthalmoscopie.* Arch. gén. de méd. Juli. — Echo méd. S. 405.

2866. O. BECKER. *Ueber Wahrnehmung eines Reflexbildes im eigenen Auge.* Wien. Med. Wochenschr. 1860. S. 670—672; 684—688. (Bildchen der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut nach hinten reflectirt.)

1862.

2867. ARGILAGOS. *Sur l'ophthalmoscopie physiologique.* Paris.

2868. GALEZOWSKI. *Nouveau modèle d'ophthalmoscope.* Acad. de méd. Séance du 7 janvier.

2869. M. R. GRITTI. *Dell'ottalmoscopo et delle malattie endoculari per esso riconoscibili.* Milano.

1863.

2870. A. BUROW. *Notiz betreffend die Beobachtung des eigenen Augenhintergrundes.* Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 155—160.

2871. E. FOLLIN. *Leçons sur l'exploration de l'oeil et en particulier sur les applications de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies des yeux.* Paris.

2872. GIRAUD-TEULON. *De l'auto-ophthalmoscope de M. Coccius.* Gaz. des Hôpit. S. 62.

2873. — *Nouvelle méthode pour l'examen autoophthalmoscopique.* Ann. d'Ocul. XLIX. S. 181.

2874. G. Z. LAURENCE et GIRAUD-TEULON. *D'une modification des procédés ophthalmoscopiques.* Annal. d'Ocul. L. S. 106.

2875. F. HEYMANN. *Die Autoskopie des Auges.* Leipzig.

2876. R. LIEBREICH. *Atlas des Ophthalmoskopie.* Berlin. Hirschwald.

1864.

2877. C. SCHWEIGGER. *Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels.* Berlin.

2878. A. COCCIUS. *Beschreibung eines Oculars zum Augenspiegel.* Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 123—147.

2879. R. SCHIRMER. *Ueber das ophthalmoskopische Bild der Macula lutea.* Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 148—151.

2880. WINTRICH. *Ueber die Benutzung des zweckmäßig abgeblendeten zerstreuten Tageslichts zur Oto-, Ophthalmo- und Laryngoskopie.* Erlang. Med. Neuigkeiten. 9. April.

2881. F. C. DONDEBS. *Omtrent de uitwendige vaten van het oog en den daarin waarnem-  
baren bloedsomloop.* Versl. v. het Nederl. Gasthuis v. Oogl. No. 5. S. 260.
2882. MONOYER. *Un Ophthalmoscope portatif.* Ann. d'Ocul. LII. S. 210.  
1867.
2883. GIRAUD-TEULON. *Instrument zur Messung der Sehnerven-Papille.* Klin. Mon.-Bl.  
V. S. 297.
2884. — *D'une nouvelle combinaison ophtalmoscopique.* Ann. d'Ocul. LVII. S. 82.
2885. L. MAUTHNER. *Die Bestimmung der Refraktionsanomalien mit Hülfe des Augen-  
spiegels.* Wien.
2886. — *Lehrbuch der Ophthalmoskopie.* Wien.
2887. H. WILSON. *Ueber Augenuntersuchung mit Hülfe des Ophthalmoskopes.* Dubl. Journ.  
XLIV. S. 87.
2888. — *Leçons sur la théorie et la pratique de l'ophthalmoscope.* Dublin 1868.  
1868.
2889. E. BERTHOLD. *Construction eines Augenspiegels zum Gebrauche bei Vorlesungen.*  
Med. Centralbl. S. 373—374.
2890. BOUCHUT. *Emploi de l'ophthalmoscope.* Mondes. (2.) XVII. S. 274.
2891. E. A. COCCUS. *De apparatus optico ad interiores bulbi oculi morbos demonstrandos  
constructo.* Leipzig. Universitätsprogramm.  
1869.
2892. C. M. GABIEL. *Sur l'ophthalmoscope.* Paris.
2893. GIRAUD-TEULON. *De l'influence, qu'exercent les lentilles positives et négatives et leur  
distance à l'œil, sur les dimensions des images ophtalmoscopiques du disque optique,  
dans les anomalies de la réfraction oculaire.* Compt Rend. LXIX. S. 384—387.
2894. E. v. JÄGER. *Ophthalmoskopischer Handatlas.* Wien.
2895. M. PERRIN. *Description d'œil artificiel destiné à faciliter les études ophtalmoscopiques.*  
Ann. d'Ocul. LXI. S. 163.
2896. PONCET. *Ophthalmoscope à chambre noire.* Gaz. hebdom. de méd. et de chir.  
No. 32. S. 501.
2897. M. WOINOW. *Bemerkungen über die Untersuchungen der Refraction mittelst des  
Augenspiegels.* Med. Centralbl. S. 881—885.  
1870.
2898. A. CLEBSCH. *Ueber die Größe des ophtalmoscopischen Bildes.* Göttingen.
2899. W. DOBROWOLSKY. *Waarnemingen omtrent den bloedsomloop in den bodem van het  
oog bij den hond en bij den mensch.* Versl. Ned. Gasth. voor Oogl. No. 11. S. 170.
2900. — *Zur Lehre über die Blutcirculation im Augenhintergrund des Hundes und  
Menschen.* Centralbl. f. d. Med. Wiss. No. 20. u. 21.
2901. JAVAL. *Nouvel ophthalmoscope.* Gaz. hebdom. S. 278. Ann. d'Ocul. LXIII. S. 287.
2902. R. LEBERREICH. *Atlas der Ophthalmoskopie.* Berlin. Hirschwald. 2. Aufl.
2903. E. G. LORING. *Determination of the optical condition of the eye by the ophthalmoscope,  
with a new modification of the instruments for that purpose.* Americ. Journ. of  
med. Science. S. 323—347.
2904. F. MOHR. *Das Ophthalmophantom, ein neues Hilfsmittel zur Erlernung der Ophthal-  
moskopie.* Deutsche Klinik No. 26. S. 241—243.
2905. — *Das Ophthalmophantom und der Augenspiegel als Optometer.* Würzburg.
2906. M. PERRIN. *Traité pratique d'ophtalmoscopie et d'optométrie.* Paris.
2907. C. SCHWEIGGER. *Ueber die Größe des ophtalmoscopischen Bildes.* Nachr. v. d.  
k. Ges. d. Wiss. Göttingen. No. 9.
2908. DE WECCKER et ROGER. *Objectif à prismes pour l'usage d'un ophthalmoscope démon-  
stratif.* Bull. de l'Acad. des Sciences. 4 avril.  
1871.
2909. E. LORING. *Ueber den ophtalmoscopisch sichtbaren hellrothen Streifen in der Mitte  
der Netzhautgefäße.* Arch. f. Augen u. Ohrenheilkde. II. S. 199.  
1872.
2910. B. CARTER. *Ein Augenspiegel von neuer Construction.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde.  
X. S. 282.
2911. H. COHN. *Ein Augenspiegel für schnelle Refraktionsbestimmung.* Klin. Mon.-Bl. f.  
Augenheilkde. X. S. 207.
2912. J. HOGG. *Ophthalmoscope à démonstration.* Med. Times and Gazette.
2913. TH. LEBER. *Der Augenspiegel.* Berlin.

2914. H. MAGNUS. *Ophthalmoscopischer Atlas*. Leipzig. Engelmann.
2915. OLDHAM. *Ueber ein verbessertes Ophthalmoskop*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. X. S. 287.
2916. SCHNABEL. *Ueber die Lage und GröÙe des aufrechten Bildes im Augenhintergrunde*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 119.
2917. SCHRÖDER. *Neuer binocularer Augenspiegel von Coccius*. Klin. Mon.-Bl. X. S. 288.
2918. SICHEL. *Nouvel ophthalmoscope*. Compt. Rend. LXXIV. S. 370.
2919. — *Note sur un ophthalmoscope à deux observateurs, pour les démonstrations*. Ann. d'Ocul. LXVII. S. 57.
- 1878.
2920. W. LAIDLAW PURVES. *A contribution to ophthalmoscopy*. London.
- 1874.
2921. E. LANDOLT. *Le grossissement des images ophthalmoscopiques*. Paris. 82 S.
2922. H. SCHMIDT. *Die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen*. Medic. Centralbl. N. 57. S. 900—902. — Sitz.-Ber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg, No. 7.
2923. PR. SMITH. *Demonstrations-Ophthalmoskop*. Brit. med. Journ. 19. Decbr.
2924. W. STAMMESHAUS. *Ueber eine Methode, dem aufrechten Bilde eine stärkere Vergrößerung zu ertheilen, sowie über die GröÙe des Gesichtsfeldes bei Untersuchungen im aufrechten Bilde*. Klin. Mon.-Bl. XII. S. 1.
- 1875.
2925. E. BERTHOLD. *Beschreibung einer einfachen Methode, vermittelt deren zwei Beobachter gleichzeitig den Augengrund untersuchen können*. Berl. klin. Wochenschr. S. 531—533.
2926. BRECHT. *Ueber den Reflex in der Umgebung der Macula lutea*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. (2.) S. 1—26.
2927. G. LUDWIG. *Bestimmung der Kurz- und Uebersichtigkeit mit dem Augenspiegel*. Allg. milit.-ärztl. Ztg. No. 8 u. 9.
2928. F. MONOYER. *Ophthalmoscope à trois observateurs*. Compt. Rend. LXXX. S. 962.
2929. H. SCHMIDT. *Weitere Mittheilung über die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen*. Sitz.-Ber. z. Bef. d. ges. Naturw. in Marburg. 24. März 1875.
2930. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Die Macula lutea, anatomisch und ophthalmoskopisch*. Arch. f. Ophthalm. XXI. S. 17—28.
2931. J. STILLING. *Ueber ophthalmoscopische Refraktionsbestimmung*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 143—183.
- 1876.
2932. BADAL. *Mesure des différences de niveau du fond de l'oeil*. Gaz. d. Hôpit. S. 1175.
2933. E. A. BROWNE. *How to use the ophthalmoscope*. London. Trübner & Co.
2934. E. v. JAEGER. *Ergebnisse der Untersuchung mit dem Augenspiegel*. Wien. Seidel u. Sohn. 196 S.
2935. S. KLEIN. *Der Augenspiegel und seine Anwendung*. Wien. Klin. No. 11 u. 12. S.-A. Wien. Urban u. Schwarzenberg. 72 S.
2936. E. LANDOLT. *Die Vergrößerung des aufrechten ophthalmoscopischen Bildes*. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 369.
2937. E. G. LORING. *Determination of the refraction of the eye by means of the ophthalmoscope*. New-York. Wood & Co. 62 S.
2938. O. E. SHAKESPEARE. *Description of a new ophthalmoscope and ophthalmometer*. Amer. Journ. of Med. Sc. Bd 141. S. 45.
- 1877.
2939. HELFREICH. *Ophthalmoskopische Mittheilungen über den Purpur der Retina*. Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. S. 113—115.
2940. J. HIRSCHBERG. *Ueber Refractionsophthalmoskope und ihre Anwendung*. Dtsche. Zeitschr. f. prakt. Med. S. 353—356 u. 366—368.
2941. L. KÖNIGSTEIN. *Ueber Sehpurpur und dessen Diagnose mit dem Augenspiegel*. Wien. Med. Presse. XVIII. No. 18.
2942. D. C. RUTENBERG. *Ueber Ophthalmoskopie des aufrechten Bildes mit erweitertem Gesichtsfelde*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV. S. 375—394.
2943. SCHMIDT-RIMPLER. *Ueber eine neue Methode ophthalmoskopischer Refraktionsbestimmung und über die Brennweite der concaven Augenspiegel*. Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. No. 10. Dec. 1876. Berl. kl. Wochenschr. XIV. No. 4 u. 5.

2944. J. F. C. THEL. *Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild*. Diss. Berlin.
2945. — *Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild*. Beitr. z. prakt. Augenheilkde. v. J. Hirschberg. Heft 2. S. 24—32. Leipzig, Veit u. Co.
2946. L. WEISS. *Die Vergrößerung, in der man bei der Augenspiegel-Untersuchung im aufrechten Bild den Augengrund sieht — durch Messung des Augenspiegelbildes der Papille und Messung des anatomischen Durchmessers der Papille an ein und demselben Auge — direct bestimmt*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (1.) S. 109—156. 1878.
2947. H. ARMAIGNAC. *Traité élément. d'Ophthalmoscopie, d'Optometrie et de Réfraction oculaire*. Paris. Delahaye. 468 S.
2948. G. ENGELHARDT. *Ueber eine neue Form des Augenspiegels*. München, Knorr u. Hirth. 36 S.
2949. G. HALTENHOFF. *Note sur un cas d'aphakie et aniridie traumatiques permettant l'observation du fond de l'oeil sans ophthalmoscope*. Genève. (Congr. méd. intern. de Genève.)
2950. HASNER. *Ueber die Vergrößerung des Retinalbildes*. Prag. Vierteljahrschr. S. 40 bis 46.
2951. J. HIRSCHBERG. *Zur objectiven Refraktionsbestimmung*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 262—263.
2952. E. LANDOLT. *Manuel d'Ophthalmoscopie*. Paris, Doin. 107 S.
2953. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur objectiven Refraktionsmessung*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 260—262.
2954. — *Ueber ophthalmoscopische Refraktionsbestimmung mit Hülfe des umgekehrten Bildes*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 211. 1879.
2955. G. ENGELHARDT. *Ueber einen neuen Augenspiegel*. Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. in Dresden. 1878—1879.
2956. W. R. GOWERS. *A manual and atlas of medical ophthalmoscopy*. London, Churchill.
2957. K. GROSSMANN. *Das Refractionsophthalmoskop*. Zehender's kl. Mon.-Bl. März.
2958. J. HIRSCHBERG. *Ueber den stabilen Augenspiegel*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 171—172.
2959. — *Ueber Refractionsophthalmoskope*. The Roy. Lond. Ophthalm. Hosp. Rep. IX. 8.
2960. A. v. REUSS. *Einige Beobachtungen über functionelle und ophthalmoskopische Refraktionsbestimmung*. Arch. f. Ophthalm. XXV. (1.)
2961. SAMELSON. *Ueber Wahrnehmbarkeit des Augengrundes bei Aphakie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 79.
2962. SCHNABEL. *Zur Lehre von der ophthalmoskopischen Vergrößerung*. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 287.
2963. J. STILLING. *Notiz über Orthoskopie des Augengrundes*. Zehender's kl. Mon.-Bl. Februar.
2964. L. DE WECKER. *Ophthalmoscope à double disque*. Ann. d'Ocul. Bd. 83. 3/4. — Zehender's kl. Mon.-Bl. März. 1880.
2965. E. LANDOLT. *On the Enlargement of Ophthalmoscopic Images*. Brit. med. Journ. 3. Jan.
2966. PARENT. *Grossissement de la loupe et des images ophthalmoscopiques*. Rec. d'Ophthalm. Juli.
2967. J. SCHNABEL. *Zur Lehre von der ophthalmoskopischen Vergrößerung*. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 287—299. 1881.
2968. D. F. BAROFFIO. *Della determinazione e misurazione dello stato diottrico statico all'ottalmoscopia*. Giorn. di med. mil. Roma. XXIX. S. 1049.
2969. BAYER. *Die Untersuchung der Thiere mit dem Augenspiegel*. Oesterr. Vierteljahrsch. f. Veterinärkde. Bd. 55. S. 77.
2970. H. COURSSERANT. *Note sur un ophthalmoscope à deux observateurs*. France méd. II. S. 722.
2971. FÖRINGER. *Die Ophthalmoskopie in der Veterinärmedizin*. Vortr. f. Thierärzte, red. v. Prof. Siedamgrotzky. Heft 4.
2972. PARENT. *Optométrie ophthalmoscopique à l'image renversée*. Rec. d'Ophthalm. III. No. 9. S. 544.

2973. TH. REID. *On the direct measurement of ophthalmoscopic objects.* Brit. med Journ. No. 1. S. 10.
2974. H. SCHOELEB. *Ein neues Refractions-Ophthalmoskop.* Arch. f. (Anat.) u. Physiol. V. S. 574.
2975. R. ULRICH. *Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld.* Diss. Marburg. — Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIX. S. 186—212.
- 1882.
2976. G. ALBERTOTTI. *Sulla determinazione sperimentale della grandezza dell' immagine oftalmoscopica rovesciata.* Giorn. della R. Accad. di Med. di Torino. — Ann. di Ottalm. XI. S. 25. — Klin. Mon.-Bl. S. 335. — Arch. Ital. de Biol. I. 2.
2977. BAUMEISTER. *Demonstration eines Augenspiegels.* Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 174.
2978. BERLIN. *Augenspiegelbilder.* Arch. f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth.) S. 168.
2979. F. FUCHS. *Vorschlag zur Construction eines Augenspiegels mit neuer Reflexion- und Polarisationsvorrichtung.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. II. S. 305—310.
2980. — *Ueber die günstigen physikalischen Bedingungen bei der Beobachtung der Netzhaut im umgekehrten Bilde.* Bonn.
2981. GALEZOWSKY. *Ophthalmoscope.* Rec. d'Ophthalm. S. 436.
2982. W. B. GOWERS. *A manual and atlas of medical ophthalmoscopy* London, Churchill. 386 S.
2983. A. GRAEFE. *Epikritische Bemerkungen über Cysticerus-Operationen und Beschreibung eines Localisirungs-Ophthalmoskops.* Arch. f. Ophthalm. XXIII. (1.) S. 187.
2984. J. HIRSCHBERG. *Ophthalmoskopie.* Eulenburg's Real-Encyclop. d. ges. Heilkde.
2985. — *Zur vergleichenden Ophthalmoskopie.* Arch. f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth. S. 31.
2986. G. L. JOHNSON. *An improvided ophthalmoscope.* Tr. Ophthalm. Soc. U. Kingd London. 1881—1882. II. S. 273.
2987. H. JULER. *The application of retinoscopy to the diagnosis and treatment of the errors of refraction.* Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 327.
2988. — *And improved ophthalmoscope for refraction and other purposes.* Brit. med Journ. II. S. 95.
2989. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Ophthalmoskopische Refractionsbestimmung im umgekehrten Bild.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. November.
2990. M. W. SCHULTEN. *Ueber die Beobachtung des Augenhintergrundes unter hochgradiger Vergrößerung.* du Bois' Arch. f. Physiol. S. 285.
2991. A. M. C. TOMÉ. *Historia del oftalmoscopie.* Ophthalm. pract. Rev. mens Ann. No. 5. S. 97.
2992. W. UNTHOFF. *Demonstration eines Refractions-Ophthalmoskops zur Bestimmung des Astigmatismus.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. S. 167.
2993. C. H. VILAS. *The ophthalmoscope; its theory and practical uses.* Chicago. 150 S. 1883.
2994. E. BERGER. *Ein neues Refractions-Ophthalmoskop.* Wien. med. Wochenschr. No. 51. — Arch. f. Augenheilkde. XII. 4. S. 412.
2995. E. A. BROWNE. *How to use the ophthalmoscope.* London.
2996. BUCH. *A new ophthalmoscope.* Physician a. Surg. Ann. Arbor, Mich. V. S. 166.
2997. W. BURCHARDT. *Ein neuer Refractions-Augenspiegel.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. September.
2998. — *Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Refraction des Auges im aufrechten Bild.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. December.
2999. R. B. CARTER. *The ophthalmoscope.* Quain's dictionary of medicine. S. 1050.
3000. COUPER. *A new refraction ophthalmoscope.* Med. Times and Gaz. No. 1719.
3001. H. COURSSERANT. *Nouvel ophthalmoscope à deux observateurs.* Bull. et mém. de la Soc. franç. d'Ophthalm. S. 113.
3002. F. FUCHS. *Ueber die günstigsten physikalischen Bedingungen bei der Beobachtung der Netzhaut im umgekehrten Bilde.* Verh. d. naturw. Vers. d. preuss. Rheinl. u. Westfalens. XXXX. 4. Folge. X. S. 181.
3003. A. GRAEFE. *Noch ein Wort über mein Localisirungs-Ophthalmoskop.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 370.
3004. LEWKOWITSCH. *Epikritische Bemerkungen über das Localisirungs-Ophthalmoskop von Professor Alfred Graefe.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 302.

3005. NACHET. *Ophthalmoscope à bouton automatique*. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 161.  
 3006. F. OSTWALDT. *Experimentelle Untersuchung über den centralen Reflexstreifen an den Netzhautgefäßen*. Diss. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Febr.-März.  
 3007. PARENT. *Description d'un ophthalmoscope à verres cylindriques*. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 130.  
 3008. PFLÜGER. *Ein neues Refractions-Ophthalmoskop*. Ber. d. ophthalm. Ges. z. Heidelberg. S. 183.  
 3009. ROULOT. *Ophthalmoscope à réfraction*. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 28.  
 3010. J. B. STORY. *The estimation of refraction by retinoscopy before and after atropinisation*. Ophthalm. Rev. London. II. S. 294.

## 1884.

3011. BURNETT. *Why the eyes of animals shine in the dark*. Pop. Sc. Month. New-York. XXIV. S. 813.  
 3012. F. DUJARDIN. *L'examen ophtalmoscopique chez les tout jeunes enfants*. Journ. d. scienc. méd. de Lille. VI. S. 575.  
 3013. EPERON. *De la détermination à l'image droite des degrés élevés de myopie*. Arch. d'Ophthalm. S. 217.  
 3014. HEUSE. *Ein Lichtreflex der Retina*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 155 bis 158.  
 3015. F. HODGES. *On some peculiarities connected with retinal images*. Brain. VII. S. 77.  
 3016. J. MASSELOIN. *Mémoire d'ophtalmoscopie*. Paris. Doin.  
 3017. L. MAUTHNER. *Historische Notiz in Betreff der Lehre vom Leuchten der Augen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Septbr. S. 257.  
 3018. G. MAYERHAUSEN. *Vorschlag zur Bezeichnung der Augenspiegel, sowie der optischen Spiegel überhaupt*. Berl. klin. Wochenschr. XXI. No. 36. — Rev. clin. d'ocul. 5<sup>me</sup> année. No. 7.  
 3019. H. PARENT. *Nowel ophthalmoscope*. Bull. de l'arsén. méd.-chir. 1883/84. I. S. 60. — Rev. clin. d'ocul. August.  
 3020. — *Disque rotatif et pivotant muni de quatre miroirs pour l'examen à l'image droite*. Rec. d'Ophthalm. S. 170.  
 3021. PFLÜGER. *Ein neues Refractions-Ophthalmoskop*. Ber. über die Univ.-Augen-Klin. in Bern. 1882. S. 69.  
 3022. KIMPLER. *Ueber ophthalmoskopische Refractionsbestimmung*. Dtsche. Wochenschr. S. 721.  
 3023. *Ophthalmoscopes à refraction munis de verres cylindriques*. Progr. méd. XII. S. 262.

## 1885.

3024. AGNEW. *The insufficiency of the ophthalmoscope as the sole test of errors of refraction*. Transact. of the Amer. ophthalm. Soc. S. 112.  
 3025. A. H. BENSON. *A convenient ophthalmoscope for students and practitioners*. Brit. med. Journ. I. S. 68.  
 3026. BERGER. *Refractions-Ophthalmoskop mit variablem Intervalle zwischen je zwei Correctionsgläsern*. Zeitschr. f. Instrumentenkde. V. Heft 3.  
 3027. BURCHARDT. *Dioptriometer für das aufrechte Bild*. Centralbl. f. chir. u. orthop. Mech. I. S. 39.  
 3028. S. M. BURNETT. *Why the eyes of animals shine in the dark*. Wash. Bull. Phil. soc. VIII. S. 13—14.  
 3029. COUPER. *New Ophthalmoscope*. Lancet. I. S. 112.  
 3030. W. DENNET. *The electric light ophthalmoscope*. Transact. of the Amer. ophthalm. Soc. S. 156. — New York. Med. Rec. Mai. S. 503.  
 3031. J. B. EMERSON. *A schematic eye for students of ophthalmoscopy*. New York Med. Rec. Oktbr. S. 398.  
 3032. FERRI. *Grandezza del fondo oculare visibile ad immagine dritta*. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. (3.) XXXIII. S. 48.  
 3033. FOX. *An improved refraction ophthalmoscope*. Med. News. Phil. XLVI. S. 279.  
 3034. GALEZOWSKY. *Traité iconographique d'ophtalmoscopie*. Paris. Baillière.  
 3035. GUNN. *New Ophthalmoscope*. Lancet. I. S. 112.  
 3036. E. JACKSON. *A new form of refraction ophthalmoscope*. Transact. of the amer. ophthalm. soc. 21. meeting. S. 111. — Med. News. XLVII.  
 3037. LANG. *New Ophthalmoscope*. Lancet. I. S. 112.

3038. LIASSALLE. *Peut-on, à l'aide du miroir ophtalmoscopique et sans verres correcteurs, déterminer, avec une exactitude suffisante, la réfraction statique de l'œil?* Lyon. méd. XLIX. S. 521.
3039. R. LIEBREICH. *Atlas der Ophthalmoscopie*. 3. Aufl. Berlin, Hirschwald. Auch Englisch bei J. A. Churchill, London.
3040. E. LORING. *Text book of ophthalmoscopy*. Part I. *The normal eye, determination of refraction, diseases of the media, physiological optics and theory of the ophthalmoscopes*.
3041. MALGAT. *Etude comparative du fond de l'œil normal et pathologique à l'ophtalmoscope*. Nice méd. IX. S. 145 u. X. S. 200.
3042. MORTON. *New Ophthalmoscope* Lancet. I. S. 112.
3043. PARENT. *Ophthalmoscope à verres cylindriques*. Arch. d'Ophthalm. S. 182.
3044. RANDALL. *Some additions of the ophthalmoscope*. Med. News. XLVII. No. 18. S. 442.
3045. SCHLEICH. *Der Augenhintergrund des Kaninchens und des Frosches als Hilfsmittel beim Unterricht im Ophthalmoskopiren*. Mittheil. a. d. ophthalm. Klin. in Tübingen. II. 2. S. 167 u. 258.
3046. M. STANFORD. *Ophthalmoscopes*. Ophthalm. soc. of the unit. kingd. 8. Januar.
3047. SZOKALSKI. *Ueber das Leuchten der Thieraugen in der Dunkelheit*. Raszechsnia No. 22.
- 1886.
3048. GIRAUD-TEULON. *Substitution dans l'éclairage ophtalmoscopique binoculaire de la lumière directe à la lumière par réflexion latérale*. Ann. d'Ocul. Bd. 96. S. 288. — Journ. Americ. med. Ass. VI. S. 456.
3049. HIRSCHFELD. *Der scheinbare Ort der Trübungen im Auge*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 314.
3050. JACKSON. *The ophthalmoscope for the general practitioner*. Maryland med. Jour. XV. S. 23.
3051. — *Lens series for the refraction ophthalmoscope*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 361.
3052. H. E. JULER. *Ophthalmoscope à réfraction avec foyer électrique*. Rec. d'Ophthalm. S. 426.
3053. — *Ophthalmoscope with electric light*. Ophthalm. Rev. S. 56.
3054. — *Présentation des deux ophtalmoscopes*. Bull. et mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 340.
3055. RANDALL. *Modified Loring ophthalmoscope, with cylindrical lenses*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 273.
3056. TH. REID. *Polarisation ophthalmoscope*. Ophthalm. Rev. S. 56. — Transact. of the ophthalm. soc. of the unit. kingd. VII. S. 497.
3057. PR. SMITH. *A new demonstrating ophthalmoscope*. Ophthalm. Rev. S. 246.
3058. M. STANFORD. *New instrument for rapidly changing ophthalmoscopic mirrors*. Ophthalm. Rev. S. 334.
3059. F. VALK. *The diagnosis of astigmatism with the ophthalmoscope*. Med. Rec. New York. XXIX. S. 673.
3060. A. VOSSIUS. *Leitfaden zum Gebrauch des Augenspiegels für Studierende und Ärzte*. Berlin. Hirschwald. 88 S.
- 1887.
3061. SW. BURNETT. *A modification of the refraction ophthalmoscope*. Transact. of the americ. ophthalm. soc. S. 589.
3062. W. S. DENNET. *Modification of the ophthalmoscope*. Ophthalm. Rev. S. 303.
3063. F. DIMMER. *Der Augenspiegel und die ophtalmoskopische Diagnostik*. Leipzig und Wien. 176 S.
3064. E. JACKSON. *A refraction ophthalmoscope*. Ophthalm. Rev. S. 1.
3065. W. H. JESSOP. *New ophthalmoscope*. Brit. med. Journ. II. S. 724.
3066. J. MASSELOU. *L'ophtalmoscope Helmholtz-Wecker*. Ann. d'Ocul. Bd. 98. S. 24.
3067. POWER. *Ophthalmoscope*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 292.
3068. RILEY. *A modified form of ophthalmoscope with cylinders*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 587.
3069. F. VALK. *An improved ophthalmoscope*. New-York. med. Rec. April.
3070. W. ZEHENDER. *Zur Erfindung des Augenspiegels*. Münch. med. Wochenschr. S. 707.

1888.

3071. L. BELLARMINOW. *Neue Methode der ophthalmoskopischen Untersuchung.* (Russisch.) Russk. Med. No. 44. — Münch. med. Wochenschr. S. 865.  
 3072. — *Erwiderung.* Berl. kl. Wochenschr. S. 1049.  
 3073. P. BONGERS. *Einfache Methode der Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 194.  
 3074. CLAIBURNE. *The theory and practice of the ophthalmoscope.* Detroit, G. S. Davis. 88 S.  
 3075. J. DAWSON. *The determination of errors of refraction by objective test.* Transact. South. Car. u. Assoc. Charleston. S. 77.  
 3076. J. B. EMERSON. *A schematic eye for students of ophthalmoscopy.* Post Graduate. New-York 1888/89. S. 46.  
 3077. L. DA FONSECA. *Atlas ophthalmoscopique.* Correio med. de Lisboa. Nov. u. Dec.  
 3078. GUATA. *Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroidale.* Ann. di Ottalm. S. 501.  
 3079. G. HAENEL. *Objective Messung der Refraction des Auges.* Jahresber. d. Ges. f. Nat.- u. Heilkde. in Dresden. 1887/88. S. 121.  
 3080. J. HIRSCHBERG. *Ueber H. Dr. Bellarminow's neue Art der ophthalmoskopischen Untersuchung.* Berl. med. Wochenschr. No. 49.  
 3081. C. HOOR. *Objective Methoden zur Einstellungs- (Refractions-) Bestimmung der Augen.* Wien. med. Wochenschr. No. 20.  
 3082. L. HOWE. *A new method of testing the refraction of the eye.* Lancet. 3. März. S. 417.  
 3083. LEROY. *Moyen d'éviter le reflet cornéen.* Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 280.  
 3084. B. SCHWARZBACH. *A new method of ophthalmoscopy.* Austral. Med. Gaz. Sydney. VIII. S. 236.  
 3085. S. SEGAL. *Ein Apparat zur Demonstration von ophthalmoskopischen Bildern des Phantoms von Perrin.* (Russisch.) Abh. d. med. Sect. d. Ges. d. Experim.-Wiss. a. d. Univ. zu Charkow f. d. Jahr 1888. II. S. 39.  
 3086. F. VALK. *An improved ophthalmoscope.* Post Graduate. New-York. 1888/89. VII. S. 48.  
 3087. A. VOSSIUS. *Leitfaden zum Gebrauch des Augenspiegels für Studierende und Aerzte.* 2. Aufl. Berlin, A. Hirschwald.

1889.

3088. L. BORTHEN. *Neuer Refraktionsaugenspiegel mit zwei Brennweiten.* Nord. ophthalm. Tidsskr. II. S. 105. — Norsk. Mag. f. Lægevid. No. 9.  
 3089. — *Nouvel ophthalmoscope à réfraction à deux foyers.* Rev. gén. d'Ophthalm. S. 337.  
 3090. — *Ein neues Refraktionsophthalmoskop mit doppeltem Spiegel.* Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 424—429.  
 3091. S. DEUTSCHININ. *Vereinfachte Methode der objectiven Refraktionsbestimmung.* (Russisch.) Westnik ophthalm. VI. 4/5. S. 316.  
 3092. A. GROENOUW. *Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 29.  
 3093. A. HODGKINSON. *On the luminosity of eyes in the dusk.* Mem. a. Proc. Manchester Literar. a. Phil. Soc. (4) II. S. 224.  
 3094. L. KÖNIGSTEIN. *Practische Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels.* Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg.  
 3095. H. MAGNUS. *Ueber ophthalmoskopische Erscheinungen in der Peripherie des Augenhintergrundes.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 1—25.  
 3096. A. RANDALL. *Ueber den nasalen Reflexbogenstreif von Dr. L. Weifs.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 178.  
 3097. — *The curvilinear reflection of Weifs as a prodromal sign of myopia.* Med. News. LIV. No. 6. S. 152.  
 3098. SCHMIDT-RIMPLER. *Prioritätsreclamation gegen Bellarminow.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar. S. 25.  
 3099. SCHWEIGGER. *Ueber den electrischen Augenspiegel.* Verh. d. physiol. Ges. Berlin. — du Bois' Arch. S. 365—366.

1890.

3100. L. BORTHEN. *A new refraction ophthalmoscope.* Brit. med. Journ. 18. Januar.



3101. W. R. GOWERS. *A manual and atlas of medical ophthalmoscopy*. 3. Ausg. London.  
 3102. HARLAN. *A new ophthalmoscope*. Transact. of the Americ. ophthalm. Soc. 22. Vers. S. 730—731.  
 3103. E. v. JAEGER. *Ophthalmoskopischer Handatlas*. Neu bearbeitet von M. Salzmann. Wien, Deuticke.  
 3104. KALT. *Nouveau modèle d'ophthalmoscope*. Soc. d'Ophthalm. 4. März.  
 3105. KNOEFFLER. *Ophthalmoscope à refraction pouvant servir de disque optométrique*. Rev. méd. de l'est. Nancy. XXII S. 103.  
 3106. C. J. A. LEBROY. *Un ophthalmoscop-optomètre*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 229.  
 3107. — *L'influence de la distance de l'observateur dans la mesure des amétropies à l'imag. droite*. Rev. gén. d'Ophthalm. IX. S. 433—436.  
 3108. W. NICATI. *Manière de déterminer plus précisément la position de l'image ophthalmoscopique renversée d'estimer le degré de la myopie*. Arch. d'Ophthalm. S. 160.  
 3109. PAYNE. *A new ophthalmoscope*. New-York. med. Journ. S. 139.  
 3110. E. PULVERMACHER. *Ueber die Sternfigur in der Netzhautmitte*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 325—330.  
 3111. RUDALL. *Note on examination with the ophthalmoscope by ordinary daylight*. Austral. med. Soc. Melbourne. XII. S. 415.  
 3112. VIGNES. *Un ophthalmoscope à réfraction*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 228.

## 1891.

3113. F. DIMMER. *Die ophthalmoskopischen Lichtreflexe der Netzhaut. Nebst Beiträgen zur normalen Anatomie der Netzhaut*. Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 240 S.  
 3114. O. GERLOFF. *Eine Modification des Schmidt-Rimpler'schen Refraktionsbestimmers*. Zehender's klin. Mon.-Bl. 29. Jahrg. S. 391—394.  
 3115. J. P. NUEL. *D'une apparence ophthalmoscopique de l'oeil myope. — Contribution à la connaissance de la prédisposition héréditaire à la myopie*. Arch. d'Ophthalm. X S. 56—73.  
 3116. H. PARENT. *Ophthalmoscope optométrique et phakométrique*. Arch. d'Ophthalm. X S. 313—320.  
 3117. SCHWEIGGER. *Ueber objective Bestimmung der Refraction und den electrischen Augenspiegel*. Heidelberg. Helmholtz-Festschr. S. 86—91.

## 1892.

3118. A. ANTONELLI. *Oftalmoscopia a refrazione*. Ann. di Ottalm. Anno XXI. S. 33.  
 3119. J. BJERRUM. *Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels*. Deutsch von O. Schwarz. Leipzig.  
 3120. DAHRENSTAEDT. *Ueber einen Fall von Sternfigur der Netzhautmitte*. Centralbl. prakt. Augenheilkde. XVI. S. 42—43.  
 3121. DAVIS. *A Reply to M. Story as to the causes of the light streak on retinal vessels*. Ophthalm. Rev. Septbr.  
 3122. — *The light-streak as seen upon the centre of the retinal vessels, owe to reflex. refraction or to both*. Arch. of Ophthalm. XX. S. 44.  
 3123. F. DIMMER. *Beiträge zur Ophthalmoskopie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. S. 19—51.  
 3124. FAGE. *Ophthalmoscope à réfraction pour les examens rapides*. Ann. d'Ocul. CVI. S. 279.  
 3125. GALEZOWSKI. *Du grossissement de l'image ophthalmoscopique dans l'étude de la pathologie des vaisseaux rétiniens*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 2. Juli. S. 601.  
 3126. — *Du grossissement de l'image ophthalmoscopique dans l'examen des vaisseaux rétiniens*. Rec. d'ophthalm. No. 7. S. 385.  
 3127. TH. GUILLOZ. *Examen binoculaire de l'image renversée du fond de l'oeil avec ophthalmoscope ordinaire*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N.S.) IV. S. 203—204.  
 3128. E. LESSING. *Vervollkommnung der Refraktionsbestimmung bis zur Unabhängigkeit vom Untersuchten*. Hamburg, O. Meissner. 13 S.  
 3129. H. PARENT. *Optométrie ophthalmoscopique au moyen de l'image renversée*. Bull. de la Soc. d'Ophthalm. de Paris. S. 105. — Arch. d'Ophthalm. S. 560.  
 3130. PHILIPSEN. *Exposé algébrique élémentaire du grossissement ophthalmoscopique*. Ann. d'Ocul. CVII. S. 177.  
 3131. G. RINDFLEISCH. *Ein einfacher Apparat zur objectiven Refraktionsbestimmung*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXX. S. 219—225.

3132. SCHNABEL. *Ueber die Beleuchtung des Gesichtsfeldes bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel.* Prag. med. Wochenschr. No. 30.  
 3133. E. SCHULTE. *Ophthalmoskopische Befunde an der Macula lutea.* Diss. Straßburg. 33 S.  
 3134. P. SMITH. *On the corneal reflex of the ophthalmoscope as a test of fixation and deviation.* Ophthalm. Rev. Febr.  
 3135. — *L'image réfléchi de la cornée produite par l'ophthalmoscope comme moyen de déterminer les déviations et le mode de fixation de l'oeil.* Ophthalm. Rev. XI. S. 37—42.  
 3136. STORV. *The light reflex on the retinal vessels.* Dublin. Journ. of med. Sc. No. 10. S. 813. — Ophthalm. Rev. XI. S. 100—108.  
 3137. W. F. WETTMANN. *The region of the macula lutea in ophthalmoscopy.* Ophthalm. Rec. Decbr.

## 1898.

3138. CL. DU BOIS-REYMOND. *Der sichtbare Puls der Netzhautgefäße.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1898. S. 308—309.  
 3139. F. DIMMER. *Der Augenspiegel und die ophthalmoskopische Diagnostik.* 2. Aufl. Wien, Deuticke. 218 S.  
 3140. H. v. HELMHOLTZ. *The history of the discovery of the ophthalmoscope.* Med. Rec. 16. Decbr.  
 3141. L. HOWE. *A convenient ophthalmoscope.* Americ. Journ. of Ophthalm. Febr.  
 3142. INOUE. *Ophthalmoskopischer Atlas.* Tokio. 2 Hefte.  
 3143. MOON. *A portable and combined optometer and ophthalmoscope.* Med. and Surgio. Rep. 11. Febr.  
 3144. D. E. ORBO. *Ottalmoscopia fissa.* Ann. di Ottalm. XXII. S. 477.  
 3145. SNELL. *A new ophthalmoscope.* Brit. med. Journ. No. 1678. S. 417. 20. Febr.  
 3146. WEILAND. *A new eye model (anaklasimeter) for determining the refraction by ophthalmoscopy and retinoscopy.* Med. News LXIII. No. 2. S. 41.  
 3147. *Das Augenleuchten und die Erfindung des Augenspiegels.* Dargestellt in Abhandlungen von E. v. BRÜCKE, W. CUMMING, H. v. HELMHOLTZ und C. G. THEOD. RUETE. (Ältere Beiträge zur Physiologie der Sinnesorgane in Neudrucken und Übersetzungen herausgegeben von Arthur König.) Hamburg u. Leipzig, L. Voss.

## 1894.

3148. FERRI. *Della grandezza del campo di osservazione nell'esame oftalmoscopico.* Ann. di Ottalm. Anno XXIII. S. 180.  
 3149. TH. GUILLOZ. *Champ d'observation dans l'examen ophthalmoscopique à l'image droite.* Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 118—130 u. 163—179.  
 3150. G. HARTRIDGE. *The Ophthalmoscope.* London, Lewis. 1894.  
 3151. C. KUNN. *Vorschlag einer Augenspiegelmodifikation.* Wien. Klin. Rundsch. No. 2. S. 19.  
 3152. E. v. JAEGER. *Ophthalmoskopischer Handatlas.* Neu bearbeitet von Dr. M. Salzmann. 2. Aufl. der neuen Ausg. Wien, F. Deuticke. 92 S. mit 32 Taf.  
 3153. TH. PROSKAUER. *Ein kleiner Beitrag zur Autophthalmoskopie.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 104.  
 3154. A. ROTH. *Ein Augenspiegel mit neuem Mechanismus zur selbstthätigen Linsen- auswechselung.* Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. Jahrg. S. 256—263.  
 3155. E. RYCHNER. *Eine neue Methode zur Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde.* Diss. Zürich. 33 S. Hamburg, Voss.

## 2. Schattenprobe, Skiaskopie oder Retinoskopie.

## 1878.

1156. CUIGNET. *Kératoskopie.* Rec. d'ophthalm. S. 14.

## 1874.

1157. CUIGNET. *Kératoskopie.* Rec. d'ophthalm. S. 239 u. 316.

## 1877.

1158. CUIGNET. *Kératoskopie.* Rec. d'ophthalm. S. 59.

## 1878.

1159. MENGIN. *De la kératoskopie.* Rec. d'ophthalm. S. 122.

## 1879.

1160. CUIGNET. *Kératoskopie.* Rec. d'ophthalm. S. 73.

1880.

3161. CUIGNET. *Kératoskopie*. Rec. d'ophthalm. S. 321 u. 520.  
 3162. PARENT. *De la kératoskopie*. Rec. d'ophthalm. S. 65 u. 424.

1882.

3163. W. CHARNLEY. *On the theory of the so-called keratascopy, and its practical application*. Ophthalm. Hosp. Rep. London. X. S. 344.  
 3164. CHIBRET. *Détermination quantitative de la myopie par la kératoscopie (fantoscope rétinienne) à l'aide d'un simple miroir plan*. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 238.  
 3165. FORBES. *On keratascopy*. Ophthalm. Hosp. Rep. S. 62.  
 3166. D. HASBROUCK. *Retinoscopy*. Journ. of Ophthalm. Otol. et Laryngol. S. 122.  
 3167. JULER. *The application of retinoscopy to the diagnosis and treatment of the errors of refraction*. Brit. med. Journ. II. S. 327. — Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 327.  
 3168. LOISEAU. *Application à l'examen des hommes de guerre du procédé de détermination de la réfraction dit „keratoskopie“*. Ann. d'oculist. S. 156.  
 3169. PARENT. *De la kératoskopie*. Rec. d'ophthalm. S. 216.

1883.

3170. A. B. PROWSE. *Retinoscopy*. Brit. med. Journ. S. 200.  
 3171. J. B. STORY. *The advantages of the plane ophthalmoscopic mirror in retinoscopy*. Ophthalm. Rev. London. II. S. 228.  
 3172. — *The estimation of refraction by retinoscopy before and after atropinisation*. Ophthalm. Rev. II. S. 294.  
 3173. WECKER et MASSELON. *La kératoskopie clinique*. Ann. d'oculist. S. 165.

1884.

3174. A. R. BAKER. *Retinoscopy*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 116.  
 3175. HUBERT und J. M. PROUFF. *Kératoskopie; nouveau kéroscope*. Rev. clin. d'ocul. IV. S. 110.  
 3176. LEAHY. *On keratascopy etc.* Indian med. gaz. Calcutta. S. 184.  
 3177. A. LEBROY. *De la kératoskopie*. Arch. d'Ophthalm. S. 140.  
 3178. P. SMITH. *A simple ophthalmoscope for the shadow-test*. Ophthalm. Rev. III. S. 266.

1885.

3179. E. JACKSON. *The measurement of refraction by the shadow test, or retinoscopy*. Americ. Journ. of med. sc. Philadelphia. N. S. Bd. 89. S. 404.  
 3180. PFLÜGER. *Skiaskopie*. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. XV. S. 361.

1886.

3181. CHAUVEL. *De la constatation objective de l'astigmatisme par les images cornéennes au conseil de revision*. Arch. de méd. et de ph. mil. VIII. S. 257—362.  
 3182. CHIBRET. *Skiascopie; ses avantages: sa place en ophthalmologie*. Arch. d'Ophthalm. VI. S. 146—154.  
 3183. CUIGNET. *Kératoskopie, Rétinoscopie, Pupilloscopie, Dioptrioscopie et Réfraction*. Rec. d'Ophthalm. S. 705. — Mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 295.  
 3184. N. GORDON. *Om Skiaskopi*. Ugeskr. f. læger. II. No. 35—36.  
 3185. HAYNES. *A new instrument for facilitating retinoscopy*. Ophthalm. Rev. London V. S. 282.  
 3186. H. HUMPHREY. *A new instrument for facilitating retinoscopy*. Ophthalm. Rev. S. 282.  
 3187. JACKSON. *The best form and practical value of the shadow test in the measurement of refraction*. Journ. americ. med. assoc. VII. S. 262.  
 3188. — *A form of plane mirror for the shadow test*. Med. News. 12. Juni.  
 3189. MORTON and BARRETT. *A clinical investigation of the merits of various methods of practising retinoscopy*. Brit. med. Journ. I. S. 105.  
 3190. NORRIE. *On Skiaskopie*. Ugeskr. f. Læger. Kopenhagen. S. 545.  
 3191. THOMPSON. *Retinoscopy in extreme degrees of ametropia*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 338.

1887.

3192. A. R. BAKER. *Retinoscopy*. Americ. Journ. of Ophthalm. Bd. IV. S. 291. — Transact. of the Intern. Med. Congr. Washington 1887. III. S. 774—780.  
 3193. J. H. CLAIBORNE. *Retinoscopy, or the shadow-test*. Med. Rec. New-York. XXXII. S. 587.

1194. CROSS. *Retinoscopy*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 290. — Transact. of the Intern. med. Congr. Washington. III. S. 770.
1195. CUIGNET. *Kératoscopie, rétinoscopie, pupilloscopie, dioptriscopie et réfraction*. Rec. d'Ophthalm. S. 11.
1196. — *Images kératoscopiques*. Bull. et Mém. de la Soc. franç. d'Ophthalm. S. 25.
1197. GRANDCLÉMENT. *De la kératoscopie ou skiascopie*. Lyon méd. LV. S. 385.
1198. C. J. A. LEROY. *Les phénomènes de l'ombre pupillaire*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 289, 337 u. 440.
1199. T. MACZEWSKI. *Skiaskopija*. Kron. lekarak. VIII. S. 400.
1200. MONOYER. *Optométrie scotoscopique*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 529.
1201. PARENT. *Diagnostic et détermination de l'astigmatisme*. Paris.
1202. ZIEMINSKI. *De la détermination de l'amétropie par la rétinosciaskopie*. Bull. et mém. de la soc. franç. d'ophthalm. S. 29.  
1888.
1203. S. M. BURNETT. *Skiascopy; or the „shadow“ test for the determination of the refraction of the eye*. Med. News. Philadelphia. LIII. S. 281.
1204. CERESETO. *A propos de la skiascopie (ancienne kératoscopie)*. Rec. d'Ophthalm. S. 449.
1205. CHAUVEL. *A propos de la skiascopie (ancienne kératoscopie)*. Rec. d'Ophthalm. S. 449.
1206. A. CHODIN. *Ueber Retinoskopie (Skiaskopie)*. Westnik ophthalm. V. S. 309.
1207. CHOUEY. *De la skiascopie (ancienne kératoscopie)*. Rec. d'Ophthalm. S. 216 u. 344.
1208. GRANDCLÉMENT. *Encore un mot sur la kératoscopie*. Lyon méd. LVII. S. 160.
1209. LEROY. *Sur la théorie de l'ombre pupillaire; réponse à M. le Prof. Monoyer, réfutation directe de la théorie de Landolt*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 494.
1210. MONOYER. *Optométrie scotoscopique*. Rev. gén. d'Ophthalm. No. 7, S. 289. No. 8, S. 337.
1211. NEUSCHÜLER. *Skiaskopie e sua pratica applicazione*. Boll. d'Ocul. S. 165.
1212. SCHWARZBACH. *A new method of ophthalmoscopy*. Australian med. Gaz. Sidney. VII. S. 236.
1213. SIMI. *Keratoscopia*. Boll. d'ocul. No. 5. Firenze.  
1889.
1214. S. ELIASBERG. *Die Methode von Cuignet-Parent zur objectiven Bestimmung von Refractionsanomalien*. (Russisch.) Wratsch. No. 4 u. 5.
1215. D. HASBROUCH. *Retinoscopy; the shadow test*. Journ. of Ophthalm., Otol. and Laryngol. New-York. S. 122.
1216. LANGIER. *Nouveau système pour reconnaître certaines déformations de la cornée*. Union med. S. 110.
1217. LAWRENTJEW. *Retinoskopie als bequemste Methode zur Bestimmung von Refractionsanomalien*. (Russisch.) Wojenno-Sanitarneje Djelo. No. 16.
1218. OVERWEG. *Objective Bestimmung der Refraction des Auges durch die Skiaskopie*. Dtsche. milit.-ärztl. Zeitschr. S. 157.
1219. C. SCHWEIGGER. *Ueber Refractionsbestimmung durch die Beleuchtungsprobe*. Arch. f. Augenheilkde. XX. S. 442. — Ber. üb. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 115.
1220. H. SNELLEN. *Skiaskopie*. Neederl. Tijdschr. voor Geneesk. (2. R.) S. 153.
1221. VESZELEY. *Ueber Skiaskopie*. Wien. klin. Wochenschr. No. 52.  
1890.
1222. BEAUMOUT. *The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia*. London. H. K. Lewis.
1223. S. M. BURNETT. *Skiascopy*. Arch. Ophthalm. New-York. XIX. S. 260.
1224. E. JACKSON. *Retinal illumination for the shadow-test*. Ophthalm. Rev. Febr.
1225. MASSELON. *Examen fonctionnel de l'oeil*. Paris.
1226. SAAD-SAMEH. *Nouvelle étude clinique et théorique sur la photoptoscopie (ancienne kératoscopie de Cuignet) et le photomètre*. Thèse de Paris.
1227. H. WÜRDEMANN. *The use of skiascopy (the shadow-test) in determination of refractive errors*. Americ. Journ. of Ophthalm. VII. S. 137.  
1891.
1228. E. BOCK. *Ueber Skiaskopie*. Vortrag, gehalten im Verein der Aerzte in Krain am 24. März. Memorabilien. Jahrg. XXXV. Heft 5. S. 257.
- V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

3229. CHIBRET. *De la Skiaskopie, son historique, son application clinique.* Heidelberg: HELMHOLTZ-Festschrift. S. 45—46.  
 3230. A. E. FICK. *Die Bestimmung des Brechungszustandes eines Auges durch Schattenprobe (Skiaskopie).* 67 S. und 3 Tafeln. Wiesbaden. J. F. Bergmann.  
 3231. L. KÖNIGSTEIN. *Ueber Skiaskopie.* Wiener med. Presse. No. 15. 16. 17. 18.  
 3232. H. PARENT. *Exposé théorique du procédé d'optométrie ophtalmoscopique dit de Cuignet ou skiaskopie.* Arch. d'Ophthalm. XI. S. 535—545. — Heidelberg: HELMHOLTZ-Festschrift. S. 47—53.  
 3233. A. ROTH. *Ueber Skiaskopie nebst Demonstration neuer skiaskopischer Instrumente.* Dtsch. militärärztl. Zeitschr.  
 3234. H. SNELLEN. *De Verlichting bij Skiaskopie.* Antwoord aan den Herrn J. D. C. Koch. Weekblad. No. 21. S. 649.  
 3235. H. WÜRDEMANN. *A simple skiaskope.* Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. VIII. S. 228.

## 1892.

3236. A. ANTONELLI. *Ottometro a Schiascopia.* Annali di Ottalmologia XXI. S. 219—221. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 230—232.  
 3237. G. BITZOS. *La Skiaskopie (Kératoscopie).* Paris. 96 S. Société d'éditions scientifiques.  
 3238. S. M. BURNETT. *Some incidental phenomena of the shadow test.* Med. News. 5. Nov. — Transact. of the Americ. ophthalm. soc. S. 383. — Americ. Journ. of Ophthalm. August.  
 3239. HEDDAEUS. *Zur Skiaskopie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXX. S. 326.  
 3240. W. E. LAMBERT. *Retinoscopy as a means of estimating astigmatism.* Read before the Hospital Graduates Club. May 24. New York med. Journ. Vol. LVI. S. 239.  
 3241. E. MÜLLER. *Zur Skiaskopie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXX. S. 389—390.  
 3242. H. PARENT. *Exposé théorique du procédé d'optométrie ophtalmoscopique dit de Cuignet ou skiaskopie.* Arch. d'ophthalm. T. XII. S. 287—314.  
 3243. RÜPPEL. *Zur Skiaskopie. I. Mathematische Begründung der Iristheorie. II. Einfluß der Einstellung des untersuchenden Auges.* Gräfe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. (2.) S. 174—203.

## 1893.

3244. L. BARDELLI. *La schiascopia. (Tesi de laurea. — Con note et aggiunte del Prof. L. Guaita.)* Diss. — Ann. d'Ottalm. XXII. S. 171.  
 3245. G. BITZOS. *Encore quelques mots sur la skiaskopie.* Ann. d'Oculist. T. CIX. S. 347.  
 3246. DUNN. *Some remarks upon retinoscopy as a means of determining the refraction of the nucleus of the lens.* Arch. of Ophthalm. XXII. S. 329. 333.  
 3247. C. HESS. *Zur Skiaskopie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 153—160.  
 3248. — *Demonstration eines Skiaskops.* Ber. d. XXIII. Vers. d. Ophthalm. Gesellsch. S. 236.  
 3249. JACKSON. *The position of the source of light and the observer in skiaskopy or the shadow test.* Arch. of Ophthalm. XXII. S. 321. 328.  
 3250. R. KATZ. *Ueber Skiaskopie.* Wratsch. No. 15.  
 3251. H. TRUHART-FELLIN. *Ueber Skiaskopie.* St. Petersburg. med. Wochenschr. No. 8. S. 65.  
 3252. H. WOLF. *Ein neues Scheibenskiaskop mit selbstthätigem Spiegelapparat.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Bd. XXXI. S. 439—447.  
 3253. ZIEM. *Ueber Durchleuchtung des Auges.* Wien. klin. Wochenschr. VI. S. 81—83 und S. 103—106.

## 1894.

3254. E. JACKSON. *Die Schzone der dioptrischen Medien und ihr Studium durch Skiaskopie.* Journ. Americ. med. Assoc. 1. Sept.  
 3255. R. KATZ. *Ueber die Prüfung der Refraktion des Auges mit Hülfe der Skiaskopie.* (Russisch). Wratsch. No. 29.  
 3256. L. KOTCHOROWSKI. *Ueber die Skiaskopie.* (Russisch). Woienno med. Journ. April.  
 3257. W. E. LAMBERT. *A refractometer for facilitating retinoscopy.* New York eye and ear infirmary Reports. II. S. 35.  
 3258. B. A. RANDALL. *Retinoskopie, als genaue Probe bei der Messung von Refraktionsstörungen.* Journ. Americ. med. Assoc. 1. Sept.  
 3259. P. SCROSSO. *Communications cliniques d'optometrie, ophtalmométrie, skiaskopie, etc.* Arch. di Ottalm. II.

### 3. Photographiren des Augenhintergrundes.

- 1865.
3260. A. M. ROSEBRUGH. *Sur un nouvel ophthalmoscope propre à photographier le fond de l'œil.* Ophthalm. Rev. S. 119.
- 1887.
3261. E. BARR. *On photographing the interior of the human eyeball.* Americ. Journ. Ophthalm. IV. S. 181.
3262. L. HOWE. *Photographs of the fundus of the living human eye.* Ophthalm. Rev. S. 304. — Transact. of the americ. ophthalm. soc. S. 568.
3263. PANEL. *D'un moyen pratique de photographier le fond de l'œil.* Paris, Delahaye und Lecrosnier.
3264. A. M. ROSEBRUGH. *Photographing the retinal image impressed on the living fundus oculi.* Toronto. 8 S.
- 1888.
3265. H. COHN. *Ueber Photographiren des Auges.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. März. S. 65. — Ber. des VII. intern. Ophthalm. Congr. zu Heidelberg S. 209.
3266. S. SEGAL. *Ein Apparat zum Photographiren des Augengrundes.* Abhandl. d. med. Sect. d. Ges. d. Exper.-Wiss. a. d. Univ. zu Charkow f. d. Jahr 1888. Heft 2. S. 41.
- 1891.
3267. O. GERLOFF. *Ueber die Photographie des Augenhintergrundes.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Bd. 29. S. 397—404.
- 1892.
3268. A. E. FICK. *Einige Bemerkungen über das Photographiren des Augenhintergrundes.* Ber. über die XXI. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 197.
- 1893.
3269. TH. GUILLOZ. *Photographie instantanée du fond de l'œil humain.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) V. 10. S. 285—286. — Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 465—480.
- 1894.
3270. L. HOWE. *Orthochromatic plates for photographing the interior of the human eye.* Transact. of the ophthalm. soc. of the United Kingdom. Vol. XIV. Sess. 1893/94. S. 251. London, Churchill.

## § 17.

### Von der Reizung des Sehnervenapparates.

Hinsichtlich der Litteratur über die allgemeine Lehre von den Empfindungen und der specifischen Energie der Sinnesorgane wird auf die betreffenden Zusammenstellungen in den größeren Lehr- und Handbüchern der Physiologie und Psychologie verwiesen.

#### 1. Mitempfindungen.

- 1786.
3271. L. HOFFMANN. *Versuch einer Geschichte der malerischen Harmonie.* Halle.
- 1812.
3272. G. T. L. SACHS. *Historia naturalis duorum leucōthiopum auctoris ipsius et sororis ejus.* Diss. inaug. Erlangen. S. 81 ff.
- 1824.
3273. J. H. G. SCHLEGEL. *Neue Materialien für die Staatsarmeykunde.* Meiningen. S. 98 ff.
- 1843.
3274. TH. GAUTIER. *La Presse.* 10. Juillet 1843.

- 1848.
3275. CH. A. E. CORNAZ. *Des abnormités congénitales des yeux et de leurs amers*. Lausanne. S. 149—150.
- 1849.
3276. E. WARTMANN. *Deuxième Mémoire sur le Daltonisme*. Genève. S. 16.
- 1851.
3277. CH. A. E. CORNAZ. *Ann. d'oculist.* No. 1. S. 3.
- 1860.
3278. L. V. MARCÉ. *Des altérations de la sensibilité*. Thèse de Paris.
- 1863.
3279. FERROUD. *Mém. de la soc. des sc. méd. de Lyon*. S. 37.
- 1864.
3280. CHABALLIER. *De la pseudochromesthésie*. Journ. de méd. de Lyon. août. S. 92.
- 1868.
3281. E. MACH. *Ueber die Abhängigkeit der Netzhautstellen von einander*. Prag. Ber. S. 10—11.
- 1872.
3282. DVORÁK. *Ueber eine Anwendung des Gesetzes der gegenseitigen Einwirkung benachbarter Netzhautstellen*. Prag. Ber. (1.) S. 73—74.
- 1873.
3283. F. A. NUSSBAUMER. *Ueber subjective Farbenempfindungen, die durch objective Gehr-empfindungen erzeugt werden*. Wien. med. Wochenschr. No. 1—3.
- 1879.
3284. APPIA. *De la corrélation physiologique entre les cinq sens et de leurs rapports avec les mouvements volontaires. Application à l'éducation des aveugles*. Paris. Imprimerie Nation.
- 1881.
3285. E. BLEULER und K. LEHMANN. *Zwangsmäßige Lichtempfindungen durch Schall und verwandte Erscheinungen auf dem Gebiete der anderen Sinnesempfindungen*. Leipzig. Fries. 96 S.
3286. H. KAISER. *Association der Worte mit Farben*. Arch. f. Augenheilkde. I. S. 96.
3287. SCHENKL. *Canustischer Beitrag zur Association der Worte mit Farben*. Prag. med. Wochenschr. VI. 48. S. 473.
- 1882.
3288. E. AGLAVE. *De l'audition des couleurs*. Assoc. franç. par l'avanc. d. sc. Ann. Rec. d'Ophtalm. S. 571.
3289. G. MAYERHAUSEN. *Ueber Association der Klänge speciell der Worte mit Farben*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XX. S. 383.
3290. PEDRONO. *De l'audition colorée*. Ann. d'Oculist. 88. S. 224.
3291. URBANTSCHITSCH. *Ueber den Einfluss der Erkrankungen des äußeren und mittleren Ohres auf die Sinnesempfindungen, insbesondere auf den Gesichtssinn*. Wied. med. Bl. No. 42.
- 1883.
3292. H. KAISER. *Association der Worte mit Farben*. Memorab. XXVII. S. 524.
3293. F. LUSSANA. *Sur l'audition colorée*. Arch. Ital. de Biol. IV. S. 269.
3294. SCHENKL. *Ueber Association der Worte mit Farben*. Prag. med. Wochenschr. No. 10 u. 11.
3295. V. URBANTSCHITSCH. *Ueber die Wechselwirkungen der innerhalb eines Sinnesgesetzten Erregungen*. Pflüger's Arch. XXXI. S. 280.
- 1884.
3296. R. HILBERT. *Ueber Association von Geschmacks- und Geruchsempfindungen mit Form- und Association von Klängen mit Formvorstellungen*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 1.
3297. F. LUSSANA. *Sull' udizione colorata*. Arch. ital. per le malattie neuroe. II. 5 Sett.
- 1885.
3298. J. DE BRIALE. *La musique des couleurs*. La Nature. XIII. 2. S. 343.
3299. A. CHARPENTIER. *Sur les connexions fonctionnelles des deux rétines*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 364.

3300. GIRANDEAU. *De l'audition colorée*. L'Encéphale. No. 5.
3301. PFLÜGER. *Ueber Erregungen und Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke*. Tagebl. d. LVIII. Vers. dtsch. Naturf. u. Ärzte in Straßburg. S. 257.
3302. A. DE ROCHAS. *L'audition colorée*. La Nature. XIII. 1. S. 306, 406. XIII. 2. S. 274. 1886.
3303. A. SCHIELE. *Ueber Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke*. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 145. 1887.
3304. A. SCHIELE. *On co-excitation in the regions of homonymous visual fields*. Englisch von H. Knapp. Arch. Ophthalm. New York. XVI. S. 317.
3305. SCHMIDT-RIMPLER. *Ueber den Einfluß peripherer Netzhautreizung auf das centrale Sehen*. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 76.
3306. H. STEINBRÜGGE. *Ueber secundäre Sinnesempfindungen*. Akademische Antrittsrede. Wiesbaden, J. F. Bergmann.
3307. URBANTSCHITSCH. *Ueber den Einfluß einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen*. Berl. klin. Wochenschr. S. 1025. 1888.
3308. BARATOUX. *L'audition colorée*. Paris, Delahaye et Lecrosnier.
3309. A. CHARPENTIER. *Influence de l'excitation d'un oeil sur l'acuité visuelle de l'autre*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 15.
3310. P. GRÜTZNER. *Ueber den Einfluß einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 44.
3311. LAURET und DUCHAUSBOY. *Un cas héréditaire d'audition colorée*. Bull. de la Soc. de psychol. physiol. III. S. 11.
3312. V. URBANTSCHITSCH. *Ueber den Einfluß einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen*. Pfüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 3. 1889.
3313. P. ALBERTONI. *Ueber Beziehungen zwischen Farben und Tönen*. Centralbl. f. Physiol. S. 345—347.
3314. R. RAMPOLDI. *Sui rapporti fisiologici che esistono negli apparati della vista e dell'udito*. Ann. di Ottalm. XVIII. S. 163. 1890.
3315. F. SUAREZ DE MENDOZA. *L'audition colorée. Etude sur les fausses sensations secondaires physiologiques et particulièrement sur les pseudo-sensations des couleurs associées aux perceptions objectives des sons*. Paris, Octave Doin. 164 p. et 13 tableaux.
3316. A. J. G. WAHLSTEDT. *Zwei Fälle von Farbenhören*. Verhandl. des biologischen Vereins in Stockholm. III. 1891.
3317. A. CHAUVEAU. *Sur les sensations chromatiques excitées dans l'un des deux yeux par la lumière colorée qui éclaire la rétine de l'autre oeil*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. CXIII. S. 394—398.
3318. CH. FÉRÉ. *Gustation et vision colorée*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 33. S. 769.
3319. P. SOLLIER. *Gustation colorée*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 32. S. 768 bis 764. 1892.
3320. H. BRAUNIS et A. BINET. *Sur deux cas d'audition colorée*. Rev. philos. Bd. 33. S. 448—461.
3321. A. BINET. *Le problème de l'audition colorée*. Rev. des Deux Mondes. Tome 113. S. 586—614.
3322. A. BINET et PHILIPPE. *Etude sur un nouveau cas d'audition colorée*. Rev. philos. Bd. 33. S. 461—464.
3323. TH. FLOURNOY. *Enquête sur l'audition colorée*. Arch. d. Sc. physiol. et natur. Bd. 28. S. 505—508.
3324. W. O. KROHN. *Pseudo-Chromesthesia, or the association of colors with words, letters and sounds*. Americ. Journ. of Psychol. V. S. 20—41.
3325. J. MILLET. *Audition colorée*. Paris, Doin. 81 S.
3326. E. B. TITCHENER. *Ueber binoculare Wirkungen monocularer Reize*. Diss. Leipzig. 80 S. — Wundt's Philos. Stud. VIII. 2. S. 231—310.



1893.

3327. GROENOUW. *Giebt es eine Miterregung im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke, wie sie Schiele beschrieben hat?* Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 112—133.

1894.

3328. A. E. FICK. *Ueber die Frage, ob zwischen den Netzhäuten eines Augenpaares ein sympathischer Zusammenhang besteht.* Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. in Zürich. Jahrg. XL.

## 2. Mechanische Reizung.

1706.

3329. J. NEWTON. *Optice. Quaestio XVI.*

1774.

3330. EICHEL. *Experimenta circa sensum videndi.* Collectan. soc. med. Havniensis. I. 1797.

3331. A. v. HUMBOLDT. *Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfasern.* II. 444.

1801.

3332. TH. YOUNG. *On the mechanism of the eye.* Phil. Transact. I. 23.

1819.

3333. \*PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne.* I. 78. 126. 136. 1825.

3334. MAGENDIE. *Journ. de Physiol.* IV. 180. V. 189.

3335. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne.* II. S. 115.

1826.

3336. J. MÜLLER. *Ueber die phantastischen Gesichterscheinerungen.* Coblenz. S. 30.

1832.

3337. D. BREWSTER. *Pogg. Annal.* XXVI. 156. — *Philos. Mag.* I. 56.

1833.

3338. SEILER. *Henke's Zeitschrift f. gerichtl. Med.* 4. Quartal. S. 266.

1834.

3339. LINCKE. *De fungo medullari.* Lipsiae.

3340. QUETELET. *Pogg. Ann.* XXXI. 494.

3341. J. MÜLLER in seinem *Arch. für Anat. und Physiol.* S. 140.

1840.

3342. TOURTUAL in J. Müller's *Handbuch der Physiologie.* II. 259.

1850.

3343. SERRES D'UZÈS. *Du phosphène.* *Compt. Rend.* XXXI. 375—378.

1854 und 55.

3344. \*CZERMAK. *Physiologische Studien.* Abth. I. § 5. S. 42 und Abth. II. S. 32. — *Wien. Sitzgs.-Ber.* XII. S. 322 und XV. S. 454.

1856.

3345. A. E. LAIBLIN. *Die Wahrnehmung der Choroidealgefäße des eigenen Auges.* Dissert. Tübingen.

3346. MEISSNER. *Bericht über die Fortschritte der Physiologie im Jahre 1856.* S. 563 in *Henle's Zeitschr. f. ration. Med.*

1858.

3347. J. CZERMAK. *Ueber das Accommodationsphosphen.* *Wien. Ber.* XXVII. S. 78—86. *Arch. f. Ophthalm.* VII. (1.) S. 147—154.

1863.

3348. R. SCHELSKE. *Ueber Farbenempfindungen.* *Arch. f. Ophthalm.* IX. (3.) S. 39—62.

1864.

3349. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut.* Breslau. S. 333—390.

3350. A. FICK. *Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane.* S. 270.

1870.

3351. V. SZOKALSKI. *Phosphene besonderer Art.* *Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde.* VIII. S. 146.

1874.

3352. E. BERLIN. *Ueber das Accommodationsphosphen.* *Arch. f. Ophthalm.* XX (1) S. 89.

3353. REICH. *Ueber einige subjective Erscheinungen bei gesteigertem intraocularen Druck.* *Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde.* S. 238.

- 1878.
3354. S. EXNER. *Zur Kenntniss von der Regeneration in der Netzhaut.* Pflüger's Arch. 16. S. 407. — Dtsch. Zeitschr. f. prakt. Med. No. 10.
3355. W. KÜHNE. *Beobachtung über Druckblindheit.* Unters. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. Bd. II. S. 46—58.
- 1879.
3356. S. EXNER. *Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und über Druckblindheit.* Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 614—626.
- 1881.
3357. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Ueber die spezifische Reaction der Sehnerven auf mechanische Reize.* Sitzgs-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. No. 4. S. 46—48.
- 1882.
3358. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur specifischen Reaction der Sehnerven auf mechanische Reize.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XX. S. 1.
- 1888.
3359. LANDESBERG. *Is the mechanical irritation of the optic nerve always followed by a sensation of light?* Med. Bull. Phil. 1882/83. XIII. S. 359.
- 1884.
3360. LANDESBERG. *Bewirkt die mechanische Reizung des Sehnervstammes die Auslösung einer Lichtempfindung?* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 7.
- 1885.
3361. W. FILEHNE. *Ueber die Entstehungsart des Lichtstaubes, der Starrblindheit und der Nachbilder.* Gräfe's Arch. XXXI. (2.) 1—30.
- 1886.
3362. C. GÜNTHER. *Subjective Gesichterscheinung des elliptischen Lichtstreifens.* Tagebl. d. LIX. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 417.
- 1887.
3363. C. GÜNTHER. *Ueber die subjective Gesichterscheinung der elliptischen Lichtstreifen.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 19. S. 400.
- 1889.
3364. KOLLER. *Experimental Scotoma by pressure on the eyeball.* Arch. of Ophthalm. XVII. 2.
- 1891.
3365. J. W. PARK. *Subjective light sensations following enucleation of the eyeball.* Arch. of Ophthalm. July. — Supplement to the Brit. med. Journ. No. 1601. September 5.
3366. S. L. SSEGAL. *Ueber die Phosphene im Auge an der Berührungsstelle.* Westnik Oftalmologii. März-April.

### 3. Elektrische Reizung.

- 1755.
3367. LE ROY. *Mém. de Mathém. de l'Acad. de France.* S. 86—92.
- 1793.
3368. PFAFF. *De electricitate sic dicta animale.* Stuttgart. Diss. Deutsch in Gren's Journal der Physik. VIII. S. 252. 253.
- 1795.
3369. PFAFF. *Ueber thierische Electricität und Reizbarkeit.* Leipzig. S. 142.
- 1798.
3370. RITTER. *Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß im Thierreiche begleitet.* Weimar. S. 127.
- 1800.
3371. VOLTA. *Colezione dell' Opere.* II. 2. S. 124.
3372. RITTER. *Beiträge zur näheren Kenntniss des Galvanismus.* Bd. II. St. 3. 4. S. 159. 166. § 93.
- 1801.
3373. \*RITTER. *Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus.* Gilbert's Ann. VII. S. 448.
- 1805.
3374. RITTER. *Neue Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus.* Gilbert's Ann. XIX. S. 6—8.

- 1819.
3375. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne*. Bd. 1. Prag. S. 50.
- 1828.
3376. MOST. *Ueber die großen Heilkräfte des in unseren Tagen mit Unrecht vernachlässigten Galvanismus*. Lüneburg. S. 812.
- 1825.
3377. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne*. II. S. 25. Berlin. — Kastner's Arch. f. d. ges. Naturlehre. V. S. 434.
- 1829.
3378. G. TH. FECHNER. *Lehrbuch des Galvanismus und der Electrochemie*. Kap. 39. S. 485 ff.
- 1830.
3379. HJORT. *De Functione retinae nervosae*. Part. II. Christiania. (Diss.) S. 31. § 17.
- 1848.
3380. E. DU BOIS-REYMOND. *Untersuchungen über thierische Electricität*. I. S. 283—293; 338—358.
- 1872.
3381. ROSENTHAL. *Einwirkung des electrischen Stromes auf die Centren der Sinnesorgane und die Haut*. Allg. Wien. med. Ztg. No. 27 u. 28.
- 1874.
3382. H. SCHLIEPHAKE. *Beiträge zur Kenntniß der Einwirkung des galvanischen Stromes auf das menschliche Auge. (Wirkung der Santoninvergiftung auf den Einfluß des galvanischen Stromes.)* Pfüger's Arch. f. Physiol. VIII. S. 565.
- 1880.
3383. B. TSCHERBATSCHOFF. *Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Auge*. Diss. Bern.
- 1884.
3384. C. EMERY. *Un phosphène électrique normal*. Arch. Ital. de Biol. V. S. 325.
- 1885.
3385. W. EHRHARDT. *Ueber den Einfluß elektrischer Ströme auf das Gesichtsfeld*. Diss. München. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1886. No. 10.
- 1888.
3386. D'ARSONVAL. *Surdité consécutive à l'action de la lumière électrique sur la rétine*. Soc. de Biol. 23. Juni.
- 1889.
3387. O. SCHWARZ. *Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Auge*. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. Bd. XXI. S. 500.
- 1892.
3388. G. GRIJNS. *Bijdrage tot de physiologie van den nervus opticus*. Onderz. Physiol. Labor. Utrecht. IV. Reeks. I. Deel. No. 2.
- 1893.
3389. A. HOCHÉ. *Ueber die galvanische Reaction des Schapparates*. Vortr. auf d. XVII. Wandervers. d. Neurol. zu Baden-Baden. 1892.
- 1894.
3390. L. O. FINKELSTEIN. *Ueber optische Phänome bei electrischer Reizung des Schapparates*. Arch. f. Psychiatr. XXVI. S. 867—885.

## § 18.

## Von der Reizung durch Licht.

## 1. Blinder Fleck und Ort der lichtempfindlichen Schicht.

1668.  
 3391. MARIOTTE. *Oeuvres*. S. 496—546; ferner in *Mém. de l'Acad. de Paris 1669 et 1682*.  
*Philos. Transact.* II. S. 668. *Acta Eruditorum*. 1683. S. 68.  
 1670.  
 3392. PECQUET. *Philos. Transact.* XIII. S. 171.  
 3393. PERRAULT. *Philos. Transact.* XIII. S. 265.  
 1694.  
 3394. DE LA HIRE. *Accidens de la vue*.  
 1704.  
 3395. MERY. *Hist. de l'Acad. de Paris*.  
 1709.  
 3396. DE LA HIRE. *Explication de quelques faits d'optique et de la manière dont se fait la vision*. *Hist. de l'Acad. de Paris*. S. 119.  
 1711.  
 3397. DE LA HIRE. *Hist. de l'Acad. de Paris*. S. 102.  
 1728.  
 3398. D. BERNOULLI. *Experimenta circum nervum opticum*. *Comment. Petropol. vet.* I. S. 314.  
 1788.  
 3399. SMITH. *Optics*. Cambridge. Remarks. S. 6. (Dtsch. Ausg. S. 367.)  
 1740.  
 3400. LE CAT. *Traité des sens*. Rouen. S. 171, 176—180.  
 1755.  
 3401. ZINN. *Descriptio oculi humani*. S. 37.  
 1757.  
 3402. A. HALLER. *Physiologia*. V. S. 357, 474.  
 1759.  
 3403. PORTERFIELD. *On the eye*. II. S. 252, 254.  
 1772.  
 3404. MICHELL. *Priestley's Geschichte der Optik*. 4. Per. 5. Abth. 2. Kap. (Dtsch. Ausg. S. 149.)  
 1819.  
 3405. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche*. I. S. 70 u. 83.  
 1835.  
 3406. D. BREWSTER. *Pogg. Ann.* XXIX. S. 339.  
 3407. G. R. TREVIRANUS. *Beiträge zur Aufklärung der Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens*. Bremen.  
 1838.  
 3408. GRIFFIN. *Contributions to the physiology of vision*. London med. gaz. Mai. S. 230.  
 1840.  
 3409. J. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie*. II. S. 370.  
 1844.  
 3410. VALENTIN. *Lehrbuch der Physiologie*. 1. Ausg. II. S. 444.  
 1846.  
 3411. A. W. VOLKMANN. Art.: *Sehen* in *Wagner's Handwörterb. d. Physiol.* III. S. 272.  
 1850.  
 3412. A. HANNOVER. *Bidrag til Odets Anatomie, Physiologie og Pathologie*. Kjöbenhavn. VI. S. 61.  
 1851.  
 3413. H. HELMHOLTZ. *Beschreibung eines Augenspiegels*. Berlin. S. 39.

- 1852.
3414. E. H. WEBER. *Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge.* Verh. d. Leipz. Ges. S. 138.
3415. A. KOELLIKER. *Zur Anatomie und Physiologie der Retina.* Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. 3. Juli.
3416. F. C. DONDEES. *Onderzoekingen gedaan in het physiol. Laborat. d. Utrecht'sche Hoogeschool.* VI. S. 134.
- 1853.
3417. D. BREWSTER. *Account of a case of vision without retina.* Rep. of the British Assoc. at Belfast. S. 3.
3418. A. FICK und P. DU BOIS-REYMOND. *Ueber die unempfindliche Stelle der Netzhaut im menschlichen Auge.* J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 396.
3419. A. COCCIUS. *Die Anwendung des Augenspiegels.* Leipzig. S. 20.
3420. A. W. VOLKMANN. *Ueber einige Gesichtspheänomene, welche mit dem Vorhandensein eines unempfindlichen Fleckes im Auge zusammenhängen.* Ber. d. Leipz. Ges. d. Wiss. S. 27.
- 1854.
3421. C. BERGMANN. *Zur Kenntniss des gelben Flecks der Netzhaut.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. (2.) S. 245—252.
3422. J. CZERMAK. *Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Auge.* Wien. Ber. XII. S. 360.
- 1855.
3423. J. BUDGE. *Beobachtungen über die blinde Stelle der Netzhaut.* Verh. d. naturhist. Vereins d. Rheinlande. S. XLI.
3424. J. CZERMAK. *Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Auge.* Wien. Ber. XV. S. 454.
3425. H. MÜLLER. Verh. d. phys. med. Ges. zu Würzburg. IV. S. 100. V. S. 411—446.
- 1856.
3426. \*H. MÜLLER. *Anatomisch physiologische Untersuchungen über die Retina bei Menschen und Thieren.* Siebold u. Kolliker's Zeitschr. f. wiss. Zool. VIII. S. 1—122.
- 1857.
3427. H. AUBERT und FÖRSTER. *Ueber den blinden Fleck und die scharfsehende Stelle im Auge.* Berl. allg. med. Centralztg. No. 33. S. 259 u. 260.
- 1859.
3428. A. COCCIUS. *Ueber Glaukom, Entzündung und die Autopsie mit dem Augenspiegel.* Leipzig. S. 40 u. 52.
3429. E. WIESENER. *De macula Mariottiana.*
- 1860.
3430. G. BRAUN. *Notiz zur Anatomie der Stäbchenschicht der Netzhaut.* Wien. Ber. XLII. S. 15—19.
3431. G. M. CAVALLIERI. *Sul punto cieco dell' occhio.* Atti dell' Istit. Lomb. II. S. 89 bis 91.
- 1861.
3432. H. MÜLLER. *Bemerkungen über die Zapfen am gelben Fleck des Menschen.* Würzb. Zeitschr. f. Naturkde. II. S. 218—221.
- 1862.
3433. A. W. VOLKMANN. *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik.* Heft 1. S. 65. Leipzig.
- 1863.
3434. WITTICH. *Studien über den blinden Fleck.* Arch. f. Ophthalm. IX. 3. S. 1—38.
- 1864.
3435. W. ZEHENDER. *Historische Notiz zur Lehre vom blinden Fleck.* Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 152—155.
- 1866.
3436. O. FUNKE. *Zur Lehre vom blinden Fleck.* Freib. Ber. III. 3. S. 1—15.
- 1867.
3437. GIRAUD-TEULON. *Instrument zur Messung der Sehnerven-Papille.* Klin. Mon.-Bl. V. S. 297.
- 1869.
3438. M. WOINOW. *Ueber das Sehen mit dem blinden Fleck und seiner Umgebung.* Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 155—166.

1871.

3439. W. DOBROWOLSKY. *Ueber den Abstand zwischen Fovea centralis und dem Centrum des blinden Fleckes in Augen von verschiedener Refraction.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 437—453.
3440. DUBRUNFAUT. *Sur quelques particularités des perceptions visuelles objectives et subjectives.* Mondes XXVI. S. 77. — Compt. Rend. Bd. 73. S. 752.
3441. — *Vision.* Institut S. 102.
3442. E. LANDOLT. *Die directe Entfernung zwischen Macula lutea und Nervus opticus.* Med. Centralbl. 45.

1872.

3443. E. LANDOLT. *La distanza diretta tra la macula lutea e la papilla del nervo ottico.* Giorn. d'ottalmologia del Prof. Quaglino. II. 1. S. 1.

1883.

3444. S. EXNER. *Die mangelhafte Erregbarkeit der Netzhaut für Licht von abnormer Einfallerichtung.* Wien. Akad. Ber. 88. III. Heft. — Exner's Rep. d. Physik. S. 233—237.
3445. STRICKER. *Ueber die lichtempfindenden Apparate der Retina.* Sitzg. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 30. März 1883. Wien. Med. Presse, No. 14.

1884.

3446. W. DOBROWOLSKY. *Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen zu gleicher Zeit.* Pflüg. Arch. f. Physiol. XXXV. S. 537—541. — St. Petersburg. med. Woch.-Schr. S. 398.

1885.

3447. SCHLEICH. *Untersuchungen über die Größe des blinden Fleckes und seine räumlichen Beziehungen zum Fixationspunkte.* Mitth. a. d. ophthalm. Klin. in Tübingen. II. S. 181.

1886.

3448. S. EXNER. *Ueber die Functionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder.* Graefe's Arch. f. Ophth. XXXII (1). S. 233—252.

1890.

3449. V. BASEVI. *Ueber die directe Entfernung der negativen physiologischen Scotome von dem Fixirpunkt und dem Mariotte'schen Fleck.* Arch. f. Augenheilkde. XXXII. S. 1—10.

1892.

3450. M. BOTTO. *Recherches sur la position et l'étendue de la tache de Mariotte dans les yeux myopes.* Actes du congr. ophthalm. de Palermo. — Ann. d'ophthalm. XXII. 1.

1893.

3451. M. BOTTO. *Ricerche sulla posizione ed estensione della regione cieca dell Mariotte negli occhi miopi.* Ann. di Ottalm. XXII. S. 42.

1894.

3452. J. GAD. *Der Energieumsatz in der Retina.* du Bois' Arch. f. Physiol. S. 491—503.
3453. A. KÖNIG u. J. ZUMPT. *Ueber die lichtempfindliche Schicht in der Netzhaut des menschlichen Auges.* Sitzgs. Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 439—442.

## 2. Vorgänge in der Netzhaut und in dem Sehnerven bei einfallendem Lichte. — Sehpurpur.

1865.

3454. FR. HOLMGREN. *Methode, um die Wirkung von Lichteindrücken auf die Retina objektiv kenntlich zu machen.* Upsala Läkaref. Förh. I. S. 177—191.

1870.

3455. V. BRAVAIS. *Du rôle de la choroïde dans la vision.* Acad. imp. de Méd. 4. Jan. Gaz. des hôp. S. 6.

1871.

3456. F. HOLMGREN. *Om retinaströmmen. (Ueber die Retinaströme.)* Upsala Läkaref. Förh. VI. S. 419—455.

1872.

3457. S. EXNER. *Ueber den Erregungsvorgang im Sehnervenapparat.* Wien. acad. Ber. 65. (3) S. 59—70.

3458. TAIT. *Note on a singular property of the retina.* Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. VII. S. 605—607.

1878.

3459. J. DEWAR u. J. MAC KENDRICK. *The physiological action of light.* Journ. of Anat. and Physiol. XII. S. 275—285.

1874.

3460. J. DEWAR and J. MAC KENDRICK. *On the physiological action of light.* Part. I. Edinburgh.

1875.

3461. M. DUVAL. *Sur l'action physiologique de la lumière.* Mondes (2.) XXXVII. S. 324—335.

3462. J. DEWAR. *L'action physiologique de la lumière.* Rev. Scientif. V<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> série. S. 516—520.

1876.

3463. F. BOLL. *Zur Anatomie und Physiologie der Retina.* Berl. Ber. 23. Novbr.

1877.

3464. H. ADLER. *Mittheilungen über das Vorkommen des Sehroth (Sehpurpur) im Menschenauge.* Wien. med. Presse. XVIII. S. 950—952.

3465. — *Beobachtungen über das Vorkommen von Sehpurpur am kranken und verletzten Menschenauge.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 14. S. 242—245.

3466. O. BECKER. *Ueber die ophthalmoskopische Sichtbarkeit des Sehroth.* Ber. d. Heidelb. Ophthalm. Congr.

3467. F. BOLL. *Zur Physiologie des Sehens und der Farbenempfindung.* Berl. Ber. 11. Jan. u. 15. Febr. — Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 23.

3468. — *Zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut.* Du Bois - Reymond's Arch. f. Physiol. S. 3. — *Memorie della Acad. dei Lincei.* 4. S. 25. In französ. Uebersetzung. Ann. d'Oculist. LXXVII. S. 221—263.

3469. — *Sull' anatomia e fisiologia della retina.* C. tav. color. Firenze.

3470. ST. CAPRANICA. *Physiologisch-chemische Untersuchungen über die farbigen Substanzen der Retina.* Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 282—296.

3471. A. CHODIN. *Ueber die chemische Reaction der Netzhaut und des Sehnerven.* Wien. Ber. 19. Juli. — Milit.-med. Monatsschr. December.

3472. — *Ueber die Veränderungen der Retina unter dem Einflusse des Lichts.* Med. Bot. No. 50—51.

3473. A. COCCIUS. *Diagnose des Sehroth am Lebenden.* Univ.-Progr. 3. Juni. Leipzig.

3474. J. DEWAR. *L'action physiologique de la lumière.* 2<sup>e</sup> partie. Rev. Scientif. (2.) XII S. 1245—1251.

3475. DIETL u. PLENK. *Ueber den Sehpurpur.* Mitth. a. d. med.-naturwiss. Ver. zu Innsbruck. 7. Februar.

3476. — *Untersuchungen über die Wahrnehmbarkeit des Sehpurpurs (Sehroth) mit dem Ophthalmoskope.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. No. 16. S. 277.

3477. A. EWALD. *Ueber Optographie und die dazu erforderlichen Apparate.* Beil. z. d. klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 105—109.

3478. A. EWALD u. W. KÜHNE. *Untersuchungen über den Sehpurpur.* Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 138—218. S. 248—290. S. 370—422.

3479. S. EXNER. *Ueber den Sehpurpur.* Wien. med. Wochenschr. No. 8.

3480. E. FUCHS. *Zur Farbe der Netzhaut.* Wien. med. Wochenschr. No. 10. S. 221.

3481. HELFREICH. *Ophthalmoskopische Mittheilungen über den Purpur der Retina.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. S. 113—115.

3482. HORNER. *Ueber Sehroth.* Centralbl. f. Augenheilkde. Sept.-Hft. Beil.

3483. L. KÖNIGSTEIN. *Ueber den Sehpurpur.* Wien. med. Presse. XVIII. No. 12.

3484. — *Ueber Sehpurpur und dessen Diagnose mit dem Augenspiegel.* Wien. med. Presse. XVIII. No. 18.

3485. W. KÜHNE. *Ueber den Sehpurpur.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 11.

3486. — *Ueber den Sehpurpur.* Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 15—105.

3487. — *Ueber das Vorkommen des Sehpurpurs.* Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. S. 257.

3488. — *Ueber die Verbreitung des Sehpurpurs im menschlichen Auge.* Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 105—108.

3489. — *Weitere Beobachtungen über den Sehpurpur des Menschen.* Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 109—113.

3490. W. KÜHNE. *Das Sehen ohne Sehpurpur*. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 119—138.
3491. — *Les colorations de la rétine et la photographie dans l'oeil*. Rev. Scient. VI. (2.) S. 841—845.
3492. — *Zur Photochemie der Netzhaut*. Heidelberg, C. Winter. — Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 1—15.
3493. — *Optographische Untersuchungen*. Centralbl. f. d. med. Wiss. 20. u. 27. Jan.
3494. — *Ueber die Darstellung von Optogrammen im Froschauge*. Unters. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 225—241.
3495. W. KÜHNE u. A. EWALD. *Ueber künstliche Bildung des Sehpurpurs*. Med. Centralbl. XV. S. 753.
3496. F. LEYDIG. *Die Farbe der Retina und das Leuchten der Augen*. Arch. f. Naturg. XLIII. S. 121—126.
3497. J. MICHEL. *Zur Kenntniss des Sehroths*. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 432.
3498. H. SCHMIDT-REMPLER. *Sehroth bei einem Amaurotischen und Bemerkungen über die ophthalmoskopische Farbe der Macula und des Augenhintergrundes*. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 400—401.
3499. — *Zur Lichtempfindung an der Stelle des congenitalen Choroideal-Colombom*. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 176—179.
3500. J. SCHNABEL. *Notiz zur Lehre vom Sehpurpur*. Wien. med. Wochenschr. S. 258—259.
3501. *Sur la coloration rouge de la rétine*. Ann. d'Oculist. LXXVII. S. 77—81; 202—211.
3502. *Coloration pourprée de la rétine d'après Messrs. Boll et Kühne*. Journ. de l'anat. et de physiol. XIII. S. 313—320.

## 1878.

3503. AYRES u. KÜHNE. *Ueber Regeneration des Sehpurpurs*. Unters. a. d. physiol. Inst. zu Heidelberg. II. S. 215—240.
3504. S. EXNER. *Zur Kenntniss von der Regeneration in der Netzhaut*. Pflüg. Arch. XVI. S. 407.
3505. GIRAUD-TEULON. *Fixation des images sur la rétine et pourpre rétinien*. Bull. de l'Acad. de méd. No. 32. — Arch. génér. Oct.
3506. — *Sur la persistance des images sur la rétine. Rapport concernant les expériences relatives au pourpre de la rétine*. Mondes 2. Sér. XLVI. S. 707.
3507. G. HALTENHOFF. *Resumé des travaux publiés sur le pourpre visuel*. Arch. d. Sc. physiol. et natur. de Genève. LXI.
3508. V. HENSEN. *Ueber Sehpurpur bei Mollusken*. Zool. Anz. I. No. 2. S. 30.
3509. HJORT. *Ueber den Sehpurpur*. Norsk Mag. 3 R. VIII. 1. Forh. S. 205.
3510. F. HOLMGREN. *Ueber Sehpurpur und Retinaströme*. Heidelb. physiol. Unters. II. Heft 1.
3511. — *Ueber Sehpurpur und Retinaströme*. Upsala Läkaref. Förh. S. 666—673.
3512. W. KÜHNE. *Fortgesetzte Untersuchungen über die Retina und die Pigmente des Auges*. Heidelb. Unters. II. S. 89—105 und S. 105—133.
3513. — *Beobachtungen an der frischen Netzhaut des Menschen*. Heidelb. Unters. II. S. 69—80.
3514. — *On the Photochemistry of the Retina and on visual Purple*. Aus d. Deutschen übers. von FOERSTER. London, Macmillan & Co.
3515. — *Notizen zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut. (Macula lutea und fovea centralis.)* Heidelb. physiol. Unters. II. S. 378—384.
3516. — *Sur le pourpre visuel*. Uebers. von DUFOUR. Ann. d'Oculist. Bd. 79. S. 32—46.
3517. — *Addition to the Article: „On the Stable Colours of the Retina.“* Journ. of Physiol. I. (2.) S. 189—192.
3518. — *Nachträge zu den Abhandlungen über den Sehpurpur*. Heidelb. physiol. Unters. I. S. 455—470.
3519. — *Notiz über die Netzhaut der Eule*. Heidelb. physiol. Unters. II. S. 257—259.
3520. — *Zur Abwehr einiger Irrthümer über das Verhalten des Sehpurpurs*. Heidelb. physiol. Unters. II. S. 254—257.
3521. W. KÜHNE u. W. C. AYRES. *Ueber lichtbeständige Farben der Netzhaut*. Heidelb. physiol. Unters. I. S. 341—369. — Englisch von Dr. AYRES in Journ. of Physiol. I. (2.) 109—130.
3522. F. W. KRUENBERG. *Der Stäbchenpurpur des Cephalopodenauges*. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I.
3523. — *Ueber die Stäbchenfarbe der Cephalopoden*. Heidelb. Unters. II. S. 58—61.
3524. MASOIN. *L'oeil comme appareil photographique*. Louvain.
3525. TIXIER. *Ueber Fixirung von Bildern auf der Netzhaut*. Bull. de l'Acad. August.



## 1879.

3526. W. C. AYRES. *Zum chemischen Verhalten des Sehpurpurs.* Heidelb. Unters. II. S. 444—447.
3527. M. H. BEAUREGARD. *Contribution à l'étude du rouge rétinien.* Journ. de l'Anat. et de la Physiol. XV. (2.) S. 161—174.
3528. BOUCHARDT. *La lumière et son action sur l'oeil.* Arch. d'Ophthalm. Bd. 82. S. 104. — Rev. Scient. IX. (2.) No. 7. S. 145—150.
3529. CHITTENDEN. *Beiträge zur Histochemie des Sehepithels.* Unters. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. II. S. 437—443.
3530. DRÄNERT. *Der Sehpurpur.* Westermann's Monatsh. Juni. S. 379.
3531. S. EXNER. *Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und über Druckblindheit.* Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 614—626.
3532. O. HAAB. *Der Sehpurpur und seine Beziehungen zum Sehact.* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. IX.
3533. — *Die Farbe der Macula lutea und die entoptische Wahrnehmung des Sehpurpurs.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. October.
3534. HEUSE. *Ueber Schroth und Sehpurpur.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 29.
3535. FR. HOLMGREN. *Ueber die Retinaströme.* Heidelberger physiol. Unters. III.
3536. W. KÜHNE. *Chemische Vorgänge in der Netzhaut.* Handb. d. Physiol. von L. HEBMANN. III. (1.) S. 235—342.
3537. — *Notiz über die Netzhautfarbe belichteter menschlicher Augen.* Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. III. S. 194—197.
3538. E. NETTLESHIP. *Observations of Visual Purple in the Human Eye.* Journ. of Physiol. II. (1.) S. 38—41.
3539. C. PUGLIA. *Sulla porpora visuale; osservazioni sperimentali e note.* Ann. di Ottalm. VII. S. 568—587. — Gaz. méd. de Paris. 12. Juli.

## 1880.

3540. P. ALBERTONI. *Sul rosso della retina nel feto e nel neonato.* Lo Sperimentale. Juni.
3541. W. E. AYRES. *Visual Purple.* New-York. med. Journ. XXXII. S. 189.
3542. M. H. BEAUREGARD. *Beitrag zum Studium des Retinarothes.* Journ. de l'Anat. et de la Physiol. S. 161.
3543. H. R. BIGELOW. *The action of the visual purple in the Eel.* New York. Med.-Rec. XVIII. (2.) S. 37.
3544. BRIGIDI u. TAFANI. *Sul rosso retinico.* Lo Sperimentale.
3545. CHITTENDEN. *Notiz über die Netzhautfarbe beleuchteter menschlicher Augen.* Heidelb. physiol. Unters. III.
3546. F. HOLMGREN. *Ueber Retinaströme.* Upsala Läkaref. Förh. XV. S. 480—481.
3547. F. KLUG. *Verhalten des Sehpurpurs gegen dunkle Wärmestrahlen.* Heidelb. physiol. Unters. III. S. 418.
3548. W. KÜHNE u. H. SEWALL. *On the physiology of the retinal epithelium.* Journ. of Physiol. III. S. 88—92.
3549. — *Zur Physiologie des Sehepithels.* Heidelb. Unters. III. S. 221—277.
3550. W. KÜHNE u. J. STEINER. *Ueber das electromotorische Verhalten der Netzhaut.* Heidelb. physiol. Unters. III. S. 327.

## 1881.

3551. A. ANGELUCCI. *Sull' azione della luce e dei colori sull' epitelio retinico.* Gaz. med. di Roma. VIII. — Ann. di Ottalm. X. 6. S. 518—528.
3552. W. C. AYRES. *The physiology of the visual purple.* New-York. med. Journ. XXXIII. 5. S. 552.
3553. — *Permanent pictures on the retina.* New-York. med. Journ. XXXIII. 3. S. 321.
3554. F. BOLL. *Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 1—38.
3555. W. KÜHNE u. J. STEINER. *Ueber elektrische Vorgänge im Sehorgan.* Heidelb. physiol. Unters. Bd. IV. S. 64—168.
3556. E. LANDOLT. *Des fonctions rétinienues.* Arch. d'ophthalm. I. S. 193—211.
3557. PARINAUD. *L'héméralopie et les fonctions du pourpre visuel.* Compt. Rend. Bd. 93. No. 5. S. 286. — Gaz. méd. de Paris. No. 34. S. 484.

## 1882.

3558. A. ANGELUCCI. *De l'action de la lumière et des couleurs sur l'épithélium rétinien.* Ann. Soc. de méd. de Gand. LX. S. 100.

3559. N. BERNARDY. *Du pourpre rétinien et de sa sécrétion*. Nancy. 61 S.
3560. A. CHARPENTIER. *Nouvelles recherches sur la sensibilité de la rétine*. Arch. d'ophthalm. S. 234.
3561. CHITTENDEN. *Beiträge zur Histochemie des Sehepithels*. Heidelb. Unters. II. S. 488.
3562. DE HAAS. *Umsetzung von Licht in Erregung zum Sehen*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 219.
3563. W. KÜHNE. *Bemerkungen zu Herrn Hoppe-Seyler's Darstellung der Optochemie*. Heidelb. Unters. II. S. 488—492.
3564. — *Beiträge zur Optochemie*. Heidelb. Unters. IV. S. 169—252.
3565. — *Beobachtungen zur Anatomie und Physiologie der Retina*. Heidelb. Unters. IV. S. 280—284.
3566. MORECHOVEZ. *Sur les processus photochimiques de la vision*. Moscou. Leçon pour l'agrégation. 25. Februar. 1883.
3567. S. EXNER. *Die mangelhafte Erregbarkeit der Netzhaut für Licht von abnormer Einfallerrichtung*. Wien. Acad. Ber. 88. III. — Exner's Rep. d. Physik.
3568. STRICKER. *Ueber die lichtempfindenden Apparate der Retina*. Stzgs.-Ber. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 30. März. — Wien. med. Presse. No. 14. 1884.
3569. A. CHARPENTIER. *Nouvelles recherches analytiques sur les fonctions visuelles*. Arch. d'ophthalm. S. 291.
3570. Th. W. ENGELMANN. *Ueber Bewegungen der Zapfen und Pigmentzellen der Netzhaut unter dem Einfluß des Lichtes und des Nervensystems*. Pflüger's Arch. XXXV. S. 498 bis 508.
3571. A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. *De bewegingen van kegels en pigment in der retina onder den invloed van het licht*. Acad. Wetenschappen te Amsterdam Afd. Natuurk. 28. juni.
3572. — *Bewegingen der kegels van het netvlies onder den invloed van licht and duister*. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Natuurk. 29 maart.
3573. H. SEWALL. *On the physiological effects of light which enters the eye through the sclerotic coat*. Journ. of Physiol. and Anat. S. 132. 1885.
3574. A. ANGELUCCI. *Una nueva teoria sobre la vision*. Bolet. de la clin. oft. del Hospit. de Santa Cruz. No. 2. 3. 4. S. 20. 35. 54.
3475. — *Une nouvelle theorie sur la vision*. Franz. von PARISOTTI. Rec. d'Ophthalm. S. 220.
3576. E. BERTHOLD. *Ueber die objectiv wahrnehmbaren Veränderungen der belichteten Netzhaut*. Königsberger Schriften. XXVI. S. 18—21.
3577. CHARPENTIER. *Réponse aux observations de Parinaud à propos des fonctions des éléments rétinien*. Compt. Rend. CI. S. 976—977.
3578. H. DRESER. *Zur Chemie der Netzhautstäbchen*. Zeitschr. f. Biol. XXII. S. 23.
3579. P. EHRlich. *Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus*. Eine farbenanalytische Studie. Berlin. 167 S.
3580. Th. W. ENGELMANN und A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. *Over de staafjes-en kegellaag van het netvlies der duif*. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Natuurk. 28 maart.
3581. GRADENIGO. *Ueber den Einfluß des Lichtes und der Wärme auf die Retina des Frosches*. Allg. Wien. med. Ztg. XXX. S. 343. 353. — Gazz. d. osp. Milano. VI. S. 378. 587.
3582. PARINAUD. *Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangibilité différente; la sensibilité dans la macula et les parties périphériques; rôle du pourpre visuel*. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 329.
3583. — *Nouvelle réplique à la réponse de Charpentier à propos des fonctions des éléments rétinien*. Compt. Rend. CI. S. 1078. 1886.
3584. A. ANGELUCCI. *Une nouvelle théorie de la vision*. Rec. d'Ophthalm. S. 34.
3585. — *Una nuova theoria sulla visione. Terza comunicazione preventiva*. Cagliari.
3586. R. DUBOIS. *De l'action de la lumière émise par les êtres vivants sur la rétine et sur les plaques au gélatino-bromure*. Soc. de Biol. 20. März.
3587. H. DRESER. *Zur Chemie der Netzhautstäbchen*. Zeitschr. f. Biol. XXII. S. 23—39.
3588. S. EXNER. *Ueber die Functionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder*. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (1.) S. 9.

3589. A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. *Ueber Form- und Ortsveränderungen der Erbn in der Sehzellenschicht nach Beleuchtung.* Ber. üb. d. XVIII. Vers. d. ophthalm. Heft 2. S. 43.
3590. — *Mouvements des éléments de la rétine sous l'influence de la lumière.* Arch. néerl. XXI. 316—386. Holländisch in: Onderz. Physiol. Labor. Utrecht. III. R. I. D.
3591. GRADENIGO. *Intorno all' influenza della luce e del calore sulla retina della rana.* Mitth. a. d. embryol. Inst. von Schenk.
3592. PARINAUD. *Anesthésie de la rétine. Contribution à l'étude de la sensibilité visuelle.* Acad. roy. de Méd. de Belgique. 1887.
3593. A. ANGELUCCI. *Une nouvelle théorie sur la vision, troisième communication.* In v. PARISOTTI. Rec. d'Ophthalm. S. 394.
3594. EMMERT. *Ueber die Vorgänge in der Netzhaut beim Sehen.* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. S. 254.
3595. FIEUZAL. *Les verres gris-jaunes et les mouvements des éléments rétinien.* Bull. clin. nat. ophthalm. de l'hôp. des Quinze-Vingts. S. 73.
3596. A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. *Ueber Form- und Ortsveränderungen der Netzhaut unter Einfluss von Licht und Dunkel.* Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. S. 229.
3597. — *Bewegingen van de elementen der retina onder den invloed van het licht.* Vers. Unders. (3.) X. S. 183—259. Arch. néerl. Bd. XXI. S. 316—386. 1888.
3598. B. M. GUNN. *On the nature of light-perceiving organs and of light-perception.* Ophthalm. Hosp. Report. XII. 2. S. 101.
3599. D. J. HAMBURGER. *Staafjesrood in monochromatisch licht.* Feestbundel a. F. C. Donders. Amsterdam. S. 285.
3600. — *De doorsnyding van den Nervus opticus etc. (Durchschneidung des Nervus opticus bei Fröschen, mit Bezug auf die Bewegung von Pigment und Zapfen in der Netzhaut unter dem Einfluss von Licht und Dunkel.)* Donders-Feestbundel van het Tydsk. v. Geneesk. S. 261. 1889.
3601. A. ANGELUCCI. *Recherches sur la fonction visuelle et la rétine et du cerveau.* Bull. d'Ophthalm. S. 1. 201. 269. 332. 604. 660.
3602. D. AXENFELD. *Contribution à l'optique physiologique.* Arch. Ital. de Biol. S. 10—12.
3603. S. EXNER. *Durch Licht bedingte Verschiebungen des Pigments im Insectenauge und deren physiologische Bedeutung.* Wien. Stzgs.-Ber. XCVIII. 3. S. 143—154. Auchsepts. Wien. Tempsky. 9 S.
3604. A. E. FICK. *Ueber Lichtwirkungen auf die Netzhaut des Frosches.* Ber. d. Ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 177. 1890.
3605. A. ANGELUCCI. *Recherches sur la fonction visuelle de la rétine et du cerveau.* Bull. d'Ophthalm. S. 3—24.
3606. — *Untersuchungen über die Sehtätigkeit der Netzhaut. [Aus: Untersuchungen über die Naturlehre der Menschen und der Thiere.]* Gießen, Roth. S. 231—357.
3607. ARCOLEO. *Osservazioni sperimentali sugli elementi contrattili della retina negli anuri a sangue freddo.* Ann. di Ottalm. XIX. S. 253.
3608. A. E. FICK. *Ueber die Ursachen der Pigmentwanderung in der Netzhaut.* Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. in Zürich. 1. 1891.
3609. E. BERANECK u. L. VERREY. *Sur une nouvelle fonction de la Choroïde.* Bull. la Soc. de sc. natur. de Neuchâtel. XX.
3610. A. E. FICK. *Untersuchung über die Pigmentwanderung in der Netzhaut des Frosches.* Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (2.) S. 1—20. 1893.
3611. E. GAGLIO. *Le modificazioni del pigmento all' oscurità ed alla luce nella retina della rana.* Arch. di Ottalm. I. S. 225.
3612. W. NAHMACHER. *Ueber den Einfluss reflectorischer und centraler Opticusanregung auf die Stellung der Zapfen in der Froschnetzhaut.* Physiol. Lab. Utrecht. II. 2. S. 1—10. — Pfüger's Arch. Bd. 53. S. 375—387.

1894.

3613. BIRNBACHER. *Ueber eine Farbenreaction der belichteten und unbelichteten Netzhaut.* Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XI. (5.) S. 1—7.  
 3614. S. FUCHS. *Untersuchungen über die im Gefolge der Belichtung auftretenden galvanischen Vorgänge in der Netzhaut und ihren zeitlichen Verlauf.* I. Mitth. Pflüger's Arch. Bd. 56. S. 408—463.  
 3615. J. GAD. *Der Energieumsatz in der Retina.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1894. S. 491—503.  
 3616. A. KÖNIG. *Ueber den menschlichen Sehpurpur und seine Bedeutung für das Sehen.* Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 577—598.  
 3617. J. v. KRIES. *Ueber den Einfluß der Adaptation auf Licht- und Farbenempfindung und über die Function der Stäbchen.* Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. B. IX, 2. S. 61—70. — Auch sep. Freiburg i. B., Mohr. 14 S.  
 3618. PARINAUD. *La sensibilité de l'oeil aux couleurs spectrales; fonctions des éléments rétinien et du pourpre visuel.* Ann. d'oculist. Bd. 112. S. 228.

### 3. Genauigkeit des Sehens. — Sehproben.

Hier ist auch die Litteratur zu § 11, 1, 2, 3 und 4, sowie zu 21,3 zu beachten.

1705.

3619. R. HOOKE. *Posthumous works.* S. 12 u. 97.

1738.

3620. SMITH. *Optics.* I. S. 31. (Uebersetzung S. 29.)

3621. JURIN. *Essay on distinct and indistinct vision.* In Smith Optics. S. 149.

1752.

3622. COURTIVRON. *Hist. de l'Acad. de Paris.* S. 200.

1754.

3623. TOB. MAYER. *Comment. Gotting.* IV. S. 97 u. 135.

1759.

3624. PORTERFIELD. *On the eye.* II. S. 58.

1824.

3625. AMICI. In Ferussac bull. sc. math. S. 221.

1829.

3626. LEHOT. In Ferussac bull. sc. math. XII. S. 417.

1830.

3627. HOLKE. *Disquis. de acie oculi dextri et sinistri.* Lipsiae.

1831.

3628. EHRENBURG. *Pogg. Ann.* XXIV. S. 36.

1840.

3629. HUECK. *Ueber die Grenzen des Sehvermögens.* J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 82.

3630. J. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie.* II. S. 82.

1841.

3631. BUBOW. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges.* Berlin. S. 38.

1843.

3632. H. KÜCHLER. *Schriftnummerprobe für Gesichtseidende.* Darmstadt.

1846.

3633. A. W. VOLKMANN. Art.: *Sehen* in Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. S. 331 u. 335.

1849.

3634. MARIE DAVY. *Institut.* No. 790. S. 59.

1850.

3635. W. PETRIE. *Institut.* No. 886. S. 415.

1852.

3636. E. H. WEBER. *Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge.* Verhandl. d. sächs. Ges. S. 145.

1854.

3637. A. SMEE. *The eye in health and disease.* London. S. 70.

3638. E. JÄGER. *Schriftscalen.* Wien.

V. HELMHOLTZ, *Physiol. Optik*, 2. Aufl.

1855.

3639. STELLWAG v. CARION. *Die Accommodationsfehler des Auges.* Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. v. 12. April 1855.

1857.

3640. AUBERT u. FÖRSTER. *Beiträge zur Kenntniß des indirecten Sehens. Ueber den Raumsinn der Netzhaut.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 1.  
3641. BERGMANN. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. (3.) II. S. 88. — Molesch. Untersuch. IV. S. 16.

1862.

3642. H. SNELLEN. *Letterproeven tot bepaling der gezigtsscherpte.* Utrecht.  
3643. — *Probuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe.* Berlin, Peters.  
3644. J. VROESOM DE HAAN. *Onderzoek naar den invloed van den leeftijd op de gezigtsscherpte.* Utrecht.

1863.

3645. GIRAUD-TEULON. *Echelle régulièrement progressive, destinée à servir à la mesure exacte des différents degrés de netteté et d'étendue de la vue distincte.* Paris.  
3646. K. VIERORDT. *Ueber die Messung der Sehschärfe.* Arch. f. Ophthalm. IX. S. 219—223.

1864.

3647. O. FUNKE. *Zur Lehre von den Empfindungskreisen der Netzhaut.* Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. Br. III. 2. S. 89—116.

3648. F. C. DONDERS. *Anomalies of accommodation and refraction.* London. S. 188—203.

1865.

3649. C. BERGMANN. *Können die Zäpfchen der Fovea centralis retinae Scheinheiten sein?* Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XXIII. S. 145—156.

3650. V. HENSEN. *Ueber eine Einrichtung der Fovea centralis retinae, welche bezweckt, daß feinere Distanzen, als solche, die dem Durchmesser eines Zapfens entsprechen, noch unterschieden werden können.* Virchow's Arch. Bd. 34. S. 401.

3651. A. W. VOLKMANN. *Zur Entscheidung der Frage, ob die Zapfen der Netzhaut als Raumelemente beim Sehen fungiren.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 395—403.

1866.

3652. H. DERBY. *On the necessity of employing greater accuracy in ascertaining and expressing the degree of acuteness of vision.* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. New York.

3653. A. W. VOLKMANN. *Weitere Untersuchungen über die Frage, ob die Zapfen der Netzhaut als Raumelemente beim Sehen fungiren.* Reichert's u. Dubois' Arch. S. 649.

1867.

3654. HENSEN. *Ueber das Sehen in der Fovea centralis.* Virchow's Arch. f. pathol. Anat. Bd. 39. S. 475.

3655. E. JÄGER. *Schriftscalen.* 4. Aufl. Wien.

1869.

3656. J. GREEN. *On a new series of Test-Letters for determining the acuteness of vision.* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. IV. u. V. S. 68.

3657. H. SNELLEN. *Probuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe.* 3. Aufl. Berlin, Peters.

3658. M. WOINOW. *Zur Bestimmung der Sehschärfe bei Ametropie.* Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 144—154.

1870.

3659. BOETTCHER. *Geometrische Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe bei Funktionsprüfungen des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung Militärpflichtiger.* Berlin, H. Peters.

3660. M. BURCHARDT. *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite.* Kassel.

3661. G. COWELL. *Test-types, for determining the acuteness of vision, after, but slightly smaller than those of Dr. H. Snellen.* London.

3662. H. DOR. *Kurze Anleitung zur Untersuchung der Sehschärfe.* Bern, Fiala.

3663. M. REICH. *Tafel von verschiedenen Zeichnungen für die Untersuchung der Sehschärfe bei Leuten, die keine Buchstaben kennen.* Milit. med. Zeitschr. St. Petersburg. XII.

1871.

3664. M. BURCHARDT. *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite.* 2. Aufl. Kassel.

1872.

3665. F. C. DONDERS. *Prakt. Opmerkingen over den invloed van hulplenzen op de Gezichtscherpte*. XIII. Jaarl. Versl. van het Nederl. Gasth. v. Oogl. p. 123.
3666. JEFFRIES. *Sehschärfe*. Klin. Mon.-Bl. X. S. 113.
3667. H. VALERIUS. *Description d'un procédé pour mesurer l'avantage de la vision binoculaire sur la vision au moyen d'un seul oeil quant à l'éclat ou à la clarté des objets*. Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 2. sér. XXXIV. No. 7. S. 34—43. 1873.
3668. BURCHARDT. *Ueber hohe Grade von Sehschärfe*. Dtsch. militärärztl. Zeitschr. II. No. 11 u. 12.
3669. J. GEMPAK. *Snellen's Lettertafel in Japanischen*. Utrecht.
3670. H. SNELLEN. *Test-Types for the determination of the acuteness of vision*. Berlin.
3671. — *Probuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe*. 4. Aufl. Berlin.
3672. VALERIUS. *Beschreibung eines Verfahrens zur Messung der Vorzüge des binocularen Sehens gegen das monoculare, in Betreff sowohl der Helligkeit als der Deutlichkeit*. Pogg. Ann. Bd. 150. S. 317—324.

1874.

3673. H. COHN. *Untersuchungen der Sehschärfe in der Jugend und im Alter*. Jahresber. d. schles. Ges.
3674. G. MITKIEWITSCH. *Zur Frage über die Schärfe des centralen Sehens und ihre Beziehung zu den Grenzen des Gesichtsfeldes in Augen verschiedener Brechbarkeit*. Diss. Petersburg. (Russisch.)

1875.

3675. J. A. BROWN. *On the power of the eye and the microscope to see parallel lines*. Proc. of the Roy. Soc. of London. XXIII. S. 522—532.
3676. A. ILEN. *Ueber die Sehschärfe und Intensität der Lichtempfindung auf der Peripherie der Netzhaut*. Petersburg. — Diss. Militärärztl. Journ. Juni-Heft.
3677. F. MONOYER. *Echelle typographique décimale pour mesurer l'acuité de la vue*. Compt. Rend. LXXX. S. 1137. — Gaz. méd. de Paris. No. 21.
3678. H. SNELLEN. *Optotypi ad visum determinandum*. Utrecht und Berlin.

1876.

3679. W. DOBROWOLSKY und A. GAINÉ. *Ueber die Sehschärfe (Formsinn) an der Peripherie der Netzhaut*. Pflüger's Arch. f. Physiol. XII. S. 411—432.
3680. E. EMMERT. *Veränderte Sehschärfe bei Druck auf's Auge*. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 400.
3681. O. KÖNIGSHÖFER. *Das Distinctionsvermögen der peripheren Theile der Netzhaut*. Erlangen.
3682. E. REGÉCZY. *Ueber das periphere Sehen*. (Ungarisch.) Orvosi Hetilap. No. 22 u. 26.
3683. C. SCHWEIGGER. *Sehproben*. Berlin.

1877.

3684. A. CHARPENTIER. *De la vision avec les diverses parties de la rétine*. Paris, Masson. 55 S. — Arch. de Physiol. IX. S. 894—945.
3685. J. HIRSCHBERG. *Historisch kritische Notiz zur Lehre vom kleinsten Gesichtswinkel*. Verh. d. Berl. Physiol. Ges. v. 12. Jan. — Ophthalm. Hospit. Rep. IX. 1. S. 16—21.
3686. E. LANDOLT. *Des rapports, qui existent entre l'acuité visuelle et la perception des couleurs au centre et aux parties excentriques de la rétine*. Gaz. méd. de Paris. No. 31. S. 378—380.
3687. — *Ueber das Verhältniß des Formsinnes zum Farbensinne im Centrum und in excentrischen Theilen der Netzhaut*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. I. S. 222 bis 223.
3688. RICCO. *Sopra un fenomeno soggettivo di visione*. Ann. d. Ottal. VI. S. 547.
3689. SEGGER. *Ueber genaue Bestimmung der Sehschärfe und die Klassificirung einseitiger Amblyopien*. Dtsch. militärärztl. Zeitschr. VI. S. 153.
3690. H. SNELLEN. *Optotypi ad visum determinandum*. Berlin. edit. 5.
3691. L. DE WECKER. *Echelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle*. Paris, Doin.

1878.

3692. ALBINI. *Reflexionen über die typographische Scala zu optischen Proben*. Giorn. internat. d. sc. med. S. 52—56.
3693. BADAL. *Conférences d'optométrie. (Réfraction. Accommodation. Acuité visuelle. etc.)* Gaz. des Hôpit. No. 15. 19. 53. 73. 89. 106.

3694. J. HIRSCHBERG. *Ueber graphische Darstellung der Netzhautfunction.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. II. S. 324—331.  
 3695. E. JÄGER. *Schriftscalen.* 6. Aufl. Wien.  
 3696. M. REICH. *Einiges über die Augen der Armenier und Georgier.* Arch. f. Ophthalm. XXIV. 3. S. 231—238.

1879.

3697. ALBINI. *Ueber typographische Sehproben.* Giorn. intern. d. Sc. med. I. 1.  
 3698. A. CHARPENTIER. *De la vision avec les diverses parties de la rétine.* Thèse. Paris.  
 3699. H. COHN. *Sehschärfe und Farbensinn der Nubier.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 197—200.  
 3700. — *Sehschärfe und Farbensinn bei elektrischem Lichte.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 105—107.  
 3701. — *Vergleichende Messungen der Sehschärfe und des Farbensinnes bei Tages-, Gas- und elektrischem Lichte.* Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 408.  
 3702. GIRAUD-TEULON. *Acuité visuelle.* Ann. d'Oculist. Bd. 81. Mai-Juni.  
 3703. MAUREL. *Dimension minime de l'image rétinienne.* Arch. de méd. nav. XXI. S. 265—280. — Gaz. hebdom. No. 28.  
 3704. POUCHET. *Note sur les moindres images rétinienne.* Gaz. méd. de Paris. No. 39. — Soc. de Biol. 12. Juli. — Gaz. hebdom. No. 29. S. 463.  
 3705. REICH. *Ueber die Sehschärfe bei den Georgiern.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 301—302.  
 3706. H. SCHÖLER. *Ueber die Stellung der Ophthalmologie sur Anthropologie.* Virchow's Arch. f. path. Anat. Bd. 78.

3707. H. SNELLEN. *Optotypi ad visum determinandum secundum formulam  $V = \frac{d}{D}$*   
 Berlin, Peters.

3708. S. TALKO. *Ein Fall von außerordentlicher Sehschärfe.* Ber. über d. 12. Vers. d. ophthalmol. Ges. z. Heidelberg. S. 114.

1880.

3709. H. ARMAIGNAC. *Quelques mots sur l'acuité visuelle et les échelles optométriques.* Rev. d'oculist. du sud-ouest. I. 1. S. 5. 2. S. 25—33.  
 3710. CARVERAS-ARAGO. *Examen y mejora de la vision, seguido de una serie de cuadros sinopticos y de unas tablas y escalas visuales cromaticas.* Barcelona.  
 3711. A. CHARPENTIER. *Sur la sensibilité différentielle de l'oeil pour de petites surfaces.* Acad. d. sc. 24 juillet. — Arch. génér. Nov.  
 3712. — *Sur la limite de petitesse des objets visibles.* Rev. méd. de l'Est. 1. Jan.  
 3713. GALEZOWSKI. *Échelles portatives des caractères des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle.* Paris, Baillière.  
 3714. E. JAVAL. *Acuité visuelle.* Gaz. des hôpit. No. 28. S. 221.  
 3715. MANOLESCU. *Recherches relatives à l'étude de l'acuité visuelle; conditions de la visibilité des lignes et des points.* Soc. de Biol. 7. Febr. — Gaz. méd. No. 12. — Ann. d'Oculist. LXXXIII. S. 55—62.  
 3716. SALZER. *Ueber die Anzahl der Sehnervenfaseren und der Retinalzapfen im Auge des Menschen.* Wien, Ber. Bd. 81. (3.)  
 3717. TALKO. *Resultate der Bemessungen der Sehschärfe bei den Soldaten des Warschauer Militärbezirks.* Kronika Rekaraka. No. 2 u. 3. — Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVIII. S. 139.  
 3718. WOOD. *Ophthalmic Test-Types and Color-Blindness-Tests.* New York, Wood & Co.

1881.

3719. G. ALBINI. *Tavole per le prove ottiche in oculistica precedute da alcune riflessioni sulle scale tipografiche.* Neapel, Detken.  
 3720. BADAL. *Sur l'angle visuel.* Soc. d'anat. et de physiol. de Bordeaux. I.  
 3721. C. DU BOIS-REYMOND. *Zahl der Empfindungskreise in der Netzhautgrube.* Berlin. Diss. 31 S.  
 3722. R. BUTZ. *Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen der physiologischen Functionen der Peripherie der Netzhaut.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. V. S. 437—445.  
 3723. U. HERZENSTEIN. *Die Sehschärfe bei 27673 Soldaten des Charkow'schen Militärbezirks.* Beil. z. d. Sitzgs-Prot. d. Charkow'schen med. Ges. No. 1. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 3—7.

1882.

3724. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la distinction des points lumineux*. Arch. d'ophthalm. S. 382.  
 3725. v. FLEISCHL. *Physiologisch-optische Notizen*. IV. Mittheilung. Sitzg. vom 9. Juni. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. LXXXVI. 3. Abth.  
 3726. E. JÄGER. *Schrift-Scalen*. 7. Aufl. Wien.  
 3727. LEROY. *Vision centrale, irradiation et acuité visuelle*. Arch. d'ophthalm. Jan., Febr. u. Juli-Aug.  
 3728. G. MAYERHAUSEN. *Zifferntafeln zur Bestimmung der Sehschärfe nach der Snellen'schen Formel*. Berlin, Peters.  
 3729. A. NIEDEN. *Schriftproben*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 89.

1883.

3730. G. BECKER. *Ueber excentrische Sehschärfe und ihre Abgrenzung von der centrischen*. Diss. Halle. Wiesbaden, Bergmann.  
 3731. J. BJERRUM. *Untersuchungen über den Formen- und Lichtsinn*. Diss. Kopenhagen  
 3732. BRAILEY. *On the tests of vision best adapted for service at sea*. Trans. Ophthalm. Soc. U. K. II. S. 184.  
 3733. BURCHARDT. *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Schweite* 3. Aufl. Kassel.  
 3734. R. BUTZ. *Untersuchungen über die physiologischen Functionen der Peripherie der Netzhaut*. Diss. Dorpat.  
 3735. A. CHARPENTIER. *La perception des couleurs et la perception de formes*. Compt. Rend. Bd. 96. S. 858 u. 1079.  
 3736. E. v. FLEISCHL. *Die Vertheilung der Sehnervenfaseru über die Zapfen der menschlichen Netzhaut*. Wien. Sitzgs.-Ber. Bd. 87. Abth. 3.  
 3737. — *Zur Anatomie und Physiologie der Retina*. Biol. Centralbl. III. S. 309 u. 331.  
 3738. GALEZOWSKI. *Echelles optométriques et chromatiques pour mesurer l'acuité de la vision, les limites du champ visuel et la faculté chromatique*. Paris.  
 3739. R. HILBERT. *Ueber das excentrische Sehen*. Physik.-ökon. Ges. zu Königsberg. Bd. 24.  
 3740. A. NIEDEN. *Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe*. 2. Aufl. Wiesbaden.  
 3741. PFLÜGER. *Optotypi*. Ber. d. Berner Univ.-Augenkl. S. 75.  
 3742. SASKEWITSCH. *Einige Fälle außerordentlicher Sehschärfe*. Wratsch. No. 1.  
 3743. SCHADOW. *Die Augen der Schulkinder Borkums*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 150.

3744. A. SCHAPRINGE. *An improvement in the arrangement of Snellen's test-types*. Med. Rec. New-York. XXIII. 3. S. 73.  
 3745. SEGGER. *Ueber die Augen der Feuerländer und das Sehen der Naturvölker im Verhältniß zu dem der Culturvölker*. Arch. f. Anthropol. XIV. S. 3.

1884.

3746. J. BJERRUM. *Untersuchungen über den Lichtsinn und den Raumsinn bei verschiedenen Augenkrankheiten*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (2.) S. 201.  
 3747. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la distinction des points noirs sur fond blanc*. Arch. d'Ophthalm. S. 193.  
 3748. E. v. FLEISCHL. *Zur Physiologie der Retina*. Wien. med. Wochenschr. No. 10 u. 11.  
 3749. M. DE LÉPINAY und NICATI. *De l'acuité visuelle binoculaire*. Bull. de la Soc. franç. d'ophthalm. S. 56.  
 3750. R. MADDOX. *On distant vision*. Proc. of the Royal Soc. of London. 21. Januar. XII. S. 433.  
 3751. G. MAYERHAUSEN. *Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren*. Graefe's Arch. XXX. (2.) S. 191—200.  
 3752. E. PFLÜGER. *Optotypi (Sehproben)*. Bern., Dalp.  
 3753. SEGGER. *Ueber normale Sehschärfe und die Beziehungen der Sehschärfe zur Refraction*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (2.) S. 69—140.

1885.

3754. ALBINI. *Tavole ottimetriche*. Neapel, Detken.  
 3755. J. RAND CAPRON. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 359.  
 3756. B. CARTER. *Acuteness of vision*. Med. Tim. and Gaz. I. S. 461.  
 3757. R. B. CARTER u. G. A. BERRY. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 386 bis 388.  
 3758. J. W. CLARK. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 433—434.



8759. J. STARRIE GARDNER. *Far-sightedness*. Nature. XXXI. S. 578.  
 8760. H. GUPPY. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 503—504.  
 8761. E. HILL. *Far-sightedness*. Nature. XXXI. S. 553.  
 8762. J. HIPPLEY. *Far sightedness*. Nature. XXXI. S. 553.  
 8763. A. KÖNIG. *Ueber den Gesichtssinn der Zulu-Kaffern*. Verhandl. d. Berl. Physik. Ges. IV. S. 15—17.  
 8764. R. W. LAWSON. *Acuteness of vision*. Med. Tim. and Gaz. I. S. 593.  
 8765. E. METZGER. *Far-sightedness*. Nature. XXXI. S. 506.  
 8766. OLIVER. *A new series of metric test-letters for determining the acuity of direct vision for form*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 190. — Med. News. XLVII. S. 247.  
 8767. A. SHAW PAGE. *Long Sight*. Nature. XXXI. S. 103.  
 8768. LORD RAYLEIGH. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 340.  
 8769. LORD RAYLEIGH u. G. B. BUCKTON. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 407—408.  
 8770. CH. ROBERTS. *Education and eyesight*. Med. Tim. and Gaz. I. S. 173.  
 8771. — *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 552—553.  
 8772. H. SNELLEN. *Optotypi ad visum determinandum*. 8. edit. Berlin.  
 8773. J. F. TENNANT, S. LUPTON, LORD RAYLEIGH u. A. CUMMINGHAM. *Civilisation and Eyesight*. Nature. XXXI. S. 457—458.  
 8774. *Schproben, entworfen nach dem Metersystem zur Bestimmung der Sehschärfe*. Herausgegeben vom St. Peterburger Augenhospital.  
 8775. *Civilisation and Eyesight*. Science. VI. S. 195—196. 1886.  
 8776. E. ALBINI. *Della visione indiretta delle forme e dei colori*. Giorn. della R. Accad. di Med. No. 7—8.  
 8777. L. BELLARMINGOW. *Ueber den Werth der für die Bestimmung der Sehschärfe angewandten Schproben*. Westnik ophthalm. Jan.-Febr.  
 8778. — *Ueber die Tauglichkeit und Genauigkeit der vorhandenen Probetypen für die Bestimmung der Sehschärfe*. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 284.  
 8779. BERRY. *Note on the relative visual acuity of fully corrected axial ametropes*. Ophthalm. Rev. S. 309.  
 8780. C. DU BOIS-REYMOND. *Seheinheit und kleinster Sehwinkel*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (3.) S. 1.  
 8781. A. E. BOSTWICK. *On a means of determining the limits of distinct vision*. Science VIII. S. 232.  
 8782. H. COHN. *Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Beamten*. Breslau.  
 8783. CSASPODI. *Schproben*. Szemészet. S. 125.  
 8784. W. S. DENNET. *Test-type for popular use*. Ophthalm. Rev. S. 254.  
 8785. — *A new test-type*. Transact. of the americ. ophthalm. soc. 22. Vers. New-London. S. 245. — Americ. Journ. of Ophthalm. S. 259.  
 8786. S. EXNER. *Ein Versuch über die Netzhautperipherie als Organ zur Wahrnehmung der Bewegungen*. Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 217—218.  
 8787. WECKER und MASSELON. *Echelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le chromatique et le sens lumineux*. 2. Aufl. Paris, Doin.  
 8788. WERTHEIM. *Die Zahl der Scheinheiten in der Umgebung der Fovea*. Tagebl. d. 59. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 418. 1887.  
 8789. G. ALBINI. *Sulla visione indiretta delle forme e dei colori*. Ann. di Ottalm. XV. S. 482.  
 8790. H. COHN. *Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder*. 2. Aufl. Breslau. Priebatsch.  
 8791. E. V. JAEGER. *Schrift-Scalen*. Wien, Seidel u. Sohn. 8. Aufl.  
 8792. T. OUGHTON. *Minima visibilia and sensory circles*. Lancet. I. S. 301 u. 364.  
 8793. TH. WERTHEIM. *Ueber die Zahl der Scheinheiten im mittleren Theile der Netzhaut*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 137. 1888.  
 8794. A. CHARPENTIER. *Acuité visuelle et dynamogénie*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. No. 19.

3795. IMBERT. *De l'acuité visuelle*. Gaz. hebdom. de so. méd. de Montpellier. X. S. 217.  
 3796. PARINAUD. *Echelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des couleurs*. Paris, Roulot.

1889.

3797. ABBOTT. *Test-types for the use of school-teachers*. London, Prichard and Curry.  
 3798. A. CARL. *Ueber die Anwendung von Decimalbrüchen zur Bestimmung der Sehschärfe*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 469—472.  
 3799. C. M. CUIVER. *Test-types*. Albany med. Ann. X. S. 321.  
 3800. E. LANDOLT. *Opto-types simples*. Paris, O. Doin.  
 3801. A. LOTZ. *Internationale Sehprobentafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel  $v = \frac{d}{D}$* . Basel, Sallmann & Bonaacker.  
 3802. G. MITKEJEWITSCH. *Schriftproben und Tafeln zur Untersuchung der Sehschärfe*. (Russisch.) Odessa.  
 3803. A. NIEDEN. *Schrifttafeln zur Bestimmung der Sehschärfe für die Ferne*. N. F. Wiesbaden, Bergmann.  
 3804. WECKER et J. MASSELOM. *Echelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle*. Paris.  
 3805. G. WEISS. *Du pouvoir séparateur de l'œil*. Paris, F. Pichon. 18 S.

1890.

3806. H. COHN. *Tafeln zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Bahnbeamten*. 3. Aufl. Breslau.  
 3807. GALEZOWSKY. *Echelles portatives des caractères et des couleurs, pour mesurer l'acuité visuelle*. 2. Aufl. Paris, Baillière.  
 3808. PARENT. *Echelle optométrique*. Compt. Rend. de la Soc. franç. d'Ophthalm. Rev. gén. S. 229.  
 3809. M. REICH. *Nouveaux test-types pour la détermination de l'acuité visuelle*. (Russisch.) 5. Aufl. Tiflis.  
 3810. C. SCHWEIGER. *Sehproben*. 2. verb. Aufl. Berlin, Hirschwald. 7 S. u. 45 Taf.  
 3811. H. SNELLEN. *Optotypi*. 10. Aufl. Berlin, Peters.  
 3812. W. UETHOFF. *Ueber die kleinsten wahrnehmbaren Gesichtswinkel in den verschiedenen Theilen des Spectrums*. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 155—160.  
 3818. — *Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Intensität, sowie von der Wellenlänge im Spectrum*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 33—61.

1891.

3814. BECKER. *Ein Apparat zur Sehschärfenbestimmung mit beweglichen Leseseichen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XV. S. 171.  
 3815. — *Ueber absolute und relative Sehschärfe bei verschiedenen Formen der Amblyopie*. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. 29. S. 404—423.  
 3816. H. COHN. *Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten*. Breslau, Priebsch.  
 3817. GUILLERY. *Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe*. Wiesbaden, Bergmann. 6 Taf. u. 2 Hefte.  
 3818. — *Ein Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben*. Arch. f. Augenheilkde. XXIII. S. 323—333.  
 3819. JACKSON. *Test for visual acuteness; their illumination and the standard of normal vision*. Journ. Americ. med. Assoc. 31. Januar.

1892.

3820. GUILLERY. *Nochmals meine Sehproben*. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 79—84.  
 3821. LIEBRECHT. *Kritische Bemerkungen zu Guillery's „Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben“*. Arch. f. Augenheilkde. XXV. S. 37—41.  
 3822. SCHNELLER. *Sehproben zur Bestimmung der Refraction, Sehschärfe und Accommodation*. Danzig, Kafemann. 24 S.  
 3823. A. STRIGER. *Einheitliche Sehproben zur Untersuchung der Sehschärfe in die Ferne und in die Nähe*. Hamburg und Leipzig, L. Voss. 40 S. u. 1 Taf. Beitr. z. Augenheilkde. Heft 7.  
 3824. WOLFFBERG. *Buchstaben-, Zahlen- und Bildertafeln nebst einer Abhandlung über die Sehschärfe*. Breslau, Preuß & Jünger.

## 1893.

3825. W. ALBRAND. *Sehproben*. Leipzig, H. Hartung u. Sohn. 4. Taf. 1 S. Text.
3826. BADAL. *Considérations sur la mesure de l'acuité visuelle*. Soc. d'ophthalm. et de laryng. de Bordeaux, April. — Ann. d'Oculist. Bd. 110. S. 201.
3827. BERRY. *On the relation between visual acuity and visual efficiency*. Transact. of the ophthalm. soc. XIII. S. 223.
3828. D. BOERMA und K. WALTHER. *Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe im Alter*. Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (2.) S. 71—82.
3829. M. BURCHARDT. *Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite*. 4. Aufl. Berlin, O. Enslin. 11 Taf. u. 32 S.
3830. H. COHN. *Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten, Seelente und Bahnbeamten*. Nach Snellen's Princip. 4. Aufl. Breslau, Priebatsch.
3831. GROENOUW. *Ueber die Sehschärfe der Netzhautperipherie und eine neue Untersuchungsmethode derselben*. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 85—133. — Hab.-Schr. Breslau. 48 S. 1892.
3832. GUILLERY. *Zur Sehschärfestimmung*. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 263 bis 266.
3833. JAVAL. *Ueber die Messung der Sehschärfe*. Franz. Ges. d. Augenheilkde. 11. Sitzung zu Paris 1.—4. Mai.
3834. MAGAWLY. *Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe*. 2. Aufl. St. Petersburg.
3835. *Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe, entworfen nach dem Meter-system*. Herausgeb. v. d. St. Petersburger Augenheilanst. 2. verb. Aufl. St. Petersburg u. Leipzig, C. Ricker.

## 1894.

3836. H. BORDIER. *Acuité visuelle des yeux amétropes. — Acuité vraie et acuité apparente*. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 355—371.
3837. H. COHN. *Ueber die Annahme der Sehschärfe im Alter*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 326—336.
3838. — *Transparente Sehproben*. (4 S. in deutsch., franz., engl. u. ital. Spr. m. 1 Taf.) Wien, F. Deutike.
3839. GROENOUW. *Acuité visuelle à la périphérie de la rétine. Nouvelle méthode pour la déterminer*. Arch. of Ophthalm. XXII. S. 502.
3840. GUILLERY. *Einiges über den Formensinn*. Arch. f. Augenheilkde. XXVIII. S. 263—276.
3841. J. HIRSCHBERG. *Zur Geschichte der Sehproben*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. S. 320.
3842. W. NICATI. *Échelles visuelles et leurs applications*. Société d'éditions. — Ann. d'Oculist. CXI. S. 413.
3843. H. SNELLEN. *Optotypi ad visum determinandum secundum formulam  $v = \frac{d}{D}$* . 12. Ausg. Berlin, H. Peters. 34 Bl. m. 4 Taf.
3844. G. J. STONEY. *On the limits of vision: with special reference to the vision of insects*. Philos. Mag. Bd. 37. No. 226. S. 316—331.
3845. TH. WERTHEIM. *Ueber die indirecte Sehschärfe*. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 177 bis 187.

## § 19.

## Die einfachen Farben.

Es gehört hierher auch ein Theil der Litteratur von § 20.

## 1. Aeltere Litteratur (bis Newton).

384—322 v. Ch.

3846. ARISTOTELES. *De coloribus*. 1571.  
 3847. JOH. FLEISCHER. *De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis*. Vitembergae. S. 86. 1588.  
 3848. JO. BAPT. PORTA. *De refractione libri novem*. Napoli. Lib. IX. 1590.  
 3849. BERNARDINI TELESII *Opera*. Venetiis. De Iride et coloribus. 1611.  
 3850. M. ANTONIUS DE DOMINIS. *De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et Iride*. Venetiis. 1618.  
 3851. F. MAUROLYCUS. *De lumine et umbra*. Lugd. S. 57. 1637.  
 3852. CARTESIUS. *De meteoris*. Cap. VIII. 1646.  
 3853. A. KIRCHER. *Ars magna lucis et umbrae*. Romae. 1648.  
 3854. JO. MARCUS MARCI *Thaumantias, über de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et causis*. Pragae. 1682.  
 3855. J. VOSSIUS. *De lucis natura et proprietate*. Amstelodami. 1665.  
 3856. R. HOOKE. *Micrographia*. London. S. 64. 1670.  
 3857. BOYLE. *Experiments and considerations touching color*. London.

## 2. Newton und Göthe.

1672.  
 3858. J. NEWTON. *New theory of light and colours*. Philos. Transact.  
 3859. — *Some experiments proposed in relation to the new theory light*. Philos. Transact.  
 3860. — *Answer to the animadversions of Mr. J. G. Pardies. On the new theory of light*. Philos. Transact.  
 3861. — *A series of queries proposed to be determined by experiments positively and directly including the new theory of light and colours*. Philos. Transact.  
 3862. — *Second answer to Mr. Pardies*. Philos. Transact.  
 3863. — *Answer to some considerations of the doctrine of light and colours*. Philos. Transact.  
 3864. J. G. PARDIES. *Two letters containing some animadversions upon J. Newton's theory of light*. Philos. Transact.  
 1673.  
 3865. J. NEWTON. *Answer to a letter from Paris, further explaining the theory of light and colours and particularly that of whiteness*. Philos. Transact.  
 3866. — *On the number of colours and the necessity of mixing them all for the production of white*. Philos. Transact.  
 1675.  
 3867. J. NEWTON. *Considerations on the reply of Mr. Linus; together with further directions how to make the experiments controverted to right*. Philos. Transact.

1676.  
8868. J. NEWTON. *A particular answer to Mr. Linus. Objections to his experiment with the prism.* Philos. Transact.
1689.  
8869. G. A. HAMBERGER et FISCHER. *De coloribus.* Jenae.
1704.  
8870. J. NEWTON. *Optics or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light.* London. (Vollständige Ausarbeitung seiner optischen Entdeckungen.)
1711.  
8871. DE LA HIRE. *Sur quelques couleurs.* Mém. de l'Acad. des Sc. S. 100.
1727.  
8872. RIZETTI. *Specimen physico math. de luminis affectionibus.* Ven.
1728.  
8873. J. NEWTON. *Optical lectures read in the public schools of the University of Cambridge.* London. (Lat. Uebersetzung: *Lectiones opticae, annis 1669—1671 in scholis publicis.* London 1729.)
1737.  
8874. J. C. LE BLOND. *Harmony of colouring.* London.
1740.  
8875. CASTEL. *L'optique des couleurs.* Paris.
1746.  
8876. L. EULER. *Nova theoria lucis colorum in den Opusculis variis argumenti.* Berol. S. 169—244.
1750.  
8877. GAUTIER. *Chroagenesie ou génération des couleurs contre le système de Newton.* Paris.
1752.  
8878. L. EULER. *Essai d'une explication physique des couleurs engendrées sur des surfaces extrêmement minces.* Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 271.
8879. GAUTIER. *Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et la peinture.* Paris.
1754.  
8880. COMINALI. *Anti-Newtonianismus.* Napoli.
1762.  
8881. J. P. EBERHARD. *Versuch einer Erklärung von der Natur der Farben zur Erläuterung der Theorie Newtons.* Halle.
1780.  
8882. ELLIOT. *Observations on the senses.* (Deutsch unter dem Titel: *Beobachtungen über die Sinne.* Leipzig 1785.)
8883. MARAT. *Découvertes sur la lumière.* Paris.
1784.  
8884. MARAT. *Notions élémentaires d'optique.* Paris.
1791.  
8885. J. W. GÖTHE. *Beiträge zur Optik. Erstes Stück.* Weimar. (Kritik in: *Allgen. Jenaer Litteratur-Zeitung.* Jahrg. 1792. No. 31. S. 241—145.)
1792.  
8886. J. W. GÖTHE. *Beiträge zur Optik. Zweites Stück.* Weimar.
1793.  
8887. F. A. C. GRÜN. *Einige Bemerkungen über des Herrn von Göthe Beiträge zur Optik.* Grun's Journ. d. Phys. VII. S. 3—21.
1794.  
8888. WUNSCH. *Kosmologische Unterhaltungen.*
1810.  
8889. J. W. GÖTHE. *Zur Farbenlehre.* 2 Bde. J. G. Cotta. 1810. Stuttgart. — (Besprechungen und Anzeigen finden sich: *Neue oberdeutsche allgemeine Litteratur-Zeitung.* 2. Jahrg. 2. Hälfte. S. 25—32. — *Neue Leipziger Litteratur-Zeitung.* Bd. III. S. 1629—1632. — *Heidelberger Jahrbücher der Litteratur.* 3. Jahrg. 4. Abt. S. 289—307. — *Annales de Chimie.* 1811 [übersetzt in *Gilbert's Ann. d. Physik.* Bd. 40. S. 103—115]. — *Göttinger gelehrter Anzeiger.* 22. Juni 1811. S. 977—990. — *Hallesche Allgemeine Litteratur-Zeitung.* 29. Jan. 1811. S. 233—240. 30. Jan. 1811. S. 241—247 u. 31. Jan. 1811. S. 249—255. — *Ergänzungsblätter zur Jenaischen allgemeinen Litteratur-Zeitung.* (1813.) 1. Jahrg. 1. Bd. No. 3—6. S. 17—44. — *The Quarterly Review.* 1814. Vol. X. No. XX.)

3890. MOLLWEIDE. *Bemerkungen zu Göthe's Polemik gegen Newton*. Zach's monatliche Correspondenz. XXII. S. 91—93.
3891. M. KLOTZ. *Kritischer Anzeiger für Litteratur und Kunst*. No. 30—33. München. 1811.
3892. PARROT. *Grundriß der Physik*. 2. Th. Dorpat u. Riga.
3893. SEEBECK. *Von den Farben und dem Verhalten derselben gegen einander*. Schweigger's Journ. Bd. I. S. 4—12.
3894. MOLLWEIDE. *Demonstratio propositionis quae theoriae colorum Newtoni fundamenta loco est*. Lipsiae.
3895. C. H. PFAFF. *Ueber die farbigen Säume der Nebenbilder des Doppelspats mit besonderer Berücksichtigung von Goethe's Erklärung der Farbenentstehung durch Nebenbilder*. Schweigger's Jahrbücher. VI. S. 177.
3896. POSELGER. *Der farbige Rand eines durch ein biconvexes Glas entstehenden Bildes mit Bezug auf Göthe's Farbenlehre*. Gilbert's Ann. XXXVII. S. 135. 1812.
3897. J. F. BENZENBERG. *Briefe, geschrieben auf einer Reise durch die Schweiz*. Düsseldorf 1812. 2. Bd. 26. u. 34. Brief. 1818.
3898. P. PREVOST. *Quelques remarques d'optique*. Bibliothèque Britannique. Tome 53. S. 18—29.
3899. C. H. PFAFF. *Ueber Newton's Farbentheorie, Herrn v. Göthe's Farbenlehre und den chemischen Gegensatz der Farben*. Leipzig, F. C. W. Vogel. — (Besprechungen finden sich in: Göttinger gelehrte Anzeigen. 15. Mai 1813. S. 761—768. — Heidelb. Jahrbücher der Litteratur. 1814. 7. Jahrg. 1. Hälfte. S. 417—430.) 1816.
3900. *Ueber physiologie Gesichts- und Farbenercheinungen*. Schweigger's Journ. XVI. S. 121—157.
3901. M. KLOTZ. *Gründliche Farbenlehre*. München. 1817.
3902. J. W. v. GÖTHE. *Die entoptischen Farben*. Zur Naturwissenschaft. S. 126—190.
3903. WERNERBURG. *Merkwürdige Phänomene durch verschiedene Prismen zur richtigen Würdigung Newton'scher und Goethe'scher Farbenlehre*. Nürnberg. 1822.
3904. L. v. HENNING. *Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Göthe's Farbenlehre, gehalten an der königl. Universität zu Berlin*. Berlin 1822. 1828.
3905. BOURGEOIS. *Manuel d'optique expérimentale*. Paris. 2 Bände. 1826.
3906. JOH. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes*. Leipzig 1826. S. 391—434. 1827.
3907. BRANDES. *Art. Farbe in Gehler's neuem physik. Wörterbuch*. 1830.
3908. A. HUECK. *Das Sehen seinem äußeren Prozesse nach entwickelt*. Riga. 1833.
3909. REUTHER. *Ueber Licht und Farbe*. Kassel.
3910. STEFFENS. *Ueber die Bedeutung der Farben in der Natur*. Schriften alt und neu. 1835.
3911. HELWAG. *Newton's Farbenlehre aus ihren richtigen Principien berichtigt*. Lübeck.
3912. MOSER. *Ueber Goethe's Farbenlehre*. Abhandl. d. Königsb. dtsh. Ges. 1836.
3913. LLOYD. *Abriß einer Geschichte der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der physischen Optik*, übersetzt von Kloeden. 1838.
3914. H. HELMHOLTZ. *Ueber Goethe's naturwissenschaftliche Arbeiten*. Kieler Monatschrift für Wissenschaft und Lit. Mai. S. 383—398. — Popul. Wiss. Vortr. 1. H. Braunschweig. 1865 u. 1876. — Vorträge u. Reden. Bd. I. Braunschweig. 1884. 1857.
3915. GRÄVELL. *Goethe im Recht gegen Newton*. Berlin. — Recensirt von Q. ICHLIUS in Kekule's kritischer Zeitschr. f. Chemie, Physik u. Math. Erlangen 1868. (2/3.)

1858.  
3916. A. ADERHOLDT. *Ueber Goethe's Farbenlehre.* Weimar.  
1859.  
3917. GRÄVELL. *Ueber Licht und Farben mit besonderer Beziehung auf die Farbenlehre Newton's und Goethe's.* Berlin.  
1860.  
3918. GRÄVELL. *Die zu sühnende Schuld gegen Goethe.* Berlin.  
1862.  
3919. B. HANTZSCH. *Goethe's Farbenlehre und die Farbenlehre der heutigen Physik.* Dresden.  
1868.  
3920. J. K. BÄHR. *Vorträge über Newton's und Goethe's Farbenlehre.* Dresden.  
1874.  
3921. N. PLÜSS. *Die Begründung der Farbenlehre durch Newton und ihre Bekämpfung durch Goethe.* Basel.  
1878.  
3922. *GOETHE'S Werke.* Bd. 35 u. 36. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von S. Kalischer. Berlin, G. Hempel.  
1880.  
3923. J. TYNDALL. *Une théorie des couleurs de Goethe.* Rev. scient. 19. Juni. — *Ann. d'Ocul.* Bd. 84. S. 192—202.  
3924. — *Goethe's Farbenlehre.* Pop. Scien. Rev. June 1880.  
3925. O. N. ROOD. *Newton's use of the term Indigo with reference to colour of the Spectrum.* Sillim. Journ. (8.) XIX. S. 135—137.  
1888.  
3926. A. KÖNIG. *Ueber Goethe's Bezeichnung der von ihm beobachteten Fälle von Farbenblindheit als „Akanoblepsie“.* Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin. 14. Dec.  
3927. S. KALISCHER. *Bemerkungen zu dem vorstehenden Vortrag von A. König.* Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin. 14. Dec.  
1890.  
3928. A. SCHUSTER. *Goethe's „Farbenlehre“.* Publications of the English Goethe Society. No. V. p. 141—151.  
3929. *GOETHE'S Werke.* Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. II. Abth. Naturwiss. Schriften. Bd. 1 u. 2. Weimar, H. Böhlau.  
3930. *GOETHE'S naturwissenschaftliche Schriften.* Bd. 3. Herausgegeben und mit Einleitung versehen von Rud. Steiner. (Deutsche National-Litteratur herausgegeben von J. Kürschner. Bd. 116. Stuttgart.)  
1892.  
3931. H. v. HELMHOLTZ. *Goethe's Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen.* Deutsche Rundschau. Bd. 72. S. 115—132. — Auch sep. Berlin 1892, G. Pötel.  
1898.  
3932. *GOETHE'S Werke.* Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. II. Abth. Naturwissenschaftl. Schriften. Bd. 3 u. 4. Weimar, H. Böhlau.

### 3. Andere physikalische Farbentheorien.

1815.  
3933. J. P. BREWER. *Versuch einer neuen Theorie der Lichtfarben.* Düsseldorf.  
1816.  
3934. READE. *Experimental outlines for a new theory of colours, light and vision.* London.  
1824.  
3935. HOPPE. *Versuch einer ganz neuen Theorie der Entstehung sämtlicher Farben.* Breslau.  
1828.  
3936. RÖTTGER. *Erklärung des Lichts und der Dunkelheit.* Halle.  
1830.  
3937. SCHÄFFER. *Versuch einer Beantwortung der von der Akademie zu Petersburg aufgegebenen Preisfrage über das Licht.* Bremen.  
3938. W. CRUMM. *An experimental inquiry into the number and properties of the primary colours, and the source of colours in the prism.* London.

1831.

3939. D. BREWSTER. *Description of a monochromatic lamp with remarks on the absorption of the Prismatic Rays.* Edinb. Trans. IX. (2.) S. 433.  
3940. — *On a new Analysis of Solar Light.* Edinb. Trans. XII. (1.) S. 123. — Pogg. Ann. XXIII. S. 435.

1834.

3941. EXLEY. *Physical optics or the phenomena of optics.* London.

1847.

3942. G. B. AIRY. *Philos. Mag.* XXX. (3.) S. 73. — Pogg. Ann. LXXI. S. 393.  
3943. D. BREWSTER. *Reply.* *Philos. Mag.* XXX. S. 153.  
3944. J. W. DRAPER. *Silliman Journ.* IV. S. 398. — *Philos. Mag.* XXX. S. 345.  
3945. D. BREWSTER. *Philos. Mag.* XXX. S. 461.  
3946. MELLONI. *Bibl. univ. de Genève.* Août. — *Philos. Mag.* XXXII. S. 262. — Pogg. Ann. LXXV. S. 62.  
3947. D. BREWSTER. *Philos. Mag.* XXXII. S. 489.

1852.

3948. H. HELMHOLTZ. *Ueber Herr D. Brewster's neue Analyse des Sonnenlichts.* Pogg. Ann. LXXXVI. S. 501. — *Philos. Mag.* VI. (4.) — *Berl. Monatsber.* 15. Juli 1852. S. 458—461.  
3949. F. BERNARD. *Thèse sur l'absorption de la lumière par les milieux non cristallins.* Ann. de Chim. (3.) XXXV. S. 385—438.

1855.

3950. D. BREWSTER. *On the triple spectrum.* Athen. S. 1156. — *Inst.* S. 381. — *Rep. of Brit. Assoc.* (2.) S. 7—9.

#### 4. Nuancenunterschiede und Grenzen des Spectrums.

1845.

3951. E. BRÜCKE. *Ueber das Verhalten der optischen Medien der Augen gegen Licht- und Wärmestrahlen.* Müllers Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 262. — Pogg. Ann. LXV. S. 593.

1846.

3952. E. BRÜCKE. *Ueber das Verhalten der optischen Medien der Augen gegen Sonnenstrahlen.* Müllers Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 379. — Pogg. Ann. LXIX. S. 549.

1852.

3953. A. CIMA. *Sul potere degli umori dell'occhio a trasmettere il calorico raggianti.* Torino.

1853.

3954. F. C. DONDEERS. *Ueber das Verhalten der unsichtbaren Lichtstrahlen von hoher Brechbarkeit in den Medien des Auges.* Müllers Arch. S. 459. — *Onderz. ged. in het physiol. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool.* VI. S. 1.

1854.

3955. F. C. DONDEERS. *Over de verhouding der onzichtbare stralen van sterke breekbareheid tot de rochten van het oog.* Ned. Lancet. S. 1.

3956. G. KESSLER. *Gräfes Arch. f. Ophthalm.* I. Abth. 1. S. 466.

1855.

3957. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Empfindlichkeit der menschlichen Netzhaut für die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichts.* Pogg. Ann. XCIV. S. 205. — *Ann. de Chim.* (3.) XLIV. S. 74. — *Arch. d. sc. phys.* XXIX. 211. S. 243.

1856.

3958. G. WILSON. *On the transmission of actinic rays of light through the eye and their relation to the yellow spot of the retina.* Proc. of Edinb. Soc. III. S. 371—375. *Edinb. Journ.* (2.) IV. S. 147—149.

1858.

3959. J. REGNAULD. *Fluorescence des milieux de l'oeil.* *Inst.* S. 410.

1859.

3960. J. SETSCHENOW. *Ueber die Fluorescenz der durchsichtigen Augenmedien.* *Arch. f. Ophthalm.* V. (2.) S. 205—209.

1860.

3961. J. REGNAULD. *Étude sur la fluorescence des milieux transparents de l'oeil.* *Cosmos.* XVI. S. 88—90. *Journ. de Pharm.* (3.) XXXVII. S. 104—111.



3962. J. JANSSEN. *Sur l'absorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux de l'oeil*. Compt. Rend. LI. S. 128—131 u. 373—374. — Ann. de chim. (3.) XL. S. 71—93. — Journ. de pharm. (3.) XXXVIII. S. 189—192. — Cosmos. XVII. S. 139 bis 140. — Cimento. XII. S. 132—133.
3963. A. v. GRÄFE. *Zur Beantwortung der Frage, warum die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichtes die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen*. Arch. f. Ophthalm. VI. (1.) S. 466.
- 1861.
3964. E. CHEVREUL. *Cercle chromatique*. Paris.
3965. LAURENCE. *Sensibility of the eye the color*. Philos. Mag. S. 220.
- 1862.
3966. R. FRANZ. *Ueber die Diathermanie der Medien des Auges*. Pogg. Ann. CXV. S. 266—279. Philos. Mag. (4.) XXIV. S. 176—185. Arch. de sc. phys. (2.) XVI. S. 140—141. Cimento. XVII. 27.
- 1866.
3967. J. B. LISTING. *Ueber die Grenzen der Farben im Spectrum*. Amtl. Ber. d. II. Naturf.-Vers. Hannover.
- 1867.
3968. J. B. LISTING. *Ueber die Grenzen der Farben im Spectrum*. Pogg. Ann. Bd. 131. S. 564—577.
3969. E. MANDELSTAMM. *Beitrag zur Physiologie der Farben*. Arch. f. Ophthalm. XIII. (2.) S. 399.
- 1869.
3970. M. MASCART. *Sur la visibilité des rayons ultraviolets*. Compt. Rend. Bd. 68. S. 402—404.
- 1870.
3971. J. M. MATZDORFF. *Ueber unsichtbares Licht*. Kreuznach.
- 1872.
3972. W. DOBROWOLSKY. *Ueber Empfindlichkeit des Auges gegen verschiedene Spectralfarben*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 66—74.
3973. — *Zur Kenntniss über die Empfindlichkeit des Auges gegen die Farbtöne*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 98—103.
3974. SEKULIC. *Ultraviolette Strahlen sind unmittelbar sichtbar*. Pogg. Ann. Bd. CXLVI. S. 157—158.
- 1874.
3975. C. BOHN. *Photometrische Untersuchungen (Helligkeit der Farben, Unterschiedsempfindlichkeit, Grenzen der Farbenempfindung u. A.)*. Pogg. Ann. Erg.-Bd. VI. S. 386.
- 1875.
3976. A. CORNU. *Sur le spectre normal du Soleil, partie ultraviolette*. Ann. Scient. de l'Ec. norm. sup. Sér. 3. III. No. 12. S. 421—435. — Arch. des Sc. phys. et natur. de Genève. LIII. No. 209. S. 50—68.
3977. L. SAUER. *Experimente über die Sichtbarkeit ultravioletter Strahlen*. Pogg. Ann. Bd. 155. S. 602—615. — Progr. d. Realschule in Stettin.
- 1877.
3978. W. v. BEZOLD. *Ueber die Fluorescenz der Netzhaut*. Münch. Ber. math.-physik. Kl. 7. Juli.
3979. A. CHODIN. *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke*. Preyers Samml. Physiol. Abh. I. Reihe. Heft 7. Jena. Dufft. S. 38—44.
- 1878.
3980. KLÜG. *Untersuchungen über die Diathermanie der Augenmedien*. Arch. f. Anat. u. Physiol. Heft 3 u. 4.
- 1879.
3981. SORET. *Sur la transparence des milieux de l'oeil pour les rayons ultraviolets*. Compt. Rend. Bd. 88. No. 20. S. 1013—1015. Arch. génér. de méd. Juli.
- 1880.
3982. O. N. ROOD. *Newtons use of the term Indigo with reference to colour of the spectrum*. Sill. Journ. (3.) XIX. S. 135—137.
- 1882.
3983. TH. W. ENGELMANN. *Prüfung der Diathermanität einiger Medien mittelst Bacterium photometricum*. Utrecht. Onderzoek. Derd. R. VII. S. 291. Pfüger's Arch. XXI. S. 125—128.

1888.

3984. DE CHARDONNET. *Pénétration des radiations actiniques dans l'oeil de l'homme et des animaux vertébrés et sur la vision des radiations ultraviolettes.* Séance de l'acad. des sc. Februar. XCVI. S. 441.  
 3985. — *Visions des radiations ultraviolettes.* Compt. Rend. Bd. 96. S. 509—511.  
 3986. E. MASCART. *Remarque sur la communication de M. de Chardonnet (Vision des radiations ultraviolettes).* Compt. Rend. Bd. 96. S. 571.  
 3987. B. O. PIERCE. *On the sensitiveness of the eye to slight differences of color.* Sill Journ. (8.) XXVI. S. 299.  
 3988. SORET. *Sur l'absorption des rayons ultra-violets par les milieux de l'oeil et par quelques autres substances.* Compt. Rend. Bd. 97. S. 572—575. — Arch. des sc. phys. (3.) X. S. 183 u. 429.  
 3989. — *Sur la visibilité des rayons ultraviolettes.* Compt. Rend. Bd. 97. S. 814—816.

1884.

3990. A. GAYET. *Sur le pouvoir absorbant du cristallin pour les rayons ultraviolettes.* Soc. franç. d'Ophthalm. S. 188. — Rec. d'Ophthalm. S. 169.  
 3991. A. KÖNIG und C. DIETERICI. *Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für Wellenlängen-Unterschiede des Lichtes.* Wiedem. Ann. XXII. S. 579. — Gräfe's Arch. XXX. (2.) S. 171—184. — Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin. 22. Februar u. 7. März.  
 3992. B. O. PIERCE. *Empfindlichkeit des Auges für minimale Farbenunterschiede.* Americ. Journ. of Sc. XXVI. S. 299.  
 3993. C. S. PIERCE und J. JASTROW. *On small differences of sensation.* Mem. of the Nat. Acad. of Sc.  
 3994. ZENGER. *Sur la visibilité des rayons ultraviolets à l'aide du parallélépipède de dispersion.* Compt. Rend. Bd. 98. S. 1017.

1886.

3995. E. BRODHUN. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Wellenlängenunterschiede des Lichtes.* Verhandl. d. Physiol. Ges. zu Berlin. Jahrg. 1885/86. No. 17 u. 18.  
 3996. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne auf der Peripherie der Netzhaut.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (1.) S. 9—32.  
 3997. WEBSTER, FOX und G. W. GOULD. *Retinal insensibility to ultra-violet and infra-red rays.* Americ. Journ. of Ophthalm. S. 345.

1889.

3998. W. UTHOFF. *Ueber die zur Erzeugung eben merklicher Farbdifferenzen erforderlichen Aenderungen der Wellenlänge spectralen Lichtes.* du Bois' Arch. S. 171.  
 3999. — *Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen die Farbentöne im Spectrum.* Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (4.) S. 1.  
 4000. J. WIDMARK. *Ueber den Einfluß des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges.* Skand. Arch. f. Physiol. I. S. 246.

1890.

4001. J. WIDMARK. *De l'influence de la lumière sur le cristallin.* Biolog. fören. förh. d. Stockholm. II. No. 8.  
 4002. — *Ueber die Einwirkung des ultravioletten Lichts aufs Auge.* Nord. ophthalm. Tidsskr. III. S. 61.  
 4003. — *Ueber die Durchdringlichkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen.* Nord. ophthalm. Tidsskr. III. S. 121.

1891.

4004. J. WIDMARK. *Ueber die Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen.* Skand. Arch. f. Physiol. III. S. 14—47. (Beitr. z. Ophthalm. Leipzig, Veit & Co.)

1892.

4005. E. BRODHUN. *Ueber die Empfindlichkeit des grünblinden und des normalen Auges gegen Farbenänderung im Spectrum.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 97—117.  
 4006. G. J. STONEY. *On the appreciation of ultra-visible quantities and on a gauge, to help us to appreciate them.* Philos. Magaz. (5.) XXXIV. S. 415—429. — Scientif. Proc. of the R. Dublin Soc. VII. S. 530.  
 4007. J. WIDMARK. *Ueber den Einfluß der ultravioletten Strahlen des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 17.

## 5. Farbenharmonie und Vergleich mit den Tonintervallen.

1704.  
4008. I. NEWTON. *Optics*. Lib. I. Pars 2. Prop. 8.  
1725 und 85.  
4009. L. B. CASTEL. *Clavecin oculaire*. Journ. de Trevoux.  
1787.  
4010. DE MAIRAN in Mém. de l'Acad. des Sc. S. 61.  
1772.  
4011. J. H. LAMBERT. *Farbenpyramide*. Augsburg. § 19.  
4012. HARTLEY in Priestley's Geschichte der Optik. S. 549.  
1802.  
4013. TH. YOUNG in Phil. Trans. S. 38.  
1817.  
4014. FIELD. *An essay on the analogy and harmony of colours*. London.  
1852.  
4015. DROBISCH. Abhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss. II. Sitzgs.-Ber. derselben. Nov. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 519—526.  
4016. UNGER. *Untersuchungen über das Gesetz der Farbenharmonie*. Pogg. Ann. LXXXVII S. 121—128. — Compt. Rend. XL. S. 239.  
1853.  
4017. DROBISCH. *Ueber die Wellenlängen und Oscillationszahlen der farbigen Strahlen im Spectrum*. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 519—526.  
1854.  
4018. UNGER. *Disque chromharmonique pour servir à expliquer les règles de l'harmonie des couleurs*. Göttingue.  
1855.  
4019. H. HELMHOLTZ. *Zusatz zu einer Abhandlung von E. Esselbach: Ueber die Messung der Wellenlänge des ultravioletten Lichtes*. Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 760. — Inst. 1856. S. 222.  
4020. J. J. OPPEL. *Ueber das optische Analogon der musikalischen Tonarten*. Jahresber. d. Frankf. Vers. 1854—1855. S. 47—55.  
4021. E. CHEVREUL. *Remarques sur les harmonies des couleurs*. Compt. Rend. XL S. 239—242. Edinb. Journ. (2.) I. S. 166—168.  
1858.  
4022. UNGER. *Die bildende Kunst, ästhetische Betrachtungen über Architectur, Sculptur und Malerei für Künstler und Kunstfreunde*. Göttingen.  
1869.  
4023. BALLU. *Aperçu sur un projet de musique optique*. Compt. Rend. Bd. 68. S. 878—879.  
1870.  
4024. W. PREYER. *Die Verwandtschaft der Töne und Farben*. Jen. Zeitschr. f. Med. u. Naturwiss. S. 376—388.  
1873.  
4025. J. AITKEN. *On harmony of colour*. Trans. of the Roy. Scottish Soc. of Arts II  
1875.  
4026. TH. W. CAVE. *The revised theory of light. I. The principles of the harmony of colour*. London. Smith, Elder & Co.  
1876.  
4027. J. PLATH. *Ueber die Versuche einer Farbenharmonielehre nach akustischen Principien*. Progr. d. Klosterschule Rofeleben.  
1879.  
4028. SCHASSLER. *Harmonische Farbenverbindungen*. Westermann's Monatsh. No. 1.  
4029. SULLY. *Harmony of colours*. Mind. No. 14. April.  
1885.  
4030. A. ROSENSTIEHL. *Les lois de la vision et l'harmonie des couleurs*. La Nature. XIII (1.) S. 263—266.  
1891.  
4031. CH. HENRY. *Harmonies de formes et de couleurs. Démonstrations pratiques avec le rapporteur esthétique et le cercle chromatique*. Paris. A. Hermann. 65 S.

**6. Der Farbensinn bei Thieren und verschiedenen Völkerstämmen. — Die historische und individuelle Entwicklung des Farbensinnes.**

1810.  
4032. BÖTTIGER. *Die aldobrandinische Hochzeit*. Dresden. S. 128.
1836.  
4033. WIEGMANN. *Die Malerei der Alten in ihrer Anwendung und Technik*. Hannover. S. 210.
1858.  
4034. W. E. GLADSTONE. *Studies on Homer and the Homeric age*. Vol. III. § 4. Oxford.
1861.  
4035. F. DIETERICI. *Die Naturbeschreibung und Naturphilosophie der Araber im zehnten Jahrhundert*. S. 85.
1867.  
4036. L. GEIGER. *Ueber den Farbensinn der Vorzeit und seine Entwicklung*. Tagebl. d. dtsh. Naturf. u. Aerzte. Anh. S. 51—57.
4037. — *Ueber den Farbensinn im Alterthum*.
1869.  
4038. P. BERT. *Sur la visibilité des divers rayons du spectre pour les animaux*. Mon. Scient. S. 827. — Compt. Rend. Bd. 69. S. 863.
1871.  
4039. L. GEIGER. *Ueber den Farbensinn der Urzeit und seine Entwicklung*. Stuttgart.
4040. — *Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit*. Cap. 3. Stuttgart.
1876.  
4041. W. JORDAN. *Die Farben bei Homeros*. Jahrb. f. klass. Philolog. CXIII.
1877.  
4042. E. JAVAL. *De l'évolution dans le sens de la vue*. Gaz. hebdom. S. 463. — Gaz. d. Hôpit. S. 678.
4043. W. E. GLADSTONE. *The colour sense*. Nineteenth Century, Oct.
4044. H. MAGNUS. *Die geschichtl. Entwicklung des Farbensinnes*. Leipzig, Günther. 56 S. — Kosmos. Bd. 1.
4045. — *Die Entwicklung des Farbensinnes*. Jena. 22 S.
4046. H. SCHMIDT. *Ueber die allmähliche Entwicklung des sinnlichen Unterscheidungsvermögens der Menschheit*. Berlin. 29 S.
4047. R. SMITH. Nature. 6. Dec. 1877.
4048. A. R. WALLACE. *Colour in animals and plants*. Macmillan's Mag. Oct.
1878.  
4049. G. ALLEN. *The colour-sense its origin and development*. Mind. Jan. 1878.
4050. ANDRÉE. *Ueber den Farbensinn der Naturvölker*. Zeitschr. f. Ethnolog. Jahrg. X.
4051. BLACKIE. *On Gladstone's theory of colour-sense in Homer*. Proc. Roy. Soc. Edinb. 1877—1878. S. 533.
4052. F. BOLL. *La evoluzione dei Colori*. La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. Vol. 2. No. 9.
4053. H. COHN. *Ueber Contrastfarbenempfindung und die Unwahrscheinlichkeit ihrer Entstehung in historischer Zeit*. Allg. med. Centralzeitg. S. 399.
4054. DELITZSCH. *Der Talmud und die Farben*. Nord u. Süd. XII. S. 254—267.
4055. DOR. *De l'évolution historique du sens des couleurs*. Paris, Masson. 19 S.
4056. — *Zur geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes*. Ber. üb. d. Vers. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 120—129. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Beil. z. Augusthft.
4057. W. E. GLADSTONE. *Der Farbensinn mit besonderer Berücksichtigung der Farberkenntniß des Homer*. Breslau, Kern. 47 S.
4058. GÜNTHER. *Der Farbensinn des menschlichen Auges in seiner geschichtlichen Entwicklung*. Augsburger Allgem. Ztg. Beil. No. 62.
4059. E. HACKEL. *Ursprung und Entwicklung der Sinneswerkzeuge*. Kosmos. November.
4060. S. KALISCHER. *Zur Ausbildung der menschlichen Sinne*. Gegenwart. No. 38
4061. E. KRAUSE. *Die geschichtliche Entwicklung des Farbensinnes*. Kosmos. I. S. 264—275 u. S. 248.
4062. LÖW. *Ueber die Farbenbezeichnungen in den Indianersprachen*. Sitzgs.-Ber. d. Münch. Anthropol. Ges.

4063. H. MAGNUS. *Zur Entwicklung des Farbensinnes.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVI. S. 465—477.
4064. — *Bemerkungen über Untersuchung und Erziehung des Farbensinnes.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 42.
4065. — *Histoire de l'évolution du sens des couleurs.* Paris, Reinwald & Co. 130 S.
4066. — *Entgegnung auf Herrn Krause's Aufsatz: Die geschichtliche Entwicklung des Farbensinnes.* Kosmos. I. S. 423—432.
4067. — *Ueber systematische Erziehung des Farbensinnes in den Schulen.* Compt. Rend. Bd. 87. S. 132—137.
4068. MAGNUS u. PECHUÉL-LÖSCHE. *Fragebogen zur Ausfüllung behufs Lösung des Problems: Bis zu welchem Grade die Naturvölker die Farben empfinden und durch Benennung unterscheiden, wie die Culturvölker.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVI. S. 375.
4069. W. POLE. *Colour-blindness in relation to the homeric expressions for colour.* Nature. Octbr. 24 u. 31.
4070. W. ZEHENDER. *Nachschrift zu dem Aufsatz des Herrn Magnus: Zur Entwicklung des Farbensinnes.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVI. S. 478—481.
4071. *Der Farbensinn des menschlichen Auges in seiner geschichtlichen Entwicklung.* Augsb. Allg. Ztg. No. 62. Beil.
- 1879.
4072. GRANT ALLEN. *Colour-Sense in Insects, its development and reaction.* Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. S. 201.
4073. — *The Colour-Sense; its Origin and Development.* London, Trübner & Co.
4074. ALMQUIST. *Studier öfver Tschuktschernas färgsinne.* Kongl. Vetenskaps. Akad. Förh. 9. Novbr. Deutsch: *Studien über den Farbensinn der Tschuktschen.* (Uebers. v. MAGNUS.) Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 14. 1880.
4075. — *Color-Sense of Natives at Mouth of Yenissi.* Nordenskiöld's Arctic Voyages. London. S. 376.
4076. ANTONOW. *Darwin'sche Hypothese der Evolution der Farbenempfindungen.* Aerztl. Blätt. No. 396.
4077. H. COHN. *Ueber quantitative Farbensinn-Bestimmungen bei Europäern und Nubiern.* Allg. med. Centralztg. 30. Aug.
4078. — *Schärfte und Farbensinn der Nubier.* Centralbl. f. Augenheilkde. III. S. 187—200.
4079. DELBOEUF. *Les sens et les couleurs chez les animaux.* Rev. Sient. May 24.
4080. DOR. *The historical Evolution of the Sense of Colour.* Englisch v. CLARKE. Edinb. med. Journ. Bd. 293. Novbr.
4081. H. T. FINCK. *Development of the color-sense.* Macmillan's Mag. 1879.
4082. GATSCHE. *Adjectives of color in Indian languages.* The americ. Naturalist. Aug. Zeitschr. f. Etholog. XI. Hft. 4 u. 5.
4083. J. GEOFFROY. *De la connaissance des couleurs dans l'antiquité, examen de la théorie de Dr. Magnus.* Union méd. No. 82 u. 86.
4084. E. HAECKEL. *Ursprung und Entwicklung der Sinnesorgane.* Ges. popul. Vortr. II. Hft. Bonn. 121 S.
4085. S. KALISCHER. *Ueber methodische Erziehung der Sinnesorgane, im Besonderen des Farbensinnes.* Ausland. No. 36.
4086. — *Die Erziehung der menschlichen Sinne, insbesondere des Farbensinnes.* Gegenwart. XVI. No. 32.
4087. A. KIRCHHOFF. *Ueber Farbensinn und Farbenbezeichnung der Nubier.* Zeitschr. f. Ethnolog. XI. (6.) S. 397. — Mitth. d. Ver. f. Erdkde. zu Halle a/S. S. 53.
4088. L. KOTELMANN. *Die Augen von 9 Lappländern, 3 Patagioniern, 13 Nubiern und 1 Neger vom weissen Nil.* Berl. klin. Wochenschr. No. 47.
4089. H. MAGNUS. *Die methodische Erziehung des Farbensinnes.* Breslau, Kern. 1 Farb.-Taf. u. 72 Farb.-Kärtch.
4090. — *Ueber methodische Erziehung der Sinnesorgane, insbesondere des Farbensinnes.* Ausland. No. 36.
4091. MARTY. *Die Fragen nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes.* Wien, Gerold.
4092. MURPHY, CRAIG - CRISTIC, BREWIN, INGLEBY, HARDMANN. *Shakespeare's Colour Names.* Nature. XIX. No. 479—483.
4093. NACHTIGAL. *Farbenbezeichnungen der Nubier.* Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 452—455.

4094. H. SCHÖLER. *Ueber die Stellung der Ophthalmologie zur Anthropologie*. Virchow's Arch. f. pathol. Anat. Bd. 78.
4095. SCHRÖDER. *Die Entwicklung des Farbensinnes am menschlichen Auge*. Berl. klin. Wochenschr. No. 36 u. 37.
4096. STEIN. *Sehschärfe und Farbensinn der Nubier*. Frankf. Ztg. No. 213.
4097. v. STRAUSS u. TORNEY. *Bezeichnung der Farben Blau und Grün im chinesischen Alterthum*. Zeitschr. d. dtsh. morgenl. Ges. XXXIV. (8.) S. 502—508.
4098. R. VIRCHOW. *Die Erziehung des Farbensinnes*. Ber. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 8.
4099. — *Verzeichniß der Farbenbezeichnungen in lappischer Sprache*. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 148.
4100. — *Farbensinn der Lappländer*. Ber. d. Berl. Ges. f. Anthropol., Ethnolog. u. Urgesch. Sitzgs.-Ber. v. 15. März. S. 64.
4101. — *Farbensinn der Nubier*. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 389.
4102. — *Die in Berlin anwesenden Nubier der Hagenbeck'schen Karawane*. Sitzgs.-Ber. d. Ges. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgesch. S. 44.
4103. A. WALLACE. *Nature*. XIX. S. 501.
- 1880.
4104. GR. ALLEN. *Der Farbensinn, sein Ursprung und seine Entwicklung*. Deutsch und mit Einleitung von E. KRAUSE. Leipzig.
4105. ALMQUIST und MAGNUS. *Studien über den Farbensinn der Tschuktschen*. Breslauer ärztl. Zeitschr. No. 14.
4106. ANDRÉE. *Ueber den Farbensinn der Naturvölker*. Globus. XXXVIII. S. 10.
4107. J. CHATIN. *Sur la valeur comparée des impressions monochromatiques chez les Invertébrés*. Compt. Rend. XC. 1. S. 41.
4108. — *Action des lumières colorées sur l'appareil optique des crustacées*. Gaz. de Paris. No. 28. S. 363.
4109. E. DREHER. *Ueber den Farbensinn der Griechen*. Dtsch. Lesehalle. No. 25.
4110. ESPINAS. *Le sens de la couleur, son origine et son développement*. Rev. philos. No. 2.
4111. GÜNTHER. *Der Farbensinn, sein Wesen und seine Entwicklung*. Diss. München.
4112. — *Ein Problem der physiologischen Physik in seinen Beziehungen zur Ethnologie*. Kosmos. Heft 8. Nov.
4113. L. HARTMANN. *Farbensinn bei den Naturvölkern*. Zeitschr. f. Ethnolog. XII. S. 188.
4114. F. HOLMGREN. *Beitrag zur Beleuchtung der Frage über die historische Entwicklung des Farbensinnes*. Upsala. Läkaref. Förh. XV. S. 222—259.
4115. A. KIRCHHOFF. *Noch einmal die Farbenbezeichnungen der Nubier*. Mitth. d. Ver. f. Erdkde. zu Halle a/S.
4116. H. MAGNUS. *Untersuchungen über den Farbensinn der Naturvölker mit einem chromolithographischen Fragebogen*. Jena. Preyer's Samml. physiol. Abh. II. (7.)
4117. RABL-RÜCKHARD. *Zur historischen Entwicklung des Farbensinnes*. Berl. anthropol. Ges. 22. Mai. — Zeitschr. f. Ethnolog. Hft. 4.
4118. A. v. REUSS. *Ueber die Wichtigkeit der Erziehung des Farbensinnes*. Wien. med. Presse. XXI. No. 26 u. 28.
4119. H. SCHÖLER. *Ophthalmologische Untersuchungen an Nubiern und Negeren*. Zeitschr. f. Ethnolog. XII. (1.) S. 59—68.
4120. J. N. STACK. *Color-sense of the Maori*. *Nature*. XXII. S. 494.
4121. STINDE. *Die angebliche Blaublindheit der Urvölker*. Gegenwart. No. 38.
- 1881.
4122. J. CHATIN. *Contributions expérimentales à l'étude de la chromatopsie chez les Batraciens, les Crustacés et les Insectes*. Paris, Gauthier-Villars.
4123. A. KIRCHHOFF. *Zur Frage über den Farbensinn der Naturvölker*. Dtsch. Rev. März.
4124. KRONER. *Der Talmud und die Farben*. Augsb. Allg. Ztg. No. 256. Beil.
4125. P. v. SEYDEWITZ. *On Color-Blindness and the development of the Color Sense*. New-Orleans. med. and surg. Journ. IV. (2). S. 81.
- 1882.
4126. BIRGHAM. *Farbensinn und Farbenblindheit bei den Hawaiianern*. Ausland. No. 17.
4127. COLEUSO. *On the perception of Colours by the ancient Maoris*. New Zealand. Inst. XIV. S. 49.
4128. TH. W. ENGELMANN. *Bacterium photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht- und Farbensinnes*. Utrecht'sche Unters. Derde Reeks. VII. S. 252. Pfüger's Arch. XXX. S. 95—124.

4129. Th. W. ENGELMANN. *Ueber Licht- und Farbenperception niederster Organismen.* Pflüger's Arch. Bd. 29. S. 387. Arch. Néerl. V. S. 417.
4130. — *Farbe und Assimilation.* Utrecht'sche Unters. Derde Recks. VII. S. 209. Arch. 1883. Néerl. (1.) S. 29.
4131. A. FLINKER. *Ueber den Farbensinn der Thiere.* Wien. med. Wochenschr. No. 9.
4132. L. W. FOX. *Examination of Indians at the Government School in Carlisle, for acuteness of vision and color-blindness.* Philad. M. Times. XII. S. 386.
4133. A. GENZMER. *Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen.* Halle.
4134. J. GROFFROY. *De la connaissance et de la denomination des couleurs dans l'antiquité.* Mém. de la Soc. d'anthropol. de Paris. (2.) II. (3.) S. 281.
4135. KELLER. *Ueber den Farbensinn der Mollusken.* Wolf's Zeitschr. XXVI. S. 100—102.
4136. LOREZ. *Die Farbenbezeichnungen bei Homer mit Berücksichtigung der Frage über Farbenblindheit.* Jahresber. d. Gymnas. in Arnaw.
4137. B. W. LOVETT. *The development of senses.* Pop. Sc. Month. New-York. XXI. S. 34.
4138. J. LUBBOCK. *On the sense of colour among some of the lower animals.* Nature. XXV. S. 422.
4139. — *On the development of the color-sense.* Fortnightly Rev. London. XXXI. S. 518. — Littell's Liv. Age. May 18.
4140. C. ROBERTS. *Colour-blindness as a racial character.* Lancet. I. S. 124.
4141. J. SOURY. *Développement du sens des couleurs chez l'enfant, le sauvage et le barbare.* Républ. franç. 27. Juni.
4142. — *Nouvelles recherches sur le sens des couleurs dans la série animale.* Républ. franç. No. 30.
- 1883.
4143. GRANT ALLEN. *Naturstudien; Bilder zur Entwicklungslehre.* Uebersetzt von E. Huth. Leipzig.
4144. V. GRABER. *Fundamentalversuche über die Helligkeits- und Farbenempfindlichkeit angeregter und geblendeter Thiere.* Sitzgs.-Ber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. 87. (1.) S. 201.
4145. A. KIRCHHOFF. *Die Farbenbezeichnung der Samojeden und Queensland-Australier nebst vergleichendem Hinblick auf diejenige der Nubier und Ainos.* Ausland. No. 2.
4146. J. LUBBOCK. *On the sense of colour among some of the lower animals.* Journ. Linn Soc. Zool. XVI. S. 121. — Nature. XXVII. S. 618.
4147. H. MAGNUS. *Die Farbenempfindung des Kindes.* Dtsch. Rev. VIII. S. 124.
4148. — *Ueber ethnologische Untersuchungen des Farbensinnes.* Virchow u. Holtzendorf Samml. wiss. Vortr. Hft. 420.
4149. MOUGEOLLE. *La linguistique et le sens des couleurs.* Rev. Scient. II. S. 715.
4150. S. OTTOLENGHI. *Il senso cromatico negli Israeliti.* Osservatore. Turin.
- 1884.
4151. C. C. ABBOT. *Colour-sense in fishes.* Science. IV. S. 336—339.
4152. G. B. BONO. *L'evoluzione storica del senso cromatico.* Gaz. delle Cliniche. XX.
4153. V. GRABER. *Grundlinien zur Erforschung des Helligkeits- und Farbensinnes der Thiere.* Leipzig.
4154. HOCHEGGER. *Die geschichtliche Entwicklung des Farbensinnes.* Psychologische Studie Innsbruck. 134 S.
4155. A. KIRCHHOFF. *Die Farbenbezeichnungen der Singhalesen und Araukaner.* Ausland. LVII. S. 266.
4156. L. KOTELMANN. *Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus.* Berl. klin. Wochenschr. S. 164 u. 395.
4157. — *Die Augen von 22 Kalmücken.* Zeitschr. f. Ethnolog.
- 1885.
4158. V. GRABER. *Ueber die Helligkeits- und Farbenempfindlichkeit einiger Meeresthiere.* Wien. Ber. Bd. 91. 1. Abth. S. 129—153.
4159. J. HOGG. *Homer colour-blind.* Journ. of scienc. London. (3.) VII. S. 313.
4160. F. HOLMGREN. *Ueber den Farbensinn fremder Völker; Zusammenstellung von Dr. Karl Rudbergs Untersuchungen auf der Weltreise der Fregatte Vanadis.* Upsal. Läkaref. Förh. XXI. S. 83—96.
4161. A. DE KEERSMAECKER. *Le Sens des Couleurs chez Homère.* London, Trübner.
4162. A. KÖNIG. *Ueber den Gesichtssinn der Zuluskaffern.* Verh. d. Berl. Physik. Ges. IV. S. 15—17.

1886.

4163. A. FOREL. *Les fourmis perçoivent-elles l'ultraviolet avec leurs yeux ou avec leur peau?* Compt. Rend. de la soc. helvét. des scienc. nat. S. 128.

4164. H. DE VARIGNY. *Le développement des sens, chez l'enfant, d'après M. Preyer.* Rev. Scientif. XXXVIII. S. 401.

1887.

4165. A. FLINKER. *Ueber den Farbensinn der Thiere.* Wien. med. Wochenschr. No. 9.

4166. HANDL. *Ueber den Farbensinn der Thiere und die Vertheilung der Energie im Spectrum.* Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. d. Wiss. XCIV. 2. Abth. S. 985.

1888.

4167. DENEFFE. *De la perfectibilité du sens chromatique dans l'espèce humaine.* Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belg. (4.) II.

4168. G. POUCHET. *La prétendue évolution du sens des couleurs.* Rev. Scient. S. 464.

1889.

4169. G. ALBERTOTTI. *Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti.* Modena.

4170. L. J. BLAKE u. W. S. FRANKLIN. *Colour-blindness a product of civilization.* Science. XIII. S. 170.

4171. A. M. FIELDE. *Color-sense and color-blindness among the Chinese.* Med. and. Surg. Rep. Philad. S. 651.

1890.

4172. A. M. FIELDE. *Colour-sense and colour-blindness among the Chinese.* China med. Miss. Journ. Shanghai. IV. S. 61.

4173. H. K. WOLFE. *The color-vocabulary of children.* Univ. Studies Nebraska III.

4174. *Colour-Sense among the Chinese.* China med. Miss. Journ. — New-York med. Journ. LII. No. 8. S. 214.

4175. *Colour vision; defective in the mercantile marine.* Brit. med. Journ. No. 1560. S. 1215

1892.

4176. H. BLÜMNER. *Die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern.* Berl. Stud. f. klass. Philol. u. Archäol. Bd. 13. Hft. 3. Berlin, S. Calvary & Co. 231 S.

1894.

4177. A. ANGELUCCI. *La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull'impiego del colore in pittura.* Arch. di Ottalm. II. S. 3 u. 69.

4178. GARBINI. *Evolution du sens des couleurs dans l'enfance.* Arch. per l'antropol. e la etnolog. XXIV. (1.)

4179. W. A. NAGEL. *Beobachtungen über den Lichtsinn augenloser Muscheln.* Biol. Centralbl. XIV. S. 385.

4180. — *Ein Beitrag zur Kenntnis des Lichtsinns augenloser Thiere.* Biol. Centralbl. XVI. S. 810—813.

## § 20.

## Die zusammengesetzten Farben.

Es gehört hierhin auch ein Theil der Litteratur von § 19.

## 1. Aeltere Litteratur

## über normales Farbensehen und über Farbentheorien.

1519.

4181. LEONARDO DA VINCI. *Trattato della pittura.* Paris. 1651.

1686.

4182. R. WALLER. *A catalogue of simple and mixte colours.* Philos. Trans.

1704.

4183. J. NEWTON. *Optice.* Lib. I. P. II. Prop. IV—VI.

1785.

4184. J. C. LE BLOND. *Il Colorito.* London.



1787.  
4185. DU FAY. Mém. de l'Acad. roy. de Paris.  
1758.  
4186. T. MAYER. In Göttinger gelehrte Anz. St. 147.  
1772.  
4187. J. H. LAMBERT. Beschreibung einer Farbenpyramide. Berlin.  
1792.  
4188. WÜNSCH. Versuche und Beobachtungen über die Farben des Lichts. Leipzig. — Gilbert's Ann. XXXIV. 10.  
1807.  
4189. TH. YOUNG. Lectures on natural philosophy. London.  
1808.  
4190. M. OPOIX. Théorie des couleurs. Paris.  
1810.  
4191. RUNGE und STEFFENS. Farbenkugel oder Construction der Verhältnisse aller Mischungen der Farben und Bedeutung der Farben in der Natur. Hamburg.  
1816.  
4192. A. SCHOPENHAUER. Ueber das Sehen und die Farben. Leipzig.  
1826.  
4193. HJORT. De functione retinae. Dissertatio. Christiania.  
1829.  
4194. J. PLATEAU. Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue. Lüttich.  
1830.  
4195. A. SCHOPENHAUER. Ueber das Sehen und die Farben. Lat. Uebersetz. in Radii Scriptores ophthalm. min. Comment. XXI exponens theoriā colorum physiologicar.  
4196. CRENUM. Properties of the primary colors etc. London.  
1836.  
4197. CHALLIS. Theoretische Auslegung einiger Thatsachen, die Zusammensetzung der Farben des Spectrums betreffend. Pogg. Ann. XXXVII. S. 528.  
1838.  
4198. A. W. VOLKMANN. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 373.  
1839.  
4199. LICHTENBERGER. Observationes quaedam de spectris objectorum extra fines visus distincti positorum. Diss. Leipzig.  
4200. MILN. Ueber die Empfindung, welche entsteht, wenn verschiedenfarbige Lichtstrahlen auf dieselben Stellen der Retina eines einzigen Auges fallen. Müllers Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 64.  
4201. D. R. HAY. Nomenclature of colours.  
4202. SZOKALSKI. Essai sur les sensations des couleurs. Ann. d'Ocul. II. S. 11. III. S. 1.  
1843.  
4203. J. MÜLLER. Zusammensetzung des weißen Lichts aus den verschiedenen Farben. Pogg. Ann. LVIII. S. 358 u. 518.  
1847.  
4204. H. W. DOVE. Ueber die Methoden, aus Complementärfarben Weiß darzustellen, und über die Erscheinungen, welche polarisirtes Licht zeigt, dessen Polarisationsebene gedreht wird. Berliner Monatsber. 1846. S. 70. Philos. Mag. XXX. S. 465. Inst. No. 712. S. 176. Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 276.  
4205. — Ueber die Darstellung des Weiss aus Complementärfarben und über die optischen Erscheinungen, welche in rotirenden Polarisationsapparaten sich zeigen. Pogg. Ann. Bd. 71. S. 97.  
4206. E. CHEVREUL. Exposé d'un moyen de définir et nommer les couleurs d'après une méthode rationnelle et expérimentale. Quesneville rev. scient. XXIX. S. 382. Comp. Rend. XXXII. S. 693. Inst. No. 906. S. 155. Dingl. polyt. Journ. CXXI. S. 367. Athen. 1851. S. 272.  
1848.  
4207. E. BRÜCKE. Ueber das Wesen der braunen Farbe. Pogg. Ann. LXXIV. S. 461. Philos. Mag. XXXIII. S. 281. Inst. No. 785. S. 21.  
4208. E. HARLESS. Physiologische Beobachtung und Experiment. Nürnberg. S. 45. (Eine Farbe durch die andere gesehen.)

4209. CHR. DOPPLER. *Versuch einer systematischen Classification der Farben*. Prag. — Abh. d. böhm. Ges. V. S. 401. 1849.
4210. J. D. FORBES. *Hints towards a classification of colours*. Philos. Mag. XXXIV. S. 161. 1851.
4211. E. BRÜCKE. *Untersuchungen über subjective Farben*. Denkschr. d. math.-naturw. Klasse d. Wien. Acad. III. 1852.
4212. \*H. HELMHOLTZ. *Ueber die Theorie der zusammengesetzten Farben*. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 461—482. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 45—66. Philos. Mag. (4.) IV. S. 519—584. Cosmos. II. S. 112—120. Ann. de chim. (3.) XXXVI. S. 500—508. Fechner's Centralbl. 1853. S. 3—9.
4213. ZIEGLER. *Traité de la couleur et de la lumière*. 1853.
4214. L. FOUCAULT. *Sur la récomposition des couleurs du spectre en teintes plates*. Cosmos. II. S. 232. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 385—387.
4215. \*H. GRASSMANN. *Zur Theorie der Farbmischung*. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 69—84. Philos. Mag. (4.) VII. S. 254—264.
4216. HOLTZMANN. *Apparat zur Darstellung von Farbmischungen*. Tagebl. d. dtach. Naturforscherversammlung.
4217. J. PLATEAU's *Reclamation*. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 172—173. Cosmos. II. S. 241. Fechner. Centralbl. S. 365.
4218. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Zusammensetzung der Spektralfarben*. Pogg. Ann. XCIV. S. 1—28. Athen. S. 1197—1198. Cosmos. III. S. 573—575. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 5. Ann. de chim. (3.) XLIV. S. 70—74. Arch. d. sc. phys. XXIX. S. 242. 1854.
4219. J. GRAILICH. *Beitrag zur Theorie der gemischten Farben*. Wien. Ber. XII. S. 783 bis 847. XIII. S. 201—284.
4220. J. CZERMAK. *Physiologische Studien*. Wien. Ber. XII. S. 322. § 6 u. XVII. S. 565.
4221. A. SCHOPENHAUER. *Ueber das Sehen und die Farben*. 2. Aufl. Leipzig. 1855.
4222. \*J. C. MAXWELL. *Experiments on colour, perceived by the eye, with remarks on colour blindness*. Edinb. Trans. XXI. S. 275—297. Edinb. Journ. (2.) I. S. 359—360. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 299—301. Philos. Mag. (4.) XIV. S. 40.
4223. G. WILSON. *Observations on Mr. Maxwell's paper*. Edinb. Journ. (2.) I. S. 361.
4224. J. D. FORBES. *Observations on Mr. Maxwell's paper*. Edinb. Journ. (2.) I. S. 362.
4225. T. v. DOESBURGH. *Over kleurmenging en kleurmeting*. Utrecht.
4226. — *De colorum mixtione et dimensione*. Inaug.-Diss. Utrecht. 1856.
4227. H. CZOLBE. *Vertheidigung des Euler'schen Begriffes der Farben*. Das Jahrhundert. No. 4. S. 86—96.
4228. J. C. MAXWELL. *On the theory of compound colours with reference to mixtures of blue and yellow light*. Athen. S. 1093. Edinb. Journ. (2.) IV. S. 335—337. Inst. S. 444. Rep. of British Assoc. 2. S. 12—13.
4229. CHALLIS. *On theory of the composition of colours on the hypothesis of undulations*. Philos. Mag. (4.) XII. S. 329—338 u. 521.
4230. G. G. STOKES. *Remarks on Challis' paper*. Philos. Mag. (4.) XII. S. 421. 1857.
4231. H. W. DOVE. *Eine Methode, Interferenz- und Absorptionsfarben zu mischen*. Berl. Monatsber. 11. März. — Pogg. Ann. CII.
4232. H. CZOLBE. *Euler's Begriff der Farben als nothwendiger Hebel, die Schranke der Kant'schen Erkenntnistheorie zu durchbrechen*. Das Jahrhundert. S. 387—392, 411—416, 437—440, 458—464.

## 2. Aeltere Litteratur über Farbenblindheit.

1684.

4233. D. TUBERVILLE. *Several remarkable cases in physick, relating chiefly to the eyes*. Philos. Trans. No. 164. S. 736—738. Aug. 4. 1684. — Lowthrop's Abridgement. Vol. III. part. 1. p. 40.

- 1777.
4234. HUDDART. *Of a person which could not distinguish colours.* Philos. Trans. LXVII. 1. S. 14.
- 1778.
4235. WHISSON. *An account of a remarkable imperfection of sight.* Philos. Trans. London. V. LXVIII. S. 611—614.
- 1779.
4236. *Sur quelques personnes qui ne peuvent distinguer les couleurs.* Observations sur la physique par Rozier et Mongez. Paris. Tome XIII. p. 86—88.
- 1785.
4237. GIROS v. GENTILLY. *Theorie der Farben.* Lichtenbergs Magazin. I. (2.) S. 57. (Unter dem Pseudonym G. PALMER englisch und französisch erschienen.)
- 1798.
4238. J. DALTON. *Extraordinary facts relating to the vision of colours.* Memoirs of Lit. and Phil. Soc. of Manchester. V. part. I. (read 31. Oct. 1794.) — Edinburgh Journ. of Sc. IX. p. 97. Neu abgedruckt in Edinburgh Journ. of Sc. V. S. 188. (1831.)
- 1802.
4239. KÜHNE. *De chromatopseudopsi.* Berolini.
- 1810.
4240. J. W. GOETHE. *Zur Farbenlehre.* 1. § 103.
- 1818.
4241. PARRY. *Med. Trans. Coll. Phys.* Vol. IV. S. 56.
- 1815.
4242. J. T. SACHS. *Eine physiologisch-optische Beobachtung.* (Nach dem Tode des Verfassers veröffentlicht von Prof. HARLES.) Meckels deutsch. Arch. f. d. Physiol. Bd. I. S. 188.
- 1816.
4243. W. NICHOLL. *Account of a case of curious imperfection of vision.* Med. chirurg. Trans. VII. S. 477. — Meckels deutsch. Arch. f. d. Physiol. V. S. 260. 1819.
- 1817.
4244. J. W. GOETHE. *Zur Naturwissenschaft und Morphologie.* 1. Heft. S. 297.
- 1818.
4245. WARDEOP. *Essays on the morbid anatomy of the human eye.* II. S. 196. London. — Meckel's deutsches Arch. f. Physiol. V. S. 262. 1819.
4246. W. NICHOLL. *Account of a case of defective power to distinguish colours.* Med. chir. Trans. IX. S. 359. — Meckels deutsch. Arch. f. d. Physiol. V. S. 264. 1819. — Ann. of Philos. N. S. III. S. 128. 1822.
- 1819.
4247. J. F. GALL und G. SPURZHEIM. *Anatomie et Physiologie du système nerveux.* IV. S. 98. Paris.
- 1821.
4248. HELLING. *Praktisches Handbuch der Augenkrankheiten.* Bd. I. Berlin.
- 1822.
4249. J. BUTTER. *Cases of deficiency in the power of perceiving colours.* Tr. Phrenol. Soc. Edinb. 1822—24. S. 209—222.
4250. — *Remarks on the insensibility of the eye to certain colours.* Edinb. philos. Journ. VI. S. 135—140.
4251. D. BREWSTER. *Remarks to the preceding paper of Mr. J. Butter.* Edinb. philos. Journ. VI. S. 140—141.
- 1823.
4252. SOMMER. *Chromatopseudopsie.* Gräfe u. Walther's Journ. f. Chir. Bd. V.
- 1826.
4253. G. HARVEY. *On an anomalous case of vision in regard to colours.* Edinb. Philos. Trans. X. S. 253.
- 1828.
4254. PURKINJE. *Achromatopsie.* Berl. Encycl. Wört. d. med. Wiss. Bd. I. S. 259.
4255. J. HERSCHEL. *Art. „Light“* in: Encyclop. metrop. S. 434. § 507.
- 1829.
4256. COLQUHOUN. *Unempfindlichkeit der Augen gegen bestimmte Farben.* Froriep's Notizen. XXIV. S. 905. (Aus Glasgow. Med. Journ.)

- 1882.
4257. D. BREWSTER. *Letters on natural magic*. London. (S. 44 der deutschen Uebersetzung.)
- 1883.
4258. J. HERSCHEL. *Brief an Dalton vom 22. Mai 1833*, abgedr. in Henry: *Memoirs of the life and scientific researches of John Dalton*. London 1854.
- 1887.
4259. \*A. SEEBECK. *Ueber den bei manchen Personen vorkommenden Mangel an Farbensinn*. Pogg. Ann. XLII. S. 177—233.
- 1888.
4260. CUNIER. *Achromatopsie héréditaire dequies cinq générations*. Ann. d'Ocul. I. S. 417 u. 488.
- 1889.
4261. E. WARTMANN. *Daltonismus*. Häser's Repetitorium Bd. IV. S. 125.
- 1841.
4262. V. SZOKALSKI. *Essai sur les sensations des couleurs dans l'état physiol. et pathol. de l'oeil*. Paris. — Ann. d'Ocul. III. S. 1.
- 1842.
4263. V. SZOKALSKI. *Ueber die Empfindungen der Farben in physiologischer und pathologischer Hinsicht*. Gießen.
- 1843.
4264. BOYS DE LOURY. *Aberration dans les sensations des couleurs*. Lancette franç. No. 151. — Bull. de Thérap. Vol. XXV. S. 459.
- 1844.
4265. TRINCHINETTI. *Chromatopseudopsie*. Ann. Univ. de Méd. No. 1. Milano.
4266. E. WARTMANN. *Mémoire sur le daltonisme et la dyschromatopsie*. Mém. soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève X.
- 1845.
4267. HERSCHEL. *Light*. Encyc. Metrop. § 507. S. 434.
- 1846.
4268. E. WARTMANN. *Memoir on Color-Blindness*. Taylor's Scientific Memoirs 1846.
4269. — *Daltonisme*. Arch. gén. de Méd. févr. — Arch. d'anat. S. 56.
- 1848.
4270. DECONDÉ. *Daltonisme dichromatique*. Ann. d'Ocul. XX.
4271. D'HOMBRES-FIRMAS. Compt. Rend. XXIX. S. 175. XXX. 60. S. 376. Inst. No. 815. S. 259.
- 1849.
4272. E. WARTMANN. *Sur un phénomène de dyschromatopsie*. Bull. de Brux. XVI. 1. S. 137. — Inst. XVII. No. 799. S. 131.
4273. — *Nouvelle mémoire sur le daltonisme*. Mém. soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève. XII.
- 1850.
4274. HELFFT. *Ueber Achromatopsie etc.* Med. Zeit. d. Ver. f. Heilkde. in Preussen. XIV. S. 97—99.
4275. D'HOMBRES-FIRMAS. *Observations d'achromatopsie*. Ann. d'Ocul. XXIII. S. 42 u. 127.
- 1851.
4276. E. CORNAZ. *De l'hyperchromatopsie*. Bruxelles. — Ann. d'Ocul. T. XXV. S. 3.
- 1852.
4277. SCHNETZLER. Arch. d. sc. phys. XXI. S. 251—252.
4278. F. BURCKHARDT. *Beobachtungen an einem Daltonisten*. Verh. der naturf. Ges. in Basel. X. S. 90—93.
- 1853.
4279. EICHMANN. *Achromatopsie*. Med. Zeit. d. Ver. f. Heilkde. in Preussen. No. 47. S. 224.
4280. G. WILSON. *Monthly Journ. of med. sc.* Nov. 1853 bis Dec. 1854. Edinb. Journ. (2.) IV. S. 322—327.
4281. C. F. SCHÖNBEIN. *Ueber Farbenveränderungen*. Wien.
- 1854.
4282. POTTON. *Recherches sur le daltonisme*. Gaz. de Lyon March 1854. — Arch. d'Ophthalm. I. S. 158. II. S. 137. — Arch. génér. de Med. S. 617. — Union méd. S. 174.

4283. G. WILSON. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 226—227.  
 4284. EICHMANN. Fechner's Centralbl. S. 294—295.  
 1855.  
 4285. LEMBERT. *Cas de pseudochromie*. Gaz. hebdomadaire. No. 16.  
 4286. WILSON. *Researches on Colour-Blindness*. Edinburgh.  
 4287. J. CL. MAXWELL. *On the Theory of Colours in relation to Colour-Blindness*. In Wilson: *Researches on Colour-Blindness*. Edinburgh. S. 153.  
 1856.  
 4288. BRONNER. *On Daltonism*. Med. Times and Gaz. April 12.  
 4289. W. POLE. Proc. of Roy. Soc. VIII. S. 172—177. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 282—286.  
 4290. J. TYNDALL. *On a peculiar case of colour blindness*. Philos. Mag. (4.) XI. S. 329—333. — Silliman's Journ. (2.) XXII. S. 143—146. — Arch. d. sc. phys. XXXIII. S. 221—225.

### 3. Neuere Litteratur über normales Farbensehen und über Farbenblindheit.

#### a) Zusammenfassende Darstellungen der Farbenlehre.

1866.  
 4291. E. BRÜCKE. *Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe*. Leipzig. 1869.  
 4292. A. NAGEL. *Der Farbensinn*. Berlin. 1871.  
 4293. W. BENSON. *Manual of the Science of Color*. London. 1874.  
 4294. W. v. BEZOLD. *Die Farbenlehre in Hinblick auf Kunst und Kunstgewerbe*. Braunschweig. 296 S.  
 4295. GUILLEMIN. *La lumière et les couleurs*. Paris, Hachette. 302 S.  
 4296. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. V. Grundzüge einer Theorie des Lichtsinnes*. Wien. Ber. (3.) LXIX. S. 179—217.  
 4297. — *Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Grundzüge einer Theorie des Farbensinnes*. Wien. Ber. (3.) LXX. S. 169—204.  
 1876.  
 4298. A. CLASSEN. *Zur Physiologie des Gesichtssinnes*. Jena. 1877.  
 4299. L. HAPPE. *Ueber den physiologischen Entwicklungsgang der Lehre von den Farben*. Leipzig, Veit & Co. 44 S.  
 4300. FR. HOLMGREN. *Om färgblindheten i dess förhållande till jernvägstrafiken och sjöväsendet*. Upsala Läkaref. Förh. XII. S. 171—251, 276—358. Auch als Brochure. 1878.  
 4301. A. CLASSEN. *Entwurf einer Psychologie der Licht- und Farbenempfindung*. Preyer's Samml. physiol. Abh. II. Reihe. 2. Heft. Jena, Fischer.  
 4302. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn*. 6 Mittheilungen an die kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Gerold's Sohn, Wien. 141 S.  
 1879.  
 4303. J. EICHLER. *Farbenlehre für Schule und Haus*. Wien, Sallmayer. 110 S.  
 4304. L. MAUTHNER. *Functionsprüfungen des Auges*. (Heft 3, 4 u. 5 der Vorträge aus dem Gesamtgebiet der Augenheilkunde.) Wiesbaden, Bergmann.  
 4305. O. N. ROOD. *Modern Chromatics, with applications to Art and Industry*. New-York, Appleton & Co. 329 S.  
 4306. ROSENTHAL. *Die Farbenlehre und ihre Beziehungen zum Kunstgewerbe*. Deutsche Revue. Dec. 1879. — Rev. Scien. IX. (2.) No. 14. S. 316.  
 4307. A. v. WOUVERMANS. *Farbenlehre*. Wien, Hartleben. 160 S.  
 1880.  
 4308. O. N. ROOD. *Die moderne Farbenlehre mit Hinweisung auf ihre Benutzungen in Malerei und Kunstgewerbe*. Intern. Bibl. XLI. Leipzig. 350 S.  
 1881.  
 4309. H. MAGNUS. *Farben und Schöpfung*. Breslau, Kern. 270 S.



4333. GLADSTONE. *On his own perception of colour*. Athen. II. S. 24. — Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 12—13.
4334. J. CL. MAXWELL. *On the theory of compound colours and the relations of the colours in the spectrum*. Proc. Roy. Soc. X. S. 404—409 u. 484—486. Philos. Transact. CL. S. 57—84. Philos. Mag. (4.) XXI. S. 141—146. Cimento. XII. S. 33—37. Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 16.
- 1861.
4335. J. J. OPPEL. *Nachträgliche Bemerkungen zu dem vorjährigen Aufsatz über Farbenblindheit*. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1860—1861. S. 42—47.
4336. J. Z. LAURENCE. *Some observations on the sensibility of the eye to colour*. Philos. Mag. (4.) XXII. S. 220—226.
4337. E. ROSE. *Ueber stehende Farbentäuschungen*. Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 72 bis 108.
- 1862.
4338. J. BRISCHE. *Phénomène d'Acromatopsie ou Daltonisme monochromatique*. Ann. Soc. méd. Chir. de Liège I, S. 87.
4339. FROMMÜLLER. *Mangelhafter Farbensinn*. Memorab. VI. S. 7.
4340. J. J. OPPEL. *Zur Veranschaulichung der Achromatopsie für nicht damit Behaftete*. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1861—1862. S. 48—55.
- 1863.
4341. R. SCHELSKE. *Ueber Farbenempfindungen*. Arch. f. Ophthalm. XI. 3. S. 39—62.
4342. M. BAKOWA. *Ein Verfahren, künstliche Farbenblindheit hervorzubringen*. Zeitschr. f. rat. Med. III. Reihe. XVII. S. 245.
- 1864.
4343. H. AUERT. *Physiologie der Netzhaut*. Breslau. S. 154—186.
4344. M. BENEDICT. *Der Daltonismus bei Sehnerven-Atrophie*. Arch. f. Ophthalm. I. (2.) S. 185.
4345. E. ROSE. *Die Gesichtstäuschungen im Icterus. (Nebst einem Anhang über den Farbensinn bei der Nachtblindheit und die Wirkung der Pikrinsäure auf das Auge*. Virchow's Arch. XXX. S. 442.
4346. v. WITTICH. *Ueber die geringsten Ausdehnungen, welche man farbigen Objecten geben kann, um sie noch in ihrer specifischen Farbe wahrzunehmen*. Königsb. med. Jahrbücher. IV. S. 23.
- 1865.
4347. CHISOLM. *Color-Blindness from Neuritis*. Ophth. Hosp. Rep. Vol. VI. S. 214.
4348. E. MACH. *Bemerkungen über intermittirende Lichtreize*. Reichert u. du Bois' Arch. Jahrg. 1865. S. 629—635.
4349. R. SCHELSKE. *Ueber Rothblindheit in Folge pathologischen Processes*. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 171—178.
4350. C. BOHN. *Ueber das Farbensehen und die Theorie der Mischfarben*. Pogg. Ann. CXXV. S. 87—118. (Versuch einer Theorie, ähnlich der von Grailich.)
4351. F. BURCKHARDT. *Notiz, betreffend mangelnden Farbensinn*. Pogg. Ann. CXXIV. S. 345.
4352. E. ROSE. *Die Farbenkrankheiten im Abriss*. Pogg. Ann. CXXVI. S. 68—87.
4353. R. SCHELSKE. *Zur Farbenempfindung*. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 171—178.
- 1866.
4354. E. GOUBERT. *De la perceptivité normale et surtout anormale de l'oeil pour les couleurs spécialement de l'achromatopsie ou cécité des couleurs*. Thèse. Paris.
4355. M. SCHULTZE. *Ueber den gelben Fleck der Retina, seinen Einfluss auf normales Sehen und auf Farbenblindheit*. Bonn.
- 1867.
4356. C. S. CORNELIUS. *Ueber Young's Farben-theorie*. Zeitschr. f. Naturkde. XXXVIII. S. 520.
4357. H. DOR. *Observations au sujet des travaux de M. Schultze sur la tache jaune de la rétine, son influence sur la vision normale et sur le Daltonisme*. Arch. sc. phys. (2.) XXVIII. S. 155—165.
4358. — *Sur le Daltonisme*. Arch. de la Bibl. univ.
4359. H. W. DOVE. *Optische Notizen. I. Vereinigung prismatischer Farben zu Weiss. II. Ueber subjective Farben durch electrische Beleuchtung*. Pogg. Ann. CXXXI. S. 651—655.
4360. GALEZOWSKI. *Sur l'achromatopsie pathologique*. Compt. rend. du Congrès ophthal. Paris.

4361. V. HENSEN. *Ueber das Sehen in der Fovea centralis*. Virchow's Arch. XXXIX. S. 475.
4362. J. NICKLES. *Physiological effects of the monochromatic flame*. Silliman's Journ. (2.) XLIII. S. 93—94.
- 1868.
4363. GALEZOWSKI. *Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs*. Paris.
4364. NIRMETSCHKE. *Ueber Farbenblindheit*. Prag. Vierteljahrsschr. 25. Jahrg. IV. S. 224—238.
4365. ZÖLLNER. *Ueber Farbenbestimmung der Gestirne*. Pogg. Ann. Bd. 135. S. 59.
- 1869.
4366. W. BENSON. *Contrast and admixture of colours*. Scient. Am. XX. S. 257—258.
4367. CHISOLM. *Colour blindness resulting from neuritis*. Ophthalm. Hosp. Rep. April.
4368. TH. LEBER. *Ueber das Vorkommen von Anomalien des Farbensinnes bei Krankheiten des Auges*. Arch. f. Ophthalm. XV (3.) S. 26—107.
4369. J. J. MÜLLER. *Zur Theorie der Farben*. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 208 bis 258. — Pogg. Ann. Bd. 139. S. 411—431, 593—613.
4370. W. PREYER. *Ueber anomale Farbenempfindungen und die physiologischen Grundfarben*. Pfüger's Arch. I. S. 299—329.
- 1870.
4371. J. CZERMAK. *Ueber Schopenhauer's Theorie der Farbe*. Wien. Akad. Ber. LXII. S. 393—411.
4372. GALEZOWSKI. *Etude sur la chromatoscopie rétinienne ou examen de la vue au moyen de l'échelle de couleurs*. Compt. Rend. LXX. S. 1162.
4373. TH. LEBER. *Ueber Farbenblindheit bei Erkrankung des Auges*. Berl. med. Ges. — Berl. klin. Wochenschr. S. 8.
4374. A. SCHOPENHAUER. *Ueber das Sehen und die Farben*. 3. Aufl. Herausgegeben von Frauenstädt, Leipzig.
4375. J. W. STRUTT. *Some experiments on colour*. Rep. Brit. Assoc. XL. Liverpool. 43. — Nature. III. S. 234—236. (1871.)
4376. VIERORDT. *Die Messung der Lichtabsorption durchsichtiger Medien mittelst des Spectralapparats*. Pogg. Ann. CXL. S. 172.
4377. M. WOINOW. *Zur Farbenempfindung*. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 212.
4378. — *Zur Frage über die Intensität der Farben*. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 251.
- 1871.
4379. J. AITKEN. *Is blue a primary colour?* Nature. IV. S. 465.
4380. A. BACHMEISTER. *Farben und Farbensinn*. Ausland. S. 847—851.
4381. F. C. DONDERS. *Angeborener absoluter Defect des Farbensinnes*. Zehender's Klin. Monatsbl. IX. S. 470—471.
4382. GALEZOWSKI. *Quelques considérations sur la cécité par cause pathologique pour les couleurs*. Ann. d'Oculist. LXV. S. 221—243.
4383. F. HOLMGREN. *Ueber Farbenblindheit und die Young-Helmholtz'sche Farben-theorie*. Upsala Läkeref. Förh. VI. S. 634—687.
4384. J. CL. MAXWELL. *On colour vision*. Nature. IV. S. 13—16.
4385. J. T. MOTT. *The primary colours*. Nature. III. S. 246 u. 307.
4386. J. J. MURPHY. *The sensation of colour*. Nature. IV. S. 27.
4387. J. J. OPPEL. *Ueber chromatische Täuschungen, den relativen Werth der Farbenbezeichnungen und das Zustandekommen unserer Farbenwahrnehmung überhaupt*. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1869/70. S. 96—105.
4388. J. W. STRUTT. *Colour*. Nature. IV. S. 142.
4389. M. WOINOW. *Zur Diagnose der Farbenblindheit*. Graefe's Arch. XVII. (2.) S. 241—248
- 1872.
4390. J. AITKEN. *On colour and colour sensation*. Proc. of the Roy. Scottish Soc. of Arts. 1871—1872.
4391. G. BRIESEWITZ. *Ueber das Farbensehen bei normalem und atrophischem Nervus opticus*. Inaug.-Diss. Greifswald.
4392. E. CHEVREUL. *Réponse aux allégations contenues dans un rapport de M. A. Gruyer sur l'Exposition internationale de Londres à propos des tapisseries des Gobelins*. Compt. Rend. LXXV. S. 902 u. 993.



4393. DOR. *Ueber Farbenblindheit. Einwendung gegen die Young-Helmholtz'sche Theorie.* Sitzgs.-Ber. d. Bern. naturf. Ges. No. 792—811. S. 7—23.
4394. E. EMMERT. *Ueber die Farben und ihre Beziehungen zum menschlichen Auge.* Bern.
4395. HAYEZ. *Formules pour les lois de teinture. Numéros des nuances chevreuliennes liés aux doses d'agents générateurs.* Compt. Rend. LXXV. S. 1103. — Mond. (2.) XXIX. S. 466.
4396. JEAFFRESON. *Colour blindness in disease of brain and optical nerves.* Lancet. I. S. 601—670.
4397. R. LIEBREICH. *Turner and Mulready. — On the Effect of certain Faults of Vision on Painting, with especial Reference to their Works.* Roy. Inst. March 8. Nature. V. S. 404.
4398. — *Die Fehler des Auges bei Malern.* Der Naturforscher. No. 47.
4399. J. CL. MAXWELL. *Sur la vision des couleurs.* Mond. (2.) XXVII. S. 293—300 u. 439—446.
4400. W. PREYER. *Notiz über die violetteempfindenden Nerven.* Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 113.
4401. W. M. WILLIAMS. *Turner's Vision.* Nature. V. S. 500.
- 1878.
4402. ANNUSKE. *Farbenstörung als erstes Symptom von Sehnervenleiden.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 254.
4403. W. v. BEZOLD. *Ueber das Gesetz der Farbenmischung und die physiologischen Grundfarben.* Pogg. Ann. CL. S. 71 u. 221.
4404. A. FICK. *Zur Theorie der Farbenblindheit.* Verhandl. d. Physik.-Med. zu Würzburg. N. F. V. S. 129.
4405. HOECKER. *Ueber angeborene Farbenblindheit.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 1.
4406. TH. LEEER. *Ueber die Theorie der Farbenblindheit und über die Art und Weise, wie gewisse, der Untersuchung von Farbenblinden entnommene Einwände gegen die Young-Helmholtz'sche Theorie sich mit derselben vereinigen lassen.* Sitzgs.-Ber. d. Ophthalm. Ges. in Klin. Monatsbl. S. 467—473.
4407. R. LIEBREICH. *Farbenblindheit.* Ausland. S. 179.
4408. M. PONTON. *Colours and their relations.* Quart. Journ. of sc. S. 74—103.
4409. E. RAHELMAHN. *Beiträge zur Lehre vom Daltonismus und seiner Bedeutung für die Young'sche Farbentheorie.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 88—106.
4410. R. SCHIRMER. *Ueber erworbene und angeborene Anomalien des Farbensinnes.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (2.) S. 194—235. — Berlin. Klin. Wochenschr. No. 5.
4411. W. SCHÖN. *Ueber die Grenzen der Farbenempfindung in pathologischen Fällen.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 171.
4412. F. J. SMITH. *Mechanical Combination of Colours.* Nature. VIII. S. 262.
4413. TALMA. *Over licht en kleurperceptie.* Bijbl. 14<sup>de</sup> Versl. Nederl. Gasth. for ooglijden. S. 129. — Inaug. Diss.
- 1874.
4414. A. FAVRE. *Recherches cliniques sur le Daltonisme et de son traitement.* Lyon méd. No. 22.
4415. GUILLEMIN. *La lumière et les couleurs.* Paris, Hachette. 302 S.
4416. FR. HOLMGREN. *Theorie der Farbenblindheit, kritische Uebersicht mit Angabe des eigenen Standpunktes.* Upsala Läkaref. Förh. IX. S. 119—163, 187—202.
4417. — *Ueber Diagnostik und Theorie der angeborenen Farbenblindheit.* Nord. Med. Arch. VI. No. 24 u. 28.
4418. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Ueber die sogenannte Intensität der Lichtempfindung und über die Empfindung des Schwarzen.* Wien. Ber. (3.) LXIX. S. 85—106.
4419. LICZEY. *Daltonisme congénital.* Journ. méd. de Bruxelles. S. 327.
4420. REICH. *Farbenempfindung.* Klin. Monatsbl.
4421. H. SCHÖLER. *Bestimmung einer der drei Grundfarben des gesunden Auges.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 87.
4422. SCHÖN. *Zur Farbenempfindung.* Berl. klin. Wochenschr. No. 20.
4423. M. A. SPOTTISWOODE. *On combinations of colour by means of polarised light.* Proc. of the Roy. Soc. of London. XXII. S. 354—358.
4424. M. WOINOW. *Zur Farbenempfindung.* (Russisch.) Med. Rundsch. Moskau. I. u. II. Heft u. Moskau med. Bote. S. 292.
4425. — *Die farbenempfindenden Elemente der Netzhaut.* Moskau med. Rundsch. I.:

1875.

4426. S. EXNER. *Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse*. VI. Abh. *Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates*. Pflüger's Arch. XI. S. 581—602.
4427. A. FAVRE. *De la dyschromatopsie traumatique*. Lyon.
4428. — *Sur le traitement du Daltonisme*. Rev. Scientif. XIV. S. 237.
4429. E. LANDOLT. *Procédé pour déterminer la perception des couleurs*. Ann. d'Oculist. LXXIV. S. 74—75.
4430. H. MAGNUS. *Die Bedeutung des farbigen Lichtes für das gesunde und kranke Auge*. Leipzig.
4431. MOL. *Onderzoek op Kleurblindheid*. Nederl. Tijds. v. Geneesk. No. 7. S. 89.
4432. POUCHET. *Chromatische Function*. Ansländ. S. 103.
4433. E. RAHLMANN. *Ueber den Farbensinn bei Sehnervenerkrankungen*. Arch. f. Ophthalm. XXI. (2.) S. 27.
4434. H. RICCÒ. *Ueber Farbenwahrnehmung*. Atti della R. Acad. di Scienza di Modena.
4435. J. STILLING. *Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen*. Stuttgart. Zwei außerordentl. Beilageh. z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. Jahrg.
4436. TREITEL. *Ueber das Verhalten der peripheren und centralen Farbenperception bei atrophia nervi optici*. Inaug. Diss. Königsberg.
4437. K. VIERORDT. *Physiologische Spectralanalysen*. Zeitschr. f. Biol. X. 4. S. 399. XI. S. 187.
4438. WARLOMONT. *De la chromatopseudopsie*. Ann. d'Oculist. LXXIV. (11. Serie. IV.) S. 5—55.
4439. A. WEBER. *Prüfung von Farbenblindheit*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 486—488.
4440. M. WOINOW. *Beiträge zur Farbenlehre*. Arch. f. Ophthalm. XXI. 1. S. 223—250. 1876.
4441. S. BERT. *De la couleur verte*. Gaz. des Hôpit. S. 1174.
4442. T. BERTIER. *Du Daltonisme et de la dyschromatopsie acquise*. Paris.
4443. W. v. BEZOLD. *Eine neue Methode der Farbmischung*. Sitzgs.-Ber. d. Münch. Akad. 4. März.
4444. — *Ueber die Vergleichung von Pigmentfarben mit Spectralfarben*. Pogg. Ann. CLVIII. 1. S. 165—169.
4445. LAVAND DE L'ESTRADE. *Procédé simple de reconstitution des couleurs du spectre solaire au moyen d'un miroir tournant*. Rev. Scient. S. 523. — Les Mondes. XLII. S. 579.
4446. J. LOUDON. *Recomposition of the component colours of white light*. Philos. Mag. (5.) I. S. 170.
4447. NUEL. *E. Hering. Du sens de lumière*. Revue critique. Ann. d'Oculist. LXXVI. S. 54—69.
4448. J. J. OPPEL. *Zwei Farbentafeln zur Illustration der Farbenblindheit mit dazu gehörendem grünlischen Glas*. Cataloge of the Spec. Loan Coll. of Scient. Apparatus. London. I. S. 139. No. 969.
4449. E. RAHLMANN. *Ueber den Daltonismus und die Young'sche Farbentheorie*. Graefe's Arch. XXII. (1.) S. 29.
4450. H. RICCÒ. *Ueber die Farbenwahrnehmung*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 282—291.
4451. O. N. ROOD. *The constants of colour*. Quat. Journ. of sc. No. 52.
4452. J. STILLING. *Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen*. Aufserord. Beil.-Hefte z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIV. 1877.
4453. S. BERT. *De la couleur verte*. Gaz. méd. de Paris. S. 197. — Gaz. des hôpit. S. 286.
4454. A. CHODIN. *De l'influence de l'augmentation de la pression oculaire sur la perception des couleurs*. Ann. d'Oculist. LXXVIII. S. 1—29.
4455. — *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Lichtstärke*. Samml. physiol. Abhandl. v. Preyer. VII. 66 S. Jena, Dufft.
4456. F. C. DONDERS. *Die quantitative Bestimmung des Farbenunterscheidungsvermögens*. Arch. f. Ophthalm. XXIII. 4. S. 282—291.
4457. A. FAVRE. *Du traitement du Daltonisme dans les écoles*. Lyon.

4458. A. FAVRE. *Recherches cliniques sur le Daltonisme*. Gaz. hebdom. S. 650—652.
4459. H. GRASSMANN. *Bemerkungen zur Theorie der Farbenempfindungen*. Anhang zu: Preyer, Elemente der reinen Empfindungslehre. Samml. physiol. Abhandl. I. 10. S. 84—93.
4460. G. JAEGER. *Einiges über Farben und Farbensinn*. Kosmos. I.
4461. TH. LEBER. *Die Störungen des Farbensinnes*. Handb. d. Augenheilkde. v. Graefe u. Sämisch. V. 2. S. 1017—1044.
4462. E. REGÉCZY. *Ueber Farbenwahrnehmung*. (Ungarisch.) Orvosi Hetilap. No. 23.
4463. J. STILLING. *Ueber Prüfung des Farbensinnes*. Beil. z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 168—173. — Beil. z. Septemberheft d. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 28.
4464. G. G. STOKES. *The absorption of light and the colours of natural bodies*. London, Mc. Millan & Co.
4465. A. WEINHOLD. *Ueber Farbenwahrnehmung*. Pogg. Ann. No. 12. S. 631—658.
4466. *Colour-Blindness*. Brit. med. Journ. No. 836.
4467. *Farbenkreis in 15 Abstufungen und 20 Anwendungstafeln, und zwar Complemente und Triaden*. Nach Prof. Dr. E. Brücke's Physiologie der Farben und unter dessen persönlicher Anleitung zusammengestellt. Wien. 1878.
4468. E. BRÜCKE. *Ueber einige Empfindungen im Gebiete des Sehnerven*. Wien. Ber. Bd. 77. Abth. 3.
4469. A. CHARPENTIER. *Sur la production de la sensation lumineuse*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 1341—1344. Gaz. Méd. de Paris. No. 24. S. 291.
4470. — *Sur la distinction entre les sensations lumineuses et les sensations chromatiques*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 1272—1274. — Gaz. Méd. de Paris. No. 23. S. 281.
4471. — *Les sensations lumineuses et les sensations chromatiques*. Arch. génér. Jan. S. 118.
4472. E. CHEVREUL. *Deux notes sur la vision des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 854—858 u. 985—991.
4473. — *Observations à propos des recherches de M. Rosenstiehl, sur le noir absolu et le noir idéal*. Compt. Rend. Bd. 87. S. 129.
4474. A. CHODIN. *Ueber den Einfluß der Verstärkung des intraoculären Drucks auf die Farbenempfindungen*. Milit.-med. Journ. Juni.
4475. H. COHN. *Beobachtungen an 100 Farbenblinden*. Ber. üb. d. Stzg. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 110—120. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. Beil. z. Augustheft.
4476. CH. CROS. *Sur une observation de couleurs complémentaires*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 983.
4477. M. J. DELBOEUF. *Rapport sur les questions relatives au Daltonisme intéressant les administrations du chemin de fer*. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. XLV. No. 4.
4478. J. DELBOEUF und W. SPRING. *Recherches expérimentales théoriques sur le Daltonisme*. Rev. Scient. 2. VII. No. 38. S. 889—892 u. 901—904.
4479. — *Moyen de produire et de corriger le Daltonisme*. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique XLV. No. 1.
4480. F. C. DONDERS. *La détermination numérique du pouvoir de distinguer les couleurs*. Arch. d'Ophthalm. 11. IX. S. 275—183.
4481. — *Over dichromatische stelsels*. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk. 28. Dec. 1878.
4482. DOR und FAVRE. *Nouvelles recherches sur la détermination quantitative de la vision chromatique*. Lyon méd. 7. u. 14. April. — Lyon, Assoc. typogr. 16 S.
4483. E. DREHER. *Beitrag zur Theorie der Farbenwahrnehmung*. Berlin, Hempel. 87 S.
4484. FAVRE. *Daltonisme*. Arch. génér.
4485. — *Sur le daltonisme, précautions sanitaires et moyens préventifs*. Compt. Rend. LXXXVI. S. 1377.
4486. A. E. FICK. *Eine Notiz über Farbenempfindung*. Pflüger's Arch. f. Physiol. XVII. S. 152—153.
4487. G. STANLEY HALL. *The perception of color*. Proc. of the Americ. Acad. of Arts and Sc. XIII. — Boston Med. and Surg. Journ. S. 475—477.
4488. J. HENRY. *Color-Blindness*. Rep. Smithson Inst. S. 196—200.

4489. HJORT. *Om Farveblindhed*. Norsk. Mag. for Lægevid. 3. R. VIII. 3. Forh. S. 27—29.
4490. FR. HOLMGREN. *Einige neuere praktische Methoden zur Entdeckung der Farbenblindheit*. Upsala Läkaref. Förh. XIII. S. 193—226.
4491. — *Ueber den farbigen Schatten und die Farbenblindheiten*. Upsala Läkaref. Förh. XIII. S. 456—565.
4492. E. JAVAL. *Correction du Daltonisme*. Gaz. des Hôpit. No. 54. S. 430. — Progr. Méd. No. 18. S. 340.
4493. J. JEFFRIES. *Dangers from Color Blindness in railroad employes and pilots*. Boston, Rand, Avery & Co.
4494. — *Incurability of congenital color-blindness*. The Boston Med. and Surg. Journ. March 28.
4495. — *Color-Blindness. A lecture*. Boston daily Advertiser.
4496. D. KITAO. *Zur Farbenlehre*. Inaug.-Diss. Göttingen.
4497. J. V. KRIES. *Beitrag zur Physiologie der Gesichtsempfindungen*. du Bois' Arch. f. Physiol. 1878. S. 503—524.
4498. E. LANDOLT u. A. CHARPENTIER. *Des sensations de lumière et de couleurs dans la vision directe et dans la vision indirecte*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 495—497. — Gaz. Méd. de Paris. No. 10. S. 120.
4499. A. LEDERER. *Ueber Farbenblindheit*. Gesundheit. III. S. 22.
4500. H. MAGNUS. *Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Farbenblindheit*. Arch. f. Ophthalm. XXIV. (4.) S. 171—236.
4501. — *Die Farbenblindheit, ihr Wesen und ihre Bedeutung*. Breslau, J. U. Kern. 60 S.
4502. — *Die Farbenblindheit*. Nord u. Süd. Dec. VII. (18.) S. 235—245.
4503. — *Neuere zur Theorie und Praxis der Farbenblindheit*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 20.
4504. H. MAGNUS, H. COHN u. JACOBI. *Ueber Farbenblindheit*. Bresl. Ztg. No. 59. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 56—58 u. 82—86.
4505. F. MINDER. *Beitrag zur Lehre von der Farbenblindheit*. Inaug.-Diss. Bern, Stämpfli.
4506. NUËL. *L'amblyopie alcoolique et le Daltonisme*. Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belgique. (3.) XII. No. 7. S. 686—701. — Ann. d'Oculist. LXXX. No. 3 u. 4.
4507. O. RADDE. *Internationale Farbenscala. 42 Gammen mit 882 constanten Tönen*. Hamburg-Paris, Steno-chrom. Anst. v. Radde.
4508. ROSENSTIEHL. *De l'emploi des disques rotatifs pour l'étude des sensations colorées; de l'harmonie des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 86. S. 343.
4509. — *Assortiment des couleurs*. Soc. d'encourag. p. l'industr. nat. V. 24. 12 S.
4510. — *Définition et classification des couleurs*. Assoc. franz. p. l'avanc. d. sc. 29. VIII. 12 S.
4511. J. STILLING. *Ueber Farbensinn und Farbenblindheit*. Cassel, Fischer. 34 S.
4512. A. WEBER. *Ueber Prüfung des Farbensinnes*. Ber. d. Vers. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 180—182. — Beil. z. Augusth. d. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 38—40. 1879.
513. J. AITKEN. *Colour-Blindness*. Nature. No. 522. — Journ. anat. and phys. XIII. S. 322.
514. BATUT. *De la chromatopséopsie*. Thèse de Paris.
515. G. A. BERRY. *Remarks on the Examination and Classification of Cases of Colour-Blindness*. Edinb. Med. Journ. Bd. 292. S. 305.
516. BRIBOSIA. *Rapport sur les communications de M. Möller, relatives au daltonisme*. Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belgique. (3.) XIII. 2. S. 208—228.
17. H. F. BROWN und J. HEROU. *Verhalten des Auges zur Neutraltinte*. Ann. de Chimie. Bd. 199. S. 178.
18. E. BRÜCKE. *Ueber einige Konsequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie*. Wien. Ber. LXXX. (3.) 3. Juli.
19. CAMERON. *Colour-Blindness*. Dublin. Journ. Sept.
20. C. CHEVREUL. *La vision des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 88. S. 929—940. Rev. Scient. No. 47.
21. CINTOLESI. *Intorno alle immagini accidentali o suggestive*. Ann. d'Ottalm. VIII. 2/3. — Nature. XXI. 21. — Beibl. d. Phys. III. S. 711.
22. H. COHN. *Studien über angeborene Farbenblindheit*. Breslau, E. Morgenstern.
23. — *Einige Bemerkungen über Herrn Dr. Magnus' Aufsatz über Farbenblindheit*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXV. 1. S. 341.

4524. H. COHN. *Quantitative Farbensinnbestimmungen.* Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 84.
4525. — *Zur Abwehr (gegen Magnus: Ueber Farbenblindheit).* Beil. z. Centralbl. f. Augenheilkde. III. October.
4526. — *Die Arbeiten des Herrn Prof. Holmgren über Farbenblindheit und seine Kampfweise.* Breslau, Morgenstern.
4527. — *Farbensinn-Messungen im directen Sonnenlicht und bei electricischem Licht.* 12. Verh. d. Ophthalm. Ges. Ber. S. 6—9. — Arch. f. Augenheilkde. IX. 2. (1880.)
4528. — *Ueber angeborene und erworbene Farbenblindheit.* Bresl. ärztl. Zeitschr. I. No. 6.
4529. H. COURSSERANT. *Sur l'emploi méthodique des verres de couleurs dans l'achromatopsie.* Acad. des sc. 21. April. — Gaz. méd. No. 19.
4530. CH. CROS. *Les couleurs, le chromomètre et la photographie des couleurs.* Journ. de phys. VIII. S. 233—236.
4531. — *Sur la classification des couleurs.* Compt. Rend. Bd. 88. S. 119—122.
4532. A. DAAE. *Die Farbenblindheit und deren Erkennung.* Deutsch von M. Säger. Berlin, Dörfel & Hirschwald.
4533. — *Ueber Farbenblindheit.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 1.
4534. F. C. DONDEERS. *Sur les systèmes de couleurs.* Congr. intern. des sc. méd. à Amsterdam. Section de Biologie. Sept.
4535. — *Des systèmes dichromatiques.* Ann. d'Oculist. Bd. 81. S. 7—10.
4536. A. EMERY. *Proposito della dottrina del Acromatopsia.* Movimento I. S. 345.
4537. EVERETT. *Colour-vision and colour-Blindness.* Nature. No. 525.
4538. FAYRE. *Le traitement du daltonisme congénital par l'exercice, chez l'enfant et chez l'adulte.* Gaz. hebdm. No. 6 u. 7.
4539. GOVI. *Ueber Behandlung von Fehlern der Farbenwahrnehmung.* Nederl. Tijdschr. voor Genesk. XIV. 2.
4540. HALL. *On the perception of colour.* Proc. of the americ. acad. of arts and sc. III.
4541. FR. HOLMGREN. *Die Arbeiten des Herrn Professor Cohn über Farbenblindheit.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 538—589. (Auch separat erschienen.)
4542. B. J. JEFFRIES. *Color-Blindness: its dangers and its detection.* Boston, Houghton, Osgood & Co. 312 S.
4543. S. KALISCHER. *Die Farbenblindheit.* Berlin, Hempel.
4544. KEYSER. *Ueber Farbenblindheit.* Ztg. d. Ver. dtsch. Eisenb.-Verw. No. 48.
4545. J. v. KRIES und KÜSTER. *Ueber angeborene Farbenblindheit.* Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 513—524.
4546. LEDERER. *Zur Mechanik der Farbenwahrnehmung.* Kosmos. IV. S. 438—457.
4547. J. MACÉ DE LÉPINAY und W. NICATI. *Recherches sur le daltonisme.* Compt. Rend. Bd. 89. S. 716—719. — Gaz. méd. de Paris. No. 46.
4548. H. MAGNUS. *Die physiologische Farbenblindheit.* Ausland. No. 3. — Allg. Ztg. 26. Mai — N. Fr. Pr. No. 5175.
4549. — *Antwort auf die Arbeit des Herrn Professor Cohn: „Einige Bemerkungen u.s.w.“* Arch. f. Ophthalm. XXV. 2. S. 280—284.
4550. L. MAUTNER. *Die Prüfung des Farbensinnes.* Wiesbaden, Bergmann.
4551. — *Nomenclatur und Theorie der Farbenblindheit.* Wien. med. Wochenschr. No. 45. Wien. med. Pr. No. 46.
4552. MOELLER. *Du Daltonisme au point de vue théorique et pratique. Etude critique des méthodes d'exploration du sens chromatique.* Bruxelles, Manceaux. 146 S.
4553. NUEL. *Des altérations du sens chromatique.* Journ. d. sc. méd. de Louvain. IV. S. 152—163.
4554. — *Ueber die erworbenen Störungen des Farbensinnes.* Ann. d'Oculist. Bd. 82. S. 1—77. — Bull. de l'Acad. de Belgique. (3.) XIII. No. 3.
4555. E. NETOLICZKA. *Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit.* 28. Jahresber. d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.
4556. H. W. PAYL. *On Colour-Blindness.* Brit. med. Journ. 25. October.
4557. PICARD. *La cécité des couleurs.* Gaz. méd. No. 11.
4558. W. POLE. *Colour-Blindness.* Nature. No. 516.
4559. — *Hering's Theorie of the vision of light and colors.* Nature. No. 521—523.
4560. A. v. REUSS. *Ueber Farbenblindheit.* Wien. Klin. V. (3.) S. 65—100.
4561. RICCO. *Studio universale della percezione dei colori.* Giorn. d. malatt. d. occhi. I. (5/6.)

4562. O. N. ROOD. *Our memory for colour and luminosity*. U. S. Nat. Acad. of So. réunion d'oct. — Nature XXI. S. 144.
4563. SCHWARTZ. *Effect of distance on appreciation of colour*. Proc. Amer. Acad. VII. S. 229.
4564. J. STILLING. *Ueber Farbenblindheit*. Ber. d. XII. Vers. d. Ophthalm. Ges. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. S. 176.
4565. — *Ueber das Sehen der Farbenblinden*. 91 S.
4566. — *Ueber den Stand der Farbenfrage*. Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 18—37.
4567. H. R. SWANZY. *Colour-Blindness*. Brit. med. Journ. 4. Oct.
4568. J. TALKO. *Untersuchungen über Farbenblindheit*. (Russisch.) Medycyna, Warszawa. VII. S. 247, 264 u. 278.
4569. TENNANT. *Colour-Blindness*. Nature. No. 528.
4570. B. J. R. WOLFE. *On Colour-sight and Colour-blindness*. London, Churchill. — Lancet, II. No. 1. S. 23. — Med. Times. No. 1501—1503. 1880.
4571. O. BERGER. *Hypnotische Farbenblindheit*. Breslauer ärztl. Zeitschr. No. 10—12.
4572. C. A. BUCKLIN. *On the effects of distance on color*. New-York med. Rec. XVII. S. 199.
4573. A. CHARPENTIER. *Le sens de la lumière et le sens des couleurs*. Prog. méd. No. 84. Arch. d'ophthalm. I.
4574. — *Sur la quantité de lumière nécessaire pour percevoir la couleur d'objets de différentes surfaces*. Compt. Rend. T. 92. S. 92.
4575. E. CHEVREUL. *Sur la vision des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 91. (1.) S. 16.
4576. H. COHN. *Das Verschwinden der Farbenblindheit beim Erwärmen eines Auges*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 16. — Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 8.
4577. — *Ueber hypnotische Farbenblindheit mit Accommodationskrampf und über Methoden, um das Auge zu hypnotisieren*. Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 6.
4578. DANILOW. *Zur Frage der Anomalie des Farbensinnes*. Diss. Petersburg. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 281.
4579. F. C. DONDEES. *Remarques sur les couleurs et la cécité des couleurs*. Arch. d'ophthalm. LXXXIV. S. 205—216. — Brit. med. Journ. No. 13.
4580. E. DREHER. *Beiträge zur Theorie der Farbewahrnehmung*. In: *Beitr. zu einer exacten Psycho-Physiologie*. Halle. S. 69—91.
4581. — *Theorie der Farbewahrnehmung*. Die Natur (N. F.) VI. No. 21. 25. 29.
4582. FAYRE. *Sur le Daltonisme*. Acad. de méd. 10. Aug. — Arch. génér. Sept.
4583. — *Mémoire sur la dyschromatopsie*. Rev. méd. No. 38.
4584. A. FICK. *Ueber die Farbenempfindungen*. Dtsch. Rundsch. April.
4585. GROSSMANN. *Ueber die Messung der Schärfe des Farbensinnes*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Bd. IV. S. 298.
4586. R. GÜNTHER. *Der Farbensinn, sein Wesen und seine Entwicklung*. Diss. München.
4587. R. HAIDENHAIN. *Zur Kritik hypnotischer Vorgänge*. Bresl. ärztl. Zeitschr. 13. März.
4588. R. HAIDENHAIN u. GRÜTZNER. *Halbseitiger Hypnotismus, hypnotische Aphasie, Farbenblindheit und Mangel des Farbensinnes bei Hypnotischen*. Bresl. ärztl. Zeitschr. Febr.
4589. J. F. HEAD. *Control of Color-Blindness*. New-York med. Rec. XVII. S. 496.
4590. E. HERING. *Zur Erklärung der Farbenblindheit aus der Theorie der Gegenfarben*. Lotos. N. F. Bd. I. Auch separat. Prag 1880.
4591. F. HOLMGREN. *Wie die Farbenblinden die Farben sehen*. Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 69—75.
4592. — *Ueber die subjective Farbenempfindung der Farbenblinden*. Centralbl. f. d. med. Wiss. Berlin. No. 49. S. 898—900 u. No. 50. S. 913—916.
4593. HORSTMANN. *Ueber Farbenblindheit*. Dtsch. med. Wochenschr. VI. No. 44.
4594. S. KALISCHER. *Die Farbenblindheit in theoretischer und praktischer Hinsicht*. Gaea. XVI. (3.)
4595. W. KRENCHEL. *Ueber die Hypothesen von Grundfarben*. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.) S. 91.
4596. W. MANZ. *Einige Wirkungen der Fuchsingläser*. Ber. d. Sect. f. Ophthalm. d. Naturf. Vers. zu Baden-Baden. 19.—24. Sept.
4597. G. MARI. *L'Aberrazione nella visione dei colori*. Piacenza.
4598. E. J. MELLBERG. *Ueber Farbenblindheit*. Nord. med. ark. XII. (4.) No. 24.
4599. MORANO. *Intorno ai lavori piu recenti sul Daltonismo*. Giorn. di Ottalm. April.

4600. E. NETOLICZKA. *Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit*. Graz. XXIX. Jahresber. d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule.
4601. M. PRSCHL. *Experimentelle Untersuchungen über die Adaptation der Netzhaut für Farben*. Pflüger's Arch. XXI. S. 405.
4602. O. N. ROOD. *Effects produced by mixing white with colored light*. Sillim. Journ. (3.) XX. S. 81.
4603. — *Newton's use of the term Indigo with reference to colour of the Spectrum*. Sillim. Journ. (3.) XIX. S. 135—137.
4604. R. RUCK. *Sur le sens des couleurs*. Rev. mens. de méd. et de chir. IV. S. 500—504.
4605. R. SCHIRMER. *Farbenblindheit*. Eulenburg's Real-Encyklopädie d. ges. Heilkde V. S. 209—220.
4606. SCHNELLER. *Ueber den Sitz der Farbenempfindung*. Dtsch. med. Wochenschr. No. 42. Tagebl. d. Ver. d. Naturf. u. Aerzte in Danzig. Ophthalm. Sect. S. 108 u. 254.
4607. J. STILLING. *Ueber das Sehen der Farbenblinden*. Zehender's Mtsbl. S. 481. Centralbl. f. Augenheilkde. October.
4608. WOLFE. *Control of Color-Blindness*. Boston evening transcript. No. 16. 1881.
4609. E. W. BARTLETT. *Color-blindness*. Rep. Bd. Health Wisconsin. — Madison. 1882 VI. (2.) S. 16.
4610. BANNISTER. *On some points in regard to color-blindness*. Journ. of nerv. and ment. disease. VIII. (6.)
4611. J. BJERRUM. *Hemianopsie für Farben*. Hosp. Tid. (2 R.) VIII. (3.) S. 41 Schmidt's med. Jahrb. XXXI. S. 167.
4612. BRAILEY. *Report on Colour-Blindness*. Transact. of Ophthalm. Soc. of the U. K. I. S. 191. — Brit. med. Journ. 23. April.
4613. E. v. BRÜCKE. *Ueber einige Konsequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie*. 2. Abh. Wien. akad. Ber. Bd. 84. (3.) S. 425—458.
4614. OLE. B. BULL. *Studien über Lichtsinn und Farbensinn*. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 54.
4615. S. M. BURNETT. *Color-Perception and Color-Blindness*. Arch. of Ophthalm. I. No. 1.
4616. G. COUTURIER. *Des sensations colorées*. Thèse de Paris.
4617. F. C. DONDERS. *Ueber Farbensysteme*. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 155—223 — Arch. néerl. XVI. (2.) S. 150—214. — Ann. d'Oculist. Bd. 86. S. 109—144 u. 197—220. — XXII. versl. v. het Ned. Gasth. v. Ooglijd. S. 1—72. — Utrecht'sche Onderzoek. (3.) VI. (1.) S. 79—151.
4618. DOR. *De l'état actuel de nos connaissances sur le daltonisme*. Compt. Rend. de VI. congr. internat. d'ophthalm. in Mailand. S. 179.
4619. O. E. DE FONTENAY. *Ueber Anomalien des Farbenseinnes*. Hosp. Tid. (2. R.) VIII. S. 29 bis 36.
4620. E. v. FLEISCHL. *Ueber die Theorien der Farbenwahrnehmung*. Sitzgs.-Ber. d. Ges. d. Aerzte zu Wien. S. 742. — Wien. med. Wochenschr. No. 25. — Wien. med. Blätter. IV. No. 24. — Wien. med. Jahrb. 1882. S. 73. — Biol. Centralbl. Bd. I. S. 499.
4621. GALEZOWSKI. *Dyschromatopsie pathologique et ses différentes variétés*. Gaz. méd. de Paris. No. 23. S. 333. — Soc. de Biol. Mai 21.
4422. — *Achromatopsie des alcooliques*. Progrès méd. No. 23. S. 440.
4623. A. GEISSLER. *Ueber Farbenblindheit*. Schmidt's Jahrb. d. ges. Med. Bd. 191. S. 73—112.
4624. GILLET DE GRANDMONT. *Sur un procédé expérimental pour la détermination de la sensibilité de la rétine aux impressions lumineuses colorées*. Compt. Rend. Bd. 92 No. 21. S. 1189. Gaz. méd. de Paris. No. 23. S. 329. Franç. méd. 64. Journ. de thérap. 11.
4625. GIRAUD-TEULON. *Des aberrations du sens chromatique ou du daltonisme*. Arch. génér. de méd. No. 1. S. 52—72. No. 2. S. 176—198.
4626. v. HASNER. *Ueber Farbensehen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar. S. 1.
4627. H. HELMHOLTZ. *Vorbemerkung zu einer nachgelassenen Abhandlung von Franz Boll: Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung*. du Bois-Reymond's Arch. Jahrg. 1881. S. 1—3.
4628. FR. HOLMGREN. *How do the colourblind see the different colours?* Proceed. of the London Roy. Soc. No. 209.

4629. FR. HOLMGREN. *Comment les aveugles pour les couleurs voient les couleurs.* Upsala Läkaref. Förh. XVI. Beil. zu Heft 2/3. S. I—VIII.
4630. — *Om ensidig färgblindhet.* Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 145—146.
4631. — *Fall af ensidig violettblindhet.* Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 563.
4632. JAEGER. *Die Farbenblindheit nach anderer Art beleuchtet.* Die Natur. No. 15.
4633. B. J. JEFFRIES. *A peculiar expression of the eyes of the color-blind.* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. XVII. meeting. New-York. S. 208—211. — Transact. of the internat. med. Congr. VII. Sess. London. III. S. 121.
4634. — *On some points in regard to color-blindness.* Journ. of nerv. and ment. disease. VIII. (3.)
4635. A. DE KEERSMAECKER. *Le daltonisme et les altérations du sens visuel.* Brüsels, Manceaux. Paris, Delahaye.
4636. B. KOLBE. *Geometrische Darstellung der Farbenblindheit.* Petersburg, Kranz.
4637. J. v. KRIES u. M. v. FREY. *Ueber die Mischung der Spectralfarben.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 336—353.
4638. J. MACÉ DE LÉPINAY u. W. NICATI. *Explication du symptôme héméralopie. (Daltonisme accidentel bleu.)* Rec. des act. du comité méd. d. Bouches-du-Rhône. Mai-Juli.
4639. L. MAUTNER. *Ueber das Wesen und die Bestimmung der Farbenblindheit.* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Colleg. VII. (1./2.)
4640. W. PREYER. *Ueber den Farben- und Temperatursinn mit besonderer Rücksicht auf Farbenblindheit.* Pflüger's Arch. Bd. 25. S. 81—100. (Auch separat. Bonn).
4641. — *Zur Theorie der Farbenblindheit.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 1.
4642. RAYLEIGH. *Experiments on Colour.* Nature. No. 24. S. 264.
4643. A. RENÉ. *De la cécité des couleurs.* Gaz. des hôp. No. 4 u. 5.
4644. A. ROSENSTIEHL. *Détermination des couleurs, qui correspondent aux sensations fondamentales à l'aide des disques rotatifs.* Compt. Rend. Bd. 92. S. 244—247.
4645. — *Détermination de la distance angulaire des couleurs.* Compt. Rend. Bd. 93. S. 207—210.
4646. — *Discussion de la théorie des trois sensations colorées fondamentales.* Compt. Rend. Bd. 92. S. 1286—1289.
4647. — *Détermination des sensations colorées fondamentales, par l'étude de la répartition des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique.* Compt. Rend. XCII. S. 244.
4648. P. SCHUBERT. *Ueber Farbenempfindung und Farbenblindheit.* Corresp. von u. für Deutschland. No. 463. 470. 474. 481.
4649. SCHUSTER. *Die Farbenblindheit.* Verh. u. Mitth. d. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt. XXXI.
4650. F. SMITH. *Apparent decomposition of sunlight by intermittent reflecting surfaces.* Nature. XXIV. S. 141.
4651. A. W. SOWARD. *Note on the recombination of the spectral colours by a second prism reversed.* Chem. News. 44. S. 267.
4652. Ph. STEFFAN. *Beitrag zur Pathologie des Farbensinnes.* Arch. f. Ophthalm. XXVII. (2.) S. 1.
4653. SZILÁGYI. *Ueber monoculares Mischen der Farben.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 28. S. 513.
4654. VOGT. *Ueber Farbenempfindung und Farbenbezeichnung.* Die Natur. No. 8. 1882.
4655. E. ALBERT. *Ueber die Aenderungen des Farbentones von Spectralfarben und Pigmenten bei abnehmender Lichtstärke.* Wiedemann's Ann. XVI. S. 129.
4656. BAYER. *Ueber erworbene Farbenblindheit.* Prag. med. Wochenschr. No. 4. u. 5.
4657. N. E. BRILL. *Color-blindness from a cerebral lesion.* Chicago. Med. Rev. V. S. 162.
4658. J. S. BURNETT. *Color-blindness and color-perception.* Pop. Sc. Month. New-York. XXI. S. 86.
4659. E. CHEVREUL. *Recherches relatives à la vision des couleurs.* Compt. Rend. Bd. 95. No. 21. S. 1086.
4660. CROSS. *Complementary colours.* Nature. XXVII. S. 150.
4661. F. C. DONDER. *Explications sur les systèmes chromatiques.* Ann. d'ocul. Bd. 87. S. 205.
4662. — *Neue Untersuchungen über Farbensysteme.* Onderzoek. i. Labor. d. Utrecht. Hoogesch. Derde. Reeks. VII. S. 95.
4663. E. v. FLEISCHL. *Ueber die Theorien der Farbewahrnehmung.* Wien. med. Jahrb. S. 73.



4664. GAMALOBO. *Cécité des couleurs*. Rec. d'Ophthalm. S. 513.
4665. A. GEISSLER. *Die Farbenblindheit, ihre Prüfungsmethoden und ihre praktische Bedeutung*. Leipzig.
4666. GIRAUD-TEULON. *Physiologie de la vision*. Bull. acad. de Méd. (2.) XI. S. 1220.
4667. — *Théorie des sensations colorées*. Bull. Acad. de Méd. (2.) XI. No. 43.
4668. G. DE GRANDMONT. *De la vision des couleurs*. Bull. de la soc. de méd. légale. Ann. d'Hyg. Juli.
4669. J. B. HANNAY. *Colour Perception*. Nature. XXV. S. 604.
4670. E. HERING. *Kritik einer Abhandlung von Donders: „Ueber Farbensysteme“*. Jahrb. „Lotos“. II. Prag. 33 S.
4671. HOE. *Eigenempfindungen über Farbenempfindungen*. Ber. d. naturf. Ges. in Bamberg. XII. S. 31–34.
4672. R. HILBERT. *Das Verhalten der Farbenblinden gegenüber den Erscheinungen der Fluorescenz*. Königsberg, Hartung.
4673. — *Farbenblindheit*. Schrift. d. physiol.-ökonom. Ges. in Königsberg. XXIII. S. 10.
4674. HORSTMANN. *Farbensinn und Farbenblindheit*. Dtsch. med. Wochenschr. S. 99, 113. 126.
4675. B. J. JEFFRIES. *Color-names, Color-blindness and the education of the color-sense in our schools*. „Education“. March.
4676. A. B. KIBBE. *Colour - Blindness*. Rocky Mountain. M. Times. Denver. I. S. 379.
4677. J. KRÄMER. *Untersuchungen über die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Art und dem Grade der Beleuchtung*. Diss. Marburg.
4678. W. KROLL. *Ueber die günstigen Erfolge der Ausbildung des Farbensinnes*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. December.
4679. MACGOWAN. *Color-blindness*. Lancet. I. S. 77.
4680. J. L. MINOR. *Central color-scotoma*. Americ. Journ. of the med. Sc. April.
4681. OLIVER. *Color-blindness*. Philad. med. Times. XII. S. 212.
4682. — *Preliminary paper on the determination of a standard of color-sense for reflected colour by daylight*. Arch. f. Ophthalm. XI. No. 1.
4683. RAYLEIGH. *Experiments on colour*. Nature. XXV. S. 64.
4684. C. ROBERTS. *Colour-blindness as a racial character*. Lancet. I. S. 124.
4685. W. ROSENBERG. *Einfaches Mittel, das Entstehen von Weiß bei Mischung complementärer Farben zu demonstrieren*. Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. XIV. S. 545.
4686. A. ROSENSTIEHL. *Recherches sur les lois de la vision des couleurs*. Bull. de la Soc. industr. de Mulhouse, séance du 28 sept. 1881.
4687. — *De la sensation du blanc et des couleurs complémentaires*. Compt. Rend. Bd. 95. No. 25. S. 1275 u. 1295.
4688. R. SCHELSKE. *Versuche über Farbenmischungen*. Wiedemann's Ann. XVI. S. 349.
4689. SCHNELLER. *Zur Frage vom Farbensinncentrum*. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 73.
4690. P. SCHUBERT. *Ueber Farbenempfindung und Farbenblindheit*. Corresp. von u. für Deutschland. No. 111, 117, 126, 137. 139.
4691. SMITH. *Colour Perception*. Nature. XXVI. S. 30.
4692. J. STILLING. *Einige Bemerkungen über Farbenprüfung*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. S. 35.
4693. SWAN. *Perception of Colour*. Nature. XXVI. S. 246.
4694. A. J. VAN DER WEYDE. *Die Systeme der Farbenblinden*. Arch. f. Ophth. XXVIII. (2.) S. 1.
4695. — *Methodisch onderzoek der kleurstelsels van kleurblinden*. Diss. Utrecht.
4696. WHITMELL. *A natural experiment on complementary colours*. Nature. XXVI. S. 573. 1888.
4697. OLE BULL. *Bemerkungen über den Farbensinn unter verschiedenen physiologischen und pathologischen Verhältnissen*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 71.
4698. CARPENTER. *Color-blindness*. Cincin. Lancet. and Clin. n. s. XI. S. 362 u. 372.
4699. A. CHARPENTIER. *Perceptions des couleurs à la périphérie de la rétine*. Arch. d'Ophthalm. III. S. 12.
4700. — *La perception des couleurs et la perception des différences de clarté*. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1079.
4701. — *La perception des couleurs et la perception de formes*. Compt. Rend. Bd. 96. S. 858 u. 1079.

4702. A. CHARPENTIER. *La perception du blanc et des couleurs complexes.* Compt. Rend. Bd. 96. S. 1239.
4703. E. CHEVREUL. *Considérations générales sur les méthodes scientifiques et applications à la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori de Leibnitz.* Compt. Rend. Bd. 96. S. 1521—1545.
4704. CSAPODI. *Egy adat a színlátásnak a tárgylátástól való függetlenségéhez.* (Zur Lehre der Unabhängigkeit des Farbensehens vom Objectsehen.) Szemészet. No. 3.
4705. H. R. DROOP. *On Colour Sensation.* Philos. Mag. (5.) XV. S. 373—384. — London phys. Soc. V. S. 217—230.
4706. F. C. DONDEERS. *Kleurvergelijkingen.* Utrecht. Onderzoek. (3.) VIII. S. 170.
4707. — *Ueber Farbengleichungen.* Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg S. 164.
4708. — *Nog eens: De Kleurstelsels naar aanleiding van Hering's Kritiek.* Utrecht. 126 S.
4709. TH. ENGELMANN. *Couleur et assimilation.* Arch. néerl. des sc. exact. et natur. XVIII. S. 29.
4710. GRAHAM. *A novel experiment in complementary colours.* Nature. XXVII. S. 294.
4711. A. GAYET. *Du daltonisme.* Gaz. hebdomadaire des sc. méd. de Bordeaux. 7. Januar.
4712. GIRAUD - TEULON. *Considerations on the doctrine of the three fundamental fibres of Young as the basis of a theory of the sensation of colour.* Monit. sc. Quesneville. Februar.
4713. — *Physiologie de la sensibilité chromatique.* Bull. Acad. de méd. Paris. (2.) XII. S. 524.
4714. GOVI. *Modo per ottenere la sensazione del bianco colla rotazione rapida di uno spettro circolare.* Atti. R. dei Lincei. (8.) Trans. VII. S. 164—167.
4715. R. HILBERT. *Die Young - Helmholtz'sche und die Hering'sche Farbentheorie.* Humboldt. II. (8.)
4716. B. J. JEFFRIES. *Colour-Blindness: Its dangers and its detection.* New ed. Boston.
4717. A. KÖNIG. *Ueber den neutralen Punkt im Spectrum der Farbenblinden.* Verh. d. physik. Ges. in Berlin. 2. März. u. 16. Nov.
4718. — *Ueber den Ort der Schnittpunkte der Intensitätscurven für die drei Grundempfindungen im normalen Auge.* Verhandl. d. Physik. Ges. Berlin. 2. März.
4719. A. LAURENT. *Du daltonisme, étiologie, fréquence, dangers.* Thèse de Paris.
4720. J. MOUTIER. *Ueber die Mischung der Farben.* Bull. soc. philomat. (7.) VII. — Rep. d. Phys. XIX. S. 672—674.
4721. TH. PETRUSCHEFFSKY. *Ueber die mittlere Farbe (oder den Ton) einer vielfarbigen Oberfläche.* Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. XV. S. 118—122.
4722. A. ROSENSTIEHL. *Définition des couleurs complémentaires.* Journ. de phys. (2.) II. S. 120—123.
4723. — *De la sensation du blanc et des couleurs complémentaires.* Rev. clin. d'Ocul. IV. (1).
4724. H. SCHEFFLER. *Die Theorie des Lichtes, physikalisch und physiologisch, mit specieller Begründung der Farbenblindheit.* Leipzig. 161 S.
4725. SEGGER. *Untersuchungen auf Farbenblindheit und Pupillendistanz.* Festschr. d. ärztl. Ver. München.
4726. J. STILLING. *Ueber das Sehen der Farbenblinden.*  
1884.
4727. AUGSTEIN. *Ueber Störung des Farbensinnes bei Neuritis.* Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 347.
4728. BICKERTON. *Case of colour-blindness.* Liverpool. med.-chir. Journ. IV. S. 421. — Brit. med. Journ. I. S. 225.
4729. L. BORTHEN. *La perception visuelle, spécialement par rapport au sens des couleurs, expliquée par mouvement moléculaire.* Compt. rend. de la 8<sup>me</sup> sess. du Congr. per. internat. des sc. méd. Copenhague.
4730. O. B. BULL. *Farvesans.* Nord. med. Ark. Stockholm. XV. No. 24. S. 1.
4731. S. M. BURNETT. *Theories of colour perception.* Philadelphia. Americ. Journ. med. sc. Bd. 88. S. 70.
4732. — *Die Farbenempfindung und Farbenblindheit.* Arch. f. Augenheilkde. XII. (2/3.) S. 241.
4733. — *Are there separate centres for light-, form- and color-perception?* Arch. of Med. Vol. XII. No. 2. S. 97.
4734. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la perception différentielle des couleurs.* Arch. d'Ophthalm. S. 488.

4735. A. CHARPENTIER. *Nouvelles séries d'expériences sur la perception différentielle des couleurs*. Acad. de sc. 26. Mai. — Union méd. No. 79. S. 971.
4736. E. CHEVREUL. *De la vision de la couleur*. Gaz. hebdom. No. 1. S. 7.
4737. G. ST. CLAIR. *Spectrum colours, colour sensations and after images. Suggestions for extending the dynamical theory*. Proc. of the Birmingham. philos. Soc. IV. (1.) S. 116. Ophthalm. Rev. III. S. 97.
4738. F. C. DONDERS. *Equations de couleurs spectrales simples et de leur mélanges binaires dans les systèmes normaux (polychromatiques) et anormaux (dichromatiques)*. Arch. Néerl. XIX. S. 303—346.
4739. — *Farbengleichungen*. Du Bois-Reymond's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 518—552.
4740. — *Proeve eener genetische verklaring van den kleurzin*. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. XX. S. 69. 89.
4741. — *Noch einmal die Farbensysteme*. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 15.
4742. J. EICHLER. *122 Farbentafeln zur Farbenlehre*. 2. Aufl. Wien, Klinkhardt.
4743. FANO. *Etat de faculté chromatique de l'oeil chez les sujets atteints d'amaurose*. Journ. d'Ocul. S. 131. 143.
4744. R. HILBERT. *Zur Kenntniss der pathologischen Farbenempfindungen. Ein Versuch einer Pathologie der Farbenempfindungen*. Betz' Memorabilien. XXIX. (9.) S. 526—540.
4745. — *Beiträge zur Kenntniss der Farbenblindheit*. Pflüger's Arch. XXXIII. S. 293.
4746. F. HOLMGREN. *Bidrag till en kritik af Hering's färgteori*. (Vorl. Mittheil.) Upsala Läkaref. Förh. XIX. S. 245.
4747. — *Beitrag zur Young-Helmholtz'schen Theorie der Farbenempfindung*. Verh. d. intern. med. Congr. zu Kopenhagen. 1884.
4748. JACOBSON. *Ueber die Abhängigkeit der Farbensinnstörungen von Krankheiten der Retina und des Nervus opticus*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. October.
4749. J. E. JOHANSSON. *Undersökning af färgsinnet i blinda fläckens närmaste omgivning*. Upsala Läkaref. Förh. XIX. S. 491.
4750. A. KÖNIG. *Ueber Farbensehen und Farbenblindheit*. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1884/85. No. 1.
4751. — *Zur Kenntniss dichromatischer Farbensysteme*. Wiedemann's Ann. XXII. S. 567.
- *Gräfe's Arch.* XXX. (2.) S. 155—170.
4752. — *Ueber die bisher gemachten Bestimmungen der Wellenlängen einfacher complementärer Farben*. Verh. d. physik. Ges. Berlin. 13. Juni.
4753. B. KOLBE. *Zur Analyse der Pigmentfarben*. Graefe's Arch. XXX. (2.) S. 1.
4754. — *Nachtrag zur „Analyse der Pigmentfarben“*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (4.) S. 313.
4755. — *Ueber die Nothwendigkeit der Bestimmung der Helligkeit der Pigmentfarben, welche bei Untersuchung des Farbenerkennungsvermögens benutzt werden*. Westnik ophthalm. Juni-October.
4756. F. KÜSTER. *Der Farbensinn ein höchst verfeinerter Temperatursinn*. Corr.-Bl. d. dtsh. Ges. f. Anthropol. München. XV. S. 4.
4757. E. MIÉVILLE. *Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux et chromatique*. Arch. d'ophthalm. März-April.
4758. OFFERT u. RAYLEIGH. *Colour-Blindness*. Engineering. XXXVIII. S. 41.
4759. H. PARINAUD. *De l'intensité lumineuse des couleurs spectrales; influence de l'adaptation rétinienne*. Compt. Rend. Bd. 99. S. 937.
4760. A. ROSENSTIEHL. *Colour*. Nature. XXXI. S. 58.
4761. C. B. STEMER. *Color-blindness*. Fort Wayne Journ. of med. sc. IV. S. 1.
4762. E. v. SZILAGYI. *Ueber Bestimmung der Einwirkungsenergie der Pigmentfarben*. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 17.
4763. T. TOMMASSI. *Le memoire locali e il Daltonismo*. Sperimentale. LIII. S. 64. 1885.
4764. W. R. AMICK. *Light and color*. Cincin. Lancet a. Clinic. XV. S. 61.
4765. W. v. BEZOLD. *Ueber Herstellung des Farbereiecks durch wahre Farbenmischung*. Münch. Ber. S. 305—324. — Wiedem. Ann. XXVI. S. 390—406.
4766. O. BULL. *Farvesenstabeller*. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania. S. 48.
4767. S. M. BURNETT. *Are there separate centres for light-, form- and color-perception?* Washington. Bull. Phil. Soc. VIII. S. 72.
4768. J. CHARPENTIER. *Définition, classification et notation des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 100. S. 808—810.

4769. J. CHARPENTIER. *Théorie de la perception des couleurs*. Compt. Rend. Bd. 101. S. 275—277.
4770. CUNNINGHAM. *On the Colour-sense*. Nature. XXXII. S. 604—605.
4771. W. DOBROWOLSKY. *Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen zu gleicher Zeit*. Pflüg. Arch. XXXV. S. 536—541.
4772. TH. GRAY. *Colour blindness*. London. 435 S.
4773. M. HEATON. *The Sense of Colour*. Nature. XXXII. S. 626.
4774. E. HERING. *Ueber individuelle Verschiedenheiten des Farbenses*. Lotos. N. F. VI.
4775. — *Bemerkungen zu A. König's Kritik einer Abhandlung über individuelle Verschiedenheiten des Farbenses*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 327—333.
4776. R. HILBERT. *Das Verhalten der Farbenblinden gegenüber der anomalen Dispersion*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 233.
4777. — *Die subjectiven Farben und die Hering'sche Farbentheorie*. Betz' Memorab. XXX. (2.) N. F. V. S. 65.
4778. — *Zur Physiologie der Retina*. Pflüg. Arch. XXXVII. S. 123—126.
4779. A. KÖNIG. *Ueber Farbensehen und Farbenblindheit*. du Bois' Arch. f. Physiol. S. 160.
4780. — *Ein Fall pathologisch entstandener Violett-Blindheit*. Verh. d. Berl. physik. Ges. IV. S. 65—69.
4781. — *Zur Kritik einer Abhandlung von Herrn E. Hering: Ueber individuelle Verschiedenheiten des Farbenses*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Sept. S. 260.
4782. B. KOLBE. *Zur Vergleichbarkeit der Pigmentfarbengleichungen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Juliheft. S. 193.
4783. J. v. KRIES und BRAUNCK. *Ueber einen Fundamentalsatz aus der Theorie der Gesichtsempfindungen*. Dubois' Arch. S. 79—84.
4784. A. LEHMANN. *Versuch einer Erklärung des Einflusses des Gesichtswinkels auf die Auffassung von Licht und Farbe bei directem Sehen*. Pflüger's Arch. XXXVI. S. 580—639.
4785. E. L. NICHOLS. *On the Sensitiveness of the Eye to Colors of a Low Degree of Saturation*. Silliman's Journ. (3.) XXX. S. 37—41.
4786. H. PARINAUD. *Sur l'existence de deux espèces de sensibilité à la lumière*. Compt. Rend. Bd. 101. S. 821.
4787. F. PETRUSCHESKY. *Ueber Farben bei künstlicher Beleuchtung*. Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. XVII. (Phys. Theil.) S. 35—42.
4788. C. ROBERTS. *The detection of colour-blindness and imperfect eyesight*. 2. Ausg. London.
4789. A. ROSENSTIEHL. *Recherches sur les couleurs*. Rev. Sc. XXXV. S. 765.
4790. *Colour-blindness in Germany*. Lancet. I. S. 140.
4791. *Colour-blindness*. Lancet. I. S. 764.
- 1886.
792. BICKERTON. *Colour-blindness*. Liverpool med.-chir. Journ. VI. S. 369.
793. — *Remarks on colour-blindness*. Lancet. II. S. 392.
794. E. A. BROWNE. *Painting by a colour-blind artist*. Transact. of the ophthalm. soc. of the unit. kingd. VI. S. 443. — Ophthalm. Rev. S. 111.
795. DEEREN. *Physiologie de la perception des couleurs*. Rec. d'Ophthalm. S. 129.
796. FAYRE. *Le pronostic du daltonisme*. Arch. d'Ophthalm. VI. S. 229.
797. R. FERET. *Essai d'application du calcul à l'étude des sensations colorées*. Compt. Rend. Bd. 102. S. 44—47.
798. — *Vérification expérimentale d'une nouvelle représentation géométrique des sensations colorées*. Compt. Rend. Bd. 102. S. 256—259.
799. A. E. FICK. *Einige Bemerkungen über Farbenempfindung*. Pflüger's Arch. XXXIX. S. 18—20.
800. P. GLAN. *Ein Grundgesetz der Complementärfarben*. Pflüger's Arch. XXXIX. S. 53—61. — Wien. Ber. XCII. S. 906—913.
301. E. HERING. *Ueber Newton's Gesetz der Farbenmischung*. Lotos, naturwiss. Jahrb. VII. S. 177. — Leipzig, Freytag. 92 S.
302. R. HILBERT. *Ueber die Erkenntheit der Farben bei herabgesetzter Beleuchtung*. Memorab. Heft 1.
303. — *Ueber Farbensehen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Febr. S. 43.

4804. R. HILBERT. *Beitrag zur Kenntniss der transitorischen Farbenblindheit*. Augenheilkde. XVI. S. 417.
4805. — *Zur Kenntniss der permanenten Lichtempfindung*. Memorab. Heft 4.
4806. A. KÖNIG und C. DIETERICI. *Die Grundempfindungen und ihre Intensitäten im Spectrum*. Sitzgs.-Ber. d. preuss. Acad. d. Wiss. in Berlin. 29. Juli.
4807. F. HOLMGREN. *Beitrag zur Young-Helmholtz'schen Theorie der Farbenempfindung*. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 18. — Verhandl. d. Skandinav. Nat. Vers. in Christiania. 1886.
4808. E. NETZ. *Farbenblindheit oder Farbenunkenntniss?* Pädagogische Studien für farbenblinde Lehrer. Jena.
4809. TRÈVE. *Essai d'une explication physiologique des couleurs complémentaires*. Rend. Bd. 102. S. 984.
4810. WEBSTER, FOX und G. W. GOULD. *On heat considered as the retinal intensity of light and color sensation*. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 175.
4811. — *The human color-sense considered as the organic response to nature*. New York. 20 S. — Americ. Journ. of Ophthalm. S. 233. 1887.
4812. T. W. BACKHOUSE. *The perception of colours*. Nature. XXXVI. S. 531.
4813. W. v. BEZOLD. *Ueber eine neue Methode zur Zerlegung des weissen Lichts in Complementärfarben*. Wiedem. Ann. XXXII. S. 165—167.
4814. BICKERTON. *Colour-blindness; its present position in the mercantile world*. Brit. med. Journ. II. S. 498.
4815. DOGIEL. *Ueber den Einfluss von Spectrumfarben auf die Menschen* (Russisch.) Abh. d. II. Congr. d. russ. Aerzte zu Moskau. II. S. 3.
4816. G. GOVI. *Du cercle chromatique de Newton*. Compt. Rend. Bd. 105. S. 106.
4817. E. HERING. *Ueber Holmgren's vermeintlichen Nachweis der Elementarfarben des Gesichtssinnes*. Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 1—46.
4818. — *Beleuchtung eines Angriffes auf die Theorie der Gegenfarben*. Arch. f. Physiol. XL. S. 29—46.
4819. — *Gegenbemerkung an Kries*. Pflüger's Arch. Bd. 41. S. 397.
4820. M. KNIES. *Ueber die Grundfarben*. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Berlin. S. 70.
4821. — *Ueber Farbenempfindung und Farbenstörungen*. Erster Theil. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 379—403. Zweiter Theil. XVIII. S. 50—66.
4822. A. KÖNIG. *The modern development of Thomas Young's theory of color*. Rep. Brit. assoc. advanc. sc. for 1886. S. 431. (Übersetzt und mit Notizen versehen: Naturwissenschaftl. Rundschau. 1886. Extrabeilage zu No. 50.)
4823. — *Ueber Newton's Gesetz der Farbmischung und darauf bezügliche Versuche von Herrn Eugen Brodhun*. Sitzgs.-Ber. d. Königl. Preuss. Acad. zu Berlin. S. 317.
4824. J. v. KRIES. *Zur Theorie der Gesichtsempfindungen*. Du Bois' Arch. f. Physiol. (1/2.) S. 113—119.
4825. — *Entgegnung an Herrn E. Hering*. Pflüger's Arch. XLI. S. 389—397.
4826. J. T. RUDALL. *Colour-blindness and other defects of sight in some of their more aspects*. Melbourne 20 S.
4827. C. E. STROMMEYER. *Perception of colour*. Nature. XXXV. S. 246 u. XXXVI. S. 28—29.
4828. H. W. VOGEL. *Ein Mischfarbenerperiment*. Verh. d. Physik. Ges. zu Berlin. S. 28—29.
4829. G. F. WATERS. *Colour-blindness*. Science. X. S. 179. 1888.
4830. E. BRODHUN. *Ueber das Leukoskop*. Wiedemann's Ann. XXXIV. S. 897.
4831. G. A. CALDERON. *Hemiacromatopsia decreta absoluta; conservación para percepción luminosa y de las formas*. Revista di Oftalm. XII. S. 337.
4832. A. CHARPENTIER. *La lumière et les couleurs au point de vue physiologique*. Baillière & f.
4833. A. FAYRE. *Persistence de la guérison du Daltonisme congénital traité par le gaz*. hebdom. de méd. (2.) XXXVI. S. 598.
4834. K. GROSSMANN. *Colour-blindness*. Brit. med. Journ. II. S. 275.
4835. E. HERING. *Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen Substanz*. Lotz sep. Prag. 36 S.

4836. D. ISAACHSEN. *Zur Farbenlehre*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 289 bis 294.
4837. M. KNIES. *Ueber Farbenempfindung und Farbenstörungen*. Dritter Theil. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 253—263.
4838. — *Objective Demonstration der Farbengrundempfindungen*. Ber. d. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 186.
4839. J. v. KRIES. *Nochmalige Bemerkung zur Theorie der Gesichtsempfindungen*. Du Bois' Arch. S. 380—388.
4840. G. MACKAY. *A discussion on a contribution to the study of hemianopsia, with special reference to acquired colour-blindness*. Brit. med. Journ. II. S. 1033. — Ophthalm. Rev. S. 272.
4841. E. DAL POZZE. *La discromatopsia. Studi sulla visione dei colori*. Foligno. S. 370.
4842. O. C. RIOS. *De la cromatopsia ó ceguera de los colores*. Rev. méd. de Chile. Sant. de Chile. 1888/89. S. 385.
4843. H. W. VOGEL. *Beobachtungen über Farbewahrnehmungen*. Naturwiss. Rundsch. No. 15. S. 185.
4844. *Sulla cromatopsia retinica nelle atrofie papillari*. Boll. d'oculist. Florenz. (2.) X. S. 1.
- 1889.
4845. G. ALBERTOTTI. *Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti*. Modena 1889.
4846. DEEREN. *Quelques aperçus sur les meilleurs moyens à prendre pour dresser une échelle chromatique*. Rec. d'Ophthalm. S. 585—597.
4847. E. DREHER. *Neue Farbenphänomene, ihre Erklärung und Bedeutung für unsere heutige Theorie der Farbewahrnehmung*. Naturwiss. Wochenschr. Bd. IV. S. 260—262.
4848. A. FAYRE. *Notes pathologiques sur la fausse appréciation des couleurs*. Lyon. méd. Bd. 62. No. 41. 44. 45. 46. 47.
4849. F. W. EDRIDGE-GREEN. *Colour-blindness and colour-perception*. Ophthalm. Rev. April. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 172. — Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 119.
4850. — *The detection of colour-blindness*. Brit. med. Journ. II. S. 1036.
4851. CH. HENRY. *Sur un cercle chromatique, un rapporteur et un décimètre esthétique*. Compt. Rend. CVIII. S. 169.
4852. — *Cercle chromatique, présentant tous les compléments et toutes les harmonies de couleurs, avec une introduction sur la théorie générale de la dynamogénie, autrement dit du contraste, du rythme et de la mesure*. Paris.
4853. F. HILLEBRAND. *Ueber die spezifische Helligkeit der Farben. Beiträge zur Psychologie der Gesichtsempfindungen mit Vormerkungen von E. Hering*. Sitzgs.-Ber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturwiss. Kl. XCVIII. 3. Abth. S. 70—122.
4854. A. HODGKINSON. *Colour and its relation to the structure of coloured bodies*. Mem. and Proc. Manchester. literar. and philos. 4 ser. S. 198.
4855. — *On the physiological phenomena of colour sensation*. Mem. a. Proc. Manchester Literar. a. Philos. Soc. (4.) II. S. 215.
4856. M. KNIES. *Ueber Farbensinnstörung bei Schnervenleiden*. Ber. über. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 7—11.
4857. A. P. LAURIE. *On Artist's Colours*. Rep. Brit. Assoc. Newcastle-upon-Thyne. S. 541.
4858. C. LUCANUS. *Ueber die Schwäche des Farbensinnes*. Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 41—50.
4859. J. SPILLER. *An experiment in colour-blindness*. Rep. of the Brit. Assoc. for 1889. S. 518. — Photogr. News. 20. Septbr.
4860. A. STEVENS. *Color-blindness*. Science. XIII. S. 89.
4861. H. WÜRDEMANN. *Color perception*. Amer. Journ. of Ophthalm. S. 163.
4862. *Color-blindness*. Science. XIII. S. 91.
4863. *Colour-blindness and defective far-sight among the seamen of the mercantile marine*. Nature. S. 438.
- 1890.
4864. A. BERGH. *Der Farbensinn nebst angeborener und erworbener Farbenblindheit*. Stockholm.
4865. BERRY. *A suggestion as to the function of some of the retinal elements*. Ophthalm. Rev. Mai. S. 135.

4866. BERRY. *Critical remarks on the theories of fundamental colour sensations.* Ophthalm. Hosp. Rep. XIII. (1.)
4867. BICKERTON. *Colour-blindness. A criticism of the Board of Trade tests.* Brit. med. Journ. 8. März. No. 1523.
4868. R. BRUDENELL CARTER. *Colour-Vision and Colour-Blindness. Lecture delivered at the Royal Institution.* Nature. 15. Mai. S. 55—61.
4869. E. CANESTRINI. *Esperienze di ottica fisiologica.* Atti della Soc. Ven. Trentina di Scienze Naturali. XI.
4870. J. LARDNER GREEN. *On colour-blindness.* Brit. med. Journ. 1. Febr.
4871. CH. HENRY. *La lumière, la couleur et la forme.* Rev. Sc. XLVI. No. 10 u. 12.
4872. E. HERING. *Die Untersuchung einseitiger Störungen des Farbensinnes mittelst binocularer Farbengleichungen.* v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 3. Abth. S. 1—23.
4873. — *Prüfung der sogenannten Farbendreiecke mit Hülfe des Farbensinnes excentrischer Netzhautstellen.* Pfüger's Arch. XLVII. S. 417—438.
4874. C. HESS. *Ueber die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Netzhaut mit homogenem Lichte.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. Abth. 1. S. 1—32.
4875. F. KREYSSIG. *Ueber perverse Lichtempfindung.* Mitth. a. d. ophthalm. Klin. in Tübingen. II. S. 329.
4876. C. KROMAN. *Sur le système de nos sensations des couleurs.* Overs. K. Dansk. Vid. Sels. Forh. S. 295—310.
4877. G. MACKAY. *Colour-blindness.* Brit. med. Journ. No. 1562. S. 1251.
4878. — *Colour-blindness and defective sight in relation to public duty.* Brit. med. Journ. No. 1568. S. 123.
4879. C. A. OLIVER. *Another theory of defective colour-vision (colour-blindness).* Edinb. med. Journ. XXXVI. S. 325.
4880. M. REICH. *Zur Pathologie der Farbenempfindung.* (Russisch) Sitzgs.-Ber. d. Kaukas. med. Ges. XXVII. No. 13.
4881. A. SCHUSTER. *Experiments with Lord Rayleigh's Colour Box.* Proc. of the Roy. Soc. XLVIII. No. 293. S. 140—149.
4882. O. SOMMERVILLE. *Another theory of defective colour vision (colour-blindness).* Edinb. med. Journ. No. 424. S. 325.
4883. G. L. SWANSTON. *Colour-blindness? amongst seamen.* Lancet. II. S. 1111.
4884. J. L. THOMPSON. *The abuse of alcohol and tobacco a cause of aquired colour-blindness.* Kansas City med. Record. August.
4885. H. W. VOGEL. *Ueber Farbenwahrnehmungen.* Verh. d. physik. Ges. zu Berlin. Jahrg. 9. No. 1.
- 1891.
4886. W. DE W. ABNEY. *On the examination for colour of cases of tobacco scotoma, and of abnormal colour-blindness.* Proc. of the Roy. Soc. XLIX. S. 491—509.
4887. — *The numerical registration of colour.* Preliminary Note. Proc. of the Roy. Soc. XLIX. S. 227—233.
4888. — *Colour Measurement and Mixture.* London. Soc. for promoting Christian Knowledge.
4889. A. CHARPENTIER. *Phénomènes de coloration apparente observés sous l'influence d'excitations lumineuses instantanées.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. (26.) S. 596—599.
4890. — *Remarques et expériences au sujet de la coloration entoptique des lumières blanches instantanées.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. (26.) S. 601—604.
4891. F. W. EDRIDGE-GREEN. *Colour-blindness and colour-perception.* Brit. med. Journ. No. 1617. S. 1356.
4892. H. v. HELMHOLTZ. *Kürzeste Linien im Farbensystem.* Berl. Sitzgs.-Ber. 17. Dec. S. 1071—1083. — Zeitschr. f. Psychol. III. S. 118—122.
4893. — *Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunterschiede trichromatischer Augen anzuwenden.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 1—20.
4894. E. HERING. *Untersuchung eines total Farbenblinden.* Pfüger's Arch. Bd. 49. S. 563—609.
4895. E. LOMMEL. *Berechnung von Mischfarben.* Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München. Franz 25 S. — Wied. Ann. Bd. 43. S. 473—497.
4896. M. SACHS. *Ueber die spezifische Lichtabsorption des gelben Fleckes der Netzhaut.* Pfüger's Arch. Bd. 50. S. 574—587.

## 1892.

4897. W. DE W. ABNEY and E. R. FESTING. *Colour Photometry*. London, Phil. Transact. Vol. 183. S. 531—565.
4898. A. ANGELUCCI. *L'occhio et la Pittura*. Diss. inaug.
4899. BICKERTON. *On colour-blindness*. London, Macmillan.
4900. A. CHAUVEAU. *Couleurs fondamentales*. Acad. des Scien. 21./28. Novbr.
4901. GALEZOWSKI. *De l'hémianopsie chromatique dans une amblyopie nerveuse*. Rec. d'ophthalm. No. 10. S. 576.
4902. GUAITA. *Prüfung der Gemälde von Beccafumi mit Rücksicht auf die Farbenempfindung des Malers*. XIII. Congr. d. ital. ophthalm. Ges. in Palermo. April.
4903. A. KÖNIG u. C. DIETERICI. *Die Grundempfindungen in normalen und anomalen Farbensystemen und ihre Intensitätsvertheilung im Spectrum*. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 241—347. Auch sep. Hamburg, L. Voss. 107 S.
4904. W. POLE. *Some unpublished data on colour-blindness*. Philos. Mag. (5.) 34. S. 100—114.
4905. — *Further data on colour-blindness. II*. Philos. Mag. (5.) 34. S. 439—443.
4906. O. N. ROOD. *On a colour System*. Americ. Journ. of science. XLIV. S. 263—270.
4907. RUTHERFORD. *On colour sense*. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb.

## 1893.

4908. W. DE W. ABNEY. *The sensitiveness of the eye to light and colour*. Nature. XLVII. S. 588—542.
4909. W. BAILY. *Notes on the construction of a colour map*. Philos. Mag. (5.) XXXV. S. 46—47.
4910. E. BRODHUN. *Die Gültigkeit des Newton'schen Farbmischungsgesetzes bei dem sog. grünblinden Farbensystem*. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 323—334.
4911. DE DANTEC. *De la sensibilité colorée*. Soc. d'anat. et de physiol. de Bordeaux. 26. Juni. — Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (9.) V. S. 718—722.
4912. C. LADD-FRANKLIN. *On theories of light-sensation*. Mind. (N. S.) II. No. 8. S. 473—490.
4913. P. GLAN. *Zum Grundgesetz der Complementärfarben*. Wiedemann's Ann. f. Phys. u. Chem. Bd. 48. S. 307—327.
4914. J. B. HAYCRAFT. *A new Hypothesis concerning Vision*. Proceed. of the Roy. Soc. LIII. No. 322. S. 78. LIV. No. 327. S. 272—274.
4915. E. HERRING. *Ueber den Einfluss der Macula lutea auf spectrale Farbengleichungen*. Pflüger's Arch. Bd. 54. S. 277—312.
4916. J. W. LOVIBOND. *Measurement of light and colour sensations*. George Gill & Sons, London.
4917. W. POLE. *Further data on colour-blindness. III*. Philos. Mag. Jan. S. 52—62.
4918. — *Further data on colour-blindness. IV*. Philos. Mag. XXXVI. No. 219. S. 188—195.
4919. — *Data on the phenomena of colour-blindness, chiefly derived from foreign sources*. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. 16. Jan. XX. S. 103—140.
4920. — *On the present state of knowledge and opinion in regard to colour-blindness*. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XXXVII. (2.) No. 22. S. 441—479.

## 1894.

4921. A. ANGELUCCI. *La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull'impiego del colore in pittura*. Arch. di Ottalm. II. S. 8 u. 69.
4922. R. B. CARTER. *The quantitative determination of colour vision*. The Lancet. No. 3681. S. 665.
4923. COGNAQ. *De la sensibilité colorée*. Thèse de Bordeaux. 1893—1894.
4924. DUFOUR. *A propos de la théorie de la vision des couleurs*. Ann. d'ocul. CXI. S. 350—371.
4925. E. HERRING. *Ueber angebliche Blaublindheit der Fovea centralis*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 59. S. 403—414.
4926. R. HILBERT. *Die individuellen Verschiedenheiten des Farbensinnes zwischen den Augen eines Beobachters*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 61—64.
4927. A. KÖNIG. *Ueber den menschlichen Sehpurpur und seine Bedeutung für das Sehen*. Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 577—598.
4928. W. NICAÏ. *Esthésiométrie et photométrie oxyopiques*. Arch. d'Ophthalm. XIV. (5.) S. 297—302.



4929. E. TONN. *Ueber die Gültigkeit von Newton's Farbenmischungsgesetz.* Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 279—304.  
 4930. J. WALLACE. *The physical and physiological basis of colour.* Univ. med. Mag.  
 4931. TH. YOUNG. *Oeuvres ophthalmologiques.* Ins Französische übersetzt und mit Noten versehen von M. Tscherning. Kopenhagen, Høst u. Søn. 248 S.

### c) Neuere Theorien der Farbenempfindung.

- 1867.
4932. W. ZENKER. *Versuch einer Theorie der Farbenperception.* Arch. f. mikrosk. Anat. III. S. 249—261.
- 1870.
4933. J. CZERMAK. *Schopenhauer's Theorie der Farbe.* Wien. Acad. Ber. Bd. 82. S. 393—411.  
 4934. A. SCHOPENHAUER. *Ueber das Sehen und die Farben.* 3. Aufl. Herausg. v. Franzstäd. Leipzig.
- 1875.
4935. A. M. MAYER. *The history of Young's Discovery of his Theory of Colors.* Americ. Journ. of Sc. a. Arts. (3 Ser.) IX. No. 52. S. 251—267.
- 1876.
4936. ALIX. *Sur la théorie de la vision.* Inst. S. 116.  
 4937. L. HAPPE. *Ueber den physiologischen Entwicklungsgang der Lehre von den Farben.* Ber. d. Aerztekammer v. Braunschweig.
- 1879.
4938. ROSENTHAL. *Théorie des Couleurs.* Rev. Scientif. (2.) IX. No. 14. S. 316—32. Deutsch in der Deutschen Revue. December.
- 1880.
4939. W. KRENCHSEL. *Ueber die Hypothesen von Grundfarben.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.) S. 91.
- 1881.
4940. F. BOLL. *Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung.* Mit einer Vorbemerkung von H. Helmholtz. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 1—3.  
 4941. W. PREYER. *Ueber den Farben- und Temperatursinn mit besonderer Rücksicht auf Farbenblindheit.* Pflüger's Arch. Bd. 25. S. 81—100. — Sep. Bonn.
- 1882.
4942. E. LANDOLT. *Théorie de la perception des couleurs.* Arch. d'Ophthalm. II. S. 5.  
 4943. J. SOUBRY. *Nouvelles théories scientifiques du sens des couleurs Hering, Preyer, Charpentier.* Rev. Scientif. Paris. XXX. S. 182.  
 4944. — *Philosophie naturelle. Le sens des couleurs.* Paris. Cap. VI.
- 1884.
4945. A. ANGELUCCI. *Una nuova teoria sulla visione.* Communic. preventiva presentata all'Acad. med. di Roma. 14. Juli.  
 4946. C. A. OLIVER. *A correlation theory of Color-perception.* Philadelphia med. Times 1883—1884. XIV. S. 715.
- 1885.
4947. GRADENIGO. *Eine neue Theorie über den Sehsact.* Allg. Wien. med. Zeitg. No. 12. S. 131.  
 4948. C. A. OLIVER. *A correlation theory of Color-perception.* Americ. Journ. of med. Sc. Philadelphia. Bd. 89. S. 98—127, 462—482.  
 4949. H. PARINAUD. *Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangibilité différents; la sensibilité dans la macula et les parties périphériques; rôle du pourpre visuel.* Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 329.
- 1886.
4950. A. ANGELUCCI. *Una nuova teoria sulla visione. Terza comunicazione preventiva.* Cagliari.  
 4951. — *Une nouvelle théorie de la vision.* Rec. d'ophthalm. S. 34.  
 4952. S. M. BURNETT. *The new theory of color-perception.* Americ. Journ. of ophthalm. Vol. III. S. 278—280.

- 1887.
4953. GRADENIGO. *Sulla teoria di Angelucci*. Ann. di Ottalm. S. 450.
- 1888.
4954. A. GOELLER. *Die Analyse der Lichtwellen durch das Auge*. Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 139—162.
4955. G. NORRIE. *Dr. Waldemar Krensch's mechanische teori for lysformmelsen. (K's mechanische Theorie der Lichtempfindung.)* Ugeskrift f. læger. (4). XVIII. No. 19, 20 u. 21.
4956. W. WUNDT. *Die Empfindung des Lichtes und der Farben*. Philos. Stud. IV. S. 312 bis 389.
- 1889.
4957. CH. V. BURTON. *Versuche über Farbenwahrnehmung und über eine photoelektrische Theorie des Sehens*. Proc. of the Cambridge Phil. Soc. VI. S. 308.
4958. G. NORRIE. *Waldemar Krensch's Grundzüge einer mechanischen Theorie der Lichtempfindung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIII. S. 145—159.
4959. PREOBRASCHENSKY. *Hypothese des Farbsehens*. Journ. russ. phys.-chem. Ges. XXI. Phys. Teil. S. 248—259. — Journ. de Phys. (2.) IX. S. 538. (1890.)
- 1890.
4960. F. W. EDRIDGE-GREEN. *A new theory of colour-blindness and colour-perception*. Proc. of the roy. soc. XLVII. S. 176.
- 1891.
4961. R. E. LIESEGANG. *Theorien der Farbenempfindung*. Phot. Arch. April.
- 1892.
4962. CHR. LADD-FRANKLIN. *Eine neue Theorie der Lichtempfindungen*. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 211—221.
- 1893.
4963. H. EBBINGHAUS. *Theorie des Farbsehens*. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 145—238. Auch sep.. Hamburg, L. Voss. 94 S.
- 1894.
4964. C. LADD FRANKLIN. *Prof. Ebbinghaus' theory of colour vision*. Mind. (N. S.) III. No. 9. S. 98—105.
4965. J. v. KRIES. *Ueber den Einfluss der Adaptation auf Licht- und Farbenempfindung und über die Function der Stäbchen*. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. B. IX. (2.) S. 61—70. — Freiburg i. B., Mohr. 14 S.
4966. W. NICATI. *Principes de chronologie ou synthèse physiologique de la couleur*. Compt. Rend. de l'Acad. des Sienc. Bd. 119. S. 917—919.
4967. H. PARINAUD. *La sensibilité de l'oeil aux couleurs spectrales; fonctions des éléments rétinien et du pourpre visuel*. Ann. d'ocul. Bd. 112. (4.) S. 228.
4968. D. TURNER. *A theory of electrical vision*. The Lancet. No. 3722. S. 1585.

#### d) Peripheres Farbsehen.

- 1870.
1969. J. CL. MAXWELL. *On colour vision at different points of the retina*. Engineer. XXX. S. 268. Rep. Brit. Assoc. XL. Liverpool 40.
1970. M. WERNOW. *Zur Farbenempfindung*. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 212.
- 1872.
1971. E. RÄHLMANN. *Ueber Farbenempfindung in den peripherischen Netzhautpartien in Bezug auf normale und pathologische Brechungszustände*. Halle. Inaug.-Diss.
- 1873.
1972. A. FICK. *Zur Theorie der Farbenblindheit*. Verh. d. physik.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. V. S. 129.
1973. E. LANDOLT. *Farbenperception der Netzhautperipherie*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XI. S. 376—377.
- 1874.
974. KRÜKOW. *Objective Farbenempfindungen auf den peripherischen Theilen der Netzhaut*. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 255. — Moskauer ärztl. Anz. No. 15 u. 16.
975. E. LANDOLT. *De la perception des couleurs à la périphérie de la rétine*. Ann. d'Ocul. S. 1.

4976. E. RÄHLMANN. *Ueber Verhältnisse der Farbenempfindung bei indirectem und directem Sehen.* Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 15.  
1875.
4977. A. CHODIN. *Zur Lehre von den Farbenempfindungen auf der Peripherie der Netzhaut.* Petersb. med. Anz. No. 10—13.
4978. KLUG. *Ueber Farbenempfindung bei indirectem Sehen.* Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) S. 251—295.
4979. TREITEL. *Prüfung des Gesichtsfeldes mit Pigmentfarben.* Diss. Königsberg.
4980. — *Ueber das Verhalten der peripheren und centralen Farbenperception bei Atrophia nervi optici.* Inaug.-Diss. Königsberg.  
1877.
4981. A. CHARPENTIER. *De la vision avec les différentes parties de la rétine.* Arch. de physiol. No. 6.
4982. A. CHODIN. *Ueber die Empfindlichkeit für Farben in der Peripherie der Netzhaut.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (3.) S. 177—208.  
1878.
4983. E. LANDOLT u. A. CHARPENTIER. *Des sensations de lumière et de couleurs dans la vision directe et dans la vision indirecte.* Compt. Rend. Bd. 86. S. 495—497. — Gaz. méd. de Paris. No. 10. S. 120.  
1879.
4984. TREITEL. *Ueber den Werth der Gesichtsfeldmessung mit Pigmenten für die Auffassung der Krankheiten des nervösen Sehapparats.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXV. (2.)  
1881.
4985. R. BUTZ. *Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen der physiologischen Funktionen der Peripherie der Netzhaut.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 437—445.
4986. J. MACÉ DE LÉPINAY und W. NICATI. *Contribution à l'étude du champ visuel des couleurs.* Arch. d'ophthalm. I. No. 6 u. 7. S. 437 u. 506.  
1883.
4987. R. BUTZ. *Untersuchungen über die physiologischen Funktionen der Peripherie der Netzhaut.* Dissert. Dorpat.  
1884.
4988. W. DOBROWOLSKY. *Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen zu gleicher Zeit.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXV. S. 537—541. St. Peterburger med. Wochenschr. S. 398.  
1885.
4989. A. CHARPENTIER. *La perception lumineuse est-elle la même sur toute l'étendue de la rétine?* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 333.  
1886.
4990. ALBINI. *Della visione indiretta delle forme e dei colori.* Giorn. della R. Accad. di Med. No. 7—8.  
1887.
4991. ALBINI. *Sulla visione indiretta delle forme e dei colori.* Ann. di Ottalm. XV. S. 482.  
1888.
4992. A. E. FICK. *Studien über Licht- und Farbenempfindung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 441.  
1889.
4993. V. BASEVI. *Sulla sensibilità della periferia della retina per la luce e per i colori in occhi normali ed in alcuni casi patologici.* Ann. d'Ottalm. XVIII. S. 41. — Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 119.
4994. E. HERING. *Ueber die Hypothesen zur Erklärung der peripheren Farbenblindheit.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 63—83.
4995. C. HESS. *Ueber den Farbensinn bei indirectem Sehen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 1—62. — Ber. über d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 24  
1890.
4996. A. FICK. *Zur Theorie des Farbensinnes bei indirectem Sehen.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLVII. S. 274—285.
4997. E. HERING. *Berichtigung zur Abhandlung über periphere Farbenblindheit.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 264.

4998. E. HERING. *Prüfung der sogenannten Farbdreiecke mit Hilfe des Farbensinnes excentrischer Netzhautstellen.* Pfüger's Arch. XLVII. S. 417—438.  
1892.
4999. E. HEGG. *Zur Farbenperimetrie.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. S. 145 bis 168. Diss. Bern.  
1898.
5000. O. BULL. *Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés.* Ann. d'Ocul. CX. S. 169.
5001. E. HEGG. *La périmétrie des couleurs.* Ann. d'Ocul. CIX. S. 321.
5002. A. KIRSCHMANN. *Die Farbenempfindung im indirecten Sehen.* Erste Mittheilung. Philos. Stud. VIII. S. 592—614.  
1894.
5003. OLE BULL. *Sur la périmétrie au moyen des pigments colorés.* Ann. d'Ocul. CXI. S. 284.
5004. A. DBOTT. *Die Außengrenzen des Gesichtsfeldes für weiße und farbige Objecte bei normalem Auge.* Diss. Breslau. 32 S.
5005. E. HEGG. *Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés.* Ann. d'Ocul. CXI. S. 122.

**e) Methoden, Apparate, Farbenproben u. s. w. zur Untersuchung des Farbensinnes.**

Betreffs der Untersuchung mit dem Farbenkreisel ist auch die Litteratur in § 22 zu beachten.

- 1865.
5006. E. ROSE. *Ueber die einfachsten Untersuchungsmethoden Farbenkranker.* Berl. klin. Wochenschr. No. 31.
- 1870.
5007. E. KETTLER. *Analytisch-synthetischer Mischfarbenapparat.* Pogg. Ann. Bd. 141. S. 604—607.
- 1874.
5008. FR. HOLMGREN. *Methoden zum schnellen Diagnosticieren der verschiedenen Arten von Farbenblindheit.* Upsala Läkaref. Förh. IX. S. 577—578.
5009. JEAFFRESON. *Photoperimeter.* Ann. d'Ocul. LXXII. 11. Ser. (2.) S. 115.
5010. H. SNELLEN u. E. LANDOLT. *Die Functionsprüfungen des Auges.* Gräfe-Sämisch' Handb. d. ges. Augenheilkde. Bd. III. Cap. I.  
1876.
5011. W. v. BEZOLD. *Der Farbenmischer.* Catalogue of the Spec. Loan Coll. of Scient. Apparatus. London. I. S. 139. No. 972.  
1877.
5012. ROSENSTIEHL. *De l'emploi des disques rotatifs pour l'étude de sensations colorées.* Compt. Rend. Bd. 84. S. 1133—1136.  
1878.
5013. H. COHN. *Gestickte Buchstaben zur Diagnose der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 77—78.
5014. — *Ueber die spectroscopische Untersuchung Farbenblinder.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 264—266 u. 288.
5015. — *Der Simultan-Contrast zur Diagnose der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 35—36.
5016. A. DAAR. *Lidt om Undersøgelse af Farvesansen. (Anleitung zur Untersuchung Farbenblinder.)* Norsk. Mag. f. Lægevid. 3 R. VII. S. 450—455. VIII. S. 81.
5017. — *Farbenblindheit und Entdeckung von Farbenblinden.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 10—11.
5018. — *Die Farbenblindheit und deren Erkennung.* Uebers. v. M. SÄNGER. Berlin, Dörfel & Hirschwald.
5019. H. DOR. *Echelle pour mesurer l'acuité de la vision chromatique.* Paris, Masson. 16 S. Basel-Lyon, Georg. — Ber. üb. d. Vers. d. Heidelb. ophthalm. Ges. S. 188.
5020. J. HIRRLINGER. *Prüfungs- und Uebungstafeln zur Untersuchung des Farbensinnes.* Stuttgart, Moser.
5021. J. HIRSCHBERG. *Das Doppelspectroscop zur Analyse der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 248.

5022. F. HOLMGREN. *An die Ärzte Schwedens betreffs der Farbenblindheit.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 60—72.
5023. E. LANDOLT. *Chromatometre.* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. No. 22.
5024. H. MAGNUS. *Zur spectroscopischen Untersuchung Farbenblinder.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 80—81, 233—235 u. 287.
5025. E. PFLÜGER. *Ueber Prüfung des Farbensinnes.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 50.
5026. J. STILLING. *Tafeln zur Bestimmung der Roth-Grünblindheit.* Leipzig.
5027. — *Tafeln zur Bestimmung der Blau-Gelbblindheit.* Cassel, Fischer. 1879.
5028. ANESHÄUSEL. *Zur Erkennung der Farbenblindheit.* Aerztl. Mitth. aus Baden. XXXIII. (11.)
5029. E. BRABOCK. *Échelle de couleurs publiée par la Soc. sténochromique de Paris.* Anthropol. Inst. London. IX. S. 19—22.
5030. A. DAAR. *Pseudo-isochromatische Proben zur Untersuchung des Farbensinnes.* Norsk. Mag. 3 R. IX. 10 Forh.
5031. F. C. DONDERS. *Ueber pseudo-isochromatische Muster zur Prüfung der Farbenblindheit.* Ber. d. XII. Vers. d. ophthalm. Ges. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. S. 171.
5032. J. HIRSCHBERG. *Ueber eine Modification des Spectroscops zur Prüfung der Farbenblinden.* Physiol. Ges. zu Berlin. 17. Jan. — Dtsch. med. Wochenschr. No. 37. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 116.
5033. — *Das Doppelspectroscop zur Analyse der Farbenblindheit.* Centralbl. f. Augenheilkde. III. 55—56.
5034. F. HOLMGREN. *Apparat för diagnos af färgblindhetens arter.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 91.
5035. — *Meddelande om spektroskopiska undersökningar af färgsinnet.* Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 307.
5036. MOELLER. *Etude critique des méthodes d'explorations pour les recherches des daltoniens dans le personnel des chemins de fer.* Bull. de l'Acad. de Belg. XIII. (2.) S. 283—300.
5037. NIKITIN. *Zur Frage der quantitativen Bestimmung des Farbensinnes.* Inaug. Diss. Petersburg.
5038. PFLÜGER. *Methoden zur Untersuchung der Farbenblindheit.* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. IX.
5039. J. STILLING. *Tafeln zur Bestimmung der herabgesetzten Farbenempfindlichkeit für Roth-Grün, sowie zur Entdeckung der Simulation der Farbenblindheit.* Leipzig. 1880.
5040. GALEZOWSKI. *Mesure de la puissance chromatique de l'oeil; Chromatoscope.* Gaz. méd. de Paris. No. 26. S. 340. Gaz. hebdom. No. 26. S. 420.
5041. — *Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle.* Paris, Baillière et fils.
5042. M. GROSSMANN. *Ueber die Messung der Schärfe des Farbensinnes.* Greifswald. Diss. 39 S. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 298.
5043. J. F. HEAD. *Tests for color-blindness.* Med. Record. S. 496. May 1.
5044. MARÉCHAL. *Appareil pour la détermination de l'acuité visuelle et de la vision des couleurs.* Compt. Rend. du 6. congr. périod. intern. d'ophthalm. à Milan. 1880. S. 244.
5045. J. JEFFRIES. *Colour-blindness, its Examination and Providence.* Lancet. II. (1.) S. 7—9.
5046. PFLÜGER. *Chromatoptometer.* Ann. di Ottalm. IX. S. 897.
5047. — *Tafeln zur Bestimmung der Farbenblindheit.* Bern, Dalp.
5048. W. THOMSON. *An instrument for the detection of color-blindness.* Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc.
5049. WOOD. *Ophthalmic Test-Types and Color-Blindness-Tests.* New-York, Wood u. Co. 1881.
5050. BADAL. *Echiquier pour l'examen de la vision des couleurs.* Le Sud-Ouest méd. Janvier.
5051. O. BULL. *A new method of examining and numerically expressing the colour perception.* Transact. of the internat. med. Congr. London. III. S. 49.
5052. — *Nouvelle méthode pour l'examen et l'expression numérique du sens chromatique.* Intern. med. Soc. — Ann. d'Ocul. July u. Aug. S. 71.
5053. H. COHN. *Neue Prüfung des Farbensinnes mit pseudo-isochromatischen Tafeln.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 372—378.

5054. H. COHN. *Ueber die schnellste, einfachste und zuverlässigste Methode zur Entdeckung der Farbenblindheit.* Berl. klin. Wochenschr. No. 19. Bresl. ärztl. Zeitschr. III. S. 200.
5055. F. C. DONDEERS. *Over spectroscopen en spectroscopisch onderzoek, tot bepaling van den kleursin.* K. Acad. van Wetensch. 26. Febr. 3 S.
5056. — *Ueber Spectroscope und spectroscopische Untersuchungen zur Bestimmung des Farbensinnes.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Mai.
5057. P. GLAN. *Ophthalmospectroskop.* Ber. üb. d. wiss. Instr. a. d. Berl. Ausstellung im Jahre 1879. S. 304.
5058. — *Ueber Apparate zur Untersuchung der Farbenempfindungen.* Pflüger's Arch. Bd. 24. S. 307—328.
5059. G. DE GRANDMONT. *Sur un procédé expérimental pour la détermination de la sensibilité de la rétine aux impressions lumineuses colorées.* Compt. Rend. Bd. 92. S. 1189.
5060. F. HOLMGREN. *Underrättelse angående ensidig färgblindhet.* Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 308.
5061. KEERSMARCKER. *Diagnostic du daltonisme par la méthode dite des laines colorées.* Rev. d'ocul. du sud-ouest. 5. S. 97.
5062. B. KOLBE. *Farben-Sättigungstafeln zur graduellen Abschätzung der Farbenblindheit.* Mit dtseh.-russ.-franz. Text. Petersburg, Kranz. Leipzig, Steinacker.
5063. — *Ueber die zweckmäßigsten Methoden zur Massenprüfung des Farbensinnes.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 368—372.
5064. — *Beschreibung eines Farbensmessers zur numerischen Bestimmung von Pigmentfarben und zur graduellen Abschätzung der Farbenblindheit.* St. Petersburg. med. Wochenschr. No. 18. S. 154.
5065. J. MARÉCHAL. *Un appareil pour l'appréciation de l'acuité chromatique dans un examen sommaire du personnel de la marine et des chemins de fer.* Transact. internat. med. Congr. 7. sess. London. III. S. 126.
5066. L. MAUTHNER. *Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie.* Wien. med. Wochenschr. No. 38/39.
5067. CH. A. OLIVER. *Description of a color-sense measure.* Arch. of Ophthalm. X. No. 4.
5068. E. PFLÜGER. *Zur Diagnose der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 206.
5069. SCHENKL. *Die Behelfe zur Diagnose der Roth-Grünblindheit.* Prag. med. Wochenschr. No. 19, 27 u. 48.
5070. A. ROSENSTIEHL. *Détermination des sensations colorées fondamentales par l'étude de la répartition des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique.* Compt. Rend. Bd. 92. S. 357—360.
5071. R. ROTHE. *Farbenkreisel nebst Musterkarte der farbigen Papierscheiben zu Gleichungen.* Prag. — Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 181.  
1882.
5072. O. BULL. *Chromatoptometrische Tabelle.* Christiania, Aschehøng.
5073. A. GEISSLER. *Die Farbenblindheit, ihre Prüfungsmethoden und ihre practische Bedeutung.* Leipzig.
5074. A. HANDL. *Ein optisches Experiment.* Carl's Repert. XVIII. S. 307.
5075. H. HELMHOLTZ. *Bemerkungen zum Leukoskop.* Verh. d. Berl. physik. Ges. No. 2. S. 5—6.
5076. A. KÖNIG. *Ueber das Leukoskop.* Verh. d. Berl. physik. Ges. No. 2. S. 1—5.
5077. J. MARÉCHAL. *Appareil pour explorer la vision des couleurs.* Brest.
5078. C. A. OLIVER. *Beschreibung eines Farbensinmessers.* Arch. f. Augenheilkde. XII. S. 91.
5079. E. PFLÜGER. *Methode zur Prüfung des Farbensinnes mit Hilfe des Flor-Contrastes.* 2. Aufl. Bern, Dalp.
5080. ROSENSTIEHL. *De l'emploi des disques tournantes pour l'étude des sensations colorées.* Compt. Rend. No. 21.
5081. J. STILLING. *Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes.* Cassel, Fischer.  
1883.
5082. X. GALEZOWSKI. *Échelles optométriques et chromatiques pour mesurer l'acuité de la vision, les limites du champ visuel et la faculté chromatique.* Paris.
5083. F. HOLMGREN. *Ueber die beste Art, die einseitige Farbenblindheit zu entdecken.* Upsala Läkaref. Förh. XVIII. S. 533—539.

5084. A. KÖNIG. *Das Leukoskop und einige mit demselben gemachten Beobachtungen.* Wiedemann's Ann. XVII. S. 990—1006. — Zeitschr. f. Instrumentenkde. III. S. 20—26.
5085. B. KOLBE. *Beitrag zur qualitativen und quantitativen Prüfung des Farbensinnes vermittelt der Pigmentfarben.* Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 53. — Petersb. med. Wochenschr. VIII. S. 66.
5086. PFLÜGER. *Neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Licht- und Farbensinnes.* Ber. d. ophthalm. Ges. Heidelberg. S. 189.
5087. J. PITHIOT. *Apparat zur Auffindung und Bestimmung von Farbennuancen, welche sich aus der Zusammensetzung einfacher Farben ergeben.* Zeitschr. f. Instrumentenkde. IV. S. 73.
5088. RIBRIO DOS SANTOS. *Chromatoscope.* Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 190.
5089. SKILL. *Pflüger's Untersuchungsmethode zur Erkennung der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 234. — Szemeszet. No. 5. 1884.
5090. A. CHARPENTIER. *Nouveau modèle d'instrument destiné à l'examen clinique de la sensibilité lumineuse et de la perception des couleurs.* Arch. d'Ophthalm. S. 210.
5091. R. HILBERT. *Eine neue Methode, Farben zu mischen.* Humboldt. III. Heft 7.
5092. — *Ein neues und bequemes Mittel zur Diagnose der Farbenblindheit.* Arch. f. Augenheilkde. XIII. (4.) S. 383.
5093. H. H. HOFFERT. *A new Apparatus for Colour-Combinations.* Philos. Mag (5.) XVII. S. 81—85.
5094. A. KÖNIG. *Ueber einen neuen Apparat zur Diagnose der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VIII. Dezember. — Verhandl. d. physik. Ges. z. Berlin. 24. Okt.
5095. M. E. MIEVILLE. *Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux et chromatique.* Arch. d'Ophthalm. IV. S. 113 u. 423.
5096. H. PARINAUD. *Nouveau modèle de photoptomètre, d'astigmomètre et d'ophtalmoscope à refraction.* Bull. de la soc. franç. d'ophtalm. S. 191.
5097. H. PARINAUD u. J. DUBOSCQ. *Appareil destiné à l'étude des intensités lumineuses chromatiques des couleurs spectrales et de leurs mélanges.* Journ. de Phys. (2.) IV. S. 271—273. 1885.
5098. J. AITKEN. *Chromometers.* Proc. Edinb. XIII. S. 122—130.
5099. A. CHARPENTIER. *Méthode pour l'étude de la perception des diminutions de clarté et nouvel appareil pour la photoptométrie et le mélange des couleurs.* Arch. d'Ophthalm. S. 734.
5100. CHIBRET. *Chromatoscope.* Arch. d'Ophthalm. V. S. 1881.
5101. COLARDEAU, IZARN et CHIBRET. *De l'application de la polarisation chromatique à la détermination rapide et quantitative de l'acuité chromatique dans la région de la macula.* Bull. et mém. soc. franç. d'ophtalm. III. S. 316.
5102. D. KITAO. *Leukoskop, seine Anwendung und seine Theorie.* Abh. d. Tokio Daigaku. No. 12. 102 S. Tokio.
5103. CH. OLIVER. *A description of some modifications in a color-sense measure.* Transact. of the americ. ophthalm. soc. XXI. Vers. S. 110.
5104. H. PARINAUD. *Appareil pour l'étude des couleurs spectrales.* Bull. et mém. soc. franç. d'ophtalm. III. S. 327.
5105. — *Photoptomètre.* Arch. d'Ophthalm. V. S. 182.
5106. L. WOLFFBERG. *Ueber den differential-diagnostischen Werth der Farbensinnprüfungen.* Ber. d. ophthalm. Ges. z. Heidelberg.
5107. ZENGER. *Sur un optomètre spectroscopique.* Compt. Rend. Bd. 101. S. 1003. 1886.
5108. A. CHARPENTIER. *Méthode polarimétrique pour la photoptométrie et le mélange des couleurs.* Arch. d'Ophthalm. S. 40.
5109. CHIBRET. *Présentation du chromatoptomètre des M. M. Colardeau, Izarn et Chibret.* Bull. et mém. de la soc. franç. d'ophtalm. IV. S. 336. — Ber. d'Ophthalm. S. 436.
5110. C. S. JEAFFERSON. *A colour circle for testing the chromatic sense.* Lancet. II. S. 115.
5111. OLIVER. *A new series of Berlin wools for the scientific detection of subnormal colour perception.* Transact. of the americ. ophthalm. Soc. XXII. S. 250. — Ophthalm. Rev. S. 262.

5112. A. v. REUSS. *Wolltäfelchen zur Untersuchung auf Farbenblindheit*. Wien. med. Pr. No. 3.
5113. K. RÖHRICH. *Messung der Schärfe des Farbensinnes an den Tafeln von Ole Bull*. Greifswald. 23 S.
5114. H. SEWALL. *A simple method of testing for color-blindness*. Med. News. Philad. S. 625.
5115. L. WOLFFBERG. *Eine einfache Methode, die quantitative Farbensinnprüfung diagnostisch zu verwerthen*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 359.
- 1887.
5116. BOEHM. *Die Diagnose des Astigmatismus durch die quantitative Farbensinnprüfung*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 429.
5117. CHIBRET. *Contribution à l'étude du sens chromatique au moyen du chromatophotomètre*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 40.
5118. B. HERZOG. *Ueber den practischen Nutzen des Wolffberg'schen Apparates zur diagnostischen Vervorrichtung der quantitativen Farbensinnprüfung*. Diss. Königsberg i. Pr.
5119. OLIVER. *New series of Berlin wools for the scientific detection of subnormal colour-perception*. Philad. 4 S.
5120. A. W. STOKES. *An apparatus for comparison of colour-tints*. Chem. Soc. 15. Dezbr. — Chem. News. LVI. S. 275.
5121. L. DE WECKER und J. MASSELON. *Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chromatique et le sens lumineux*. Paris, Doin. 64 S.
- 1888.
5122. J. AITKEN. *The new chromomictor*. Scientif. News. I. No. 2. S. 27—28 u. No. 3. S. 57—58.
5123. K. GROSSMANN. *Colour-blindness, with demonstrations of new tests*. Brit. med. Journ. II.
5124. E. HERING. *Eine Vorrichtung zur Farbenmischung zur Diagnose der Farbenblindheit und zur Untersuchung der Contrasterscheinungen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 119.
5125. OLIVER. *Description of a series of tests for detection and determination of subnormal color-perception designed for use in railway service*. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 86.
5126. H. PARINAUD. *Échelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des couleurs*. Paris, Roulot.
5127. H. A. STEPHENSON. *Wolffberg's colour test*. Brit. med. Journ. II. S. 111.
- 1889.
5128. BICKERTON. *Criticisms of the tests for colour-blindness by the board of trade*. Ophthalm. Rev. S. 297.
5129. St. C. BUXTON. *Colour-tests for railway servants*. Lancet. S. 1252.
5130. FRAENKEL. *Farbige Brillen für Farbenblinde*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXVII. (2.) S. 57.
5131. K. GROSSMANN. *Notes on tests for colour-blindness*. Ophthalm. Rev. S. 298.
5132. — *Zur Prüfung auf Farbenblindheit*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Jan. S. 13.
5133. J. F. HEYES. *The testing of colour-blindness*. Nature. XL. S. 572.
5134. J. STILLING. *Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes*. Leipzig, Thieme.
5135. W. UTHOFF. *Die practischen Untersuchungsmethoden auf Farbenblindheit*. Münch. med. Wochenschr. S. 657.
5136. L. WOLFFBERG. *Relieftafeln zur Prüfung der Sehschärfe, zur Controlle der Beleuchtungsintensität und zu diagnostischen Zwecken*. Eine vorläufige Mittheilung. Breslau, Preuß & Jünger. 7 S.
- 1890.
5137. E. BICKART. *Ueber Wolffberg's quantitative Farbensinnprüfung zur Diagnose von Refraktionsanomalien*. Diss. Straßburg.
138. L. CLARK. *Testing for Colour-Blindness*. Letter to the Editor. Nature. 12. Juni. S. 147.
139. F. W. EDRIDGE-GREEN. *Two new tests for colour-blindness*. Brit. med. Journ. 11. Jan.
140. — *The detection of colour-blindness*. Brit. med. Journ. 9. Novbr.
141. E. FARAVELLI. *Premières lignes d'ophtalmospectroscopie*. Arch. Ital. de Biol. XIV, S. 151—154.
142. K. GROSSMANN. *Note on tests for colour-blindness*. Brit. med. Journ. 11. Jan.



5143. E. HERING. *Zur Diagnostik der Farbenblindheit.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 217—233.
5144. O. J. LODGE. *Testing for colour-blindness.* Nature. XIII. S. 100.
5145. J. STILLING. *Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes.* 3. Aufl. 9 Taf. Leipzig.  
1891.
5146. H. ADLER. *Die Farbenstiftprobe. Eine neue Methode zur Untersuchung auf Farbenblindheit.* Wien. klin. Wochenschr. No. 21. S. 387.
5147. F. W. EDWARDS-GREEN. *A review of the tests for colour-blindness.* Brit. med. Journ. No. 1600. S. 470.
5148. L. WOLFFBERG. *Apparat zur diagnostischen Verwerthung der quantitativen Farbensinnprüfung.* 3. Aufl. 55 S. Breslau, Preufs & Jünger.
5149. — *Zur dritten Auflage des diagnostischen Farbenapparates. Erläuterungen für den praktischen Arzt und Militärarzt.* Breslau, Preufs & Jünger.  
1892.
5150. K. GROSSMANN. *Zur Prüfung auf Farbenblindheit.* Verh. d. X. internat. Congr. IV. S. 57.  
1893.
5151. ST. CLAIR BUXTON. *On a combination test for colour vision.* Lancet. 13. Juli.
5152. COUSINS. *Nouveau cadran pour l'épreuve de la vision des couleurs.* Réunion. annuelle de la Brit. med. Assoc. August.
5153. C. A. OLIVER. *A series of wools for the ready detection of colour-blindness.* Transact. of the Americ. ophthalm. soc. held at New London. Juli. S. 538.
5154. F. SCHMIDT u. HAENSCH. *Neuer Helmholtz'scher Farbenmischapparat.* Zeitschr. f. Instrumentenkde. XIII. S. 200.
5155. L. WOLFFBERG. *Ueber die Functionsprüfungen des Auges.* Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 152—168.  
1894.
5156. W. THOMPSON. *A new wool-test for the detection of color-blindness.* The med. news. Philadelphia. Aug.
5157. L. WOLFFBERG. *Diagnostischer Farbenapparat.* 4. Aufl. Breslau, Preufs & Jünger. 40 S. m. 2 Sehpr.

#### f) Zur Casuistik der Farbenblindheit.

- 1843.
5158. BOYS DE LOURY. *Observation sur un cas d'aberration dans la sensation des couleurs.* Rev. méd. Franç. Paris. III. S. 335—344.
- 1858.
5159. BRONNER. *Cases of color-blindness.* Med. Times & Gaz. London. XII. S. 359—361.
- 1864.
5160. H. W. DOVE. *Eine Beobachtung über mangelnden Farbensinn.* Berl. Monatsber. S. 667.
- 1867.
5161. J. DASTICH. *Ueber einen Fall von Rothblindheit.* K. böhm. Ges. d. Wiss. (Philos. Sect.) 1. Juli.
- 1871.
5162. F. C. DONDEERS. *Fall von vollständiger Achromatopsie.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 470.
5163. M. WOINOW. *Zur Diagnose der Farbenblindheit.* Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 241.
- 1874.
5164. LIEGEY. *Cas de altonisme congénital.* Journ. de Méd. de Bruxelles. S. 327.
- 1875.
5165. FR. HOLMGREN. *Ein Fall von Farbenblindheit.* Upsala Läkaref. Förh. X. S. 541 bis 545.
5166. A. RICCÒ. *Studio di un caso di daltonismo.* Ann. di Ottalm. V. S. 59—94.
- 1876.
5167. A. RICCÒ. *Studio di un caso di daltonismo.* Cimento. XV. S. 175. Rendic. Acc. Linc. 2. Jan.

## 1877.

5168. BULL. *Tilfælde af erhvervet Farveblindhet. (Ein Fall von Farbenblindheit.)* Norsk. Mag. f. Lægevid. 3 R. VII Förh. S. 125.  
 5169. W. CAMERER. *Versuche eines Farbenblinden am Spectralapparat.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XV. S. 52—60.

## 1878.

5170. F. C. DONDERS. *Over dichromatische stelsels.* Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuuk. 28. Decbr.  
 5171. J. HIRSCHBERG. *Ein Fall von angeborener sog. Farbenblindheit.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. II. S. 332. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 156.  
 5172. PARSEVI. *Storia de un caso singolare di cromatopseudopsia.* Giorn. d. R. Acad. di Med. Torino. 3.  
 5173. J. STILLING. *Blau-Gelbblindheit mit unverkürztem Spectrum.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 99—100.

## 1879.

5174. O. BECKER. *Ein Fall von angeborener einseitiger totaler Farbenblindheit.* Arch. f. Ophthalm. XXV. (2.) S. 205—212.  
 5175. A. v. HIPPEL. *Ueber Farbenblindheit.* Berl. klin. Wochenschr. No. 30.  
 5176. E. LANDOLT. *A manual of examination of the eyes*, translated by S. M. Burnett. Philadelphia. S. 190—191.  
 5177. NUËL. *Des altérations acquises du sens chromatique.* Bull. de l'Acad. roy. de med. de Belgique. (3) XIII. 3. S. 372—391. Ann. d'Ocul. Bd. 82. S. 64.

## 1880.

5178. A. v. HIPPEL. *Ein Fall von einseitiger congenitaler Roth-Grünblindheit bei normalem Farbensinn des anderen Auges.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 176.  
 5179. H. MAGNUS. *Ein Fall von angeborener totaler Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 373.  
 5180. NETTLESHIP. *On cases of congenital day-blindness with colour-blindness.* St. Thomas Hosp.-Rep. No. X.  
 5181. E. PFLÜGER. *Beobachtungen an Farbenblinden* Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 381.

## 1881.

5182. A. v. HIPPEL. *Ueber einseitige Farbenblindheit.* Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. 47.  
 5183. FR. HOLMGREEN. *Flere Fall of ensidig Färgblindhet.* Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 222—225.  
 5184. E. LANDOLT. *Achromatopsie totale.* Arch. d'ophthalm. franç. No. 2. S. 114—120.  
 5185. H. MAGNUS. *A case of congenital total color-blindness.* Boston med. and surg. Journ. CIII. No. 4. S. 34.  
 5186. E. PFLÜGER. *Weitere Beobachtungen an Farbenblinden.* Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 1.  
 5187. S. SNEILL. *Peculiar case of Colour-Blindness.* Lancet. April 30. S. 727.

## 1882.

5188. G. HERMANN. *Ein Beitrag zur Casuistik der Farbenblindheit.* Diss. Dorpat.  
 5189. B. KOLBE. *Ein Fall von angeborener einseitiger Rothgrüschwäche.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. S. 291.  
 5190. H. NOYES. *Two cases of hemi-achromatopsia.* Arch. f. Ophthalm. XI. 2. Juni.  
 5191. TRÉCUL. *Exemple du noir vu en rouge orangé.* Compt. Rend. Bd. 95. S. 1198.

## 1883.

5192. FONTAN. *Un cas de daltonisme traumatique.* Rec. d'Ophthalm. S. 705.  
 5193. J. L. MINOR. *A case of colour-blindness for green.* Americ. Journ. of med. Sc. Philad. N. S. LXVXX. S. 471.  
 5194. S. W. SHUFELDT. *A case of daltonism affecting one eye.* Med. Rev. New York. XXIII. S. 319.  
 5195. H. R. SWANZY. *Case of Hemiachromatopsia.* Trans. of the Ophthalm. Soc. Vol. III. Lancet. II. (3.)

## 1884.

5196. EPERON. *Hemiachromatopsie.* Arch. f. Augenheilkunde. XIII. S. 123. Arch. d'Ophthalm. S. 356.  
 5197. NOYES. *Zwei Fälle von Hemiachromatopsie.* Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 123.

1885.

5198. BICKERTON. *Case of colour-blindness*. Liverpool. Med.-chir. Journ. V. S. 508.  
 5199. DOR. *Una observação de achromatopsia completa*. Arch. ophthalm. de Lisb. VI. S. 97.  
 5200. — *Un cas de chromatotyphlose ou achromatopsie complète*. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 433.  
 5201. B. L. MILLIKIN. *Case of sudden loss of color perception*. Columbus med. Journ. IV. S. 193.

1886.

5202. R. FERET. *Application du diagramme des couleurs à des expériences faites sur un daltonien*. Compt. Rend. CII. S. 608—610. — Rev. Scientif. No. 12. S. 376.

1888.

5203. VERREY. *Hemiachromatopsie droite absolue; conservation partielle de la perception lumineuse et des formes*. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 289.  
 5204. WILLIAMS. *Partial chromatopsy; green vision in spots*. St. Louis med. and surg. Journ. Sept.

1889.

5205. F. W. EDRIDGE-GREEN. *Note on a case of asymmetrical colour-blindness*. Med. Press London. S. 53.

1890.

5206. C. HESS. *Untersuchungen eines Falles von halbseitiger Farbensinnstörung am linken Auge*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (3.) S. 24—36.  
 5207. J. HOGG. *An undetected case of colour-blindness*. Brit. Med. Journ. 19. April.  
 5208. F. KREYSSIG. *Genuine totale Farbenblindheit*. Mitth. u. d. ophthalm. Klinik in Tübingen. S. 332.  
 5209. RAYLEIGH. *On defective colour vision*. Rep. of the Brit. Assoc. for 1890. S. 728 bis 729. 1891.

1891.

5210. E. HERING. *Untersuchung eines total Farbenblinden*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 49. S. 563—609.  
 5211. E. LANDOLT. *Un nouveau cas d'achromatopsie totale*. Arch. d'ophth. XI. (3.) S. 202 bis 207.  
 5212. QUERENGHI. *Due casi di Acromatopsia totale*. Ann. di Ottalm. Anno XX. S. 351. Ann. d'ocul. CVI. S. 333.  
 5213. M. v. VINTSCHGAU. *Physiologische Analyse eines ungewöhnlichen Falles partieller Farbenblindheit. (Trichromasie des Spectrums.)* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLVIII. S. 431—528.

1892.

5214. A. MC. GILLIVRAY. *A case of central colour defects, with remarks*. Brit. med. Journ. 23. Juli.  
 5215. A. KIRSCHMANN. *Beiträge zur Kenntniss der Farbenblindheit*. Wundt's Philos. Stud. VIII. S. 173—230 u. 407—430.  
 5216. M. v. VINTSCHGAU. *Ueber Farbenblindheit*. Ber. d. naturw.-med. Vers. in Innsbruck. XX. 1891/92.

1894.

5217. BEEVOR. *Functional amblyopia and achromatopsia of the right eye in a man with loss of other special senses right hemiplegia, tremors and hemianaesthesia*. Trans. Ophthalm. Soc. U. K. XIV. S. 249.  
 5218. E. HERING. *Ueber einen Fall von Gelb-Blaublindheit*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 308—332.  
 5219. A. v. HIPPEL. *Ueber totale angeborene Farbenblindheit*. (Aus Festschr. zur 200jähr. Jubelfeier d. Univers. Halle.) Berlin, A. Hirschwald. 11 S. mit 1 Taf.  
 5220. A. KÖNIG. *Eine bisher noch nicht beobachtete Form angeborener Farbenblindheit. (Pseudo-Monochromasie.)* Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 161—171.  
 5221. R. SIMON. *Ueber typische Violettblindheit bei Retinitis albuminurica*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. S. 132—139.  
 5222. E. UHRY. *Beitrag zur Casuistik der Blau-Gelbblindheit*. Diss. Straßburg. 36 S.  
 5223. M. v. VINTSCHGAU. *Physiologische Analyse eines ungewöhnlichen Falles partieller Farbenblindheit*. Zweite Mittheilung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 191—307.

## g) Xantopsie (Santoninwirkung), Erythroptie, Chloropie und Kyanopie.

- 1842.
5224. V. SZOKALSKI. *Ueber die Empfindungen der Farben in physiologischer und pathologischer Hinsicht.* Gießen. S. 158.
- 1852.
5225. WITCKE. *Wirkung des Wurmsamens.* Med. Zeitschr. d. Ver. f. Heilk. in Preussen. No. 7.
- 1854.
5226. KNOBLAUCH. *Beitrag zur Wirkung des Santonins auf das Sehorgan.* Deutsche Klinik. No. 35.
- 1855.
5227. ZIMMERMANN. *Gelb- und Grünsehen nach Santoniningebrauche.* Deutsche Klinik. Nov. 14.
- 1858.
5228. A. DE MARTINI. *Effets produits sur la vision par la santonine.* Compt. Rend. XLVII. S. 259—260.
5229. E. ROSE. *De Santonico.* Diss. Berlin.
- 1859.
5230. T. L. PHIPSON. *Action de la santonine sur la vue.* Compt. Rend. XLVIII. S. 593 bis 594.
5231. LIEFÈVRE. *Action de la santonine.* Compt. Rend. XLXIII. S. 448.
5232. E. ROSE. *Ueber die Wirkung der wesentlichen Bestandtheile der Wurmbülthen.* Virchow's Arch. XVI. S. 233—253.
- 1860.
5233. FALCK. *Mittheilungen über die Wirkungen des Santonins.* Deutsche Klinik. No. 27 u. 28.
5234. E. ROSE. *Ueber die Farbenblindheit durch Genuß der Santonsäure.* Virchow's Arch. XIX. S. 522—536. XX. S. 245—290.
5235. A. DE MARTINI. *Sur la coloration de la vue et de l'urine produite par la santonine.* Compt. Rend. L. S. 544—545. Inst. S. 108 u. 109.
5236. GUÉPIN. *Note sur l'action de la santonine sur la vue et son action thérapeutique.* Compt. Rend. LI. S. 794—795.
- 1861.
5237. FRANCESCHI. *On the action of Santonine on vision and its causes.* Ref. in Ann. d'Ocul. S. 199.
- 1863.
5238. E. ROSE. *Ueber die Hallucinationen im Santonrausch.* Virchow's Arch. XXVIII.
- 1864.
5239. E. ROSE. *Die Gesichtstäuschungen im Icterus (Nebst einem Anhang über den Farbensinn bei der Nachtblindheit und die Wirkung der Pikrinsäure auf das Auge.)* Virch. Arch. XXX. S. 442.
- 1865.
5240. R. SCHLESKE. *Rothblindheit in Folge pathologischer Processe.* Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 171.
- 1867.
5241. G. HÜFNER. *Versuch einer Erklärung der im Santonrausche beobachteten Erscheinung von partieller Farbenblindheit im Sinne der Young'schen Theorie.* Arch. f. Ophthalm. XIII. (2.) S. 309.
- 1868.
5242. W. PREYER. *Ueber anomale Farbenempfindungen und die physiologischen Grundfarben.* Pflüger's Arch. I. S. 229—329.
5243. F. GIOVANNI. *Effets de coloration de la santonine.* Journ. de chim. med. S. 373 bis 376.
- 1871.
5244. BRACHET und E. GSELL. *De l'application de verres à base d'uranium ou de sesquioxyde de fer aux bécicles, pour combattre les affections de l'oeil et principalement l'aphakie.* Compt. Rend. Bd. 72. S. 544.

1874.

5245. H. SCHLIEPHAKE. *Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung des galvanischen Stromes auf das menschliche Auge (Wirkung der Santoninvergiftung auf den Einfluss des galvanischen Stromes)*. Pflüger's Arch. VIII. S. 565.  
 5246. W. SCHÖN. *Farbenstörung durch Santonin*. Berl. klin. Wochenschr. No. 29.  
 5247. WOJNOW. *Ueber die Wirkung des Santonins auf die Netzhaut*. (Russisch.) Med. Rundsch. Moskau. 5. Heft.

1877.

5248. G. BRACKMEYER. *Ueber die Einwirkung der Santonsäure auf den Farbensinn*. Würzburg.  
 5249. O. N. ROOD. *Observations on a property of the retina, first noticed by Tait*. Sillim. Journ. Vol. XIII. S. 32.

1878.

5250. W. W. SEELY. *The Yellow Vision in Santonin Poisoning*. The Cincinnati Clin. XIV. No. 6.

1879.

5251. CUIGNET. *Vision rouge*. Rec. d'Ophthalm. September.

1881.

5252. L. MAUTHNER. *Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie*. Wien. med. Wochenschr. No. 38 u. 39.  
 5253. O. PURTSCHER. *Ein Fall von Erythroopsie nach Cataracta traumatica*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 338.

1882.

5254. KESTEVEN. *Xantopsia*. Clin. Soc. of London. 27. Januar.  
 5255. G. MAYERHAUSEN. *Zur Kenntniss der Erythroopsie*. Wien. med. Presse. Jahrg. XXIII. No. 42.  
 5256. — *Ueber Rothscheu*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. S. 348.  
 5257. STEINER. *Zur Kenntniss der Erythroopsie*. Wien. med. Pr. No. 44. S. 1387.

1883.

5258. BENSON. *On Erythroopsia*. Ophthalm. Rec. II. No. 26.  
 5259. F. DIMMER. *Zur Erythroopsie Aphakischer*. Wien. med. Wochenschr. No. 15.  
 5260. J. HIRSCHLER. *Zum Rothsehen der Aphakischen*. Wien. med. Wochenschr. S. 89, 125 u. 149.  
 5261. MARI. *La Santonina e la visione dei colori*. Ann. d'Ottalm. XI. (6.)  
 5262. O. PURTSCHER. *Zur Frage der Erythroopsie Aphakischer*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VII. Juni.

1884.

5263. R. HILBERT. *Ueber eine eigenthümliche Ermüdungserscheinung des nervösen Sehapparates und seine Beziehung zur Erythroopsie*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 403. — Rec. d'Ophthalm. Nov. S. 653.  
 5264. — *Zur Kenntniss der pathologischen Farbenempfindung*. Betz' Memorabilien. Jahrg. 1884. S. 526.  
 5265. STEINHEIM. *Zur Erythroopsie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VIII. S. 44. — Rec. d'Ophthalm. S. 210.

1885.

5266. K. L. BAAS. *Periodisches Blauschen als einzige Erscheinung eines larvirten Wechselfiebers*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 240.  
 5267. BERGER. *Ein Fall von Erythroopsie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 140.  
 5268. COGGINS. *A case of erythroopsia*. Boston med. and surg. Journ. Bd. 113. S. 615.  
 5269. VAN DUYSE. *Deux cas d'Erythroopsie*. Rev. gén. d'Ophthalm. No. 5. S. 197.  
 5270. R. HILBERT. *Zur Kenntniss der Xantopie*. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 419.  
 5271. — *Ueber Xantopie durch Pikrinsäure*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 70.  
 5272. J. HIRSCHBERG. *Ein Fall von Blauschen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 141.  
 5273. — *Ueber Gelbsehen und Nachtblindheit der Icterischen*. Berl. klin. Wochenschr. No. 23.  
 5274. PFLÜGER. *Erythroopsie*. Bericht über die Augenklinik in Bern f. 1883. S. 49.  
 5275. O. PURTSCHER. *Weitere Beiträge zur Frage der Erythroopsie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 48 u. 72.

276. C. SCHULIN. *Erythropsia*. Northwest. Lancet, St. Paul. 1884—85. IV. S. 317.  
 277. A. SZILL. *Ueber Erythropsie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. Februar. 1886.  
 278. A. CARRERAS. *La eritropsia en los operados de cataracta*. Rev. de sc. méd. S. 391.  
 279. GALEZOWSKI. *De l'érythropsie ou vision colorée des opérés de la cataracte*. Arch. slav. de biol. I. S. 426.  
 280. A. GRISSLER. *Beiträge zur Kenntniss der Erythropsie (Rothsehen) und verwandter Erscheinungen*. Schmidt's Jahrb. Bd. 208. S. 86.  
 281. R. HILBERT. *Zur Kenntniss der Erythropsie*. Kl. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 483.  
 282. — *Contribution to the knowledge of xanthopsia*. Arch. Ophthalm. New-York. XIV. S. 196.  
 283. — *Beitrag zur Kenntniss der transitorischen Farbenblindheit*. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 417.  
 284. SZILL. *Einige Bemerkungen zur Erythropsiefrage*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 259.  
 1887.  
 285. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Ursachen der Erythropsie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 213.  
 286. TH. KUBLI. *Vier Fälle von Erythropsie* (Russisch.) Westnik ophthalm. IV. (3.) S. 239.  
 287. O. PURTSCHER. *Neue Beiträge zur Frage der Erythropsie*. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 260.  
 1888.  
 288. DUFOUR. *Sur la vue rouge ou l'érythropsie*. Ann. d'Ocul. Bd. 99. S. 135.  
 289. A. KÖNIG. *Ueber den Einfluss von santoninsaurem Natron auf ein normales trichromatisches Farbensystem*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XII. S. 353.  
 290. E. VALUDE. *L'érythropsie*. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 130.  
 291. WESTHOFF. *Erythropsie bei Aphakie*. Festbündel, Donders' Jubiläum. Amsterdam. S. 256.  
 1889.  
 292. VETSCH. *Ueber das Rothsehen*. Correspondenzbl. f. Schweiz. Aerzte. XIX.  
 1891.  
 293. M. REICH. *Zur Lehre von der Erythropsie und Xanthokyanopsie*. Westnik Oftalm. — Petersb. med. Wochenschr.  
 1892.  
 294. W. M. BAUMONT. *Erythropsie dans l'aphakie*. Ophthalm. Rev. XI. S. 72—75.  
 295. R. HILBERT. *Zur Kenntniss der Kyanopie*. Arch. f. Augenheilkde. Bd. 24. S. 240—244.  
 296. VAN MILLINGEN. *Contribution à l'étude de l'érythropsie*. Ann. d'ocul. S. 417.  
 1893.  
 297. E. BERGER. *Accès d'érythropsie chez un aveugle*. Rev. gén. d'ophthalm. No. 2. S. 65.  
 298. E. FUCHS. *Ueber einen Fall von subjectiven Gehörs- und Gesichtsempfindungen*. Neurol. Centralbl. No. 22.  
 299. R. HILBERT. *Die Chloropie*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVII. Jahrg. S. 50—52.  
 300. J. HIRSCHBERG. *Grünsehen auf einem Auge*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVII. S. 110—111.  
 1894.  
 301. GUEBHARD. *Ueber Grünsehen*. Séanc. d. l. Soc. franç. de Phys. 1893. S. 129. — Naturwiss. Rundsch. S. 168.  
 302. R. HILBERT. *Die durch Einwirkung gewisser toxischer Körper hervorgerufenen subjectiven Farbenempfindungen*. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 28—32.  
 303. — *Erythropie, zehn Minuten andauernd, in Folge starker Erregung des Nervensystems*. Betz's Memorabilien. S. H.  
 304. SOMYA. *Zwei Fälle von Grünsehen*. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 305—307.

#### h) Praktische Bedeutung und Verbreitung der Farbenblindheit.

1858.  
 305. G. WILSON. *A note on the statistics of colour-blindness*. Year book of facts. S. 138—139.  
 1878.  
 306. A. FAYRE. *Du daltonisme au point de vue de l'industrie des chemins de fer*. Lyon méd. No. 19. S. 6—20.

5307. A. FAVRE. *Réforme des employés de chemin de fer affectés de daltonisme*. Congr. l'Assoc. franç. pour l'avancement des sc. Lyon.  
1874.
5308. BLASCHKO. *Daltonismus der Eisenbahnbeamten*. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. S. 74.
5309. COHEN. *Daltonismus der Eisenbahnbeamten*. Nederl. Weekbl. S. 313.
5310. A. FAVRE. *Daltonismus der Eisenbahnbeamten*. Lyon méd. No. 22.  
1876.
5311. A. FAVRE. *De la dyschromatopsie dans les rapports avec l'état militaire et la navigation*. Lyon.
5312. FERIS. *Daltonisme dans ses rapports avec la navigation*. Paris. — Congrès de médecins scandinaves réunis à Gothenburg. July 14.  
1877.
5313. F. C. DONDEERS. *Rapport van het Gerichtsvermogen van het personeel. Staatsproeven*. Utrecht. Rep. v. h. Nederl. Gasth. v. Ooglijders 1878.
5314. A. FAVRE. *Du Daltonisme dans ses rapports avec la navigation*. Lyon.
5315. MICHEL. *Die Prüfung der Sehkraft und der Farbenblindheit beim Eisenbahnpersonal*. Aertzl. Intelligensbl. No. 47.
5316. J. STILLING. *Die Prüfung des Farbensinnes beim Eisenbahn- und Marinepersonal*. Cassel, Fischer. 7 S. 3 Taf.  
1878.
5317. H. COHN. *Beobachtungen an 100 Farbenblinden*. Ber. üb. d. Sitzg. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 110—120. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. Beil. z. August.
5318. H. COHN u. H. MAGNUS. *Untersuchung von 5000 Schulkindern auf Farbenblindheit*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 97—99.
5319. A. DAAE. *Ein Beitrag zur Statistik der Farbenblindheit*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 79 u. 263.
5320. DHERRES. *Moyen d'éviter les accidents dus au daltonisme, dans la perception des signaux colorés*. Compt. Rend. Bd. 87. S. 502.
5321. J. JEFFRIES. *Relative frequency of colour-blindness in males and females*. Med. Surg. Journ. Boston. Juli.
5322. — *Dangers from color-blindness in railroad employes and pilots*. 9th. Ann. B. Mass. State Board Health.
5323. FR. HOLMGREN. *De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marine*. Paris. G. Masson.
5324. — *Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den Eisenbahnen und der Marine*. Leipzig. F. C. W. Vogel.
5325. — *Ueber die Farbenblindheit in Schweden*. Upsala Läkaref. Förh. XIII. S. 641—648. Französ. i. Anhang zu XIV. Heft 1. S. VIII—XV.
5326. — *Ueber die Farbenblindheit in Schweden*. Centralbl. f. prakt. Augenheilk. II. Sep.
5327. A. LEDERER. *Farbenblindheit und mangelhafter Farbensinn mit Rücksicht auf den Signaldienst in der Marine*. Wien. med. Wochenschr. XXVIII. No. 2. 3 u. 4.
5328. H. MAGNUS. *Ueber die Höhe des Prozentsatzes der Farbenblindheit und die bestimmenden Factoren*. Bresl. Ztg. No. 537.  
1879.
5329. SWAN M. BURNETT. *Resultat der Untersuchung des Farbensinnes von 3040 Kindern in den Schulen der Farbigen im District Columbia*. Arch. f. Augenheilkde. II. S. 146. 1880. Nat. med. Rev. (Washington.) I. S. 191—198.
5330. A. CARL. *Ein Beitrag zur Statistik der Farbenblindheit*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 360—362.
5331. H. DE COCK. *Kleuronderscheidingsvermogen bij de Kon. Ned. Zeemacht in (1) Indie*. Nederl. Mil. Geneesk. Arch. III. S. 386—403.
5332. O. E. DE FONTENAY. *Ueber die Farbenblindheit in Dänemark*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 135—136.
5333. F. HOLMGREN. *Beiträge zur Statistik der Farbenblindheit*. Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 204—248, 411—500.
5334. HOSCH. *Zur Statistik der angeborenen Farbenblindheit*. Correspondenzbl. f. Schweiz. Aerzte. IX. No. 8. S. 225—235.
5335. JEFFRIES. *Color-blindness among school-children*. Boston evening transcript. 9. Apr.

5336. O. JUST. *Beiträge zur Statistik der Myopie und des Farbensinnes*. Arch. f. Augenheilkde. VIII. (2.) S. 191—201.
5337. KEYSER. *Report on the examination of railroad employees for colour-blindness*. Med. Report. No. 448. New-York. 7. Juni.
5338. H. MAGNUS. *Untersuchungen von 5489 Breslauer Schülern und Schülerinnen auf Farbenblindheit*. Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 2.
5339. MEYHÖFER. *Untersuchung von Schülerinnen auf Farbenblindheit*. Schles. Ztg. No. 187.
5340. MOELLER. *Rapport sur la réforme des employées de chemin de fer affectées de Daltonisme en Suède, Norvège et Danemark*. Bull. de l'Acad. de Belg. XIII. (2.) S. 330—361.
5341. — *Étude critique des méthodes d'exploration pour les recherches des daltoniens dans le personnel des chemins de fer*. Bull. d'Acad. Roy. de Belg. XII. (2.) S. 288—330 u. 330—361.
5342. A. v. REUSS. *Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den Eisenbahnen*. Neue Freie Presse. 4. Septbr.
5343. TALKO. *Ueber das Untersuchen der Farbenblinden an den Eisenbahnen*. Medycyna. Sowrennaja Medicina. No. 11 u. 12.

1880.

5344. H. W. AUSTIN. *The color-blind and colored signals*. New Orleans Med. a. surg. Journ. Oct.
5345. O. E. DE FONTENAY. *Ueber das Vorkommen der angeborenen Farbenblindheit in Dänemark*. Nord. med. ark. XII. No. 8. No. 15.
5346. B. J. JEFFRIES. *Report of the examination of 27927 school-children for Color-blindness*. Boston.
5347. MAGNUS. *Examination of colour-blindness*. Boston. Med. a. Surg. Journ. CII. (5.) S. 117.
5348. A. MEYER. *Osservazioni sulla cecità dei colori in Italia*. Ann. di Ottalm. Anno IX. S. 190—196.
5349. A. SCHMITZ. *Statistische Mittheilungen über das Vorkommen von Farbenblindheit in Cleve und Umgegend*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 275—278.

1881.

5350. W. T. BACON. *Report of examinations of railroad employes. Color-Blindness*. Conn. State Board Health Report 1881.
5351. E. W. BARTLETT. *Color-Blindness*. State Board Health Rep. Wisconsin. S. 16—27.
5352. DE FONTENAY. *Farvedblind hedeno Betydning for Jernbanere*. Jernbanebladet. 11. November.
5353. J. W. HOLLAND. *Farbenblindheit bei Eisenbahnbediensteten*. Gesundheit. III. S. 61.
5354. MELLBERG. *Jakttagelser rörande färgblindhet*. Nord. med. Ark. XII.
5355. J. STILLING. *Simultancontrast bei Farbenprüfungen*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 129—131.

1882.

5356. LYDER BORTHEN. *Farbenblindheits-Untersuchungen von 550 Schulkindern in Throndhjem*. Norweg. Monatsbl. f. Augenheilkde. Dez.
5357. B. KOLBE. *Untersuchungen auf Farbenblindheit in Russland*. Wratsch. No. 28 u. 32. Deutscher Auszug in St. Petersburger Med. Wochenschr. No. 43.
5358. W. KROLL. *Ueber die günstigen Erfolge der Ausbildung des Farbensinnes*. Hirschberg's Centralbl. f. Augenheilkde. Dez.
5359. D. RUIZ Y SAUROMAN. *Estudios sobre el daltonismo aplicado a la navegacion*. Bol. de med. nav. San Fernando. V. S. 97.
5360. A. SCHMITZ. *Weitere 2623 Untersuchungen auf Farbenblindheit*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. September.
5361. W. THOMSON. *The practical examination of railway employes, as to color-blindness, acuteness of vision and hearing*. Med. News. Philadelphia. XL. S. 36.
5362. E. VITALI. *L'acromatopsia, o daltonismo, considerata in modo speciale nei suoi rapporti col servizio ferroviario; ed esposizione del metodo Holmgren per riconoscerla*. Bari.

1883.

5363. G. B. BONO. *Il daltonismo nei delinquenti*. Arch. f. psichiatri. etc. Torino. IV. S. 88.



5364. VELARDI. *Rapporto del esame del senso cromatico nel personale delle ferrovie meridionali*. Ann. di Ottalm. S. 297.  
1884.
5365. FOUCHER. *De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marine*. Union méd. de Canada. XIII. S. 49.  
1885.
5366. J. HOGG. *Colour-blindness in the mercantile marine*. Brit. med. Journ. I. S. 1151.
5367. THOMSON. *A report of the examination of the employees of the Pennsylvania rail road as to color sense, acuteness of vision and hearing*. Transact. of the americ. ophthalm. soc. Boston. S. 728.
5368. — *The sight and hearing of railway employees*. Pop. Sc. Monthly, Febr. S. 433—441  
1886.
5369. CLARK. *Examination of colour-blindness among the employees of the C. H. and D. R. R. and its subdivisions*. Cinc. Lancet and Clin. XVII. S. 642.
5370. WOERMS. *Le daltonisme chez les employés de chemin de fer*. Gaz. des hôp. No. 24.  
S. 188.  
1887.
5371. T. H. DICKERSON. *Colour-blindness; its present position in the mercantile marine service*. Fort Wayne Journ. med. soc. VII. S. 178.
5372. K. HOOR. *Prüfung auf Farbenblindheit bei der k. k. Armee und Kriegsmarine*. Militärarzt. XXI. S. 73 u. 81.
5373. PERTORELLI. *Il senso chromatico degli impiegati ferroviari*. Ann. di Ottalm. XV. S. 500.
5374. W. THOMSON. *Color-blindness among railroad employes*. Med. News. Philadelphia. LI. S. 182.
5375. *Color-blindness among railway employees*. Science. IX. S. 41. X. S. 121.  
1888.
5376. S. T. ARMSTRONG. *Colour-blindness in the mercantile marine of the united states*. Brit. med. Journ. I. S. 188.
5377. BICKERTON. *Sailors and their eyesight, including colour-blindness*. Ophthalm. Rev. II. S. 1038.
5378. E. RUIZ Y SAUROMÁN. *El daltonismo en sus relaciones con la navegación*. Bol. de med. nav. Madrid. XI. S. 131.  
1889.
5379. F. W. EDRIIDGE-GREEN. *The detection of colour-blindness from a practical point of view*. London, Ballière, Tindall and Cox.
5380. MARÉCHAL. *Recherches des daltoniens dans le recrutement maritime*. Rec. d'Ophthalm. S. 33—37.
5381. RUIZ Y SAUROMAN. *El daltonismo en sus relaciones con la navegación*. Bol. de med. nav. Madrid. XII. S. 29, 133, 190, 241 u. 276. XIII. (1890.) S. 5.  
1892.
5382. LIBBRECHT. *Du Daltonisme au point de vue de l'examen des employés du chemin de fer et de la marine*. Verhandl. d. X. internat. Congr. IV. S. 92.
5383. S. SNELL. *On the importance of the examination of the eyes separately for defects of colour-vision*. Brit. med. Journ. No. 1622. S. 222.
5384. *Report of the Committee on colour vision*. Roy. Soc. Proc. LI. No. 311. S. 281.  
1893.
5385. *Colour-blindness in the mercantile marine*. Brit. med. Journ. No. 1706. S. 594.

## § 21.

## Von der Intensität der Lichtempfindung.

## 1. Psychophysisches Gesetz, Adaptation, untere Reizschwelle, Größe des Eigenlichtes.

1760.  
5386. P. BOUGUER. *Traité d'Optique sur la gradation de la lumière, publ. par Lacaille*. Paris. 1887.  
5387. STEINHEIL. Abhandl. d. math.-phys. Klasse der bayr. Akademie. S. 14. 1844.  
5388. MASSON. *Etudes de photométrie électrique*. Compt. Rend. XVIII. S. 289. — Pogg. Ann. LXIII. S. 158. 1845.  
5389. MASSON. Ann. de chim. et de phys. XIV. 150. 1857.  
5390. FÖRSTER. *Ueber Hemeralopie und die Anwendung eines Photometers im Gebiete der Ophthalmologie*. Habilitätschr. Breslau. 1858.  
5391. ARAGO. *Oeuvres complètes*. X. S. 255.  
5392. \*G. TH. FECHNER. *Ueber ein wichtiges psychophysisches Grundgesetz zur Schätzung der Sterngrößen*. Leipzig. Aus den Abhandl. der sächs. Gesellschaft der Wissensch. Math.-phys. Klasse. IV. S. 457. — Nachtrag dazu im Berichte der sächsischen Gesellschaft. 1859. S. 59. 1859.  
5393. G. TH. RUETE. *Explicatio facti quod minimae paullum lucentes stellae tantum peripheria retinae cerni possint*. Programm. Leipzig. 1860.  
5394. G. TH. FECHNER. *Elemente der Psychophysik*. Leipzig. 2 Bd. 1861.  
5395. H. AUBERT. *Beiträge zur Physiologie der Netzhaut*. Abhandl. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. S. 49. — Moleschott's Unters. VIII. S. 243. 1864.  
5396. G. TH. FECHNER. *Ueber die Frage des psychophysischen Grundgesetzes mit Rücksicht auf Aubert's Versuche*. Leipz. Ber. S. 1—20.  
5397. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut*. Breslau. S. 23—153. 1867.  
5398. V. HENSEN. *Ueber das Sehen in der fovea centralis*. Virch. Arch. f. pathol. Anat. XXXIX. S. 475. 1870.  
5399. A. SICHEL. *De Panesthésie rétinienne*. Ann. d'ocul. 5400. M. WOINOW. *Zur Frage über die Intensität der Farbenempfindungen*. Arch. f. Ophthalm. XVI. 1. S. 251. 1871.  
5401. S. LAMANSKY. *Ueber die Grenzen der Empfindlichkeit der Augen für Spectralfarben*. Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 123. Pogg. Ann. 1870. XVI. (1.) S. 251. 1872.  
5402. DELBOEUF. *Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de lumière et de fatigue*. Bull. Bruxelles. (2.) XXIV. S. 250—262. Inst. S. 413—416.  
5403. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensität verschiedener Spectralfarben*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 74—92. Monatsber. d. Königl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 119—122.

5404. J. PLATEAU. *Sur la mesure des sensations physiques et sur la loi qui lie l'intensité de ces sensations à l'intensité de la cause excitante.* Compt. Rend. Bd. 75. S. 677. Bull. de l'acad. roy. de Belg. 2. sér. T. XXXIII. No. 5. S. 376—388.

1873.

5405. J. DELBOEUF. *Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de lumière et de fatigue.* Bruxelles. 115 S.  
5406. — *Étude psychophysique.* Bruxelles. — Mém. d. l'Acad. roy. de Belgique.  
5407. W. DOBROWOLSKY. *Sensibilité de l'oeil pour discerner les différences de l'intensité de diverses couleurs.* Mondes. (2.) XXX. S. 397. Inst. (2.) I. S. 60.

1874.

5408. F. BRENTANO. *Psychologie vom empirischen Standpunkt.*  
5409. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. IV. Ueber die sog. Intensität der Lichtempfindung und über die Empfindung des Schwarzen.* Wien. Ber. (3.) LXXI. S. 85—106.  
5410. J. PLATEAU. *Ueber die Messung psychischer Empfindungen und das Gesetz, welche die Stärke der Empfindung mit der Stärke der erregenden Ursache verknüpft.* Pogg. Ann. Bd. 150. S. 465—475.  
5411. E. RAHELMAH. *Ueber Schwellenwerthe der verschiedenen Spektralfarben an verschiedenen Stellen der Netzhaut.* Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 232.

1875.

5412. BRETON. *Sur la loi de Fechner.* Mondes. (2.) XXXVIII. S. 63—69.  
5413. E. HERING. *Zur Lehre von der Beziehung zwischen Leib und Seele. I. Mittheilung über Fechner's psychophysisches Gesetz.* Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. Bd. 72. S. 310—348.  
5414. A. ILEN. *Ueber die Sehschärfe und Intensität der Lichtempfindung auf der Peripherie der Netzhaut.* Petersb. Dissert. — Militärärz. Journ. Juni.

1876.

5415. E. CARP. *Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung einer neuen Methode den Lichtsinn zu messen.* Marburg.  
5416. W. DOBROWOLSKY und A. GAINÉ. *Ueber die Lichtempfindlichkeit (Lichtsinn) der Peripherie der Netzhaut.* Pflüger's Arch. f. Physiol. Bd. XII. S. 432—440.  
5417. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensität der Farben (Farbensinn) im Centrum und an der Peripherie der Netzhaut.* Pflüger's Arch. f. Physiol. Bd. XII. S. 441—471.  
5418. LANGER. *Die Grundlagen der Psychophysik.*  
5419. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Vorlegung eines neuen Apparates zur Bestimmung des Lichtsinnes.* Tagebl. d. 49. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu Hamburg. S. 119.

1877.

5420. A. CHODIN. *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Lichtstärke.* Samml. physiol. Abhandl. von Preyer. VII. 66. S. Jena. Dufft.  
5421. G. TH. FECHNER. *In Sachen der Psychophysik.* Leipzig.  
5422. B. TH. LOWNE. *On the quantitative relation of light to sensation. — A contribution to the physiology of the retina.* Journ. of Anat. and Physiol. Vol. XI. S. 707—712.  
5423. — *On some phenomena connected with vision.* Proc. of the London Roy. Soc. LXX. S. 487—492.

1878.

5424. J. DELBOEUF. *La loi psychophysique et le nouveau livre de Fechner.* Paris.  
5425. A. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen. II. Ueber das psychophysische resp. Weber'sche Gesetz.* Pflüger's Arch. Bd. 18. S. 542—573.  
5426. G. E. MÜLLER. *Zur Grundlegung der Psychophysik.* Berlin, Grieben. — Bibl. f. Wiss. u. Litter. Bd. 23.  
5427. — „In Sachen der Psychophysik. Von Gustav Fechner.“ Götting. gelehrt. Anst. Stück 26 u. 27. S. 801—837.  
5428. C. TROTTER. *Note on „Fechner's Law“.* Journ. of Physiol. I. 1. S. 60—65.

1879.

5429. E. BRÜCKE. *Ueber einige Konsequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie.* Wien. Ber. Bd. 80. (3.) 3. Juli.  
5430. A. CHARPENTIER. *Sur la quantité de lumière perdue pour la mise en activité de l'appareil visuel et ses variations dans différentes conditions.* Compt. Rend. Bd. 88. S. 121.

5431. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen. II. Ueber das psycho-physische resp. Weber'sche Gesetz.* Pflüger's Arch. XVIII. S. 542—573.
5432. G. E. MÜLLER. *Zur Grundlegung der Psychophysik.* 2. Ausg. Berlin, Hofmann.
5433. G. SCHADOW. *Die Lichtempfindlichkeit der peripheren Netzhauttheile im Verhältniss zu deren Raum- und Farbensinn.* Pflüger's Arch. XIX. S. 439—461.  
1880.
5434. A. CHARPENTIER. *Sur la sensibilité de l'oeil aux différences de lumière.* Compt. Rend. T. 91. S. 49. — Gaz. méd. No. 90.
5435. — *Sur la sensibilité visuelle et ses rapports avec la sensibilité lumineuse et la sensibilité chromatique.* Compt. rend. Bd. 91. No. 26. S. 1075. Gaz. méd. de Paris. 1881. No. 2.
5436. — *Sur la sensibilité différentielle de l'oeil pour de petites surfaces lumineuses.* Compt. Rend. Bd. 91. S. 240.
5437. — *Sur les variations de la sensibilité lumineuse suivant l'étendue des parties rétinienne excitées.* Compt. Rend. T. 91. S. 995.
5438. HEUSE. *Eine Beobachtung über das Eigenlicht der Macula lutea.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. 147.  
1881.
5439. F. BOAS. *Ueber eine neue Form des Gesetzes der Unterschiedsschwelle.* Pflüger's Arch. Bd. 26. S. 493.
5440. E. v. BRÜCKE. *Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie.* 2. Abh. Wien. Acad. Ber. Bd. 84. (3.) S. 425—458.
5441. OLE B. BULL. *Studien über Lichtsinn und Farbensinn.* Arch. f. Ophth. XXVII. (1.) S. 54.
5442. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Veränderung der Empfindlichkeit des Auges gegen Spectralfarben bei wechselnder Lichtstärke derselben.* Arch. f. d. ges. Physiol. XXIV. S. 189—202. — Russisch in Klinitscheskaja Gazeta. No. 3 u. 4.
5443. J. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *Héméralopie et torpeur rétinienne, deux formes opposées de daltonisme.* Compt. Rend. Bd. 92. No. 24. S. 1412. Gaz. méd. de Paris. No. 27. S. 387.
5444. H. PARINAUD. *De l'héméralopie dans les affections du foie et de la nature de la cécité nocturne.* Arch. génér. de méd. April. S. 403—414.
5445. — *L'héméralopie et les fonctions du pourpre visuel.* Compt. Rend. Bd. 93. No. 5. S. 286. — Gaz. méd. de Paris. No. 34. S. 484.
5446. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Hemeralopie.* Eulenburg's Real-Encyclop. d. ges. Heilkde. VI. S. 400—402.  
1882.
5447. E. ALBERT. *Ueber die Aenderungen des Farbentones von Spectralfarben und Pigmenten bei abnehmender Lichtstärke.* Wiedem. Ann. XVI. S. 129.
5448. BAYER. *Ueber Mondblindheit.* Wien. Med. Bl. Bd. IV. No. 21. — Sitzgs.-Ber. d. k. k. Ges. d. Aerzte. S. 645.
5449. BERRY. *On a practical test for the light sense.* Ophthalm. Rev. London I. S. 175.
5450. F. BOAS. *Die Bestimmung der Unterschiedsempfindlichkeit nach der Methode der übermerklichen Unterschiede.* Pflüger's Arch. Bd. 28. S. 562.
5451. — *Ueber die Grundaufgabe der Psychophysik.* Pflüger's Arch. Bd. 28. S. 566.
5452. — *Ueber die verschiedenen Formen des Unterschiedsschwellenwerthes.* Pflüger's Arch. Bd. 27. S. 214.
5453. — *Ueber die Berechnung der Unterschiedsschwellenwerthe nach der Methode der richtigen und falschen Fälle.* Pflügers Arch. Bd. 28. S. 84.
5454. A. CHARPENTIER. *Note complémentaire relative à l'influence de la surface sur la sensibilité lumineuse.* Arch. d'ophthalm. S. 487.
5455. G. TH. FECHNER. *Revision der Hauptpunkte der Psychophysik.* Leipzig.
5456. J. v. KRIES. *Ueber die Messung intensiver Gröfsen und über das sog. psychophysische Gesetz.* Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. VI. S. 257—294.  
1883.
5457. J. BJERRUM. *Untersuchungen über den Formen- und Lichtsinn.* Diss. Kopenhagen.
5458. A. CHARPENTIER. *Nouvelles recherches sur la perception des différences de clarté.* Compt. Rend. Bd. 97. S. 1373.
5459. — *Influence de la couleur sur la perception des différences de clarté.* Compt. Rend. Bd. 97. S. 1431.
5460. DELBOEUF. *Examen critique de la loi psychophysique.* Paris.

5461. W. WALDHÄUER. *Untersuchungen betr. die untere Reizschwelle Farbenblinder.* D. 64 S.
- 1884.
5462. J. BJERRUM. *Lichtsinnuntersuchungen.* Dtsch. med. Wochenschr. S. 706.
5463. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la perception des différences de clarté.* Arch. d'Opht. S. 400.
5464. — *La perception des différences successives de l'éclairage.* Compt. Rend. Bd. 99.
5465. O. E. ERDMANN. *Ueber ungleiche Ermüdung centraler und peripherischer Theile der Netzhaut.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. April u. Mai. S. 120.
5466. R. HILBERT. *Ortsbestimmung derjenigen Zone der Retina, in welcher Lichtobjecte am deutlichsten wahrgenommen werden.* Fortschr. d. Med. No. 24. S.
5467. E. MIÉVILLE. *Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux chromatique.* Arch. d'ophtalm. März April.
5468. H. PARINAUD. *Sur la sensibilité visuelle.* Compt. Rend. Bd. 99. S. 241.
5469. SAMBROHN. *Lichtsinnuntersuchungen.* Dtsch. med. Wochenschr. S. 706.
5470. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Commotio retinae. Herabsetzung des Lichtsinnes.* Klin. Mo. Bl. f. Augenheilkde. XII. Juni.
5471. L. WOLFFBERG. *Ueber Prüfung des centralen und peripheren Lichtsinnes.* Sitzg. d. physik.-med. Soc. zu Erlangen vom 12. Mai. — Ztschr. f. Instr.-Kde. IV. 1885.
5472. BRETON. *Mesure expérimentale de l'intensité des sensations lumineuses en fonction des quantités de lumière.* Ass. franç. Grenoble. XIV. (1.) S. 103—104. (2.) S. 226.
5473. A. CHARPENTIER. *Sur la mesure de l'intensité des sensations, en particulier des sensations colorées.* Compt. Rend. Bd. 100. S. 1248—1251.
5474. — *Relation entre la sensibilité lumineuse et l'éclairage ambiant.* Compt. Rend. Soc. de Biol. II. S. 475.
5475. — *La perception différentielle dans le cas des éclairages ordinaires.* Compt. Rend. Bd. 100. S. 361—362.
5476. — *La perception lumineuse simultanée.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II.
5477. J. HIRSCHBERG. *Ueber Gelbschen und Nachtblindheit der Ictericischen.* Berl. Wochenschr. No. 23.
5478. E. KRAEPELIN. *Zur Frage der Gültigkeit des Weberschen Gesetzes bei Lichtempfindungen.* Philos. Stud. II. S. 306—327. Nachtrag. S. 651—655.
5479. J. v. KRIES u. BRAUNECK. *Ueber einen Fundamentalsatz aus der Theorie der Gesichtsempfindungen.* du Bois' Arch. S. 79—84.
5480. L. ROY. *Examen du sens de la lumière d'après une méthode basée sur la dépendance du sens des couleurs vis-à-vis le sens de la lumière.* Rev. clin. d'ocul. V. S. 111.
5481. TH. TREITEL. *Ueber Hemeralopie und Untersuchung des Lichtsinnes.* Arch. f. Opht. XXXI. (1.) S. 139.
5482. — *Eine neue Methode der numerischen Bestimmung des Lichtsinnes.* Centralbl. f. Augenheilkde. Januar.
5483. — *Tafeln zur numerischen Bestimmung des Lichtsinnes.* Königsberg i. Pr.
5484. L. WOLFFBERG. *Ueber die Prüfung des Lichtsinnes.* Gräfe's Arch. XXXI. (1.) S.
5485. — *Demonstration eines Apparates zur centralen und perimetrischen Lichtempfindungsprüfung.* Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1885.
5486. W. WUNDT. *Ueber das Webersche Gesetz.* Wundt's Stud. Bd. II. S. 1—36. 1886.
5487. BERRY. *Day-blindness.* Edinb. med. Journ. XXXI. S. 1030.
5488. — *Night-blindness.* Edinb. med. Journ. XXXI. S. 1025.
5489. J. BJERRUM. *Bemærkning i anledning af en passage i Dr. Philipsen's Artikel om Hedsans. (Bemerkung wegen Dr. P.'s Abhandlung über den Lichtsinn.)* Hosp. Tid. S. 851.
5490. A. CHARPENTIER. *La sensibilité lumineuse et l'adaptation rétinienne.* Arch. d'ophtalm.
5491. — *Faits complémentaires relatifs à l'intensité des sensations lumineuses.* d'ophtalm. S. 289.
5492. A. ELSAS. *Ueber die Psychophysik.* Marburg.
5493. R. HILBERT. *Ueber die Erkenntlichkeit der Farben bei herabgesetzter Beleuchtung.* Memorab. Heft 1.
5494. A. KOHLER. *Ueber die hauptsächlichsten Versuche einer mathematischen Formulierung des psychophysischen Gesetzes von Weber.* Wundt's Stud. III. S. 572.

5495. A. LEHMANN. *Ueber die Anwendung der Methode der mittleren Abstufungen auf den Lichtsinn.* Philos. Stud. III. S. 497—533.  
 5496. H. PHILIPSEN. *Undersøgelse af øjets klarhedssans og denne undersøgelsses kliniske betydning og omraade.* (Die Untersuchung des Lichtsinnes und ihre klinische Bedeutung.) Hosp. Tid. No. 33—34.

1887.

5497. BRETON. *Mesure des sensations lumineuses en fonction des quantités de lumière.* Compt. Rend. Bd. 105, S. 426.  
 5498. A. CHARPENTIER. *Nouveaux faits sur la sensibilité lumineuse.* Arch. d'Ophthalm. VII. S. 13.  
 5499. H. EBBINGHAUS. *Die Gesetzmäßigkeit des Helligkeitscontrastes.* Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 994.  
 5500. G. TH. FECHNER. *Ueber die psychischen Maaßprincipien und das Weber'sche Gesetz.* Wundt's Philos. Studien. IV. S. 161—280.  
 5501. E. HERING. *Ueber Newton's Gesetz der Farbenmischung.* Lotos. VII. S. 177. — Sep. Leipzig, Freytag. 92 S.  
 5502. H. NEIGLICK. *Zur Psychophysik des Lichtsinnes.* Wundt's Philos. Stud. IV. S. 28—111.  
 5503. — *Sur quelques rapports entre la loi de Weber et les phénomènes de contraste lumineux.* Rev. Philos. Paris. XXIV. S. 180.  
 5504. SEGGER. *Schprobentafeln zur Prüfung des Lichtsinnes.* Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. Beil. zu klin. Monatsbl. f. Augenhlkde. XXV. S. 202—204.  
 5505. TH. TREITEL. *Ueber das Verhalten der normalen Adaptation.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 73.  
 5506. — *Ueber das Wesen der Lichtsinnsstörung.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (1.) S. 31.  
 5507. L. DE WECKER u. MASSELON. *Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chromatique et le sens lumineux.* Paris, Doin. 64 S.  
 5508. W. WUNDT. *Bemerkungen zu Neiglick's Aufsatz: Zur Psychophysik des Gesichtsinnes.* Philos. Stud. IV. S. 112—116.

1888.

5509. H. EBBERT. *Ueber den Einfluß der Schwellenwerthe der Lichtempfindung auf den Character der Spectra.* Wiedem. Ann. XXXIII. S. 136—155.  
 5510. A. E. FICK. *Studien über Licht und Farbenempfindung.* Pflüger's Arch. f. die ges. Physiol. XLIII. S. 441.  
 5511. A. KÖNIG u. E. BRODHUN. *Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn.* Sitzgs.-Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 917—931.  
 5512. S. P. LANGLEY. *Energy and vision.* Americ. Journ. of sc. XXXVI. S. 359.  
 5513. A. MEINONG. *Ueber Sinnestäuschung. Belege des Weber'schen Gesetzes.* Vierteljahresschr. f. wiss. Philos. XII. S. 1—31.  
 5514. J. MERKEL. *Die Abhängigkeit zwischen Reiz und Empfindung.* Wundt's Philos. Stud. IV. S. 541—595. V. S. 245—291, 499—557. (1889.)  
 5515. H. PARINAUD. *Échelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des couleurs.* Paris, Roulot.  
 5516. SEGAL, S. *Ueber die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut und eine einfache Methode zu deren Bestimmung.* (Russisch.) Russk. Mediz. No. 1 u. 2.  
 5517. SEGGER. *Schproben-Tafeln zur Prüfung des Lichtsinnes.* München. Litter.-artist. Anstalt.

1889.

5518. V. BASEVI. *Influensadell'adattamento sulla sensibilità retinica per la luce e per i colori.* Ann. di Ottalm. XVII. S. 475.  
 5519. H. EBBINGHAUS. *Ueber den Grund der Abweichungen von dem Weber'schen Gesetz bei Lichtempfindungen.* Pflügers Arch. XLV. S. 113.  
 5520. H. EBBERT. *Bemerkungen zu Herrn Langley's Aufsatz „Energy and vision“.* Wiedemann's Ann. XXXVI. (2.) S. 592.  
 5521. G. TH. FECHNER. *Elemente der Psychophysik.* 2. unveränd. Aufl., m. Hinweis auf d. Verf. spät. Arb. u. e. chronologisch geordneten Verzeichnis seiner sämmtl. Schriften. 2 Teile. Hrgb. v. W. Wundt. Breitkopf & Härtel. Leipzig. 346 u. 571 S.  
 5522. H. v. HELMHOLTZ. *Ueber das Eigenlicht der Netzhaut.* Verhandl. d. Physik. Ges. zu Berlin. VII. 13. S. 85.  
 5523. A. KÖNIG und E. BRODHUN. *Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn.* (2. Mitth.) Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. S. 641—644.

5524. S. P. LANGLEY. *Energy and Vision*. Philos. Mag. Jan. 1889. S. 1. — Ann. de Chim. et de Phys. XVII. 5. S. 62.  
 5525. F. C. MÜLLER-LYER. *Psychophysische Untersuchungen*. Du Bois-Reymond's Arch. Suppl. S. 91—141.  
 5526. O. MURANI. *Ricerche sperimentali sulla legge psicofisica di Fechner*. Rend. Lomb. (2.) XXII. S. 542.  
 5527. P. TANNERY. *Philosophie mathématique*. Rev. Philos. XXVII. S. 73—82.  
 5528. TH. TREITEL. *Ueber den Lichtsinn der Netzhautperipherie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 50—75.

## 1890.

5529. V. BASEVI. *Influenza dell'adattamento sulla sensibilità retinica per la luce e per i colori*. Ann. di Ottalm. XVIII. S. 475.  
 5530. H. EBBINGHAUS. *Ueber negative Empfindungswerthe*. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 337 bis 384, 463—485.  
 5531. G. TH. FECHNER. *Briefe über negative Empfindungswerthe*. Herausg. v. W. Preyer. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 29—46, 108—120.  
 5532. H. v. HELMHOLTZ. *Die Störung der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede durch das Eigenlicht der Netzhaut*. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 5—17.  
 5533. G. ITELSON. *Zur Geschichte des psychophysischen Problems*. Arch. f. Gesch. d. Philos. III. S. 282—290.  
 5534. M. RADAKOVIC. *Ueber Fechner's Ableitungen der psychophysischen Maßformeln*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIV. S. 1—26.  
 5535. O. SCHIRMER. *Ueber die Gültigkeit des Weber'schen Gesetzes für den Lichtsinn*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 4. S. 121—149.

## 1891.

5536. W. de W. ABNEY. *On the limit of visibility of the different rays of the spectrum*. Preliminary Note. Proceed. of the Roy. Soc. XLIX. S. 509—518.  
 5537. BJERRUM, J. *Eine Bemerkung über den Helligkeitssinn*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 37. (3.) S. 261—262.  
 5538. H. EBBINGHAUS. *Ein Mißverständniß*. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 335—336.  
 5539. H. v. HELMHOLTZ. *Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunterschiede trichromatischer Augen anzuwenden*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 1—20.  
 5540. — *Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechner'schen Gesetzes im Farbensystem*. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 1—80.  
 5541. — *Kürzeste Linien im Farbensystem*. Sitzgs.-Ber. der Berl. Akad. S. 1071—1083.  
 5542. E. LINDEMANN. *Ueber eine von Prof. Ceraschi angedeutete persönliche Gleichung der Helligkeitsvergleichen der Sterne*. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersburg. Bd. 1. (1.) S. 77—82.

## 1892.

5543. O. SCHIRMER. *Ueber die Adaptation im gesunden und kranken Auge*. Verhandl. d. X. internat. Kongresses. IV. S. 58.  
 5544. SCHTSCHEPOTIEW. *Beiträge zur Lehre über die Hemeralopie*. Wratsch. No. 44.  
 5545. A. STEFANINI. *Sulle leggi psicofisiche di Fechner e di Plateau*. Il Nuovo Cimento (3.) XXXI. 5/6. S. 235.  
 5546. TH. WERTHEIM. *Eine Beobachtung über das indirekte Sehen*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 172—174.  
 5547. CHR. WIENER. *Die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke*. Wied. Ann. Bd. 47. S. 659—670.  
 5548. — *Die Zerstreuung des Lichtes durch matte Oberflächen und die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke*. In: Festschrift der Technischen Hochschule zu Karlsruhe.

## 1893.

5549. W. de W. ABNEY. *The sensitiveness of the eye to light and colour*. Nature. Vol. XLV. S. 538—542.  
 5550. E. BRODHUN. *Die Gültigkeit des Newton'schen Farbenmischungsgesetzes bei dem grünblinden Farbensystem*. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 323—334.  
 5551. CH. HENRY. *Sur le minimum perceptible de lumière*. Compt. Rend. Bd. 116. S. 96—98.  
 5552. R. KATZ. *Beitrag zum Studium der peripherischen Lichtempfindlichkeit des Auges* (Russisch.) Westn. Ophthalm. Juli-Octbr.

5553. R. KATZ. *Apparat zur klinischen Prüfung der Lichtempfindlichkeit des Auges.* (Russisch.) Wratsch. No. 9.
5554. — *Apparat zur numerischen Bestimmung der centralen und peripheren Lichtempfindlichkeit des Auges (Lichtsinn-Perimeter).* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. März. S. 73—75.
5555. K. MARBE. *Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen.* Wundt's Philos. Stud. Bd. VIII. S. 615—637.
5556. K. PETRÉN. *Untersuchungen über den Lichtsinn.* Skand. Arch. f. Physiol. IV. S. 421—447. 1894.
5557. A. CATANIA. *Sull' essenza dell' emeralopia.* Arch. di Ottalm. I. 8/9.
5558. K. DEGENKOLB. *Versuche über den Einfluß einiger Genussmittel auf das Vermögen des Auges, feine Helligkeitsunterschiede wahrzunehmen.* Diss. Tübingen 1894.
5559. H. DRESEB. *Ueber die Beeinflussung des Lichtsinnes durch Strychnin.* Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmacol. XXXIII. 2/3. S. 251—260.
5560. P. L. GRAY. *The Minimum Temperature of Visibility.* Philos. Mag. XXXVII. No. 229. S. 549—557.
5561. W. A. HOLDEN. *Die Prüfung des Lichtsinnes in der Peripherie der Retina zu diagnostischen Zwecken.* Arch. of Ophthalm. XXIII. S. 40—49. Abgekürzte Uebers. Arch. f. Augenheilkde. XXX. 1. S. 57—61.
5562. MISLAWSKY. *Apparat zur Untersuchung der Empfindlichkeit der Retina für Helligkeitsdifferenzen.* Wratsch. No. 16.
5563. ROMANO. *Ueber das Wesen der Hemeralopie.* Arch. di Ottalm. I. S. 5—9.
5564. L. W. STERN. *Die Wahrnehmung von Helligkeitsveränderungen.* Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 249—278 u. 395—397.

## 2. Isochrome und heterochrome Photometrie.

- 1775.
5565. W. J. G. KARSTEN. *Untersuchungen über die ersten Gründe der Photometrie.* Münchener Akad. IX.
- 1814.
5566. J. FRAUNHOFER. *Bestimmung des Brechungs- und des Farbenzerstreuungsvermögens verschiedener Glasarten in Bezug auf die Vervollkommenung achromatischer Fernrohre.* Denkschr. der bayr. Akad. V. S. 211.
- 1825.
5567. PURKINJE. *Zur Physiologie der Sinne.* II. S. 109.
- 1852.
5568. \*H. W. DOVE. *Ueber den Einfluß der Helligkeit einer weißen Beleuchtung auf die relative Intensität verschiedener Farben.* Berl. Monatsber. S. 69—78. Pogg. Ann. LXXXV. S. 397—408. Inst. 1852. S. 193. Phil. Magaz. (4.) IV. S. 246—249. Arch. d. sc. phys. XXI. S. 215—219. Cosmos. I. S. 208—211.
5569. POUILLET. *Compt. Rend.* XXXV. S. 373—379. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 490—498. Inst. S. 301. Cosmos. I. S. 546—549.
- 1854.
5570. J. J. OPPEL. *Ueber den Einfluß der Beleuchtung auf die relative Lichtstärke verschiedener Farben.* Jahresber. des Frankf. Vereins. 1853—54. S. 44—49.
- 1855.
5571. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Zusammensetzung von Spectralfarben.* Pogg. Ann. XCIV. S. 18—21.
- 1862.
5572. H. AUBERT. *Ueber subjective Lichterscheinungen.* Pogg. Ann. CXVII. S. 638—641.
- 1863.
5573. v. WITTICH. *Ueber die geringsten Ausdehnungen, welche man farbigen Objecten geben kann, um sie noch in ihrer specifischen Farbe wahrzunehmen.* Königsberger Med. Jahrbücher. IV. S. 23—55.
5574. A. W. VOLKMANN. *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik.* Heft 1. Leipzig. 1869.
5575. F. A. KELLER. *Ueber die ungleiche Sichtbarkeit der Farben bei Dämmerlicht und die ungleiche photographische Arbeit derselben bei hellem Tageslicht.* Polyt. C. B. S. 1395. *Compt. Rend.* Bd. 69. S. 278—280.



5576. K. VIERORDT. *Beschreibung einer photometrischen Methode zur Messung und Vergleichung der Stärke des farbigen Lichtes.* Pogg. Ann. Bd. 137. S. 200.  
1870.
5577. A. v. HIPPEL. *Ueber ein Photometer.* Berl. klin. Woch. S. 424.
5578. LANDSBERG. *Des effets de la lumière des lampes sur la vue.* Bull. d'encourag. des sc. S. 310.
5579. K. VIERORDT. *Die Messung der Lichtabsorption durchsichtiger Medien mittelst des Spektralapparats.* Pogg. An. Bd. 140. S. 172.  
1871.
5580. K. VIERORDT. *Die Anwendung des Spectralapparates zur Messung und Vergleichung der Stärke des farbigen Lichtes.* Tübingen.  
1872.
5581. W. DOBROWOLSKY. *Ueber gleichmäßige Ab- und Zunahme der Lichtintensität verschiedener Spectralfarben bei gleichmäßiger Ab- und Zunahme der Lichtstärke des Gesammlichtes.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 92—98.
5582. H. HELMHOLTZ. *Ueber Versuche des Herrn Dobrowolsky, die Empfindlichkeit des Auges gegen Unterschiede der Lichtintensität verschiedener Spectralfarben betreffend.* Monatsber. d. Berl. Akad. Sitz. v. 19. Febr. 1872. S. 119—122.  
1873.
5583. YVON. *Ein auf die Reliefempfindung gegründetes Photometer.* Pogg. Ann. Bd. 14 S. 334. Compt. Rend. T. 75. S. 1102.  
1874.
5584. C. BOHN. *Photometrische Untersuchungen. (Helligkeit der Farben, Unterschiedsempfindlichkeit, Grenzen der Farbenempfindung u. A.)* Pogg. Ann. Ergänzungsbd. V. S. 386.
5585. v. ZAHN. *Ueber die photometrische Vergleichung verschiedenfarbiger Lichtquellen.* Sitzgs.-Ber. d. Naturf. Ges. zu Leipzig. No. 3 u. 4.  
1875.
5586. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Lichtstärke der Farben im Centrum und auf der Peripherie der Netzhaut. (Russisch.)* Petersab. Med. An. No. 31—35.
5587. — *Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensität der Farben (Farbensinn) im Centrum und auf der Peripherie der Netzhaut.* Pflüger's Arch. Bd. XII. S. 441—471.  
1876.
5588. GOUY. *Recherches photométriques sur les flammes colorées.* Compt. Rend. Bd. 7 S. 269—272.
5589. TRANNIN. *Photometrische Messungen in den verschiedenen Theilen des Spectrums.* Journ. de phys. théor. et prat. V. S. 297.  
1877.
5590. A. CHARPENTIER. *Nouvel instrument pour l'exploration de la sensibilité rétinienne.* Gaz. Méd. de Paris.
5591. A. RICCO. *Relazione fra il minimo angolo visuale e l'intensità luminosa.* Atti della Accad. di sc. di Modena. VIII. § 8.
5592. S. P. THOMPSON. *On the relative apparent brightness of objects in binocular and monocular vision.* Rep. Brit. Assoc. f. the advanc. of Sc.  
1878.
5593. E. BRÜCKE. *Ueber einige Empfindungen im Gebiete des Sehnerven.* Wien. Ber. Bd. 71 Abth. 8.
5594. O. N. ROOD. *On the photometric comparison of light of different colours.* Journ. 3. XV. S. 81.  
1879.
5595. A. CHARPENTIER. *Sur la sensibilité de l'oeil à l'action de la lumière colorée, plus ou moins additionnée de lumière blanche et sur la photométrie des couleurs.* Gaz. med. No. 9. — Compt. Rend. Bd. 88. S. 299.  
1880.
5596. J. W. DRAPER. *On a new standard of light.* Phil. Mag. (5.) IX. S. 76. — Journ. asiat. Soc. of Bengal. XLVIII. S. 83—94.
5597. J. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *Etude sur la distribution de la lumière dans le spectre solaire.* Compt. Rend. Bd. 91. S. 623—625.

5598. J. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *De la distribution de la lumière dans le spectre solaire (spectre des Daltoniens)*. Compt. Rend. Bd. 91. S. 1078—1080. Rev. méd. franç. et étrang. 15. Jan. 1881.
5599. NAPOLI. *Un nouveau photomètre*. Séances de la Soc. franç. de Physique, séance du 19. mars.
5600. L. SCHWENDLER. *Eine neue Lichteinheit*. Journ. asiat. Soc. of Bengal. 48. S. 83 bis 94. (1879.) — Beibl. z. d. Ann. d. Phys. u. Chem. IV. 4. S. 280.  
1881.
5601. O. BECKER. *Ueber heterochrome Photometrie*. Ber.üb. d. XIII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. (Rostock.) S. 167—172.
5602. E. v. BRÜCKE. *Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie*. (2. Abh.) Wien. Akad. Ber. Bd. 84 (3.) S. 425—458.
5603. A. CHARPENTIER. *Sur la sensibilité visuelle dans ses rapports avec la sensibilité lumineuse et la sensibilité chromatique*. Gaz. d. Hôpit. No. 2. S. 21. — The Med. Record. 16. April.
5604. — *Sur la quantité de lumière nécessaire pour percevoir la couleur d'objets de différentes surfaces*. Compt. Rend. Bd. 92. No. 2. S. 92—94. Rev. méd. No. 9.
5605. — *Remarques sur la sensibilité de l'oeil aux différences de lumière successives*. Arch. d'ophthalm. franç. I. No. 2. S. 152—156.
5606. A. CROVA. *Comparaison photométrique des sources lumineuses de teintes différentes*. Compt. Rend. Bd. 93. No. 13. S. 512.
5607. — *Étude sur les spectrophotomètres*. Compt. Rend. Bd. 92. No. 1. S. 36.
5608. A. CROVA u. LAGARDE. *Détermination du pouvoir éclairant des radiations simples*. Compt. Rend. Bd. 93. No. 23. S. 959—961. Journ. de phys. (2.) I. S. 162—169. (1882.)
5609. W. DOBROWOLSKY. *Ueber die Veränderung der Empfindlichkeit des Auges gegen Spektralfarben, bei wechselnder Lichtstärke derselben*. Pflüger's Arch. XXIV. S. 189—202.
5610. H. KRÜSS. *Photometer und Helligkeitsmessungen*. Centralztg. f. Opt. u. Mechan. No. 1, 2, 3.
5611. S. P. LANGLEY. *Ueber die Vertheilung der Energie im normalen Sonnenspectrum*. Compt. Rend. Bd. 92. S. 701—703. Bd. 93. S. 140—143.
5612. J. MACÉ DE LÉPINAY u. W. NICATI. *Recherches sur la comparaison photométrique des diverses parties d'un même spectre*. Ann. de Chim. et de Phys. (5). XXIV. S. 289—336.  
1882.
5613. A. CHARPENTIER. *Étude de l'influence de la coloration sur la visibilité des points lumineux*. Arch. d'ophthalm. S. 542.
5614. — *Sur la visibilité des points lumineux*. Compt. Rend. Bd. 95. S. 148.
5615. — *Description d'un photopomètre différentiel*. Arch. d'Ophthalm. S. 418.
5616. H. COHN. *Ueber Farbenempfindungen bei schwacher künstlicher Beleuchtung*. Arch. f. Augenheilkde. Bd. 11. S. 283.
5617. J. KRAMER. *Untersuchungen über die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Art und dem Grade der Beleuchtung*. Dissert. Marburg.
5618. J. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *Recherches expérimentales sur le phénomène de Purkinje*. Journ. de Phys. (2.) I. S. 33. — Crón. cicat. Barcelona. V. S. 241.
5619. — *Relation entre la loi de Bouguer-Masson et le phénomène de Purkinje*. Compt. Rend. Bd. 94. S. 785.
5620. ROSENSTIEHL. *De l'intensité relative des couleurs*. Séances de la Soc. franç. de Phys. April-Juli. S. 103.
5621. — *De l'emploi des disques tournants pour l'étude des sensations colorées: intensité relative des couleurs*. Compt. rend. T. 94. S. 1411.  
1883.
5622. H. AUBERT. *Die Helligkeit des Schwarz und Weiß*. Pflüger's Arch. XXXI. S. 223.
5623. CONVOY. *A new Photometer*. Philos. Mag. S. 423.
5624. A. CROVA. *Description d'un spectrophotomètre*. Ann. de Chim. et Phys. S. 556.
5625. J. MACÉ DE LÉPINAY. *Sur une méthode pratique pour la comparaison photométrique des sources usuelles diversement colorés*. Compt. Rend. Bd. 97. S. 1428.
5626. SABINE. *On a Wedge- and Diaphragm-Photometer*. Philos. Mag. Januar. S. 22.

5627. L. WEBER. *Mittheilung über einen photometrischen Apparat.* Wiedem. Ann. XX. S. 326.  
 5628. H. WILD. *Ueber die Umwandlung meines Photometers in ein Spectrophotometer.* Wiedem. Ann. XX. S. 452.

1884.

5629. O. B. BULL. *Untersuchungen über Lichtperception und Photometrie.* Dtsch. med. Wochenschr. S. 705.  
 5630. A. CHARPENTIER. *Note additionnelle relative à une modification de mon photomètre différentiel.* Arch. d'Ophthalm. S. 307.  
 5631. A. CROVA. *Sur un photomètre à diffusion.* Compt. Rend. Bd. 99. S. 1115.  
 5632. J. v. KRIES. *Bemerkungen zu der Arbeit von Aubert „Die Helligkeit des Schwarz und Weiß“.* Pfüger's Arch. XXXIII. S. 248.  
 5633. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *Recherches sur la comparaison photométrique de diverses parties d'un même spectre.* Ann. de Chim. et Phys. (5.) XXX. S. 145.  
 5634. H. PARINAUD. *De l'intensité lumineuse des couleurs spectrales; influence de l'adaptation rétinienne.* Compt. rend. Bd. 99. S. 937.  
 5635. W. H. PREECE. *On a new standard of illumination and the measurement of light.* Proceed. of the Roy. Soc. London. Bd. 36. S. 270.  
 5636. L. WEBER. *Die photometrische Vergleichung ungleichfarbiger Lichtquellen.* Elektrotechn. Zeitschr. April.  
 5637. W. ZENKER. *Das neue Spectrophotometer von Crova, verglichen mit dem von Glan, nebst einem Vorschlag zur weiteren Verbesserung beider Apparate.* Zeitschr. f. Instrumentenkde. IV. S. 88—87.

1885.

5638. A. CHARPENTIER. *Sur la distribution de l'intensité lumineuse et de l'intensité visuelle dans le spectre solaire.* Compt. Rend. Bd. 101. S. 182.  
 5639. J. JOLY. *On Photometers made of solid paraffin or other translucent substances.* Scient. Proc. Roy. Dublin. Soc. Vol. IV. (7.) S. 345—346.  
 5640. WM. E. WARRAND. *Black and White.* Nature. XXXII. S. 245.

1886.

5641. W. DE W. ABNEY und E. R. FESTING. *Colour Photometry.* Proceed. of the Roy. Soc. of London. XLI. S. 238.  
 5642. — *Colour Photometry.* Philos. Transact. Vol. 177. S. 423—456.  
 5643. H. ARMAIGNAC. *Ecran graduateur de la lumière.* Rev. clin. d'Ocul. No. 1. S. 5.  
 5644. A. CHARPENTIER. *Sur une condition physiologique influençant les mesures photométriques.* Compt. Rend. Bd. 103. S. 130—131.  
 5645. — *L'intensité des sensations lumineuses.* Arch. d'Ophthalm. V. S. 27.  
 5646. G. COLASANTI und G. MENGARINI. *Il fenomeno spectrale fisiologico.* Lincei Mem. (4.) III. S. 65—77.  
 5647. A. KÖNIG. *Ueber einige neue Photometer.* Verhandl. d. Physik. Ges. zu Berlin. 22. Jan.

1887.

5648. E. BRODHUN. *Beiträge zur Farbenlehre.* Diss. Berlin.  
 5649. E. LOMMEL. *Die Photometrie der diffusen Zurückwerfung.* Münch. Acad. Ber. S. 95—132.  
 5650. *De la quantité de la lumière nécessaire à la vision normale.* Bull. internat. de l'électr. Heft 7.

1888.

5651. W. DE W. ABNEY und E. R. FESTING. *Colour Photometry.* Proceed. of the Roy. Soc. XLIV. S. 237.  
 5652. — *Colour Photometry.* Philos. Transact. Vol. 179.  
 5653. A. KIRSCHMANN. *Ein photometrischer Apparat zu psychophysischen Zwecken.* Wundt's Philos. Stud. V. S. 292—300.  
 5654. A. LEHMANN. *Ueber Photometrie mittelst rotirender Scheiben.* Philos. Stud. IV. S. 231—240.

1889.

5655. W. DE W. ABNEY. *On the measurement of the luminosity and intensity of light reflected from coloured surfaces.* Philos. Mag. (5.) XXVII. No. 164. S. 62—69.  
 5656. F. HILLEBRAND. *Ueber die spezifische Helligkeit der Farben (mit Vorbemerkungen von E. Hering).* Sitzgs.-Ber. d. k. Acad. d. Wiss. in Wien. Bd. 98. Abth. 3 (1—4.) S. 70—120.

5657. A. KIRSCHMANN. *Ueber die Helligkeitsempfindung im indirecten Sehen.* Philos. Stud. V. S. 447—497.  
 5658. O. LUMMER und E. BRODHUN. *Photometrische Untersuchungen. I. Über ein neues Photometer.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. S. 41—50. *II. Lichtmessung durch Schätzung gleicher Helligkeitsunterschiede, Contrastphotometer.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. IX. 12. S. 461—465.  
 5659. — *Ersatz des Photometerfleckes durch eine rein optische Vorrichtung.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. IX. 2. S. 28—25. Naturw. Rundsch. IV. 7. S. 81.

1890.

5660. E. BRÜCKE. *Ueber zwei einander ergänzende Photometer.* Zeitschr. f. Instr.-Kde. X. S. 11—16.  
 5661. G. MENGARINI. *Ueber das Maximum der Lichtstärke im Sonnenspectrum.* Moleschott's Unters. XIV. 2. S. 119.

1891.

5662. A. KÖNIG. *Ueber den Helligkeitswerth der Spectralfarben bei verschiedener absoluter Intensität.* Nach gemeinsam mit R. Ritter ausgeführten Versuchen. In: Beiträge zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Helmholtz-Festschr. S. 309 bis 388. — Auch separat. Hamburg. L. Voss.

1892.

5663. W. DE W. ABNEY and E. R. FESTING. *Colour Photometry.* Phil. Transact. Vol. 188. S. 581—565.  
 5664. J. H. LAMBERT. *Photometrie (Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae 1760).* Deutsch herausgegeben von E. Anding. Erstes Heft (Theil I und II). 135 S. mit 35 Fig. Zweites Heft (Theil III, IV und V) 112 S. m. 32 Fig. Drittes Heft (Theil VI und VII) 172 S. mit 8 Fig. W. Engelmann. Leipzig.  
 5665. E. W. LEHMANN. *Ueber ein Photometer.* Dissert. Erlangen. 24 S.  
 5666. O. LUMMER und E. BRODHUN. *Photometrische Untersuchungen. V. Über ein neues Spektralphotometer.* Zeitschr. f. Instrumentenkde. S. 133—140.  
 5667. A. PALAZ. *Traité de photométrie industrielle spécialement appliquée à l'éclairage électrique.* 280 S. Georges Carré, Paris.  
 5668. M. SACHS. *Ueber den Einfluß farbiger Lichter auf die Weite der Pupille.* Pflüger's Arch. Bd. 52. S. 79—86.  
 5669. CH. WIENER. *Die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke.* Wied. Ann. Bd. 47. S. 659—670.

1893.

5670. E. GRUBER. *Untersuchungen über die Helligkeit der Farben.* Wundt's Philos. Stud. IX. S. 429—446.  
 5671. A. A. MAYER. *Studies of the Phenomena of Simultaneous Contrast Colour, and on a Photometer for Measuring the Intensities of Lights of different Colours.* Philos. Mag. XXXVI. No. 219. S. 153—175. Americ. Journ. of sc. Vol. XLVI. July.  
 5672. O. N. ROOD. *On a photometric method which is independent of colour.* Americ. Journ. of Sc. Vol. XLVI. S. 173—176.  
 5673. M. SACHS. *Eine Methode der objectiven Prüfung des Farbensinnes.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 3. S. 108—125.  
 5674. S. P. THOMPSON. *Some Notes on Photometry.* Philos. Mag. (5.) XXXVI. S. 120—129.  
 5675. A. P. TROTTER. *A new Photometer.* Philos. Mag. (5.) XXXVI. No. 218. S. 82—88.

### 3. Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtung.

1858.

5676. A. C. TWINING. *The relation of illumination to magnifying power, when visibility is maintained.*

1861.

5677. H. AUBERT. *Beiträge zur Physiologie der Netzhaut.* Abhandl. d. schles. Ges. S. 49—103.

1872.

5678. KLEIN. *De l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle.* Paris. 108 S. Ausz. in Journ. de l'Anat. et Physiol. 1873. 3. S. 317—325.

1876.

5679. E. CARP. *Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung nebst einer neuen Methode, den Lichtsinn zu messen.* Marburg.  
 5680. W. DOERINGKEL. *Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung.* Marburg.  
 5681. A. POSCH. *Ueber Sehschärfe und Beleuchtung.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 14.

1877.

5682. E. JAVAL. *Mesure de l'acuité visuelle en tenant compte de l'éclairage.* Gaz. hebdom. S. 398. Gaz. d. Hôpit. S. 509. Gaz. Méd. S. 337.  
 5683. A. RICCÒ. *Relazione fra il minimo angolo visuale e l'intensità luminosa.* Annal d'Ottalm. Ann. VI. f. 3.  
 5684. — *Ueber die Beziehungen zwischen dem kleinsten Sehwinkel und der Lichtintensität.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 122–126.

1878.

5685. G. ALBERTOTTI. *Ueber das Verhältniß zwischen V (Sehschärfe) und L (Helligkeit).* Ann. di Ottalm. I. S. 1–18.

1879.

5686. E. JAVAL. *Essai sur la physiologie de la lecture.* Cap. 5. *Influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle.* Ann. d'Ocul. Januar bis Juni.

1881.

5687. H. PARINAUD. *Détermination numérique de l'acuité visuelle pour les couleurs et la lumière.* Chromoptomètre. Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 113–134.

1883.

5688. A. CHARPENTIER. *Expériences relatives à l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle.* Arch. d'Ophthalm. III. S. 397.

5689. H. COHN. *Untersuchungen über die Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung.* Sitzgs.-Ber. d. schles. Ges. 16. Nov. Bresl. ärztl. Ztg.

5690. W. MACÉ DE LÉPINAY und W. NICATI. *Recherches sur la comparaison photométriques des diverses parties d'un même spectre.* Ann. de Chim. et Phys. 5. Serie. XXX.

1884.

5691. H. COHN. *Untersuchungen über die Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung.* Arch. f. Augenheilkde. XII. 2/3. S. 223.

5692. L. WEBER. *Die photometrische Vergleichung ungleichfarbiger Lichtquellen.* Elektrotechn. Zeitschr. April.

1885.

5693. A. KÖNIG. *Ueber die Beziehungen zwischen der Sehschärfe und der Beleuchtungsintensität.* Verhandl. d. physik. Ges. in Berlin. No. 16 Sitzg. v. 4. Dec.

5694. B. KOLBE. *Ueber den Einfluß der relativen Helligkeit und der Farbe des Papiers auf die Sehschärfe.* (Russisch.) Chodin's Westn. Oftalm. Bd. II. S. 289. Pflüger's Arch. XXXVII. S. 562–581.

5695. W. UHTHOFF. *Ueber das Verhältniß der Sehschärfe zur Beleuchtungsintensität.* Verhandl. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 6, 7, 8. Sitzg. a. 13. Febr. — Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 231.

1886.

5696. H. COHN. *Ueber Sehschärfe bei photometrirtem Tageslicht und den Polarisationsepiskotister.* Tagebl. d. LIX. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzt. in Berlin. S. 222. — Ber. üb. d. XVIII. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 2. — Aerztl. Intelligenzbl. München. XXXIII. S. 586.

5697. J. ROSENTHAL. *Ueber Beleuchtung und den Zusammenhang derselben mit der Sehschärfe.* Tagebl. d. LIX. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 416.

5698. W. UHTHOFF. *Ueber das Abhängigkeitsverhältniß der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität.* v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (1.) S. 171.

1888.

5699. J. BJERRUM. *Bemærkninger om formindskelse af synsstyrken samt kliniske iagttagelser angaaende forholdet mellem synsstyrke, klarhedssans og farvesans. (Bemærkninger über Verminderung der Sehschärfe nebst klinischen Beobachtungen über das Verhältniß m Sehschärfe, Lichtsinn und Farbensinn.)* Nord. oftalm. Tidsskr. I. S. 95.

5700. J. TALKO. *Die Sehschärfe des Auges während der vollkommenen Sonnenfinsterniß untersucht.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 481.

1889.  
 5701. A. KÖNIG. *Ueber die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Lichtintensität bei specularer Beleuchtung.* Verhandl. physik. Ges. Berlin. VIII. S. 9—12.  
 1890.  
 5702. W. UHTHOFF. *Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Intensität, sowie von der Wellenlänge im Spektrum.* Graefe's Arch. f. Ophthalm XXXVI. Abt. 1. S. 33—61.  
 1892.  
 5703. A. KARVEZKI. *Du rapport entre l'intensité de l'éclairage et l'acuité visuelle.* (Russisch.) Thèse. St. Petersburg.

#### 4. Irradiation.

1519.  
 5704. LIONARDO DA VINCI. *Trattato della pittura.* Paris. 1651.  
 1595.  
 5705. MÄSTLINUS. *Disput. de pass. planet.* Thes. 148.  
 1602.  
 5706. TYCHO BRAHE. *Tychonis Brahe Dani Astronomiae instauratae Progymnasmata.* Prag, cap. I.  
 1604.  
 5707. KEPLER. *Ad Vitellionem Paralipomena.* Frankfurt. S. 39, 200, 217—221, 285, 286, 445—446.  
 1610.  
 5708. GALILEI. *Sydercus Nuncius.*  
 1611.  
 5709. GALILEI. *Continuazione del Nunsio sidereo.*  
 5710. — *Lettera at Padre Christoforo Grienberger.*  
 1612.  
 5711. GALILEI. *Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari.* Roma 1613.  
 1618.  
 5712. D'AGUILON. *Francisci Aguiloni opti corum libri sex.* Antwerpen. H. IV. S. 225.  
 1619.  
 5713. GALILEI. *Discorso delle comete di Mario Guiducci.* Opere II. S. 256, und 396.  
 Systema cosmicum. Lyon 1641. Dial. III. S. 248.  
 5714. SARRSIUS. *Libra astronomica ac philosophica.* Perusiae.  
 5715. SCHKINER. *Oculus, hoc est fundamentum opticum.* Oeniponti. S. 132 u. 133.  
 1628.  
 5716. GALILEI. *Il saggiatore.* Rom. Opere di Galileo Galilei, Florenz 1718. II. S. 299, 329 u. 392—400.  
 1626.  
 5717. SARRSIUS. *Ratio ponderum librae et simbellae etc.* Paris. S. 183.  
 1630.  
 5718. CASTELLI. *Extrait d'une lettre.* Opere di Galileo Galilei, Florenz 1852. IX. S. 206.  
 1681.  
 5719. GASSENDI. *Mercurius in sole visus.* Paris. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. IV. S. 499.  
 1682.  
 5720. GALILEI. *Dialoghi quattro sopra i due massimi sistemi del mondo.* Florenz, Dial. 3.  
 5721. SCHICKARD. *Para responsi ad epistolas P. Gassendi de Mercurio sub sole viso.* Tubingae. (Der Planet wird durch Irradiation verkleinert.)  
 1686.  
 5722. GASSENDI. *Epistola prima de apparente magnitudine solis humilis et sublimis.* Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia Lyon 1658. III. S. 421 u. 422.  
 1687.  
 5723. DESCARTES. *Dioptrique.* Leyde. Discours VI. S. 67 u. 68.  
 1640.  
 5724. GASSENDI. *Epistola secunda de apparente magnitudine solis humilis et sublimis.* Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. III. S. 422—431.

1641.  
 5725. GASSENDI. *Epistola tertia de apparente magnitudine solis humilis et*  
 Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. III. S. 456 u. 457.  
 1642.  
 5726. GASSENDI. *Epistola III de proportionibus, qua gravitas decidentia acceleratur.*  
 omnia. III. S. 585.  
 1647.  
 5727. HEVELIUS. *Selenographia, sive lunae descriptio.* Gedani.  
 1648.  
 5728. PLEMPICIUS. *Ophthalmographia, sive tractatio de oculo.* 2. édit. Louvain IV.  
 1658.  
 5729. GASSENDI. *Physica.* Sect. II. L. II, chap. V. Petri Gassendi opera  
 Lyon 1658. L. S. 572—575, 580 u. 581.  
 1659.  
 5730. HUYGENS. *Christiani Hugensii systema saturnium.* Hagae comitis. S. 7.  
 1662.  
 5731. HORROX. *Venus in sole visa.* Gedani.  
 1667.  
 5732. H. FABRI. *Synopsis optica, in qua etc.* Lyon. Propos. VIII, XIV, XVII et  
 XVIII et coroll. 1, 2, 3.  
 1674.  
 5733. MILLIET DECHALES. *Cursus seu mundus mathematicus.* Lyon. Theil 0  
 propos. 26.  
 1685.  
 5734. ZAHN. *Oculus artificialis teledioptricus etc.* Herbipolis.  
 1699.  
 5735. DE LA HIRE. *Observation d'une éclipse de l'Oeil du Taureau etc.* M.  
 l'Acad. d. sc. de Paris.  
 1738.  
 5736. JURIN. *On distinct and indistinct vision.* Smith's Optics. § 53.  
 1739.  
 5737. GRANDJEAN DE FOUCHY. *De atmosphaera Lunari.* Phil. Transact. XLI S.  
 1743.  
 5738. DELISLE. *Extrait d'une lettre écrite de Pétersbourg le 24 août 1743, et*  
*à Cassini.* Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 419.  
 1748.  
 5739. LE MONNIER. *Extrait des observations de la dernière éclipse annulaire du*  
*25 juillet 1748, observée en Écosse etc.* Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris.  
 1751.  
 5740. HAMBERGER. *Physiologia medica.* Jena.  
 1762.  
 5741. DE LALANDE. *Observation qui prouve que le diamètre apparent de Vénus ne*  
*pas sensiblement, lors même qu'il est vu sur le disque lumineux du soleil.* M.  
 l'Acad. d. sc. de Paris.  
 1770.  
 5742. DE LALANDE. *Explication du prolongement obscur du disque de Vénus,*  
*aperçoit dans ses passages sur le soleil.* Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris.  
 1782.  
 5743. F. W. HERSCHEL. *On the diameter and magnitude of the Georgium Sidus*  
*a description of the dark and lucid disk and periphery micrometers.* Phil. T.  
 1783. I. S. 4.  
 1784.  
 5744. LE GENTIL. *Sur la grandeur apparente des corps opaques vus sur un fond*  
*ou autrement.* Mém. de l'Acad. des sc. de Paris. 1784: S. 469.  
 1810.  
 5745. HASSENFRATZ. *Cours de physique céleste.* S. 23.  
 1811.  
 5746. BIOT. *Traité élémentaire d'astronomie physique.* Edit. 2<sup>me</sup>. S. 534, 536.  
 1818.  
 5747. ARAGO. *Sur l'irradiation. Note inédite. Oeuvres complètes.* XI. S. 535.

1814.  
5748. DELAMBRE. *Astronomie théorique et pratique*. T. II. Chap. 26. § 197. T. III. Chap. 29. § 12.
1820.  
5749. DE ZACH. *Éclipse annulaire du soleil, le 7. septembre 1820*. *Correspond. astronom.* IV. S. 171.
1821.  
5750. L. L. VALLÉE. *Traité de la science du dessin*. Paris. IV chap. VI u. VII.
1826.  
5751. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns*. S. 400.
1828.  
5752. BRANDES. *Gehler's neues Physik*. Wörterbuch. V. S. 796.  
5753. J. HERSCHEL. *On light*. I. § 697.  
5754. LEROY. *Vision centrale, irradiation et acuité visuelle*. *Arch. d'ophthalm.*  
5755. J. SOUTH. *On the occultation of  $\delta$  Piscium by the moon, observed in Blackman-Street, etc.; references to recorded observations of occultations, in which peculiarities have been apparently seen, either at the Moon's limb or upon her disk; etc.* *Mém. of the Astron. Soc. of London*. III. 1829. S. 303.
1829.  
5756. QUETELET. *Positions de physique*. III. S. 81.
1830.  
5757. HIOBT. *De functione retinae*. Christiania. 2. Theil. §§ 6 u. 61.
1831.  
5758. ROBINSON. *On Irradiation*. *Mem. of the Astronom. Soc. of London*. V. S. 1.  
5759. JOSLIN. *On Irradiation*. *Transact. of the Americ. Philos. Soc.* N. S. IV. (3) S. 340.
1832.  
5760. BESSEL. *Durchgang des Merkur durch die Sonne*. *Astronomische Nachrichten*. Bd. X. S. 187.
5761. D. BREWSTER. *On the undulations excited in the retina by the action of luminous points and lines*. *Philos. Mag.* (3.) I. S. 169.
1838.  
5762. \*J. PLATEAU. *Mémoire sur l'irradiation*. *Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxelles*. T. XI. *Pogg. Ann.* Erg.-Bd. I. S. 79, 193, 406.
1839.  
5763. J. PLATEAU. *Note sur l'irradiation*. *Bull. de l'Acad. de Belg.* VI. (1.) S. 501.  
5764. — *Deuxième note sur l'irradiation*. *Bull. de l'Acad. de Belg.* VI. (2.) S. 102.
1840.  
5765. G. TH. FECHNER. *Von der sog. Irradiation*. *Pogg. Ann.* L. S. 195.
1842.  
5766. VALZ. *Éclipse solaire du 8 juillet*. *Bull. de l'Acad. de Belg.* IX. (2.) S. 288.
1849.  
5767. BADEN POWELL. *On irradiation*. *Memoirs of the London astronom. Society*. XVIII. S. 69. — *Inst.* No. 818. S. 288. No. 840. S. 47. — *Report of Brit. Assoc.* 2. S. 21.
1850.  
5768. W. HAIDINGER. *Das Interferenzschachbrettmuster und die Farbe der Polarisationsbüschel*. *Wien. Ber.* VII. S. 389 u. 396. *Pogg. Ann.* LXXXV. S. 350. — *Cosmos*. I. S. 252, 454. (Fall von Irradiation, vermischt mit monochromatischen Abweichungen.)  
5769. PETRIE. *On the powers of minute vision. Results from experiments for determining the best sort of station-marks, etc.* *Report of the British Assoc.* II. S. 183.
1851.  
5770. H. W. DOVE. *Ueber die Ursache des Glanzes und der Irradiation, abgeleitet aus chromatischen Versuchen mit dem Stereoskop*. *Pogg. Ann.* LXXXVIII. S. 169. — *Berl. Monatsber.* S. 252. — *Phil. Mag.* (4.) IV. S. 241. — *Arch. d. sc. phys. et nat.* XXI. S. 209. — *Inst.* No. 991. S. 421.
1852.  
5771. \*H. WELCKER. *Ueber Irradiation und einige andere Erscheinungen des Sehens*. Gießen.  
5772. FLIEDNER. *Beobachtungen über Zerstreuungsbilder im Auge, sowie über die Theorie des Sehens*. *Pogg. Ann.* LXXXV. S. 348.



5773. TROUESSART. *Note concernant ses recherches sur la théorie de la vision.* Compt. Rend. XXXV. S. 134—136. — Arch. d. sc. phys. XX. S. 305—306.
5774. L. L. VALLÉE. *De la vision considérée dans les influences en quelque sorte moléculaires exercées dans les réfractions, et du phénomène de l'irradiation.* Compt. Rend. XXXV, S. 679—681.
- 1853.
5775. FLIEDNER. *Zur Theorie des Sehens.* Pogg. Ann. LXXXIII. S. 29.
5776. A. CRAMER. *Bydrage tot de verklaring der zoogenaamde irradiatie - verschynselen.* Nederl. Lancet (3.) III. S. 551.
5777. H. MEYER. *Ueber die sphärische Abweichung des menschlichen Auges.* Pogg. Ann. LXXXIX. S. 540—568. — Fechner's Centralbl. S. 864.
- 1854.
5778. F. BURCKHARDT. *Zur Irradiation.* Verhandl. d. naturf. Ges. z. Basel. I. S. 154—157.
5779. TROUESSART. *Recherches sur quelques phénomènes de la vision.* Brest. S. 130 u. 336.
- 1855.
5780. A. CRAMER. *Beitrag zur Erklärung der sog. Irradiationserscheinungen.* Prag. Vierteljahrschr. IV. S. 50—70.
5781. F. BURCKHARDT. *Ueber den Gang der Lichtstrahlen im Auge.* Verhandl. d. naturf. Ges. in Basel. II. S. 269.
- 1856.
5782. VAN BREDÁ. *Eenige waarnemingen over de zoogenaamde nabeelden.* Akad. van Wetensch. van Amsterdam. afd. Natuurk. V. S. 342.
5783. A. FICK. *Einige Versuche über die chromatische Aberration des menschlichen Auges.* Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 70—76.
- 1857.
5784. A. W. VOLKMANN. *Ueber Irradiation.* Ber. d. sächs. Ges. S. 129.
- 1858.
5785. RESPIGHI. *Sulla irradiazione oculare.* Mem. del Istituto di Bologna. IX. S. 513.
- 1859.
5786. ARAGO. *De l'influence des lunettes sur les images.* Oeuvres complètes. XI. S. 305 u. 307.
- 1861.
5787. H. AUBERT. *Beiträge zur Physiologie der Netzhaut.* Abhandl. d. Schlesischen Ges. S. 49. § 4—8.
5788. FAYE. *L'irradiation peut-elle réconcilier l'hypothèse des nuages solaires avec les faits observés pendant les éclipses totales?* Compt. Rend. LII. S. 85.
5789. A. W. VOLKMANN. *Ueber den Einfluss der Extension eines Lichtreizes auf dessen Erkennbarkeit.* Gött. Nachr. S. 170—176.
5790. — *Ueber die Irradiation, welche auch bei vollständiger Accommodation des Auges stattfindet.* Münch. Ber. 2. S. 75—78.
- 1866.
5791. E. MACH. *Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut.* Wien. Ber. LII. (2.) S. 303—322.
5792. A. PROCTOR. *Deceptive figures; with remarks on Saturn's „square shouldered“ phase.* Int. Obs. X. S. 23—27.
- 1867.
5793. E. MACH. *Ueber den physiologischen Effect räumlich vertheilter Lichtreize.* Wien. Akad. Ber. LIV. (2.) S. 131—134.
- 1868.
5794. E. MACH. *Ueber die physiologische Wirkung räumlich vertheilter Lichtreize.* Wien. Ber. LVII. (2.) S. 11—19.
5795. STONE. *A rediscussion of the observations of the transit of Venus.* Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXVIII. S. 255.
5796. — *Some remarks and suggestions arising from the observations of the transit of Mercury across the sun's disk.* Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXIX. S. 15 u. 47.
- 1869.
5797. FAYE. *Sur les passages de Vénus et la parallaxe du soleil.* Compt. Rend. LXIII. S. 42.

1798. LEGRAND. *Sur l'erreur que comportent l'observation du passage de Mercure sur le soleil et beaucoup d'autres observations astronomiques.* Compt. Rend. Bd. 68. S. 244.
1799. STONE. *On some points connected with the rediscussion of the observations of the transit of Venus 1769.* Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXIX. S. 286.
- 1871.
1800. WYLD. *Certain phenomena applied in solution of difficulties connected with the theory of vision.* Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh. VII. 1869—72. S. 355 u. 361.
- 1878.
1801. T. K. ABBOT. *On the „Black Drop“ in the Transit of Venus.* Phil. Mag. (4.) XLVI. S. 875.
1802. LE ROUX. *Sur l'irradiation.* Compt. Rend. Bd. 76. S. 960.
- 1874.
1803. M. DEVIC. *Sur l'observation d'un phénomène de la goutte noire.* Compt. Rend. Bd. 79. 2. S. 96.
1804. WOLF et ANDRÉ. *Recherches sur les apparences singulières qui ont souvent accompagné l'observation des contacts de Mercure et de Vénus avec le bord du soleil.* Ann. de l'Observatoire de Paris, mémoires. X. 1.
- 1876.
1805. ANDRÉ. *Sur le passage de Vénus du 9. décembre 1874.* Compt. Rend. LXXXII. S. 205.
- 1878.
1806. ANDRÉ. *Résultats des observations du passage de Mercure.* Compt. Rend. LXXXVI. S. 1380.
1807. — *Étude du ligament noir dans les passages des planètes devant le soleil.* Assoc. franç. scs. de Paris. — Rev. scient. 2. sér. 8. année.
- 1879.
1808. CINTOLESI. *Intorno alle immagini accidentali o suggestive.* Ann. d'Ottalm. VIII. 2 u. 3. — Nature. XXI. 21. — Beibl. d. Physik. III. S. 711.
1809. J. PLATEAU. *Un mot sur l'irradiation.* Bull. de l'Acad. roy. des sc. de Belg. No. 7. 2. sér. Bd. 48. S. 37.
- 1880.
1810. J. PLATEAU. *Un mot sur l'irradiation.* Arch. de biol. I. S. 61—65.
- 1881.
1811. ANDRÉ und ANGOT. *Origine du ligament noir dans les passages de Vénus et de Mercure et moyen de l'éviter.* Ann. scient. de l'Ecole norm. supér. 2. X. S. 323.
- 1884.
1812. PROMPT. *Des lignes d'irradiation.* Nice méd. 1883—84. VIII. S. 145.
- 1886.
1813. A. CHARPENTIER. *Propagation de la sensation lumineuse aux zones rétinienne non excitées.* Compt. Rend. Bd. 102. S. 983.
1814. J. KROUTIL. *Note über Irradiation.* (böhmisch) Casopis. XVI. S. 31—42.

## § 22.

## Die Dauer der Lichtempfindung.

Hinsichtlich der positiven Nachbilder ist auch die Litteratur in § 23 zu beachten.

cca. 150.

815. PTOLÉMÆUS. *Optik.*

cca. 1000.

816. ALHAZEN. *Opticæ thesaurus. Alhaseni Arabis libri VII edit. a F. Risnero.* Basil 1572. Lib. II. cap. 20. S. 36—37.

1604.  
5817. KEPLER. *Ad vitellionem paralipomena quibus astronomiae pars optica traditur.* Frankfurt. S. 169—170.
1615.  
5818. D'AGUILON. *Francisci Aguilonis opticonum libri sex.* Antwerpen.
1659.  
5819. GASSENDI. *Vita Peireskii.* Paris. 1641. lib. V. Petri Gassendi opera omnia. Lyon. 1658. Bd. V. S. 317.
1645.  
5820. MICHAELIUS. *De oculo seu de natura visus libellus.* Dordrecht. (Am Ende der Paralipomena.)
1668.  
5821. BOYLE. *Experiments and observations upon colours.* The philosophical works of R. Boyle. 2. edit. London. 1738. II. S. 4.
1667.  
5822. H. FABRI. *Synopsis optica in qua, etc.* Propos. XVI. Coroll. IV. S. 21. Lyon.
1674.  
5823. MILLIET DUCHALES. *Cursus seu Mundus Mathematicus.* Bd. III. lib. II. Propos. LXIII. S. 448—450. Lyon. 2. Aufl.
1685.  
5824. ZAHN. *Oculus artificialis teledioptricus, etc.* Herbipolis. Fundam. I. Syntagma I. cap. VI.
1704.  
5825. J. NEWTON. *Optice.* Quaestio. XVI.
1740.  
5826. MARIOTTE. *Traité des couleurs. II. part. 4. disc. Des apparences des couleurs qui procèdent des modifications internes des organes de la vision.* Oeures, La Haye. 1740. S. 818—820.
5827. SEGNER. *De raritate luminis.* Gottingae.
1745.  
5828. BOERHAVE. *Praelectiones academicae, in proprias institutiones rei medicae.* Herausg. v. A. Haller. Turin. Bd. III. S. 147. § 541.
1751.  
5829. HAMBERGER. *Physiologia medica.* Jena. § 993.
1758.  
5830. DUFIRAU. *Manuel physique, ou manière courte et facile d'expliquer les phénomènes de la nature.* Lyon. S. 379—380.
5831. JURIN. *An essay upon distinct and indistinct vision.* In: Smith, A complete system of optics. Cambridge. § 222.
1759.  
5832. PORTERFIELD. *A treatise on the eye, the manner and phenomena of vision.* Edinburgh. II. S. 422.
1760.  
5833. MUSSCHENBROEK. *Introductio ad philosophiam naturalem.* § 1820.
1768.  
5834. SCOPOLI. *Entomologia Carniolica.*
1765.  
5835. D'ARCY. *Sur la durée de la sensation de la vue.* Mém. de l'Acad. des Sc. S. 450.
5836. B. FRANKLIN. *New experiments and observations.* London. 1769. S. 469. — Journ. phys. de Rozier. 1773. II. S. 388.
1770.  
5837. MELVILLE. *Essays and observations physical and literary.* II. S. 12: *Observations on light and colours.*
1776.  
5838. DE GODART. *Premier mémoire d'optique, ou explication d'une expérience de M. Franklin.* Journ. de phys. de Rozier. VII. S. 509.
1778.  
5839. DICQUEMARE. *Remarques sur l'illusion des sens, et en particulier de la vue.* Journ. de phys. de Rozier. XI. S. 403.

1781.  
5840. KRATZENSTEIN. *Afhandling om det menneskelige öies achromatiske beskaffenhed.* Nouv. Coll. des mém. de la Soc. roy. danoise des sc. Erster Theil. S. 131. Kopenhagen. 1786.  
5841. R. W. DARWIN. *New experiments on the ocular spectra of light and colours.* Philos. Transact. LXXVI. (2.) S. 313. 1795.  
5842. T. CAVALLLO. *Naturlehre*, übers. v. Trommsdorf. III. S. 132. 1796.  
5843. VOIGT. *Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischung.* Gren's Journ. d. Phys. III. S. 235. 1800.  
5844. A. F. LÜDICKE. *Beschreibung eines Schwungrades, die Verwandlung der Regenbogenfarben in Weiß darzustellen.* Gilb. Ann. V. S. 272. 1803.  
5845. P. PRÉVOST. *Remarques sur trois suites d'observations cyanométriques de H. B. de Saussure.* Journ. de Phys. de Bozier. LVII. S. 372 u. 382. 1806.  
5846. RITTER. *Physisch-chemische Abhandlungen.* Leipzig. III. S. 356. 1810.  
5847. A. F. LÜDICKE. *Versuche über die Mischung prismatischer Farben.* Gilb. Ann. XXXIV. 4. 1816.  
5848. — *Beschreibung eines Chromaskops.* Gilb. Ann. XXXVI.  
5849. — *Ueber das prismatische weiße Licht.* Gilb. Ann. XXXVI. 1816.  
5850. A. F. LÜDICKE. *Versuche mit dem Chromaskop.* Gilb. Ann. LII. 1819.  
5851. PARROT. *Entretiens sur la Physique.* Dorpat 1819—24. III. S. 235. 1825.  
5852. PURKINJE. *Beobachtungen und Versuche sur Physiologie der Sinne.* Bd. II: *Neue Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht.* Berlin. S. 100.  
5853. ROGET. *Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel seen through vertical apertures.* Philos. Transact. I. 131. Pogg. Ann. V. S. 93. 1827.  
5854. E. G. FISCHER. *Lehrbuch der mechanischen Naturlehre.* Berlin. II. S. 267. (Farbenkreisel.)  
5855. PARIS. *Thaumatrope.* Pogg. Ann. X. S. 480. — Edinb. Journ. of Sc. VII. S. 87.  
5856. J. PLATEAU. *Sur la durée des sensations que les couleurs produisent dans l'oeil.* Corresp. math. et phys. de Quetelet. III. S. 27.  
5857. C. WHEATSTONE. *On the duplication and multiplication of objects, a new optical experiment.* Quarterly Journ. of sc. N. S. I. S. 344.  
5858. TH. YOUNG. *Optische Erscheinung bei einer schwingenden Saite.* Pogg. Ann. X. S. 470 bis 480. 1828.  
5859. J. PLATEAU. *Sur les sensations produites dans l'oeil par les différentes couleurs.* Corresp. math. et phys. de Quetelet. IV. S. 51. 1829.  
5860. J. PLATEAU. *Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de vue.* Liège.  
5861. — *Lettre relative à différentes expériences d'optique.* Corresp. math. et phys. de Quetelet VI. S. 121.  
5862. LE FRANÇOIS. *Théorie mathématique des courbes d'intersection apparente de deux lignes qui tournent avec rapidité autour de deux points fixes.* Corresp. math. et phys. de Quetelet. V. S. 120.  
5863. — *De la courbe produite par les intersections successives de deux droites pivotant autour de deux points fixes, de manière que la vitesse angulaire de l'une soit double de celle de l'autre.* Corresp. math. et phys. de Quetelet V. S. 379. 1830.  
5864. J. PLATEAU. *Ueber einige Eigenschaften der vom Lichte auf das Gesichtsorgan hervorgebrachten Eindrücke.* Pogg. Ann. XX. S. 304—324 u. 543. (Verschiedene Dauer des Farbeindrucks, Radspeichencurven.)

## 1881.

5865. A. A. *Optical deception upon the Liverpool and Manchester rail-road.* Journ. of the Roy. Inst. I. S. 600.  
 5866. AIMÉ. *Phénomènes qui arrivent quand on met deux roues en mouvement l'une devant l'autre.* Bull. de Férussac, sc. math. XV. S. 103 u. 107.  
 5867. J. PLATEAU. *Lettre sur une illusion d'optique.* Ann. de chim. et de phys. de Paris. XLVIII. S. 281.  
 5868. M. FARADAY. *On a peculiar class of optical deceptions.* Journ. of the Roy. Inst. I. S. 206. — Pogg. Ann. XXII. S. 601. (Ein Zahnrad durch das andere gesehen; Schraubenbewegung.)

## 1883.

5869. J. PLATEAU. *Sur un nouveau genre d'illusion d'optique.* Corresp. math. et phys. de l'observat. de Bruxelles. VII. S. 365.  
 5870. — *Des illusions sur lesquelles se fonde le petit appareil appelé récemment phanakistoscope.* Ann. de chim. et de phys. LIII. S. 304. — Pogg. Ann. XXXII. S. 647.  
 5871. STAMFFER. *Die stroboskopischen Scheiben oder optische Zauberscheiben, deren Theorie und wissenschaftl. Anwendung.* Wien. — Pogg. Ann. XXIX. S. 189. XXXII. S. 636. — Jahrb. d. polytechn. Inst. zu Wien. Bd. XVIII.  
 5872. BUSOLT. *Farbenkreisel.* Pogg. Ann. XXXII. S. 656.  
 5873. TALBOT. *Proposed philosophical experiments.* Phil. Mag. (3.) III. S. 81.  
 5874. WHEATSTONE. *Remarks on one of M. Talbot's proposed philosophical experiments.* Phil. Mag. (3.) III. S. 204.  
 5875. — *On the duration of luminous impressions on the organ of vision.* Athenäum. 16. März.

## 1884.

5876. HORNER. *On the properties of the Dädaleum, a new instrument of optical illusion.* Pogg. Ann. XXXII. S. 650. — Phil. Mag. (3.) IV. S. 36.  
 5877. TALBOT. *Facts relating to optical science: A body in rapid motion, yet apparently at rest.* Phil. Mag. (3.) IV. S. 113.  
 5878. — *Experiments on light; on Photometry.* Phil. Mag. (3.) V. S. 327.

## 1885.

5879. G. TH. FECHNER. *Ueber einige Erscheinungen des Sinnengedächtnisses.* Fechner's Centralbl. Jahrg. I. S. 775.  
 5880. SNELL. *Description of an instrument for exhibiting a certain optical deception.* Silliman's Journ. (1.) XXVII. S. 310.  
 5881. TOMLINSON. *On the theory of accidental and complementary colours, with additional experiments and observations.* Thomson's Rec. of gen. sc. II. S. 283.  
 5882. J. PLATEAU. *Sur un principe de photométrie.* Bull. de l'Acad. de Bruxelles. II. S. 52. — Pogg. Ann. XXXV. S. 457—464. (Messungen der Lichtstärke intermittirenden Lichts.)  
 5883. H. W. DOVE. *Ueber Discontinuität des Leuchtens der Blitze.*  
 5884. ADAMS. *Optische Täuschung bei Betrachtung eines in Bewegung begriffenen Körpers.* Pogg. Ann. XXXIV. S. 384. — Phil. Mag. V. S. 373.

## 1886.

5885. J. PLATEAU. *Notice sur l'anorthoskop.* Bull. de l'Acad. de Bruxelles. III. S. 7. — Pogg. Ann. XXXVII. S. 464.  
 5886. — *Sur un nouveau moyen de déterminer la vitesse et les particularités d'un mouvement périodique très-rapide, tel que celui d'une corde sonore en vibration; etc.* Bull. de l'Acad. de Belg. III. S. 364.  
 5887. TOMLINSON. *On the curved figures produced by rapidly rotating discs.* Thomson's Rec. of gen. sc. IV. S. 135.

## 1889.

5888. SERRE. *Note sur la persistance des impressions sur la rétine.* Ann. d'Ocul. I. S. 291.  
 5889. J. PLATEAU. *Mémoire sur l'irradiation.* Mém. de l'Acad. de Belg. XI. § 82 u. 86.

## 1842.

5890. MILWARD. *Some observations on the action of light on revolving discs.* Phil. Mag. (3.) XX. S. 449.

## 1848.

5891. D. BREWSTER. *On the combination of prolonged direct luminous impressions on the retina with their complementary impressions.* Phil. Mag. (3.) XXII. S. 434.

## 1845.

5892. EMSMANN. *Optische Täuschung, welche sich an dem Abplattungsmodelle zeigt.* Pogg. Ann. LXIV. S. 326.

5893. CHR. DOPPLER. Abhandl. der böhmischen Ges. der Wiss. V. Folge. Bd. 3.

## 1846.

5894. COATES. *Ocular spectra.* Proc. of the Americ. phil. Soc. IV. S. 239.

5895. H. W. DOVE. *Ueber die Methoden, aus Complementärfarben Weiß darzustellen, und über die Erscheinungen, welche polarisirtes Licht zeigt, dessen Polarisationsebene gedreht wird.* Berl. Monatsber. S. 70. Pogg. Ann. LXXI. S. 97; Phil. Mag. XXX. S. 465; Inst. No. 712. S. 176; Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 276.

5896. — *Ueber ein optisches Verfahren, die Umdrehungsgeschwindigkeit einer rotirenden Scheibe zu messen.* Berl. Monatsber. 1847. S. 77. Pogg. Ann. LXXI. S. 112; Inst. No. 712. S. 177.

## 1847.

5897. H. W. DOVE. *Beschreibung eines Stephanoskops.* Pogg. Ann. LXXI. S. 115.

5898. MÜLLER. *Anwendung der stroboskopischen Scheiben zur Versinnlichung der Wellenlehre.* Pogg. Ann. LXVII. S. 271.

## 1849.

5899. J. PLATEAU. *Sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions de la rétine.* Bull. de Bruxelles XVI. I. S. 424, 588. II. S. 30, 254. Inst. XVII. No. 818. S. 277. No. 830. S. 378. XVIII. No. 835. S. 5. — Phil. Mag. XXXV. S. 434, 436; — Pogg. Ann. LXXVIII. S. 563; LXXIX. S. 269; LXXX. S. 150, 287; — Froriep's Notizen X. S. 221, 325.

## 1850.

5900. J. TYNDALL. *Phenomena of water jet. (Beleuchtung durch electrische Funken.)* Phil. Mag. (4.) I. S. 105; Pogg. Ann. LXXXII. S. 294; Edinb. Journ. L. S. 370; Inst. No. 924. S. 303.

5901. H. BUFF. *Einige Bemerkungen über die Erscheinung der Auflösung des flüssigen Strahls in Tropfen.* Liebig und Wöhler, LXXVIII. S. 162. (Beleuchtung durch intermittirendes Licht.)

5902. BILLET SÉLIS. *Sur les moyens d'observer la constitution des veines liquides.* Ann. d. chim. et de phys. (8.) XXXI. S. 326; Pogg. Ann. LXXXIII. S. 597.

5903. SECCHI. *Sopra un nuovo fotometro destinato specialmente a misurare l'intensità relativa della luce delle stelle.* Atti dell' Accad. pontif. de' Nuovi Lincei, sessione I. anno. IV.

5904. W. SWAN. *On the gradual production of luminous impressions on the eye and other phenomena of vision.* Sill. Journ. (2.) IX. S. 443; Proceed. Edinb. Roy. Soc. 1849. II. S. 230.

5905. — *On the limits to the velocity of revolving lighthouse apparatus caused by the time required for the production of luminous impressions on the eye.* Report of the Brit. Assoc. 2. Theil. S. 191.

5906. STEVELLY. *Attempt to explain the occasional distinct vision of rapidly revolving coloured sectors.* Sill. Journ. (2.) X. S. 401; Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 21.

5907. SINSTEDEN. *Eine optische Stelle aus den Allen.* Pogg. Ann. LXXXIV. S. 448; Cosmos I. S. 116.

## 1851.

5908. LOOMIS. *On the apparent motion of figures of certain colours.* Proc. of the Amer. Assoc. 1852. S. 78.

## 1852.

5909. MOIGNO. *Stereo-fantascope, ou bioscope de M. J. Duboscq.* Cosmos. No. 30. S. 703.

5910. MONTIGNY. *Procédé pour rendre perceptibles et pour compter les vibrations d'une tige élastique.* Bull. de Bruxelles XIX. 1. S. 227—250; Inst. S. 216—220; 268. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 102—121.

5911. — *Phénomènes de persistance des impressions de la lumière sur la rétine.* Mém. de l'Acad. de Belg. Bd. XXIV.

## 1853.

5912. A. POPPE. *Das verbesserte Interferenzoskop.* Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 223—230. (Beobachtung von Flüssigkeitswellen durch stroboskopische Scheiben.)

5913. F. UCHATIUS. *Apparat zur Darstellung beweglicher Bilder an der Wand.* Wien. Ber. X. S. 482—485.

5914. W. ROLLMANN. *Ueber eine neue Anwendung der stroboskopischen Scheiben*. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 246—250.
5915. J. PLATEAU. *Sur le passage de Lucrèce où l'on a vu une description du fantascop*. Arch. d. sc. phys. XX. S. 300—302; Cosmos. I. S. 307—309. (Gegen Sinsted.)  
1854.
5916. EMMANN. *Ueber die Dauer des Lichteindrucks*. Pogg. Ann. XCI. S. 611—618  
Inst. S. 276.  
1855.
5917. CZERMAK. *Physiologische Studien*. II. Wien. Akad. Ber. XV. S. 463.
5918. LISSAJOUS. *Note sur un moyen nouveau de mettre en évidence le mouvement vibratoire des corps*. Compt. Rend. XLI. S. 93—94; Inst. S. 245. Cosmos. VII. S. 81—83.  
Arch. d. sc. phys. XXX. S. 159—161.
5919. — *Note sur une méthode nouvelle applicable à l'étude des mouvements vibratoires*. Compt. Rend. XLI. S. 814—817; Cosmos. VII. S. 608—609; Inst. S. 402—403.
5920. MAXWELL. *Experiments on colour as perceived by the eye, with remarks on colour blindness*. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XXI. (1.) S. 275.
5921. SCHAFFHÜTL. *Abbildung und Beschreibung des Universalvibrations - Photometers*. Abhandl. d. Münchener Akad. 1855. Bd. VII. S. 465.  
1856.
5922. LISSAJOUS. *Mémoire sur l'étude optique des mouvements vibratoires*. Compt. Rend. XLIII. S. 973—976; XLIV. S. 727; XLV. S. 48—52; Inst. S. 411. 1857. S. 231.  
Cosmos. IX. S. 626—629; XI. S. 80—83, 110—112, 431—432; Ann. d. chim. et de phys. (3.) LI. S. 147—231.  
1858.
5923. J. C. D'ALMEIDA. *Nouvel appareil stéréoscopique*. Compt. Rend. XLVII. S. 61.
5924. D. BREWSTER. *On the duration of luminous impressions of certain points of the retina*. Athen. II. S. 521.
5925. MEISENS. *Recherches sur la persistance des impressions de la rétine*. Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique. (2.) T. III. No. 11.  
1860.
5926. H. W. DOVE. *Ueber einen besonderen Farbenkreis des Herrn Lohmeier in Hamburg*. Berl. Monatsber. S. 491. (Ist gleich dem Dädaleum.)
5927. GOODCHILD. *Trocheidoskop*. Dingler's Journ. CLVII. S. 181—184. Pract. mechan. Journ. April 4. (Farbenscheiben für Contrasterscheinungen benutzt.)  
1861.
5928. SHAW. *Description of a new optical instrument called the Stereotrope*. Phil. Mag. (4.) XXII. S. 537.
5929. SWAN. *On the gradual production of luminous impressions on the eye, part 2, being a description of an instrument for producing isolated luminous impressions on the eye of extremely short duration and for measuring their intensity*. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XXII. S. 33.  
1862.
5930. F. ZÖLLNER. *Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder*. Pogg. Ann. CXVII. 477—484.
5931. J. J. OPPEL. *Vorläufige Notiz über eine eigenthümliche Augentäuschung in Bezug auf Rotationsrichtungen*. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1861—1862. S. 56—57.
5932. D. BREWSTER. *On the compensation of impressions moving over the retina*. Rep. of Brit. Assoc. 1861. (2.) S. 29.  
1863.
5933. A. FICK. *Ueber den seitlichen Verlauf der Erregung in der Netzhaut*. Reichert und du Bois' Arch. S. 739—764.
5934. O. N. ROOD. *On certain appearances produced by revolving discs*. Silliman's Journ. (2.) XXXV. S. 357.  
1864.
5935. E. BRÜCKE. *Ueber den Nutzeffect intermittirender Netzhautreizungen*. Wien. Ber. XLIX. 21. Jan.
5936. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut*. Breslau S. 96—103.
5937. MONTIGNY. *Note sur un nouveau scintillomètre*. Bull. de l'Acad. de Belgique. XVII. S. 260.

## 1865.

5938. A. CLAUDET. *On moving photographic figures illustrating some phenomena of vision connected with the combination of the stereoscope and the phenakistoscope, by means of photography.* Athen. S. 374. Rep. Brit. Assoc. 2. S. 9.  
 5939. LAING. *Combination von Stereoskop und Phänakistoskop.* Mechanic's Magazine. (2.) XIII. S. 190.  
 5940. LUCAS. *Théorie mathématique de la vision des corps lumineux.* Les Mondes. IX. S. 546.  
 5941. E. MACH. *Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut.* Wien. Akad. Ber. LII. (2.) S. 303.  
 5942. — *Bemerkungen über intermittierende Lichtreize.* Reichert und du Bois' Arch. S. 629—635.

## 1866.

5943. LABORDE. *Dauer der Lichteindrücke.* Pogg. Ann. Bd. 129. S. 660. — Compt. rend. T. 63. S. 87.  
 5944. J. LANDERER. *Illusion optique.* Mondes. XI. S. 9—10.  
 5945. E. MACH. *Ueber den physiologischen Effect räumlich vertheilter Lichtreize.* 2. u. 3. Abhandl. Wien. Akad. Ber. LIV. (2.) S. 131 u. 393.

## 1867.

5946. A. CLAUDET. *A new fact relating to binocular vision.* Phil. Mag. 4. sér. XXXIII. S. 549.  
 5947. TOEPLER und RADAU. *Stroboscope.* Mondes. (2.) XV. S. 206—209.  
 5948. PEPPER. *L'Eidoscope.* Les Mondes. (2.) XIII. S. 178.  
 5949. WEBER. *Theorie des Anorthoscops und der anorthoscopischen Figuren.* Zeitschr. f. Mathem. u. Physik. XII. S. 133.

## 1868.

5950. CARPENTER. *On the Zootrope and its antecedents.* The student and intellectual observer of sc., litt. a. art. II. S. 24, 25 u. 26.  
 5951. S. EXNER. *Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit.* Wien. Akad. Ber. Bd. 58. (2.) S. 601—632.  
 5952. JEFFRIES. *Remarks upon the principles of the Thaumatrope.* Transact. of the Amer. Ophthalm. Soc. 1869. S. 8.  
 5953. C. LANGLOIS et ANGIERS. *Kinéscope.* Les Mondes. (2.) XVII. S. 56.

## 1869.

5954. F. BURCKHARDT. *Eine Relief-Erscheinung.* Pogg. Ann. Bd. 137. S. 471.  
 5955. C. BURCKHARDT und H. FABER. *Versuche über die zu einer Farbenempfindung erforderlichen kleinsten Zeiträume.* Pflüger's Arch. Bd. II. S. 121—127.  
 5956. C. MAXWELL. *Zootrope perfectionnée.* Mondes. (2.) XX. S. 585—586.  
 5957. O. J. RUPP. *Die Dauer der Nachempfindung auf den seitlichen Theilen der Netzhaut.* Königsberg. Dissert.  
 5958. VIERORDT. *Das Pendel als Meßapparat der Dauer der Gesichtseindrücke.* Pflüger's Arch. Bd. II. S. 121—142.

## 1870.

5959. K. EXNER. *Ueber die Curven des Anklingens und Abklingens der Lichtempfindungen.* Wien. Akad. Ber. Bd. 62. (Naturw. Kl.) S. 197.  
 5960. S. EXNER. *Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit.* Carl's Report. VI. S. 242—270.  
 5961. — *Bemerkungen über intermittirende Netzhautreizungen.* Pflüger's Arch. III. S. 214.  
 5962. HOFMANN. *Optische Erscheinung auf fortdauernden Lichteindruck gegründet, und Vorführung von Burckhardt's Reliefserscheinungen.* Zeitschr. f. Naturwiss. II. (2.) S. 205.  
 5963. J. LANDERER. *Eine optische Täuschung.* Zeitschr. f. Naturwissensch. XXXV. S. 214.

## 1871.

5964. BAYT. *Ueber die Zeit, welche nöthig ist, damit ein Gesichtseindruck zum Bewusstsein kommt und über die Größe (Extension) der bewussten Wahrnehmung bei einem Gesichtseindruck von gegebener Dauer.* Pflüger's Arch. f. Physiol. IV. S. 325.  
 5965. KURZ, A. *Ueber optische Erscheinungen, welche durch zwei rasch sich drehende Körper hervorgerufen werden.* Pogg. Ann. Ergzb. V. 653—655.  
 5966. R. PICTET. *Mémoire sur la vision binoculaire.* Biblioth. univ. Arch. des Sc. nouv. période. XI. S. 105 u. 114.



5967. O. N. ROOD. *On the amount of time necessary for vision.* New-York. Phil. Mag. (4.) XLII. S. 320. Americ. Journ. of sc. a. arts. No. 2. S. 159.

5968. ZIZMANN. *Die Bilder der stroboskopischen Scheiben objectivirt.* Dingler's Polytechn. Journ. Bd. 199. S. 231.

1872.

5969. DVORÁK. *Ueber Analoga der persönlichen Differenz zwischen beiden Augen und den Netzhautstellen desselben Auges.* Prager Verhandl. Sitzung vom 8. März.

1878.

5970. VOLPICELLI. *Effetti della persistenza dei colori sulla retina.* Atti della R. Accad. dei Lincei. XXVI. S. 623.

1874.

5971. GORINI. *Un caso straordinario di lunga persistenza delle immagini nell'occhio umano.* Ann. di Ottalm. III. S. 164.

5972. A. KLEINER. *Zur Theorie der intermittirenden Netzhautreizung.* Zürich. Dissert.

5973. A. J. KUNKEL. *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Zeit.* Pflüger's Arch. f. Physiol. IX. S. 197.

1875.

5974. MORTON. *Ein neues Chromatrop.* Pogg. Ann. Bd. 157. 1876. S. 150.

5975. A. RICCÒ. *Sulla successione persistenza della sensazione dei colori.* Atti della R. acad. in Modena XVI. Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 282. Ann. di Ottalm. IV. S. 315. Modena, Soliani. 131 S.

1876.

5976. W. v. BEZOLD. *Beiträge zur Geschichte der physiologischen Optik (Farbenkreis und binoculares Sehen).* Pogg. Ann. Bd. VIII. S. 510—515.

5977. GHERARDI. *Notizia di un fenomeno d'ottica fisiologica di qualche novità.* Rendic. delle sessioni dell'Acad. delle Sc. dell'Istituto di Bologna. 1875/76. S. 134.

5978. P. GORINI. *Un caso straordinario di lunga persistenza delle immagini nell'occhio umano.* La France Méd. S. 735.

5979. A. KLEINER. *Zur Theorie der intermittirenden Netzhautreizung.* Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. (N. F.) XIV. S. 133.

5980. A. RICCÒ. *Esperienze cromostroboscopiche.* Annuario della Società dei Naturalisti in Modena. Anno X.

1877.

5981. J. DUBOSQ. *Expérience de projection, où l'on utilise la persistance des impressions sur la rétine.* Journ. de phys. VI. S. 213—216.

5982. C. M. GABRIEL. *La persistance des impressions sur la rétine, expériences exécutées à l'aide du phénakistoscope de projection.* Paris.

5983. A. J. KUNKEL. *Ueber die Erregung der Netzhaut.* Pflüger's Arch. Bd. 15. S. 27.

5984. LAVAND DE LESTRADE. *Recomposition de la lumière spectrale.* Les Mondes. (2.) XLIII. S. 828.

5985. — *Miroir tournant pour la reconstitution des couleurs du spectre.* Les Mondes. (2.) XLIV. S. 416.

5986. B. TH. LOWNE. *On some phenomena connected with vision.* Proc. of the London Roy. Soc. XXV. S. 487—492.

5987. LUVINI. *Miroir tremblant pour la reconstitution des couleurs du spectre.* Les Mondes. (2.) XLIII. S. 427.

5988. — *Recomposition de la lumière spectrale.* Les Mondes. (2.) XLIV. S. 97.

5989. PEIRCE. *Note on the sensation of color.* Silliman's Journ. (3.) XIII. S. 247.

5990. SILVANUS THOMPSON. *Some new optical illusions.* Rep. of the Brit. Assoc. Communications. S. 32.

1878.

5991. E. CHEVREUL. *Sur les phénomènes qui se rattachent à la vision d'objets colorés en mouvement.* Compt. Rend. Bd. 86. S. 621.

5992. — *Sur la vision des couleurs et particulièrement de l'influence exercée sur la vision d'objets colorés, qui se meuvent circulairement, quand on les observe comparativement avec des objets en repos identiques aux premiers.* Compt. Rend. Bd. 87. S. 576—578, 707—713.

5993. GIRAUD-TEULON. *Sur la persistance des images sur la rétine. — Rapport concernant les expériences relatives au pourpre de la rétine.* Les Mondes. (2. sér.) XLVI. S. 707.

5994. J. PLATEAU. *Sur une loi de la persistance des impressions dans l'oeil*. Bull. de l'Acad. roy. de Belg. (2. sér.) T. XLVI. No. 9 u. 10. S. 334.
5995. REYNAUD. *Le Praxinoscope*. La Nature. 1. Févr. 1879.  
1879.
5996. A. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen. Ueber Talbot's Gesetz*. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 542—573.
5997. RICHTER und BREGUET. *Influence de la durée et de l'intensité sur la perception lumineuse*. Compt. Rend. Bd. 88. S. 239—240. — Arch. génér. de méd. April. — Gaz. hebdom. No. 7.
5998. TOBIN. *An new illustration of persistance of vision*. Journ. of the Franklin Institute. LXXXVIII. (3. sér.) S. 330.  
1880.
5999. E. CHEVREUL. *Note relative à un mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation*. Compt. Rend. Bd. 91. S. 870.
6000. E. DREHER. *Studien am Lebensrad betreffs eines richtigen Verständnisses der Sinneswahrnehmungen*. Die Natur. No. 5. S. 53—55.
6001. OTT und PRENDERGAST. *The rapidity of perception of colored lights*. Journ. of nerv. and ment. dis. (N. S.) V. S. 258.
6002. RICHTER und BREGUET. *De l'influence de la durée de l'intensité de la lumière sur la perception lumineuse*. Arch. de physiol. (2.) VII. S. 689—696.  
1881.
6003. BULL. *A new method of examining and numerically expressing the colour perception*. Transact. of the Intern. med. Cong. London. III. S. 49.
6004. KUHN. *Empfehlung des Rothe'schen Kreisels*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde., V. S. 93.
6005. E. LOMMEL. *Einfaches Verfahren, die stroboscopischen Erscheinungen für viele gleichzeitig sichtbar zu machen*. Carl's Repert. XVII. 7. S. 463.
6006. RAYLEIGH. *Experiments on colour*. Nature XXV. S. 64 u. 66.
6007. R. ROTHE. *Farbenkreisels nebst Musterkarte der farbigen Papierscheiben zu Gleichungen*. Prag. — Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 181.  
1882.
6008. F. BOAS. *Ein Beweis des Talbot'schen Satzes und Bemerkungen zu einigen aus demselben gezogenen Folgerungen*. Wiedem. Annal. XVI. S. 359—362.
6009. A. CHARPENTIER. *Sur la durée de la perception lumineuse dans la vision directe et dans la vision indirecte*. Compt. Rend. Bd. 95. S. 96. Franc. méd. II. S. 112.
6010. E. CHEVREUL. *Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et sur les vitesses respectives évaluées en chiffres, de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre moitié est blanche; vitesses correspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrême vitesse jusqu'au repos*. Compt. Rend. Bd. 95. S. 1086.
6011. WEAD. *On Combining Colour-Disks*. Nature. XXV. S. 266.
6012. — *Le Phénakistoscope de projection*. La Nature. X. No. 473. S. 64.  
1883.
6013. A. M. BLOCH. *Sur la vitesse des transmissions visuelles, auditives et tactiles*. Compt. Rend. Bd. 97. S. 1221.
6014. E. CHEVREUL. *Sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et sur les vitesses respectives, évaluées en chiffres de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre moitié est blanche; vitesses correspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrême vitesse jusqu'au repos*. Compt. Rend. Bd. 96. S. 18—29.  
1884.
6015. A. M. BLOCH. *Expériences sur la vitesse relative des transmissions visuelles, auditives, tactiles*. Journ. de l'anat. et de la physiol. XX. 1.
6016. BUCCOLA und B. UFFREDUZI. *Wahrnehmungszeit der Farben*. Riv. di filoa. scient. IV. No. 1.
6017. A. CHARPENTIER. *Sur l'inertie d'appareil rétinien et ses variations suivant la couleur excitatrice*. Compt. Rend. Bd. 99. S. 1061.
6018. A. CORNU. *Expériences d'optique relatives à l'achromatisme des phénomènes d'interférence et à la persistance des impressions sur la rétine*. Assoc. Franc. Blois. S. 162.

- 6019 J. DUBOSCQ. *Projectionsversuche. Verharren der Eindrücke auf der Retina. Wiederherstellung des weißen Lichtes.* Séances Soc. Phys. Juni/April. S. 665.  
 6020. HEUSE. *Eine stereoskopische Erscheinung in der rotirenden Bildertrommel.* Arch. f. Ophthalm. XXX. 1. S. 159.  
 6021. E. L. NICHOLS. *On the duration of color impressions upon the retina.* Sill. Journ. XXVIII. S. 243.

1885.

6022. G. O. BERGER. *Ueber den Einfluß der Reizstärke auf die Dauer einfacher psychischer Vorgänge mit besonderer Rücksicht auf die Lichtreize.* Leipzig.  
 6023. A. M. BLOCH. *Expériences sur la vision.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 493.  
 6024. J. M. K. CATTELL. *Ueber die Zeit der Erkennung und Benennung von Schriftzeichen. Bildern und Farben.* Philos. Stud. II. S. 635—650.  
 6025. — *The inertia of the eye and brain.* Brain. London. VIII. S. 296.  
 6026. W. FILEHNE. *Ueber die Entstehungsart des Lichtstaubes, der Starrblindheit und der Nachbilder.* Gräfe's Arch. XXXI. (2.) 1—30.

1886.

6027. J. M. C. K. CATTELL. *Ueber die Trägheit der Netzhaut und des Sehcentrums.* Wundt's Philos. Stud. III. S. 94—127.  
 6028. S. EXNER. *Ueber die Funktionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder.* Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (1.) S. 233—252.

1887.

6029. A. M. BLOCH. *Observations relatives à la persistance visuelle.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 130.  
 6030. — *Note relative aux deux dernières communications du Prof. Charpentier sur la persistance visuelle.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 118.  
 6031. — *Notes sur les sensations visuelles.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 391.  
 6032. — *La vitesse comparative des sensations.* Rev. scient. (3.) XXXIX. S. 585—589.  
 6033. — *Persistance des impressions rétiniennees.* Gaz. hebdom. No. 9. S. 156.  
 6034. A. CHARPENTIER. *Loi de Bloch relative aux lumières de courte durée.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 3.  
 6035. — *Théorie des disques rotatifs.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 39.  
 6036. — *Nouveaux faits relatifs aux excitations lumineuses de courte durée.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 42.  
 6037. — *Influence de l'intensité lumineuse sur la persistance des impressions rétiniennees.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 85.  
 6038. — *Variations de la persistance des impressions rétiniennees dans différentes conditions.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 92.  
 6039. — *Nouvelle série d'expériences sur la persistance des impressions rétiniennees.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 120.  
 6040. — *Influence exercée sur la persistance apparente des impressions rétiniennees par la durée des excitations consécutives.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 159.  
 6041. — *Observations relatives à la persistance visuelle.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 174.  
 6042. — *Sur la période d'addition des impressions lumineuses.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 191.  
 6043. — *Sur l'appréciation du temps par la rétine.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 360.  
 6044. — *Nouvelle note sur l'appréciation du temps.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 373.  
 6045. — *Note sur le synchronisme apparent de deux excitations lumineuses successives et voisines.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 447.

1888.

6046. A. M. BLOCH. *Sur le temps perdu de l'excitation rétinienne.* Soc. de Biol. 26. Mai.  
 6047. A. CHARPENTIER. *Temps perdu du nerf optique pour les excitations lumineuses et colorées.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 308.  
 6048. — *Nouvelle note sur le temps perdu du nerf optique.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 372.  
 6049. — *La perception différentielle des lumières instantanées.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 471.

6050. A. CHARPENTIER. *Influence de la surface sur la sensibilité lumineuse dans le cas des lumières instantanées.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 536.
6051. — *Durée de l'excitation latente de l'appareil visuel.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 305.
6052. — *La persistance des images rétinienne au centre et à la périphérie de la rétine.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 374.
6053. — *Sur l'intensité comparée des lumières brèves et de lumières continues.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 493.
- 1889.
6054. L. BELLARMINOW. *Ueber intermittirende Netzhautreizung.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. 1. S. 25—49. Westn. ophthalm. VI. 1. S. 1. Tagebl. d. III. Kongresses d. russ. Aerzte. S. 290.
6055. L. COUTEAUX. *Une conséquence de l'intermittence des sensations.* Rev. scient. XLIII. S. 316.
6056. G. N. STEWART. *Ist das Talbot'sche Gesetz gültig für sehr schnell intermittirendes Licht?* Proceed. of the Roy. Soc. of Edinburgh. XV. 127. S. 441.
- 1890.
6057. E. CANESTRINI. *Esperienze di ottica fisiologica.* Atti della Società Veneto Trentina de Scienze Naturali. Vol. XI.
6058. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la persistance des impressions rétinienne et sur les excitations lumineuses de courte durée.* Arch. d'Ophthalm. X. S. 108—135, 212—231, 340—356, 406—430, 522—537.
6059. — *Méthode directe pour l'étude de la persistance des impressions lumineuses.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 25. April. S. 198.
6060. — *Interférence rétinienne.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 16. Mai. S. 263.
- 1891.
6061. E. G. BAADER. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Lichtwechsel.* Diss. Freiburg. 38 S.
6062. BROWN-SÉQUARD. *Remarques sur les recherches de M. Charpentier sur l'intensité et sur la persistance des impressions lumineuses brèves.* Arch. de Physiol. XXIII. No. 3.
6063. A. CHARPENTIER. *Démonstration expérimentale d'un temps perdu dans l'excitation des centres visuels.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. S. 528—530.
6064. — *Sur la persistance totale des impressions lumineuses, distinguée de leur persistance apparente.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. S. 600—601.
6065. — *Dissociation des impressions lumineuses successives par des zones différentes de la rétine.* Arch. de Physiol. (5.) III. 4. S. 674—687.
6066. — *Relation entre les oscillations rétinienne et certains phénomènes entoptiques.* Compt. Rend. CXIII. No. 4. S. 217—219.
6067. — *Résultats d'expériences sur les interférences rétinienne.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 19. S. 434—437.
6068. — *Méthode pour l'observation des interférences rétinienne.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 18. S. 388—392.
6069. A. KURZ. *Stroboscopische Demonstrationen.* Exner's Repert. Bd. 27. S. 569—581.
- 1892.
6070. E. FARAVELLI. *Il tempo quale coefficiente da introdursi nella determinazione del visus.* (Nota preventiva.) Rivista gen. ital. di Clinica med. anno IV. No. 12—13.
6071. CL. ROYER. *Recherches d'optique physiologique et physique.* Bruxelles. 42 S. Monnon.
- 1893.
6072. K. MARBE. *Zur Lehre von den Gesichtsempfindungen, welche aus successiven Reizen resultiren.* Diss. Bonn. — Wundt's Philos. Stud. IX. S. 384—399.
6073. A. CHARPENTIER. *Démonstration directe de la différence de temps perdu suivant les couleurs.* Arch. de Physiol. (5.) V. 3. S. 568—571.
- 1894.
6074. K. MARBE. *Vorrichtung zur successiven Variirung der Sektoren rotirender Scheiben und zur Ableitung der Sektorenverhältnisse während der Rotation.* Centralbl. f. Physiol. Heft 25. S. 1—4.

## § 23.

## Die Veränderungen der Reizbarkeit.

Hinsichtlich der Adaptation ist auch die Litteratur von § 21, hinsichtlich der positiven Nachbilder die Litteratur von § 22 zu beachten.

1100.  
6075. ALHAZEN. *Opticae thesaurus*. Basel. 1572. lib. III, cap. V.  
1593.  
6076. J. B. PORTA. *De refractione optices parte libri novem*. Neapel. lib. III, prop. 7.  
1613.  
6077. D'AGUILON. *Francisci Aguilonii opticorum libri sex*. Antwerpen. lib. I, prop. 5.  
S. 56 u. 57.  
1634.  
6078. PRIEESCH *Vita*. S. 175. 296.  
1644.  
6079. DESCARTES. *Dioptrice et Meteora*. Amsterdam. Kap. 6. § IV.  
1646.  
6080. ATHAN. KIRCHER. *Ars magna lucis et umbrae*. S. 162.  
1668.  
6081. MARIOTTE. *Oeuvres*. S. 318.  
1674.  
6082. MILLIET DECHALES. *Cursus seu Mundus Mathematicus*. Lyon III. lib. 2. prop. LXIII.  
1689.  
6083. DE LA HIRE. *Dissertation sur les différents accidents de la vue*. 1<sup>re</sup> part. § 2.  
Mém. de l'Acad. des sc. de Paris IX (veröffentl. 1730) (bei PORTERFIELD. *On the eye*. I. S. 343).  
6084. I. NEWTON. *Experiments on ocular spectra produced by the action of the sun's light on the retina*. Edinb. Journ. of Sc. IV. S. 75.  
1691.  
6085. J. NEWTON. *Brief vom 30. Juni 1691*. Mitgetheilt in Newton's Leben von Brewster übersetzt von Goldberg. Leipzig. 1833. S. 263—265.  
1699.  
6086. MALEBRANCHE. *Réflexions sur la lumière et les couleurs, etc.* Mém. de l'Acad. des sc. de Paris.  
1738.  
6087. JURIN. *Essay on distinct and indistinct vision*. S. 176. In Smith's *Optics*. Cambridge.  
1743.  
6088. BUFFON. *Dissertation sur les couleurs accidentelles*. Mém. de Paris. S. 147.  
1755.  
6089. DE BERGEN. *De maculis et faculis a solis aspectu in oculo residuis*. Nova Acad. Naturae curiosor. I. S. 188. 1757.  
6090. NOLLET. *Leçons de physique expérimentale*. V. S. 509 n. 510.  
1761.  
6091. SCHERFFER. *Diss. de coloribus accidentalibus*. Viennae.  
1765.  
6092. SCHERFFER. *Abhandlung von den zufälligen Farben*. Wien; übers. im Journ. de Physique de Rozier. XXVI. S. 175 und 273.  
6093. AEPINUS. *De coloribus accidentalibus*. Nov. Com. Acad. Petr. X. S. 282. Journ. de Physique. 1776. XXVI. S. 291.  
1769.  
6094. B. FRANKLIN. *New experiments and observations*. London. S. 469. — Journ. de Physique de Rozier. 1773. II. S. 383.

1775.  
 1095. MONGEZ. *Lettre sur une dégradation des couleurs.* Journ. de phys. de Rozier. VI. S. 481.  
 1096. ROZIER. Journ. de phys. de Rozier. VI. S. 486.  
 1097. SCHERFFER. *Institutionum opticarum partes quatuor.* Wien. Th. I. cap. II. art. III. 1776.  
 1098. DE GODART. *Premier mémoire d'optique, ou explication d'une expérience de M. Franklin.* Journ. de phys. de Rozier. VII. S. 509.  
 1099. — *Deuxième mémoire d'optique, ou recherches sur les couleurs accidentelles.* Journ. de phys. de Rozier. VIII. S. 1.  
 1100. — *Troisième mémoire d'optique, ou suite de celui sur les couleurs accidentelles.* Journ. de phys. de Rozier. VIII. S. 269. 1781.  
 1101. KRATZENSTEIN. *Afhandling om det menneskelige öies achromatiske beskaffenhed.* Nouv. collect. des mém. de la Soc. roy. Danoise d. sc. I. S. 131. Kopenhagen. 1786.  
 1102. E. DARWIN. *On the ocular spectra of light and colours.* Phil. Trans. Vol. 76. S. 313. 1787.  
 1103. *Dissertation sur les couleurs accidentelles.* Journ. de phys. de Rozier. XXX. S. 407. 1792.  
 1104. WELLS. *An essay upon single vision with two eyes; together with experiments and observations on several other subjects in optics.* London. 1794.  
 1105. E. DARWIN. *Zoonomia or the law of organic life.* London. — Deutsche Uebersetzung von Brandis. Hannover 1795. II. S. 387. 1796.  
 1106. VOIGT. *Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischung.* Gren's Journ. d. Phys. III. S. 235. 1798.  
 1107. COMPARETTI. *Observationes dioptricae et anatomicae de coloribus apparentibus.* Patav. 1802.  
 1108. TROXLER. *Ueber das Verschwinden gegebener Gegenstände innerhalb unseres Gesichtskreises.* Himly und Schmidt Ophthalmolog. Bibliothek. Bd. I, St. 2, S. 1–20, Bd. II, St. 2, S. 40. 1803.  
 1109. HIMLY. *Einiges über die Polarität der Farben.* Ophthalm. Biblioth. I. (2.) S. 1. 1804.  
 1110. PRIEUR DE LA COTE D'OR. *Bemerkungen über die Farben und einige besondere Erscheinungen derselben.* Ann. d. Chim. LIV. S. 1. — Gilb. Ann. XXXI. S. 315.  
 1111. TROXLER. *Präliminarien zur physiologischen Optik.* Ophthalm. Biblioth. v. Himly. II. (2.) S. 54 u. (3.) S. 1. 1810.  
 1112. J. W. v. GOETHE. *Zur Farbenlehre.* I. S. 13. 20. 1816.  
 1113. *Ueber physiologische Gesichts- und Farbenercheinungen.* Schweigger's Arch. Bd. 16. S. 121–157. 1817.  
 1114. SCHULZ. *Ueber physiologische Farbenercheinungen, insbesondere das phosphorische Augenlicht als Quelle derselben betrachtet.* In Goethe für Naturwiss. II. S. 20. 38. 1819.  
 1115. PURKINJE. *Beiträge zur Physiologie der Sinne.* I. S. 92. 1826.  
 1116. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes.* Coblenz. S. 401. 1830.  
 1117. LEHOT. *Nouvelle explication des couleurs accidentelles.* Ann. des sciences d'observ. par Saigey et Raspail. III. (3.) S. 329. Froriep's Notizen XXVIII. S. 177; Fechner's Repertorium 1832. S. 229.  
 1118. GERGONNE in seinem Journ. de Mathem. XXI. S. 291.

1833.

6119. D. BREWSTER. Philos. Mag. II. S. 89; IV. S. 354. Pogg. Ann. XXIX.

6120. J. PLATEAU. *Sur le phénomène des couleurs accidentelles*. Ann. de chim. et de phys. LIII. S. 386. LVIII. S. 337; Pogg. Ann. XXXII. S. 543.

1834.

6121. J. PLATEAU. *Essai d'une Théorie génér. comprenant l'ensemble des apparences visuelles, qui succèdent à la contemplation des objets colorés et de celles, qui accompagnent cette contemplation, c'est-à-dire la persistance des impressions de la rétine, les couleurs accidentelles, l'irradiation, les effets de la juxtaposition des couleurs, les ombres colorées*. Bruxelles. Mém. de l'Acad. de Belgique. VIII.6122. D. BREWSTER. *On the connexion of the physical sciences, by Mrs. Sommerville* Edinb. Review. LIX. S. 154 u. 160.6123. — *On the influence of successive impulses of light upon the retina*. Philos. Mag. (3.) IV. S. 241—245.6124. — *Account of two experiments on accidental colours, with observations on their theory*. Philos. Mag. (3.) IV. S. 353—354.6125. GHERARD. *De visione, quae duobus simul oculis, vel alter utro tantum exercetur; item de nonnullis praestantibus phaenominis visionis quae fit ope vitrorum coloratorum, deque coloribus quos vocant accidentales, eorumque theoria*. Novi commentarii Acad. Scient. Instituti Bononiensis. I. S. 349 u. 362.6126. J. PLATEAU. *Sur un phénomène de couleurs accidentelles*. Corresp. math. et phys. de Quetelet. VIII. S. 511.

1835.

6127. G. TH. FECHNER. *Ueber einige Erscheinungen des Sinnengedächtnisses*. Fechner's Centralblatt. Jahrg. I. S. 775.

1836.

6128. OSANN. *Ueber Ergänzungsfarben*. Pogg. Ann. XXXVII. S. 287.6129. J. PLATEAU. *Berichtigung, veranlaßt durch einen Aufsatz des Herrn Prof. Osann*. Pogg. Ann. XXXVIII. S. 626.

1837.

6130. OSANN. *Einige nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Ergänzungsfarben*. Pogg. Ann. XLII. S. 72.6131. J. PLATEAU. *Réponse aux objections publiées contre une théorie générale des apparences visuelles dues à la contemplation des objets colorés*. Corresp. math. et phys. de Quetelet. IX. S. 97.

1838.

6132. G. TH. FECHNER. *Ueber die subjectiven Complementärfarben*. Pogg. Ann. XLIV. S. 221—245; 513—530.6133. — *Scheibe zur Ergänzung subjectiver Complementärfarben*. Pogg. Ann. XLV. S. 227.

1839.

6134. D. BREWSTER. *Observations on Prof. Plateau's defence of his theory of accidental colours*. Phil. Mag. XV. S. 435.

1840.

6135. G. TH. FECHNER. *Ueber die subjectiven Nachbilder und Nebenbilder*. Pogg. Ann. L. S. 193—221, 427—465.6136. SPLITTGERBER. *Methode, subjective und complementäre Farbenercheinungen zu erregen*. Pogg. Ann. IL. S. 587.

6137. D. BREWSTER. Phil. Mag. XXIII. S. 354. Pogg. Ann. LXI. S. 138. (Combination. der verlöschenden Eindrücke mit complementären.)

6138. TOURTUAL. *Bericht über die Leistungen im Gebiete der Physiologie der Sinne, im Besonderen des Gesichtssinnes*. Müller's Arch. S. 1.

1841.

6139. KNOCHENHAUER. *Ueber Blendungsbilder*. Pogg. Ann. LIII. S. 946.

1842.

6140. PICKFORD. *Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht*. Heidelberg.6141. FISCHER. *Ueber die chromatischen Erscheinungen der Blendungsbilder*. Verhandl. d. Naturforsch.-Ges. in Basel. V. S. 240. 1843.

1844.

6142. TRANSON. Institut No. 556. S. 284.

- 1845.
- §143 WHEATSTONE. *Sur un effet singulier de juxtaposition de certaines couleurs dans des circonstances particulières.* Inst. No. 582. S. 75.
- 1846.
- §144. COATES. *Ocular spectra.* Proc. of the Americ. Philos. Soc. IV. S. 239.
- 1847.
- §145. H. W. DOVE. *Ueber subjective Farbenerscheinungen bei einem Farbenkreisel, und eine darauf gegründete Methode, seine Umdrehungsgeschwindigkeit zu bestimmen.* Pogg. Ann. LXXI. S. 112.
- 1848.
- §146. H. W. DOVE. *Ueber Scheiben zur Darstellung subjectiver Farben.* Pogg. Ann. LXXV. S. 526.
- §147. GRÜEL. *Ueber einen Apparat für subjective Farbenerscheinungen.* Pogg. Ann. LXXV. S. 524.
- §148. H. TAYLOR. *On the apparent motion of the figures in certain patterns of blue and red worsted.* Phil. Mag. XXXIII. S. 345; Froriep's Notizen IX. S. 33; Arch. d. sc. phys. et nat. X. S. 304.
- 1849.
- §149. J. PLATEAU. *Quatrième note sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions sur la rétine.* Bull. de l'Acad. de Belg. XVI. (2.) S. 254.
- 1850.
- §150. J. M. SEGUIN. *Sur les couleurs accidentelles.* Compt. Rend. XXXIII. S. 642. XXXIV. S. 767—768. XXXV. S. 476. — Phil. Mag. (4.) III. S. 77. — Sillim. Journ. (2.) XIII. S. 441.
- §151. SINSTEDEN. *Ueber einen neuen Kreisel zur Darstellung subjectiver Complementärfarben und eine eigenthümliche Erscheinung, welche die Orangefarbe dabei zeigt.* Pogg. Ann. LXXXIV S. 45.
- §152. E. BRÜCKE. *Untersuchungen über subjective Farben.* Pogg. Ann. LXXXIV. S. 418. Wien. Denkschr. III. S. 95; Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 122.
- §153. MINICH. *Sui colori accidentali.* Atti dell'Istituto Veneto di sc. lettere ed arti.
- 1852.
- §154. W. R. GROVE. *On a mode of reviving dormant impressions on the retina.* Phil. Mag. (4.) III. S. 435—436; Inst. S. 251—252. Arch. d. sc. phys. et nat. XX. S. 227—228; Cosmos I. S. 237—238.
- §155. H. W. DOVE. *Zur Erklärung der flatternden Herzen.* Pogg. Ann. LXXXV. S. 402.
- 1854.
- §156. J. J. OPPEL. *Ueber das Phänomen der flatternden Herzen.* Jahresber. d. Frankfurter Vereins 1853—1854. S. 50—52; Hallesche Zeitschr. für Naturwissenschaft. V. S. 819.
- §157. W. SCORESBY. *An inquiry into some of the circumstances and principles which regulate the production of pictures on the retina of the human eye with their measure and endurance, their colours and changes.* Phil. Mag. (4.) VII. S. 218—221; VIII. S. 544. Inst. S. 154—156; Proc. of Roy. Soc. VI. S. 380—383. VII. S. 117—122. Athen. S. 1272.
- §158. J. M. SEGUIN. *Recherches sur les couleurs accidentelles.* Ann. de Chim. et de Phys. (3.) XLI. S. 413—431.
- 1855.
- §159. S. MARIANINI. *Sur une manière de voir facilement les couleurs accidentelles.* Arch. d. sc. phys. XXX. S. 325; Cimento. I. S. 165.
- 1856.
- §160. VAN BREDA. *Eenige waarnemingen over de zoogenaamde nabeelden.* Acad. van Wetenschap. te Amsterdam, afdel. Natuurk. V. S. 342.
- §161. J. M. SEGUIN. *Couleurs accidentelles.* Cosmos. IX. S. 39.
- §162. VIERORDT. Arch. f. physiol. Heilkde. Heft 2.
- 1857.
- §163. MELSENS. *Recherches sur la persistance des impressions de la rétine.* Bull. de Bruxelles. (2.) III. 214—252. Cl. d. sc. S. 735—777.
- 1858.
- §164. H. HELMHOLTZ. *Ueber Nachbilder.* Ber. über die 34. Vers. deutscher Naturf. in Carlsruhe. S. 225—226.
- §165. — *Ueber die subjectiven Nachbilder im Auge.* Niederrhein. Sitzg.-Ber. S. 98—100.



6166. H. AUBERT. Ueber das Verhalten der Nachbilder auf den peripherischen Theilen der Netzhaut. Moleschott, Unters. z. Naturlehre IV. S. 215—239.
6167. J. M. SÉGUIN. Note sur les couleurs accidentelles. Compt. Rend. XLVII. S. 198—201. 1859.
6168. H. AUBERT. Ueber die durch den electrischen Funken erzeugten Nachbilder. Moleschott, Unters. z. Naturlehre. V. S. 279—314. 1861.
6169. J. SMITH. On the chromoscope. Rep. of Brit. Assoc. 1860. 2. S. 65—66. 1861. 2. S. 33. 1862.
6170. H. AUBERT. Untersuchungen über die Sinnesthätigkeiten der Netzhaut. Pogg. Ann. CXV. S. 87—116. CXVI. S. 249—278.
6171. E. ROSE. Presentations of colour produced under novel conditions. Rep. of Brit. Assoc. 1861. 2. S. 33. (Aus intermittirendem Weiss und Schwarz.) 1863.
6172. M. BOKOWA. Ein Verfahren, künstliche Farbenblindheit hervorzubringen. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XVII. S. 161. 1864.
6173. H. AUBERT. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 347—386. 1865.
6174. E. BRÜCKE. Ueber Ergänzungsfarben und Contrastfarben. Wien. Sitzb.-Ber. LI.
6175. LADAME. Sur les couleurs accidentelles. Bull. de la Soc. des Sc. nat. de Neuchâtel VII. 1864—67. S. 84.
6176. E. MACH. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. I. Wien. Ber. Bd. 52. S. 303—322.
6177. F. BURCKHARDT. Die Contrastfarben im Nachbilde. Verh. d. naturf. Ges. i. Bas. IV. S. 263—285. 1866.
6178. F. BURCKHARDT. Die Contrastfarben im Nachbilde. Pogg. Ann. Bd. 129. S. 535 bis 548.
6179. LABORDE. Impressions persistantes de la lumière; comment elles s'accomplissent dans les yeux. Mondes. XI. S. 576—582. Pogg. Ann. Bd. 129. S. 660. Compt. Rend. Bd. 63. S. 87.
6180. E. MACH. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. II. Wien. Ber. Bd. 54. (2.) S. 131—134. — III. Wien. Ber. Bd. 54. S. 393.
6181. C. F. MÜLLER. Versuche über den Verlauf der Netzhautermüdung. Inaug. Diss. Zürich. 1867.
6182. E. CHEVEUL. Observations à propos d'une communication de M. Decharme sur divers phénomènes de vision. Compt. Rend. LXV. S. 612—613.
6183. CZERNY. Ueber Blendung der Netzhaut durch Sonnenlicht. Sitzb.-Ber. d. k. k. Acad. d. Wiss. II. Abth. Oct.-Heft. B. LVI.
6184. H. W. DOVE. Optische Notizen. I. Vereinigung prismatischer Farben zu Weiss; II. Ueber subjektive Farben durch elektrische Beleuchtung. Pogg. Ann. Bd. 131. S. 651—653.
6185. TH. W. ENGELMANN. Ueber Scheinbewegung in Nachbildern. Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturwiss. Bd. III. S. 443.
6186. — Over schijnbewegingen bij nabebelden. Ned. Arch. III. S. 114.
6187. A. ROLLET. Zur Lehre von den Contrastfarben und dem Abklingen der Farben. Wien. Ber. Bd. 55. 2. S. 424—432. 1868.
6188. CZERNY. Ueber Blendung der Netzhaut durch Sonnenlicht. Wien. Ber. LVI. S. 409—428.
6189. E. MACH. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. IV. Wien. Ber. Bd. 57. (2.) S. 11—19.
6190. MONOYER. Idée d'une nouvelle théorie entièrement physique des images consécutives. Bull. de la Soc. des Sc. nat. de Strassbourg. I. S. 58 u. 65. 1870.
6191. DVORÁK. Versuche über die Nachbilder von Reizveränderungen. Wien. Acad. Ber. Bd. 61. Abth. 2. S. 257.

1192. C. MARANGONI. *Nuovo metodo di sviluppare nell' occhio le immagini accidentali abbaglianti*. Nuov. Cim. (2.) III. S. 132—147. Rendic. Lomb. (2.) III. 1. S. 189—196.
1193. J. M. SÉGUIN. *Mémoire sur les images accidentelles des objets blancs*. Compt. Rend. Bd. 70. S. 322—323.
1194. TAIT. *Note on a singular property of the retina*. Edinb. Proc. 1869/70. VII. S. 605—607.
- 1871.
1195. E. ADAMÜCK und M. WOJNOW. *Beiträge zur Lehre von den negativen Nachbildern*. Arch. f. Ophthalm. XVII. 1. S. 135.
1196. J. K. BECKER. *Zur Lehre von den subjectiven Farbenercheinungen*. Pogg. Ann. Supplem. Bd. V. S. 305.
1197. DUBRUNFAUT. *Vision*. Inst. S. 102.
- 1872.
1198. A. S. DAVIS. *On recurrent Vision*. Phil. Mag. (4.) XLIV. S. 526.
1199. DVORÁK. *Über Analoga der persönlichen Differenz zwischen beiden Augen und den Netzhautstellen desselben Auges*. Wien. Ber. 8. März 1872.
1200. S. EXNER. *Ueber den Erregungsvorgang im Sehnervenapparate*. Wien. Sitzungsber. LXV. (3.) S. 59.
1201. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. I. Ueber successive Lichtinduction*. Wien. Ber. (3.) LXVI. S. 5—24.
1202. MARANGONI. *Neue Methode, die Blendungsbilder im Auge zu entwickeln*. Pogg. Ann. Bd. 146. S. 115.
1203. C. A. YOUNG. *Note on Recurrent Vision*. Nature. V. S. 512. Sill. Journal (3.) III. S. 262. Naturf. V. S. 200. Phil. Mag. (4.) XLIII. S. 343.
- 1873.
1204. DELBOEUF. *Étude psychophysique. Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations, et spécialement des sensations de lumière et de fatigue*. Acad. de Belg. Bd. XXIII.
1205. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. III. Ueber simultane Lichtinduction und über successiven Contrast*. Wien. Ber. (3.) LXVIII. S. 229—244.
1206. LAMEY. *Mondes*. (2.) XXXII. S. 442.
1207. RAGONA SCINA. *Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva*. Mem. dell'Acad. di Modena. XIV. S. 7.
- 1874.
1208. W. SCHÖN. *Einfluss der Ermüdung auf die Farbenempfindung*. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 273.
- 1875.
1209. S. EXNER. *Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse. IV. Abh. Die Empfindungszone des Sehnervenapparates*. Pfüger's Arch. XI. S. 581—602.
1210. J. PLATEAU. *Sur les couleurs accidentelles ou subjectives*. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2<sup>me</sup> Ser. T. 39. No. 1. S. 100—119. 1. Janvier.
1211. REYMOND. *Stato torpido e hemeralopico della Retina*. Ann. d'Ottalm. IV. S. 40 bis 112.
1212. A. RICCÒ. *Sulla successione e persistenza delle sensazioni dei colori*. Atti della R. Acad. di sc. in Modena XVI.
1213. H. WALB. *Ueber periodische Ermüdung des Auges*. Klin. Monatsbl. für Augenheilkde. XIII. S. 195—199.
- 1876.
1214. DÖNHOFF. *Beiträge zur Physiologie. IV. Ueber oscillirende Gesichtsempfindungen*. Arch. f. anat. Physiol. u. wiss. Med. (4.) S. 459.
1215. H. HARTSHORNE. *On some disputed points in physiological optics*. Proc. of the Amer. philos. Soc. XVI. S. 218 u. 221.
1216. KLEINER. *Interessante physiologisch-optische Beobachtungen*. Gaa XII. S. 378. — Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zürich. XX. S. 488.
1217. H. MORTON. *Ein neues Chromatrop*. Pogg. Ann. Bd. 157. S. 150—155.
1218. J. PLATEAU. *Sur les couleurs accidentelles ou subjectives*. Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 2. sér. XLII. No. 9, 10 und 11.
1219. RICCÒ. *Esperienze cromostroboscopiche*. Annuario della Soc. dei Naturalisti in Modena. X. fasc. 1.

## 1877.

6220. E. CHEVREUL. *Sur un phénomène de l'insolation de l'oeil, qui n'a point encore été expliqué.* Compt. Rend. Bd. 84. S. 895—900.  
 6221. P. CINTOLESI. *Sopra un fenomeno d'ottica fisiologica; Nota preliminare.* Nuove Cimento. (8.) II.  
 6222. J. v. KRIES. *Ueber Ermüdung des Sehnerven.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. 2. S. 1—43.  
 6223. O. N. ROOD. *Observations on a property of the retina first noticed by Tait.* Sillim. Journ. XIII. S. 32.

## 1878.

6224. P. CINTOLESI. *Notice relative à quelques phénomènes subjectifs observés dans l'illumination intermittente de la rétine.* Arch. des sc. phys. et nat. T. 63. S. 24.  
 6225. S. EXNER. *Zur Kenntniss von der Regeneration in der Netzhaut.* Pflüger's Arch. XVI. S. 407.  
 6226. RICHET. *Excitabilité de la rétine.* Progr. méd. No. 45. S. 859.

## 1879.

6227. J. AITKEN. *A new variety of ocular spectrum.* Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh Vol. X. — Journ. of anat. and phys. XIII. 8.  
 6228. E. CHEVREUL. *Sur les pirouettes complémentaires.* Compt. Rend. Bd. 88. S. 77.  
 6229. S. EXNER. *Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und die Druckblindheit.* Pflüger's Arch. XX. S. 614—626.  
 6230. P. CINTOLESI. *Intorno alle immagini accidentali o soggettive.* Ann. di Ottalm. Arch. VIII. fasc. 2 u. 3.  
 6231. RICHET und BREGUET. *Influence de la durée et de l'intensité sur la perception lumineuse.* Compt. Rend. Bd. 88. S. 239—240. — Gaz. hebdomadaire. No. 7. — Arch. génér. de méd. April.

## 1880.

6232. J. PLATEAU. *Une application des images accidentelles.* Bull. de l'Acad. de Belgique 2 sér. T. XLIX. No. 5.  
 6233. RICHET und BREGUET. *De l'influence de la durée de l'intensité de la lumière sur la perception lumineuse.* Arch. de phys. (2.) VII. S. 689—696.  
 6234. J. M. SÉGUIN. *Images accidentelles des objets blancs.* Ann. de Chim. et de Phys. (5.) XIX. S. 450—464.  
 6235. THOMPSON. *A new illustration of persistence of vision.* Journ. of the Franklin Institute. (3.) LXXIX. S. 53.

## 1881.

6236. A. CHARPENTIER. *Illumination violette de la rétine, sous l'influence d'oscillations lumineuses.* Compt. Rend. Bd. 92. No. 7. S. 355—357.  
 6237. E. EMMEERT. *Größenverhältnisse der Nachbilder.* Kl. Monatsbl. f. Augenheilkde. December.  
 6238. H. KUENT. *Ueber farbige Lichtinduction.* Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. 1.  
 6239. J. PLATEAU. *Une application des images accidentelles.* Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique. (3.) II. 9/10.  
 6240. SMITH. *Apparent decomposition of sun-light by intermittent reflecting surfaces.* Nature. XXIV. S. 141.

## 1882.

6241. B. DEUTSCHMANN. *Ueber Blendung der Netzhaut durch directes Sonnenlicht.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 241.  
 6242. HAAB. *Ueber die Schädigung der Augen durch Sonnenlicht.* Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. No. 12. S. 381.  
 6243. J. B. HANNAY. *Colour-Perception.* Nature. Vol. XXV. S. 604.  
 6244. MACÉ DE LÉPINAY et W. NICATI. *Sur un phénomène d'optique physiologique.* Journ. de Phys. (2.) I. S. 86.  
 6245. D. OUGHTON. *Motor diathesis of the secondary perceptions.* Lancet. S. 134.  
 6246. — *Composition, resolution and obeyance of secondary perceptions.* Lancet. S. 106.  
 6247. J. PLATEAU. *Sur les sensations que l'auteur éprouve dans les yeux.* Bull. Bruxelles. (3.) III. S. 241—243.  
 6248. POUCHET. *Sur une espèce particulière des images consécutives d'origine cérébrale.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 301.

6249. NAPIER SMITH. *Colour-Perception*. Nature. XXVI. S. 3.  
 6250. SWAN. *Perception of Colour*. Nature. XXVI. S. 246.  
 1888.  
 6251. A. CHARPENTIER. *Recherches sur la vitesse des réactions d'origine rétinienne*. Arch. de physiol. norm. et pathol. I. S. 599.  
 6252. REICH. *Blendung durch Beobachtung einer Sonnenfinsternis*. Wratsch. No. 45 und 46.  
 1884.  
 6253. G. ST. CLAIR. *Spectrum colours, colour sensations and after images. Suggestions for extending the dynamical theory*. Proc. of the Birmingh. Phil. Soc. Vol. IV. Part. I. S. 116. — Ophthalm. Rev. III. S. 97.  
 6254. E. O. ERDMANN. *Ueber ungleiche Ermüdung centraler und peripherischer Theile der Netzhaut*. Verhandl. d. physikal. Gesellsch. zu Berlin. 22. Febr.  
 6255. S. EXNER. *Ueber den Sitz der Nachbilder im Centralnervengorgan*. Exner's Rep. d. Phys. Bd. XX. S. 374.  
 6256. LE ROUX. *De la dislocation mécanique des images persistentes*. Acad. des Sc. Sitzung vom 20. October.  
 6257. J. ROYCE. *Afterimages*. Science. III. S. 321.  
 6258. M. v. VINTSCHGAU und A. LUSTIG. *Zeitmessende Beobachtungen über die Wahrnehmung des sich entwickelnden positiven Nachbildes eines electrischen Funkens*. Pflüger's Arch. XXXIII. S. 494.  
 1885.  
 6259. S. BIDWELL. *On certain spectral images produced by a rotating vacuum tube*. Nature. XXXII. S. 30—31.  
 6260. — *Ocular After-Images and Lightning*. Nature. XXXII. S. 101—102.  
 6261. A. CHARPENTIER. *Sur la durée de l'adaptation de la rétine à l'obscurité*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 310.  
 6262. — *Recherches sur la perception différentielle successive*. Arch. d'Ophthalm. S. 1.  
 6263. A. S. DAVIS. *Ocular After-Images and Lightning*. Nature. XXXII. S. 126.  
 6264. FÉRE und A. LONDE. *Observations pour servir à l'histoire des effets dynamiques des impressions visuelles*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 362.  
 6265. W. M. LAURIN. *Ocular-Images and After Images*. Nature. XXXII. S. 197.  
 6266. H. F. NEWALL. *On Certain Stages of Ocular After-Images*. Nature. XXXII. S. 77—78.  
 6267. C. F. SINCLAIR. *Sun-blindness*. Journ. americ. med. ass. V. S. 483.  
 6268. WILLIAMS. *Snow blindness*. St. Louis med. and surg. Journ. XLVIII. S. 336.  
 1886.  
 6269. A. CHARPENTIER. *L'inertie rétinienne et la théorie des perceptions visuelles*. Arch. d'ophthalm. S. 114.  
 6270. — *Expériences sur la marche de l'adaptation rétinienne*. Arch. d'Ophthalm. S. 294.  
 6271. HOFFMANN. *Ueber die Schneeblindheit und einige verwandte Blendungserscheinungen*. Mitth. d. deutsch. u. österr. Alpenvereins. No. 6.  
 6272. E. P. LE ROUX. *Sur les images secondaires ou de persistance*. Compt. Rend. CII. S. 166—168.  
 6273. CH. A. OLIVER. *Subjective 'After-Color. (Complementary-Color.)* Proc. Amer. Phil. Soc. XXIII. S. 500—502.  
 1887.  
 6274. J. v. KRIES. *Entgegnung an Herrn E. Hering*. Pflüger's Arch. XLI. S. 389—397.  
 1888.  
 6275. A. BERLIN. *Om snöblindhet*. Nord. med. arkiv. XX. No. 3.  
 6276. E. HERING. *Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 1. Mittheilung. Ueber die Unabhängigkeit der Farbensgleichungen von den Erregbarkeitsveränderungen des Sehorgans*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 488—506.  
 6277. — *Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 2. Mittheilung. Ueber successive Lichtinduction und sogenannte negative Nachbilder*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 43. S. 264—288.  
 6278. — *Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 3. Mittheilung. Ueber die sogenannten Ermüdungserscheinungen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 43. S. 329—346.  
 v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

6279. T. INOUE. *Sehstörung durch Beobachtung der Sonnenfinsternisse*. Ber. d. Augen-klinik. Tokio.
- 1889.
6280. A. E. FICK und A. GÜRBER. *Ueber Netzhauterholung*. Ber. d. Ophthalm. Ges. in Heidelberg. 1889. S. 54.
6281. SAMUJLOW. *Zur Frage der Ermüdung der Netzhaut durch verschiedene Farben*. St. Petersburg. med. Wochenschr. No. 3. — Arch. f. Augenheilkde. XXI. 1. S. 119. — Wjestnik Ophthalm. 1889. No. 2. — Diss. Petersburg. — Tagebl. d. III. Congr. d. russ. Aerzte. S. 287.
6282. *Fatigue of sight*. Science. XIII. S. 41.
- 1890.
6283. A. CHARPENTIER. *Dédoublement de la sensation lumineuse*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. No. 18. S. 267—269.
6284. W. B. CROFT. *Experiment in Subjective Colours*. Nature. Vol. 42. No. 1086.
6285. H. EBBINGHAUS. *Ueber Nachbilder im binocularen Sehen und die binocularen Farbenerscheinungen überhaupt*. Pflüger's Arch. XLVI. S. 498—509.
6286. S. EXNER. *Das Verschwinden der Nachbilder bei Augenbewegungen*. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 47—52.
6287. A. E. FICK. *Ueber Erholung der Netzhaut*. Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. No. 9.
6288. A. E. FICK und A. GÜRBER. *Ueber Erholung der Netzhaut*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 2. S. 245—301.
6289. C. HESS. *Ueber die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Netzhaut mit homogenem Lichte*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 1. S. 1—32.
- 1891.
6290. A. CHARPENTIER. *Expériences démontrant la production de vibrations dans l'appareil visuel sous l'influence des excitations lumineuses*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. S. 355—356.
6291. — *Oscillations rétinienne*. Compt. Rend. CXIII. No. 3. S. 147—150.
6292. A. CHAUVÉAU. *Instrumentation pour l'exécution des diverses expériences relatives à l'étude du contraste binoculaire*. Compt. Rend. Bd. 113. S. 442—446.
6293. E. HERING. *Ueber Ermüdung und Erholung des Sehorgans*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. 3. S. 1—86.
6294. C. HESS. *Untersuchungen über die nach kurzdauernder Reizung des Sehorgans auftretenden Nachbilder*. Pflüger's Arch. XLIX. S. 190—208.
6295. A. SZILI. *Zur Erklärung der flatternden Herzen*. Du Bois' Arch. S. 157—163.
- 1892.
6296. A. CHARPENTIER. *Réaction oscillatoire de la rétine sous l'influence des excitations lumineuses*. Arch. de Physiol. (5.) IV. S. 541—553.
6297. — *Propagation à distance de la réaction oscillatoire de la rétine*. Arch. de Physiol. (5.) IV. S. 629—639.
6298. E. S. FERRY. *Persistence of vision*. The Americ. Journ. of Sc. (3.) XLIV. S. 192.
6299. A. E. FICK. *Entgegnung an E. Hering in Sachen der Netzhauterholung*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 3. S. 300—304.
6300. — *Ueber Ermüdung und Erholung der Netzhaut*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. S. 118—126.
6301. E. HERING. *Bemerkungen zu E. Fick's Entgegnung auf die Abhandlung über Ermüdung und Erholung des Sehorgans*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 2. S. 252—258.
6302. A. SZILI. *Flatternde Herzen*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 359—387.
6303. TH. WERTHEIM. *Eine Beobachtung über das indirecte Sehen*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 172—174.
6304. J. WIDMARK. *Om bländning af näthinna*. (Blendung der Netzhaut.) Nord. ophthalm. Tidsskr. V. 2. S. 57.
6305. — *Ueber Blendung der Netzhaut*. Skand. Arch. f. Physiol. IV. S. 281—295.
6306. A. E. WRIGHT. *A suggestion as to the possible cause of the corona observed in certain after-images*. Journ. of Anat. a. Pathol. Bd. 26. S. 192—197.
- 1893.
6307. M. BLIX. *Ueber gleichfarbige (isochromatische) Induction*. Skand. Arch. f. Physiol. V. S. 13—19.

6308. L. GROSSMANN. *Ueber reflectorische Hyper- und Anästhesie der Retina*. Wien. med. Pressa. 1893. No. 45, 46, 47.
6309. E. HERRING. *Offener Brief an Prof. H. Sattler*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 2. S. 274—290.
6310. C. HESS. *Ueber die Unerklärbarkeit gewisser Ermüdungserscheinungen des Sehorgans mit der Dreifasertheorie*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (2.) S. 45—70.
6311. K. MARBE. *Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen*. Phil. Stud. VIII. S. 615—637.
6312. ROSENBAUM. *Die Farbensirene und Bemerkungen über die Entstehung der Farben*. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. 8. Nov. 1893.
6313. A. SCHAPRINGE. *Zur Theorie der „Flatternden Herzen“*. Zeitschr. f. Psychol. V. 6. S. 885—896.
6314. H. SMELLEN, sen. *Ueber Nachbilder*. Ber. üb. d. XXIII. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 4—11. — Ann. d'Ocul. Bd. 110. S. 241.
6315. J. WIDMARK. *Ueber Netzhautblendung*. Nord. ophthalm. Tidskr. V. S. 2.
6316. P. ZERMAN. *Ueber eine subjective Erscheinung im Auge*. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 233—235.
- 1894.
6317. S. BIDWELL. *On the recurrent images following visual impressions*. Proc. of the roy. Soc. Bd. 56. No. 837. S. 132—145.
6318. H. P. BOSSCHA. *Primäre, secundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 22—42.
6319. C. HESS. *Bemerkung zu dem Aufsatz von Bosscha: „Primäre, secundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken.“* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 337—338.
6320. — *Studien über Nachbilder*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 259—279.
6321. G. MACKAY. *On blinding of the retina by direct sunlight. A study in prognosis (concluded)*. Ophthalm. Rev. XIII. S. 1, 41 u. 83.
6322. RAJA. *Ueber die Ermüdung der Augen*. Ann. di Ottalm. 1894. 3/4.

## § 24.

## Vom Contraste.

- 1651.
6323. LEONARDO DA VINCI († 1519). *Trattato della pittura*. Cap. CLVI, CC, CCCXXVIII.
- 1672.
6324. OTTO V. GUERICKE. *Experimenta nova, ut vocantur, Magdeburgica de vacuo spatio*. Amstelod. S. 142.
- 1788.
6325. JURIN. *Essay on distinct and indistinct vision*. S. 170.
- 1748.
6326. G. DE BUFFON. *Sur les couleurs accidentelles*. Mém. de Paris. S. 217.
- 1752.
6327. MAZEAU. *Observations sur les couleurs engendrées par le frottement des surfaces planes et transparentes*. Mém. de l'Acad. de Berlin.
- 1757.
6328. VOLTAIRE. *Essay sur l'histoire générale, et sur les mœurs et l'esprit des nations*. Chap. CXLII.
- 1760.
6329. P. BOUGUER. *Traité d'optique sur la gradation de la lumière*. Paris. S. 368.
6330. MELLVILLE. *Observations on light and colours. Essays and observations*. Phys. and Litt. Edinburgh. II. S. 12 u. 75.

1762.  
6331. J. P. EBERHARD. *Commentatio de colore aëris*. Nova acta Academiae curiosorum II. appendix.
1764.  
6332. AEPINUS. *Observationes quaedam ad opticam pertinentes*. Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg. (2.) X. S. 292.
1765.  
6333. SCHERFFER. *Abhandlung von den zufälligen Farben*. Wien. — Journ. de phys. de Rozier XXVI. S. 175. (1785.)
1767.  
6334. BEGUELIN. *Mémoire sur les ombres colorées*. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 27. 1771.
6335. BEGUELIN. *Sur la source d'une illusion du sens de la vue qui change le couleur d'écarlate*. Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin. Jahrg. 1771, erschienen 1778. S. 8.
1778.  
6336. v. GLEICHEN, gen. RUSSWORM. *Von den Farben des Schattens*. Act. Acad. Mart. S. 308.
6337. MONGEZ. *Observations sur une décomposition de lumière faussement appelée bleue*. Journ. de phys. de Rozier. XII. S. 127.
1782.  
6338. H. F. T. *Observations sur les ombres colorées*. Paris. 1782.
6339. FLAUGERGUES. *Sur les ombres colorées*. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 52.
6340. OPOIX. *Suite des observations sur les couleurs*. Journ. de Phys. de Rozier XII. (2.) S. 401.
6341. LEMASSON LE GOLET. *Lettre à M. l'Abbé Mongez*. Journ. de phys. de Rozier XXIII. (2.) S. 206.
6342. PETRINI. *Mem. di Math. e di Fisica del Soc. Ital.* XIII. S. 11. 1787.
6343. CARVALHO e SAMPAGO. *Tratado das Cores*. Malta. 1789.
6344. MONGE. *Mémoire sur quelques phénomènes de la vision*. Ann. de chim. III. S. 21. 1792.
6345. WILKENS. *Ein Beitrag zu den gefärbten Schatten*. Gren's Journ. VII. S. 21. 1794.
6346. RUMFORD. *An account of some experiments upon coloured shadows*. Philos. Trans. I. S. 107. 1796.
6347. VOIGT. *Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischungen*. Gren's Journ. III. S. 235. 1797.
6348. J. W. v. GOETHE. *Zur Schweiserreise im Jahre 1797*. 1801.
6349. HASENFRATZ. *Premier mémoire sur les ombres colorées*. Journ. de l'école polytech. IV. (11.) S. 272. 1805.
6350. PETRINI. *Lettera sulle ombre colorate*. Nuovo Giorn. di Pisa II. (1.) S. 45. 1805.
6351. — *Memoria sopra i colori immaginari dell' ombra*. Nuovo Giorn. di Pisa II. S. 376.
6352. — *Ricerche sulla produzione de' colori immaginari nell'ombra*. Mém. de la Soc. de Turin XIII. S. 37.
6353. PRIEUR DE LA CÔTE D'OR. *Bemerkungen über die Farben und einige besondere Erscheinungen derselben*. Gilbert's Ann. XXI. S. 815. Ann. de Chim. LIV. S. 1.
6354. HASENFRATZ. *Sur les ombres colorées*. Journ. de l'école polytech. XI. 1810.
6355. J. W. v. GOETHE. *Zur Farbenlehre*. S. 27. 1811.
6356. GROTHUSS. *Ueber die zufälligen Farben des Schattens*. Schweigger's Journ. III. S. 1.
6357. v. PAULA SCHRANK. *Ueber die blauen Schatten*. Abh. d. Münch. Akad. S. 295.

1818.

6358. v. PAULA SOHRANK. *Ueber die blauen Schatten*, Abhandl. der Münchener Akad. S. 57.

1820.

6359. MUNCKE. *Ueber subjective Farben und gefärbte Schatten*. Schweigger's Journ. XXX. S. 47.

1826.

6360. ZSCHOKKE. *Die farbigen Schatten, ihr Entstehen und ihr Gesetz*. Aarau. Unterhaltungsbl. f. Natur- u. Menschenkde. S. 49.

1827.

6361. BRANDES. Art.: *Farbe* in Gehler's neuem physik. Wörterb. IV. S. 124.

6362. TRESCHEL. *Sur les ombres colorées*. Biblioth. univers. XXXII. S. 3.

1828.

6363. BOURGEOIS. *Sur un nouveau phénomène d'optique*. Bullet. de Férussac. IX. S. 179.

1829.

6364. READE. *On the nature of light and shadow, demonstrating that a black shadow can be rarefied, without refraction, into all the colours of the rainbow*. Philos. Mag. N. S. V. S. 109.

1830.

6365. HIORT. *De functione retinae*. 2. Theil. §§ 7, 8, 34 u. 35

6366. TOURTUAL. *Ueber die Erscheinungen des Schattens und deren physiologische Bedingungen, nebst Bemerkungen über die wechselseitigen Verhältnisse der Farben*. Berlin.

6367. C. J. LEHOT. *Eine neue Erklärung der zufälligen Farben*. Froriep's Notizen. Bd. XXVIII. S. 177—181.

6368. — *Nouvelle explication des couleurs accidentelles*. Ann. des sc. d'observation par Saigey et Raspail. III. S. 329.

1831.

6369. GERGONNE. *Essai théorique sur les couleurs accidentelles*. Ann. de Mathém. pures et appliquées de Gergonne. XXI. S. 284.

1832.

6370. SMITH VON FOCHABERS. Edinb. Journ. of Sc. V. S. 52.

6371. D. BREWSTER. *Ueber den Versuch von Smith*. Pogg. Ann. XXVII. S. 494.

6372. E. CHEVREUL. *Sur l'influence, que deux couleurs peuvent avoir l'une sur l'autre, quand on les voit simultanément*. Mém. de l'Acad. de Paris. XI.

1833.

6373. OSANN. *Beschreibung einer einfachen Vorrichtung zur Hervorbringung sogenannter complementärer Farben und Nachweisung, daß die hiermit hervorgebrachten Farben objectiver Natur sind*. Pogg. Ann. Bd. XXVII. S. 694.

1834.

6374. J. MÜLLER. *Lehrbuch der Physiologie*. 2. Aufl. II. S. 372. — Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 144.

6375. J. PLATEAU. Ann. de chim. et de phys. LVIII. S. 339. Pogg. Ann. XXXII. S. 543.

1835.

6376. TOMLINSON. *On the theory of accidental and complementary colours, with additional experiments and observations*. Thomson's Records of gen. sc. II. S. 283 u. IV. S. 208. (1836.)

1836.

6377. COOPER. *On accidental colours and coloured shadows*. Thomson's Records. IV. S. 427.

6378. OSANN. *Ueber Ergänzungsfarben*. Pogg. Ann. XXXVII. S. 287.

6379. POHLMANN. *Theorie der farbigen Schatten, vollständig entwickelt und durch Versuche begründet*. Pogg. Ann. XXXVII. S. 319—341.

9380. J. PLATEAU. *Berichtigung, veranlaßt durch einen Aufsatz des Herrn Prof. Osann*. Pogg. Ann. XXXVIII. S. 626.

1837.

6381. OSANN. *Nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Ergänzungsfarben*. Pogg. Ann. Bd. 42. S. 72.

1838.

6382. \*G. TH. FECHNER. *Ueber die Frage, ob die sog. Farben durch den Contrast objectiver Natur seien*. Pogg. Ann. XLIV. S. 221—245 u. S. 513.



6383. H. W. DOVE. *Ueber subjective Complementärfarben*. Pogg. Ann. XLV. S. 158.  
1839.
6384. E. CHEVREUL. *De la loi du contraste simultané des couleurs*. Strasbourg.  
1840.
6385. \*G. TH. FECHNER. *Thatsachen, welche bei einer Theorie der Farben durch den Contrast zu berücksichtigen sind*. Pogg. Ann. Bd. 50. S. 433.  
1841.
6386. SCHAFFGOTSCH. *Ueber einige Apparate für subjective Farbenerscheinungen*. Pogg. Ann. Bd. 54. S. 193.  
1843.
6387. G. DE BUFFON. *Sur les couleurs accidentelles*. Mém. de Paris. S. 247.  
1847.
6388. D. RAGONA SCINA. *Su taluni fenomeni che presentano i cristalli colorati*. Racc. fis. chim. II. S. 207.  
1848.
6389. H. W. DOVE. *Ueber Scheiben zur Darstellung subjectiver Farben*. Pogg. Ann. Bd. 75. S. 524.  
1851.
6390. E. BRÜCKE. *Untersuchungen über subjective Farben*. Wien. Denkschr. III. S. 95. Pogg. Ann. LXXXIV. S. 418. Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 122.
6391. SINSTEDEN. *Ueber einen neuen Farbenkreis zur Darstellung subjectiver Complementärfarben und eine eigenthümliche Erscheinung, welche die Orangefarbe dabei zeigt*. Pogg. Ann. Bd. 84. S. 45.  
1852.
6392. A. BEER. *Ueber das überzählige Roth im Farbenbogen der totalen Reflexion (Contrastfarbe)*. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 113—115. Cosmos. II. S. 95.  
1854.
6393. CZERMAK. *Physiologische Studien*. I. Theil. Wien. Acad. Ber. XII. S. 322 u. 364. (Eine Modification des Scheiner'schen Versuches.)  
1855.
6394. H. MEYER. *Ueber Contrast- und Complementärfarben*. Pogg. Ann. XCV. S. 170—171. Ann. de chim. (3.) XLV. S. 507. Philos. Mag. (4.) IX. S. 547.  
1857.
6395. B. BIZIO. *Sopra le ombre colorate*. Venezia.
6396. — *Intorno alle ombre colorate*. Memorie dell'Istituto Veneto di sc. lettere et arti. VII. S. 393.
6397. E. WEICKER. *De nonnullis coloribus complementariis quales singulis hominibus apparent*.
6398. A. PAALZOW. *Ueber subjective Farben und die Entstehung des Glanzes*. Berl. Monatsber. S. 390.  
1858.
6399. E. CHEVREUL. *Note sur quelques expériences de contraste simultanée des couleurs*. Compt. Rend. XLVII. S. 196—198. Dingler Journ. CXLIX. S. 435—436.
6400. FOURNET. *Note sur certaines colorations de la lune et du soleil*. Compt. Rend. XLVII. S. 189.  
1859.
6401. BABINET. *Sur les ombres bleues du 27. mai 1856*. Compt. Rend. XLVIII. S. 1007.
6402. FOURNET. *Recherches sur les ombres colorées qui se manifestent à diverses heures, en diverses saisons, et sur les applications du phénomène*. Compt. Rend. XLVIII. S. 1105 u. XLIX. S. 24 u. 121.
6403. POEY. *Expériences sur les ombres prismatiques observées à La Havane en rapport avec la déclinaison du soleil et l'état atmosphérique*. Compt. Rend. XLIX. S. 362.
6404. NARDO. *Nota sulle ombre colorate ottenute col solo concorso di luce bianche*. Cimento. IX. S. 352—356. — Atti dell' Istit. Veneto. V. — Zeitschr. f. Chem. 1860. S. 18—20.
6405. D. RAGONA SCINA. *Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva*. Atti dell' Acad. Palermit. III. — Zeitschr. f. Chem. S. 20—24.  
1860.
6406. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Contrasterscheinungen im Auge*. Verhandl. d. Naturhist.-med. Vers. zu Heidelberg. 27. April. Bd. II. S. 32—33.
6407. G. TH. FECHNER. *Ueber die Contrastempfindung*. Leipziger Ber. S. 71—145.

6408. G. TH. FECHNER. *Einige Bemerkungen gegen die Abhandlung Prof. Osann's über Ergänzungsfarben.* Leipziger Ber. S. 146—165.
6409. OSANN. *Ueber Ergänzungsfarben.* Würzb. Zeitschr. I. S. 61—77.
6410. J. J. OPPEL. *Ueber farbige Schatten bewirkt durch weisses Licht.* Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1859—1860. S. 65—69.
6411. E. CHEVREUL. *Remarques sur une question relative à la loi du contraste simultané des couleurs.* Compt. Rend. LI. S. 448.
6412. GOODCHILD. *Trocheidoscope.* Practical mechan. journ. April. S. 4.
6413. MAGRINI. *Sulle ombre colorate studiate dal signor Bassolini.* Atti dell' Istituto Lombardo di sc. lettere ed arti, Milano. II. S. 318 u. 345.
6414. ZÖLLNER. *Ueber eine neue Beziehung der Retina zu den Bewegungen der Iris.* Pogg. Ann. CXI. S. 481 u. 660.
- 1861.
6415. NEWCOMB. *On some illusions and other phenomena attendant on vision through coloured media.* Silliman's Journ. XXXI. S. 418.
6416. ROSSOLINI. *Sulle ombre colorate.* Atti dell' Istit. Lombardo. II. 318—321.
6417. H. AUBERT. *Beiträge zur Physiologie der Netzhaut.* Abh. d. schles. Gesellsch. 1861. I. S. 49—103. S. 344.
- 1862.
6418. G. TH. FECHNER. *Ueber den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch.* Leipziger Ber. S. 27—56.
- 1863.
6419. F. BURCKHARDT. *Ueber Contrastfarben.* Pogg. Ann. Bd. 118. S. 303.
6420. E. CHEVREUL. *Nouvelles expériences sur le principe du contraste simultané des couleurs et de leur mélange, en réponse à un Mémoire de M. Plateau: Sur un phénomène de couleurs juxtaposées.* Compt. Rend. LVII. S. 713.
6421. J. PLATEAU. *Sur un phénomène de couleurs juxtaposées.* Bull. de l'Acad. de Belg. (2.) XVI. S. 139.
6422. — *Réponse aux observations présentées par M. Chevreul.* Compt. Rend. LVII. S. 1029.
- 1865.
6423. F. BURCKHARDT. *Die Contrastfarben im Nachbilde.* Basler Verhandl. IV. S. 263 bis 285.
6424. E. BRÜCKE. *Ueber Ergänzungs- und Contrastfarben.* Wien. Sitzgs.-Ber. LI. 2. S. 461 bis 501.
- 1866.
6425. F. BURCKHARDT. *Die Contrastfarben im Nachbilde.* Pogg. Ann. Bd. 129. S. 529—548.
- 1867.
6426. A. ROLLET. *Ueber die Aenderung der Farben durch den Contrast.* Wien. Ber. LV. (2.) S. 344—357.
6427. — *Zur Physiologie der Contrastfarben.* Wien. Akad.-Ber. LV. Febr., März- u. Maiheft. S. 741—767.
6428. — *Zur Lehre von den Contrastfarben und dem Abklingen der Farben.* Wien. Ber. Bd. 55. (2.) S. 424—432.
- 1868.
6429. BRAUN. *Photographies de feuillage, et couleurs de contraste.* Les Mondes (2.) XVII. S. 62.
- 1869.
6430. G. TH. FECHNER. *Ueber die Contrastempfindung.* Ber. d. königl. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Kl. Sitzung v. 1. Juli.
6431. W. BENSON. *Contrast and admixture of colours.* Scient. Americ. XX. S. 257—258.
- 1870.
6432. L. HERMANN. *Die Erscheinung simultanen Contrastes.* Pflüger's Arch. f. Physiol. III. S. 13—15.
- 1871.
6433. J. K. BECKER. *Zur Lehre von den subjectiven Farbenercheinungen.* Pogg. Ann. Ergänzungs. V. S. 305.
6434. H. W. DOVE. *Ueber die subjectiven Farben an den Doppelbildern farbiger Glasplatten.* Pogg. Ann. CXLIII. S. 491. Berl. Akad.-Ber. April.

6435. DUBRUNFAUT. *Sur quelques particularités des perceptions visuelles objectives et subjectives.* Mondes XXI. S. 77. — Compt. Rend. Bd. 73. S. 752.
6436. J. J. OPPEL. *Ueber chromatische Täuschungen, den relativen Werth der Farbenbezeichnungen und das Zustandekommen unserer Farbenwahrnehmung überhaupt.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1869/70. S. 96—105.
6437. TH. WARD. *Optical Phenomenon.* Nature IV. S. 68.  
1872.
6438. J. AITKEN. *On colour and colour sensation.* Proc. of the roy. Scot. Soc. of arts. 1871—72.  
1873.
6439. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. II. Ueber simultanen Lichtcontrast.* Wien. Ber. (3.) LXVIII. S. 186—201.
6440. — *Zur Lehre vom Lichtsinn. III. Ueber simultane Lichtinduction und über successiven Contrast.* Wien Ber. (3.) LXVIII. S. 229—244.
6441. D. RAGONA SCINA. *Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva.* Mem. dell'Acad. di Modena. XIV. S. 7.  
1874.
6442. E. CHEVREUL. *Études des procédés de l'esprit humain dans la recherche de l'inconnu. II. L'enseignement devant l'étude de la vision, la loi du contraste simultané des couleurs.* Paris, Frimin-Didot frères, fils & Co.
6443. E. HERING. *Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Grundzüge einer Theorie des Farbensinnes.* Wien. Akad. Ber. LXX. (3.) S. 169.  
1875.
6444. J. PLATEAU. *Sur les couleurs accidentelles ou subjectives.* Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2<sup>me</sup>. Ser. T. 39. No. 1. S. 100—119.
6445. C. SCHRÖDER. *Farbige Schatten.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 354.
6446. J. STILLING. *Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Beilageheft. XIII.
6447. WHITMELL. *Coloured shadows.* Nature. XI. S. 406.  
1876.
6448. J. PLATEAU. *Sur les couleurs accidentelles ou subjectives.* Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Ser. Tome XLII. No. 9, 10 u. 11.  
1877.
6449. E. CHEVREUL. *Sur un phénomène de l'insolation de l'oeil, qui n'a point encore été expliqué.* Compt. Rend. LXXXIV. S. 895.  
1878.
6450. H. COHN. *Ueber Contrastfarbenempfindung und die Unwahrscheinlichkeit ihrer Entstehung in historischer Zeit.* Allg. med. Centralztg. S. 399.
6451. — *Der Simultancontrast zur Diagnose der Farbenblindheit.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 35—36.
6452. GRAHAM. *On complementary colours.* Nature XVIII. S. 323.
6453. J. STILLING. *Farbige Schatten bei Tageslicht.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 124.  
1879.
6454. O. BECKER. *Farbige Schatten und inducirte Schatten.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. S. 236.
6455. E. CHEVREUL. *Complément d'études sur la vision des couleurs.* Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. XLI. S. 231.
6456. P. CINTOLESI. *Intorno alle immagini accidentali o suggestive.* Ann. di Ottalm. VIII. 2 u. 3. — Nature XXI. S. 21. — Beibl. d. Psys. III. S. 711.  
1881.
6457. E. DREHER. *Neue „subjective Wahrnehmungen“ auf Grund von Contrastwirkung.* Die Natur. No. 31. S. 371.
6458. W. J. HERSCHEL. *Effect of green in painted windows.* Nature XXIV. S. 583.
6459. L. MAUTHNER. *Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie.* Wien. med. Wochenschr. No. 38. 39.
6460. J. STILLING. *Simultancontrast bei Farbenprüfungen.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 129—131.
6461. E. SZILÁGYI. *Ueber Simultancontrast.* Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47. S. 849.

1892.

6462. CROSS. *Complementary colours*. Nature XXVII. S. 150.  
 6463. MADAN. *Complementary colours at the falls of Niagara*. Nature XXVII. S. 174.  
 6464. J. PARINAUD. *Du contraste chromatique*. Soc. de Biol. 22. Juli. — Gaz. des Hôp. S. 686.  
 6465. — *Du siège cérébral des images accidentelles ou consécutives*. Soc. de Biol. 22. April. Gaz. des Hôp. S. 459.  
 6466. TRÉCUL. *Noir vu en rouge orangé*. Compt. Rend. XCV. S. 1198.  
 6467. WHITMELL. *A natural experiment on complementary colours*. Nature. XXVI. S. 573.

1888.

6468. B. SCHMERLER. *Untersuchungen über den Farbencontrast vermittelt rotirender Scheiben*. Philos. Stud. I. S. 379—417.  
 6469. E. CHEVREUL. *Considérations générales sur les méthodes scientifiques et applications à la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori de Leibnits*. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1521—1545.

1884.

6470. E. CHEVREUL. *Sur la vision dans ses rapports avec les contrastes des couleurs*. Compt. Rend. XCVIII. S. 1309.  
 6471. G. H. SCHNEIDER. *Die psychologische Ursache der Contrasterscheinungen*. Zeitschr. für Philos. u. philos. Kritik. Bd. 85. S. 130—242.

1885.

6472. S. EXNER. *Ueber eine neue Urtheilstäuschung im Gebiete des Gesichtssinnes*. Pflüger's Arch. XXXVII. S. 520—522.  
 6473. M. HEATON. *Le contraste des couleurs*. La Nature. XIII. 2. S. 110.  
 6474. R. HILBERT. *Zur Physiologie der Retina*. Pflüger's Arch. XXXVII. S. 123—126.  
 6475. — *Die subjectiven Farben und die Hering'sche Farbentheorie*. Betz's Memorabilien. XXX. (2.) N. F. V. S. 65.  
 6476. RAMPOLDI. *Sopra alcuni fenomeni di contrasto visivo*. Ann. di Ottalm.

1886.

6477. A. CHARPENTIER. *Contraste simultané*. Progr. méd. No. 17. S. 354. Compt. Rend. CII. S. 864.  
 6478. E. HERING. *Ueber Sigmund Exner's neue Urtheilstäuschung auf dem Gebiete des Gesichtssinnes*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX. S. 159—170.

1887.

6479. H. EBBINGHAUS. *Die Gesetzmäßigkeit des Helligkeitscontrastes*. Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. II. S. 994.  
 6480. S. EXNER. *Gegenbemerkung, „eine neue Urtheilstäuschung im Gebiete des Gesichtssinnes“ betreffend*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 323.  
 6481. E. HERING. *Ueber den Begriff „Urtheilstäuschung“ in der physiologischen Optik und über die Wahrnehmung simultaner und successiver Helligkeitsunterschiede*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 91.  
 6482. — *Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz*. I. Mittheilung. *Der Versuch mit den farbigen Schatten*. Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 172—191.  
 6483. — *Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz*. II. Mittheilung. *Der Contrastversuch von H. Meyer und die Versuche am Farbenkreisel*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 1—29.  
 6484. — *Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz*. III. Mittheilung. *Der Spiegelcontrastversuch*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 358—367.

1888.

6485. D. AXENFELD. *Sulla visione dei colori di contrasto*. Bull. della R. Accad. Med. di Roma. XIV. 7.  
 6486. E. HERING. *Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz*. IV. Mittheilung. *Die subjective „Trennung des Lichtes in zwei complementäre Portionen.“* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 1—21.  
 6487. — *Eine Vorrichtung zur Farbmischung zur Diagnose der Farbenblindheit und zur Untersuchung der Contrasterscheinungen*. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 119.

1889.

6488. D. AXENFELD. *Sur la vision des couleurs de contraste*. Arch. ital. de Biol. XI. S. 81 bis 90.  
 6489. O. N. ROOD. *On colour contrast*. Mind. XV. S. 312.

1890.

6490. E. CHEVREUL. *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés considéré d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture etc.* Paris, Gauthier Villars et fils.
6491. E. HERING. *Eine Methode zur Betrachtung des Simultancontrastes.* Pflüger's Arch. XLVII. S. 236—242.
6492. — *Beitrag zur Lehre vom Simultancontrast.* Zeitschr. f. Psychol. I. S. 18—28.
6493. A. KIRSCHMANN. *Ueber die quantitativen Verhältnisse des simultanen Helligkeits- und Farbencontrastes.* Philos. Stud. VI. S. 417—491. — Leipzig, Dissert.
- 1891.
6494. A. KIRSCHMANN. *Die psychologisch-ästhetische Bedeutung des Licht- und Farbencontrastes.* Wundt's Philos. Stud. VII. S. 362—393.
6495. A. ROLLET. *Versuche über subjective Farben.* Pflüger's Arch. XLIX. S. 1—28.
- 1892.
6496. R. HILBERT. *Zur Kenntniss des successiven Contrastes.* Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 74 bis 77.
6497. A. KIRSCHMANN. *Some effects of contrast.* Americ. Journ. of Psychol. IV. 4. S. 542—557.
- 1893.
6498. R. KATZ. *Ueber die Empfindlichkeit des Auges für simultanen und succedanen Lichtcontrast.* Diss. St. Petersburg.
6499. A. A. MAYER. *Studies of the Phenomena of Simultaneous Contrast Colour, and as a Photometer for Measuring the Intensities of Lights of different Colours.* Philos. Mag. XXXVI. No. 219. S. 168—175. — Amer. Journ. of science. Vol. XLVI.
- 1894.
6500. W. DE W. ARNEY. *Measurement of colour produced by contrast.* Proc. of the London Roy. Soc. LVI. No. 337. S. 221—229.
6501. C. HESS und H. PRETORI. *Messende Untersuchungen über die Gesetzmäßigkeit in simultanen Helligkeitscontrastes.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. 4. S. 1—24.

## § 25.

## Verschiedene subjective Erscheinungen.

Außer den hier aufgeführten Abhandlungen ist auch ein Theil der in § 15 angegebenen Litteratur zu berücksichtigen.

1816.

6502. *Ueber physiologie Gesichts- und Farbenercheinungen.* Schweigger's Arch. Bd. 16. S. 121—157.

1834.

6503. D. BREWSTER. *On the influence of successive impulses of light upon the retina.* Philos. Mag. IV. S. 241—245.
6504. M. GRIFFITHS. *Observations on the vision of the retina.* Phil. Mag. IV. S. 43—46.

1839.

6505. A. A. EWERBECK. *De phaenomenis opticis subjectivis.*

1844.

6506. W. HAIDINGER. *Ueber das directe Erkennen des polarisirten Lichts.* Pogg. Ann. LXIII. S. 29.

1846.

6507. W. HAIDINGER. *Ueber complementäre Farbeindrücke bei Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel.* Pogg. Ann. LXVII. S. 435.
6508. — *Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel in geradlinig polarisirtem Licht.* Pogg. Ann. LXVIII. S. 73.

6509. W. HAIDINGER. *Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel auf Flächen, welche das Licht in zwei senkrecht auf einander stehenden Richtungen polarisiren.* Pogg. Ann. LXVIII. S. 305.
6510. SILBERMANN. *Essai d'explication des houppes ou aigrettes visibles à l'oeil nu dans la lumière polarisée.* Compt. Rend. XXIII. S. 624. Inst. No. 665. S. 827.  
1847.
6511. v. ERRLACH. *Mikroskopische Beobachtungen über organische Elementartheile bei polarisiertem Licht.* Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 318.
6512. W. HAIDINGER. *Helle Andreaskreuzlinien in der Sehaxe.* Ber. d. Freunde d. Naturwiss. in Wien. II. S. 178. Pogg. Ann. LXX. S. 408.
6513. BOTENHART. *Polarisationsbüschel am Quarz.* Ber. d. Freunde d. Naturwiss. in Wien. I. S. 82.
6514. — *Sur une modification des houppes colorées de Haidinger.* Compt. Rend. XXIV. S. 44. Inst. No. 680. S. 11. Pogg. Ann. LXX. S. 899.  
1848.
6515. JAMIN. *Sur les houppes colorées de Haidinger.* Compt. Rend. XXVI. S. 197. Pogg. Ann. LXXIV. S. 145. Inst. No. 787. S. 53.  
1850.
6516. D. BREWSTER. *On the polarizing structure of the eye.* Sill. Journ. (2.) X. S. 394. Rep. of British Assoc. II. S. 5. Wien. Ber. V. S. 442.
6517. G. G. STOKES. *On Haidinger's brushes.* Sill. Journ. (2.) X. S. 394. Rep. of British Assoc. II. S. 20.
6518. W. HAIDINGER. *Das Interferenzschachbrettmuster und die Farbe der Polarisationsbüschel.* Wien. Ber. VII. S. 389. Pogg. Ann. LXXXV. S. 350. Cosmos. I. S. 252. 454.  
1852.
6519. W. HAIDINGER. *Die Loew'schen Ringe eine Beugungserscheinung.* Wien. Ber. IX. S. 240—249. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 451—461.  
1854.
6520. A. BUROW. *Der gelbe Fleck im eigenen Auge sichtbar.* J. Müller's Arch. S. 166.
6521. W. HAIDINGER. *Dauer des Eindrucks der Polarisationsbüschel auf der Netzhaut.* Wien. Ber. XII. S. 678—680. Pogg. Ann. XCIII. S. 318—320.
6522. — *Beitrag zur Erklärung der Farben der Polarisationsbüschel durch Beugung.* Wien. Ber. XII. S. 3—9. Pogg. Ann. XCI. S. 591—601.
6523. — *Einige neuere Ansichten über die Natur der Polarisationsbüschel.* Wien. Ber. XII. S. 758—765. Pogg. Ann. XCVI. S. 314—322.
6524. G. G. STOKES. *Ueber das optische Schachbrettmuster.* Wien. Ber. XII. S. 670—677. Pogg. Ann. XLVI. S. 305—318.  
1855.
6525. H. MEYER. *Ueber den die Flamme eines Lichtes umgebenden Hof, sowie Beiträge zu „Unempfindlichkeit der Netzhaut in der Nähe starker Lichteindrücke“, „Mondhöfe“, „Loew'sche Ringe“ u. s. w.* Pogg. Ann. Bd. 96. S. 285.  
1856.
6526. J. C. MAXWELL. *On the unequal sensibility of the foramen centrale to light of different colours.* Athen. S. 1093. Edinb. Journ. (2.) IV. S. 337. Inst. S. 444. Rep. of Brit. Assoc. II. S. 12.  
1857.
6527. F. W. PIEPER. *De phantasmatisbus nervi optici.* Halle.  
1858.
6528. POWER. *Philos. Mag.* (4.) XVI. S. 69.  
1859.
6529. D. BREWSTER. *Compt. Rend.* XLVIII. S. 614. — *Pogg. Ann.* Bd. 107. S. 846.
6530. H. MÜLLER. *Ueber die elliptischen Lichtstreifen von Purkinje.* Verhandl. der Würzburger phys.-med. Ges. IX. S. 30.  
1860.
6531. J. CZERMAK. *Ueber die entoptische Wahrnehmung der Stäbchen- und Zapfenschicht.* Wien. Ber. XLI. S. 644—648.  
1861.
6532. J. CZERMAK. *Zur objectiven Erklärung einiger sogenannten subjectiven Gesichtserscheinungen.* Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 163—174.

6533. PURKINJE. *Bemerkungen über eine subjective Lichterscheinung.* Prag. Ber. S. 84.  
 6534. L. REUBEN. *On normal quasi-vision of the moving blood-corpuscles within the retina of the human eye.* Sill. Journ. (2.) XXXI. S. 325—338 u. 417.  
 6535. D. BREWSTER. *On certain affections of the retina.* Philos. Mag. (4.) XXI. S. 20 bis 24. Sillim. Journ. (2.) XXXI. S. 417.  
 6536. — *On the optical study of the retina.* Athenaeum. S. 412. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 29. 1868.  
 6537. S. EXNER. *Ueber einige neue subjective Gesichterscheinungen.* Pflüger's Arch. I. S. 375—391. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 594.  
 6538. R. HOUDIN. *Nouveau moyen d'exploration de la rétine par les phosphènes. — Images subjectives de la macula lutea et de la fovea centralis.* Mondes. (2.) XVI. S. 764—767. Compt. Rend. LXVI. S. 630—633. 1869.  
 6539. B. A. POPE. *Entoptische Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Blutkreislauf.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 72—78 u. 459. 1870.  
 6540. J. K. BECKER. *Zur Lehre von den subjectiven Farbenerscheinungen.* Pogg. Ann. Erg.-Bd. V. S. 305—319. 1878.  
 6541. LAMEY. *Eine subjective Gesichterscheinung.* Mondes. XXXII. S. 442.  
 6542. D. RAGONA SCINA. *Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva.* Cimento. (2.) X. S. 48. Mem. dell' Accad. d. Modena. XIV. 1877.  
 6543. A. RICCÒ. *Sopra un fenomeno soggettivo di visione.* Ann d'Ottalm. VI. S. 547. 1879.  
 6544. F. J. C. ACKROYD. *On a visual phenomenon and its explanation.* Nature. No. 515. Philos. Mag. (5.) XLVI. S. 334.  
 6545. A. EWALD. *Ueber die entoptische Wahrnehmung der Macula lutea und des Schpurpurs.* Heidelb. physiol. Unt. II. 2. S. 241.  
 6546. HAAB. *Die Farbe der Macula lutea und die entoptische Wahrnehmung des Schpurpurs.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. October. 1881.  
 6547. A. CHARPENTIER. *Illumination violette de la rétine, sous l'influence des oscillations lumineuses.* Compt. Rend. XCII. No. 7. S. 355—357.  
 6548. C. EMERY. *La perception entoptique del colore del fondo del occhio.* Ann. dell' Acad. dei Lincei. (3.) VI. S. 49—51. 1882.  
 6549. S. E. AYRES. *Der Blutlauf in der Gegend des gelben Flecks.* Arch. of Ophthalm. XI. S. 476. Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 29. (1883.)  
 6550. C. EMERY. *La perception entoptique de la couleur du fond de l'oeil.* Arch. ital. de biol. I. S. 225.  
 6551. G. MAYERHAUSEN. *Einiges über den Maxwell'schen Fleck.* Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (2.) S. 283. 1883.  
 6552. E. BERTHOLD. *Ueber subjective Farbenempfindungen.* Schr. d. Königsb. Ges. XXIV. S. 33.  
 6553. G. MAYERHAUSEN. *Beitrag zur Kenntniss der Photopsien in der Umgebung des Fixirpunktes.* Arch. f. Ophthalm. XXIX. (4.) S. 199.  
 6554. — *Ueber eine eigenthümliche Erscheinungsform des Eigentlichen der Netzhaut nebst Bemerkung über die Gleichgewichtslage der Bulbi im wachen Zustande.* Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 77.  
 6555. RAMPOLDI. *Sopra due nuovi fenomeni subbietivi della visione colorata.* Ann. di Ottalm. S. 545. 1884.  
 6556. A. KÖNIG. *Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichterscheinung.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (3.) S. 329—330. — Verhandl. der physikal. Gesellsch. zu Berlin. 27. Juni.  
 6557. G. MAYERHAUSEN. *Studien über die Chromatokinopsien.* Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 31. — Arch. of Ophthalm. S. 81.  
 6558. — *Nachtrag zu meinem Aufsatz: Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren.* Graefe's Arch. XXX. (4.) S. 311.

6559. A. RICCÒ. *Fenomeno di colorazione soggettiva prodotto dalla luce palpebrale*. Ann. di Ottalm. XIII. S. 452.  
1885.
6560. D. GOYDER. *On a peculiar retinal light and its probable cause*. Med. Press. a. Circ. XXXVIII. S. 4.
6561. AD. OLSHAUSEN. *Entoptische Untersuchung eines centralen Blendungs-Scotoms nebst einigen die Macula lutea betreffenden anatomischen und physiologischen Beobachtungen und Betrachtungen*. Diss. Halle.  
1886.
6562. J. COLASANTI und G. MENGARINI. *Il fenomeno spectrale fisiologico*. Lincei Mem. (4.) III. S. 65—77.
6563. CROSS. *Abnormal visual sensations*. Americ. Journ. of the med. sc. No. 184. S. 415.
6564. S. EXNER. *Zwei subjective Erscheinungen im Gebiete des Gesichtssinnes*. Protok. d. Sitzg. d. chem.-phys. Ges. zu Wien vom 8. Dec. 1885.
6565. RAMPOLDI. *Sopra un fenomeno visivo suscitato dalla atropina; osservazioni e sperimenti*. Ann. univ. di med. e chir. CCLXXV. S. 113.  
1887.
6566. C. ADDARIO. *Su di una imagine endottica intraretinica*. Ann. di Ottalm. XVI. S. 476.
6567. A. CHARPENTIER. *Quelques phénomènes entoptiques*. Arch. d'Ophthalm. VII. S. 209.  
1888.
6568. C. ADDARIO. *Sul significato anatomico di una immagine endottica a mosaico d'esagoni*. Ann. di Ottalm. XVII.
6569. J. COLASANTI und G. MENGARINI. *Das physiologische Spectralphänomen*. Moleschott's Unters. zur Naturl. XIII. 6. S. 451.
6570. R. GEIGEL. *Ueber Reflexion des Lichtes im Innern des Auges und einen neuen Versuch zur Erklärung der Haidinger'schen Polarisationsbüschel*. Wiedemann's Ann. XXXIV. S. 347—361. — Sitzgs.-Ber. d. Würzb. phys.-med. Ges.  
1889.
6571. RAMPOLDI. *Sopra un fenomeno subiettivo della visione*. Ann. di Ottalm. XVIII. 6. S. 487.  
1890.
6572. A. CHARPENTIER. *Caloration entoptique du champ visuel en pourpre violet*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 6. Juni S. 310.
6573. J. LE CONTE. *On a Curious Visual Phenomenon*. Americ. Journ. of Psychol. III. S. 364—366.  
1892.
6574. E. BAQUIS. *Alcuni fenomeni subiettivi della visione*. Ann. di Ottalm. XXI. — Ann. d'ophthalm. XII. 5. S. 274.
3575. G. L. JOHNSON. *Bemerkungen über die Macula lutea*. Arch. f. Augenheilkde. XXV. S. 157—175.  
1893.
5576. M. KUPFER. *Flimmerskotom und entoptische Erscheinungen*. Diss. Erlangen. 91 S.  
1894.
5577. TSCHIBIEW. *Eine neue entoptische Erscheinung*. Wjestnik Ophthalm. No. 6.



## § 26.

## Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen.

Hier ist nur die ältere Litteratur einigermaßen vollständig aufgeführt; hinsichtlich der neueren Litteratur muß auf die Zusammenstellungen in den entsprechenden philosophischen Werken verwiesen werden. — Siehe auch die Litteratur von § 33.

1637.  
6578. CARTESIUS. *Dioptrice*. Oeuvres publiées par V. Cousin. T. V.  
1644.  
6579. CARTESIUS. *Principia Philosophiae*. T. III.  
1708.  
6580. LEIBNITZ. *Nouveaux essais sur l'entendement humain*. Opera philos. ed. Erdmann.  
I. S. 194.  
1709.  
6581. BERKELEY. *Theory of vision*. London.  
1720.  
6582. LOCKE. *Essai sur l'entendement humain*. Trad. de l'Anglais. Londres. L. II. et IV.  
6583. HUME. *Untersuchungen über den menschlichen Verstand*.  
1787.  
6584. J. KANT. *Kritik der reinen Vernunft*. 2. Aufl. Riga.  
1811.  
6585. STEINBUCH. *Beiträge zur Physiologie der Sinne*. Nürnberg.  
1816.  
6586. J. F. HERBART. *Lehrbuch zur Psychologie*. Seine Werke, herausgegeben von  
Hartenstein. Leipzig. 1850 V.  
1825.  
6587. HERBART. *Psychologie als Wissenschaft*. Sämmtliche Werke. VI.  
1826.  
6588. JOH. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig.  
1849.  
6589. TH. WAITZ. *Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft*. Braunschweig.  
1852.  
6590. H. LOTZE. *Medicinische Psychologie*. Leipzig.  
1856.  
6591. H. LOTZE. *Mikrokosmos*. Leipzig.  
1858.  
6592. KOSACK. *Auslegung der Gesichtsempfindungen gegenüber dem modernen Sensualismus*.  
Nordhausen.  
1861.  
6593. C. S. CORNELIUS. *Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens*. Halle.  
6594. M. J. SCHLEIDEN. *Zur Theorie des Erkennens durch den Gesichtssinn*. Leipzig.  
6595. A. NAGEL. *Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhaut-*  
*stellen*. Leipzig und Heidelberg.  
1861—64.  
6596. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig.  
1862.  
6597. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung*. Leipzig und Heidelberg.  
Abgedruckt aus der Zeitschr. f. rat. Med. 1858—1862.  
1863.  
6598. A. CLASSEN. *Das Schlußverfahren des Schactes*. Rostock.  
6599. E. HERING. *Ueber Dr. A. Classen's Beitrag zur physiologischen Optik*. Arch. f.  
pathol. Anat. u. Physiol. VIII. 2. S. 179.  
1864.  
6600. C. S. CORNELIUS. *Zur Theorie des Sehens*. Halle.

6601. J. DASTICH. *Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne.* Prag. 1866.
6602. H. ULRICH. *Gott und der Mensch. I.: Leib und Seele, Grundsätze einer Psychologie des Menschen.* Leipzig. 1868.
6603. E. LEYDFF. *Ueber die Sinneswahrnehmungen.* Berlin. 1871.
6604. A. VERSTRAETE. *Note sur la question de savoir de quelle manière nous acquérons par la vue la connaissance des corps.* Bull. de Brux. XXXII. (2.) S. 155. 1872.
6605. ZÖLLNER. *Die Theorie der unbewußten Schlüsse in ihrer Anwendung auf die Gesichtswahrnehmungen.* S. 378 seines Werkes: *Ueber die Natur der Kometen.* Leipzig. 1873.
6606. C. STUMPF. *Ueber den physiologischen Ursprung der Raumvorstellung.* Leipzig. 324 S. 1876.
6607. O. LIEBMANN. *Zur Analysis der Wirklichkeit.* Daraus: *Zur Theorie des Sehens.* S. 128—169. Straßburg, Trübner. 1877.
6608. S. STRICKER. *Untersuchungen über das Ortsbewußtsein und dessen Beziehungen zu der Raumvorstellung.* Wien. Sitzgs.-Ber. LXXVI. (3. Abth.) 1878.
6609. DÖNHOF. *Ueber angeborene Vorstellungen bei den Thieren.* Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 387.
6610. H. HELMHOLTZ. *Die Thatsachen in der Wahrnehmung.* Berlin, Univers. Programm.
6611. S. STRICKER. *Untersuchungen über das Ortsbewußtsein und dessen Beziehungen zur Raumvorstellung.* Wien. Sitzgs.-Ber. LXXVI. (3.) Nov.-Heft. 1879.
6612. H. HELMHOLTZ. *Die Thatsachen in der Wahrnehmung.* Berlin, Hirschwald. 68 S.
6613. E. JÄESCHE. *Das räumliche Sehen.* Stuttgart, Enke. 130 S.
6614. P. R. SCHUSTER. *Giebt es unbewußte und vererbte Vorstellungen?* Herausgeb. von Zöllner. Leipzig. 83 S. 1880.
6615. BIBART. *Une expérience d'optique physiologique.* Journ. de phys. IX. S. 199—200.
6616. DUFOUR. *Sur l'expérience des sens.* Bull. de la soc. méd. de la Suisse Romande. 1881.
6617. F. CELLER. *Ueber Gesichtswahrnehmungen.* Presb. Verhandl. 1875—1880. S. 21—60. 1882.
6618. E. v. FLEISCHL. *Localzeichen und Organgefühle.* Med. Jahrb. S. 91.
6619. — *Physiologisch-optische Notizen.* 1. Mittheilung. Sitzgs.-Ber. d. k. Acad. d. Wiss. LXXXIII. 3. Abth. (Sitzg. v. 17. März 1881.)
6620. A. GENZMER. *Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen der neugeborenen Menschen.* Halle. 28 S. 1883.
6621. L. BORTHEM. *Einige Bemerkungen über Wahrnehmung und Vorstellung.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 451. 1884.
6622. TH. LOEWY. *Die Gemein-Ideen des Gesichts- und Tastsinnes.* Leipzig 1884. — Philos. Mag. (5.) XVII. S. 403—406. 1886.
6623. H. DE VARIGNY. *Le développement des sens, chez l'enfant, d'après M. Preyer.* Rev. Scientif. XXXVIII. S. 401. 1887.
6624. J. JASTROW. *Die Wahrnehmung des Raumes durch verschiedene Sinne.* John's Hopk. Univ. Circul. VI. S. 53. 1888.
6625. CH. DUNAN. *L'espace visuel et l'espace tactile.* Rev. Philos. XIII. 2. S. 134.
6626. E. REHFISCH. *Sinneswahrnehmung und Sinnesäusung.* Berlin, Fried & Co.
6627. G. K. UPHUES. *Wahrnehmung und Empfindung.* Leipzig, Duncker & Humblot. 289 S.

1889.  
 6628. D. AXELFELD. *Intorno all' origine della nozione di spazio*. Riv. di Filos. scient. VIII. S. 349.  
 6629. J. LOEB. *Untersuchungen über die Orientirung im Fühlraum der Hand und im Blickraum*. Pflüger's Arch. XLIV. S. 1.  
 1890.  
 6630. H. SPENCER. *Our Space-Consciousness: A Reply*. Mind. XV. S. 305—324.  
 1891.  
 6631. E. L. FISCHER. *Theorie der Gesichtswahrnehmung*. Mainz, Kirchheim. 392 S.  
 6632. C. REYMOND. *Le arti figurative ed un vecchio pregiudizio fisiologico sulla cina*. Torino, Paravia & Co.  
 6633. RUDZKI. *Ueber ein angeborenes Gefühl der Kardinalrichtungen des Horizonts*. B. Centralbl. XI. No. 2. S. 63.  
 1892.  
 6634. A. FARGES. *La critique de Kant sur l'espace et le temps*. Ann. de Philos. Chr. (N. S.) XXVI. S. 456—475.  
 6635. G. HIRTH. *Das plastische Sehen als Rindenzwang*. München, G. Hirth's Verlag. 80 S. mit 50 Textill. u. 34 Tafeln mit stereoskop. Abbildungen.  
 6636. C. STUMPF. *Zum Begriff der Localzeichen*. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 70—73.  
 1894.  
 6637. H. v. HELMHOLTZ. *Ueber den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinnesindrücke*. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 81—96.  
 6638. E. MILHAUD. *La projection externe des images visuelles*. Rev. Philos. XXXVIII. S. 210—222.

## § 27.

## Die Augenbewegungen.

1823.  
 6639. BELL. *On the motions of the eye*. Philos. Transact.  
 1826.  
 6640. JOH. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig. S. 251.  
 1836.  
 6641. A. W. VOLKMANN. *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns*. S. 33.  
 1838.  
 6642. HUECK. *Die Axendrehung des Auges*. Dorpat.  
 1840.  
 6643. SZOKALSKI. *De l'influence des muscles obliques de l'oeil sur la vision et de la paralysie*. Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gand. Sept.  
 6644. TOURTUAL. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol., im Jahresbericht S. XXIX; LV; LIX.  
 1842.  
 6645. A. BUROW. *Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges*. Berlin.  
 6646. VALENTIN. *Repertorium*. S. 407.  
 6647. C. F. KRAUSE. *Handbuch der menschlichen Anatomie*. S. 550.  
 1843.  
 6648. A. W. VOLKMANN. *Revision einiger in meinen Beiträgen zur Physiologie des Gesichtssinns aufgestellten Lehrsätze*. Müller's Arch. S. 1.  
 6649. SZOKALSKY. *Compt. Rend.*  
 1844.  
 6650. VALENTIN. *Lehrbuch der Physiologie des Menschen* II. S. 332.  
 1846.  
 6651. TOURTUAL. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 346.  
 6652. TH. RUETE. *Lehrbuch der Ophthalmologie*. S. 14.

6653. TH. RUETE. *Das Ophthalmotrop.* S. 9. Göttingen.  
 6654. F. C. DONDERS. *Nederl. Lancet.* August.  
 6655. A. W. VOLKMAN. Artikel: *Sehen* in Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. S. 337 bis 358. S. 281—290.  
 1847.  
 6656. F. C. DONDERS. *Beitrag zur Lehre von den Bewegungen des menschlichen Auges.* Holländ. Beitr. z. d. anat. und physiol. Wiss. I, S. 104—145; 384—386.  
 1848.  
 6657. F. C. DONDERS. *Noch etwas über Hueck's vermeintliche Axendrehung des Auges.* Holl. Beiträge. I. S. 384.  
 1854.  
 6658. G. MEISSNER. *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans.* Leipzig.  
 6659. CZERMAK. *Ueber Abhängigkeit der Accommodation und Convergenz.* Wien. Ber. XII. S. 337—358; XV. S. 438—454.  
 6660. A. FICK. *Die Bewegungen des menschlichen Augapfels.* Zeitschr. f. rat. Med. IV. S. 801.  
 1855.  
 6661. G. MEISSNER. *Zur Lehre von den Bewegungen des Auges.* Arch. f. Ophthalm. II. (1.) S. 1—123.  
 1856.  
 6662. G. MEISSNER. *Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie.* Zeitschr. f. ration. Med. 1856 und die folgenden Jahrgänge.  
 1857.  
 6663. TH. RUETE. *Ein neues Ophthalmotrop.* Leipzig.  
 1858.  
 6664. A. FICK. *Neue Versuche über die Augenstellungen.* Moleschott's Unters. z. Naturlehre d. Menschen. V. S. 193.  
 1859.  
 6665. G. MEISSNER. *Ueber die Bewegungen des Auges, nach neuen Versuchen.* Zeitschr. f. rat. Med. (3.) VIII. S. 1.  
 6666. F. v. RECKLINGHAUSEN. *Netzhautfunctionen.* Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 127.  
 6667. W. WUNDT. *Ueber die Bewegungen des Auges.* Verhandl. d. nat.-med. Ver. zu Heidelberg.  
 1860.  
 6668. H. AUBERT. *Eine scheinbare bedeutende Drehung von Objecten bei Neigung des Kopfes nach rechts oder links.* Virchow's Arch. XX. S. 381.  
 1862.  
 6669. W. WUNDT. *Ueber die Bewegungen der Augen.* Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 1—87.  
 6670. — *Beschreibung eines künstlichen Augenmuskelsystems zur Untersuchung der Bewegungsgesetze des menschlichen Auges im gesunden und kranken Zustande.* Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 88—114.  
 6671. F. C. DONDERS und D. DOJER. *Die Lage des Drehpunktes des Auges.* Arch. f. d. Holländ. Beitr. III. S. 560. — *Derde Versl. Gast. v. Oogl.* S. 209.  
 1863.  
 6672. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Bewegungen des menschlichen Auges.* Verhandl. d. Naturhist. med. Ver. zu Heidelberg. Bd. III. S. 62—67.  
 6673. — *Ueber die normalen Bewegungen des menschlichen Auges.* Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 153—214.  
 6674. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie.* 3. u. 4. Heft. Leipzig. (Kritisches gegen Meissner u. Helmholtz.)  
 6675. J. B. SCHUURMAN. *Vergelijkend Onderzoek der Beweging van het Oog bij Emmetropie en Ametropie.* Dissert. Utrecht. — *Vijde Versl. Gast. v. Oogl.* 1864. S. 1.  
 1864.  
 6676. H. HELMHOLTZ. *On the normal motions of the human eye in relation to binocular vision.* Proc. of London Roy. Soc. Vol. XIII. S. 186—199.  
 6677. GIRAUD-TEULON. *Compt. Rend.* LVIII. S. 361 (über Drehpunkt).  
 6678. E. HERING. *Die sog. Raddrehung des Auges in ihrer Bedeutung für das Sehen bei ruhendem Blick.* Reichert's und du Bois' Arch. S. 278.

## 1865.

6679. E. BERTHOLD. *Ueber die Bewegungen des kurzsichtigen Auges.* Arch. f. Ophthalm. XI. 8. S. 107.
6680. J. DASTICH. *Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne.* Abb. d. Böhm. Ges. (5.) XIII. S. 48—64.
6681. H. HELMHOLTZ. *Ueber den Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Projection der Retinalbilder nach außen.* Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. III. S. 170 bis 171. Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 244—245.
6682. — *Ueber die Augenbewegungen.* Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. — Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 255—256. No. 17. S. 257—259.

## 1866.

6683. BÖTTCHER. *Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective.* Arch. f. Ophthalm. XII. 2. S. 22—99.

6684. SCHLIJACHTIN. *Ueber die Bewegungen des Augapfels.* (Russisch.) Inaug.-Diss. Moskau. 1867.

6685. A. BUROW sen. *Das Gesetz der Axenstellung bei einseitiger Bewaffnung des Auges.* Arch. f. Ophthalm. XIII. 2. S. 327.

6686. J. HOCK. *Ueber ein Mittel, die bei der Bewegung der Augen eintretenden Meridianneigungen direct zu beobachten.* Wien. med. Wochenschr. XVII. S. 101.

## 1868.

6687. E. HERING. *Die Lehre vom binocularen Sehen.* I. Leipzig.
6688. J. J. MÜLLER. *Untersuchungen über den Drehpunkt des menschlichen Auges.* Inaug.-Diss. Zürich. — Arch. f. Ophthalm. XIV. (3.) S. 183.
6689. A. NAGEL. *Ueber das Vorkommen von wahren Rollungen des Auges um die Gesichtslinie.* Arch. für Ophthalm. XIV. (2.) S. 228.

## 1869.

6690. F. ABLT jun. *Tijdsbepalingen ten aanzien der bewegingen van den oogappel.* (Iris-Onderzoekingen in het Phys. Lab. te Utrecht. 2. R. II. S. 402. — Tiende Vers. Ned. Gasth. v. Oogl. S. 116. — Ned. Arch. IV. S. 481.
6691. E. HERING. *Ueber die Rollung des Auges um die Gesichtslinie.* Arch. für Ophthalm. XV. (1.) S. 1—16.
6692. A. W. VOLKMAN. *Zur Mechanik der Augenmuskeln.* Ber. d. kgl. sächsa. Ges. d. Wiss. XXI. S. 28—69.

## 1870.

6693. E. ADAMÜCK. *Over de innervatie der oogbewegingen.* Onderzoekingen in het Phys. Lab. te Utrecht. 2. R. III. S. 140. — Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 75. — Ned. Arch. V. S. 256.
6694. — *Zur Physiologie des N. oculomotorius.* Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 177—180.
6695. AUB. *Finden Raddrehungen der Augen bei Seitwärtsneigungen des Kopfes statt?* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 232.
6696. G. F. W. BAEHR. *Over de beweging van het oog.* K. Akad. van Wetensch. te Amsterdam. 29 April. Versl. en Med. afd. Natuurk. 2. Reeks. V. S. 273.
6697. — *Note sur les résultats d'une étude mathématique des mouvements de l'œil.* Arch. Néerl. des Sc. math. et nat. V. S. 233—235. — Mondes. XXVI. S. 730.
6698. F. C. DONDEES. *Die Bewegungen des Auges, veranschaulicht durch das Phänophthalmotrop.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 154.
6699. — *De beweging van het oog, toegelicht met het phaenophthalmotrop.* Onderzoekingen in het Phys. Lab. d. Utrechtsche Hoogesch. Tweede R. III. S. 119. — Ned. Arch. V. S. 222. — Versl. Ned. Gasth. Oogl. No. 11. S. 54.
6700. — *Over angeboren en verkregen associatie.* Als naschrift tot het onderzoek van Dr. Adamük. Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk. S. 247—256. Bijbladen 11 Versl. v. h. Ned. Gasth. v. oogl. S. 80—89.
6701. GIRAUD-TEULON. *De la loi de rotation du globe oculaire dans les mouvements associés des yeux.* Acad. des Sciences. 25 avril. — Compt. Rend. Vol. 70. S. 945. — Jour. de l'anat. et physiol. Juillet. — Gaz. hebdom. S. 291.
6702. L. KUGEL. *Ueber die Bewegungen des hypermetropischen Auges.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XVI. 1. S. 311—352.
6703. A. SKREBITZKY. *Bijdrage tot de leer der bewegingen van het oog.* Onderzoekingen in het Phys. Lab. te Utrecht. Tweede R. III. S. 424. — Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk. V. S. 476. — Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 80.

6704. M. WOJNOW. *Ueber die Raddrehungen des menschlichen Auges.* (Russisch.) Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. in Moskau. XII.
6705. — *Ueber den Drehpunkt des Auges.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 243. 1871.
6706. G. F. W. BAEHR. *Sur le mouvement de l'oeil.* Arch. néerl. VI. S. 127—161.
6707. E. BERLIN. *Beitrag zur Mechanik der Augenbewegungen.* Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 154. — Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 545. (Vorl. Mitth.)
6708. E. HITZIG. *Ueber die beim Galvanisiren des Kopfes entstehenden Störungen der Muskelinnervation und der Vorstellungen vom Verhalten im Raume.* Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 716—770.
6709. — *Weitere Untersuchungen zur Physiologie des Gehirns.* Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 771—772. — Berl. klin. Wochenschr. 1872. S. 504.
6710. J. MANNHARDT. *Ueber das Convergenzvermögen, dessen Leistungen, Bedingungen und Wirkungen.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 429—437.
6711. J. J. MÜLLER. *Ueber den Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Wahrnehmung der Tiefendimension.* Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 6. Mai 1871. S. 125—134.
6712. A. NAGEL. *Ueber das Vorkommen von wahren Rollungen des Auges um die Gesichtslinie.* Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 237.
6713. SAVARY. *De l'esprit d'observation dans les sciences médicales appliqué à l'étude de la physiologie des muscles de l'oeil et des paralysies musculaires.* Thèse de Paris.
6714. A. SKREBITZKY. *Ein Beitrag zur Lehre von den Augenbewegungen.* Arch. f. Ophthalm. XVII. 1. S. 107.
6715. M. WOJNOW. *Beiträge zur Lehre von den Augenbewegungen.* Arch. f. Ophthalm. XVII. 2. S. 233.
6716. — *Ueber die Raddrehung des Auges.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 387—391. 1872.
6717. W. DOBROWOLSKY. *Ueber Rollung der Augen bei Convergenz und Accommodation.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 53—66.
6718. F. C. DONDERS. *Ueber angeborene und erworbene Association.* Arch. f. Ophthalm. XVIII. 2. S. 153—164.
6719. FANO. *Note sur les fonctions du muscle grand oblique de l'oeil.* Union médicale, 31 août. Journ. d'Opht. S. 528.
6720. v. HASNER. *Die Applicationsgesetze der monocularen Bewegung.* Prager Vierteljahrsschr. Bd. IV. S. 114—128.
6721. KOSTAREFF. *De la rotation de l'oeil sur l'axe optique.* Inaug.-Diss. Moscou.
6722. LE CONTE. *Rotation of the eye on the optic axis.* Americ. Journ. of sc. and arts. II. Ser. Vol. 47. S. 153—168.
6723. J. SAMELSOHN. *Zur Frage von der Innervation der Augenbewegungen.* Arch. für Ophthalm. XVIII. (2.) S. 142—152. 1873.
6724. A. CHODIN. *Zur Lehre vom Drehpunkte in Augen verschiedener Refraction.* (Russisch.) Diss. Petersburg.
6725. F. C. DONDERS. *Versuch einer genetischen Erklärung der Augenbewegungen.* Pfüger's Arch. VIII. S. 373.
6726. — *De primaire standen van het oog: a) vor evenwijdige, b) vor convergente blicklijnen.* Onderzoekingen ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. II. S. 380. — Nederl. Gasthuis v. oogl. S. 8—13.
6727. A. GENZMER. *Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen.* Inaug.-Diss. Halle.
6728. J. v. HASNER. *Ueber den Seitenblickwinkel.* Wien. med. Wochenschr. No. 21.
6729. — *Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges etc. Die Applicationsgesetze der monocularen Bewegung, Theorie der parallelen Blicklinien.* S. 15—39.
6730. L. HERMANN. *Ein Apparat zur Demonstration der aus dem Listing'schen Gesetz folgenden scheinbaren Raddrehungen.* Pfüger's Arch. VIII. S. 305—306.
6731. E. HITZIG. *Zur Physiologie des Gehirns.* Berliner med. psych. Ges. 7. Juli 1873. Berl. Klin. Wochenschr. No. 52. S. 621.
6732. M. WOJNOW. *Augenbewegungen.* (Russisch.) St. Petersburg. 1874.
6733. J. BREUER. *Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinths.* Med. Jahrbücher der Wiener Aerzte. S. 72—124.

6734. S. EXNER. *Menière'sche Krankheit bei Kaninchen. Ein Versuch über Trochlear-Kreuzung.* Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. Math.-naturwiss. Cl. 70. III. Abth. S. 153.
6735. MULDER. *Over parallele Rollbewegingen der oogen.* Onderzoekingen ged. in te Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hooges. Derde B. III. 1. S. 118.
6736. W. SCHÖN. *Zur Raddrehung. I. Mittheilung.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 17 u. 308.
6737. C. STARK. *Ein Beitrag zur Lehre von den motorischen Innervationsherden in der Rinde der vorderen Centralwindung des Menschen.* Berl. klin. Wochenschr. S. 40.
6738. J. L. TUPPER. *On the centre of motion in the human eye.* Proc. of the Roy. Inst. of London. XXII. S. 429.

1875.

6739. F. C. DONDERS. *Naschrift over de wet der ligging van het netvlies in betrekking tot de van het blikvlak.* Onderzoekingen ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hooges. 3. B. III. S. 185—189. — XVII. Versl. van het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 68—72.
6740. — *Ueber das Gesetz von der Lage der Netzhaut in Beziehung zu der Blickebene.* Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) S. 125.
6741. — *Die correspondirenden Netzhautmeridiane und die symmetrischen Rollbewegungen.* Graefe's Arch. XXI. (3.) S. 100—132. — Onderz. etc. 3. Reihe. III. (2.) S. 45—75.
6742. GIRAUD-TEULON. *Ueber das Gesetz der Rotation bei combinirten Bewegungen des Auges.* Ann. d'Oculist. LXXIV. S. 113.
6743. A. GRAEFE. *Motilitätsstörungen des Auges.* Graefe-Sämisch, Handbuch der ges. Augenheilkde. Bd. VI, Cap. 9. Leipzig.
6744. MULDER. *Ueber parallele Rollbewegungen der Augen.* Arch. f. Ophthalm. XXI. S. 68.
6745. P. L. PANUM. *Bestemmelsen af Afstanden i mellem bølge øjnes Omdrejningspunkt.* Nord. med. Ark. VII. No. 9.
6746. RITZMANN. *Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen bei den gewöhnlichen Blickbewegungen.* Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) S. 131.
6747. W. SCHÖN. *Zur Raddrehung. II. Mittheil.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. S. 205—212.
6748. — *Apparat zur Demonstration des Listing-Donders'schen Gesetzes.* Klin. Monatsb. f. Augenheilkde. XIII. S. 430—435.
6749. WEISS. *Zur Bestimmung des Drehpunktes im Auge.* Arch. f. Ophthalm. XXI. S. 132—186.

1876.

6750. E. v. CYON. *Rapports physiologiques entre le nerf acoustique et l'appareil moteur de l'oeil.* Acad. des Sciences. 10. Avril. — Recueil d'Ophth. S. 175. — Ann. d'Ocul. T. 75. S. 171.
6751. F. C. DONDERS. *Korte Beschrijving van eenige Werktuigen en Toestellen tot de Collectie van het Physiologisch Laboratorium en het Nederlandsch Gasthuis voor Oogtijden behorende.* Onderzoekingen in het Physiolog. Laborat. te Utrecht. Derde Reek. IV, 1. S. 1—30.
6752. — *Versuch einer genetischen Erklärung der Augenbewegungen.* Pflüger's Arch. Bd. XIII. S. 373—421. — Utrecht'sche Onderzoekingen. Derde B. D. IV. 1. S. 83 bis 94. XVII. — Versl. van het Nederl. Gasth. etc. S. 73—136. — Ann. d'Oculist. LXXV. S. 213—237.
6753. E. L. HOLMES. *Ueber die Stellung der Augäpfel bei geschlossenen Lidern.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 374—475.
6754. E. LANDOLT. *Tableau synoptique des mouvements des yeux.* Delahaye, Paris.
6755. L. MAUTHNER. *Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges.* S. 634—648.
6756. M. E. MULDER. *Over parallele rollbewegingen der oogen.* Zeventiende Versl. van het Nederl. Gasth. etc. S. 1—67.
6757. W. NICATI. *Ueber das Tropometer (Instrument zur Messung der Augenbewegungen).* Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. VI. No. 15. S. 458.
6758. PRENGRÜBER. *Physiologie des muscles de l'oeil et leurs paralysies.* Thèse de Paris.
6759. SCHIAPARELLI. *Di alcune questioni concernenti il movimento degli occhi.* Ann. d'Ottalm. V. S. 243—262.
6760. E. RITZMANN. *Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen bei den gewöhnlichen Blickbewegungen.* Onderzoekingen, Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hooges. Derde B. IV. S. 95—113.

## 1877.

6761. F. C. DONDEBS. *Essai d'une explication génétique des mouvements oculaires.* (Suite.) Annal. d'Oculist. T. 77. S. 5 u. 97.
6762. FÉRÉOL. *Association synergique des deux yeux, persistant malgré la paralysie de la sixième paire d'un côté.* Gaz. des hôp. No. 90. 93. 98.
6763. A. GRAEFE. *Ophthalmotrop.* Amtl. Ber. d. 50. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu München. S. 332.
6764. LABORDE. *L'influence du bulbe rachidien sur les mouvements associés des yeux.* Gaz. méd. de Paris. No. 3 u. 5.
6765. LABORDE, DUVAL u. GRAUX. *Sur quelques points de la physiologie du bulbe rachidien.* Gaz. des hôp. S. 142.
6766. MERCIER. *Independent movements of the eyes under chloroform.* Brit. med. Journ. No. 845.
6767. W. NIOTI. *Méthode pour mesurer le champ du regard: Le Tropopérimètre.* Gaz. Méd. de Paris. S. 324. — Gaz. d. Hôpit. S. 556.
6768. E. RÄHLMANN u. L. WITKOWSKY. *Ueber atypische Augenbewegungen.* du Bois-Reymond's Arch. S. 454.
6769. WARNER. *Loss of associated movements of the eyes under chloroform and in disease.* Brit. med. Journ. No. 845.
6770. W. v. ZEHENDER. *Methode, die Distanz der Augendrehpunkte mit Hilfe der sogenannten Tapetenbilder zu bestimmen.* Amtl. Ber. d. 50. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu München. S. 382.

## 1878.

6771. M. DUVAL. *Zusatz zu der Abhandlung von Laborde: Influence du bulbe etc.* Gaz. méd. de Paris. S. 632.
6772. LABORDE. *Influence du bulbe sur les mouvements associés des yeux.* Gaz. méd. de Paris. S. 28.
6773. SANDER. *Ueber die Beziehungen der Augen zum wachenden und schlafenden Zustand des Gehirns und über ihre Veränderungen bei Krankheiten.* Arch. f. Psych. IX. S. 129.
6774. SCHWAHN. *Ueber das Schielen nach Verletzungen in der Umgebung des kleinen Gehirns.* Eckhardt, Beiträge zur Anat. u. Physiol. VIII. (3.) S. 149.
6775. SIEMENS. *Zur Lehre vom epileptischen Schläfe und vom Schläfe überhaupt.* Arch. f. Psych. IX. (3.) S. 72.

## 1879.

6776. H. BIESINGER. *Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Accommodation und Convergens der Blicklinien.* Inaug.-Diss. Tübingen. Abgedruckt in Nagel's Mittheil. aus der ophthalmiatr. Klinik in Tübingen. Heft 1. S. 58.
6777. DUVAL. *Sur l'innervation des mouvements conjugués des yeux.* Gaz. méd. de Paris. S. 389.
6778. — *Der wahre Ursprung der motorischen Nerven des Auges.* Gaz. hebdom. No. 27.
6779. CL. GALLOPAIN. *Le Pli Courbe n'est ni le siège de la perception des impressions visuelles ni le centre des mouvements des yeux.* Ann. méd.-psychol. (6.) II. 2. S. 177—188.
6780. E. HERING. *Ueber Muskelgeräusche des Auges.* Wien. Akad. Ber. 79. III. Abth.
6781. — *Physiologie des Gesichtssinnes. Der Raumsinn und die Bewegungen des Auges.* Hermann's Handbuch der Physiol. III. (1) S. 343.
6782. A. NAGEL. *Zusätzliche Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Biesinger.* Nagel's Mittheil. aus der ophthalmiatr. Klin. in Tübingen. Heft 1. S. 108.
6783. L. WITKOWSKI. *Ueber einige Bewegungserscheinungen am Auge.* Arch. f. Psychiatr. IX. S. 443.

## 1880.

6784. ABADIE. *Note sur l'appui de l'hypothèse de M. Landouzy sur l'existence d'un contre-rotateur des yeux.* Prog. méd. No. 4.
6785. DUVAL u. LABORDE. *De l'innervation des mouvements associés des globes oculaires.* Journ. d'anat. et de physiol. XVI. S. 66.
6786. GIRAUD-TEULON. *Analyse critique de „l'essai d'une explication génétique des mouvements oculaires“ du professeur Donders.* Arch. d'ophthalm. Sept.-Oct. — Prog. méd. No. 38. — Gaz. méd. No. 38.
6787. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision.* Sillim. Journ. (3.) XX. S. 83.



1881.

6788. W. BROWNING. *Ein binoculares Ophthalmotrop.* Arch. f. Augenheilkde. XI S. 69—74.  
 6789. FANO. *Sur les fonctions du muscle petit oblique de l'œil chez l'homme.* Compt. Rend. Bd 92. S. 44. — Gaz. méd. de Paris. No. 3. S. 30.  
 6790. E. LANDOLT. *Etude sur les mouvements des yeux.* Arch. d'ophthalm. Nov.-Dec.  
 6791. — *Des mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique.* Transact. of the intern. med. Congr. VII. session. London. III. S. 25. Arch. d'ophthalm. I. S. 586.

1882.

6792. W. BECHTEREW. *Thierversuche über vorzugsweise Rollbewegungen um die Längsachse.* Petersb. med. Wochenschr. No. 6.  
 6793. BJELOW. *Contributions à l'étude des conditions de l'équilibre dynamique des yeux ext. et inf. des yeux à réfraction différente.* Diss. Petersburg.  
 6794. W. LE CONTE STEVENS. *Notes on physiological optics. III. Theory of Associated Muscular Action. — A new mode of Stereoscopy.* Sill. Journ. XXIII. S. 290—306. IV. Sill Journ. XXIII. S. 346—360.

1883.

6795. G. MAYERHAUSEN. *Ueber eine eigenthümliche Erscheinungsform des Eigenlichtes der Netzhaut, nebst Bemerkung über die Gleichgewichtslage der Bulbi im wachen Zustande.* Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 77.

1884.

6796. BJELOW. *Ueber die Bestimmung des dynamischen Gleichgewichts der Augenmuskeln.* Wjestnik Ophthalm. No. 4 u. 5.  
 6797. RYMOND. *Modificazione all' esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l'accomodazione e la convergenza oculare.* Ann. di Ottalm. XIII. (2.) S. 136. Giorn. d. r. Ac. di med. di Torino. XII. S. 69.  
 6798. W. v. ZEHENDER. *Ein Vierspiegelapparat zur Bestimmung des Convergenzwinkels der Gesichtslinien.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 231.

1885.

6799. DEBENEDETTI. *Determinazione del centro del movimento del globo oculare.* Giorn. della R. Ac. di med. di Torino.  
 6800. E. JAESCHE. *Einige Bemerkungen über die Ruhelage der Augen.* Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 302.  
 6801. E. LANDOLT. *Ophthalmodynamometer.* Ber. über die 17. Vers. der ophth. Ges. Heidelberg. S. 243.  
 6802. L. MAUTHNER. *Die Nuclearlähmung der Augenmuskeln.* Wiesbaden, Bergmann. Vorträge a. d. Gesamtgebiet d. Augenheilkde. 12. Heft.  
 6803. G. SOUS. *Instrument du Dr. W. Zehender pour déterminer l'angle de convergence des axes visuels.* Rev. clin. d'Ocul. V. S. 94.

1886.

6804. FROST. *Model of movements of eyes.* Ophthalm. Rev. S. 86.  
 6805. PH. KNOLL. *Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns.* Sitzgs.-Ber. d. k. Acad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 94. S. 3. — Wien. Gerolds Sohn. 1887.  
 6806. L. MAUTHNER. *Die nicht nuclearen Lähmungen.* Vorträge a. d. Gesamtgebiet d. Augenheilkde. 13. Heft.  
 6807. G. SECONDI. *Osservazioni sul rapporto tra l'accomodazione e la convergenza.* Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. XXXIV. S. 714.

1887.

6808. D. BELOW. *Ueber statisches und dynamisches Gleichgewicht der Augen.* Westn. Ophthalm. IV. (3. u. 4.) S. 201 u. 309.  
 6809. E. LANDOLT. *Übersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande.* Deutsch bearb. von H. MAGNUS. Breslau.  
 6810. J. NUSSEBAUM. *Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprungsgebieten der Augenmuskelnerven.* Med. Jahrb. Heft 7. S. 407.  
 6811. M. TSCHERNING. *La loi de Listing.* Thèse de Paris. 42 S.  
 6812. H. WESTERN. *Augenbewegungsmodell nach Prof. Aubert.* Zeitschr. f. Instrumentenk. VII. S. 53.

1888.

6813. A. CHARPENTIER. *Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contraction des muscles de l'œil.* Compt. rend. de la société de biologie. V. No. 26. S. 596.  
 6814. — *Influences diverses sur la contraction des muscles de l'œil.* Compt. rend. de la société de biologie V. No. 27. S. 621.  
 6815. A. GRAEFE. *Die Thätigkeit der geraden inneren Augenmuskeln bei den associirten Seiten- und den accommodativen Konvergenzbewegungen der Augen.* Ber. des VII. internat. Ophthalmologen-Congresses zu Heidelberg. S. 30.  
 6816. F. D. A. C. VAN MOLL. *Over afwezigheid van rollbeweging bij zijdelingsche blick richting.* Feestbundel, Donder's Jubiléum. S. 1.  
 6817. G. C. SAVAGE. *The harmonious non-symmetrical action of the oblique muscles explains binocular astigmatism.* Americ. Journ. of Ophthalm. S. 245.  
 6818. M. TSCHERNING. *Quelques conséquences de la loi de Listing.* Ann. d'Oculist. Bd. 100. S. 101.

1889.

6819. BENZLER. *Ein Fall von essentieller Convergenzlähmung.* Deutsche militärärztliche Zeitschr. No. 7. S. 301.  
 6820. J. B. LAWFOED. *Congenital hereditary defect of ocular movements.* Transact. of the ophthalm. soc. VIII. S. 262.  
 6821. MARLOW. *The position of rest as a cause of strabismus.* Ophthalm. Rev. S. 362.  
 6822. G. SECONDI. *Valori di A e di A<sub>1</sub> nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orizzontale.* Ann. di Ottalm. XVIII. S. 117.  
 6823. L. WINTERITZ. *Ein Diagramm als Beitrag zur Orientirung über die Wirkungsweise der Augenmuskeln und die Ausfallserscheinungen bei Lähmung derselben.* Wien. klin. Wochenschr. No. 11.

1890.

6824. M. KNIES. *Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln.* Arch. f. Augenheilkde. XXXII. S. 19—51.  
 6825. MOTT. *Augenbewegungen.* Brit. Med. Journ. No. 1598. Oesterr.-Ung. Centralbl. f. med. Wiss. No. 19. S. 344.  
 6826. H. MUNK. *Sehphäre und Augenbewegungen.* Sitzg.-Ber. d. Akad. d. Wiss. in Berlin. III. S. 53—74.  
 6827. OBREGIA. *Ueber Augenbewegungen auf Sehphärenreizung.* Arch. f. Physiol. S. 206.  
 6828. STEVENS. *Die Anomalien der Augenmuskeln.* Zweiter Theil. Arch. f. Augenheilkde. XXI. S. 335.

1891.

6829. V. BRAVAIS. *Du mouvement des yeux dans la lecture.* Lyon méd. 29. Nov.  
 6830. FERRI. *Ueber die Axenrotation des Auges bei Seitwärtsneigung des Kopfes.* Giorn. dell' Acc. di Med. de Torino. H. 1—4.  
 6831. M. HERZ. *Die Bulbuswege und die Augenmuskeln.* Pflüger's Arch. XLVIII. S. 385—417.  
 6832. M. HORNEMANN. *Zur Kenntniss der Blickfeldbestimmung. Beiträge zur Methode der Blickfeldbestimmung, sowie perimetrische Messungen von monoclären Augenbewegungen im horizontalen und verticalen Meridian.* Diss. Halle.  
 6833. E. LANDOLT. *Beitrag zur Physiologie der Augenbewegungen.* Heidelberger Helmholtz-Festschr. S. 65—68.  
 6834. — *Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux.* Arch. d'Ophthalm. XI. S. 385—396.  
 6835. REY. *Etude sur le centre de rotation de l'œil humain.* Thèse de Toulouse.  
 6836. G. C. SAVAGE. *The harmonious symmetrical action of the oblique muscles in all cases of astigmatism.* Ophthalm. Rec. I. S. 1.  
 6837. — *Insufficiency of the oblique muscles.* Arch. of Ophthalm. XX. S. 105—107.

1892.

6838. BUMSTAD. *A new test for the ocular muscles.* Ann. of Ophthalm. and Otology. I. S. 84.  
 6839. L. FERRI. *Schema rappresentativa delle azioni fisiologiche dei muscoli oculari e loro diplopia paralitiche.* Ann. di Ottalm. XXI. S. 65.  
 6840. FERRIER. *De l'action des muscles obliques.* Ann. d'Oculist. CVII. S. 92.  
 6841. WIEBS. *Ueber die Ruhestellung der Augen.* Groningen.

## 1893.

6842. C. HOTZ. *Ein bemerkenswerther Fall von totaler Lähmung des Internus und Externus beider Augen.* Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 370—373.  
 6843. E. LANDOLT. *Tableau synoptique des mouvements des yeux et de leurs anomalies.* Paris.  
 6844. — *Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande.* Deutsch von H. MAGNUS. Augenärztliche Unterrichtstafeln für den akademischen und Selbstunterricht. Herausgegeben von H. MAGNUS. Heft 3. Breslau, Kern. 2. Aufl.  
 6845. OSTWALT. *Présentation d'un ophtalmophoromètre.* Congr. franc. d'Opht. — *Revue génér. d'Opht.* S. 300.  
 6846. A. ROTH. *Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordnung.* Berlin. Hirschwald.  
 6847. O. SCHWARZ. *Vorzeigung eines Instrumentes zur Messung der „latenten Rollung“.* Ber. d. 23. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 223—228.

## 1894.

6848. CH. CONTEJEAN u. A. DELMAS. *Sur le „mouvement de roue“ du globe oculaire se produisant pendant l'inclinaison latérale de la tête.* Arch. de Physiol. (5.) VI. S. 687—692.  
 6849. A. DELMAS. *Etude sur le mouvement de roue de l'oeil pendant l'inclinaison latérale de la tête.* Thèse de Paris.  
 6850. A. GRAEFE. *Accommodation und Convergenz.* Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 247.  
 6851. KATZ. *Ueber anomale Association von Bewegungen des oberen Lides und der Regenbogenhaut mit Bewegungen des Augapfels.* Wratsch. S. 1268.  
 6852. MADDOX. *Latent torsion of the eyes.* Ophthalm. Rev. S. 181.  
 6853. E. LANDOLT. *An Ophthalmotrope.* Trans. Ophth. Soc. U. K. XII. S. 256.  
 6854. J. REBOUD. *La position de repos des yeux.* Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 681—698.  
 6855. J. S. R. RUSSEL. *An experimental investigation on eye movements.* Brit. Med. Journ. No. 1759. S. 588. — *Journ. of Physiol.* XVII. S. 1—27.  
 6856. — *Further researches on eye movements.* The Journ. of Physiol. XVII. S. 378—390.  
 6857. C. S. SHERRINGTON. *Experimental note on two movements of the eye.* The Journ. of Physiol. XVII. S. 27—30.  
 6858. E. B. TIFFANY. *Anomalies of refraction and of the muscles of the eye.* New York.  
 6859. L. WEISS. *Ueber das Verhalten vom Musculus rectus externus und rectus internus bei wachsender Divergenz der Orbita.* Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 298.

## § 28.

## Das monoculare Gesichtsfeld.

Man beachte in Bezug auf die Größe des Gesichtsfeldes die in § 10. 2 angegebene Litteratur. — Ueber optische Täuschungen finden sich weitere Litteraturangaben in § 29.

## 1709.

6860. BERKELEY. *New theory of vision.* Section 79.  
 6861. LOCKE. *Essay concerning human understanding.* Bd. II. Ch. 9. § 8.

## 1728.

6862. CHESELDEN. *Philos. Transact.* XXXV. 447.

## 1788.

6863. SMITH. *Opticks.* Remarks S. 27.

## 1759.

6864. PORTERFIELD. *On the eye.* II. S. 285.

## 1772.

6865. PRIESTLEY. *Geschichte der Optik.* II. S. 512 der deutschen Uebersetzung.

1786.  
6866. GRANT. *Nachricht von den Erscheinungen nach der Operation eines Staars an einem Blindgeborenen.* Voigt's Mag. f. d. Physik u. Naturgeschichte. IV. (1.) S. 21.
1801.  
6867. J. WARR. *Case of a young gentleman who recovered his sight when seven years of age.* Philos. Trans. XCI. S. 382—396.
1807.  
6868. HOME. Philos. Transact. P. I. — Bibl. Brit. XXXVII. S. 85. 1808.
1811.  
6869. STEINBUCH. *Beiträge zur Physiologie der Sinne.*
1812.  
6870. J. C. HOFFBAUER. *Psychologisch-optische Beobachtungen und Versuche, auch zur Bestätigung der Cheselden'schen Beobachtungen an Blindgeborenen, die zum Gesichte gelangt sind, mitgetheilt.* Reil und Hoffbauer, Beiträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. Halle. Bd. II. S. 249—277.
1826.  
6871. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns.* Leipzig. 1.  
6872. J. WARDROP. *Case of a lady, born blind, who received sight at an advanced age by the formation of an artificial pupil.* Philos. Trans. III. S. 529—540.
1827.  
6873. TOURTUAL. *Die Sinne des Menschen.* Münster.
1834.  
6874. C. M. N. BARTELS. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns.* Berlin.
1836.  
6875. A. W. VOLKMANN. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns.* Leipzig.
1840.  
6876. J. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie des Menschen.* Coblenz. Bd. II. S. 362.
1841.  
6877. FRANZ. Philos. Transact. VI. S. 529.
1847.  
6878. TRINCHINETTI. *Observations sur les premières impressions visuelles, aperçues par deux aveugles de naissance après l'opération de la cataracte.* Arch. d. sciences phys. et nat. VI. S. 336; Giorn dell' istituto Lombardo, fasc. 46 e 47.
1849.  
6879. WALLER. *Sur un cas, où la vue altérée faisait voir les objets plus petits que nature.* Inst. XVII. No. 787. S. 39.
1851.  
6880. E. H. WEBER. *Programmata collecta.* Fasc. III. — *Ueber den Tastsinn und das Gemeingefühl.* S. 559 in R. Wagner's Wörterb. d. Physiol.
6881. A. FICK. *De errore quodam optico asymmetria bulbi effecto.* Marburg. (Im Ausz. Zeitschr. f. rat. Med. (2.) II. S. 88.
1852.  
6882. KNIE. *Erinnerungen einer Blindgeborenen.* Breslau.
6883. E. H. WEBER. *Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge.* Ber. d. sächs. Soc. S. 85 ff.
1853.  
6884. E. H. WEBER. *Ueber GröÙe, Lage und Gestalt des sog. blinden Flecks im Auge und die davon abhängigen Erscheinungen.* Ber. d. sächs. Soc. S. 149—158; Fechner's Centralbl. S. 929—941.
6885. A. FICK und P. DU BOIS REYMOND. *Ueber die unempfindliche Stelle der Netzhaut im menschlichen Auge.* Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 396—407; — Fechner Centralbl. 1854. S. 57—72.
6886. A. W. VOLKMANN. *Ueber einige Gesichtspheänomene, welche mit dem Vorhandensein eines unempfindlichen Fleckes im Auge zusammenhängen.* Ber. d. sächs. Soc. S. 27—50. Fechner Centralbl. 1854. S. 57—72.
1854.  
6887. J. CZERMAK. *Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Auge.* Wien. Ber. XII. S. 358—364.
1855.  
6888. J. J. OPPEL. *Ueber geometrisch-optische Täuschungen.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1854—55. S. 37—47.

6889. H. AUBERT. *Ueber den blinden Blick*. Jahresber. d. schles. Ges. 1854. S. 25—28.  
 6890. J. BUDGE. *Beobachtungen über die blinde Stelle der Netzhaut*. Verh. d. naturhist. Ver. d. Rheinl. S. XLI.  
 6891. H. MEYER. *Ueber den Einfluß der Aufmerksamkeit auf die Bildung des Gesichtsfeldes überhaupt und des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen im Besonderen*. Arch. f. Ophthalm. II. S. 77.

1856.

6892. H. AUBERT u. FÖRSTER. *Ueber den Raumsinn der Netzhaut*. Jahresber. d. schles. Ges. S. 33—34.

1858.

6893. A. W. VOLKMANN. *Ueber den Einfluß der Uebung auf das Erkennen räumlicher Distanzen*. Leipziger Ber. X. S. 38—69.  
 6894. — *Ueber das Vermögen, Größenverhältnisse zu schätzen*. Leipziger Ber. X. S. 173—204.  
 6895. G. TH. FECHNER. *Ueber ein psychophysisches Grundgesetz*. Abh. d. Leipziger Ges. VI. S. 457—532.  
 6896. J. J. OPPEL. *Nachlese zu den geometrisch-optischen Täuschungen*. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1856—57 S. 47—55 und 1860—61 S. 26—37.  
 6897. UEBERWEG. *Zur Theorie der Richtung des Sehens*. Zeitschr. f. rat. Med. 3. Bd. V. S. 268—282.  
 6898. NUNNELY. *On the Organs of Vision*.

1859.

6899. F. v. RECKLINGHAUSEN. *Netzhautfunctionen*. Arch. f. Ophthalm. V. 2. S. 127—179. Pogg. Ann. CX. S. 65—92.  
 6900. HEGELMAYER. *Ueber Sinnengedächtnis*. Vierordt's Arch. XI. S. 844—853.

1860.

6901. F. ZÖLLNER. *Ueber eine neue Art von Pseudoskopie*. Pogg. Ann. CX. S. 500—525. Cosmos. XVIII. S. 289—290. Zeitschr. f. Naturw. XVI. S. 60—63.

1861.

6902. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie*. Leipzig. Heft 1. Seite 65—80.  
 6903. E. MACH. *Ueber das Sehen von Lagen und Winkeln durch die Bewegung des Auges*. Wien. Ber. XLIII. 2. S. 215—224.  
 6904. F. ZÖLLNER. *Ueber die Abhängigkeit der pseudoskopischen Ablenkung paralleler Linien von dem Neigungswinkel der sie durchschneidenden Querlinien*. Pogg. Ann. CXIV. S. 587—594.  
 6905. E. BACALOGLO. *Ueber die von Herrn Zöllner beschriebene Pseudoskopie*. Pogg. Ann. CXIII. S. 333—336; Zeitschr. f. Naturw. XVIII. S. 445.

1862.

6906. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie des Sinneswahrnehmungen*. Leipzig u. Heidelberg. Abdr. a. d. Zeitschr. f. rat. Med. 1858—62.

1863.

6907. A. W. VOLKMANN. *Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik*. Leipzig. Heft 1. S. 139—180.

1864.

6908. v. WITTICH. *Studien über den blinden Fleck*. Arch. f. Ophthalm. IX. 3. S. 9—46.  
 6909. O. FUNKE. *Zur Lehre vom blinden Fleck*. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg im Breisgau. Bd. III. Heft 3.

1865.

6910. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut*. Breslau. S. 269—271.  
 6911. DELBOEUF. *Essai d'une théorie psychophysique de la manière dont l'oeil apprécie les grandeurs*. Bull. de Brux. (2.) XIX. S. 523.  
 6912. — *Note sur certaines illusions d'optiques*. Bull. de Brux. (2.) XIX. S. 154—155.

1866.

6913. DELBOEUF. *Notes sur certaines illusions d'optique. Essai d'une théorie psychophysique sur la manière dont l'oeil apprécie les distances, les angles et les grandeurs*. Mondes. XI. S. 391—398.  
 6914. H. SCHEFFLER. *Die Statik der Netzhaut und die pseudoskopischen Erscheinungen*. Pogg. Ann. Bd. 127. S. 105—125.

1867.

6915. D. BREWSTER. *On a new property of the retina*. Edinb. Transact. XXIV. (2.) S. 327—331.

1869.

6916. M. WOJNOW. *Ueber das Sehen mit dem blinden Fleck und seiner Umgebung.* Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 155—166.

1878.

6917. A. A. G. GUJE. *Over onbewuste besluiten en eene opmerking omtrent de pseudoscopish figur van Zöllner.* Maandbl. voor Naturwetensch. No. 6.

1875.

6918. S. EXNER. *Ueber das Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammengesetzten Auges.* Wien. Acad. Ber. (3.) 72. S. 156—190.

6919. A. v. HIPPEL. *Beobachtungen an einem mit doppelseitiger Cataract geborenen, erfolgreich operirten Kinde.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. 2. S. 101—131.

6920. J. HIRSCHBERG. *Eine Beobachtungsreihe zur empiristischen Theorie des Sehens.* Arch. f. Ophthalm. XXI. 1. S. 23—42.

6921. SCHNELLER. *Studien über das Blickfeld.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. 3. S. 133—198.

6922. H. MESSER. *Ueber Täuschungen des Augenmaßes.* Diss. Würzburg. 34 S.

6923. — *Notiz über die Vergleichung von Distanzen nach dem Augenmaß.* Pogg. Ann. CLVII. S. 172—175.

1876.

6924. A. BARTOLI. *Sulla sensibilità dell'occhio nella valutazione dei rapporti di grandezza delle lunghezze e degli angoli e sulla legge psico-fisica di Fechner.* Nuovo Cimento. Ser. II. Vol. XVI.

6925. DUFOUR. *Guérison d'un aveugle-né. Observation pour servir à l'étude des théories de la vision.* Bull. de la Soc. med. de la Suisse rom. Separat. Lausanne.

6926. F. KÜSTER. *Die Directionskreise des Blickfeldes.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 149—210. Utrecht'sche Onderzoekingen, Derde R. IV. S. 114—180. — XVII. Versl. van het Nederl. Gasthuis etc. S. 137—203.

6927. RECORDON. *Guérison d'un aveugle-né.* Bull. de la Soc. méd. de la Suisse romande.

6928. SCHNELLER. *Ergänzung zu den Studien über das Blickfeld.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 4. S. 136—146.

1877.

6929. A. CHODIN. *Ist das Weber-Fechner'sche Gesetz auf das Augenmaß anwendbar?* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. 1. S. 92—108.

1878.

6930. L. FIALLA. *Guérison de six aveugles-nés.* Bukarest, Thiel & Weiss.

1879.

6931. HEUSE. *Noch einmal das Zöllner'sche Muster.* Arch. f. Ophthalm. XXV. 1. S. 116.

1880.

6932. W. HOLTZ. *Ueber eine Augentäuschung beim Anblick geometrischer Figuren.* Wiedemann's Ann. X. S. 158—160.

6933. L. MAUTHNER. *Wien. med. Wochenschr.*

6934. CH. MONTIGNY. *Différence des appréciations de la grandeur apparente des images microscopiques par divers observateurs.* Bull. de l'Acad. Roy. Belg. (2.) XLIX. S. 670 bis 678.

1881.

6935. BADAL. *Micropsie, macropsie et metamorphopsie rétinienne.* Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 182—185.

6936. A. CHARPENTIER. *Täuschungen in der Abschätzung der Größe.* Compt. Rend. XCIII. S. 791—793.

6937. — *Illusion relative à la grandeur et à la distance des objets dont on s'éloigne.* Compt. Rend. 21. März.

6938. R. SCHIRMER. *Makropsie und Mikropsie.* Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde. VIII. S. 525.

1882.

6939. E. v. FLEISCHL. *Localzeichen und Organgefühle.* Med. Jahrb. S. 91.

6940. L. MEYER. *Blindgeborene.* Deutsch. med. Wochenschr. S. 177.

6941. STÖBER. *Sur le champ visuel.* Mém. Soc. de méd. de Nancy. (1880—1881.) LXVI.

6942. R. SCHIRMER. *Metamorphopsie.* Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde. IX. S. 28.

- 1884.
6943. J. ALBERTOTTI. *Un cas de cataracte congénitale opérée.* Arch. Ital. de Biol. VI. S. 341—356.
6944. W. v. BEZOLD. *Eine perspectivische Täuschung.* Wiedemann's Ann. XXIII. S. 351. 1885.
6945. H. ARMAIGNAC. *De la vision chez les aveugles-nés qui recouvrent la vue dans un âge plus ou moins avancé, et de la vision d'un oeil atteint de cécité pendant une première période de l'existence et qui vient à recouvrer la vue, le second oeil ayant toujours été bon.* Rev. clin. d'Oculist. S. 212.
6946. C. J. A. LEBOT. *De la perception monoculaire des grandeurs ou des formes apparentes.* Arch. d'Ophthalm. V. S. 216. 1886.
6947. DOR. *Guérison d'un aveugle de naissance.* Rev. gén. d'Ophthalm. No. 11. S. 481. 1887.
6948. DOR. *Guérison d'une aveugle née.* Lyon méd. LIV. S. 153.
6949. A. SZILL. *Beobachtung nach binocularer Staarblindheit.* Szemézet. S. 57. 1888.
6950. CH. DUNAN. *L'espace visuel et l'espace tactile.* Rev. Philos. XIII. 2. S. 134.
6951. F. FISCHER. *Bericht über ein achtjähriges Kind mit angeborener totaler Cataract und dessen Verhalten während der ersten drei Wochen nach wiedererlangtem Sehen.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 461.
6952. W. GOLDZIEHER. *Zwei Fälle von beiderseitiger angeborener Cataract nebst Bemerkungen über das Sehenlernen Blindgeborener.* Wien. med. Wochenschr. Jahrg. 38. S. 32—33 u. 68—73.
6953. L. J. HOPPE. *Die Erklärung der Sinnestäuschungen bei Gesunden und bei Kranken.* Würzburg, Stuber. 306 S. 1889.
6954. CH. DUNAN. *Un nouveau cas de guérison d'aveugle-né.* Rev. philos. XIV. Jahrb. Bd. 27. S. 58—72.
6955. L. .... *Note sur l'acquisition de la notion d'espace à propos d'observations récemment faites par M. Dunan.* La crit. philos. V. 4.
6956. G. MARTIUS. *Ueber die scheinbare Grösse der Gegenstände und ihre Beziehung zur Grösse der Netzhautbilder.* Philos. Stud. V. S. 601—617.
6957. F. C. MÜLLER-LYER. *Optische Urtheilstäuschungen.* Du Bois' Arch. Suppl. Bd. S. 263—271.
6958. H. MÜNSTERBERG. *Augenmafs.* Beitr. z. experiment. Psychol. Heft 2. S. 125—151. Freiburg i. B., Mohr. 1890.
6959. W. LÁSKA. *Ueber einige optische Urtheilstäuschungen.* Du Bois' Arch. S. 326—330. 1891.
6960. R. FISCHER. *Größenschätzungen im Gesichtsfeld.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. 1. S. 97—136.
6961. — *Weitere Größenschätzungen im Gesichtsfeld.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. 3. S. 55—85.
6962. J. v. KRIES. *Beiträge zur Lehre vom Augenmafs.* Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Hamburg, L. Voss. Helmholtzestschrift. S. 173—194.
6963. TH. LIPPS. *Aesthetische Factoren der Raumanschauung.* Festschr. z. Helmholtz' 70. Geburtstage. Hamburg, L. Voss. S. 217—307.
6964. E. RÄHLMANN. *Physiologisch-psychologische Studien über die Entwicklung der Gesichtswahrnehmungen bei Kindern und bei operirten Blindgeborenen.* Zeitschr. f. Psychol. II. S. 53—96.
6965. K. F. SCHWERTASSEK. *Ueber die Theorie der Localzeichen.* Pr. Leitmeritz. 11 S.
6966. W. UETHOFF. *Untersuchungen über das Sehenlernen eines blindgeborenen und sein Erfolg operirten Knaben.* Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Hamburg, L. Voss. Helmholtzestschrift. S. 113—172. (Auch separat erschienen.) 1892.
6967. FR. BRENTANO. *Ueber ein optisches Paradoxon.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 349 bis 358.
6968. BRIBOSIA. *Guérison d'un aveugle de naissance; opération de cataracte congénitale double, chez un sujet de 15 ans.* Arch. d'Ophthalm. XII. 2. S. 88—95.

6969. J. DELBOEUF. *Sur une nouvelle illusion d'optique*. Bull. de l'Acad. de Belg. (3.) XXIV. S. 545—558.  
 6970. A. GRAFÉ. *Note sur un aveugle de naissance opéré de la cataracte à l'âge de quinze ans*. Rev. scientif. Bd. L. S. 67—75.  
 6971. J. JASTROW. *On the judgment of angles and positions of lines*. Americ. Journ. of Psychol. V. 2. S. 214—248.  
 6972. TH. LIPPS. *Optische Streitfragen*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 493—504.  
 6973. C. STUMPF. *Zum Begriff der Localzeichen*. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 70—73. 1898.  
 6974. W. HOLTZ. *Ueber den unmittelbaren Größeneindruck in seiner Beziehung zur Entfernung und zum Contrast*. Göttinger Nachrichten. S. 159—167. 1894.  
 6975. F. AUERBACH. *Erklärung der Brentano'schen optischen Täuschung*. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 152—160.  
 6976. V. FRANKE. *Das Sehenlernen eines 26jährigen intelligenten Blindgeborenen*. Deutschmann's Beitr. z. Augenheilkde. H. 16. S. 1.

## § 29.

## Die Richtung des Sehens.

Ueber optische Täuschungen findet sich weitere Litteratur in § 23.

1604.  
 6977. KEPLER. *Ad Vitellionem Paralipomena*. S. 169; 285; 69—70. 1619.  
 6978. SCHEINER. *Oculus*. Oenipontii. S. 192. 1687.  
 6979. DESCARTES. *Dioptrice*. Leyden. S. 68. 1667.  
 6980. HONORATUS FABRI *Synopsis optica*. Lugduni. 1709.  
 6981. BERKELEY. *Essay towards a new theory of vision*. 1740.  
 6982. LE CAT. *Traité des sens*. Rouen.  
 6983. WEDEL. *Ueber den Radius visorius des Honoratus Faber*. Halleri Disputat. anat. IV. S. 216. 1754.  
 6984. CONDILLAC. *Traité des sensations*. 1759.  
 6985. PORTERFIELD. *A treatise on the eye*. Edinburg. II. S. 285. 1761.  
 6986. D'ALEMBERT. *Opuscula mathematica*. I. S. 26, 265. 1771.  
 6987. BOEHM. *De Visione erecta*. Acta Hassiaca. S. 64. 1772.  
 6988. PRIESTLEY. *History and present state of discoveries relating to vision, light and colours*. Uebers. v. Klügel. Leipzig 1775. S. 69. 1788.  
 6989. ROCHON. *Recueil de Mémoires sur la Mécanique et sur la Physique*. Brest. VI. S. 241. 1784.  
 6990. DU TOUR. *Mémoire pour établir que le point visible est vu dans le rayon qui va de ce point à l'oeil*. Mémoires de savans étrang. Paris. VI. S. 241.



6991. FEARN. *A rationale of the laws of cerebral vision, composing the laws of erect vision, deduced upon the Principle of Dioptrics.* London.  
1788.
6992. WALTER. *Berliner dtsch. Abhdl.* 3.  
1798.
6993. ARALDI. *Esame di uno fra i diversi dubbi messi dal celebre d'Alembert e dell' Ottica; con alcune considerazioni sopra la teorica psicologica della visione dell' Istit. nazion. Ital.* I. S. 451.  
1794.
6994. LICHTENBERG. *Erzleben's Naturlehre.* 6. Aufl. S. 328.
6995. KAESTNER. *Hamburger Magazin.* VIII. St. 4. Art. 8; IX. St. 1. Art. 4.  
1820.
6996. RUDOLPH. *Physiologie.* II. S. 227.  
1826.
6997. J. MÜLLER. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns.* Leipzig.  
1834.
6998. C. M. N. BARTELS. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinns.* Berlin.  
1836.
6999. A. W. VOLKMANN. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinns.* Leipzig Auch in R. W. Handwörterbuch d. Physiol. Art.: Sehen.  
1837.
7000. MILLER. *Ueber die Richtungslinien des Sehens.* Pogg. Ann. XLII. S. 1.  
J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. 1838. S. 387.  
1838.
7001. A. W. VOLKMANN. *Ueber die Lage des Kreuzungspunktes der Richtungslinien des Lichtes im ruhigen und bewegten Auge.* Pogg. Ann. Bd. 45. S. 207.  
1839.
7002. KNOCHENHAUER. *Ueber die Richtungsstrahlen und Richtungslinien beim Sehen.* Ann. Bd. 46. S. 248.
7003. A. W. VOLKMANN. *Erklärung einiger Gesichtssphänomene.* Müller's Arch. XXXIX.  
1842.
7004. STAMM. *Ueber Volkmann's Richtungslinien des Sehens und über die Ursache der Undeutlichkeit außerhalb der Augenaxen.* Pogg. Ann. LVII. S. 346.  
1844.
7005. D. BREWSTER. *Law of visible position in single and binocular vision.* Edinb. Trans.  
1847.
7006. H. W. DOVE. *Ueber eine optische Täuschung beim Fahren auf der Eisenbahn.* Ann. Bd. 71. S. 118.  
1849.
7007. J. PLATEAU. *Sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions de la rétine.* Bull. de Brux. XVI. II. S. 30, 254. — Inst. XVIII. No. 835.  
Phil. Magaz. XXXVI. S. 434, 436. — Pogg. Ann. LXXX. S. 150, 287.  
1852.
7008. H. BOENS. *Etude sur la vision de l'homme et des animaux.* Bull. de  
XIX. 2. S. 155—161. (Cl. des sciences. S. 443—449.)
7009. H. LOTZE. *Medicinische Psychologie.* S. 362—369.  
1854.
7010. L. FICK. *Bemerkungen zur Physiologie des Sehens.* Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 220—225.
7011. A. v. GRAEFE. *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augen.* Arch. f. Ophthalm. I. (1.) S. 67.  
1855.
7012. H. HELMHOLTZ. *Ueber das Sehen des Menschen, ein populär wissenschaftlicher Vortrag.* Leipzig. S. 20—42.
7013. E. B. HUNT. *On our sense of the vertical and horizontal.* Sill. Journ. (2.)  
S. 368—375.  
1856.
7014. J. J. OPPEL. *Neue Beobachtungen und Versuche über eine eigenthümliche, wenig bekannte Reactionsthatigkeit des menschlichen Auges.* Pogg. Ann. LXXXV.  
S. 540—561.

1858.

15. UEBERWEG. *Zur Theorie der Richtung des Sehens.* Zeitschr. f. ration. Medicin. (3.) Bd. V. S. 268—282.

1860.

16. J. J. OPPEL. *Zur Theorie einer eigenthümlichen Reactionsthätigkeit des menschlichen Auges in Bezug auf bewegte Netzhautbilder.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1859—1860. S. 54—64. — Zeitschr. f. Naturw. XVII. S. 258—260.  
 17. H. AUERT. *Eine scheinbare bedeutende Drehung von Objecten bei Neigung des Kopfes nach rechts und links.* Virch. Arch. XX. S. 381—393.  
 18. G. BUECHTEMANN. *De anomalia loci, quo rerum imagines in retina ortae, nec extinctae oculis aversis referuntur.* Berlin.

1861.

19. A. NAGEL. *Das Sehen mit zwei Augen.* Breslau. S. 124—129.  
 20. E. HERRING. *Beiträge zur Physiologie.* Leipzig. Heft 1. S. 35—64.  
 21. RAINY. *Sur la cause des mouvements apparents des images des objets.* Ophthalm. Hosp. Rep. No. 12.

1862.

22. F. ZÖLLNER. *Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder.* Pogg. Ann. CXVII. S. 477—484. — Zeitschr. f. Naturw. XXI. S. 163.

1863.

23. J. CZERMAK. *Ueber das sogenannte Problem des Aufrechtsehens.* Wien. Ber. XVII. S. 566—574.

1864.

24. G. TH. RUETE. *Ueber die Richtungslinien des Sehens.* Sitzgs.-Ber. II. S. 3. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 186.

1865.

25. ALFRED GRAEFE. *Ueber einige Verhältnisse des Binocularsehens bei Schielenden.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 6—16.  
 26. H. W. DOVE. *Ueber optische Täuschungen bei der Bewegung.* Berl. Ber. S. 129.  
 27. H. HELMHOLTZ. *Ueber den Einfluß der Raddrehung der Augen auf die Projection der Retinabilder nach außen.* Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. III. S. 170, in: Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 244—245.

1867.

28. TH. W. ENGELMANN. *Over schijnbewegingen bij nabelden.* Ned. Arch. III. S. 114  
 29. — *Ueber Scheinbewegungen in Nachbildern.* Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. III. S. 443.

1868.

30. G. OTT. *Ueber eine intermittirende optische Täuschung.* Berner Mitth. 1868. S. 70—74.

1869.

31. LAMANSKY. *Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit der Blickbewegung, resp. Augenbewegung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 418—422.  
 32. F. P. LE ROUX. *Illusions du jugement qui accompagnent les perceptions visuelles.* Mondes. (2.) XXI. S. 477—479.

1871.

33. PH. BRETON. *Danse apparente des fils télégraphiques vus par la fenêtre d'un wagon en marche rapide.* Mondes. (2.) XXVI. S. 548.  
 34. F. C. DONDER. *Die Projection der Gesichterscheinungen nach den Richtungslinien.* Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 1—68.

1872.

35. F. C. DONDER. *De projectie der gezichtsverschynselen naar de richtingslijnen.* Onderzoekingen ged. in het Physiol. Laborat. d. Utrecht'sche Hoogeschool. Derde Reeks. I. S. 146—168. — Arch. néerl. VII. S. 254—276.

1873.

36. E. EMMERT. *Gesichtswahrnehmungen und Sinnestäuschungen.* Bern.  
 37. J. JAGO. *Visible direction: being an elementary contribution to the study of monocular and binocular vision.* Philos. Mag. (4.) XLVI. S. 80—84. Proc. Roy. Soc. XXI. S. 213—217.  
 38. A. THIESSCH. *Optische Täuschungen auf dem Gebiete der Architectur.* Zeitschr. f. Bauwesen. Jahrg. 1873.

1875.  
 7039. E. MACH. *Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen*. Leipzig.  
 7040. E. HITZIG. *Ein Fall von erworbenem rhythmischen Nystagmus mit davon abhängigen Schwindelempfindungen in Form von sehr ausgesprochenen Scheinbewegungen*. Berl. klin. Wochenschr. XII. S. 38.
1876.  
 7041. K. VIERORDT. *Die Bewegungsempfindung*. Zeitschr. f. Biol. XII. S. 226—240.
1877.  
 7042. E. BRÜCKE. *Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste*. Intern. wiss. Bibl. Bd. 28. Brockhaus, Leipzig.
1878.  
 7043. G. H. SCHNEIDER. *Warum bemerken wir mäſsig bewegte Dinge leichter als ruhende?* Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. II. S. 377—414.  
 7044. STRICKER. *Ueber Sinnes täuschungen*. Wien. med. Bl. No. 4—6.
1879.  
 7045. J. AITKEN. *Eine neue Art von Nachbildern*. Journ. of Anat. and Physiol. April.  
 7046. GIRAUD-TEULON. *Rapport sur une „Note relative à une illusion d'optique“ par M. le Dr. Prompt*. Bull. de l'Acad. de méd. VIII. 36. S. 936—946.  
 7047. HAENEL. *Ueber optische Täuschungen*. Jahresb. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. in Dresden. 1878—1879. S. 105.  
 7048. J. HOPPE. *Die Scheinbewegungen*. Würzburg.  
 7049. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen. IV. Ueber Scheinbewegungen*. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 542—573.  
 7050. PROMPT. *Sur une illusion d'optique*. Gaz. méd. de Paris. No. 37.  
 7051. S. P. THOMPSON. *Some new optical illusions*. Monthly Journ. of Sc. März.
1880.  
 7052. S. P. THOMPSON. *Optical illusions of motion*. Brain. Vol. II. No. 3.  
 7053. J. HOPPE. *Die scheinbare Bewegung des Ufers in einer dem Wasser entgegengesetzten Richtung beim Stehen am fließenden oder doch bewegten Wasser*. Memorab. XXV. S. 108.  
 7054. G. ZEHFUSS. *Ueber Bewegungsnachbilder*. Wiedemann's Ann. IX. S. 672.
1881.  
 7055. CH. S. W. CORBOLD. *Observations on certain optical illusions of motion*. Brain. IV. 13. S. 75.  
 7056. JACKSON. *Relation between the apparent movement of objects and the rotation of the eyes*. Transact. ophthalm. soc. of the United Kingd. I. Octbr. 13. — Lancet. II. No. 17.  
 7057. — *Apparent movement of objects during involuntary movements of the eyes*. Ophthalm. Rev. November. S. 16.  
 7058. E. KRAEPELIN. *Ueber Trugwahrnehmungen*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. V. S. 205—228, 349—369.  
 7059. TSCHERMAK. *Zur Physiologie des Gesichtorgans. Das Plateau-Oppelsche Phänomen und sein Platz in der Reihe gleichartiger Erscheinungen*. Milit.-med. Journ. Juni-Juli. — Arch. f. Augenheilkde. XI. 2. S. 241.
1882.  
 7060. BOWDITSCH und G. S. HALL. *Optical illusions of motion*. Journ. of physiol. III. S. 297—307.  
 7061. BUCCOLA. *La riproduzione della percezione del movimento nello spazio visivo*. Riv. di filos. scient. I. 4.  
 7062. F. C. DONDEES. *On the relation between the apparent movements of objects and the rotation of the eyes*. Transact. ophthalm. soc. of the United Kingd. London. 1881—1882. II. S. 21.  
 7063. E. v. FLEISCHL. *Physiologisch-optische Notizen. II., V. u. VI.* Mitth. Wiener Sitzungsber. Bd. 86. 3. Abth.  
 7064. SCHÖBL. *Eine eigenthümliche optische Täuschung*. Natur. No. 32.
1883.  
 7065. G. MAYERHAUSEN. *Ueber die Größenverhältnisse der Nachbilder bei geschlossenen Lidern*. Arch. f. Ophthalm. XXIX. 2. S. 23.  
 7066. — *Zur Casuistik der Gesichtstäuschungen*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI. S. 271.

1884.

7067. E. BUDDÉ. *Ueber metakinetische Scheinbewegungen und über die Wahrnehmung der Bewegung.* Du Bois-Reymond's Arch. S. 127.

1885.

7068. ALIX. *Une illusion de l'esprit.* Rev. méd. de Toulouse. XIX. S. 129.  
 7069. A. BROTHERS. *On a variation in the size of an image on the retina according to the distance of the background on which it is seen.* Chem. News. LI. S. 296.  
 7070. V. KANDINSKY. *Kritische und klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen.* Berlin, Friedländer u. Sohn.

1886.

7071. H. AUBERT. *Die Bewegungsempfindung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX. S. 347.  
 7072. A. CHARPENTIER. *Nouveaux faits à propos du balancement des étoiles.* Compt. Rend. CII. S. 1462.  
 7073. — *Mouvements apparents d'un petit objet faiblement éclairé dans le champ visuel obscur.* Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 765. III. S. 226. — Compt. Rend. CII. S. 1025, 1155.  
 7074. — *Illusion visuelle.* Franc. méd. 17. Juni.  
 7075. — *Note sur une illusion visuelle.* Gaz. hebd. de méd. et de chir. No. 22. S. 363. — Compt. Rend. Bd. 102. S. 1155.  
 7076. S. EXNER. *Ein Versuch über die Netzhautperipherie als Organ zur Wahrnehmung von Bewegungen.* Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 217—218.  
 7077. A. KÖNIG. *Ueber eine auf die empirische Grundlage unserer Raumschauung bezügliche Beobachtung.* Wiedemann's Ann. XXVIII. S. 267—268. — Verhandl. d. Phys. Ges. zu Berlin vom 5. März.  
 7078. M. H. DE PARVILLE. *Sur une illusion visuelle et l'oscillation apparente des étoiles.* Compt. Rend. CII. S. 1309.

1887.

7079. H. AUBERT. *Die Bewegungsempfindung.* (Zweite Mittheilung nebst Nachtrag.) Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 459—480 u. 623—624.  
 7080. BERLIN. *Ueber ablenkenden Linsen-Astigmatismus und seinen Einfluß auf das Empfinden von Bewegung.* Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V.  
 7081. S. EXNER. *Einige Beobachtungen über Bewegungsnachbilder.* Centralbl. f. Physiol. S. 135.  
 7082. CH. FÉRÉ. *Sensation et mouvement. Etude expérimentale de psycho-mécanique.* Paris.

1888.

7083. H. AUBERT. *Physiologische Studien über die Orientirung.* Tübingen, Laupp. 122 S.  
 7084. D. AXENFELD. *Illusione visiva monoculare.* Acad. med. di Roma. XIV. S. 5.  
 7085. S. EXNER. *Ueber optische Bewegungsempfindungen.* Biol. Centralbl. VIII. No. 14. S. 437—448.  
 7086. E. HERING. *Berichtigung.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (4.) S. 272.  
 7087. E. HEUSE. *Zwei kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der physiologischen Optik.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (2.) S. 127—134.  
 7088. A. E. MULDER. *Ons oordeel over verticaal, bij neiging van het hoofd naar rechts of links.* Feestbundel a. F. C. Donders, etc. Amsterdam. S. 340—352.

1889.

7089. H. AUBERT. *Die Orientirung im Raume bei ruhendem und bewegtem Körper und über den Schwindel.* Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturg. in Mecklenburg. XLII. S. 249.  
 7090. BEEVOR. *Apparent movement of objects associated with giddiness.* Ophthalm. Rev. VIII. S. 220.

1890.

7091. L. FERRI. *Dei movimenti apparenti. Osservazioni di fisiologia sulla sensazione visiva di movimento.* Giorn. d. R. Accad. med. di Torino. S. 172. — Ann. di Ottalm. XX. S. 400. 1891.  
 7092. TH. LIPPS. *Ueber eine falsche Nachbildlocalisation.* Zeitschr. f. Psychol. I. S. 60 bis 74.

1891.

7093. A. AHRENS. *Untersuchungen über die Bewegung der Augen beim Schreiben.* Diss. Rostock. 30 S.

- 1892.
7094. TH. LIPPS. *Die Raumannschauungen und die Augenbewegungen.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 123—171.
7095. O. SCHWARZ. *Bemerkungen über die von Lipps und Cornelius besprochene Nachbilderscheinung.* Zeitschr. f. Psychol. III. S. 398—404.
- 1894.
7096. J. HOPPE. *Studie zur Erklärung gewisser Scheinbewegungen.* Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. VIII. S. 29—37.
7097. A. KIRSCHMANN. *Die Parallaxe des indirecten Sehens und die spaltförmigen Pupillen der Katze.* Philos. Stud. IX. S. 447—496.
7098. H. W. KNOX. *On the quantitative determination of an optical illusion.* Americ. Journ. of Psychol. VI. 3. S. 413—421.
7099. E. MILHAUD. *La projection externe des images visuelles.* Rev. Philos. XXXVIII. 8. S. 210—222.
7100. L. W. STERN. *Die Wahrnehmung von Bewegungen mittelst des Auges.* Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 321—386. Auch separat. Hamburg, L. Voss.
7101. J. REBOUD. *La position de repos des yeux.* Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 681—698.

## § 30.

## Wahrnehmung der Tiefendimension.

## 1. Tiefenwahrnehmung ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder.

- 150.
7102. CLAUDIUS PTOLEMAEUS. *Syntaxis mathematica (Almagest).* Lib. III. Cap. 3 u. Optica. 1088.
7103. ALHAZEN. *Opticae thesaurus.* Lib. VII. S. 53—54. Edit. Risneri. Basil. 1572. 1214—94.
7104. ROGER BACO. *Opus majus.* London. 1733. Perspective. S. 118. 1271.
7105. VITELLIO. *Optica.* S. 412. Edit. Risneri. Basil. 1572. 1588.
7106. J. B. PORTA. *De refractione.* S. 24, 128. 1588—1679.
7107. HOBBS. *Robin's Mathematical tracts.* London. 1761. Vol. II. S. 241—244. 1604.
7108. KEPLER. *Paralipomena.* S. 62—66. 1644.
7109. DESCARTES. *Dioptrice.* Amstelodami. S. 68. *De homine.* S. 66—71. 1658.
7110. P. GASSENDI. *Opera omnia.* Lugduni II. S. 395. 1667.
7111. J. GREGORY. *Geometriae pars universalis.* Venetiae. S. 141. 1674.
7112. MALEBRANCHE. *Recherche de la verité.* Paris. P. I. 1687.
7113. MOLYNEUX. *Why celestial objects appear greatest near the horizon.* Phil. Trans. 1681. I. S. 221. 1694.
7114. DE LA HIRE. *Sur différents accidents de la vue.* Anc. Mém. de Paris. IX.

- 1700.
7115. TH. GOUYE. *Mém. de Paris*. S. 11.
- 1709.
7116. BERKELEY. *Essay toward a new theory of vision*. Dublin. S. 30. — Auch in Robin's mathematical tracts. II. S. 242. London. 1761.
- 1712.
7117. JABLOT. *Description de plusieurs nouveaux microscopes*. (Umkehrung des Reliefs.)
- 1717.
7118. VARIGNON. *Lignes suivant lesquelles des arbres doivent être plantés pour être vues deux à deux aux extrémités de chaque ordonnée à ces lignes sous des angles de sinus données*. *Mém. de Paris*.
- 1728.
7119. R. SMITH. *Optik*. Deutsche Ausgabe. S. 418. Ebenda Huygens in Art. 586.
- 1736.
7120. J. LOGAN. *Some thoughts on the sun and the moon, when near the horizon appearing larger than when near the zenith*. Phil. Trans.
7121. J. T. DESAGULIERS. *Attempt to explain the phenomenon of the horizontal moon appearing larger than when elevated, supported by an experiment*. Phil. Trans. LII. S. 462.
- 1745.
7122. P. F. GMELIN. *De fallaci visione per microscopia composita notata*. Phil. Trans.
- 1755.
7123. P. BOUGUER. *Sur la grandeur apparente des objets*. *Mém. de Paris*.
- 1758.
7124. J. E. MONTUCLA. *Histoire des mathématiques*. Paris. Vol. I. S. 309.
- 1759.
7125. W. PORTERFIELD. *A treatise on the eye*. Edinburg. 2 Vol.
- 1762.
7126. SAM. DUNN. *An attempt to assign the cause, why the sun and moon appear to the naked eye larger, when they are near the horizon*. Phil. Trans. Vol. VIII. S. 180.
- 1765.
7127. J. H. LAMBERT. *Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendung*. Berlin 1765—72. Bd. I. § 60—78.
- 1768.
7128. L. EULER. *Lettres à une Princesse d'Allemagne*. Petersh. 1768—72. Deutsch von F. Kries. Leipzig. 1792—94. S. 317.
- 1772.
7129. PRIESTLEY. *Geschichte der Optik*. Deutsch von Klügel. Leipzig. 1776. II. S. 491—511.
- 1786.
7130. D. RITTENHOUSE. *Explanation of an optical deception*. Transact. Americ. Philos. Society. II. — Edinb. Journ. of science. VII. S. 99.
- 1828.
7131. MUNCKE. Art.: *Gesicht* in Gehler's physik. Wörterb. Neu bearbeitet. Leipzig. IV. S. 1455.
- 1838.
7132. NECKER. *Ueber einige merkwürdige optische Phänomene*. Pogg. Ann. XXVII. S. 502.
- 1840.
7133. HUECK. *Ueber die Täuschung des Fernrückens der Gesichtsobjecte*. Müller's Arch. S. 76.
- 1842.
7134. H. MEYER. *Ueber einige Täuschungen in der Entfernung und Grösse der Gesichtsobjecte*. Arch. f. physiol. Heilkde. S. 316.
- 1847.
7135. D. BREWSTER. *On the conversion of relief by inverted vision*. Edinb. Philos. Transact. XV. S. 657. Philos. Mag. XXX. S. 432. Athenaeum. No. 1029. S. 773.
- 1848.
7136. WALLER. *Sur un cas, où la vue altérée faisait voir les objets plus petits que nature*. Inst. XVII. No. 787. S. 39.

- 1850.
7137. DE HALDAT. *Mémoire sur quelques illusions d'optique et particulièrement sur la modification des images oculaires.* Compt. Rend. XXXII. S. 357.
- 1853.
7138. H. DENZLER. *Ueber eine Sinnestäuschung psychologischen Ursprungs.* Mitth. d. naturf. Ges. in Zürich. III. S. 216—218.
- 1854.
7139. DROBISCH. *Ueber die Bestimmung der Gestalt des scheinbaren Himmelsgewölbes.* Ber. d. Leipz. Ges. der Wiss. S. 107.
- 1855.
7140. J. J. OPPEL. *Ueber ein Anaglyptoskop. (Vorrichtung, vertiefte Formen erhaben zu sehen.)* Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1854—1855. S. 55—57. — Pogg. Ann. XCIX. S. 466—469.
- 1856.
7141. A. WEBER. *Ueber die scheinbare Umkehrung des Erhabenen und Vertieften.* Arch. f. Ophthalm. II. (1.) S. 141—146.
- 1858.
7142. H. SCHROEDER. *Ueber eine optische Inversion bei Betrachtung verkehrter, durch optische Vorrichtung entworfenen physischer Bilder.* Pogg. Ann. CV. S. 296—311.
- 1859.
7143. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. (3.) VII. S. 279—317. (Ueber den Einfluss der Accommodation auf die räumliche Tiefenwahrnehmung.)
7144. P. L. PANUM. *Die scheinbare Größe der gesehenen Objecte.* Arch. f. Ophthalm. V. (1.) S. 1—86.
- 1860.
7145. F. AUGUST. *Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen.* Leipzig.
7146. D. BREWSTER. *On some optical illusions connected with the inversion of perspective.* Athenaeum. 2. S. 24. — Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 7—8.
7147. SINSTEDEN. *Ueber ein neues pseudoskopisches Bewegungsphänomen.* Pogg. Ann. CXI. S. 336—339. — Cosmos. XVIII. S. 290—292.
7148. MOHR. *Ueber pseudoskopische Wahrnehmungen.* Pogg. Ann. CXI. S. 638—642.
- 1862.
7149. E. EMERSON. *On the perception of relief.* Sill. Journ. (2.) XXXIV. S. 312—314. Philos. Mag. (4.) XXV. S. 125—130.
7150. R. T. LEWIS. *On the changes in the apparent size of the moon.* Philos. Mag. (4.) XXIII. S. 380—382.
7151. T. ZENO. *On the changes in the apparent size of the moon.* Philos. Mag. (4.) XXIV. S. 390—392.
7152. G. SCHWEIZER. *Ueber eine merkwürdige optische Täuschung, die bei der Betrachtung des Mondes durch Fernröhre vorkommen kann.* Bull. de Moscou. 1. S. 336—332. Astronom. Nachrichten. LVIII. S. 182—192.
- 1865.
7153. E. CHEVREUL. *Note sur le Panorama.* Compt. Rend. Bd. 61. S. 670—671.
7154. J. C. MONRO. *On a case of stereoscopic illusion.* Philos. Mag. (4.) Bd. 29. S. 15.
- 1866.
7155. F. C. DONDEERS. *Involed der accomodatie op de voorstelling van afstand.* Nederl. Arch. II. S. 212.
7156. J. LANDEREE. *Illusion optique.* Mondes. XI. S. 9—10.
- 1867.
7157. SCHUBRING. *Wahrnehmung der Tiefendimensionen.* Corresp.-Bl. d. naturwiss. Ver. in Halle. VIII. S. 253.
- 1868.
7158. E. MACH. *Beobachtungen über monoculare Stereoskopie.* Wien.
- 1869.
7159. F. BURCKHARDT. *Eine Relief-Erscheinung.* Pogg. Ann. Bd. 137. S. 417—474. Besl. Verh. V. S. 269—272.
7160. F. C. DONDEERS. *Involed der accomodatie op de voorstelling van afstand.* Vers. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 111.

7161. E. MACH. *Beobachtungen über monoculare Stereoskopie.* Wien. Ber. LVIII. 2. S. 731—736.  
1870.
7162. EMSMANN. *Eine pseudoskopische und optometrische Figur.* Pogg. Ann. Bd. 141. S. 476—479.
7163. HOFFMANN. *Optische Erscheinung auf fortdauernden Lichteindruck gegründet und Vorführung von Burckhardt's Reliefserscheinungen.* Zeitschr. f. Naturwiss. (2). II. S. 206.
7164. J. LANDERER. *Eine optische Täuschung.* Zeitschr. f. Naturw. XXXV. S. 214.  
1872.
7165. VAN DER MEULEN. *Stereoscopie bij onvolkomen gezichtsvermogen.* Onderz. ged. in het phys. Lab. d. Utr. hoogesch. 3. reeks II.
7166. VAN DER MEULEN und T. C. VAN DOOREMAAL. *Stereoscopisch zien, zonder corresponderende half beelden.* Onderz. ged. in het phys. Lab. d. Utr. hoogesch. 3. reeks II. S. 119.
7167. VOGEL und ZENKER. *Die körperliche Wahrnehmung einer einfachen Zeichnung.* Athenäum 2. S. 86.  
1873.
7168. VAN DER MEULEN en VAN DOOREMAAL. *Stereoskopisches Sehen ohne correspondirende Halbbilder.* Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 137—141.  
1874.
7169. J. SAMELSOHN. *Ueber eine besondere Art monocularer Reliefsanschauung.* Arch. f. d. ges. Physiol. IX. S. 221—226.  
1877.
7170. E. BRÜCKE. *Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste.* Internat. wiss. Bibl. Bd. 28. Leipzig, Brockhaus.
7171. S. P. THOMPSON. *On the chromatique aberration of the eye in relation to the perception of distance.* Philos. Mag. Juli 1877.  
1879.
7172. A. BERLIN. *Taxation der Entfernung bei einseitig erblindeten Pferden.* Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Baden-Baden. Tagebl. S. 348.  
1880.
7173. J. PLATEAU. *Une application des images accidentelles.* Bull. de l'Acad. de Belg. (2.) XLIX. S. 316.  
1881.
7174. J. PLATEAU. *Une application des images accidentelles. Deuxième Note.* Bull. de l'Acad. de Belg. (3.) II. S. 281.  
1882.
7175. G. HAUCK. *Die malerische Perspective.* Wochenbl. f. Architectur u. Ingenieure. Jahrg. IV. No. 52, 54, 56 u. 58. — Sep. Berlin, Springer.  
1883.
7176. GOVI. *Intorno allo scopritore di una singolare illusione ottica.* Atti R. dei Lincei. (3.) Trans. VII. S. 183—187.  
1884.
7177. W. v. BEZOLD. *Eine perspectivische Täuschung.* Wiedem. Ann. XXIII. S. 351.
7178. P. STROBANT. *Sur l'agrandissement des constellations, du soleil et de la lune à l'horizon.* Bull. Acad. Roy. Belg. (3.) VIII. S. 719—734.  
1885.
7179. G. HAUCK. *Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.* Berlin.
7180. J. OUGHTON. *On the secondary nature of monocular relief.* Lancet. 8. Juli. II. S. 8, 27, 62.
7181. P. STROBANT. *Nouvelles recherches sur l'agrandissement apparent des constellations, du soleil et de la lune à l'horizon.* Bull. de l'Acad. roy. de Belg. (3.) X. No. 8.
7182. — *Récréations scientifiques. Curieuse illusion d'optique.* La Nature. XIII. (2.) S. 64.  
1887.
7183. J. HOPPE. *Beitrag zur Erklärung des Erhaben- und Vertiefteischens.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 523.
7184. J. LOEB. *Dioptrische Fehler des Auges als Hilfsmittel der monocularen Tiefenwahrnehmung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 371.



7185. J. LOEB. *Ueber die optische Inversion ebener Linienzeichnungen bei einäugiger Betrachtung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 274.  
1888.
7186. M. BLONDEL. *Une association inséparable, l'agrandissement des astres à l'horizon.* Rev. philos. XIII. Bd. 11. S. 489.
7187. E. HEUSE. *Zwei kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der physiologischen Optik.* Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (2.) S. 127—134.
7188. J. HOPPE. *Die Umkehrung des Sehens und des Gesehenen mit Beziehung auf die gleichzeitige Schabprägung.* Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 295.  
1889.
7189. M. BLONDEL. *L'agrandissement des astres à l'horizon.* Rev. philos. XIV. Jahrg. Bd. 27. S. 197—199.
7190. B. BOUUDON. *La vision des monuments élevés.* Rev. Scient. XLV. S. 763.
7191. DAUDEL. *A propos de la vision des monuments élevés.* Rev. Scient. XLIV. S. 733.
7192. V. EGGER. *La vision des monuments élevés.* Rev. Scient. XLIV. S. 745—747.
7193. W. HILKER. *Versuche über die Fähigkeit der Schätzung nach der Tiefendimension bei den verschiedenen Brechungszuständen der Augen, bei Sehschärferabsetzung und beim Fehlen des binocularen Schactes.* Inaug.-Diss. Marburg.
7194. A. RÉMY. *La vision des monuments élevés.* Rev. Scient. XLIV. S. 237—239.
7195. F. ROZIER. *La vision des monuments élevés.* Rev. Scient. XLIV. S. 1 u. 653. — XLV. S. 668 u. 763.  
1890.
7196. PROMPT. *Remarques sur la sensation du relief, d'après une intéressante illusion d'optique.* Arch. de Physiol. (5). II. S. 59—67.
7197. G. SOREL. *La vision des objets élevés.* Rev. Scientif. XLV. No. 18. S. 565.  
1891.
7198. C. S. CORNELIUS. *Zur Theorie des räumlichen Vorstellens mit Rücksicht auf eine Nachbildlocalisation.* Zeitschr. f. Psychol. II. S. 64—179.
7199. C. ST. WAKE. *The third dimension in monocular vision.* The Open Court. Chicago. No. 179. 29. Jan.  
1892.
7200. A. E. BOSTWICK. *Estimates of distance.* Science. XIX. S. 118.  
1894.
7201. W. FILEHNE. *Die Form des Himmelsgewölbes.* Pflüger's Arch. Bd. 59. S. 279—308.
7202. F. HILLEBRAND. *Das Verhältniß von Accommodation und Convergenz zur Tiefenlocalisation.* Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 97—151.

## 2. Stereoskopie und binoculare Tiefenwahrnehmungen.

- 800 v. Chr.
7203. EUCLIDES. *Optice et Katoptrice.*  
1588.
7204. J. B. PORTA. *De refractione.*  
1613.
7205. F. AGUILONIUS. *Opticorum Libri VI.* Antwerpen.  
1651.
7206. LEONARDO DA VINCI (geb. 1452, gest. 1519). *Trattato della pittura.* Rom.  
1728.
7207. R. SMITH. *Optics.* II. S. 388 und 526.  
1792.
7208. W. C. WELLS. *Essay upon single vision with two eyes.* London. 1792. Neue Auflage. London 1818.  
1811.
7209. W. C. WELLS. *Observations and experiments on vision.* Phil. Trans.  
1833.
7210. A. MAYO. *Outlines of human physiology.* S. 288.  
1838.
7211. C. WHEATSTONE. *Contributions to the physiology of vision. Part. I. On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision.* Phil. Trans. P. II. S. 371—394.

1839.  
7212. C. WHEATSTONE. *Ueber das Sehen mit zwei Augen und das Stereoskop.* Pogg. Ann. Bd. 47. S. 625. — Bibl. Univ. N. S. Bd. XVII. S. 174.
1841.  
7213. E. BRÜCKE. *Ueber die stereoskopischen Erscheinungen.* Müller's Arch. S. 459.
1842.  
7214. TOURTUAL. *Die Dimension der Tiefe im freien Sehen und im stereoskopischen Bilde.* Münster.
1844.  
7215. D. BREWSTER. *Law of visible position in single and binocular vision and on the representation of solid figures by the union of dissimilar plane pictures in the retina.* Edinb. Phil. Trans. XV. — Philos. Mag. XXIV. S. 356—439.
1848.  
7216. F. C. DONDERS. *Ueber den Zusammenhang zwischen dem Convergiere der Sehaxen und dem Accommodationszustand der Augen.* Holl. Beiträge. I. S. 379.
1850.  
7217. D. BREWSTER. *Notice of a chromatic stereoscope.* Edinb. Journ. XLVIII. S. 150. — Inst. No. 850. S. 128. — Philos. Mag. (4.) III. S. 31. — Sill. Journ. (2.) XV. S. 289—290.  
7218. J. DUBOSQ. *Description du stéréoscope de M. Brewster construit par lui.* Compt. Rend. XXXI. S. 895. — Bull. de la Soc. d'encour. d. sc. 1851. S. 45. — Dingler's polyt. Journ. CXX. S. 159. — Athenaeum. 1861. S. 1350.  
7219. H. W. DOVE. *Ueber das Binocularsehen prismatischer Farben und eine neue stereoskopische Methode.* Pogg. Ann. LXXX. S. 446. — Berl. Monatsber. S. 152. — Arch. de Genève. XIX. S. 219.  
7220. — *Beschreibung mehrerer Prismenstereoskope und eines einfachen Spiegelstereoskops.* Pogg. Ann. LXXXIII. S. 183. — Berl. Monatsber. 1851. S. 246. — Philos. Mag. (4.) II. S. 29. — Inst. No. 937. S. 404.  
7221. — *Ueber eine bei dem Doppeltsehen einer geraden Linie wahrgenommene Erscheinung.* Berl. Monatsber. S. 363. — Inst. No. 907. S. 128.
1852.  
7222. J. DUBOSQ. *Nouveaux stéréoscopes.* Cosmos. I. S. 97—104, 703—705.  
7223. D. BREWSTER. *Description of several new and simple stereoscopes for exhibiting, as solids, one or more representations of them on a plane.* Philos. Mag. (4.) III. S. 16 bis 26. Trans. of Scott. Soc. of arts. 1849. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2. S. 5. Arch. d. sc. phys. XIX. S. 200—204. Dingler's polyt. Journ. CXXIV. S. 109—112. Sill. Journ. (2.) XV. S. 140—142, 288—289.  
7224. — *Account of a binocular camera and of a method of obtaining drawings of full length and colossal statues.* Phil. Mag. (4.) III. S. 26—30. Trans. of Scott. Soc. of arts. 1849. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2. S. 5.  
7225. — *Sur la vision binoculaire et le stéréoscope.* Cosmos. I. S. 422—425. North Brit. Rev. May.  
7226. E. WILDE. *Ueber die Anwendung der Camera lucida zu einem Stereoskope.* Pogg. Ann. LXXXV. S. 63—67.  
7227. C. WHEATSTONE. *Contributions to the physiology of vision.* P. II. *On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision.* Philos. Mag. (4.) III. S. 149—152, 504—523. Inst. S. 179—180. Arch. d. sc. phys. XIX. S. 196—200.  
7228. H. MEYER. *Ueber die Schätzung der Grösse und der Entfernung der Gesichtsobjecte aus der Convergenz der Augenaxen.* Pogg. Ann. LXXXV. S. 198—207. Arch. d. sc. phys. XX. S. 137—158. Cosmos. I. S. 47.  
7229. H. W. DOVE. Pogg. Ann. LXXXV. S. 407—408.
1853.  
7230. W. ROLLMANN. *Notiz zur Stereoskopie.* Pogg. Ann. LXXXIX. S. 350—351.  
7231. — *Zwei neue stereoskopische Methoden.* Pogg. Ann. XC. S. 186—187. Zeitschr. f. Naturwiss. III. S. 97—100. Fechner's Centralbl. 1855. S. 980—981.  
7232. W. HARDIE. *Description of a new pseudoscope.* Philos. Mag. (4.) V. S. 442—446.  
7233. C. CLARKE. *Perfectionnements apportés au stéréoscope.* Cosmos. III. S. 123.  
7234. KILBURN. *Stéréoscope-écran.* Cosmos. III. S. 770.
1854.  
7235. J. DUBOSQ. *Stéréoscope cosmoramique ou optique stéréoscopique.* Cosmos. IV. S. 33—35.  
7236. A. CLAUDET. *Théorie des images stéréoscopiques.* Cosmos. IV. S. 65—67.

7237. A. CLAUDET. *Angle stéréoscopique*. Cosmos. IV. S. 147.  
 7238. G. KNIGHT. *On a stereoscopic cosmorama lens*. Athenaeum. S. 1241—1242. Cosmos. V. S. 240. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 70.  
 7239. MOIGNO. *Invention du stéréoscope par réfraction*. Cosmos. V. S. 241.  
 7240. SMEE. *Sur la perspective binoculaire*. Cosmos. V. S. 512—513.  
 1855.  
 7241. J. CZERMAK. *Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes*. Wien. Ber. XII. S. 322 bis 366; XV. S. 425—466; XVII. S. 563—576.  
 7242. — *Das Stereophoroskop*. Wiener Ber. Bd. XV. S. 463.  
 7243. F. BURCKHARDT. *Ueber Binocularsehen*. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 123 bis 154.  
 7244. SORET. *Sur un phénomène de vision binoculaire*. Bibl. univ. de Genève. Octobre. 1856.  
 7245. W. B. ROGERS. *Observations on binocular vision*. Sill. Journ. (2.) XXI. S. 80—95; S. 173—189; S. 439. Edinb. Journ. (2.) III. S. 210—217.  
 7246. D. BREWSTER. *On Mr. Roger's theory of binocular vision*. Proc. of Edinb. R. Soc. III. S. 356—358.  
 7247. — *The stereoscope, its history, theory and construction*. London.  
 7248. — *Réclamation de priorité*. Cosmos. VIII. S. 549—552.  
 7249. J. J. OPPEL. *Notizen über Stereoskopie, insbesondere über eine einfache vergrößernde Modification des Stereoskops ohne Spiegel und Gläser*. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1855—1856. S. 37—56.  
 7250. FAYE. *Sur un nouveau système de stéréoscope*. Compt. Rend. XLIII. S. 673—674. Pogg. Ann. XCIX. S. 641—642. Cosmos. IX. S. 374—375. Inst. S. 349. Arch. de sc. phys. XXXIII. S. 221. Dingler's polyt. Journ. CXLIII. S. 316.  
 7251. ZINELLI. *Neue Methode, die Bilder im Relief zu sehen*. Zeitschr. f. Mathematik. I. S. 320—321. — Horn's photogr. Journ. No. 10. — Dingler's polyt. Journ. CXL. S. 315.  
 7252. H. GOLDSCHMIDT. *Sur la vision stéréoscopique*. Cosmos. IX. S. 657.  
 7253. H. MEYER. *Beitrag zur Lehre von der Schätzung der Entfernung aus der Convergenz der Augenachsen*. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 92—94.  
 7254. J. M. HESSEMER. *Ueber die Anfertigung stereoskopischer Bilder*. Dingler's polyt. Journ. LXXXIX. S. 111—121.  
 7255. LUGBOL. *Stereoscopic experiment*. Sill. Journ. (2.) XXII. S. 104.  
 7256. SUTTON. *Sur la théorie du stéréoscope*. Cosmos. IX. S. 313—319.  
 7257. A. CLAUDET. *On various phenomena of refraction through semilenses or prisms, producing anomalies in the illusion of stereoscopic images*. Proc. of R. Soc. VIII. S. 104—110. Athenaeum. S. 1029. Cosmos. XI. S. 283—285. Inst. S. 346. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 71—75. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 9—10.  
 7258. C. WHEATSTONE. *Réponses aux assertions de Sir D. Brewster*. Cosmos. VIII. S. 625 bis 628.  
 1857.  
 7259. H. W. DOVE. *Ueber die Unterschiede monocularer und binocularer Pseudoskopie*. Berl. Monatsber. S. 221—226. Pogg. Ann. CI. S. 302—308.  
 7260. — *Darstellung von Körpern durch Betrachtung einer Projection derselben vermittelt eines Prismenstereoskops*. Berl. Monatsber. S. 291.  
 7261. A. CIMA. *Sopra un nuovo fenomeno di stereoscopia*. Cimento. VI. S. 185—192. Compt. Rend. XLV. 664. Philos. Mag. (4.) XIV. S. 480. Pogg. Ann. CII. S. 319. Inst. S. 364—365. Cosmos. XI. S. 353—354.  
 7262. J. G. HALSKE. *Stereoskop mit beweglichen Bildern*. Pogg. Ann. C. S. 657—658.  
 7263. J. ELLIOT. *The telescoping stereoscope*. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 78. Sill. Journ. (2.) XXIII. S. 292.  
 7264. — *On two new forms of the stereoscope, intended for the purpose of uniting large binocular pictures*. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 104—108; 218—219.  
 7265. H. HELMHOLTZ. *Das Telestereoskop*. Pogg. Ann. CI. S. 494—496; CII. S. 167 bis 175. — Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl. S. 79—81. — Ann. d. chim. (3.) LII. S. 118—124. — Philos. Mag. (4.) XV. S. 19—24. — Inst. 1858. S. 63—64. — Sill. Journ. (2.) XXV. S. 297—298. — Dingler's polyt. Journ. CXLIV. S. 268—270. Polytechn. Centralbl. S. 1449—1450; 1858. S. 180—186. — Cimento. VI. S. 239 bis 240. — Cosmos. XI. S. 352—353.

7266. J. DUBOSCQ. *Note sur une nouvelle disposition de stéréoscope à prismes réfringents, à angle variable et lentilles mobiles.* Compt. Rend. XLIV. S. 148—150. — Cosmos. X. S. 91—92.
7267. W. CROOKES. *Théorie des images stéréoscopiques.* Cosmos. X. S. 461—462.
7268. D. BREWSTER and C. WHEATSTONE. *Liverpool and Manchester Photographic Journ.* January 1. S. 4—7; January 15. S. 21—23. (*Prioritätsstreit.*)
7269. C. WHEATSTONE. *The original invention of the stereoscope.* The Liverpool and Manchester Photographic Journ. No. 1 u. 2.
7270. J. J. OPPEL. *Bemerkungen zur Stereoskopie, insbesondere zur Erklärung des Glanzes zweifarbiger Bilder.* Pogg. Ann. Bd. 100. S. 462.

## 1858.

7271. H. W. DOVE. *Ueber den Einfluß des Binocularsehens bei Beurtheilung der Entfernung durch Spiegelung und Brechung gesehener Gegenstände.* Berl. Monatsber. S. 312 bis 315. — Pogg. Ann. CIV. S. 325—329. — Inst. S. 282—283.
7272. W. HARDIE. *On the telestereoscope.* Philos. Mag. (4.) XV. S. 156—157. (*Prioritäts-reclamation.*)
7273. SMITH and BECK. *Improvements to the stereoscope.* Athenaeum. II. S. 269—270.
7274. A. BOBLIN. *Expérience d'optique permettant d'obtenir d'une seule épreuve photographique la sensation d'un corps en relief.* Bull. de Brux. (2.) V. S. 304—306. Inst. S. 431—432. Compt. Rend. XLVII. S. 444.
7275. A. CLAUDET. *On the stereomonoscope.* Philos. Mag. (4.) XVI. S. 462—463. Proc. of Roy. Soc. IX. S. 194—196. Dingler's polyt. Journ. CLI. S. 72—73. Cosmos. XII. S. 493.
7276. J. C. D'ALMEIDA. *Nouvel appareil stéréoscopique.* Compt. Rend. XLVII. S. 61—63.

## 1859.

7277. F. v. RECKLINGHAUSEN. *Netzhautfunctionen.* Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 127 bis 179. — Pogg. Ann. CX. S. 65—92.
7278. E. BRÜCKE. *Eine Dissectionsbrille.* Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 181—183.
7279. H. W. DOVE. *Stereoskopische Darstellung eines durch einen Doppelspath binocular betrachteten Typendrucks.* Berl. Monatsber. S. 278—280. Pogg. Ann. CVI. S. 655 bis 657. Philos. Mag. (4.) XVII. S. 414—415.
7280. — *Anwendung des Stereoskops, um einen Druck von seinem Nachdruck, überhaupt ein Original von seiner Copie zu unterscheiden.* Berl. Monatsber. S. 280 bis 288. Pogg. Ann. CVII. S. 657—660. Phil. Mag. (4.) XVII. S. 415—417. Dingler's polyt. Journ. CLIII. S. 451—454. Polytechn. Centralbl. S. 741—744.
7281. J. MÜLLER. *Stereoskopische Mondphotographie.* Pogg. Ann. CVII. S. 660. — Ber. d. Freib. Ges. II. S. 67. — Dingler polyt. Journ. CLIII. S. 75.
7282. W. DE LA RUE. *Report of the present state of celestial photography in England. Stereoscopic pictures of the moon.* Rep. of. Bris. Assoc. 1. S. 143—145. Cosmos. XV. S. 519—521.
7283. — *Stereoscopic pictures of the larger planets.* Rep. of Brit. Assoc. 1. S. 148—149.
7284. J. J. OPPEL. *Ueber das Einfachsehen doppelter Bilder bei gekreuzten Augenaxen.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1858—59. S. 22—38; S. 64—75.
7285. SAMUEL. *On an early form of the lenticular stereoscope constructed for the use of schools.* Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 19.
7286. H. W. DOVE. *Optische Studien, Fortsetzung der in der Farbenlehre enthaltene n* Berlin. (Sammlung der bisher citirten Aufsätze.)
7287. J. BECK. *On producing the idea of distance in the stereoscope.* Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 7.
7288. E. DOULIOT. *Sulla percezione de' rilievi nello stereoscopio e nella natura.* Cimento. X. S. 342—352.

## 1860.

7289. P. VOLFICELLI. *Di uno stereoscopio diaframmatico.* Cimento. XII. S. 181—189.
7290. J. BECK. *Verbesserungen an Stereokopen.* Lond. Journ. of arts. Juni. — Dingler's polyt. Journ. CLVII. S. 277—278.
7291. H. W. DOVE. *Ueber die Nicht-Identität der GröÙe der durch Prägen und Guß in derselben Form von verschiedenen Metallen erhaltenen Medaillen.* Pogg. Ann. CX. S. 498—499. Philos. Mag. (4.) XX. S. 327. Dingler's polyt. Journ. CLVII. S. 280—281.

7292. A. ROLLET. *Physiologische Versuche über binoculares Sehen, angestellt mit Hülfe planparalleler Glasplatten.* Wien. Ber. XLII. S. 488—502.
7293. E. BRÜCKE. *Ueber prismatische Brillen.* Wien. med. Wochenschr. 9. Juni.
7294. GIRAUD TEULON. *Über prismatische Brillen.* Compt. Rend. Bd. L. S. 382—385.
7295. T. W. JONES. *On the invention of stereoscopic glasses for single pictures: with preliminary observations on the stereoscope and on the physiology of stereoscopic vision.* London.
7296. F. AUGUST. *Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen.* Pogg. Ann. Bd. 110. S. 582.
7297. C. G. TH. RUETE. *Das Stereoskop.* Leipzig.
7298. ROGERS. *Some experiments and inferences on regard to binocular vision.* Proc. of the Amer. Assoc. S. 187.
7299. F. v. BECKLINGHAUSEN. *Zur Theorie des Sehens.* Pogg. Ann. Bd. 110. S. 65.  
1861.
7300. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Vierte Abhandl. *Ueber das Sehen mit zwei Augen.* Henle und Pfeuffer's Zeitschr. (3.) XII. S. 145—262. Pogg. Ann. CXVI. S. 617—628. (Die citirten Aufsätze sind gesammelt erschienen unter dem Titel: W. WUNDT, *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Leipzig u. Heidelberg. 1862.)
7301. O. BECKER und A. ROLLET. *Beiträge zur Lehre vom Sehen der dritten Dimension.* Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 667—706.
7302. H. W. DOVE. *Ueber Binocularsehen und subjective Farben.* Berl. Monatsber. S. 521—522. Pogg. Ann. CXIV. S. 163—165.
7303. F. ROSSETTI. *Della visione binoculare.* Venezia.
7304. J. J. OPPEL. *Bemerkungen über Accommodation beim stereoskopischen Sehen.* Jahresber. d. Phys. Ver. Frankfurt a. M. 1860/61. S. 48.
7305. F. GIRAUD-TEULON. *Physiologie et pathologie fonctionelle de la vision binoculaire.* Avec. 114 Fig. Paris.
7306. L. v. BABO. *Ueber die stereoskopische Darstellung mikroskopischer Gegenstände.* Ber. d. Freiburger Ges. II. S. 312—314.
7307. T. DU MONCEL. *Rapport sur les appareils stéréoscopiques de Mr. Ph. Benoist.* Bull. de la Soc. d'encour. 1. S. 198—201.  
1862.
7308. J. TOWNE. *The stereoscope and stereoscopic results.* Guy's Hosp. Rep. 1862 u. 1863. S. 103. XI. S. 144—180.
7309. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie.* Leipzig. 1861—1864. 2. bis 5. Heft.
7310. A. ROLLET. *Physiologische Versuche über binoculares Sehen.* Wien.  
1863.
7311. H. PICK. *Ueber das Stereoskop.* Wien.  
1864.
7312. KNAPP. *Exposé des avantages de l'ophthalmoscope binoculaire.* Ann. d'Oculist.
7313. W. v. BEZOLD. *Zur Lehre vom binocularen Sehen.* Sitzgs.-Ber. d. Münch. Akad. d. Wiss. S. 372—381.  
1865.
7314. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Zeitschr. f. Biol. I. S. 237—262.
7315. A. CLAUDET. *On moving photographic figures illustrating some phenomena of vision connected with the combination of the stereoscope and the phenakistoscope, by means of photography.* Athen. S. 374. Rep. Brit. Assoc. (2.) S. 9.
7316. DANCER. *Sur la vision pseudoscopique à travers un prisme.* Mondes. VIII. S. 260.
7317. H. HELMHOLTZ. *Ueber stereoskopisches Sehen.* Verhandl. d. naturhist. med. Vereins zu Heidelberg, im Heidelb. Jahrb. No. 46. S. 728—731.
7318. E. HERING. *Die Gesetze der binocularen Tiefenwahrnehmung.* Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 79—97 u. 152—165.
7319. J. TOWNE. *The stereoscope and stereoscopic results.* Guy's Hosp. Rep. S. 144.  
1866.
7320. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Nachtrag. Zeitschr. f. Biol. II. S. 178—187.
7321. BÜTTCHER. *Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective nach eigenen Untersuchungen.* Arch. f. Ophthalm. XII. 2. S. 22.
7322. — *Ueber das Minimum der stereoskopischen Wahrnehmung.* Berl. klin. Wochenschr. No. 4.

7323. F. C. DONDERS. *Het binoculaire zien en de voorstelling der derde dimensie*. Verslag Ned. Gasth. voor Oogl. No. 7. S. 101. Nederl. arch. voor Genees en Natuurk. II. S. 303.
7324. F. C. DONDERS und DOIJER. *La vision binoculaire et la perception de la troisième dimension*. Amsterdam.
7325. E. JAVAL. *Sur un instrument nommé „iconoscope“, destiné à donner du relief aux images planes examinées avec les deux yeux*. Compt. Rend. LXIII. S. 927—928. 1867.
7326. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen*. Pogg. Ann. CXXX. S. 424—433. Philos. Mag. (4.) XXXIII. S. 326—332.
7327. A. CLAUDET. *On a new fact relating to binocular vision*. Philos. Mag. (4.) XXXIII. S. 549—554. Proc. Roy. Soc. XV. S. 424—429.
7328. H. W. DOVE. *Optische Notizen: III. Ueber Inversionen bei binocularer und monocularer Betrachtung perspectivischer Zeichnungen und durchsichtiger Körper*. Pogg. Ann. CXXXII. S. 474—479.
7329. F. C. DONDERS. *Das binoculare Sehen und die Vorstellung von der dritten Dimension*. Arch. f. Ophthalm. XIII. (1.) S. 1.
7330. E. MACH. *Ueber wissenschaftliche Anwendung der Photographie und Stereoskopie*. Wien. Ber. LIV. 2. S. 123—126.
7331. C. MAXWELL. *On a real image stereoscope*. Athenäum. 2. S. 337.
7332. G. TH. RUETE. *Das Stereoskop*. 2. Aufl. Leipzig.
7333. SERRÉ D'UZÈS. *Recherches expérimentales sur la vision binoculaire*. Gaz. des Hôpit. No. 72. S. 286.
7334. J. TOWNE. *Contributions to the physiology of binocular vision*. Proc. of the roy. soc. of London. XV. S. 424. 1868.
7335. H. HELMHOLTZ. *De la production de la sensation du relief dans l'acte de la vision binoculaire*. Compt. Rend. du Congr. intern. d'Ophthalm. Paris. S. 53—58. — Zehender's Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. V. S. 270—271.
7336. J. MARTIUS-MATZDORFF. *Die interessanten Erscheinungen der Stereoskopie*. Berlin.
7337. ROLLMANN. *Pseudoskopische Erscheinungen*. Pogg. Ann. CXXXIV. S. 615—618.
7338. R. STAUDIGL. *Grundzüge der Reliefperspective*. Wien. 1869.
7339. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision*. Philos. Mag. (4.) XXXVII. S. 131—140. XXXVIII. S. 179—204. Sill. Journ. (2.) XLVII. S. 68—77. S. 153 bis 178. Americ. Journ. of sc. XLVII. No. 140. S. 153.
7340. J. B. LISTING. *Ueber eine neue Art stereoskopischer Wahrnehmung*. Gött. Nachr. No. 21. S. 431—455. Klin. Monatsbl. S. 29.
7341. SYLVESTER. *Sur une représentation stéréoscopique de l'icosiheptagramme cubique de Mr. le professeur Chr. Wiener*. Mondes. (2.) XXI. S. 412. 1870.
7342. F. KOHLRAUSCH. *Ueber eine durch die verschiedene Brechbarkeit des Lichtes hervorbrachte stereoskopische Wirkung*. Gött. Nachr. S. 415—416. — Pogg. Ann. Bd. 143. S. 144—147.
7343. J. B. LISTING. *Ueber eine neue Art stereoskopischer Wahrnehmung*. Pogg. Ann. CXLI. S. 225—245.
7344. C. G. TH. RUETE. *20 stereoskopische Bilder*. Leipzig.
7345. J. TOWNE. *Contributions the physiology of binocular vision*. Guy's Hosp. Rep. XV. S. 180—214. Med. Centralbl. S. 118. 1871.
7346. H. DOR. *Das Stereoskop und das stereoskopische Sehen*. Basel.
7347. C. F. HENNES. *Contribution to the subject of binocular vision*. Frankl. Journ. LXII. S. 263. Mech. Mag. XXVI. S. 393 u. 470.
7348. J. LE CONTE. *On binocular vision*. Sill. Journ. (3.) I. S. 33—44. II. S. 1—10. S. 317—323 u. 417—426.
7349. — *Sur les images d'illusion et sur la théorie du relief binoculaire*. Arch. sc. phys. (2.) XLI. S. 394—422.
7350. J. J. MÜLLER. *Ueber den Einfluß der Raddrehung der Augen auf die Wahrnehmung der Tiefendimension*. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 6. Mai. 2/3. S. 125 bis 134.

7351. E. SANG. *Experiments and observations on binocular vision*. Proc. of the roy. soc. of Edinb. VII. S. 133.  
1872.
7352. F. C. DONDEES. *De stereoskopische combinatie na operatie van scheelzien, en argument tegen de empiristische theorie*. Onderzoek. ged. het Physiol. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. Derde Reeks. I. S. 83.
7353. H. DOR. *Quelques mots sur la vision binoculaire*. Arch. des sc. Mars. (2.) XLVIII. S. 61—95.
7354. TAIT. *Expériences et observations sur la vision binoculaire*. Mondes. (2.) XXVIII. S. 434.  
1873.
7355. G. FRITSCH. *Ueber das stereoskopische Sehen im Mikroskop und Herstellung stereoskopischer Mikrotypen auf photographischem Wege*. Festschr. d. Ges. d. naturf. Freunde zu Berlin.
7356. J. HOPPE. *Das stereoskopische Sehen*. Basel. 89 S.
7357. KRAMER. *Ueber die Entstehung der räumlichen Tiefenwahrnehmung*. Progr. d. Gymn. zu Schlessingen. 1872/73.
7358. VAN DER MEULEN. *Stereoskopie bei unvollkommenem Sehvermögen*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 100—136.  
1874.
7359. BÖTTCHER. *Zur Theorie und Construction stereoskopischer Instrumente für wissenschaftliche Diagnostik*. Arch. f. Ophthalm. XX. 2. S. 182.
7360. J. ARTHA V. HASNER. *Die Tiefenempfindung der Coordinatenverwandlung*. Prag. Vierteljahrsschr. S. 123.
7361. J. HOPPE. *Das stereoskopische Anschauen der beiden Hälften einer durchgeschnittenen stereoskopischen Photographie unter Auseinanderrücken oder Zusammenschieben dieser beiden Hälften*. Memorab. XIX. S. 149—158.
7362. — *Ueber den Einfluß des Augenconvergenzgrades auf die scheinbare GröÙe und Entfernung der Gegenstände; der Meyer'sche Versuch*. Deutsch. Klin. No. 32—37.  
1875.
7363. M. DEVIC. *Ein optisches Phänomen*. Pogg. Ann. Bd. 156. S. 336. Compt. Rend. Bd. 79. S. 96.
7364. E. DREHER. *Zur Theorie des Sehens*. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 417—427.
7365. H. EMSMANN. *Zum binocularen Sehen*. Pogg. Ann. CLVI. S. 307—312.
7366. GIRAUD-TEULON. *Sur une nouvelle méthode et sur un nouvel instrument de télémétrie (mesure rapide des distances)*. Compt. Rend. LXXX. S. 1379.
7367. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision*. Americ. Journ. of Sc. & Arts. (3.) IX. No. 51. S. 159—171.
7368. A. RIGHI. *Sulla visione stereoscopica*. Nuovo Cimento. 2. XIV. S. 55—103.  
1876.
7369. DÖNHOF. *Beiträge zur Physiologie. III. Instinctmäßiges Tiefensehen*. Reichert u. du Bois-Reymond's Archiv. S. 238—240.
7370. G. F. HETSCH. *Anleitung zum Studium der Perspective und deren Anwendung*. Nach dem Dänischen bearbeitet von J. Scholz. Leipzig, Weigel. 133 S.
7371. J. HIRSCHBERG. *Optische Notizen*. Arch. f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1876. S. 622 bis 629.
7372. TH. HUGEL. *Die Stereoskopie gestützt auf orthogonale Coordinaten*. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. (2.) XIV. S. 270.
7373. STEINHAUSER. *Stereoskopische Wandtafeln*. Carl's Rep. XII. S. 389—392.  
1877.
7374. TRAPPE. *Eine optische Täuschung*. Wiedem. Ann. II. S. 141—144.  
1878.
7375. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Bedeutung der Convergenzstellung der Augen für die Beurtheilung des Abstandes binocular gesehener Gegenstände*. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 322—324. — Verhandl. d. Berl. physiol. Ges. 1877—1878. No. 11. S. 57—59.
7376. W. SCHÖN. *Zur Lehre vom binocularen Sehen*. Arch. f. Ophthalm. XXIV. 1. S. 27—130 u. 4. S. 47—116.
7377. STEINHAUSER. *Die mathematischen Beziehungen zwischen dem Stereoskope und den zu demselben gehörigen Bildern*. Carl's Repertorium f. Experimentalphysik. XIII. S. 433.

1880.

7378. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision: laws of ocular motion.* New Haven.

1881.

7379. J. LE CONTE. *Some phenomena of binocular vision.* Sill. Journ. XX. S. 83—93.  
 7380. H. HELMHOLTZ. *Note on stereoscopic vision.* Philos. Mag. (5.) XI. S. 507—508.  
 7381. E. LANDOLT. *Un télémètre.* Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 77—83.  
 7382. — *Une modification de mon télémètre.* Arch. d'ophthalm. I. 3. S. 212—220.  
 7383. W. LE CONTE STEVENS. *The stereoscope and vision by optic divergence.* Sill. Journ. (3.) XXI. 192. S. 443—456. XXII. S. 858—862.  
 7384. — *On Wheatstone's and Brewster's theory of binocular perspective.* Philos. Mag. (5.) XII. S. 436—444.

1882.

7385. J. BIELEFELD. *Das stereoskopische Sehen nach Schieloperationen.* Diss. Würzburg.  
 7386. W. LE CONTE STEVENS. *A new form of reversible stereoscope.* Americ. Journ. of Sc. No. 135. S. 226.  
 7387. — *Notes on physiological optics.* Phil. Mag. (5.) XIV. S. 312.  
 7388. — *Notes on physiological optics.* No. 3: *Theory of associated muscular action. — Relation between different elements of binocular perspective. — A new mode of Stereoscropy.* Amer. Journ. of Sc. Vol. XXIII. S. 290—302.  
 7389. — *Notes on physiological optics.* No. 4: *Voluntary control of focal accommodation. — Effect of muscular effort on retinal sensitiveness. — Relation of axial adjustment to focal accommodation etc.* Sill. Journ. XXIII. S. 346.  
 7390. — *Notes on physiological optics.* No. 5: *Vision by the light of the electric spark.* Amer. Journ. of Sc. Vol. XXIV.

1883.

7391. T. W. BACKHOUSE. *Physiological optics.* Amer. Journ. Sc. (3.) XXVI. S. 305.  
 7392. R. BERLIN. *Ueber Tiefenwahrnehmung bei Thieren mit Demonstration eines Apparates.* Ber. über d. 15. Vers. d. Heidelb. ophthalm. Ges. S. 181.  
 7393. BURMESTER. *Grundzüge der Reliefperspective.* Leipzig. Mit 3 Taf.

1884.

7394. GOVI. *Intorno a una deformazione prospettica delle imagine vedute nei cannocchiale.* Compt. Rend. XCIX. S. 480.  
 7395. HEUBE. *Eine stereoskopische Erscheinung in der rotirenden Bildertrommel.* Arch. f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 159.  
 7396. J. OUGHTON. *The secondary nature of binocular relief.* Lancet. Juli. S. 13 u. 58.

1885.

7397. L. CAZES. *De l'obtention par la photographie des épreuves stéréoscopiques à perspective exacte.* Journ. de phys. (2.) IV. S. 314—316.  
 7398. F. C. DONDERS. *Ueber Stereoskopie durch Farbendifferenz.* Ber. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 82 u. 86.  
 7399. W. EINTHOVEN. *Stereoskopie durch Farbendifferenz.* Graefe's Arch. XXXI. (3.) S. 211—238. Arch. Néerl. Sc. exact. et nat. XX. S. 361—367.  
 7400. EWALD. *Demonstration eines Stereokops.* Tagebl. d. 58. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Straßburg. S. 215.

1886.

7401. R. ANCKE. *Stereoskopenbilder.* Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 222.  
 7402. W. EINTHOVEN. *Stereoscopie door kleurverschil.* Nederl. Gasth. voor Ooglijders. 27. Versl. Bybladen. S. 1. — Sep. Utrecht.  
 7403. STROH. *On a new form of Stereoscope.* Proc. of the Roy. Soc. of London. XL. S. 317.

1887.

7404. W. W. ANDERSON. *Stereoscopic vision.* Science. IX. S. 56.  
 7405. J. LE CONTE. *Some peculiarities of the phantom images formed by binocular combination of regular figures.* Sill. Journ. XXXIV. S. 97.  
 7406. W. KROLL. *Stereoskopische Bilder.* (25 Tafeln.) Hamburg u. Leipzig, L. Voss.  
 7407. SOUB. *Vision binoculaire et réfraction.* Rev. clin. d'ocul. No. 10.  
 7408. W. LE CONTE STEVENS. *Stereoscopic vision.* Science. IX. S. 14.



## 1888.

7409. R. W. DOYNE. *A new stereoscope*. Ophthalm. Rev. S. 65.  
 7410. TH. GROSSMANN. *Stereoscopy by difference of colours, for normal and colour-blind eyes*. Ophthalm. Rev. S. 346.  
 7411. E. JAVAL. *Le stéréoscope et le strabisme*. Arch. d'Ophth. VIII. S. 244.  
 7412. W. KROLL. *Stereoskopische Bilder*. 25 Tafeln. 2. Aufl. Hamburg u. Leipzig, L. Voss.

## 1889.

7413. R. BERLIN. *Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren*. Festschr. d. kgl. Thierarzneisch. zu Stuttgart zum 25. Reg.-Jub. Sr. Maj. d. K. v. Württemberg. Stuttgart. 59 S.  
 7414. GREEN. *Stereoscopic illusions provoked by the use of unequal glasses before the two eyes*. Ophthalm. Rev. Octbr.  
 7415. — *On certain stereoscopic illusions booked by prismatic and cylindrical spectacle glasses*. Transact. of the americ. ophthalm. soc. 25. meeting. New-London. S. 449—456.  
 \*7416. J. A. LIPPINCOTT. *On the binocular metamorphopsia produced by correcting glasses*. Arch. of Ophthalm. S. 18.  
 7417. J. MARTIUS-MATZDORFF. *Die interessantesten Erscheinungen der Stereoskopie*. In 36 Figg. u. 6 Holzschn. 2. Aufl. Berlin, Winkelmann.

## 1890.

7418. H. AUBERT. *Das binoculare Perimikroskop*. Pflüg. Arch. Bd. 47. S. 341—346.  
 7419. V. BASEVI. *De la vision stéréoscopique dans ses rapports avec l'accommodation et les couleurs*. Ann. d'Oculist. CIII. S. 222.  
 7420. BERRY. *Note on a stereoscopic effect and its application*. Ophthalm. Rev. No. 102.  
 7421. BURCKHARDT. *Ueber einen seltenen Fall von Störung des binocularen Sehacts*. Münch. med. Wochenschr. No. 10.  
 7422. E. JAVAL. *De la stéréoscopie dans le traitement du strabisme*. Rec. d'Ophthalm. Febr.  
 7423. J. A. LIPPINCOTT. *New tests for binocular vision*. Amer. Journ. of Ophthalm. Vol. VII. No. 8. S. 247.

## 1891.

7424. R. BERLIN. *Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren*. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 1—24.  
 7425. T. F. BLISS. *A curious case of vision dependent upon the use of both eyes*. Med. Rec. 4. Juli.  
 7426. C. DU BOIS-REYMOND. *Ueber Brücke's Theorie des körperlichen Sehens*. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 427—437.  
 7427. C. DAHLFELD. *Bilder für stereoskopische Uebungen zum Gebrauche für Schielende*. 20 lithogr. Taf. F. Enke, Stuttgart.  
 7428. R. GREEFF. *Untersuchungen über binoculares Sehen mit Anwendung des Hering'schen Fallversuches*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 21—47.  
 7429. J. A. LIPPINCOTT. *Ueber die durch corrigirende Gläser hervorgerufene binoculare Metamorphopsie*. Arch. f. Augenheilkde. XXIII. S. 96—108.

## 1892.

7430. A. RIGHI. *Sulla teoria dello stereoscopia*. Il Nuovo Cimento. (3.) XXXI. 5/6. S. 255.

## 1893.

7431. H. FRIEDENWALD. *Ueber die durch corrigirende Gläser hervorgerufene binoculare Metamorphopsie*. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 362—370.  
 7432. A. D. MANSFIELD. *The retention of binocular vision with two glasses of different strengths*. Ann. of Ophthalm. and Otol. II. No. 1.  
 7433. M. PICKERT. *Untersuchungen über den Hering'schen Fallversuch*. Diss. Göttingen. 28 S.  
 7434. VIGNES. *Dispositif pour faciliter les expériences stéréoscopiques*. Rec. d'ophthalm. S. 275.

## 1894.

7435. H. MÜNSTERBERG. *Studies from the Harvard Psychol. Lab. A stereoscope without mirrors or prisms*. Psychol. Rev. I.  
 7436. H. PARINAUD. *Stéréoscopie. Modèle de stéréoscope clinique*. Ann. d'Oculist. CXI. S. 406.  
 7437. F. STOLZE. *Die Stereoskopie und das Stereoskop in Theorie und Praxis*. Halle.

## § 31.

## Das binoculare Doppeltsehen.

118.  
7438. GALENUS. *De usu partium*. Lib. X. Cap. 12.  
1598.  
7439. J. B. PORTA. *De refractione*. S. 142.  
1611.  
7440. KEPLER. *Dioptrice*. Propos. LXII.  
1618.  
7441. F. AGUILONIUS. *Opticorum libri VI*. Antwerpen.  
1658.  
7442. GASSENDI *Opera*. Vol. II. S. 395.  
1669.  
7443. TACQUET. *Opera mathematica*.  
1671.  
7444. ROHAULT. *Traité de physique*. Paris 1671 u. 1682. Part. I. Cap. 31.  
1704.  
7445. J. NEWTON. *Optice*. Quaestio XXV.  
1748.  
7446. DU TOUR. *Act*. Paris. S. 334.  
1759.  
7447. PORTERFIELD. *On the eye*. II. S. 285.  
1760.  
7448. DU TOUR. *Pourquoi un objet sur lequel nous fixons les yeux, paroit-il unique?* Mém. des savants étrangers. III. S. 514. IV. S. 499. V. S. 677.  
1818.  
7449. G. U. A. VIETH. *Ueber die Richtung der Augen*. Gilbert's Ann. LVIII. S. 233.  
7450. W. C. WELLS. *Upon single vision with two eyes*. London.  
1824.  
7451. W. H. WOLLASTON. *On the semi-decussation of the optic nerves*. Philos. Transact. I. S. 222. Edinb. Philos. Journ. XXII. S. 420. Ann. of Philos. April. S. 306.  
1826.  
7452. JOH. MÜLLER. *Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig.  
1827.  
7453. TOURTUAL. *Die Sinne des Menschen*. S. 234.  
1833.  
7454. C. WHEATSTONE. *On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision*. Phil. Transact. P. II. S. 384—385.  
1839.  
7455. F. G. ENDER. *De horoptere et strabismo*. Diss. Berlin.  
1840.  
7456. JOH. MÜLLER. *Handbuch der Physiologie des Menschen*. Coblenz. Bd. II. S. 376—387.  
1841.  
7457. E. BRÜCKE. *Ueber die stereoskopischen Erscheinungen*. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 459.  
7458. H. W. DOVE. Berl. Monatsb. 29. Juli.  
1848.  
7459. A. P. PRÉVOST. *Essai sur la théorie de la vision binoculaire*. Genève. Pogg. Ann. LXII. S. 548.  
1844.  
7460. D. BREWSTER. *Law of visible position in single and binocular vision*. Edinb. Philos. Trans. XV.

- 1846.
7461. VAN DEURS. *Doppeltsehen und Schielen*. Oppenheim's Zeitschr. Th. XXXII. 1848.
7462. SICHEL. *Sur une espèce de diplopie binoculaire musculaire non encore décrite*. Ann. d'ocul. XIX.
- 1849.
7463. LOCKE. *On single and double vision*. Philos. Mag. XXXIV. S. 195. Sill. Journ. VII. S. 68.
7464. LATHROP. *Results additional to those offered by Dr. Locke*. Sill. Journ. VII. S. 343.
- 1852.
7465. A. MÜLLER. *Ueber das Beschauen der Landschaften mit normaler und abgeänderter Augenstellung*. Pogg. Ann. LXXXVI. S. 147—152. Cosmos. I. S. 336.
7466. D. BREWSTER. *Sur la vision binoculaire et le stéréoscope*. North Brit. Rev. 1855. May. Cosmos. I. S. 422—425, 450—453.
- 1854.
7467. A. v. GRAEFE. *Ueber Doppeltsehen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute*. Arch. f. Ophthalm. I. 1. S. 82—120.
7468. F. BURCKHARDT. *Ueber Binocularsehen*. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 123 bis 154.
7469. G. MEISSNER. *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans*. Leipzig.
7470. J. CZERMAK. *Zur Lehre von den Doppelbildern, die beim Sehen mit beiden Augen entstehen*. Wien. Ber. Bd. XII. S. 357.
- 1855.
7471. A. v. GRAEFE. *Ueber eigenthümliche noch unerklärliche Anomalien in der Projection der Netzhautbilder*. Arch. f. Ophthalm. I. (2.) S. 284.
7472. J. CZERMAK. *Zur Lehre von den Doppelbildern, die beim Sehen mit beiden Augen entstehen*. Wien. Ber. Bd. XV. S. 448.
7473. H. EMSMANN. *Ueber Doppeltsehen*. Pogg. Ann. XCVI. S. 588—602.
7474. W. B. ROGERS. *Observations on binocular vision*. Sill. Journ. (2). XX. S. 86—98; 204—220; 318—335. XXI. 80—95; 173—189; 439. Cosmos. VIII. S. 229—230. Arch. des sc. phys. XXX. S. 247—249. Edinb. Journ. (2). III. S. 210—217.
- 1856.
7475. D. BREWSTER. *On Mr. Rogers theory of binocular vision*. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 356—358.
- 1857.
7476. GIRAUD-TEULON. *Note sur le mécanisme de la production du relief dans la vision binoculaire*. Compt. Rend. XLV. S. 566—569. Inst. S. 345—346. Cosmos. XI. S. 459—461; 490—492; 495.
7477. D. BREWSTER. *The stereoscope*. London.
- 1858.
7478. E. CLAPARÈDE. *Quelques mots sur la vision binoculaire et sur la question de l'Horoptre*. Arch. d. sc. phys. (2.) III. S. 138—168. III. S. 225—267. III. S. 362—368.
7479. — *Sur une nouvelle détermination de l'horoptère*. Compt. Rend. 1858. S. 566.
7480. P. L. PANUM. *Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen*. Kiel.
- 1859.
7481. A. P. PRÉVOST. *Note sur la vision binoculaire*. Arch. d. sc. phys. (2.) IV. S. 105—111.
7482. E. CLAPARÈDE. *Remarques sur la note précédente*. Arch. d. sc. phys. S. 112.
7483. — *Beitrag zur Kenntniss des Horopters*. Müller's Arch. S. 384.
7484. J. v. HASNER. *Ueber das Binocularsehen*. Prag. Ber. 1829. S. 10. Abh. d. Kgl. Böhm. Ges. (5.) X. S. 25—34.
7485. A. W. VOLKMAN. *Das Tachistoskop, ein Instrument, welches bei Untersuchung des momentanen Sehens den Gebrauch des electrischen Funkens ersetzt*. Leipziger Ber. S. 90—98.
7486. — *Die stereoskopischen Erscheinungen in ihrer Beziehung zu der Lehre von den identischen Netzhautstellen*. Arch. f. Ophthalm. V. 2. S. 1—100.
7487. A. GRAEFE. *Beitrag zu der Lehre über den Einfluss der Erregung nicht identischer Netzhautpunkte auf die Stellung der Sehzellen*. Arch. f. Ophthalm. V. (1.) S. 128 bis 132.

7488. F. v. RECKLINGHAUSEN. *Netzhautfunctionen*. Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 127 bis 179. Pogg. Ann. CX. S. 65—92.

7489. L. GEMÜNDT. *Ueber das binoculare Doppelsehen*. Würzburg.

1860.

7490. F. AUGUST. *Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen*. Pogg. Ann. CX. S. 582—593. Phil. Mag. (4.) XX. S. 329—336. Ann. de chim. (3.) LX. S. 506—509.

7491. W. ROGERS. *Some experiments and inferences in regard to binocular vision*. Edinb. Journ. (2.) XII. S. 285—287. Sill. Journ. (2.) XXX. S. 387—390; 404—409. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 17—18.

7492. H. W. DOVE. *Ueber Stereoskopie (gegen v. Recklinghausens Zweifel betreffs der electrischen Beleuchtung stereoskopischer Bilder)*. Pogg. Ann. CX. S. 494—498.

7493. F. GIBAUD-TEULON. *De l'unité de jugement ou de sensation dans l'acte de la vision binoculaire*. Compt. Rend. LI. S. 17—20. Cosmos. XVII. S. 24—27. Inst. S. 217.

7494. — *De l'influence sur la fonction visuelle binoculaire des verres de lunettes convexes et concaves*. Paris.

7495. T. HAYDEN. *Sulla funzione della macchia gialla del Sömmering nel produrre l'unità della percezione visuale nella visione binoculare*. Cimento. XI. S. 255—257.

1861.

7496. A. NAGEL. *Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen*. Leipzig u. Heidelberg. S. 1—184. Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl. XVII. Sitzgs.-Ber. S. 9—12.

7497. F. v. RECKLINGHAUSEN. *Zum körperlichen Sehen*. Pogg. Ann. CXIV. S. 170 bis 173. (Die Wirkung instantaner Beleuchtung betreffend.)

7498. W. WUNDT. *Ueber das Sehen mit zwei Augen*. Henle u. Pfeuffer. (3.) XII. S. 145—262.

7499. P. L. PANUM. *Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhaut-eindrücke beim Sehen mit zwei Augen*. Reichert's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 63 bis 111; 178—227.

7500. F. BURCKHARDT. *Die Empfindlichkeit des Augenpaares für Doppelbilder*. Pogg. Ann. CXII. S. 596—606. Verh. d. naturh. Ges. in Basel. III. S. 33—44.

7501. O. N. ROOD. *On the relation between our perception of distance and colour*. Sill. Journ. XXXII. S. 184—185.

1862.

7502. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Form des Horopters, mathematisch bestimmt*. Verhandl. d. naturhist. med. Ver. zu Heidelberg. Bd. III. S. 51—55.

7503. BAHR. *Ueber die Nichtexistenz identischer Netzhautstellen*. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 179—184.

7504. A. NAGEL. *Ueber die ungleiche Entfernung von Doppelbildern, welche in verschiedener Höhe gesehen werden*. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 368—387.

7505. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie*. 2. bis 5. Heft. Leipzig. 1862—1864.

7506. W. WUNDT. *Ueber binoculares Sehen*. Pogg. Ann. Bd. 116. S. 617.

1863.

7507. L. HERMANN. *Notiz über die Gestalt der Horopterfläche bei convergenten Secundärstellungen*. Centralbl. f. med. Wiss. No. 51.

7508. J. TOWNE. *The stereoscope and stereoscopic results*. Guy's Hosp. Rep. 1862 bis 1865.

7509. F. C. DONDER. *Die Refraktionsanomalien des Auges und ihre Folgen*. Arch. f. d. holländ. Beitr. III. S. 358. Pogg. Ann. CXX. S. 452.

7510. A. W. VOLKMANN. *Vorläufige Mittheilung über den Horopter und die Axendrehung des Auges*. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 51.

7511. — *Ueber identische Netzhautstellen*. Berl. Monatsber. August. (Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane.)

7512. H. HELMHOLTZ. *Ueber die normalen Bewegungen des menschlichen Auges*. Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 188—190. (Dieselbe Abweichung beschrieben.)

7513. E. HERING. *Ueber W. Wundt's Theorie des binocularen Sehens*. Pogg. Ann. CXIX. S. 115.

7514. W. WUNDT. *Ueber Dr. E. Hering's Kritik meiner Theorie des Binocularsehens*. Pogg. Ann. CXX. S. 172.

7515. E. JAVAL. *Note sur un moyen nouveau de choisir les verres prismatiques pour le strabisme.* Ann. d'Ocul. L. S. 316.  
1864.
7516. E. HERING. *Das Gesetz der identischen Schrichtungen.* Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 27.
7517. — *Bemerkungen zu Volkmann's neuen Untersuchungen über das Binocularsehen.* Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 303.
7518. — *Zur Kritik der Wundt'schen Theorie des binocularen Sehens.* Pogg. Ann. Bd. 122 S. 476.
7519. W. v. BEZOLD. *Zur Lehre vom binocularen Sehen.* Sitzgs.-Ber. d. Kgl. Bayer. Akad. Math. phys. Kl. 10. Decbr.
7520. HANKEL. *Mathematische Bestimmung des Horopters.* Pogg. Ann. Bd. 122. S. 575.
7521. H. HELMHOLTZ. *Ueber den Horopter.* Arch. f. Ophthalm. X. S. 1—60.
7522. — *Ueber den Horopter.* Heidelb. Jahrb. f. 1864. S. 340—342.
7523. — *Bemerkungen über die Form des Horopters.* Pogg. Ann. CXXIII. S. 158—161.
7524. — *On the normal motions of the human eye in relation to binocular vision.* Proc. of London. Roy. Soc. Vol. XIII. S. 186—199.  
1864.
7525. D. BREWSTER. *On Hemipia or half-vision.* Philos. Mag. (4.) XXIX. S. 506—507. — Edinb. Trans. XXIV. S. 15—18.
7526. H. AUBERT. *Physiologie der Netzhaut.* S. 280—331.
7527. E. HERING. *Die Gesetze der binocularen Tiefenwahrnehmung.* Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 79.
7528. A. GRAEFE. *Ueber einige Verhältnisse des Binocularsehens bei Schielenden mit Beziehung auf die Lehre von der Identität der Netzhäute.* Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 1—46.
7529. W. v. BEZOLD. *Zur Lehre von den identischen Netzhautpunkten.* Zeitschr. f. Biol. I. S. 170—179.
7530. DASTICH. *Ueber das Zustandekommen der räumlichen Gesichtsanschauung unter Berücksichtigung der physiologischen Mitbedingungen.* Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Philos. Sect. 6. Nov.
7531. — *Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne.* Abh. d. Böhm. Ges. (5.) XIII. S. 48—64.
7532. E. HERING. *Gegenbemerkung über die Form des Horopters.* Pogg. Ann. Bd. 124. S. 638.  
1866.
7533. BÖTTCHER. *Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective.* Arch. f. Ophthalm. XII. (2.) S. 22—99.
7534. G. B. W. GOEDICKE. *De perturbationibus visus binocularis.* Berlin.  
1868.
7535. E. HERING. *Die Lehre vom binocularen Sehen.* Leipzig. (Erste Liefer.)
7536. — *Bemerkung zu der Abhandlung von Donders über das binoculare Sehen.* Arch. f. Ophthalm. XIV. (1.) S. 1.
7537. C. SCHWEIGGER. *Das Gesetz der identischen Netzhautpunkte und die Lehre vom Schielen.* Verh. d. Berl. med. Ges. i. d. J. 1867/68. S. 1—13 u. 18—19.  
1869.
7538. H. KAISER. *Der Modus des Binocularsehens.* Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 130.
7539. — *Zur Lehre vom Horopter.* Arch. f. Ophthalm. XV. (1.) S. 75—123.  
1870.
7540. A. CLASSEN. *Ueber Widerwillen gegen Einfachsehen nach der Operation des Strabismus internus. Ein Beitrag zur Theorie der identischen Netzhautstellen.* Graefe's Arch. XVI. (1.) S. 123.
7541. J. TOWNE. *Contributions to the physiology of binocular vision.* Guy's Hosp. Rep. Vol. XV. S. 180—214.
7542. M. WOINOW. *Ueber das Verhalten der Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen.* Wien.
7543. — *Beiträge zur Lehre vom binocularen Sehen.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 200—211.  
1871.
7544. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision.* Americ. Journ. of Science and Arts. (3.) I. S. 33—34. II. S. 1—10, 315—323, 417—426.

7545. CUIGNET. *De la vision chez le tout jeune enfant*. Ann. d'Ocul. LXVI. S. 117—126.  
 7546. F. C. DONDEERS. *Zur Theorie der correspondirenden Netzhautpunkte*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 471.  
 7547. E. JAVAL. *Du strabisme*. Ann. d'Oculist. LXV. S. 97—112.  
 7548. R. PICTET. *Sur la vision binoculaire*. Arch. d. sc. phys. (2.) XL. S. 105—152. Bibl. univ. de Genève Arch. T. 40. S. 105.  
 7549. SANG. *Experiments and observations on binocular vision*. Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh. VII. S. 433.

## 1872.

7550. J. LE CONTE. *Sur la transparence des images doubles*. Arch. d. sc. phys. (2.) XLV. S. 229—232.  
 7551. — *On some phenomena of binocular vision*. Americ. Journ. of Science and Arts Ser. II. Vol. 47. Ser. III. Vol. 1. 2.  
 7552. F. C. DONDEERS. *De stereoskopische combinatie, na operatie van scheelsien, een argument tegen de empiristische theorie*. Onderz. ged. in het physiol. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. III. Reeks I. S. 83—91.  
 7553. DOR. *Quelques mots sur la vision binoculaire en réponse aux articles de Mm. Raoul Pictet et Joseph Le Conte*. Arch. d. Scienc. de la bibl. univ. May. 22 pp.  
 7554. L. MANDELSTAMM. *Beitrag zur Lehre von der Lage correspondirender Netzhautpunkte*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 133—141.  
 7555. R. PICTET. *Expériences et observations sur la vision binoculaire*. Mém. de St. Petersb. XVII. No. 11. S. 1—79.

## 1873.

7556. A. GENZMER. *Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen*. Inaug.-Diss. Halle.  
 7557. V. HARNER. *Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges*. Sinnenleben und Sehen. S. 1—15.  
 7558. — *Die reciproken Netzhäute und das Tiefensehen*. S. 40—57.  
 7559. J. JAGO. *Visible direction: being an elementary contribution to the study of monocular and binocular vision*. Proc. of the Roy. Soc. March 13. — Phil. Mag. XLVI. S. 80—84.  
 7560. KRENCHEL. *Ueber die krankhaft herabgesetzte Fusionsbreite als Ursache des Schielens*. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 144—155.  
 7561. H. SCHÖLER. *Zur Identitätsfrage. 1. Grenzen der Correspondenz beider Sehfelder. 2. Messung der Disparität an Schielenden und Entdeckung neuer Schielformen*. Graefe's Arch. XIX. (1.) S. 1—55.

## 1874.

7562. E. LANDOLT. *Le Chiasmètre*. Ann. d'Ocul. S. 3. — Klin. Monatsbl. XI. S. 470.  
 7563. F. D. A. VAN MOLL. *Over de normale incongruentie der netvliezen*. Vijftiende Versl. betr. het nederl. gasth. voor oogl. Utrecht. S. 79—121.

## 1875.

7564. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision*. Americ. Journ. of Science and Arts. 3. ser. Vol. IX. S. 159—171.  
 7565. F. C. DONDEERS. *Die correspondirenden Netzhautmeridiane und die symmetrischen Rollbewegungen*. Arch. f. Ophthalm. XXI. 3. S. 100.  
 7566. — *De corresponderende netvlies-meridianen en de symmetrische rollbewegingen*. Onderzoek. ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. III. 2. S. 45.  
 7567. EMSMANN. *Zum binocularen Sehen*. Pogg. Ann. Bd. 156. S. 307—312.  
 7568. A. GRAEFE. *Motilitätsstörungen des Auges*. Graefe-Sämisch, Handbuch d. ges. Augenheilkde. Bd. VI. Cap. 9. Leipzig.  
 7569. F. D. A. VAN MOLL. *Over de normale incongruentie der netvliezen*. Onderzoek. ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. III. S. 89.  
 7570. H. SCHÖLER. *Zur Behandlung Schielender (Einübung des binocularen Einfachsehens)*. Allg. med. Centralztg. S. 842—844.

## 1876.

7571. W. v. BEZOLD. *Beiträge zur Geschichte der physiologischen Optik (Farbenkreisel und binoculares Sehen)*. Pogg. Ann. Ergänzungsbd. VIII. S. 510—515.  
 7572. J. HIRSCHBERG. *Notis zur Theorie des Sehens*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. (4.) S. 118—125.

7573. W. SCHÖN. *Zur Lehre vom binocularen indirecten Sehen. I.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXII. 4. S. 31—62.
7574. ÜBERHORST. *Die Entstehung der Gesichtswahrnehmung.* Göttingen. 1877.
7575. H. CULBERTSON. *On a modified mode of detecting paralysis of the ocular muscles.* Americ. Journ. of the med. Scienc. Jan.
7576. FÉRÉOL. *Association synergique des deux yeux persistant malgré la paralysie de la sixième paire d'un côté.* Gaz. des hôp. No. 90, 93, 98.
7577. JÄESCHKE. *Ueber das binoculare Sehfeld.* Dorpat. Med. Zeitschr. VI. S. 354. 1878.
7578. J. v. KRIES. *Wettstreit der Schrichtungen beim Divergensschielen.* Arch. f. Ophthalm. XXIV. (4.) S. 117—138.
7579. W. SCHÖN. *Zur Lehre vom binocularen Sehen. II.* Arch. f. Ophthalm. XXIV. (1.) S. 27 u. (4.) S. 47.
7580. SCHWAHN. *Ueber das Schielen nach Verletzungen in der Umgebung des kleinen Gehirns.* Eckardt's Beitr. z. Anat. u. Physiol. VIII. (3.) S. 149.
7581. J. G. VOGT. *Physiologisch-optisches Experiment, die Identität correspondirender Netzhautstellen, die mechanische Umkehrung der Netzhautbilder etc. endgültig erweisend.* Leipzig. 1879.
7582. A. CLASSEN. *Wie orientiren wir uns im Raum durch den Gesichtssinn?* Jena. 45 S. Preyer's Sammlung physiol. Abhandl. II. Heft 5.
7583. E. HERRING. *Physiologie des Gesichtssinnes. Der Raumsinn und die Bewegungen des Auges.* Hermann's Handbuch der Physiol. III. (1.) S. 343.
7584. JÄESCHKE. *Das räumliche Sehen.* Stuttgart. 130 S.
7585. L. MAUTHNER. *Ueber Incongruens der Netzhäute.* Wien. med. Wochenschr. No. 11 u. 12, 14 u. 15; auch separat.
7586. RÄHLMANN. *Zur Frage von dem Einfluß des Bewußtseins auf die Coordination der Augenbewegungen und das Schielen.* Zehender's klin. Monatsbl. Jan. S. 1—16.
7587. A. SCHLESINGER. *Ueber das binoculare Sehen der Schielenden vor und nach der Operation.* XX. Jahresvers. d. ungar. Aerzte u. Naturf.
7588. L. TORTIÈRE. *Considérations sur la diplopie binoculaire.* Paris. 1880.
7589. SAMELSON. *Ein neuer Fall von Strabismus convergens concomitans intermittens.* Centralbl. f. pract. Augenheilkde. IV. S. 117—119.
7590. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Zeitbestimmungen bezüglich der Fusion künstlich erzeugter Doppelbilder.* Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.)
7591. — *Bestimmungen der Zeit, welche zur Prismen-Ueberwindung im Interesse des Einfachsehens durch Schielen erforderlich ist.* Sitzgs.-B. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. z. Marburg. No. 6. August. 1881.
7592. T. ANDERSON. *A prismatic optometer.* Nature. XXIV. S. 618.
7593. E. v. FLEISCHL. *Physiologisch-optische Notizen. I.* Wiener Sitzungsber. Bd. 83. 3. Abth. 17. März 1881.
7594. E. JAVAL. *De la vision binoculaire.* Ann. d'Oculist. Bd. 85. 5/6. S. 217.
7595. J. LE CONTE. *Sight, an exposition of the principles of monocular and binocular vision.* N. Y. D. Appleton et Comp. 275 S.
7596. RÄHLMANN. *Ueber die Veränderung der Fusionstendenz bei Veränderung der Blickrichtung und über die Augenstellung in den complicirten Secundärstellungen.* Bericht über die Wirksamkeit der Univers.-Augenklinik zu Dorpat in dem Zeitraum 1879 bis 1881. S. 24.
7597. OUGHTON. *The theory of corresponding points in single vision.* Lancet. II. No. 27.
7598. SAMELSON. *Darstellung eines Kranken zur Illustration der Frage von der Incongruens der Netzhäute.* Dtsch. med. Wochenschr. No. 23.
7599. SCHWAHN. *Experimenteller Beitrag zur Lehre von den associirten Zwangsstellungen der Augen.* Eckhard's Beitr. z. Physiol. IX. S. 193.
7600. C. SCHWEIGGER. *Klinische Untersuchungen über das Schielen.* Berlin, Hirschwald. 152 S.

1882.

7601. A. HÖGGER. *Nervenmechanismus der associirten Augenbewegungen*. I. Theil: *Die Erscheinungen der die Bewegungen des Kopfes und Körpers begleitenden associirten Augenbewegungen bei Säugethieren und beim Menschen*. Mitth. der math.-naturw. Classe der ungar. Acad. d. Wissensch. Budapest 1881. Bd. X. No. 18. S. 32. — II. Theil: *Der Einfluß einzelner Theile des Nervensystems auf die unwillkürlich associirten Augenbewegungen*. Ebenda. XI. No. 1. S. 1—100. (Ungarisch.)
7602. E. JAVAL. *Strabisme*. Nouveau Dictionn. de méd. et de chir. prat. XXXIII. S. 698.
7603. SCHNELLER. *Beiträge zur Lehre vom Schielen*. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. 2. S. 97.
7604. W. LE CONTE STEVENS. *Notes on physiological optics*. V: *Vision by the light of the electric spark*. Amer. Journ. of Sc. XXIV. Okt.

1883.

7605. E. LANDOLT. *Sur l'ophthalmo-dynamomètre, présentation d'un instrument construit pour mesurer la convergence et l'accommodation*. Bull. et mém. de la Sc. franç. d'Ophth. S. 25.
7606. P. B. SMITH. *A model illustrating conjugate movements of the eyes*. Lancet. II. S. 1092.

1884.

7607. BELOW. *Ueber die Bedingung des dynamischen Gleichgewichts der Augenmuskeln*. Westnik ophthalmolog. No. 4 u. 5.
7608. BERRY. *The determination of the degree of latent and manifest squint in metre angles*. — *A suggestion*. Ophth. Rev. III. No. 33. S. 193.
7609. ELLABY. *De l'amplitude de convergence*. Thèse de Paris.
7610. PATTON. *Notes on the metre angle*. Ophth. Rev. S. 360.
7611. ULRICH. *Der Schact bei Strabismus convergens concomitans*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 45.
7612. W. v. ZEHENDER. *Ein Vierspiegel-Apparat zur Bestimmung des Convergenzwinkels der Gesichtslinien*. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 231.

1885.

7613. A. GRAEFE. *Beiträge zur Kenntniß der bei Entwicklung und Hemmung strabotischer Ablenkungen wirksamen Einflüsse mit besonderer Berücksichtigung des Strabismus hyperopicus und der Asthenopia muscularis*. Arch. f. Ophth. XXXII. (2.) S. 223.
7614. J. HIRSCHBERG. *Ueber Messung des Schielgrades*. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 325.
7615. E. LANDOLT. *L'amplitude de convergence*. Arch. d'ophthalm. S. 97 u. 173. — Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 105.
7616. — *Ueber die Insufficienz des Convergenzvermögens*. Ber. über die 17. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. S. 5.
7617. G. SOUS. *Instrument du Dr. Zehender, pour déterminer l'angle de convergence des axes visuels*. Rev. clin. d'ocul. V. S. 94.
7618. STILLING. *Ueber die Entstehung des Schielens*. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 73.

1886.

7619. E. JAVAL. *La théorie de la vision binoculaire élucidée par un cas de strabisme avec vision triple*. Ann. d'Oculist. Bd. 95. S. 206. — Bull. et mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 33.

7620. E. LANDOLT. *On insufficiency of the power of convergence*. Ophth. Review. S. 185.

1887.

7621. CH. LADD-FRANKLIN. *A method for the experimental determination of the horopter*. Americ. Journ. Psychol. I. S. 99.
7622. J. LE CONTE. *On some phenomena of binocular vision*. Americ. Journ. of med. sc. New-Haven. S. 97.
7623. E. LANDOLT. *Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande*. Deutsch bearbeitet von H. Magnus. Breslau.
7624. J. LARMOR. *On the form and position of the horopter*. Proc. Cambr. VI. S. 60—65.
7625. STÖBER. *Pouvoir convergent binoculaire et angle métrique*. Semaine médic. No. 39. S. 378.

1888.

7626. A. GRAEFE. *Die Thätigkeit der geraden inneren Augenmuskeln bei den associirten Seiten- und den accommodativen Convergenzbewegungen der Augen*. Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 30.



7627. E. JAVAL. *Le stéréoscope et le strabisme*. Arch. f. Ophthalm. VIII. S. 244.
7628. E. LANDOLT. *Proposition sur le numérotage des prismes en ophtalmologie*. Ber. d. 7. intern. Ophth.-Congr. zu Heidelberg. S. 437.
7629. F. v. MARTINI. *Die Lage der Doppelbilder beim binocularen Sehen*. Mittheil. d. Thurg. naturf. Ges. Heft 8. S. 46.
7630. C. REYMOND et J. STILLING. *Des rapports de l'accommodation avec la convergence et de l'origine du strabisme*. Straßburg, Trübner.
7631. P. SMITH. *A tape measure for strabismus*. Ophthalm. Rev. S. 349.  
1889.
7632. BENZLER. *Ein Fall von essentieller Convergenzlähmung*. Deutsche Militärärztliche Zeitschr. No. 7. S. 301.
7633. CRISPO. *Notes sur des phénomènes de diplopie d'origine musculaire*. Arch. de Physiol. norm. et pathol. S. 749—750.
7634. A. E. FICK. *Ueber die Faktoren der Schachsenkonvergenz*. Correspbl. f. Schweiz. Aerzte. 1889. XIX. S. 141.
7635. — *Ueber die Faktoren der Schachsenkonvergenz. (Discussion.)* Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte. XIX. S. 151.
7636. A. GRAEFE. *Ueber die Einstellung der Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens*. Mit 1 Holzschn. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. Abth. 1. S. 137 bis 146.
7637. — *Noch einmal „Die Convergenzfaktoren“*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. Abth. 4. S. 333—339.
7638. J. H. HYSLOP. *On Some Facts of Binocular Vision*. Mind. XIV. S. 392—401.
7639. E. JAVAL. *Sur le rétablissement de la vision binoculaire chez les strabiques*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (9.) I. S. 596—600.
7640. KALT. *Importance de la netteté des images rétiniennes pour la conservation de la vision binoculaire*. Compt. Rend. de la soc. de biol. Séance du 12. Octobre. No. 32. S. 591.
7641. E. LANDOLT. *Antwort auf Prof. Graefe's Artikel: „Ueber die Einstellung der Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens.“* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 265—272.
7642. J. VENN. *On Some Facts of Binocular Vision*. Mind. Vol. 14. S. 251—260.  
1890.
7643. K. HIRSCHBERGER. *Binoculares Gesichtsfeld Schielender*. Münch. med. Wochenschr. No. 10.
7644. E. A. JACKSON. *Unit of strength and system for numbering prisms*. Ophthalm. Rev. No. 104. S. 169.
7645. M. L. JAYS. *Mesure de la convergence dans la vision binoculaire. — Choix d'une unité de convergence. — Série métrique des prismes usités en oculistique*. Rec. d'Ophthalm. No. 9. S. 522.
7646. L. KUGEL. *Ueber Exstinction der Netzhautbilder des schielenden Auges beim doppel- äugigen Sehen*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 66—128.
7647. E. LANDOLT. *Die rationelle Nummerirung der in der ophthalmologischen Praxis verwendeten Prismen*. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 235.
7648. LIPPINCOTT. *New tests for binocular vision*. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. VII. No. 8. S. 247.
7649. J. NEUMANN. *Beitrag zur conjugirten Ablenkung der Augen*. Aus dem Stadt- krankenhaus zu Dresden. Berliner klin. Wochenschr. No. 18.
7650. F. PRENTICE. *Ein metrisches System zur Bezeichnung und Bestimmung von Prismen*. Mit einleitenden Bemerkungen von SWAN M. BURNETT. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 215.
7651. SACHS. *Ueber die Ursachen des scheinbaren Näherstehens des unteren von zwei höhendistanten Doppelbildern. Nachtrag: Ueber das Verhalten der Accommodation beim Blicke nach aufwärts und abwärts*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 193—216.
7652. SCHNELLER. *Beiträge zur Theorie des Schielens*. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (3.) S. 138.
7653. TAMAGNO. *Osservazione di paralisi di convergenza*. XII. Congr. dell' Assoc. Oftalm. Italiana. Pisa. — Ann. di Ottalm. XIX.

## 1891.

7654. A. GRAEFE. *Ueber Fusionsbewegungen der Augen beim Prismaversuche.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (1.) S. 243—257.  
 7655. R. GREEFF. *Untersuchungen über binoculares Sehen mit Anwendung des Hering'schen Fallversuches.* Zeitschr. f. Psych. III. S. 21.  
 7656. C. HESS. *Bemerkung zu dem Aufsatz von Schneller „Beiträge zur Theorie des Schielens“.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (1.) S. 258—260.  
 7657. E. JAVAL. *De la vision binoculaire dans ses relations avec le strabisme.* Heidelb. Helmholtz-Festschr. S. 32—41.  
 7658. VAN MILLINGEN. *Les anomalies de la convergence.* Ann. d'ocul. T. CVI. S. 103.

## 1892.

7659. L. FERREI. *Schéma de l'action physiologique des muscles de l'œil et de la diplopie paralytique.* Ann. di Ottalmol. XXI.  
 7660. SCHNELLER. *Zur Lehre von den dem Zusammensehen mit beiden Augen dienenden Bewegungen.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 71—117.  
 7661. M. TSCHERNING. *La théorie du strabisme de Hansen-Grut.* Ann. de la Poliol. de Paris.

## 1893.

7662. BERRY. *The innervation of the oculomotor muscles.* Ophth. Rev. S. 285.  
 7663. A. B. FRIEDENWALD. *Ueber die durch korrigierende Gläser hervorgerufene binoculare Metamorphopsie.* Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 362.  
 7664. GALEZOWSKI. *Du dioptré et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires.* Progrès méd. No. 11. S. 202.  
 7665. E. JACKSON. *The rod test with the rotatory variable prism.* Ophthalm. Rev. XII. S. 228.  
 7666. — *Tests for heterophoria and their comparative value.* Univ. Med. Mag. Philad. S. 454. — Journ. Amer. med. Assoc. Chicago. XXI. S. 690.  
 7667. F. HILLEBRAND. *Die Stabilität der Raumwerthe auf der Netzhaut.* Zeitschr. f. Psych. V. S. 1—60.  
 7668. E. LANDOLT. *Tableau synoptique des mouvements des yeux et de leurs anomalies.* Paris.  
 7669. — *Übersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande.* (Augenärztl. Unterrichtstaf. d. akad. u. Selbstunterr. Deutsch herausgegeben von H. Magnus. Heft 3.) Breslau, Kern. 2. Aufl.  
 7670. PICKERT. *Untersuchungen mittelst des Hering'schen Fallversuches.* Inaug.-Diss. Göttingen.  
 7671. A. ROTH. *Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordnung.* 1 Tafel. Berlin, Hirschwald.  
 7672. S. L. ZIEGLER. *Eine bequeme Prismenskala.* Ann. of Ophthalm. and Otol. Juli

## 1894.

7673. SWAN M. BURNETT. *The new or dioptrical system of measuring and designating prisms employed in ophthalmic practice.* The Refractionist. Boston.  
 7674. E. H. GRUT. *Die Schieltheorien.* Arch. f. Augenheilkde. XXIX. 2. S. 69—98.  
 7675. J. HIRSCHBERG. *Eine Anmerkung über das regelmässig abwechselnde Schielen.* Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Juli. S. 193.  
 7676. W. SCHMIEDT. *Ueber relative Fusionsbreite bei Hebung und Senkung der Blickebene.* Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (4.) S. 233—256.  
 7677. STEVENS. *Relation of the function of accommodation to that of convergence.* Transact. of the VII. internat. ophthalm. Congress, Edinburgh. S. 266.

## § 32.

## Wettstreit der Sehfelder.

1743.  
7678. DU TOUR. *Mem. de Paris*. S. 334.
1760.  
7679. DU TOUR. *Pourquoi un objet sur lequel nous fixons les yeux paroit-il unique? Mém. des savans étrangers*. III.
1772.  
7680. JANIN. *Mémoires et observations sur l'oeil*. Lyon et Paris. S. 39.
1776.  
7681. JANIN. *Abhandlung über das Auge und seine Krankheiten*. Berlin. S. 38.
1784.  
7682. J. ELLIOT. *Anfangsgründe derjenigen Theile der Naturlehre, welche mit der Arzneiwissenschaft in Verbindung stehen*. Uebers. v. Bertram. Leipzig.
1791.  
7683. W. C. WELLS. *Essay upon single vision with two eyes*. London.
7684. MÖNNICH. *Untersuchung der Frage, ob man mit beiden Augen zugleich und gleich deutlich sehe*. Dtsch. Abh. d. Berl. Acad. 1790—1791. S. 46.
1793.  
7685. WALTHER. *Von der Einsaugung und Durchkreuzung der Sehnerven*. Berlin. 1794. Dtsch. Abhandl. d. Berl. Acad. 1793. S. 3.
1799.  
7686. L. A. v. ARNIM. *Ueber scheinbare Verdoppelung der Gegenstände für das Auge*. Gilbert's Ann. III. S. 256.
1806.  
7687. CH. N. A. HALDAT DU LYS. *Sur la double vision*. Journ. de phys. LXIII. S. 387.
1814.  
7688. ACKERMANN und HERHOLT. *Sieht der Mensch mit einem Auge allein oder mit beiden zugleich?* Kopenhagen.
1826.  
7689. J. MÜLLER. *Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns*. Leipzig. S. 191—194.
1836.  
7690. A. W. VOLKMANN. *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichts*. Leipzig. S. 97—99.
1838.  
7691. C. WHEATSTONE. *Contributions to the physiology of vision*. Philos. Trans. II. S. 386—387.
7692. VÖLCKERS. *Ueber Farbenmischung in beiden Augen*. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 61 u. 63.
7693. A. W. VOLKMANN. *Ueber die Empfindung, welche entsteht, wenn verschiedenfarbige Lichtstrahlen auf identische Netzhautstellen fallen*. Müller's Arch. S. 373.
1841.  
7694. H. W. DOVE. *Monatsber. d. Berl. Acad.* S. 251.
1846.  
7695. A. SEEBECK. *Beiträge zur Physiologie des Gehör- und Gesichtssinns*. Pogg. Ann. LXVIII. S. 449.
1848.  
7696. E. HABLESS. *Physiologische Beobachtung und Experiment*. Nürnberg. S. 45.
1849.  
7697. FOUCAULT et REGNAULT. *Note sur quelques phénomènes de la vision au moyen des deux yeux*. Compt. Rend. XXVIII. S. 78. — Philos. Mag. XXXIV. S. 269. — Inst. XVII. No. 783.
7698. DE HALDAT. *Optique oculaire*. Nancy. — Arch. de sc. physiol. et nat. XII. S. 45. — Inst. XVII. No. 786. S. 29

1850.

7699. H. W. DOVE. *Ueber die Ursache des Glanzes und der Irradiation, abgeleitet aus chromatischen Versuchen mit dem Stereoskop.* Pogg. Ann. LXXXIII. S. 169. Berl. Monatsber. 1851. S. 252. Philos. Mag. (4.) IV. S. 241. Arch. d. sc. phys. et. nat. XXI. S. 209. Inst. No. 991. S. 421.
7700. — *Ueber das Binocularsehen prismatischer Farben und eine neue stereoskopische Methode.* Pogg. Ann. LXXX. S. 446. Berl. Monatsber. S. 152. Arch. des sc. phys. et natur. XIX. S. 219.
7701. H. MEYER. *Ueber einen optischen Versuch.* Wien. Ber. VII. S. 454. Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 188.

1852.

7702. D. BREWSTER. *Examination of Dove's theory of lustre.* Athenäum. S. 1041. Cosmos. I. S. 577—578. Sill. Journ. (2.) XV. S. 125.
7703. H. WELKER. *Ueber Irradiation und einige andere Erscheinungen des Sehens.* Gießen. S. 107.

1853.

7704. E. BRÜCKE. *Ueber die Wirkung complementär gefärbter Gläser beim binoculären Sehen.* Wien. Ber. XI. S. 213—216. — Pogg. Ann. XC. S. 606—609.

1854.

7705. F. BURCKHARDT. *Ueber Binocularsehen.* Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 123—154.
7706. — *Zur Irradiation.* Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 154—157.
7707. J. J. OPPEL. *Ueber die Entstehung des Glanzes bei zweifarbigen, insbesondere bei schwarzen und weißen stereoskopischen Bildern.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1853 bis 54. S. 52—55. und 1854—55. S. 33—37.

1855.

7708. D. BREWSTER. *On the binocular vision of surfaces of different colours.* Athenäum. S. 1120. — Inst. S. 375. — Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 9.
7709. H. W. DOVE. *Ueber die von ihm gegebene Erklärung des Glanzes.* Berl. Monatsber. S. 691—694. Inst. 1856. S. 118—119.

1856.

7710. H. HELMHOLTZ. *Ueber die Erklärung der stereoskopischen Erscheinung des Glanzes.* Verh. d. naturhist. Ver. d. Rheinlande. S. XXXVIII—XL.
7711. H. MEYER. *Ueber den Einfluß der Aufmerksamkeit auf die Bildung des Gesichtsfeldes überhaupt und die Bildung des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen im Besonderen.* Arch. f. Ophthalm. II. 2. S. 77—92.

1857.

7712. H. W. DOVE. *Ueber Binocularsehen durch verschieden gefärbte Gläser.* Berl. Monatsber. S. 208—211. — Pogg. Ann. CI. S. 147—151.
7713. J. J. OPPEL. *Bemerkungen zur Stereoskopie und insbesondere zur Erklärung des Glanzes zweifarbiger Bilder.* Pogg. Ann. Bd. 100. S. 462.
7714. A. PAALZOW. *Ueber subjective Farben und die Entstehung des Glanzes.* Berl. Monatsber. S. 435.

1858.

7715. J. DINGLE. *On a new law of binocular vision.* Athenäum. II. S. 458.
7716. J. J. OPPEL. *Ueber das „Glitzern“, eine eigenthümliche Art des Glanzes und die stereoskopische Nachahmung desselben.* Jahresber. d. Frankf. Ver. 1856—1857. S. 56—62.
7717. P. L. PANUM. *Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen.* Kiel. S. 38—42.

1860.

7718. G. TH. FECHNER. *Ueber einige Verhältnisse des binocularen Sehens.* Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. VII. S. 337—564.
7719. F. ZÖLLNER. *Ueber eine neue Beziehung der Retina zu den Bewegungen der Iris.* Pogg. Ann. CXI. S. 481—499, 660.
7720. H. W. DOVE. *Optische Notizen.* Pogg. Ann. CX. S. 286—288.
7721. ROGERS. *On our inability from the retinal impression alone to determine which retina is impressed.* Proc. of the Amer. Assoc. S. 192.

1861.

7722. E. BRÜCKE. *Ueber den Metallganz.* Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 177—192.
7723. D. BREWSTER. *On binocular lustre.* Athenäum. 2. S. 411. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 29—31.

7724. O. N. ROOD. *Upon some experiments connected with Dove's theory of lustre.* Sill. Journ. (2.) XXXI. S. 339—345. Philos. Mag. (4.) XXII. S. 38—45.
7725. H. W. DOVE. *Ueber den Glanz.* Berl. Monatsber. S. 522—525.
7726. — *Ueber Binocularsehen und subjective Farben.* Pogg. Ann. Bd. 114. S. 165—168.
7727. P. L. PANUM. *Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhaut-eindrücke beim Sehen mit zwei Augen.* Reichert's und Du Bois-Reymond's Arch. f. Anat. und Physiol. S. 63—227.
- 1862.
7728. W. WUNDT. *Ueber die Entstehung des Glanzes.* Pogg. Ann. CXVI. S. 627—631.
7729. O. N. ROOD. *On some stereoscopic experiments.* Silliman Journ. (2.) XXXIV. S. 199—202.
7730. G. TH. FECHNER. *Ueber den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch.* Leipziger Ber. S. 27—56.
7731. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Leipzig und Heidelberg. S. 299—375.
- 1864.
7732. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie.* 5. Heft. Leipzig. S. 312—316.
- 1865.
7733. E. JAVAL. *De la neutralisation dans l'acte de la vision.* Ann. d'Oculist. LIV. S. 5—16.
7734. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Zeitschr. f. Biol. I. S. 297—262.
7735. O. N. ROOD. *On the combination which takes place when light of different tints is presented to the right and left eye.* Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 254—259.
7736. — *Description of a simple apparatus for producing lustre without the use of lustrous surfaces or of the stereoscope.* Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 260.
- 1866.
7737. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* (Nachtrag.) Zeitschr. f. Biol. II. S. 178 bis 188.
- 1867.
7738. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Pogg. Ann. Bd. 130. S. 424—433.
- 1870.
7739. M. WOINOW. *Ueber den Wettstreit der Sehfelder.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 194—199.
- 1871.
7740. TH. WARD. *Optical Phenomenon.* Nature. IV. S. 68.
- 1874.
7741. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculare Farbenmischung.* Pogg. Ann. Jubelband. S. 585—590.
7742. W. SCHÖN und A. MOSSO. *Eine Beobachtung, betreffend den Wettstreit der Sehfelder.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 269.
- 1875.
7743. W. DOBROWOLSKY. *Ueber binoculare Farbenmischung.* Pflüger's Arch. X. S. 56—61.
7744. S. EXNER. *Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse.* IV. Abh.: *Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates.* Pflüger's Arch. 11. S. 581—602.
7745. W. SCHÖN. *Zum Wettstreit der Sehfelder.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 356—358.
- 1876.
7746. NIPHER. *Optical experiments.* Nature. XIV. S. 308.
- 1877.
7747. A. CHODIN. *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke.* Preyer's Samml. Physiol. Abhandl. Erste Reihe. 7. Heft. Jena, Dufft. S. 44—66.
- 1879.
7748. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen.* III. *Wettstreit der Sehfelder.* Pflüger's Arch. XVIII. S. 542—573.
- 1882.
7749. J. GORHAM. *On the blending of colours by the sole agency of the sensorium.* Brain. IV. S. 467.
- 1889.
7750. D. AXENFELD. *Notes physiologiques. (Un phénomène de contraste binoculaire.)* Arch. Ital. de Biol. XII. S. 28.

1891.

7751. A. CHAUVEAU. *Sur la fusion des sensations chromatiques perçues isolément par chacun des deux yeux.* Compt. Rend. CXIII. S. 358—362. — Progr. med. No. 38.  
 7752. — *Sur la théorie de l'antagonisme des champs visuels.* Compt. Rend. Bd. 113. Nov. 15. S. 439—442.

## § 33.

## Kritik der Theorien.

Hinsichtlich weiterer Litteratur muß auf die Zusammenstellungen in den entsprechenden philosophischen Werken verwiesen werden; ferner ist die Litteratur von § 26 zu beachten.

1833.

7753. H. ERPENBECK. *Ueber das Recht-Sehen trotz des umgekehrten Schbildes auf der Retina.*

1846.

7754. TH. WAITZ. *Grundlegung der Psychologie.* Hamburg.

1849.

7755. TH. WAITZ. *Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.* Braunschweig.

1852.

7756. H. LOTZE. *Medicinische Psychologie.* Leipzig.

1854.

7757. G. MEISSNER. *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans.* 1854.

1855.

7758. A. BAIN. *The senses and the intellect.*

7759. H. HELMHOLTZ. *Ueber das Sehen des Menschen.* Ein populär wissenschaftlicher Vortrag. Leipzig, L. Voss.

7760. H. SPENGER. *Principles of psychology.* London. 2 Vol.

1858.

7761. C. G. P. LANGENHAUN. *Quid sit, quod objecta, inversa in retina imagine, sensu recta percipiantur, disseritur.*

7762. P. L. PANUM. *Ueber das Sehen mit zwei Augen.* Kiel.

1859.

7763. A. KUSSMAUL. *Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen.*

7764. ÜBERWEG. *Zur Theorie der Richtung des Sehens.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. 3. R. Bd. 5. S. 274.

1860.

7765. G. TH. FECHNER. *Elemente der Psychophysik.* 2 Bde. Leipzig.

1861.

7766. CORNELIUS. *Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens vom physikalischen, physiologischen und psychologischen Standpunkt.* Halle.

7767. A. NAGEL. *Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen.* Leipzig u. Heidelberg.

1862.

7768. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Leipzig u. Heidelberg.

1863.

7769. A. CLASSEN. *Das Schlußverfahren des Schactes.* Rostock.

1864.

7770. ABBOT. *Light and touch.*

7771. A. BAIN. *The senses and the intellect.* 2. ed.

7772. CORNELIUS. *Zur Theorie des Sehens.* Halle.

7773. A. FICK. *Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane*. Lehr. Heft 2.  
 7774. W. WUNDT. *Vorlesungen über Menschen- und Thierseele*. Leipzig, Voss. 2 Bde.  
 1866.  
 7775. H. SCHEFFLER. *Die Gesetze des räumlichen Sehens (als Supplement zu: „Die physiologische Optik“)*. Braunschweig.  
 1867.  
 7776. A. CLASSEN. *Ueber die räumliche Form der Gesichtsempfindung*. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. XXXVIII. S. 91 u. 441.  
 1868.  
 7777. A. BAIN. *The senses and the intellect*. 3 edition. London.  
 7778. J. BAUMANN. *Die Lehre von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren Philosophie*. 2 Bde.  
 7779. S. ROWLEY. *An new theory of vision*. Phil. Mag. (4.) XXXVI. S. 192—206.  
 1870.  
 7780. F. C. DONDEERS. *Over aangeboren en verkregen associatie*. Onderz. in h. Phys. Lab. te Utrecht. Tw. R. III. S. 145. — Nederl. Arch. v. Genees en Natuurk. S. 247—256. Bijbladen 11 de Verslag, Gasthuis v. Ooglijders. S. 80—89.  
 1871.  
 7781. A. VERSTRAETE. *Note sur la question de savoir de quelle manière nous acquérons par la vue la connaissance des corps*. Bull. de Brux. XXXII. 2. S. 155.  
 1872.  
 7782. F. C. DONDEERS. *Ueber angeborene und erworbene Association*. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 153.  
 1873.  
 7783. A. CLASSEN. *Durch welche Hilfsmittel orientiren wir uns über den Ort der gesehenen Dinge?* Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 53—87.  
 7784. KRAMER. *Ueber die Entstehung der räumlichen Tiefenwahrnehmung*. Progr. d. Gymnas. zu Schleusingen. 1872—73.  
 7785. C. STUMPF. *Ueber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung*. Leipzig.  
 1874.  
 7786. v. HASNER. *Die Tiefenempfindung als Coordinatenverwandlung*. Prager Vierteljahrschr. Bd. 123. S. 23—32.  
 7787. J. JACOBSON. *Die Hasner'sche Theorie der Rückconstruction*. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 71.  
 1875.  
 7788. G. GUÉROULT. *La notion d'espace et les conditions nécessaires à sa production*. Rev. Scient. XV. S. 986—989.  
 7789. v. HASNER. *Zur Theorie der Sehempfindung*. Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) S. 43 bis 46.  
 7790. O. LIEBMANN. *Zur Analysis der Wirklichkeit*. Straßburg.  
 7791. OGER. *La vérité sur le redressement des images*. Mondes. (2.) XXXVIII. S. 159—164.  
 1876.  
 7792. A. CLASSEN. *Physiologie des Gesichtssinnes, zum ersten Mal begründet auf Kant's Theorie der Erfahrung*. Braunschweig.  
 7793. J. DELBOEUF. *La Psychologie comme science naturelle, son présent et son avenir*. Brüssel, Muquardt. 111 S.  
 7794. C. UEBERHORST. *Die Entstehung der Gesichtswahrnehmung*. Versuch der Auflösung des Problems der physiologischen Psychologie. Göttingen.  
 1878.  
 7795. A. KRAUSE. *Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanschauung und der geometrischen Axiome*. Lehr. Schauenburg. 94 S.  
 7796. J. SULLY. *The Question of Visual Perception in Germany*. Mind. IX. S. 1—24.  
 1879.  
 7797. A. CLASSEN. *Wie orientiren wir uns im Raum durch den Gesichtssinn?* Preyer's Samml. physiol. Abhandl. 2. Reihe. Heft 5. Jena.  
 7798. E. HERING. *Der Raumsinn und die Bewegungen des Auges*. Handb. d. Physiol. Herausgeg. v. L. Hermann. III. 1. S. 343—601.  
 1880.  
 7799. O. LIEBMANN. *Zur Analysis der Wirklichkeit*. 2. Aufl. Straßburg.

1881.

7800. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur empiristischen Theorie des Sehens*. Sitzgs.-Ber. d. naturwiss. Ges. in Marburg. S. 41.

7801. FR. SCHULTZE. *Philosophie der Naturwissenschaft*. 2 Theile. Leipzig.

1882.

7802. H. SCHMIDT-RIMPLER. *Zur empiristischen Theorie des Sehens*. Neurol. Centralbl. 1. S. 59.

1883.

7803. TH. LIPPS. *Grundthatsachen des Seelenlebens*. Bonn. 708 S.

1885.

7804. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XI. S. 433—493.

7805. TH. LIPPS. *Psychologische Studien*. (1. *Der Raum der Gesichtswahrnehmung*.) Heidelberg, Weiss. 161 S.

1886.

7806. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. X. S. 419—467.

7807. E. MACH. *Beiträge zur Analyse der Empfindungen*. Jena, Fischer. 168 S.

1887.

7808. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XI. S. 53—116, 249—307.

1888.

7809. CH. DUNAN. *L'espace visuelle et l'espace tactile*. Rev. philos. XIII. 2. S. 184.

7810. J. H. HYSLOP. *On Wundt's theory of psychic synthesis in vision*. Mind. XIII. S. 499.

7811. L. DE LA RIVE. *Sur la composition des sensations et la formation de la notion de l'espace*. Basel. H. Gevrey.

1889.

7812. A. CLASSEN. *Physiologie des Gesichtssinnes, zum ersten Mal begründet auf Kant's Theorie der Erfahrung*. Braunschweig, Vieweg.

7813. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIII. S. 71—124, 392—419.

7814. L. DE LA RIVE. *Sur la g  n  se de la notion d'espace*. Rev. philos. XIV. Jahrg. Bd. 27. S. 452—462. Rep. britt. assoc. 1888. S. 585.

1890.

7815. W. JAMES. *The principles of psychology*. London.

7816. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIV. S. 317—358.

7817. A. K  PCKE. *Ueber empirische und idealisirende Raumauffassung*. Progr. Altona Ottensen. 10 S.

7818. H. SPENCER. *Our Space-Consciousness: A. Reply*. Mind. XV. S. 305—324.

1891.

7819. C. S. CORNELIUS. *Zur Theorie des r  umlichen Vorstellens mit R  cksicht auf eine Nachbildlokalisation*. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 64—179.

7820. E. L. FISCHER. *Theorie der Gesichtswahrnehmung*. Mainz, Kirchheim 392 S.

7821. J. H. HYSLOP. *Helmholtz's theory of space-perception*. Mind. XVI. S. 54—79.

7822. B. KERRY. *Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung*. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XV. S. 127—167.

7823. H. MUNK. *Sehsp  hre und Raumvorstellungen*. Intern. Beitr. z. wissensch. Med. (Virchow-Festschr.). Bd. I. S. 355—366. Berlin, Hirschwald.

7824. J. ONANOFF. *Origine de la vision droite*. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (9). III. 12. S. 233—236.

7825. RUDZKI. *Ueber ein angeborenes Gef  hl der Cardinalrichtungen des Horizonts*. Biol. Centralbl. XI. No. 2. S. 63.

1892.

7826. A. FARGES. *La critique de Kant sur l'espace et le temps*. Ann. de Philos. Chr  t (N. S.) Bd. 26. 5. S. 456—475.

7827. G. HIRTH. *Das plastische Sehen als Rindenzwang*. M  nchen. G. Hirth's Verlag. 80 S. m. 50 Textillustr. u. 34 Taf. m. stereoskop. Abbild.



7828. TH. LIPPS. *Die Raumannschauungen und die Augenbewegungen*. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 123—171.
7829. A. STÖHR. *Zur nativistischen Behandlung des Tiefensehens*. Wien, Deuticke. 30 S.
7830. W. WUNDT. *Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele*. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig.
- 1893.
7831. M. GLOSNER. *Die Theorie der Gesichtswahrnehmung und der kritische Realismus E. L. Fischer's*. Jahrb. f. Philos. u. specul. Theol. VII. S. 326—344.
- 1894.
7832. J. H. HYSLOP. *Experiments in space perception*. Psychol. Rev. I. 3. S. 257—273.
7833. J. KRASSNIG. *Die Zeit- und Raumvorstellung, eine psychologische Studie*. Progr. Nikolsburg. 89 S.
-

# Autorenregister zur Litteraturübersicht.

Anonym erschienene Abhandlungen sind mit den Anfangsworten ihres Titels in die alphabetische Reihenfolge eingeordnet.

## A.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>A., A. 5865.<br/>           Abadie 778. 6784.<br/>           Abbe, E. 1126. 1875.<br/>           Abbot, C. C. 4151.<br/>           Abbot, T. R. 5801.<br/>           Abbott 3797. 7770.<br/>           Abercrombi, Adams, Ord,<br/>             Nettleship 2704.<br/>           Abney, W. de W. 4886.<br/>             4887. 4888. 4908. 5536.<br/>             5549. 5655. 6500.<br/>           Abney, W. de W. u. Festing,<br/>             E. R. 4897. 5641. 5642.<br/>             5651. 5652. 5663.<br/>           Ackermann u. Herholt 7688.<br/>           Ackroyd, F. J. C. 715. 6544.<br/>           Adams, G. 1510. 5884, siehe<br/>             auch Abercrombi.<br/>           Adams, J. E. 835.<br/>           Adamück, E. 483. 1591.<br/>             1994. 2277. 2278. 2279.<br/>             2285. 2305. 6693. 6694.<br/>           Adamück, E. u. Woinow, M.<br/>             1674. 2286. 6195.<br/>           Adda 2202.<br/>           Addario, C. 6566. 6568.<br/>           Adensamer, Th. 426.<br/>           Aderholt, A. 3916.<br/>           Adler, H. 3464. 3465. 5146.<br/>           Aeby, Ch. 1663.<br/>           Aepinus 2729. 6093. 6832.<br/>           Aglave, E. 3288.<br/>           Agnew 3024.<br/>           Aguilonius (oder d'Aguilon),<br/>             F. 3. 5712. 5818. 6077.<br/>             7205. 7441.<br/>           Ahlström, G. 657.</p> | <p>Ahrens, A. 7093.<br/>           Ahrens, B. u. A. 1706.<br/>           Aimé 5866.<br/>           Aimée 2416.<br/>           Airy, G. B. 2417. 2568.<br/>             2699. 3942.<br/>           Aitken, J. 746. 4025. 4379.<br/>             4390. 4513. 5098. 5122.<br/>             6227. 6438. 7045.<br/>           Albers, J. A. 316. 2166.<br/>           Albert, E. 4655. 5447.<br/>           Albertoni, P. 3813. 3540.<br/>           Albertotti, 528. 570.<br/>             601. 1436. 1437. 1626.<br/>             2115. 2976. 4169. 4845.<br/>             5685. 6943., siehe auch<br/>             Tartuferi, F.<br/>           Albini 704. 1057. 3692.<br/>             3697. 3719. 3754. 3776.<br/>             3789. 4990. 4991.<br/>           Albrand, W. 3825.<br/>           Albrecht, J. 1838. 1955.<br/>           d'Alembert 2872. 6986.<br/>           Alhazen 5816. 6075. 7103.<br/>           Alix 4936. 7068.<br/>           Allen, G. 4049. 4072. 4073.<br/>             4104. 4143.<br/>           d'Almeida, J. C. 5923.<br/>             7276.<br/>           Almquist 4074. 4075.<br/>           Almquist u. Magnus 4105.<br/>           Alt, A. 80.<br/>           Altmann, R. 1127. 1128.<br/>           Amadei 1956.<br/>           Amat, C. 2125.<br/>           Amici 3625.<br/>           Amick, W. R. 4764.<br/>           Ammon, F. A. 837.<br/>           Anaglino 154.</p> | <p>Anagnostakis 2837.<br/>           Ancke, B. 7401.<br/>           Anderson, H. K., siehe Lang-<br/>             ley, J. N.<br/>           Anderson, J. 289.<br/>           Anderson, T. 2531. 7592.<br/>           Anderson, W. W. 7404.<br/>           Andogaky, N. u. Dolganow,<br/>             W. 2665.<br/>           André 5805. 5806. 5807;<br/>             siehe auch Wolf.<br/>           André u. Angot 5811.<br/>           Andrée 4050. 4106.<br/>           Andrews, E. A. 416.<br/>           Aneshäusel 5028.<br/>           Angelucci, A. 155. 174. 240.<br/>             304. 907. 908. 1910. 2315.<br/>             2550. 2707. 2708. 3551.<br/>             3558. 3574. 3575. 3584.<br/>             3585. 3598. 3601. 3605.<br/>             3606. 4177. 4898. 4921.<br/>             4945. 4950. 4951.<br/>           Angelucci, A. u. Aubert 2316.<br/>           Angiers, siehe Langlois.<br/>           Angot, siehe André.<br/>           Annuske 4402.<br/>           Antonelli, A. 1095. 1490.<br/>             3118. 3286.<br/>           Antonow 4076.<br/>           Appia 2746. 3284.<br/>           Aquapendente, F. 1. 7.<br/>           Arago 5391. 5747. 5786.<br/>           Araldi 6993.<br/>           Archer, Ch. 2254.<br/>           Arcoleo 3607.<br/>           d'Arcy 5835.<br/>           Argilagos 2864. 2867.<br/>           Argyropulos 708.<br/>           Aristoteles 3846.</p> |
|--|---|--|

- Arlt, F. 472. 679. 694. 1938. 6690.  
 Armaignac, H. 1755. 2947. 3709. 5643. 6945.  
 Arminski, J. 1865. 2030. 2066.  
 Armstrong, S. T. 5376.  
 Arndt 227.  
 Arnim, L. A. v. 7686.  
 Arnold, F. 30. 2187.  
 d'Arsonval 3386.  
 Artha, siehe Haaner.  
 Asher, J. 2093.  
 Aub 6695.  
 Aubert, H. 47. 66. 562. 620. 2347. 3349. 4343. 5395. 5397. 5572. 5622. 5677. 5787. 5986. 6166. 6168. 6170. 6173. 6417. 6668. 6889. 6910. 7017. 7071. 7079. 7083. 7089. 7418. 7526; siehe auch Angelucci.  
 Aubert, H. u. Förster 3427. 3640. 6892.  
 Auerbach, F. 6975.  
 Augstein 4727.  
 August, F. 7145. 7296. 7490.  
 Auscher, E., siehe Déjerine, J.  
 Austin, H. W. 5344.  
 Ayres u. Kühne 3503.  
 Ayres, C. 2321.  
 Ayres, S. E. 6549.  
 Ayres, W. C. 3526. 3541. 3552. 3553; siehe auch Kühne, W.  
 Axenfeld, A. 6628.  
 Axenfeld, D. 823. 1494. 1549. 1777. 1809. 2710. 3602. 6485. 6488. 7084. 7750.  
 Axenfeld, T. 1866. 2723.  
  
**B.**  
 Baader, E. G. 6061.  
 Baas, K. L. 2083. 5266.  
 Babinet 6401.  
 Babo, L. v. 7306.  
 Babuchin 1016.  
 Bacaloglo, E. 6905.  
 Bachmeister, A. 4380.  
 Backhouse, T. W. 2701. 2776. 4812. 7391.  
 Baco, R. 7104.  
 Bacon, W. T. 5350.  
 Badal 812. 813. 814. 1233. 1240. 1408. 1537. 1538. 1539. 1541. 1596. 1597. 1604. 1743. 1747. 1748. 1756. 1895. 1899. 1908. 2777. 2932. 3693. 3720. 3826. 5050. 6935.  
 Baehr, G. F. W. 6696. 6697. 6706.  
 Bähr, J. K. 3920.  
 Baer, N. A. 2014.  
 Baer, O. 1438.  
 Bäuerlein 2300.  
 Bagot 1491.  
 Bahr 2249. 7503.  
 Baily, W. 4909.  
 Bain, A. 7758. 7771. 7777.  
 Bajardi, P. 608. 621. 622. 796. 2612; siehe auch Reymond.  
 Baker, A. R. 1792. 3174. 3192.  
 Bakowa, M. 4842.  
 Ballu 4023.  
 Bannister 4610.  
 Baquis, E. 1342. 6574.  
 Baratoux 3308.  
 Bardelli, L. 3244.  
 Baroffio, D. F. 2968.  
 Barr, E. 3261.  
 Barrat, H. P. 2711.  
 Barret, J. W. 964. 1545. 2831; siehe auch Morton und auch Lang, W.  
 Bartels, C. M. N. 31. 1164. 6874. 6998; siehe auch Schulz.  
 Barthélemy 1862.  
 Bartlett, E. W., 4609. 5351.  
 Bartoli, A. 6924.  
 Basevi, V. 3449. 4993. 5518. 5529. 7419.  
 Batten, R. D. 2067.  
 Batut 4514.  
 Baudrimont 2432.  
 Bauer 506.  
 Baumann, J., 7778.  
 Baumeister 2977.  
 Baumgartner, A. v. 4824.  
 Baumont, W. M. 5294.  
 Baxt 5964.  
 Bayer 2969. 4656. 5448.  
 Beaudouin, M. 403.  
 Beaumont 3222.  
 Beaunis, H. und Binet, A. 3320.  
 Beauregard, M. H. 3527. 3542.  
 Beccaria 623. 644.  
 Bechterew, W. v. 142. 143. 144. 145. 146. 156. 157. 193. 213. 241. 255. 737. 758. 940. 6792.  
 Beck, siehe Smith.  
 Beck, J. 7287. 7290.  
 Becker 3814. 3815.  
 Becker, G. 3730.  
 Becker, J. K. 6196. 6433. 6540.  
 Becker, O. 683. 920. 1027. 1033. 1034. 1037. 1214. 1962. 2261. 2499. 2774. 2866. 3466. 5174. 5601. 6454.  
 Becker, O. und Rollet, A. 7301.  
 Becker, F. J. v. 1014.  
 Becquerel, siehe Cahours.  
 Beddard, F. E. 376.  
 Beer, A. 2433. 2439. 2446. 6392.  
 Beer, Th. 2356. 2363.  
 Beever 5217. 7090.  
 Beguelin 6334. 6335.  
 Behr 2813.  
 Beireis, G. C. und Vogler, J. H. Ch. 2731.  
 Bell 6639.  
 Bellarminow, L. 571. 581. 589. 747. 817. 818. 3071. 3072. 3777. 3788. 6054.  
 Belliard 2068.  
 Bellonci 147. 158. 175. 176. 228. 941.  
 Below, D. 6808. 7607.  
 Benedict, M. 4344.  
 Bennet, A. H. und Lavill, Th. 242.  
 Bennet, E. H. 2572.  
 Benson, A. H. 3025.  
 Benson, F. 5258.  
 Benson, W. 4293. 4366. 6431.  
 Benzenberg, J. F. 3897.  
 Benzler 6819. 7632.  
 Béraneck, E. 404. 427.  
 Beraneck, E. u. Verrey, L. 3609.  
 Bergen, de 6069.  
 Berger 3026. 5267.  
 Berger, E. 341. 929. 1028. 1058. 1919. 2537. 2538. 2569. 2994. 5297.  
 Berger, G. O. 6022.  
 Berger, O. 177. 4571.  
 Berger, Th. H. 2250.  
 Bergh, A. 4864.  
 Bergmann, C. 851. 3421. 3641. 3649.  
 Bergmann u. Leuckart 324.  
 Bergmeister 2589.  
 Berkeley 6581. 6860. 6961. 7116.  
 Berlin 842. 1195. 2583. 2978. 7080.  
 Berlin, A. 6275. 7172.  
 Berlin, E. 2513. 3352. 6707.  
 Berlin, R. 2593. 7392. 7413. 7424.  
 Bernard, F. 3949.

- Bernardy, N. 3559.  
 Bernheimer, S. 963.  
 Bernouilli, D. 3898.  
 Bernstein, J. 58. 64. 81. 1222.  
 Berry 1710. 2031. 3779. 3827. 4515. 4865. 4866. 5449. 5487. 5488. 7420. 7608. 7662; siehe auch Carter, R. B.  
 Bert, P. 4088. 4453.  
 Bert, S. 4441.  
 Berthold, E. 2889. 2925. 3576. 6552. 6679.  
 Bertier, T. 4442.  
 Bertillon, A. 748.  
 Bertin 1866.  
 Bertin-Sans, E. 1957.  
 Bertin-Sans, H. 645. 1385. 1643. 1950.  
 Bertkau, Ph. 367.  
 Bertrand 1546.  
 Beselin, O. 1690.  
 Besio 2214.  
 Bessel 1107. 5760.  
 Besser, L. 84.  
 Bettremieux 2594.  
 Bezold, W. v. 2394. 2395. 2396. 2397. 2696. 2697. 2698. 3978. 4294. 4403. 4443. 4444. 4765. 4813. 5011. 5976. 6944. 7177. 7313. 7314. 7320. 7326. 7519. 7529. 7571. 7734. 7737. 7738. 7741.  
 Biagi, G. 984.  
 Bianchi 159.  
 Bibart 6615.  
 Bickart, E. 5137.  
 Bickerton 4728. 4792. 4793. 4814. 4867. 4899. 5128. 5198. 5377.  
 Bidloo, G. 315. 2141.  
 Bidwell, S. 6259. 6260. 6317.  
 Bialefeld, J. 7385.  
 Biesinger, 1637. 6776.  
 Bigelow, H. R. 3543.  
 Binet, A. 3321; siehe auch Beaunis, H.  
 Binet u. Philippe 3322.  
 Biot 5746.  
 Birgham 4126.  
 Birnbacher 3618.  
 Bischoff, J. 1511.  
 Bissell, E. J. 631.  
 Bitzos, G. 1814. 3237. 3245.  
 Bizio, B. 6395. 6396.  
 Bjeloff 6793. 6796.  
 Bjerrum, J. 1476. 1480. 1846. 1926. 2364. 3119. 3731.  
 3746. 4611. 5457. 5462. 5489. 5537. 5699.  
 Blackie 4051.  
 Blake, L. J. u. Franklin, W. S. 4170.  
 Blanch, A. J. 2573.  
 Blaschko, H. 116. 5308.  
 Blessig, R. 848.  
 Bleuler, E. u. Lehmann, K. 3285.  
 Bliss, T. F. 7425.  
 Blix, M. 516. 523. 529. 1423. 6307.  
 Bloch, A. M. 6013. 6015. 6023. 6029. 6030. 6031. 6032. 6033. 6046.  
 Blondel, M. 7186. 7189.  
 Blümner, H. 4176.  
 Boas, F. 5439. 5450. 5451. 5452. 5453. 6008.  
 Boblin, A. 7274.  
 Bock, A. 2069.  
 Bock, E. 3228.  
 Boé, F. 749.  
 Boedeker, J. 572.  
 Boehm 2597. 5116. 6987.  
 Boens, H. 7008.  
 Boerhave 2150. 5828.  
 Boerma, D. u. Walther, K. 3828.  
 Böttcher 1223. 3659. 6683. 7321. 7322. 7359. 7533.  
 Böttiger 4032.  
 Bohn, C. 3975. 4250. 5584.  
 Bois-Reymond, C. du 609. 824. 921. 1439. 1645. 2621. 3138. 3721. 3780. 7426.  
 Bois-Reymond, E. du 3380.  
 Bois-Reymond, P. du siehe Fick, A.  
 Bokowa, M. 6172.  
 Boll, F. 329. 3461. 3467. 3468. 3469. 3554. 4052. 4940.  
 Bongers, P. 3073.  
 Bonnet 2200.  
 Bono, G. B. 85. 1951. 1963. 2551. 4152. 5363.  
 Bono, de 256.  
 Bordier, H. 1349. 1817. 3836.  
 Borel, G. 1204.  
 Borgmann, H. 1935.  
 Borteling, L. A. 1784.  
 Borthen, L. 3088. 3089. 3090. 3100. 4729. 5356. 6621.  
 Borysiekiewicz, M. 942. 969. 989. 990. 991.  
 Boss, S. 610.  
 Bosscha, H. P. 6318.  
 Bostwick, A. E. 3781. 7200.  
 Botto, M. 3450. 3451.  
 Botzenhart 6513. 6514.  
 Bouchard 2310.  
 Bouchardt 3528.  
 Bouchut 2890.  
 Bouguier, P. 5386. 6329. 7123.  
 Bourdon, B. 7190.  
 Bourgeois 3905. 6363.  
 Bourgeois u. Tscherning 573.  
 Bouveret, L. 214.  
 Bowditch, H. P. 86.  
 Bowditch u. Hall, G. S. 7060.  
 Bowditch u. Souchard 90.  
 Bowman, W. 448. 1005. 1047.  
 Boyle 3857. 5821.  
 Brabock, E. 5029.  
 Brachet u. Gsell, E. 5244.  
 Brackmeyer, G. 5248.  
 Braham, P. 1881.  
 Brahe, T. 5706.  
 Brailey, 726. 2524. 3732. 4612.  
 Brandes 3907. 5752. 6361.  
 Braun 6429.  
 Braun, G. 857. 3430.  
 Brauneck, siehe v. Kries, J.  
 Brauneck, J. C. 1928.  
 Brauns, A. E. 1937.  
 Braunschweig, P. 1489.  
 Braunstein, E. P. 797. 803.  
 Bravais, V. 3455. 6329.  
 Brecht 2926.  
 Breda, van 5782. 6160.  
 Breguet, siehe Richet.  
 Brentano, F. 5408. 6967.  
 Breton, 1187. 2246. 5412. 5472. 5497. 7033.  
 Breuer, J. 6733.  
 Brewer, J. P. 3933.  
 Brewin 4092.  
 Brewster, D. 29. 461. 1008. 1013. 1360. 1362. 2178. 2419. 2734. 2740. 2743. 3337. 3406. 3417. 3939. 3940. 3943. 3945. 3947. 3950. 4251. 4257. 5761. 5891. 5924. 5932. 6119. 6122. 6123. 6124. 6134. 6137. 6371. 6503. 6516. 6529. 6535. 6536. 6915. 7005. 7135. 7146. 7215. 7217. 7223. 7224. 7225. 7246. 7247. 7248. 7460. 7466. 7475. 7477. 7525. 7702. 7708. 7723.  
 Brewster, D. u. Wheatstone, C. 7268.

7724. O. N. ROOD. *Upon some experiments connected with Dove's theory of lustre.* Sill. Journ. (2.) XXXI. S. 339—345. Philos. Mag. (4.) XXII. S. 38—45.
7725. H. W. DOVE. *Ueber den Glanz.* Berl. Monatsber. S. 522—525.
7726. — *Ueber Binocularsehen und subjective Farben.* Pogg. Ann. Bd. 114. S. 165—168.
7727. P. L. PANUM. *Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhaut-eindrücke beim Sehen mit zwei Augen.* Reichert's und Du Bois-Reymond's Arch. f. Anat. und Physiol. S. 68—227.
- 1862.
7728. W. WUNDT. *Ueber die Entstehung des Glanzes.* Pogg. Ann. CXVI. S. 627—631.
7729. O. N. ROOD. *On some stereoscopic experiments.* Silliman Journ. (2.) XXXIV. S. 199—202.
7730. G. TH. FECHNER. *Ueber den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch.* Leipziger Ber. S. 27—56.
7731. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Leipzig und Heidelberg. S. 299—375.
- 1864.
7732. E. HERING. *Beiträge zur Physiologie.* 5. Heft. Leipzig. S. 312—316.
- 1865.
7733. E. JAVAL. *De la neutralisation dans l'acte de la vision.* Ann. d'Oculist. LIV. S. 5—16.
7734. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Zeitschr. f. Biol. I. S. 237—262.
7735. O. N. ROOD. *On the combination which takes place when light of different tints is presented to the right and left eye.* Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 254—259.
7736. — *Description of a simple apparatus for producing lustre without the use of lustrous surfaces or of the stereoscope.* Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 260.
- 1866.
7737. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* (Nachtrag.) Zeitschr. f. Biol. II. S. 173 bis 188.
- 1867.
7738. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculares Sehen.* Pogg. Ann. Bd. 130. S. 424—433.
- 1870.
7739. M. WOINOW. *Ueber den Wettstreit der Sehfelder.* Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 194—199.
- 1871.
7740. TH. WARD. *Optical Phenomenon.* Nature. IV. S. 68.
- 1874.
7741. W. v. BEZOLD. *Ueber binoculare Farbenmischung.* Pogg. Ann. Jubelband. S. 585—590.
7742. W. SCHÖN und A. MOSO. *Eine Beobachtung, betreffend den Wettstreit der Sehfelder.* Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 269.
- 1875.
7743. W. DOBROWOLSKY. *Ueber binoculare Farbenmischung.* Pflüger's Arch. X. S. 56—61.
7744. S. EXNER. *Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse.* IV. Abh.: *Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates.* Pflüger's Arch. 11. S. 581—602.
7745. W. SCHÖN. *Zum Wettstreit der Sehfelder.* Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 356—358.
- 1876.
7746. NIPHER. *Optical experiments.* Nature. XIV. S. 308.
- 1877.
7747. A. CHODIN. *Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke.* Preyer's Samml. Physiol. Abhandl. Erste Reihe. 7. Heft. Jena, Dufft. S. 44—66.
- 1879.
7748. KLEINER. *Physiologisch-optische Beobachtungen.* III. *Wettstreit der Sehfelder.* Pflüger's Arch. XVIII. S. 542—573.
- 1882.
7749. J. GORHAM. *On the blending of colours by the sole agency of the sensorium.* Brain. IV. S. 467.
- 1889.
7750. D. AXENFELD. *Notes physiologiques.* (Un phénomène de contraste binoculaire.) Arch. Ital. de Biol. XII. S. 28.

1891.

7751. A. CHAUVEAU. *Sur la fusion des sensations chromatiques perçues isolément par chacun des deux yeux.* Compt. Rend. CXIII. S. 358—362. — Progr. med. No. 38.  
 7752. — *Sur la théorie de l'antagonisme des champs visuels.* Compt. Rend. Bd. 113. Nov. 15. S. 439—442.

## § 33.

## Kritik der Theorien.

Hinsichtlich weiterer Litteratur muß auf die Zusammenstellungen in den entsprechenden philosophischen Werken verwiesen werden; ferner ist die Litteratur von § 26 zu beachten.

1833.

7753. H. ERPENBECK. *Ueber das Recht-Sehen trotz des umgekehrten Sehbildes auf der Retina.*

1846.

7754. TH. WAITZ. *Grundlegung der Psychologie.* Hamburg.

1849.

7755. TH. WAITZ. *Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.* Braunschweig.

1852.

7756. H. LOTZE. *Medicinische Psychologie.* Leipzig.

1854.

7757. G. MEISSNER. *Beiträge zur Physiologie des Sehorgans.* 1854.

1855.

7758. A. BAIN. *The senses and the intellect.*

7759. H. HELMHOLTZ. *Ueber das Sehen des Menschen.* Ein populär wissenschaftlicher Vortrag. Leipzig, L. Voss.

7760. H. SPENCER. *Principles of psychology.* London. 2 Vol.

1858.

7761. C. G. P. LANGENHAUN. *Quid sit, quod objecta, inversa in retina imagine, sensu recta percipiantur, disseritur.*

7762. P. L. PANUM. *Ueber das Sehen mit zwei Augen.* Kiel.

1859.

7763. A. KUSMAUL. *Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen.*

7764. ÜBERWEG. *Zur Theorie der Richtung des Sehens.* Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. nat. Med. 3. B. Bd. 5. S. 274.

1860.

7765. G. TH. FECHNER. *Elemente der Psychophysik.* 2 Bde. Leipzig.

1861.

7766. CORNELIUS. *Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens vom physikalischen, physiologischen und psychologischen Standpunkt.* Halle.

7767. A. NAGEL. *Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen.* Leipzig u. Heidelberg.

1862.

7768. W. WUNDT. *Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung.* Leipzig u. Heidelberg.

1863.

7769. A. CLASSEN. *Das Schlußverfahren des Sehactes.* Rostock.

1864.

7770. ABBOT. *Light and touch.*

7771. A. BAIN. *The senses and the intellect.* 2. ed.

7772. CORNELIUS. *Zur Theorie des Sehens.* Halle.

Czapaki, S. 1148.  
 Czermak, J. 1011. 1525.  
 1530. 1531. 1533. 1534.  
 1650. 1651. 1653. 1654.  
 2239. 2387. 2764. 3344.  
 3347. 3422. 3424. 4220.  
 4371. 4933. 5917. 6393.  
 6531. 6532. 6659. 6887.  
 7023. 7241. 7242. 7470.  
 7472.  
 Czerny 6183. 6188.  
 Czolbe, H. 4227. 4232.  
 Cyon, E. v. 1872. 1876. 6750.

## D.

Dase, A. 4532. 4533. 5016.  
 5017. 5018. 5030. 5319.  
 Dahlerup, L. 1735.  
 Dahlfeld, C. 7427.  
 Dahrenstaedt 3120.  
 Dalton, F. C. 122. 132.  
 Dalton, J. 4233.  
 Danoer 7316.  
 Daniel 1965.  
 Danilow 4578.  
 Dannillo, S. 231.  
 Dantec, de 4911.  
 Dareste 343.  
 Darkschewitsch, L. 201.  
 215. 216.  
 Darwin, E. 6102. 6105.  
 Darwin, R. W. 5341.  
 Dastich, J. 5161. 6601. 6680.  
 7530. 7531.  
 Daudel 7191.  
 Davis 3121. 3122.  
 Davis, A. E. 632.  
 Davis, A. S. 6198. 6263.  
 Davy, M. 3634.  
 Dawson, J. 3075.  
 Debenedetti 180. 6799.  
 Dobovzy 705.  
 Dechaies, M. 2724. 5733.  
 5823. 6082.  
 Decker, C. 2353.  
 Decondé 4270.  
 Deeren 1477. 1795. 1996.  
 2061. 2332. 2791. 4795.  
 4846.  
 Degenkolb, K. 5553.  
 Dejeret u. Violet 305.  
 Déjérine, J., Sollier, P. u.  
 Auscher, E. 257.  
 Delambre 5743.  
 Delboeuf, J. 65. 69. 148. 4079.  
 4477. 5402. 5405. 5406.  
 5424. 5460. 6204. 6911.  
 6912. 6913. 6969. 7793.

Delboeuf, J. u. Spring, W.  
 4478. 4479.  
 Delisle 5733.  
 Delitzsch 4054.  
 Delmaa, A. 6849; siehe auch  
 Contejean.  
 Deneffe 4167.  
 Denisenko, G. 389. 911. 912.  
 914. 915. 916. 917. 933.  
 934. 966.  
 Dennet, W. S. 658. 1464. 2576.  
 3030. 3062. 3784. 3785.  
 Denti, F., 574. 583. 2586.  
 Denzler, H. 7133.  
 Depigny, J. P. 2448.  
 Derby, H. 633. 3652.  
 Desaguliers, J. T. 7121.  
 Descartes 5723. 6079. 6979.  
 7109. (Siehe auch Car-  
 tesius.)  
 Desfosses, L. 344. 935.  
 Desjardin, D. 2604.  
 Desjardins, E. 591.  
 Dessauer 1061. 2326.  
 Deurs, van 4761.  
 Deutschmann, R. 6241.  
 Devic, M. 5803. 7363.  
 Dherbes 5320.  
 Dewar, J. 3462. 3474.  
 Dewar, J. u. Mac Kendrick,  
 J. 3459. 3460.  
 Dickerson, T. H. 5371.  
 Dickinson 133.  
 Dioquemare 5339.  
 Dieterici, C.; siehe König, A.  
 Dieterici, F. 4035.  
 Dietl und Plenk 3475. 3476.  
 Dimmer, F. 993. 994. 2804.  
 3063. 3113. 3123. 3139. 5259.  
 Dingle, J. 7715.  
 Ditlevsen, J. G. 514.  
*Dissertation sur les couleurs*  
*etc.* 6103.  
 Dobrowolsky, W. 887. 888.  
 1400. 1576. 1933. 1984.  
 1966. 1984. 2500. 2899.  
 2900. 3439. 3446. 3972.  
 3973. 3996. 4771. 4988.  
 5285. 5408. 5407. 5417.  
 5442. 5581. 5586. 5587.  
 5609. 6717. 7743.  
 Dobrowolsky, W. u. Gaine,  
 A. 3679. 5416.  
 Dönhoff 6214. 6809. 7369.  
 Dörfel, 533. 2554.  
 Doerinkel, W. 1679. 5690.  
 Doesburgh, T. v. 4225. 4226.  
 Dogiel 695. 759. 769. 804.  
 944. 953. 964. 973. 974.  
 986. 988. 4815.

Doijer, siehe Dondera.  
 Doijer, D. 1915.  
 Dolganow, W., siehe An-  
 dogaky, N.  
 Domec 2306. 2312.  
 Dominis, M. A. de 3850.  
 Dommartin 258.  
 Doncan, A. 1051. 2743.  
 Dondera, F. C. 477. 634. 810.  
 832. 1045. 1115. 1179. 1190.  
 1409. 1410. 1524. 1565.  
 1566. 1567. 1568. 1569.  
 1571. 1584. 1585. 1657.  
 1660. 1669. 1728. 1752.  
 1829. 1896. 2118. 2121.  
 2211. 2220. 2221. 2229.  
 2234. 2238. 2267. 2460.  
 2464. 2465. 2476. 2477.  
 2742. 2745. 2822. 2833.  
 2835. 2836. 2831. 3416.  
 3648. 3665. 3954. 3955.  
 4381. 4456. 4480. 4481.  
 4534. 4535. 4579. 4617.  
 4661. 4662. 4706. 4707.  
 4708. 4738. 4739. 4740.  
 4741. 5031. 5055. 5056.  
 5162. 5170. 5313. 6654.  
 6656. 6657. 6698. 6699.  
 6700. 6718. 6725. 6726.  
 6739. 6740. 6741. 6751.  
 6752. 6761. 7034. 7035.  
 7062. 7155. 7160. 7216.  
 7323. 7329. 7352. 7398.  
 7509. 7546. 7552. 7565.  
 7566. 7780. 7782.  
 Dondera, F. C. u. Doijer D.  
 688. 6671. 7524.  
 Dooremaal, van, siehe van  
 der Meulen.  
 Doppler, C. 4209. 5893.  
 Dor, H. 479. 484. 1665.  
 1672. 2271. 2662. 4055.  
 4056. 4080. 4357. 4358.  
 4393. 4618. 5019. 5199.  
 5200. 6947. 6948. 7346.  
 7353. 7553.  
 Dor, H. und Favre 4482.  
 Dostoevski, A. 760.  
 Doucet 1411.  
 Douglas, J. C. 1731. 1733.  
 Douliot, E. 7233.  
 Dove, H. W. 4204. 4205.  
 4231. 4359. 5160. 5563.  
 5770. 5883. 5895. 5896.  
 5897. 5926. 6145. 6146.  
 6155. 6184. 6383. 6389.  
 6434. 7006. 7026. 7219.  
 7220. 7221. 7229. 7259.  
 7260. 7271. 7279. 7280.  
 7286. 7291. 7302. 7323.

7458. 7492. 7694. 7699.  
7700. 7709. 7712. 7720.  
7725. 7726.  
Doyle, R. W. 7409.  
Doyon, M., siehe Morat, J. P.  
Dränert 3530.  
Draper, J. W. 3944. 5596.  
Draper-Speakman, H. 2624.  
Dreher, E. 4109. 4483. 4580.  
4581. 4847. 6000. 6457.  
7364.  
Dreschfeld 184.  
Dresser, H. 3578. 3587. 5559.  
Drews, R. 1088.  
Drobisch 4015. 4017. 7139.  
Droop, H. R. 4705.  
Drott, A. 5004.  
Drouin, A. 2301.  
Drutschinin, S. 3091.  
Dubois, E. 1758.  
Dubois, R. 390. 391. 3586;  
siehe auch Leroy, A.  
Dubois, R. und Renaut, J.  
979.  
Duboscq, J. 5981. 6019. 7218.  
7222. 7235. 7266; siehe  
auch Parinaud, H.  
Dubrunfant 807. 2771. 2772.  
3440. 3441. 6197. 6435.  
Duchaussoy, siehe Lauret.  
Dudgeon, R. E. 75. 1199.  
Duffan 5850.  
Dufour 2296. 4924. 5288.  
6616. 6925.  
Dugés 2190.  
Dujardin, F. 825. 827. 3012.  
Dunan, Ch. 6625. 6950.  
6954. 7809.  
Dunn, S. 8246. 7126.  
Durand, G. 798.  
Dürr, E. 189. 1841. 1979.  
Duval, M. 106. 109. 217. 392.  
892. 3461. 6771. 6777. 6778.  
siehe auch Laborde.  
Duval, M. und Kalt 393.  
Duval, M. und Laborde 6785.  
Duwez 2294.  
Duyse, van 5269.  
Dvorák 3282. 5969. 6191.  
6199.  
Dyer, E. 1441. 1465.

## E.

Eaton, F. B. 634.  
Ebbinghaus, H. 4963. 5499.  
5519. 5530. 5538. 6285.  
6479.  
Eberhard, J. P. 3881. 6331.

Ebert, H. 5509. 5520.  
Eckhard 181.  
Edinger 182.  
Edridge-Green, F. W. 4849.  
4850. 4891. 4960. 5139.  
5140. 5147. 5205. 5379.  
Edwards, M. 74.  
Egger, V. 7192.  
Egorow, J. 1297.  
Ehrenberg 3628.  
Ehrnrooth, M. 2680.  
Ehrhardt, W. 1450. 3385.  
Ehrlich, P. 3579.  
Eichel 3330.  
Eichler, J. 4303. 4742.  
Eichmann 4279. 4284.  
Eijsselsteijn, G. van 1713.  
Einthoven, W. 7399. 7402.  
Eissen, W. 592.  
Eliasberg, S. 3214.  
Ellaby 7609.  
Elliot, J. 18. 3882. 7263. 7264.  
7682.  
Elsas, A. 5492.  
Ely 1833.  
Emerson, E. 7149.  
Emerson, J. B. 1308. 1429.  
1471. 3031. 3076.  
Emery, A. 4536.  
Emery, C. 3384. 6548. 6550.  
Emmert, E. 331. 1070. 1424.  
1590. 1605. 1786. 2320.  
2322. 3594. 3680. 4394.  
6237. 7036.  
Emsmann, H. 5892. 5916.  
7162. 7365. 7473. 7567.  
Encke 1109.  
Ender, F. G. 7455.  
Engel, J. 1367. 2222.  
Engelhard 1808.  
Engelhardt, G. 696. 2948.  
2955.  
Engelmann, Th. W. 3570.  
3983. 4128. 4129. 4130.  
4709. 6185. 6186. 7028.  
7029.  
Engelmann u. van Genderen-  
Stort 3580.  
Eperon 3013. 5196.  
Erdmann, O. E., 5465. 6254.  
Eriksen 650.  
Erlach, v. 6511.  
Erpenbeck, H. 7753.  
Espinas 4110.  
Esser 2811.  
l'Estrade, L. de 4445.  
Euclides 7203.  
Euler, L. 1099. 1100. 1101.  
2369. 2370. 2371. 3876.  
3878. 7128.

Eulenburg, A. u. Schmidt, H.  
691.  
Evans, C. W. 815.  
Everbusch, O. 727.  
Everett 4537.  
Ewald 7400.  
Ewald, A. 8477. 6545; siehe  
auch Kühne.  
Ewald, A. und Kühne, W.  
3478.  
Ewart, J. C. 894. 897. 1055.  
Ewart, J. C. und Thin, G.  
902.  
Ewens, G. F. W. 297.  
Ewerbeck, A. A. 6505.  
Ewetsky, Th. v. 337.  
Exley 3941.  
Exner, K. 5959.  
Exner, S. 123. 183. 202. 218.  
333. 340. 380. 394. 411.  
1133. 2323. 2712. 3854.  
3856. 3444. 3448. 3457.  
3479. 3504. 3531. 3567.  
3588. 3603. 3786. 4426.  
5951. 5960. 5961. 6028.  
6200. 6209. 6225. 6229.  
6255. 6286. 6472. 6480.  
6537. 6564. 6734. 6918.  
7076. 7081. 7085. 7744.  
Exner, S. und Paneth, J.  
203. 219.

## F.

Faber, siehe Burckhardt, H.  
Fabri, H. 5732. 5822. 6980.  
Fage 3124.  
Falchi, F. 970.  
Falck 5283.  
Fano 1540. 4743. 6719. 6789.  
Faraday, M. 5868.  
Faravelli, E. 5141. 6070.  
Farbenkreis etc. 4467.  
Farbensinn des menschlichen  
Auges etc. 4071.  
Farges, A. 6634. 7826.  
Fasola, G. 243.  
Fatigue of sight 6282.  
Favaro, A. 2111.  
Favre, 4414. 4427. 4428.  
4457. 4458. 4484. 4485.  
4538. 4582. 4583. 4796.  
4833. 4848. 5306. 5307.  
5310. 5311. 5314; siehe  
auch Dor.  
Fay, du 4185.  
Faye 5788. 5797. 7250.  
Fearn 6991.



- Fechner, G. Th. 2442. 3378.  
 5392. 5394. 5396. 5421.  
 5455. 5500. 5521. 5531.  
 5765. 5879. 6137. 6132.  
 6135. 6382. 6385. 6407.  
 6408. 6418. 6430. 6896.  
 7718. 7790. 7765.  
 Feilchenfeld, W. 1836.  
 Fenner, C. S. 1587.  
 Fére 728.  
 Fére und Londe, A. 6264.  
 Fére, Ch. 184. 3318. 7082.  
 Féreol 6762. 7576.  
 Feret, R. 4797. 4798. 5202.  
 Ferge, C. L. 504.  
 Ferguson, R. M. 1911.  
 Feris 5312.  
 Ferrer, H. 602.  
 Ferri 1442. 1451. 3032. 3148.  
 6830. 6839. 7091. 7659.  
 Ferrier, 185. 259. 750. 6840;  
 siehe auch Goltz, F.  
 Ferrier und Yeo 164.  
 Ferry, E. S. 6298.  
 Ferry, L. 659.  
 Festing, E. R., siehe Abney,  
 W. de W.  
 Fialla, L. 6930.  
 Fick 1944.  
 Fick, A. 45. 49. 77. 1252.  
 1253. 2388. 2434. 2449.  
 2765. 3350. 4404. 4584.  
 4972. 4996. 5788. 5933.  
 6660. 6664. 6881. 7773.  
 Fick, A. und du Bois-Rey-  
 mond, P. 3418. 6885.  
 Fick, A. E. 1699. 1701. 1702.  
 1714. 1916. 1921. 8230.  
 3268. 3328. 3604. 3608.  
 3610. 4486. 4799. 4992.  
 5510. 6287. 6299. 6300.  
 7634. 7635.  
 Fick, A. E. und Gürber, A.  
 6280. 6288.  
 Fick, L. 7010.  
 Fick, L. u. A. 2237.  
 Fiedler, A. S. 89.  
 Field 4014.  
 Fields, A. M. 4171. 4172.  
 Fieuzal 8595.  
 Filehne, W. 3361. 6026.  
 7201.  
 Filia 186.  
 Fink, H. T. 4081.  
 Finkelstein, L. P. 3390.  
 Finsterwalder, S. 1141. 2687.  
 Fischer 2413. 6141; siehe  
 auch Hamberger, G. A.  
 Fischer, E. G. 5854.  
 Fischer, E. L. 6631. 7820.  
 Fischer, F. 6951.  
 Fischer, K. 1719.  
 Fischer, R. 6960. 6961.  
 Fitzgerald, C. E. 1796. 1801.  
 Flaugergues 6339.  
 Fleet, F. van 1325. 2666.  
 Fleischer, S. 1373.  
 Fleischer, J. 5847.  
 Fleischl, E. v. 517. 945. 946.  
 955. 2782. 2788. 3725.  
 3736. 3737. 3748. 4620.  
 4668. 6618. 6619. 6939.  
 7063. 7593.  
 Fliedner 2435. 2444. 5772.  
 5775.  
 Flinker, A. 4131. 4165.  
 Flournoy, Th. 3323.  
 Fochabers, S. v. 6370.  
 Föringer 2971.  
 Förster 260. 1388. 1392.  
 1893. 1430. 1967. 1980.  
 1997. 2119. 2461. 5390.  
 siehe auch Aubert, H.  
 Förster, E. 2263.  
 Förster, R. 1412.  
 Follin, E. 2823. 2860. 2871;  
 siehe auch Janssen.  
 Follin und Nachet 2831.  
 Fonseca, L. da 2540. 3077.  
 Fontan 5192.  
 Fontenay, O. E. de 4619.  
 5332. 5345. 5352.  
 Forbes 2208. 3165.  
 Forbes, J. D. 1180. 2384.  
 4210. 4224.  
 Forbes, L. 1275.  
 Forel, A. 371. 372. 4161.  
 Formad, H. F. 709.  
 Foucault, L. 4214.  
 Foucault und Regnault 7697.  
 Foucher 5365.  
 Fouchy, G. de 5737.  
 Fournet 6400. 6402.  
 Fox 3033; siehe auch Webster.  
 Fox, L. W. 4132.  
 Fraenkel 530. 2541. 2605.  
 5130.  
 Fränkl, J. 2288.  
 Franceschi 5237.  
 Franciel, P. 701.  
 Franck, F. 719.  
 Franke, V. 6976.  
 Franklin, B. 5836. 6094.  
 Franklin, C. L. 4912. 4962.  
 4964. 7621.  
 Franklin, W. S., siehe Blake,  
 L. J.  
 Fraunhofer, J. 2377. 5566.  
 Franz 6877.  
 Franz, R. 3966.  
 Fravel, E. H. 1616. 1631.  
 Freund, C. S. 232. 244.  
 Frey, M. v., siehe v. Kries, J.  
 Fridenberg, P. H. 1040. 2801.  
 Friedenwald, A. B. 7663.  
 Friedenwald, H. 7431.  
 Fries, J. F. 2197.  
 Frimmel, Th. v. 2116.  
 Frisch, A. v. 245.  
 Fritsch, G. 7355.  
 Frobelius 2825.  
 Fronmüller 4339.  
 Frost 2126. 6804.  
 Fubini, S. 1020.  
 Fuchs 1628.  
 Fuchs, E. 2783. 3490. 5298.  
 Fuchs, F. 2979. 2980. 3002.  
 Fuchs, S. 418. 3614.  
 Furchtbauer, G. 1138.  
 Fukala, V. 2034. 2052. 2053.  
 2054. 2070.  
 Fulda 1968.  
 Funke, O. 3436. 3647. 6909.  
 Furney, E. E. 2336.

## G.

- Gad, J. 135. 3452. 3615.  
 Gaglio, E. 3611.  
 Gaine, A., siehe Dobro-  
 wolsky, W.  
 Galenus 7498.  
 Galezowski 1443. 1452. 2035.  
 2287. 2483. 2484. 2625.  
 2626. 2644. 2868. 2981.  
 3084. 3125. 3126. 3713.  
 3738. 3807. 4360. 4363.  
 4372. 4382. 4622. 4901.  
 5040. 5041. 5082. 5279.  
 7664.  
 Galilei 5708. 5709. 5710.  
 5711. 5713. 5716. 5720.  
 Gall, J. F. und Spurzheim,  
 G. 4247.  
 Gallenga 2351.  
 Gallopain, C. 110. 6779.  
 Gamalobo 4664.  
 Gang der Lichtstrahlen im  
 Auge 2451.  
 Garbini 4178.  
 Gard, J. 1594.  
 Gardner, J. S. 3759.  
 Gariel, C. M. 1901. 2892.  
 5982.  
 Garnier, E. v. 788. 1065.  
 Gassendi 5719. 5722. 5724.  
 5725. 5726. 5729. 5819.  
 7110. 7442.

- Gatschet 4882.  
 Gauser, S. 936.  
 Gauss 1108.  
 Gautier 3274. 3877. 3879.  
 Gavarret 531. 2542.  
 Gayet, A. 3990. 4711.  
 Gazepý 1444. 1787. 2577.  
 Geigel, R. 6570.  
 Geiger, L. 4036. 4037. 4039.  
 4040.  
 Geissler, A. 4623. 4665. 5073.  
 5280.  
 Gellzuha, E. 2084.  
 Gempak, J. 3669.  
 Gemündt, L. 7489.  
 Genderen-Stort, A. C. H.  
 van 3571. 3572. 3589. 3590.  
 3596. 3597; siehe auch  
 Engelmann.  
 Gentilly, G. v. 4237.  
 Genzmer, A. 4188. 6620.  
 6727. 7556.  
 Geoffroy, J. 4083. 4134.  
 Gergens, E., siehe Goltz, F.  
 Gergonne 6118. 6369.  
 Gerlach, L. 2784.  
 Gerling 1169.  
 Gerloff, O. 2071. 3114. 3267.  
 Germann, Th. 1850.  
 Gerold, H. 56. 485. 1876.  
 Gerson, G. H. 2412.  
 Gerstenberg 60.  
*Gesichts- und Farben-*  
*erscheinungen* 3900. 6502.  
 Géza, P. 2627.  
 Gherard 6125.  
 Gherardi 5977.  
 Gilbert 1513.  
 Giles, T. E. 1492.  
 Giovanni 1694. 5243.  
 Girandeau 3300.  
 Giraud-Teulon F. 76. 1189.  
 1194. 1205. 1570. 1579.  
 1612. 1664. 1885. 2337.  
 2463. 2763. 2861. 2872.  
 2878. 2883. 2884. 2893.  
 3048. 3437. 3505. 3506.  
 3645. 3702. 4625. 4666.  
 4667. 4712. 4713. 5993.  
 6677. 6701. 6742. 6786.  
 7046. 7294. 7305. 7866.  
 7476. 7493. 7494; siehe  
 auch Laurence, G. Z.  
 Girls, M. 1870.  
 Giudicci, V. 1773. 1788.  
 Gladstone 4034. 4043. 4057.  
 4333.  
 Glan, P. 4800. 4913. 5057.  
 5058.  
 Gleichen, v. 6336.  
 Glossner, M. 7831.  
 Gmelin, P. E. 7122.  
 Godard, de 5838. 6098. 6099.  
 6100.  
 Goedicke 1744. 7534.  
 Goeller, A. 4954.  
 Goepfert, E. 419.  
 Goethe, J. W. v. 3885. 3886.  
 3889. 3902. 3922. 3929.  
 3930. 3932. 4240. 4244.  
 6112. 6113. 6348. 6335.  
 Goldscheider, A. 87.  
 Goldschmidt, H. 7252.  
 Goldzieher, W. 6952.  
 Goltz, F. 111. 165. 166. 233.  
 Goltz, F. und Ferrier, D.  
 124.  
 Goltz, F. und Gergens, E.  
 104.  
 Gonzenbach, M., v. 277.  
 Goodchild 5927. 6412.  
 Goodsir 2247.  
 Gordon, N. 3184.  
 Gorham, J. P. 816. 7749.  
 Gorini 5971. 5978.  
 Gottschau 1038.  
 Goubert, E. 4354.  
 Gould, G. W., siehe Fox;  
 siehe Webster.  
 Gouy 5588.  
 Gouye, Th. 7115.  
 Govi 2109. 2110. 4539. 4714.  
 4816. 7176. 7394.  
 Gowers, W. R. 2956. 2982.  
 3101.  
 Goyder, D. 6560.  
 Graber, V. 4144. 4153. 4158.  
 Gradenigo 3581. 3591. 4947.  
 4953.  
 Gradle 2528.  
 Graefe 2167.  
 Graefe, A. 1647. 2983. 3008.  
 6743. 6763. 6815. 6850.  
 7025. 7487. 7528. 7568.  
 7613. 7626. 7636. 7637.  
 7654.  
 Graefe, A. v. 50. 78. 1386.  
 1655. 1726. 2260. 3963.  
 7011. 7467. 7471.  
 Grävell 3915. 3917. 3918.  
 Grafé, A. 6970.  
 Graham, 4710. 6452.  
 Grailich, J. 4219.  
 Grant 6866.  
 Grandclément 98. 3197.  
 3208.  
 Grandmont, G. de 1453. 1454.  
 1472. 4624. 4668. 5059.  
 Grasselli, G. 1445.  
 Grassmann, H. 4215. 4459.  
 Graux, siehe Laborde.  
 Gray, P. L. 5560.  
 Gray, Th. 4772.  
 Greeff, R. 635. 995. 1093.  
 1711. 7428. 7655; siehe  
 auch Ramón y Cajal, S.  
 Green, 996. 2491. 2496. 2503.  
 2504. 3656. 4870. 7414.  
 7415.  
 Gregory, J. 7111.  
 Gren, F. A. C. 3887.  
 Grenacher, H. 356. 373.  
 Grether, E. 1580.  
 Griffin 3408.  
 Griffith, A. H. 1455.  
 Griffith, M. 2735. 6504.  
 Grijns, G. 3388.  
 Grimal, E. 2615.  
 Grimm, J. T. C. 11.  
 Grimm, v. 2151.  
 Gritti, M. R. 2869.  
 Groenouw, A. 278. 1478.  
 1495. 3092. 3327. 3831.  
 3839.  
 Gros 1007.  
 Grosch, P. 279.  
 Gross, siehe Smith, P.  
 Grossmann 2798. 4585.  
 Grossmann, K. 2957. 4834.  
 5123. 5131. 5132. 5142.  
 5150.  
 Grossmann, L. 6308.  
 Grossmann, M. 5042.  
 Grossmann, Th. 7410.  
 Grossmann u. Mayerhausen  
 1413. 1414.  
 Grothuss 6356.  
 Grove, G. W. 660.  
 Grove, W. R. 6154.  
 Gruber, E. 5670.  
 Grüel 6147.  
 Grünhagen, A. 685. 686.  
 689. 697. 700. 738. 790.  
 Grünhagen, A. u. Cohn, R.  
 743.  
 Grützner, siehe Haidenhain,  
 R.  
 Grützner, P. 3310.  
 Gruithuisen 2208.  
 Grut, E. H. 7674.  
 Gsell, E., siehe Brachet.  
 Guaita 3078. 4321. 4902.  
 Gudden 187. 204. 895. 937.  
 2744.  
 Guebhard 5301.  
 Günther 188. 4058. 4111.  
 4112.  
 Günther, C. 3362. 3363.  
 Günther, R. 4586.  
 Guépin 5236.

Guérard 2422.  
 Gürber, A., siehe Fick, A. E.  
 Guericke, O. v. 6324.  
 Guérin, J. 2297.  
 Guérout, G. 7788.  
 Guillemin 4295. 4415.  
 Guillery 3817. 3818. 3820.  
 3832. 3840.  
 Guilloz, Th. 2360. 2657. 8127.  
 3139. 3269.  
 Guje, A. A. G. 6917.  
 Gullstrand, A. 2616. 2628.  
 2629. 2630. 2631.  
 Gumo, M. 770.  
 Gunn 3035. 3598.  
 Guppy, H. 3760.  
 Gut, J. 2450.  
 Gysi, E. 716.

## H.

Haab, O. 280. 761. 3532.  
 3533. 6242. 6546.  
 Haafien, van 2529.  
 Haan, J. V. de 3644.  
 Haas, de 1723. 3562.  
 Haackel, E. 4059. 4084.  
 Hällstén 502. 1129. 1688.  
 Haenel 3079. 7047.  
 Haensch, siehe Schmidt, F.  
 Hänsell, P. 1059. 1064.  
 Haessler, J. F. 15.  
 Häuselmann 4313.  
 Haidenhain, R. 4587.  
 Haidenhain, R. und Grützner  
 4588.  
 Haidinger, W. 5768. 6506.  
 6507. 6508. 6509. 6512.  
 6518. 6519. 6521. 6522.  
 6523.  
 Haldat, de 2201. 2209. 7137.  
 7698.  
 Hall 4540.  
 Hall, G. Stanley 4487; siehe  
 auch Bowditch.  
 Haller, A. 14. 17. 2145. 3402.  
 Halske, J. G. 7262.  
 Haltenhoff, G. 2949. 3507.  
 Hamberger 5740. 5829.  
 Hamberger, G. A. u. Fischer  
 3869.  
 Hamburger, D. J. 3599.  
 3600.  
 Hamilton 2428.  
 Hamilton, J. 167. 168.  
 Handl 4166. 5074.  
 Hankel 7520.  
 Hannay, J. B. 4669. 6243.

Hannover, A. 1002. 1043.  
 1050. 2228. 3412.  
 Hansen, W. 1842. 1847.  
 Hantzsck, R. 3919.  
 Happe, L. 1234. 1241. 1680.  
 1681. 2259. 4299. 4937.  
 Harochek, A. 1139.  
 Hardie, W. 7232. 7272.  
 Hardmann 4092.  
 Hardy, E. W. H. 2441.  
 Harkness, W. 2555.  
 Harlan 2354. 3105.  
 Harless, E. 4208. 7696.  
 Harting 1003.  
 Hartley 4012.  
 Hartmann, L. 4113.  
 Hartridge, G. 1288. 1298.  
 1814. 1819. 1850. 3150.  
 Hartshorne, W. 6215.  
 Harvey, G. 4253.  
 Hasbrouck, D., 3166. 3215.  
 Hasenpat, A. 2240.  
 Hasket, D. 2473.  
 Hasner, J., Ritter von Artha  
 61. 532. 1235. 1242. 1243.  
 1244. 1245. 1254. 1528.  
 1676. 1677. 1678. 1682.  
 1683. 1684. 1897. 1902.  
 2489. 2543. 2845. 2846.  
 2950. 4626. 6720. 6728.  
 6729. 7380. 7484. 7557.  
 7558. 7786. 7789.  
 Hasse, C. 867. 871.  
 Hassenfratz 2411. 5745. 6349.  
 6354.  
 Hassenstein 2812.  
 Hauck, G. 7175. 7179.  
 Hauvel 2085.  
 Havrez 4395.  
 Hawksbee 1357.  
 Hay, D. R. 4201.  
 Hay, G. 2514. 2523. 2556.  
 Haycraft, J. B. 4914.  
 Hayden, T. 7495.  
 Haynes 3185.  
 Head, J. F. 4589. 5043.  
 Heaton, M. 4773. 6473.  
 Heberling, F. W. 1929.  
 Heddaeus 717. 762. 780. 781.  
 782. 805. 3239.  
 Hegelmayer 6900.  
 Hegg, E. 4999. 5001. 5005.  
 Heiberg, H. 1052. 2266. 2280.  
 Heineken 2427.  
 Heinrich, G. 2632.  
 Heitzmann 1035. 1062.  
 Helfft 4274.  
 Helfreich 2939. 3481.  
 Helling 4248.  
 Helm, G. T. 1632.

Helmholtz, H. v. 51. 53. 54. 71.  
 470. 672. 1183. 2230. 2236.  
 2242. 2819. 2821. 3140.  
 3147. 3413. 3914. 3931.  
 3948. 3957. 4019. 4212.  
 4218. 4326. 4627. 4892.  
 4893. 5075. 5522. 5532.  
 5539. 5540. 5541. 5571.  
 5582. 6164. 6165. 6406.  
 6610. 6612. 6637. 6672.  
 6673. 6676. 6681. 6682.  
 7012. 7027. 7265. 7317.  
 7335. 7375. 7380. 7502.  
 7512. 7521. 7522. 7523.  
 7524. 7710. 7759.  
 Helsham 456. 2408.  
 Helwag 3911.  
 Hément, F. 1802.  
 Henke, W. 682. 2258.  
 Henle, J. 840. 868. 1018.  
 1024. 1522. 2224.  
 Hennes, C. F. 7347.  
 Henning, L. v. 3904.  
 Henry, Ch. 4031. 4351. 4852.  
 4871. 5551.  
 Henry, J. 4488.  
 Henschen, S. E. 298. 306.  
 Hensen, V. 876. 3508. 3650.  
 3654. 4361. 5398.; siehe  
 auch Völkers, C.  
 Hensen, V. u. Völkers, C.  
 2269. 2272. 2290. 2307.  
 Herbart, J. F. 6586. 6587.  
 Herholt, siehe Ackermann.  
 Hering, E. 1076. 4296. 4297.  
 4302. 4418. 4590. 4670.  
 4774. 4775. 4801. 4817.  
 4818. 4819. 4835. 4853.  
 4872. 4873. 4894. 4915.  
 4925. 4994. 4997. 4998.  
 5124. 5143. 5210. 5218.  
 5409. 5418. 5501. 5556.  
 6201. 6205. 6276. 6277.  
 6278. 6293. 6301. 6309.  
 6439. 6440. 6443. 6478.  
 6481. 6482. 6483. 6484.  
 6486. 6487. 6491. 6492.  
 6596. 6599. 6674. 6678.  
 6687. 6691. 6780. 6781.  
 6902. 7020. 7086. 7309.  
 7318. 7505. 7513. 7516.  
 7517. 7518. 7527. 7532.  
 7535. 7536. 7583. 7732.  
 7798.  
 Hermann, G. 5188.  
 Hermann, L. 1203. 1215.  
 1246. 1255. 1276. 6432.  
 6730. 7507.  
 Herou, J., siehe Brown, H. F.  
 Herrick, F. H. 395.

- Herrnheiser 1642.  
 Herschel, F. W. 5743.  
 Herschel, W. J. 6458.  
 Herschel, J. F. W. 4255.  
 4258. 4267. 4327. 5753.  
 Herz, M. 6831.  
 Herzenstein, W. 8723.  
 Herzog, B. 5118.  
 Hess, C. 381. 396. 827. 1707.  
 1716. 3247. 3248. 4874.  
 4995. 5206. 6289. 6294.  
 6310. 6319. 6320. 7656.  
 Hess, C. u. Neumann, F. 1715.  
 Hess, C. u. Pretori, H. 6501.  
 Hessemer, J. M. 7254.  
 Hetsch, G. F. 7370.  
 Heuse 1206. 2775. 3014.  
 3534. 5438. 6020. 6981.  
 7087. 7187. 7395.  
 Hevelius 5727.  
 Heyes, J. F. 5133.  
 Heyl, A. G. 1304.  
 Heymann 1395. 2511. 2875.  
 Hickson, S. J. 345. 359. 360;  
 siehe auch Lowne, B. T.  
 Higgins, Ch. 1595.  
 Highet 636.  
 Hilbert, R. 354. 789. 825.  
 1431. 1432. 1550. 1555.  
 3296. 3739. 4672. 4673.  
 4715. 4744. 4745. 4776.  
 4777. 4778. 4802. 4803.  
 4804. 4805. 4926. 5091.  
 5052. 5263. 5264. 5270.  
 5271. 5281. 5282. 5283.  
 5295. 5299. 5302. 5303.  
 5466. 5498. 6474. 6475.  
 6496.  
 Hildebrand, M. 1766.  
 Hilger, C. 355.  
 Hilker, W. 7193.  
 Hill, E. 3761.  
 Hillebrand, F. 4853. 5656.  
 7202. 7667.  
 Himly 2163. 6109.  
 Hintzi, C. 2617.  
 Hjort 2302. 3379. 3509. 4193.  
 4489. 5757. 6365.  
 Hippel, A. v. 2557. 5175. 5178.  
 5182. 5219. 5577. 6919.  
 Hipplesley, J. 2440.  
 Hippisley, J. 3762.  
 Hire, de la 1504. 1505. 1506.  
 2137. 2406. 2725. 2806.  
 3394. 3396. 3397. 3871.  
 5735. 6083. 7114.  
 Hirrlinger, J. 5020.  
 Hirschberg, J. 281. 412. 507.  
 533. 1121. 1122. 1124. 1216.  
 1217. 1224. 1225. 1277.  
 1278. 1320. 1377. 1378.  
 1379. 1406. 1481. 1569.  
 1754. 2036. 2544. 2940.  
 2951. 2958. 2959. 2984.  
 2985. 3080. 3685. 3694.  
 3841. 5020. 5021. 5032.  
 5033. 5171. 5272. 5273.  
 5300. 5477. 6920. 7371.  
 7572. 7614. 7675.  
 Hirschberger, K. 7643.  
 Hirschfeld 3049.  
 Hirschler, J. 5260.  
 Hirth, G. 100. 6635. 7827.  
*Histoire de l'Acad. etc.* 2730.  
 Hitzig, E. 205. 6708. 6709.  
 6731. 7040.  
 Hobbes 7107.  
 Hoche, A. 3389.  
 Hochecker 4405.  
 Hochegger 4154.  
 Hook, 1119. 2308. 6686.  
 Hocquard u. Masson, A. 2327.  
 Hodges, F. 3015.  
 Hodgkinson, A. 3093. 4854.  
 4855.  
 Högges 189. 7601.  
 Hölke, F. A. 1821.  
 Höltzke 539. 564.  
 Hoffbauer, J. C. 6870.  
 Hoffert, H. H. 5093.  
 Hoffmann 6271. 7163.  
 Hoffmann, A. 2330.  
 Hoffmann, L. 3271.  
 Hofhammer, H. 2130.  
 Hofmann 5962.  
 Hogg, J. 2912. 4159. 5207.  
 5366.  
 Hoh 4671.  
 Holden, W. A. 1803. 5561.  
 Holke 1520. 3627.  
 Holland, J. W. 5853.  
 Holmes, E. L. 6753.  
 Holmgren, F. 330. 492. 497.  
 687. 706. 1074. 1077.  
 3454. 3456. 3510. 3511.  
 3535.\* 3546. 4114. 4160.  
 4300. 4383. 4416. 4417.  
 4490. 4491. 4541. 4591.  
 4592. 4628. 4629. 4630.  
 4631. 4746. 4747. 4807.  
 5008. 5022. 5034. 5035.  
 5060. 5083. 5165. 5183.  
 5323. 5324. 5325. 5326.  
 5333.  
 Holowinski, A. 2675.  
 Holtz, W. 6932. 6974.  
 Holtzmann 4216.  
 d'Hombres-Firmas 4271.  
 4275.  
 Home 2158. 2159. 2165. 6868.  
 Hooke, R. 3619. 3856.  
 Hoor, 1640. 3081. 5372.  
 Hoppe 3935.  
 Hoppe, J. 88. 7048. 7053.  
 7096. 7183. 7188. 7356.  
 7361. 7362.  
 Hoppe, L. J. 6953.  
 Hoquart 2352.  
 Hori, M. 2094.  
 Horn, A. 1153.  
 Hornemann, M. 6832.  
 Horner 2113. 3482. 5876.  
 Horrox 5731.  
 Horstmann 833. 834. 1832.  
 1834. 1848. 1903. 1947.  
 1981. 4593. 4674.  
 Hosch 1425. 5334.  
 Hotz, C. 6842.  
 Hotz, F. C. 2633. 2634. 2667.  
 Houdin, 809. 2766. 6533.  
 Howe, L. 1294. 1299. 2668.  
 3082. 3141. 3262. 3270.  
 Hubert u. Prouff, J. M. 549.  
 3175.  
 Huddart 4234.  
 Hueck, A. 28. 1162. 2182.  
 2199. 3629. 3908. 6642.  
 7133.  
 Hüfner, G. 5241.  
 Hugel, Th. 7372.  
 Hulke, J. W. 872.  
 Humboldt, A. v. 3331.  
 Hume 6583.  
 Humphrey, H. 3186.  
 Hunt 4320.  
 Hunt, D. 1969. 2313.  
 Hunt, E. B. 7013.  
 Hunter, J. 2157.  
 Hunter, D. W. 651.  
 Hurwitz 710.  
 Huygens 1149. 5780.  
 Hyslop, J. H. 7638. 7810.  
 7821. 7832.

## I.

- Ilen, A. 3676. 5414.  
 Imbert, 1633. 1634. 1692.  
 1909. 2559. 3795.  
 Ingleby 4092.  
 Inouye 3142. 6279.  
 Isaachsen, D. 4836.  
 Isaacsohn 893.  
 Isignonis, M. A. 82.  
 Issekutz, L. 566.  
 Itelson, G. 5533.  
 Iwanoff, A. u. Rollett, A.  
 698.  
 Iwanow 772.  
 Izarn, siehe Colardeau.

## J.

Jablot 7117.  
 Jackmann 1859.  
 Jackson 821. 822. 2606.  
 2635. 2658. 2659. 2669.  
 2683. 3036. 3050. 3051.  
 3064. 3179. 3187. 3188.  
 3224. 3249. 3254. 3819.  
 7056. 7057. 7644. 7665.  
 7666.  
 Jacob, A. H. 1021.  
 Jacobi, siehe Magnus, H.  
 Jacobsen, O., siehe Zehender.  
 Jacobson 4748. 7172. 7787.  
 Jaeger 4460. 4632.  
 Jäger, v. 476. 1188. 1667.  
 2847. 2848. 2850. 2894.  
 2934. 3103. 3152. 3688.  
 3655. 3695. 3726. 3791.  
 Jascha, E. 6613. 6800. 7577.  
 7584.  
 Jago, J. 2752. 2757. 7037.  
 7559.  
 James, W. 7815.  
 Jamin 6515.  
 Jan, F. A. u. Küffner, W. 5.  
 Janin 7680. 7681.  
 Jankowski, B. 2086.  
 Janssen, J. 3962.  
 Janssen u. Follin 2865.  
 Jastrow, J. 6624. 6971; siehe  
 auch Peirce, C. S.  
 Jastrowitz, M. 234.  
 Javal, E. 95. 518. 524. 534.  
 535. 540. 541. 542. 543.  
 550. 551. 565. 584. 593.  
 594. 595. 625. 1599. 1878.  
 1882. 1948. 2008. 2324.  
 2328. 2485. 2486. 2487.  
 2488. 2492. 2493. 2497.  
 2498. 2505. 2516. 2517.  
 2518. 2526. 2530. 2532.  
 2535. 2545. 2546. 2558.  
 2570. 2598. 2599. 2645.  
 2646. 2679. 2901. 3714.  
 3833. 4042. 4492. 5682.  
 5686. 7325. 7411. 7422.  
 7515. 7547. 7594. 7602.  
 7619. 7627. 7639. 7657.  
 7733.  
 Javal E. u. Martin 2600.  
 Javal, E. und Schiötz 525.  
 Jays, M. L. 7645.  
 Jeaffreson 1738. 4396. 5009.  
 Jeaffreson, C. S. 5110.  
 Jeffries 3666. 4493. 4494. 4495.  
 4542. 4633. 4634. 4675.  
 4716. 5045. 5321. 5322.  
 5335. 5346. 5952.

Jegorow, J. 751. 763. 771.  
 Jessop, 752. 820. 2350. 3065.  
 Johannides, D. P. 2778.  
 Johansson, J. E. 4749.  
 Johnson, G. L. 2803. 2986.  
 6575.  
 Joly, J. 5639.  
 Joly, J. L. S. 72.  
 Jones 1515. 2459. 7295.  
 Joqs 1483.  
 Jordan, W. 4041.  
 Jorissenne, G. 720. 783.  
 Joslin 5759.  
 Joubin, L. 429.  
 Joug, W. de 2021.  
 Jouslain 307.  
 Juda 1906.  
 Juler 2987. 2988. 3052. 3053.  
 3054. 3167.  
 Jurin 8. 455. 1508. 2407. 3621.  
 5796. 5831. 6087. 6325.  
 Just, O. 1945. 5336.

## K.

Kaestner 6995.  
 Kaiser, H. 59. 1575. 1670.  
 2273. 2482. 3286. 3292.  
 7538. 7539.  
 Kalischer, S. 8927. 4060.  
 4085. 4086. 4543. 4594.  
 Kallius, E. 997.  
 Kalt 3104. 7640; siehe auch  
 Duval, M.  
 Kandinsky, V. 7070.  
 Kant, J. 6584.  
 Karsten, W. J. G. 5565.  
 Karvezki, A. 5703.  
 Kaschanowski, P. 190. 753.  
 Katsch, H. 1778.  
 Katz, R. 1560. 3250. 3255.  
 5552. 5553. 5554. 6498.  
 6851.  
 Kaufmann, J. 1722.  
 Kazurow 1433. 2329.  
 Keersmaecker, A. de 4161.  
 4635. 5061.  
 Keller 4135. 5575.  
 Kelsch, A. 2587.  
 Kennel, J. v. 397.  
 Kepler 2. 1146. 1147. 1502.  
 2133. 5707. 5817. 6977.  
 7108. 7440.  
 Kerry, B. 7804. 7806. 7808.  
 7813. 7816. 7822.  
 Kessler, G. 3956.  
 Kessler, H. J. 2095.

Keasler, L. 334.  
 Keateven 5254.  
 Ketteler, E. 5007.  
 Keyser 1071. 2055. 4544.  
 5837.  
 Kibbe, A. B. 4676.  
 Kilburn 7234.  
 Kiesel, A. 434.  
 Kiesling, H. 1211.  
 Kiessling, J. 1321.  
 Kircher 13.  
 Kircher, A. 3853. 6060.  
 Kirchhoff, A. 4087. 4115.  
 4123. 4145. 4155.  
 Kirilzew, S. 282.  
 Kirschmann, A. 5002. 5215.  
 5653. 5657. 6493. 6494.  
 6497. 7097.  
 Kitao, D. 4496. 5102.  
 Klein 2935. 5678.  
 Kleiner 5425. 5431. 5972.  
 5979. 5996. 6216. 7049.  
 7748.  
 Klinckowström, A. 430. 435.  
 Klingenberg, A. 1309. 1343.  
 Klotz, M. 3691. 3901.  
 Klügel 2160.  
 Klag 3547. 3980. 4978.  
 Knapp, H. 79. 474. 1186.  
 1200. 1914. 2257. 2457.  
 2462. 2478. 7312.  
 Knauth, Ph. H. 2472.  
 Knie 6882.  
 Knies, M. 261. 1025. 1998.  
 4820. 4821. 4837. 4838.  
 4856. 6824.  
 Knight, G. 7238.  
 Knoblauch 5226.  
 Knochenhauer 1170. 6139.  
 7002.  
 Knöpfier 1336. 3105.  
 Knoll, 206. 220. 6805.  
 Knox, H. W. 7098.  
 Köhler, A. 5494.  
 Kölliker, A. v. 449. 842. 847.  
 956. 1009. 1049. 3415.  
 Kölliker, A. und Müller, H.  
 843. 844.  
 König, A. 544. 3616. 3763.  
 3926. 4162. 4717. 4718.  
 4750. 4751. 4752. 4779.  
 4780. 4781. 4822. 4823.  
 4927. 5076. 5084. 5094.  
 5220. 5289. 5647. 5662.  
 5693. 5701. 6556. 7077.  
 König, A. und Brodhun, E.  
 5511. 5523.  
 König, A. und Dieterici, C.  
 3991. 4806. 4903.  
 König, A. u. Zumft, J. 3453.

- König, O. 1482.  
 Königsberg 1886.  
 Königshöfer, O. 3681.  
 Königstein, L. 1623. 1648.  
 1836. 2941. 3094. 3231.  
 3483. 3484.  
 Köpcke, A. 7817.  
 Koganäi 957.  
 Kohl, C. 398. 420. 421. 431.  
 Kohlrausch 466. 467.  
 Kohlrausch, F. 7342.  
 Kohlrausch, R. H. 2193.  
 Kokemüller, D. 1547. 2795.  
 Kolbe, B. 4636. 4753. 4754.  
 4756. 4782. 5062. 5063.  
 5064. 5085. 5189. 5357.  
 5694.  
 Koller, C. 1322. 1466. 2636.  
 2637. 3864.  
 Konrad, E. u. Wagner, J. 1456.  
 Korn, M. 1387.  
 Kosack, 6592.  
 Koschel 1080.  
 Kostareff 6721.  
 Kotchorowski, L. 3256.  
 Kotelmann, L. 1871. 4088.  
 4156. 4157.  
 Kovalewsky, N. 754.  
 Kraepelin, E. 5478. 7058.  
 Kramer 4677. 5617. 7357.  
 7784.  
 Krassnig, J. 7833.  
 Kratzenstein 5840. 6101.  
 Krause, A. 7795.  
 Krause, C. F. Th. 446. 464.  
 465. 6647.  
 Krause, E. 4061.  
 Krause, W. 399. 858. 865.  
 874. 875. 877. 908. 918.  
 923. 958. 967. 975. 980.  
 981. 998. 1370.  
 Krenchel, W. 2295. 4595.  
 4939. 7560.  
 Kreyssig, F. 4875. 5208.  
 Kries, J. v. 3617. 4314.  
 4497. 4824. 4825. 4839.  
 4965. 5456. 5632. 6222.  
 6274. 6962. 7578.  
 Kries, J. v. und Brauneck  
 4783. 5479.  
 Kries, J. v. und Frey, M.  
 4637.  
 Kries, J. v. und Küster 4545.  
 Krohn, W. O. 3924.  
 Kroll, W. 4678. 5358. 7406.  
 7412.  
 Kroman, C. 4876.  
 Kroner 4124.  
 Krotoschin, A. 2037. 2056.  
 2072.  
 Kroutil, J. 5814.  
 Krüchow 4974.  
 Krüss, H. 5610.  
 Krukenberg, F. W. 3522.  
 3523.  
 Krukhoft, A. 1078.  
 Kubli, Th. 5286.  
 Kuchler, H. 3632.  
 Kuffner, W., siehe Jan.  
 Kühne 4239.  
 Kühne, W. 335. 909. 3355.  
 3485. 3486. 3487. 3488.  
 3489. 3490. 3491. 3492.  
 3493. 3494. 3512. 3513.  
 3514. 3515. 3516. 3517.  
 3518. 3519. 3520. 3536.  
 3537. 3563. 3564. 3565;  
 siehe auch Ayres, W. C.  
 und Ewald, A.  
 Kühne, W. u. Ayres, W. C.  
 3521.  
 Kühne, W. und Ewald, A.  
 3495.  
 Kühne, W. und Sewall, H.  
 3548. 3549.  
 Kühne, W. und Steiner, J.  
 3550. 3555.  
 Kühnen 2038.  
 Küster, siehe Kries, J. v.  
 Küster, F. 4756. 6926.  
 Kugel 2468. 2469. 2481. 2638.  
 6702. 7646.  
 Kuhn 1063.  
 Kuhnt 924. 982. 6004. 6238.  
 Kunkel, A. J. 5973. 5983.  
 Kunn, C. 3151.  
 Kupfer, M. 6576.  
 Kurz, A. 1315. 1316. 5965.  
 6069.  
 Kussmaul, A. 673. 2816. 7763.  
  
 L.  
 L ... 6955.  
 Laborde 5943. 6179. 6764.  
 6772; siehe auch Duval.  
 Laborde, Duval und Graux  
 6765.  
 Ladame 6175.  
 Ladd, G. T. 1496.  
 Ladd-Franklin, C., siehe  
 Franklin, C. L.  
 Lagarde, siehe Crova, A.  
 Lagrange 1102. 1103. 1104.  
 1361. 1352. 1484. 1637.  
 Laiblin, A. E. 2756. 3345.  
 Laing 5939.  
 Lalande, de 5741. 5742.  
 Lamansky, S. 5401. 7031.  
 Lambert, J. H. 4011. 4187.  
 5664. 7127.  
 Lambert, W. E. 3240. 3257.  
 Lamey 6206. 6541.  
 Landerer, J. 5944. 5963.  
 7156. 7164.  
 Landesberg 545. 2560. 3359.  
 3360.  
 Landmann, O. 1561.  
 Landolt, E. 512. 515. 811.  
 883. 1078. 1212. 1374.  
 1397. 1600. 1898. 1900.  
 1920. 1940. 1941. 1946.  
 1952. 2304. 2921. 2936.  
 2952. 2965. 3442. 3443.  
 3556. 3686. 3687. 3696.  
 3800. 4429. 4942. 4973.  
 4975. 5023. 5176. 5184.  
 5211. 6754. 6790. 6791.  
 6801. 6809. 6833. 6838.  
 6843. 6844. 6853. 7381.  
 7382. 7562. 7605. 7615.  
 7616. 7620. 7623. 7628.  
 7641. 7647. 7668. 7669;  
 siehe auch Snellen, H.  
 Landolt, E. u. Charpentier, A.  
 4498. 4983.  
 Landolt u. Nuël 1213. 1218.  
 Landsberg 5578.  
 Landsberg, C. 1300. 1661.  
 Landsberg, P. 2073.  
 Lang 3037.  
 Lang, V. 1120.  
 Lang, W. u. Barret 1301.  
 Lange, O. 2365.  
 Langenbeck, M. 2219. 2281.  
 Langenhaun, C. G. P. 7761.  
 Langer 5418.  
 Langier 3216.  
 Langley, J. N. u. Anderson,  
 H. K. 791. 792.  
 Langley, S. P. 5512. 5524.  
 5611.  
 Langlois u. Angiers 5953.  
 Lankaster, E. R. 961.  
 Lankaster, E. R. u. Bourne,  
 A. G. 349.  
 Lannegrace 221. 235. 246.  
 Lapersonne, de 1485.  
 Laqueur 546. 552. 1551. 1552.  
 1581.  
 Larmor, J. 7624.  
 Laser, F. 2389.  
 Láska, W. 6959.  
 Lassalle 3038.  
 Lasswitz, K. 102.  
 Lathrop 7464.  
 Laurence 1577. 3965. 4336.  
 Laurence, G. Z. u. Giraud-  
 Teulon 2874.

- Laurent 2494. 4719.  
 Lauret u. Duchaussoy 3811.  
 Laurie, A. P. 4857.  
 Laurin, W. M. 6265.  
 Lautenbach, L. J. 652. 653.  
 Lavill, Th., siehe Bennet,  
 A. H.  
 Lawford, J. B. 6820.  
 Lawrentjew 3217.  
 Lawson, R. W. 3764.  
 Leahy, 553. 2571. 3176.  
 Leber, Th. 2779. 2780. 2918.  
 4368. 4373. 4406. 4461.  
 Le Blond 3874. 4184.  
 Le Cat 9. 2728. 3400. 6982.  
 Le Conte, J. 91. 2773. 6573.  
 6722. 6787. 7339. 7348.  
 7349. 7367. 7378. 7379.  
 7405. 7544. 7550. 7551.  
 7564. 7595. 7622.  
 Le Conte-Stevens, W. 6794.  
 7883. 7384. 7386. 7587.  
 7388. 7389. 7390. 7408.  
 7604.  
 Lederer, A. 4499. 4546. 5327.  
 Leduc 1624. 1689.  
 Lee, H. 764. 773. 784.  
 Lee, R. J. 332.  
 Leegard, Ch. 1467.  
 Leeser, J. 721. 722.  
 Lefèvre 5231.  
 Le François 5862. 5863.  
 Le Gentil 5744.  
 Le Golet, L. 6341.  
 Legrand 5798.  
 Lehmann, A. 4784. 5495.  
 5654.  
 Lehmann, E. W. 5665.  
 Lehmann, K., siehe Bleuler, E.  
 Lehot 24. 1159. 2176. 3626.  
 6117. 6367. 6368.  
 Leibnitz 6580.  
 Lemaire 2588.  
 Lember 4285. 4323.  
 Le Moine 2146.  
 Le Monnier 5739.  
 Lenhossék, M. v. 436.  
 Leonhard, G. 1774.  
 Leonhard, G. A. 2839.  
 Leonova, O., v. 299.  
 Lépinay, J. Macé de 5626.  
 Lépinay, J. Macé de u. Ni-  
 cati, W. 3749. 4547. 4638.  
 4986. 5443. 5597. 5598.  
 5612. 5618. 5619. 5633.  
 5690. 6244.  
 Leplat, siehe Nußl.  
 Leplat, L. 2639.  
 Le Roux 2289. 2390. 5802.  
 6256. 6272. 7032.  
 Le Roy 2149. 2154. 3367.  
 Leroy 575. 596. 597. 603.  
 604. 1493. 1544. 1617. 2533.  
 2536. 2547. 2607. 2618.  
 2691. 2692. 2715. 2716.  
 3083. 3106. 3107. 3177.  
 3198. 3209. 3727. 5754.  
 6946.  
 Leroy, A. und Dubois, R. 598.  
 Lessing, E. 3128.  
 Lestrade, L. de 5984. 5985.  
 Leuckart, siehe Bergmann.  
 Levi 1236. 2525.  
 Lewis, R. T. 7150.  
 Lewkowitsch 3004.  
 Leyden, E. 6603.  
 Leydig, F. 999. 3496.  
 Lichtenberg 6994.  
 Lichtenberger 4199.  
 Liczey 4419.  
 Liebmann, O. 6607. 7790.  
 7799.  
 Liebrecht 3821. 5382.  
 Liebreich, R. 2843. 2856.  
 2857. 2862. 2863. 2876.  
 2902. 3039. 4397. 4398.  
 4407.  
 Liegey 5164.  
 Liesegang, R. E. 4961.  
 Liévin, H. 1415.  
 Limbourg, P. 793.  
 Lincke 3339.  
 Lindemann, E. 5542.  
 Lindsay, B. 2799. 2800.  
 Lionardo da Vinci, siehe  
 Vinci, Lionardo da.  
 Lippincott, J. A. 7416. 7423.  
 7429. 7648.  
 Lipps, Th. 6963. 6972. 7092.  
 7094. 7803. 7805. 7828.  
 Lissajous 5918. 5919. 5922.  
 Lissauer, H. 247.  
 Listing, J. B. 1113. 1176.  
 1181. 2231. 2739. 3967.  
 3968. 7340. 7343.  
 Littauer, L. 794.  
 Lloyd 3913.  
 Lobé (Albinus), J. P. 2144.  
 Lobo, G. 1207.  
 Locke 6582. 6861. 7463.  
 Lodge, O. J. 5144.  
 Loeb, J. 169. 207. 6629.  
 7184. 7185.  
 Löcherer, G. 93.  
 Löw 4062.  
 Löwe, L. 910.  
 Loewy, Th. 6622.  
 Logan, J. 7120.  
 Loiseau 1757. 1761. 1767.  
 1771. 2619. 3168.  
 Lommel, E. 4895. 5649. 6005.  
 Londe, A., siehe Féré.  
 Loomis 5906.  
 Loring 519. 1671. 2903. 2909.  
 2937. 3040.  
 Lorz 4136.  
 Lotz, A. 3801.  
 Lotze, H. 6590. 6591. 7009.  
 7756.  
 Loudon, J. 4446.  
 Loury, B. de 4264. 5158.  
 Lovett, R. W. 4137.  
 Lovibond, J. W. 4916.  
 Lowne, B. Th. 5422. 5423.  
 5986.  
 Lowne, B. Th. und Hickson,  
 S. J. 362.  
 Lubimoff, N. 1185.  
 Lubbock, J. 4138. 4139.  
 4146.  
 Lucanus, C. 2720. 4858.  
 Lucas 5940.  
 Luchsinger, B. 718. 729.  
 Luchtman, G. J. 2183.  
 Luciani, L. 170.  
 Luciani, L. u. Tamburini, A.  
 107. 112.  
 Luciani und Seppilli 206.  
 Lüdicke, A. F. 5844. 5847.  
 5848. 5849. 5850.  
 Ludwig, C. 41.  
 Ludwig, G. 2927.  
 Lugeol 7255.  
 Lummer, O. u. Brodhun, E.  
 5658. 5659. 5666.  
 Lupton, S., siehe Tennant,  
 J. F.  
 Lussana, F. 3293. 3297.  
 Lustig, A., siehe Vintschgan,  
 M. v.  
 Lutze, P. 723.  
 Luvini 5987. 5988.  
 Lyder, B. 1840.  
 Lys, C. N. A. H. du 7687.

## M.

- M'Caakey, G. W. 276.  
 Mc. Cornell, J. C. 2714.  
 Macdonald, J. O. 2282.  
 Mac-Gillavry, M. 1659.  
 Mac-Gillavry, Th. H. 1658.  
 Mc. Gillivray, A. 5214.  
 Macgowan 4679.  
 Mach, E. 96. 3281. 4348.  
 5791. 5793. 5794. 5941.  
 5942. 5945. 6176. 6180.  
 6189. 6903. 7039. 7153.  
 7161. 7330. 7807.

- Mo. Hardy 1421.  
Mackay, G. 1868. 4840. 4877.  
4878. 6321.  
Mac Kendrick, J., siehe  
Dewar.  
Mackenzie 2741.  
M'Leod 2398.  
Maczewski, T. 3199.  
Madan 6463.  
Maddox 1629. 1695. 3750.  
6852.  
Mästlinus 5705.  
Magawly 3834.  
Magendie 1155. 2170. 3834.  
Magni 2256.  
Magnus, H. 73. 308. 312. 313.  
2108. 2914. 3095. 4044.  
4045. 4063. 4064. 4065.  
4066. 4067. 4089. 4090.  
4116. 4147. 4148. 4309.  
4430. 4500. 4501. 4502.  
4503. 4548. 4549. 5024.  
5179. 5185. 5328. 5338.  
5347; siehe auch Almquist  
und Cohn, H.  
Magnus und Pechuël-Löche  
4068.  
Magnus, H., Cohn H. und  
Jacobi 4504.  
Magrini 6413.  
Maher, O. W. 2789. 2792.  
Mairan, de 4010.  
Maklakoff 637. 1446.  
Malebranche 6086. 7112.  
Malgat 3041.  
Mallock, A. 437.  
Manby, C. 4329.  
Mandelstamm, L. 480. 1191.  
1248. 2265. 3969. 7554.  
Mandelstamm, L. u. Schöler,  
H. 1208.  
Mannhardt, F. 2122.  
Mannhardt, J. 2009. 2253.  
2283. 6710.  
Manolescu 1982. 3715.  
Mansfield, A. D. 7432.  
Mans, W. 856. 1000. 1843.  
2252. 4596.  
Marangoni 6192. 6202.  
Marat 3883. 3884.  
Marbe, K. 5555. 6072. 6074.  
6311.  
Marcé, L. V. 3278.  
Marci, J. M. 3854.  
Maréchal, J. 1768. 5044. 5065.  
5077. 5380.  
Mari 4597. 5261.  
Marianini, S. 6159.  
Mariotte 3391. 5826. 6081.  
Mark, E. L. 377.  
Markwort, J. G. 20.  
Marlow 6821.  
Marsilly, M. de 2832.  
Marty 4091.  
Martin, siehe Javal.  
Martin, G. 1337. 2608. 2647.  
2648.  
Martin, P. 413.  
Martini, A. de 5228. 5235.  
Martini, F. v. 7629.  
Martius, G. 6956.  
Martius-Matzdorff, J. 3971.  
7336. 7417.  
Marula, A. 1789.  
Mascart, E. 3970. 3986; siehe  
auch Perrin, M.  
Maskelyne 2373.  
Masoin 3524.  
Masselon, J. 1618. 1638. 3016.  
3066. 3225; siehe auch  
Wecker, L. de.  
Masson 5388. 5389; siehe  
auch Hocquard.  
Matthiessen, A. 2382.  
Matthiessen, L. 432. 433.  
1039. 1123. 1125. 1134.  
1140. 1226. 1227. 1228.  
1287. 1256. 1257. 1258.  
1267. 1268. 1269. 1279.  
1280. 1282. 1283. 1284.  
1289. 1290. 1295. 1296.  
1302. 1303. 1305. 1306.  
1317. 1323. 1326. 1327.  
1338. 1344. 1345. 1384.  
2561. 2676. 2677; s. auch  
Zehender, W.  
Matzdorff, J. M., siehe Mar-  
tius-Matzdorff.  
Maunoir, J. P. 2245.  
Maurel 3703.  
Maurolycus, F. 1144. 1500.  
3851.  
Mauthner, L. 486. 1209. 1219.  
1229. 1259. 1601. 2521.  
2762. 2885. 2886. 3017.  
4304. 4322. 4550. 4551.  
4639. 5066. 5252. 6459.  
6755. 6802. 6806. 6933.  
7585.  
Maxwell, J. C. 4222. 4228.  
4287. 4334. 4384. 4399.  
4969. 5920. 5956. 6526.  
7331.  
Mayer, A. A. 5671. 6499.  
Mayer, A. M. 4935.  
Mayer, H. 1368. 1527. 2223.  
Mayer, T. 3623. 4186.  
Mayer, S. u. Pribram, F. 744.  
Mayerhausen, G. 536. 1447.  
1448. 1457. 1458. 2787.  
3018. 3289. 3728. 3751.  
5255. 5256. 6551. 6553.  
6554. 6557. 6558. 6795.  
7065. 7066.  
Mayo, A. 7210.  
Mays, K. 938.  
Mazeas 6327.  
Mazza, F. 405.  
Meinong, A. 5513.  
Meissner, G. 2750. 2755. 3346.  
6858. 6861. 6862. 6865.  
7469. 7757.  
Mellberg 4598. 5354.  
Mello 1459.  
Melloni 3946.  
Melville 5837. 6330.  
Melsens 5925. 6163.  
Mendoza, F. S. de 2609. 3315.  
Mengarini, G. 5661; s. auch  
Colasanti, J.  
Mengin 3159.  
Mercanti 739.  
Mercier 6766.  
Mergier, G. E. 1813. 1815.  
Merkel, F. 884. 885. 904.  
906.  
Merkel, J. 5514.  
Merrill, H. B. 438.  
Méry 2805. 3395.  
Meslin, G. 2796.  
Messer, H. 6922. 6923.  
Metzger, E. 3765.  
Meugin 2786.  
Meulen, J. E. van der 7165.  
Meulen, J. E. van der u.  
Dooremaal, T. C. van 7166.  
7168.  
Meulen, S. G. van der 7358.  
Meyer, A. 711. 5848.  
Meyer, E. 605. 611. 1582.  
1953.  
Meyer, H. 886. 1006. 2212.  
2426. 2445. 2452. 2453.  
5777. 6394. 6525. 6891.  
7134. 7228. 7258. 7701.  
7711.  
Meyer, L. 6940.  
Meyerstein 475. 2830.  
Meyhöfer 5339.  
Michaelius 5820.  
Michel 5315.  
Michel, A. 2361.  
Michel, J. 898. 925. 3497.  
Michell 3404.  
Mickle, W. J. 136.  
Middelburg 2470. 2471.  
Miéville, E. 4757. 5467.  
Miéville, M. E. 5095.  
Mile 1167. 1521. 2133. 2195.  
2380. 4200. 7000.



- Miles, H. S. 1872.  
 Milhand, E. 6638. 7099.  
 Millet, J. 3325.  
 Millingen, van 5296. 7658.  
 Millikin, B. L. 5201.  
 Milward 5890.  
 Minder, F. 4505.  
 Minding 1112.  
 Minich 6158.  
 Minor, J. L. 1434. 1468. 4680. 5193.  
 Mislawski 774. 5562.  
 Mitchell, S. 2670.  
 Mitkiewitsch, G. 3674. 3802.  
 Mittendorf, W. J. 1958. 1970.  
 Moauro 661.  
 Möbius, A. F. 1106. 1114.  
 Möbius, P. J. 740.  
 Moeli 113. 262. 741.  
 Moeller 4552. 5036. 5340. 5341.  
 Mönnich 510. 1285. 1307. 7684.  
 Moser 1394.  
 Mohr 2904. 2905. 7148.  
 Moigno 5909. 7239.  
 Mol 4431.  
 Molinetti 2153.  
 Moll, F. D. A. van 6816. 7563. 7569.  
 Mollweide 2876. 3890. 3894.  
 Molyneux 7113.  
 Monakow, C. v. 149. 150. 191. 192. 198. 248.  
 Moncel, T. du 7307.  
 Monge 6344.  
 Mongez 6095. 6337.  
 Monnik, A. J. W. 487. 493. 494.  
 Monoyer, F. 1887. 2382. 2928. 3200. 3210. 3677. 6190.  
 Monroe 1358. 2162. 7154.  
 Montigny 5910. 5911. 5937. 6934.  
 Montucla, J. E. 7124.  
 Moon 1816. 3143.  
 Morano 4599.  
 Morat, J. P. u. Doyon, M. 283. 2355.  
 Morechovez 3566.  
 Morgagni 2727.  
 Moriggia 724. 730.  
 Morosin, J. 1971.  
 Morton, 2185. 3042. 5974.  
 Morton, A. 1328.  
 Morton, H. 6217.  
 Morton, S. 1270.  
 Morton u. Barrett 3189.  
 Moser 86. 1110. 1111. 2206. 3912.  
 Moser, L. 1175.  
 Moser, K. 1190.  
 Mosso, A., siehe Schön, W.  
 Most 3376.  
 Motais 1081. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087.  
 Mott 263. 264. 4385. 6825.  
 Mott u. Schaefer 284.  
 Motte, de la 1507.  
 Moungeolle 4149.  
 Moutier, J. 4720.  
 Moyné, G. 1775. 1779. 1782.  
 Mühlbach, N. Th. 1154.  
 Müller 5898.  
 Müller, A. 2438. 7465.  
 Müller, C. F. 6181.  
 Müller, E. 3241.  
 Müller, F. 291.  
 Müller, G. E. 5426. 5427. 5432.  
 Müller, H. 676. 690. 681. 841. 849. 850. 861. 862. 2251. 2753. 3425. 3426. 3432. 6530.  
 Müller, J. 25. 33. 318. 320. 2181. 2378. 2810. 3336. 3341. 3409. 3630. 3906. 4203. 5751. 6116. 6874. 6588. 6640. 6871. 6876. 6997. 7281. 7452. 7456. 7689.  
 Müller, J. J. 4369. 6688. 6711. 7850.  
 Müller-Lyer, F. C. 5525. 6957.  
 Münsterberg, H. 6958. 7435.  
 Mulder 6735. 6744. 6756. 7088.  
 Muncke 27. 1161. 1517. 1519. 6359. 7131.  
 Munk, H. 114. 117. 118. 119. 125. 126. 151. 171. 209. 210. 211. 249. 265. 266. 285. 731. 742. 6826. 7823.  
 Murani, O. 5526.  
 Murphy 4092. 4386.  
 Musgrove, J. 1329.  
 Musschenbroek 5833.  
 Nagel, W. A. 422. 4179. 4180.  
 Nahmacher, W. 3612.  
 Napoli 5599.  
 Nardo 6404.  
 Necker 7132.  
 Neiglick, H. 5502. 5503.  
 Netoliczka, E. 1602. 1607. 4555. 4600.  
 Nettleship, E. 3538. 5180; siehe auch Abercrombi.  
 Netter 765.  
 Netz, E. 4308.  
 Neuber 2198.  
 Neumann, C. 1137.  
 Neumann, F., siehe Hess, C.  
 Neumann, J. 7649.  
 Neuschüller 1625. 3211.  
 Newall, H. F. 1286. 6266.  
 Newcomb 6415.  
 Newton, J. 2368. 3329. 3858. 3859. 3860. 3861. 3862. 3863. 3865. 3866. 3867. 3868. 3870. 3873. 4008. 4183. 5825. 6084. 6085. 7445.  
 Nicati, W. 662. 899. 3108. 3842. 4928. 4966. 6757. 6767., s. a. Lépinay, J. Macé de.  
 Nicholl, W. 4243. 4246.  
 Nichols, E. L. 4785. 6021.  
 Nicklès, J. 4362.  
 Nicolai, C. 2366.  
 Niebuhr, M. 2096.  
 Nieden, A. 152. 1460. 1470. 1486. 3729. 3740. 3803.  
 Niedt, A. 2381. 2421.  
 Nikitin 5037.  
 Nikolai 2357.  
 Nilson, L. C. A. 22.  
 Niemetschek 4364.  
 Nimier 1811. 2057. 2058. 2074.  
 Nipher 7746.  
 Nollat 6090.  
 Nordenson, E. 2562.  
 Norrie, G. 3190. 4965. 4968.  
 Norris, W. F. u. Wallace, J. 1001.  
 Norton, A. 2291. 2292.  
 Notthaft, J. 339.  
 Noyes 286. 2506. 2589. 2610. 5190. 5197.  
 Nuel 2039. 2040. 4447. 4506. 4553. 4554. 5177; siehe auch Landolt und Warlomont.  
 Nuel u. Leplat 2022.  
 Nuell, J. P. 267. 2059. 2790. 3115.  
 Nunneley 473. 852. 6896.

## N.

- Nachet 3005; siehe auch Follin.  
 Nachtel 712.  
 Nachtigal 4093.  
 Nägeli, C. 2767.  
 Nagel, A. 1247. 1572. 1606. 1888. 1893. 1894. 1904. 1905. 1985. 2106. 2495. 4292. 6595. 6689. 6712. 6782. 7019. 7496. 7504. 7767.

Nussebaum, J. 222. 6810.  
Nussebaumer, F. A. 3283.  
Nycholt, T. L. à 2761.

## O.

O. 1523.  
Obernier, F. 808.  
Obregia 268. 6827.  
Offert u. Rayleigh 4758.  
Oger 7791.  
Ogneff, J. 947.  
Ohlemann, H. 2087.  
Olbers 2155.  
Oldham 2915.  
Oliver 287. 1696. 1697. 1720.  
2563. 3766. 4681. 4682.  
4879. 4946. 4948. 5067.  
5078. 5103. 5111. 5125.  
5119. 5153. 6273.  
Olshausen, A. 6561.  
Onanoff, J. 7824.  
*Ophthalmoscopes à réfraction*  
etc. 3023.  
Opix, 4190. 6340.  
Oppel, J. J. 1656. 4020. 4332.  
4335. 4340. 4387. 4448.  
5570. 5931. 6156. 6410.  
6436. 6888. 6896. 7014.  
7016. 7140. 7249. 7270.  
7284. 7304. 7707. 7713.  
7716.  
Ord, siehe Abercrombi.  
Orro, D. E. 3144.  
Osann 6128. 6130. 6373.  
6378. 6381. 6409.  
Oscroft-Tansley, J. 1311.  
Ostwalt, F. 626. 663. 1330.  
1331. 1333. 1334. 1339.  
2075. 2649. 2660. 3006.  
6845.  
Ott, F. 2060.  
Ott u. Prendergast 6001.  
Otth, G. 7030.  
Ottolenghi, S. 4150.  
Oudemans, J. A. C. 1758.  
Oughton 3792. 6245. 6246.  
7180. 7396. 7597.  
Oulmont, P. 250.  
Overweg 3218.  
Owen, D. C. L. 2793.  
Ozoulay, L. 1473.

## P.

Paalzow, 6398. 7714.  
Pacini, F. 838.  
Page, A. S. 3767.

Palaz, A. 5667.  
Palmer, G. 4237.  
Panel 3263.  
Paneth, J., siehe Exner, S.  
Pankrath, O. 406.  
Panum, P. L. 6745. 7144.  
7480. 7499. 7717. 7727.  
7762.  
Pappenheim, 1041. 1364. 2204.  
Pardies, J. G. 3864.  
Parent, H. 1281. 1846. 2601.  
2966. 2972. 3007. 8019.  
3020. 3043. 8116. 8129.  
3162. 8169. 3201. 3232.  
3242. 3808.  
Parinaud, H. 137. 188. 732.  
3557. 3582. 3583. 3592.  
3618. 3796. 4759. 4786.  
4949. 4967. 5096. 5104.  
5105. 5126. 5444. 5445.  
5468. 5515. 5634. 5687.  
6464. 6465. 7486.  
Parinaud, H. u. Duboscq, J.  
5097.  
Paris 5855.  
Park, J. W. 3365.  
Parker, G. H. 407.  
Parrot 733. 2171. 3892. 5851.  
Parry 4241.  
Parsevi 5172.  
Parville, M. H. de 7078.  
Pasquet 2196.  
Patten, W. 374. 378. 382.  
Patton 7610.  
Paula-Schrank v. 6357. 6358.  
Pauli, F. 1407.  
Paulsen 1972.  
Pautz, W. 1067.  
Payne 3109.  
Payl, H. W. 4556.  
Pechuël-Lösche, siehe  
Magnus.  
Péclet 2415.  
Pecquet 3392.  
Pedrazzoli 1310. 1474. 1487.  
Pedrono 3290.  
Peirce 3987. 3992. 5989.  
Peirce, C. S. u. Jastrow, J.  
3993.  
Peirescius 6078.  
Pemberton 2142.  
Pepper 5948.  
Percival, A. 1717.  
Pereles 1708.  
Perez, F. G. 1619.  
Perez-Caballero, F. R. 537.  
554.  
*Perimetrie* 1428.  
Perlia 269. 288.  
Perrault 3393.

Perrin 1271. 1772. 2895. 2906.  
Perrin u. Mascart 1732.  
Perroud 3279.  
Pertorelli 5373.  
Peschel, M. 1249. 1260. 1261.  
2527. 2781. 4601.  
Petit, F. P. du 450. 451.  
452. 453. 454. 665.  
Petrén, K. 5556.  
Petrie 3635. 5769.  
Petrini 2016. 6342. 6350.  
6351. 6352.  
Petruscheffsky, Th. 4316.  
4721. 4787.  
Peytal 1526.  
Pfalz, G. 2578.  
Pfaff 3368. 3369. 3895. 3899.  
Pfister u. Streit 612.  
Pflüger 498. 613. 1250. 1922.  
1973. 2010. 2076. 2653.  
3008. 3021. 3180. 3301.  
3741. 3752. 5025. 5038.  
5046. 5047. 5068. 5079.  
5086. 5181. 5182. 5274.  
Philippe, siehe Binet.  
Philipsen, 3130. 5496.  
Phipson, T. L. 5230.  
*Physiologie Gesichts- u. Far-*  
*benerscheinungen* 6502.  
Picard 713. 4557.  
Pick, A. 251.  
Pick, H. 7311.  
Pickert, 7433. 7670.  
Pickford 6140.  
Picqué 785. 786.  
Pischi, K. 1873.  
Pictet, R. 5966. 7548. 7555.  
Pieper, F. W. 6527.  
Pierini, P. 1324.  
Piola 1105.  
Pitcairn 2726.  
Pithiot, J. 5087.  
Placido, A. 520. 2534.  
Plagge 1163.  
Plateau, J., 326. 363. 364.  
375. 383. 384. 385. 4194.  
4217. 5404. 5410. 5762.  
5763. 5764. 5809. 5810.  
5856. 5859. 5860. 5861.  
5864. 5867. 5869. 5870.  
5882. 5885. 5886. 5889.  
5899. 5915. 5994. 6120.  
6121. 6126. 6129. 6131.  
6149. 6210. 6218. 6232.  
6299. 6247. 6375. 6380.  
6421. 6422. 6444. 6448.  
7007. 7173. 7174.  
Plath, J. 4027.  
Platner, J. J. 2143.  
Plehn 1783. 1790.

Plempius 2136. 5728.  
 Plenk, F. 105.  
 Plenk, siehe Dietl.  
 Pliqué, A. 2274.  
 Plüss, N. 3921.  
 Poeller, F. 2077.  
 Poey 6403.  
 Pohlmann 6379.  
 Polailon, J. F. B. 1193.  
 Pole, W. 4069. 4289. 4328.  
 4558. 4559. 4904. 4905.  
 4917. 4918. 4919. 4920.  
 Polemann 328.  
 Poncet 2896.  
 Ponton, M. 4408.  
 Pope, B. A. 2392. 2467. 2768.  
 2769. 6539.  
 Poppe, A. 5912.  
 Poppe, J. 2174.  
 Porro, J. 2853.  
 Porta, J. B. 1145. 1501. 3848.  
 6076. 7106. 7204. 7439.  
 Porterfield 12. 1150. 1509.  
 2152. 3403. 3624. 5832.  
 6864. 6985. 7125. 7447.  
 Posch, A. 5681.  
 Poselger 3896.  
 Potton 4282.  
 Pouchet 357. 3704. 4168.  
 4432. 6248.  
 Pouillet 5569.  
 Poulain, L. V. 2303.  
 Power, 3067. 6528.  
 Powell 2447. 5767.  
 Pozze, E. dal 4841.  
 Pray, O. M. 2507. 2508.  
 Preece, W. H. 5635.  
 Prendergast, siehe Ott.  
 Prengrüber 6758.  
 Prentice, F. 7650.  
 Preobraschensky 4959.  
 Pretori, H., siehe Hess, C.  
 Preusse, M. 734.  
 Prevost 2807. 3898. 5845.  
 7459. 7481.  
 Preyer, W. 4024. 4370. 4400.  
 4640. 4641. 4941. 5242.  
 Pribram, F., siehe Mayer, S.  
 Priestley 16. 1151. 6865.  
 6988. 7129.  
 Privat, G. 2564.  
 Proctor, A. 5792.  
 Prompt 1542. 1762. 2400.  
 5812. 7050. 7196.  
 Proskauer, Th. 2061. 3153.  
 Prouff, J. M. 555. 567. 568;  
 siehe auch Hubert.  
 Provenzali 2401. 2402.  
 Prowse, A. B. 3170.  
 Ptolemaeus, C. 5815. 7102.

Pufahl 346.  
 Puglia, C. 3539.  
 Pulvermacher, E. 8110.  
 Purcell, F. 423. 439.  
 Purkinje 19. 23. 462. 1158.  
 1518. 2177. 2180. 2414.  
 2418. 2732. 2733. 8833.  
 3335. 3375. 3877. 8405.  
 4254. 5567. 5852. 6115.  
 6533.  
 Purtscher, O. 2579. 2590.  
 5253. 5262. 5275. 5287.  
 Purves, 1786. 1789. 1740.  
 2920.  
 Pybylski, J. 766. 767.

## Q.

*Quantité de la lumière etc.*  
 5650.  
 Querenghi 5212.  
 Quesnel 1865.  
 Qusetlet 3340. 5756.

## R.

Rabl-Rückhard 4117.  
 Rabus, H. 309.  
 Rabuteau, A. 57.  
 Radakovic, M. 5534.  
 Radau, siehe Toepler.  
 Radde, O. 4507.  
 Radicke, F. W. G. 34.  
 Ragona-Scina, D. 6207. 6388.  
 6405. 6441. 6542.  
 Raggi, A. 787.  
 Raia 6922.  
 Rainy 7021.  
 Raehlmann, E. 1907. 4409.  
 4433. 4449. 4971. 4976.  
 5411. 6964. 7586. 7596.  
 Raehlmann, E. u. Witkowski,  
 L. 714. 6768.  
 Ramis, J. 1703.  
 Rampoldi 959. 3314. 6476.  
 6555. 6565. 6571.  
 Ramon y Cajal, S. 977. 987.  
 Ramón y Cajal, S. u. Greeff,  
 R. 992.  
 Randall 1449. 1639. 1709.  
 1851. 1852. 2041. 2062.  
 2338. 3044. 3055. 3096.  
 3097. 3258.  
 Randall, B. A. u. de Schweini-  
 tzt, G. E. 1861.  
 Ranney, L. 153.  
 Rasmus u. Wauer 1262.  
 Rayleigh, Lord 3768. 4642.  
 4683. 5209. 6006; siehe

auch Tennant, J. F. und  
 Offert; siehe ferner Strutt  
 J. W.  
 Rayleigh, Lord u. Buckton,  
 G. B. 3769.  
 Read, J. 1157.  
 Reade 3934. 6364.  
 Reboud, J. 6854. 7101.  
 Becklinghausen, F. v. 6666.  
 6899. 7277. 7299. 7488.  
 7497.  
 Recordon 6927.  
 Reeken, van 674. 2344.  
 Regéczy 3682. 4462.  
 Regnaud, J. 3959. 3961.  
 Regnault, siehe Foucault.  
 Rehfisch, E. 6526.  
 Reich, M. 508. 1220. 1398.  
 1826. 1828. 1830. 1837.  
 1845. 1974. 3353. 3663.  
 3696. 8705. 9309. 4420.  
 4880. 5293. 6252.  
 Reid, Th. 654. 1469. 2973.  
 3056.  
 Reinhard, C. 212. 223.  
 Remak, R. 845.  
 Rembold, S. 707.  
 Rémy, A. 7194.  
 Renaut, J., siehe Dubois, R.  
 René, A. 4643.  
*Report of the Committee etc.*  
 5384.  
 Respighi 2255. 5785.  
 Retzius, G. 799. 889. 926.  
 Reuben, L. 2760. 6534.  
 Reuling, G. 2298.  
 Reusch, F. E. 1118. 2501.  
 Reuss, A. v. 505. 521. 526.  
 1238. 1266. 1613. 1844.  
 1966. 2785. 2960. 4118.  
 4560. 5112. 5342.  
 Reuss u. Woinow 489. 1197.  
 Reuther 3909.  
 Rey 6835.  
 Raymond 1483. 1691. 1698.  
 1931. 2650. 2661. 6211.  
 6632. 6797.  
 Raymond u. Bajardi, P. 2602.  
 Raymond, C. u. Stilling, J.  
 7630.  
 Reynaud 5995.  
 Rheinstein, J. 1869.  
 Riccò, A. 3638. 4434. 4450.  
 4561. 5166. 5167. 5591.  
 5683. 5684. 5975. 5980.  
 6212. 6219. 6543. 6559.  
 Richet, Ch. 270. 292. 293.  
 6226.  
 Richet u. Breguet 5997. 6002.  
 6231. 6233.

- Richey 2611.  
 Richi 1874.  
 Richter, A. 236.  
 Richter, R. 194. 195.  
 Righi, A. 7368. 7490.  
 Rjäsan 2117.  
 Rimpler 3022.  
 Rindfleisch, G. 3181.  
 Rios, O. C. 4842.  
 Risley 1741. 2662. 3068.  
 Ritter 853. 860. 2186. 3870.  
 3372. 3373. 3374. 5846.  
 Ritter, C. 347.  
 Ritter, K. 1022. 1026.  
 Ritter, R. 5662.  
 Rittenhouse, D. 7130.  
 Ritzmann, E. 1975. 6746. 6760.  
 Rive, L. de la 7811. 7814.  
 Rizetti 3872.  
 Roberts 1620. 1853. 3770.  
 3771. 4110. 4684. 4788.  
 Robinski 1017. 1019. 1029.  
 1030. 1081. 1032. 1036.  
 Robinson 5758.  
 Rochas, A. de 3302.  
 Rochon 6989.  
 Rochon-Duvigneau, A. 836.  
 Roe, A. L. 1806.  
 Röder, W. 513. 1239.  
 Rödenbeck, A. E. 21.  
 Röhrich, K. 5113.  
 Röttger 3936.  
 Roger, siehe de Wecker.  
 Rogers 7245. 7298. 7474.  
 7491. 7721.  
 Rogot 5853.  
 Rohault 7444.  
 Rollet, A. 6187. 6426. 6427.  
 6428. 6495. 7292. 7310;  
 siehe auch Becker, O.  
 Rollmann 5914. 7230. 7231.  
 7337.  
 Romano 1923. 5563.  
 Rood, O. N. 2759. 3925.  
 3982. 4305. 4308. 4310.  
 4311. 4451. 4562. 4602.  
 4603. 4906. 5249. 5594.  
 5672. 5934. 5967. 6223.  
 6489. 7501. 7724. 7729.  
 7735. 7736.  
 Roosa, D. R. 2654.  
 Rose, E. 4337. 4345. 4352.  
 5006. 5229. 5232. 5234.  
 5238. 5239. 6171.  
 Rosebrugh, A. M. 3260. 3264.  
 Rosenbach 6312.  
 Rosenberg, W. 4685.  
 Rosenstiehl, A. 4030. 4508.  
 4509. 4510. 4644. 4645.  
 4646. 4647. 4686. 4687.  
 4722. 4723. 4760. 4789.  
 5012. 5070. 5080. 5620.  
 5621.  
 Rosenthal 94. 3381. 4306.  
 4938. 5697.  
 Rosow, B. 481. 1192. 2264.  
 Rosset 2309.  
 Rossetti, F. 7303.  
 Rossolini 6416.  
 Rotand 2042.  
 Roth, A. 1557. 2663. 3154.  
 3233. 6846. 7671.  
 Roth, J. 614. 2640.  
 Rothe, R. 5071. 6007.  
 Rothmund 2474.  
 Rouget, C. 675. 677. 678.  
 Roulot 3009.  
 Rowley, S. 7779.  
 Roy, L. 5480.  
 Roy, Le, siehe Le Roy.  
 Royce, J. 6257.  
 Royer, Cl. 6071.  
 Rozier 6096. 7195.  
 Ruck, R. 4604.  
 Rudall 3111. 4826.  
 Rudolphi 2175. 2809. 6996.  
 Rudzki 6633. 7825.  
 Rue, W. de la 7282. 7283.  
 Rüppel 1759. 3243.  
 Ruete, G. Th. 37. 43. 1529.  
 2243. 2751. 2820. 2840.  
 4147. 5393. 6652. 6653.  
 6663. 7024. 7297. 7332.  
 7344.  
 Rumball 1152.  
 Rumford 6346.  
 Rumpf, Th. 1685.  
 Rumschewitz, K. 1023. 1056.  
 Runge u. Steffens 4191.  
 Rupp, O. J. 5957.  
 Russel, J. S. R. 6855. 6856.  
 Rutenberg, D. C. 2942.  
 Rutherford 4907.  
 Ryba 1369.  
 Rychner, E. 3155.  
 Rymza 2078.  
 S.  
 Saad-Sameh 3226.  
 Sabine 5626.  
 Sacchi, G. 960.  
 Sachs 7651.  
 Sachs, G. T. L. 3272.  
 Sachs, J. T. 4242.  
 Sachs, M. 826. 828. 985.  
 4896. 5668. 5673.  
 Saemann, H. A. O. 2828.  
 Salgo 775.  
 Salomonsohn, H. 1497.  
 Salzer 919. 3716.  
 Salzmann, M. 1558. 1562.  
 Samelson 127. 139. 5469.  
 6723. 7169. 7589. 7598.  
 Samelson 2961.  
 Sampago, C. c 6343.  
 Samuel 7285.  
 Sander 6773.  
 Sang, E. 2695. 7351. 7549.  
 Sanson 2194.  
 Santeson, G. 2717. 2718.  
 Santons, R. dos 5088.  
 Sarsius 5714. 5717.  
 Saskewitsch 3742.  
 Sattler 2132. 2344.  
 Sauer, L. 3977.  
 Sauroman, D. Ruiz y 5359.  
 5378. 5381.  
 Savage 1721. 6817. 6836.  
 6837.  
 Savary 6713.  
 Schadow 735. 3743. 5433.  
 Schaefer, siehe Mott.  
 Schafer, E. A. 365.  
 Schäffer 3937.  
 Schaffhäutl 5921.  
 Schaffgotsch 6386.  
 Schanz, F. 655.  
 Schapringier, A. 3744. 6313.  
 Schasler, M. 4317.  
 Schassler 4023.  
 Schauenburg, C. H. 2841.  
 2858.  
 Scheffler, H. 48. 1578. 4724.  
 6914. 7775.  
 Scheiner 4. 1148. 1503. 2134.  
 5715. 6978.  
 Schelske, R. 478. 3348. 4341.  
 4349. 4353. 4688. 5240.  
 Schenkl 1403. 3287. 3294.  
 5069.  
 Scherffer 6091. 6092. 6097.  
 6333.  
 Scherk, 1401.  
 Schewiakoff, W. 400.  
 Schiaparelli 6759.  
 Schickard 5721.  
 Schiefferdecker, P. 379. 961.  
 968.  
 Schiele, A. 3303. 3304.  
 Schiess 863. 1644. 1999.  
 Schiff 172. 692.  
 Schiötz 527. 547. 569. 1461.  
 1641. 1854; siehe auch  
 Javal.  
 Schipiloff, K. 768.  
 Schirmer, O. 830. 1573.  
 2107. 2284. 2509. 5535.  
 5543.

- Schirmer, B. 1673. 2112.  
2879. 4410. 4605. 6938.  
6942.
- Schlampp, K. W. 414. 424.
- Schleich 1959. 3045. 3447.
- Schleiden, M. J. 6594.
- Schlegel, J. H. G. 3273.
- Schlesinger, A. 702. 7587.
- Schliephake, H. 3382. 5245.
- Schljachtin 6684.
- Schloesser 829. 2131.
- Schmeichler, 755.
- Schmerler, B. 6468.
- Schmidt, E. 1142.
- Schmidt, F. u. Haensch 5154.
- Schmidt, H. 896. 900. 1586.  
2922. 2929. 4046; siehe  
auch Eulenburg, A.
- Schmidt-Rimpler, H. 271.  
300. 615. 901. 1094. 1608.  
1987. 2023. 2024. 2025.  
2026. 2043. 2044. 2088.  
2097. 2318. 2319. 2930.  
2943. 2953. 2954. 2989.  
3098. 3305. 3357. 3358.  
3498. 3499. 5419. 5446.  
5470. 7590. 7591. 7800.  
7802.
- Schmiedt, W. 7676.
- Schmithausen, A. 1536.
- Schmitz 5349. 5360.
- Schnabel 1936. 2916. 2962.  
2967. 3132. 3500.
- Schneider, G. H. 6471. 7043.
- Schneller 120. 140. 606.  
1675. 1704. 2000. 2017.  
2339. 2855. 3822. 4606.  
4689. 6921. 6928. 7603.  
7652. 7660.
- Schnetzler 4277.
- Schnyder 2429.
- Schöbel, E. 409.
- Schöbl 7064.
- Schoeler, H. 699. 1291. 2124.  
2974. 3706. 4094. 4119.  
4421. 7561. 7570; siehe  
auch Mandelstamm, L.
- Schön, W. 1066. 1263. 1272.  
1273. 1292. 1402. 1404.  
1943. 2001. 2089. 2340.  
2341. 2345. 2346. 2678.  
2719. 4411. 4422. 5246.  
6208. 6736. 6747. 6748.  
7376. 7573. 7579. 7745.
- Schön, W. und Mosso, A.  
7742.
- Schönbein, C. F. 4281.
- Schopenhauer, A. 4192. 4195.  
4221. 4374. 4934.
- Schrank, v. Paula- 6357. 6358.
- Schröder 2917. 4095. 6445.  
7142.
- Schröder, Th. v. 2063. 2098.  
2099.
- Schroeter 1230. 1405. 2064.
- Schtschepotiew 5544.
- Schubert, P. 4648. 4690.
- Schubring 7157.
- Schulek, V. 1543. 2706.
- Schulin, C. 5276.
- Schulte, E. 8133.
- Schulten, M. W. 2990.
- Schultze, F. 7801.
- Schultze, M. 854. 859. 866.  
869. 878. 878. 881. 882.  
890. 891. 4355.
- Schultze, O. 425.
- Schulz 6114.
- Schulz und Bartels 1808.
- Schulze, F. E. 690.
- Schumann 1583. 2275.
- Schur, S. 693.
- Schuster 4649.
- Schuster, A. 3928. 4881.
- Schuster, P. B. 6614.
- Schuurmann, J. B. 6675.
- Schwahn 6774. 7580. 7599.
- Schwartz 4563.
- Schwarz, O. 3387. 6847. 7095.
- Schwarzbach 3084. 8212.
- Schweigger, C. 1475. 1479.  
2079. 2090. 2475. 2877.  
2907. 3099. 3117. 3219.  
3683. 3810. 7537. 7600.
- Schweinitz, G. E. de 2655;  
siehe auch Randall, B. A.
- Schweizer, G. 7152.
- Schwendler, L. 5600.
- Schwertassek, K. F. 6965.
- Soimeni 616. 2127.
- Scina, D. R., siehe Ragona-  
Scina, D.
- Scopoli 5834.
- Sooresby, W. 6157.
- Sczawinska, W. de 408.
- Sczelkow 522. 1609.
- Seashore, C. E. 2358.
- Secchi 5908.
- Secondi, G. 599. 1698. 1700.  
1705. 1712. 6807. 6822.
- Sebeck, A. 8893. 4259. 7695.
- Seeliger, A. 2682.
- Seely 1988. 5250.
- Segal, S. 3085. 3266. 5516.
- Seggel 1776. 2045. 3689.  
3745. 3753. 4725. 5504.  
5517.
- Segner 5827.
- Séguin, J. M. 6150. 6158.  
6161. 6167. 6193. 6284.
- Schproben 3774.
- Seiler 3338.
- Sekulic 3974.
- Sélie, B. 5902.
- Senff 468. 2213.
- Seppilli, G. 294; siehe auch  
Luciani.
- Serre 2191. 5888.
- Serres, M. de 317.
- Serres d'Uzés, siehe d'Uzés, S.
- Setschenow, J. 3960.
- Sewall, H. 3573. 5114; siehe  
auch Kühne, W.
- Seydewitz, P. v. 4125.
- Sgroso, P. 664. 1819. 3259.
- Shakespeare, O. E. 511.  
2938.
- Sharkey, S. 252.
- Shaw 5928.
- Shaglinaky 745.
- Sherrington, C. S. 6857.
- Shufeldt, S. W. 5194.
- Sichel 2918. 2919. 5399. 7462.
- Siebold v. und Stannius 323.
- Siemerling 224. 253.
- Siemens 6775.
- Siesmann, L. 1856.
- Silbermann 6510.
- Silex, P. 2128. 2129.
- Simi 3213.
- Simon, R. 1498. 2651. 5221.
- Simonoff 2179.
- Sinclair, C. F. 6267.
- Sinstden 5907. 6151. 6391.  
7147.
- Skrebitzky, A. 6703. 6714.
- Smee 1564. 3637. 7240.
- Smith 3399. 3620. 4691.  
6240. 6863.
- Smith, D. 1053.
- Smith, F. 1353. 4650.
- Smith, F. J. 4412.
- Smith, J. 4330. 6169.
- Smith, N. 6249.
- Smith, P. 576. 607. 1635.  
2002. 2046. 2047. 2293.  
2923. 3057. 3134. 3135.  
3178. 7606. 7631.
- Smith, R. 4047. 7119. 7207.
- Smith, S. 1949.
- Smith, Th. 2189.
- Smith und Beck 7273.
- Smith P. und Gross 2043.
- Snell 1983. 3145. 5187. 5383.  
5880.
- Snellen, H. 1718. 1745. 2510.  
2512. 2519. 3220. 3234.  
3642. 3643. 3657. 3670.  
3671. 3678. 3690. 3707.  
3772. 3811. 3843. 6314.

Snellen, H. und Landolt E.  
509. 1588. 1610. 1787.  
2520. 5010.  
Soemmering, D. W. 459.  
Sömmering, Th. 444. 445.  
Sollier, P. 3319; siehe auch  
Déjerine, F.  
Solger, B. 983.  
Sommer 4252.  
Sommerville, O. 4882.  
Somya 5304.  
Sorel, G. 7197.  
Soret 3981. 3988. 3989. 7244.  
Sormanni 1954.  
Sotteau 2738.  
Souehard, siehe Bowditch.  
Soury 4141. 4142. 4315. 4943.  
4944.  
Sous, G. 1603. 1614. 1769.  
6803. 7407. 7617.  
South, J. 5755.  
Soward, A. W. 4651.  
Spalitta, F. u. Consiglio, M.  
800. 801.  
Speakmann 617. 2641.  
Spencer, H. 6630. 7760.  
7818.  
Spill, v. d. 2620.  
Spiller, J. 4859.  
Spitzka, E. C. 237.  
Splittgerber 6136.  
Spottiswoode, M. A. 4423.  
Spring, W., siehe Delboeuf, J.  
Spurzheim, G., siehe Gall, J. F.  
Seamuljow 6281.  
Seegal, S. L. 3366.  
Stack, J. N. 4120.  
Stamm 1173. 7004.  
Stammeshaus, W. 1221. 1231.  
2924.  
Stampfer 806. 5871.  
Stanford, M. 9046. 9058.  
Stannius, siehe v. Siebold.  
Stark, C. 6737.  
Staudigl, R. 7388.  
Stefanini, A. 5545.  
Steffan, Ph. 1857. 1976. 2003.  
2004. 4652.  
Steffens 3910; siehe auch  
Ränge.  
Steifensand 2737.  
Steiger, A. 1354. 1355. 1924.  
2673. 2674. 3823.  
Stein 4096.  
Steinach, E. 776. 795.  
Steinbrügge, H. 3306.  
Steinbuch 6585. 6869.  
Steiner 5257; siehe auch  
Kühne, W.  
Steinhauser 7373. 7377.

Steinheil 1877. 5387.  
Steinheim 5265.  
Steinlin, W. 870. 879.  
Stemer, C. B. 4761.  
Stephenson, H. A. 5127.  
Stephenson, S. 2080.  
Stern, L. W. 5564. 7100.  
Stevally 5906.  
Stevens 6328. 7677.  
Stevens, A. 4860.  
Stevens, W. L. C. 1426; siehe  
ferner Le Conte Stevens.  
Stewart, G. N. 6056.  
Stillling, J. 115. 1054. 1416.  
1589. 1988. 2005. 2006.  
2011. 2018. 2019. 2027.  
2028. 2029. 2049. 2081.  
2100. 2101. 2102. 2931.  
2963. 4435. 4452. 4463.  
4511. 4564. 4565. 4566.  
4607. 4692. 4726. 5026.  
5027. 5039. 5081. 5134.  
5145. 5173. 5816. 5355.  
6446. 6453. 6460. 7618;  
siehe auch Raymond, C.  
Stinde 4121.  
Stöber 1435. 6941. 7625.  
Stöhr, A. 7829.  
Stöhr, Ph. 976.  
Stötting 1082.  
Stokes, A. W. 5120.  
Stokes, G. G. 4230. 4464.  
6517. 6524.  
Stoltz 2248.  
Stolze, F. 7437.  
Stone 5795. 5796. 5799.  
Stoney, G. J. 440. 3844.  
4006.  
Story, J. B. 627. 1427. 3010.  
3136. 3171. 3172.  
Stowell 272.  
Straumann 2012.  
Strauss, v. und Torney 4097.  
Strawbridge 488. 2515.  
Streit, siehe Pfister.  
Stricker 3445. 3568. 6608.  
6611. 7044.  
Stroban, P. 7178. 7181.  
7182.  
Stroh 7403.  
Stromeyer, C. E. 4827.  
Strutt, J. W. 4975. 4388;  
siehe Rayleigh, Lord.  
Stumpf, C. 6606. 6636. 6973.  
7785.  
Sturm 2138. 2139. 2423.  
2207.  
*Sulla cromatoscopia retinica*  
*etc.* 4844.  
Sully 4029. 7796.

Sulzer 618. 628. 629. 638.  
639. 640. 2091. 2688. 2689.  
2690.  
*Sur quelques personnes etc.*  
4236.  
Sutton 7256.  
Swan 4693. 5904. 5905. 5929.  
6250.  
Swanston, G. L. 4883.  
Swanzy, H. R. 2591. 4567.  
5195.  
Sylvester 7341.  
Szabó, G. 948. 949.  
Szilagyi, 4653. 4762. 6461.  
Szili, A. 1556. 2007. 5089.  
5277. 5284. 6295. 6302.  
6949.  
Szokalski 89. 314. 1686.  
2218. 2420. 3047. 3351.  
4202. 4262. 4263. 5224.  
6643. 6649.

T.

T., H. F. 6338.  
Tacquet 7443.  
Tafari, A. 950. 962; siehe  
auch Brigidi.  
*Tafeln und Schriftproben etc.*  
3835.  
Tait 3458. 6194. 7854.  
Talbot 5873. 5877. 5878.  
Talko 3708. 3717. 4568. 5343.  
5700.  
Talma 4413.  
Tamagno 7653.  
Tamburini 128; siehe auch  
Luciani.  
Tannery, P. 5527.  
Tartuferi, F. 971. 972.  
Tartuferi, F. u. Albertotti, G.  
1274.  
Tauber, G. 1516.  
Taylor 442. 6148.  
Telesius, B. 3849.  
Templeton, R. 1734.  
Tennant 4569.  
Tennant, J. F., Lupton, S.,  
Rayleigh u. Cunningham,  
A. 3773.  
Thalheim 2205.  
Thel, J. F. C. 2944. 2945.  
Theobald 2065. 2580.  
Theod, C. G. 1135.  
Thier 2092. 2103.  
Thiersch, A. 7038.  
Thin, G., siehe Ewart, J. C.  
Thomas 641. 1010.  
Thompson 3191.

- Thompeon, J. H. 2722.  
 Thompson, J. L. 4864.  
 Thompson, S. P. 2399. 5592.  
 5674. 5990. 6235. 7051.  
 7052. 7171.  
 Thompson, W. 5156.  
 Thompson u. Brown 273.  
 Thomson 1763. 5367. 5368.  
 Thomson, W. 5048. 5361.  
 5374.  
 Thomson, W. M. 1735.  
 Tiffany, E. B. 6858.  
 Tipton 1977.  
 Titchener, E. B. 3326.  
 Tixier 3525.  
 Tobin 5998.  
 Toepler und Radau 5947.  
 Tomaschewski 254.  
 Tomé, A. M. C. 2991.  
 Tomlinson 5881. 5887. 6376.  
 Tommasi, T. 4763.  
 Tonn, E. 4929.  
 Tornatola, S. 401.  
 Torney, siehe v. Strauss.  
 Tortière, L. 7588.  
 Tour, Du 6990. 7446. 7448.  
 7678. 7679.  
 Tourtual 26. 2379. 3342.  
 6138. 6139. 6366. 6644.  
 6651. 6873. 7214. 7453.  
 Towne, J. 7308. 7319. 7334.  
 7345. 7508. 7541.  
 Trannin 5589.  
 Transon 6142.  
 Trappe 7374.  
 Trautvetter, v. 2268.  
 Trécul 5191. 6466.  
 Treitel 4436. 4979. 4980.  
 4984. 5481. 5482. 5483.  
 5505. 5506. 5528.  
 Treschel 6362.  
 Trève 4809.  
 Treviranus 463. 1160. 2184.  
 3407.  
 Triepel, H. 1563.  
 Trig, A. C. van 2827.  
 Trinchinetti 4265. 6878.  
 Trotter, A. P. 5675.  
 Trotter, C. 5428.  
 Trouessart 2391. 2393. 2436.  
 2747. 5773. 5779.  
 Troxler 6108. 6111.  
 Truhart-Fellin, H. 8251.  
 Tscherbatscheff, B. 3383.  
 Tschermak 7059.  
 Tscherning 577. 585. 586.  
 600. 619. 630. 1312. 1313.  
 1318. 1332. 1340. 1341.  
 1347. 1356. 1820. 1960.  
 1978. 2359. 2362. 2367.  
 2367a. 2684. 2685. 2686.  
 2693. 2694. 2802. 6811.  
 6818. 7661; siehe auch  
 Bourgeois.  
 Tschiriew 6577.  
 Tuberville, D. 4233.  
 Tuellmann, L. 1927.  
 Tumlrz, O. 2403.  
 Tupper, J. L. 2770 6738.  
 Turner, D. 4968.  
 Turner, J. 301.  
 Tweedy, J. 1797. 2522. 2592.  
 Twining, A. C. 5676.  
 Tyndall, J. 2455. 3923. 3924.  
 4290. 5900.
- U.
- Uchatius, F. 5913.  
 Ueberhorst 7574. 7794.  
 Ueberweg 6897. 7015. 7764.  
 Uffreduzzi, B.; siehe Buccola.  
 Uthhoff, W. 556. 578. 2992.  
 3812. 3813. 3998. 3999.  
 5135. 5695. 5698. 5702.  
 6966.  
 Uhry, E. 5222.  
 Ulrich 1990. 2829. 2975. 7611.  
 Ulrici, H. 6602.  
 Unger 4016. 4018. 4022.  
 Uphues, G. K. 6627.  
 Urbantschitsch, V. 92. 129.  
 141. 3291. 3295. 3307.  
 3312.  
 Uschakoff 1396.  
 d'Uzès, S. 3343. 7333.
- V.
- Valentin 1012. 1382. 2217.  
 3410. 6646. 6650.  
 Valerius, H. 3667. 3672.  
 Valk, F. 1636. 3059. 3069.  
 3086.  
 Vallée, L. L. 44. 1172. 1177.  
 1182. 2216. 2383. 2385.  
 2386. 2443. 5750. 5774.  
 Valude 2082. 5290.  
 Valz 5766.  
 Varignon 7118.  
 Varigny, H. de 4164. 6623.  
 Velardi 5364.  
 Velhagen, C. 2104.  
 Venn, J. 7642.  
 Vennemann 2581.  
 Verrey 5203; siehe auch  
 Beranek, E.  
 Verschoor, J. W. 1729.  
 Verstraete, A. 6604. 7781.  
 Vezzeley 3221.  
 Vezzeley, K. K. 2013.  
 Vetsch 5292.  
 Vetter, A. 225.  
 Viale 302. 310. 311; siehe  
 auch Dejeret.  
 Viallanes, H. 415.  
 Vierordt, K. 2754. 3646.  
 4376. 4437. 5576. 5579.  
 5580. 5958. 6162. 7041.  
 Vieth, G. U. A. 7449.  
 Vigerie, D. de la 1419.  
 Vignes 3112. 7434.  
 Vilas, C. H. 2993.  
 Vilmain, G. 2314.  
 Vinci, Leonardo da 4181.  
 5704. 6323. 7206.  
 Vintschgau, M. v. 725. 736.  
 846. 5213. 5216. 5223.  
 Vintschgau, M. v. u. Lustig,  
 A. 6258.  
 Virchow, H. 348. 350. 366.  
 939. 1060. 1079. 2333.  
 Virchow, R. 1043. 4098.  
 4099. 4100. 4101. 4102.  
 Vitali, E. 1348. 5362.  
 Vitellio 7105.  
 Vitzou, A. N. 238. 295. 303.  
 Völckers, C. 7692; siehe auch  
 Hensen.  
 Völckers, C. und Hensen, V.  
 2269.  
 Vogel, H. W. 4828. 4843.  
 4885.  
 Vogel und Zenker 7167.  
 Vogler, J. H. Ch., siehe  
 Beireis, G. C.  
 Vogt 4654.  
 Vogt, J. G. 7581.  
 Voigt 5843. 6106. 6347.  
 Volkelt 4312.  
 Volkmann, A. W. 32. 38.  
 1165. 1166. 1168. 1174.  
 1178. 2192. 2424. 3411.  
 3420. 3433. 3633. 3651.  
 3653. 4198. 5574. 5784.  
 5789. 5790. 6641. 6648.  
 6655. 6692. 6875. 6886.  
 6893. 6894. 6907. 6999.  
 7001. 7003. 7485. 7486.  
 7510. 7511. 7690. 7693.  
 Volpicelli 5970. 7289.  
 Volta 3371.  
 Voltaire 6328.  
 Vossius, A. 3060. 3087.  
 Vossius, J. 3855.  
 Voyburg, P. 2105.  
 Vulpian, A. 68. 703.

## W.

- W. 2736.  
 North, O. F. 927.  
 Olli, G. 928. 951.  
 Or 880.  
 Or, J., siehe Konrad, E.  
 Or, R. 319. 322.  
 Or, v. 855.  
 Ordt, A. J. G. 8316.  
 Or, Th. 6589. 7754. 7755.  
 Or, C. St. 7199.  
 Or, H. 6215.  
 Or, W. 642. 1092.  
 Or, W. 5461.  
 Or, A. 4108.  
 Or, A. R. 4048.  
 Or, J. 1917. 4930; siehe  
 Norris, W. F.  
 Or, W. C. 2225.  
 Or, G. 1553.  
 Or, 4182. 6879. 7136.  
 Or, ark 2430.  
 Or, 6992.  
 Or, 2140. 7685.  
 Or, K., siehe Boerma, D.  
 Or, 2702.  
 Or, A. H. 1807.  
 Or, Th. 6437. 7740.  
 Or, 4245. 6872.  
 Or, J. 6867.  
 Or, nont 1760. 1764. 1889.  
 Or, nont und Nuel 2299.  
 Or, 6769.  
 Or, W. E. 5640.  
 Or, ann, E. 3276. 4261.  
 Or, 4268. 4269. 4272.  
 Or, S. 402.  
 Or, G. F. 4829.  
 Or, siehe Rasmus.  
 Or, 6011. 6012.  
 Or, 5949.  
 Or, A. 482. 4439. 4512.  
 Or, C. 2226.  
 Or, E. H. 666. 668.  
 Or, 3636. 6880. 6883.  
 Or, L. 5627. 5636. 5692.  
 Or, Fox, L. 2114.  
 Or, Fox und Gould,  
 Or, V. 3997. 4810. 4811.  
 Or, L. de 1889. 1890.  
 Or, 1742. 2964. 3691.  
 Or, L. de und Masselon  
 Or, 18. 557. 558. 559. 560.  
 Or, 2565. 2566. 3173.  
 Or, 3804. 5121. 5507.  
 Wecker L. de und Roger  
 2908.  
 Wedel 6983.  
 Weymann, W. F. 3137.  
 Weicker, E. 6397.  
 Weidlich 1548. 2334.  
 Weiland 656. 2664. 2671.  
 3146.  
 Weinhold, A. 4465.  
 Weise, E. 1770.  
 Weisker, G. 1264. 1287.  
 Weiss 579. 6749.  
 Weiss, G. 3805.  
 Weiss, L. 1089. 1090. 1096.  
 1251. 1598. 1939. 1949.  
 1961. 1991. 1992. 1993.  
 2020. 2700. 2946. 6859.  
 Welcker, H. 864. 5771.  
 7703.  
 Weller C. H. 2173.  
 Weller, E. C. A. 2758.  
 Wells 2169. 6104.  
 Wells, S. 2884.  
 Wells, W. C. 7208. 7209.  
 7450. 7683.  
 Werneburg 3903.  
 Wernicke 121. 1422.  
 Werthheim, Th. 3788. 3793.  
 3845. 5546. 6303.  
 Westhoff 5291.  
 Westien, H. 561. 587. 1293.  
 6812.  
 Weyde, A. J. van der 4694.  
 4695.  
 Weymann, W. F. 3137.  
 Wheatstone, C. 5857. 5874.  
 5875. 6143. 7211. 7212.  
 7227. 7258. 7269. 7454.  
 7691; s. auch Brewster, D.  
 Whisson 4235.  
 Whitmell 4696. 6447. 6467.  
 Wicherkiewicz 1097.  
 Widmark, J. 1858. 4000.  
 4001. 4002. 4003. 4004.  
 4007. 6304. 6305. 6315.  
 Wiedemann, E. 99.  
 Wiegmann 4033.  
 Wiener, C. 5547. 5548.  
 5669.  
 Wiers 6841.  
 Wiesener, E. 3429.  
 Wilbrand, H. 196. 226. 274.  
 1417. 1462.  
 Wild, H. 5628.  
 Wilde, E. 7226.  
 Wilhelmi, A. 2709.  
 Wilkens 6345.  
 Wilks, S. 756.  
 Will, F. 321.  
 William, H. W. 1860.  
 Williams 4401. 5204. 6268.  
 Willigen, van der 2454.  
 Wilson 4283. 4286.  
 Wilson, F. M. 1499.  
 Wilson, G. 3958. 4223. 4280.  
 5805.  
 Wilson, H. 2672. 2887. 2888.  
 Wingerath, H. 2050.  
 Winternitz, L. 6823.  
 Wintrich 2880.  
 Wintringham 457. 2409.  
 Wising 197.  
 Witcke 5225.  
 Witkowski, G. J. 1232.  
 Witkowski, L. 6783; siehe  
 auch Raehlmann, E.  
 Witter 2262.  
 Wittich 3434. 4346. 5573.  
 6908.  
 Woerms 5370.  
 Woinow, M. 490. 491. 495.  
 496. 499. 500. 503. 905.  
 1015. 1198. 1201. 1210.  
 1380. 1535. 2123. 2276.  
 2897. 3438. 3658. 4377.  
 4378. 4389. 4424. 4425.  
 4440. 4970. 5163. 5247.  
 5400. 6704. 6705. 6715.  
 6716. 6732. 6916. 7542.  
 7543. 7739; siehe auch  
 Adamück, E. und Reuss.  
 Wolf und André 5804.  
 Wolf, H. 3252.  
 Wolf, M. 2404. 2405.  
 Wolfe 4608.  
 Wolfe, B. J. R. 4570.  
 Wolfe, H. K. 4173.  
 Wolffberg, L. 1791. 2794.  
 3824. 5106. 5115. 5136.  
 5148. 5149. 5155. 5157.  
 5471. 5484. 5485.  
 Wolfsskehl 2549.  
 Wollaston 1514. 7451.  
 Wood 3718. 5049.  
 Woodward, J. H. 643.  
 Wouvermans, A. v. 4307.  
 4319.  
 Wright, A. E. 6306.  
 Wüllner, A. 1117.  
 Wünsch 3888. 4188.  
 Würdemann, H. 2656. 3227.  
 3235. 4861.  
 Wundt, W. 62. 83. 97. 101.  
 4956. 5486. 5508. 6597.  
 6667. 6669. 6670. 6906.  
 7143. 7300. 7498. 7506.  
 7514. 7728. 7731. 7768.  
 7774. 7830.  
 Wyld 5800.  
 Wyngaarden, H. v. 1532.



## Y.

Yeo, siehe Ferrier.  
 Young, C. A. 6203.  
 Young, Th. 103. 458. 1359.  
 1512. 1649. 2156. 2161.  
 2164. 2375. 2410. 3332.  
 4013. 4189. 4981. 5858.  
 Yvon 5583.

## Z.

Zach, de 5749.  
 Zahn 5784. 5824.  
 Zahn, v. 5585.  
 Zander, A. 2859.

Zeeman, P. 6316.  
 Zeglinski, N. 757.  
 Zehender, W. v. 471. 580.  
 588. 1072. 1115. 1131.  
 1132. 1184. 1371. 1574.  
 1890. 1891. 1892. 1918.  
 1925. 2567. 2582. 2681.  
 2842. 2852. 3070. 3435.  
 4070. 6770. 6798. 7612.  
 Zehender, W. u. Matthiessen,  
 L. 1381  
 Zehender, W., Matthiessen,  
 L. u. Jacobsen, O. 1383.  
 Zehfuss, G. 7054.  
 Zenger 1746. 3994. 5107.  
 Zenker W. 4932. 5637.  
 Zenker, siehe Vogel.

Zenner, P. 173.  
 Zeno, T. 7151.  
 Zereletzky 275.  
 Ziegler 4213. 7672.  
 Ziem 441. 802. 3253.  
 Zierninski, 3202.  
 Zimmermann 2342. 5  
 Zinelli 7251.  
 Zinken-Sommer, H. 1  
 Zinn 443. 8401.  
 Zizmann 5968.  
 Zöllner F. 2458. 4366  
 6414. 6605. 6901.  
 7022. 7719.  
 Zachokke 6360.  
 Zumft, J., siehe Köni  
 Zwjaginzew, G. 777.

# TAFELN.

---

